

LOUIS VIDAL

CTIONNAIRE
SPÉCIALITÉS
ARMACEUTIQUES

1938

BUREAU DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
PARIS

P. 11.247

LOUIS VIDAL



DICTIONNAIRE DE SPECIALITÉS PHARMACEUTIQUES



1938

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

107, Rue La Fayette, 1^{er} PARIS (X^e)



Cet ouvrage est distribué par les soins de :
OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

===== SIÈGE SOCIAL : =====

107, rue La Fayette, Paris (Xe).
Tél. : Trudaine 41-05 et 06-84.

AGENCE DE LYON :

8, rue des Marronniers.
Tél. : Franklin 39-83.

AGENCE DE MARSEILLE :

15, rue La Fayette.
Tél. : National 12-65.

AGENCE DE BORDEAUX :

1, rue Albert-de-Mun.
===== Tél. : 76-20. =====

AGENCE DE LILLE :

5, rue Gauthier-de-Châtillon.
===== Tél. : 57-30. =====

OFFICE BELGE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

47-51-55-57, rue François-Bossaerts, Bruxelles.
===== Tél. : 15-79-05. =====

AU CORPS MÉDICAL



Nous avons le plaisir de vous présenter la XIX^e édition du *Dictionnaire de Spécialités pharmaceutiques*, qui, cette année encore, enrichie de produits nouveaux, apporte au Corps Médical la plus complète et la plus pratique des sélections de spécialités digne de retenir son attention.

L'accueil sympathique réservé par tous les Médecins à cet ouvrage, les encouragements de ses très nombreux usagers ainsi que l'appui financier des Laboratoires, nous ont permis de mener à bien notre tâche, fruit, chaque année mûri, de plus de vingt années d'efforts.

Que les uns et les autres soient ici remerciés : ils sont les vrais artisans du succès du Dictionnaire, des services duquel aucun Médecin ne saurait actuellement se priver.

Le présent volume comprend trois parties :

1^o Le Dictionnaire, texte détaillé sur chacun des produits classés alphabétiquement.

2^o Nomenclature nominale de Spécialités Pharmaceutiques médicales (celles faisant l'objet d'une insertion en première partie étant précédées d'un astérisque) avec les adresses de leurs fabricants.

3^o Nomenclature de Spécialités Pharmaceutiques, classées par ordre alphabétique de Laboratoires.

Le tirage de l'Édition 1938, porté à 25 000 exemplaires, nous permettra, nous l'espérons, de donner satisfaction à toutes les demandes.

Comme par le passé, nous restons à votre disposition pour tous renseignements d'ordre médico-pharmaceutique dont vous pourriez avoir besoin, en vous adressant à nos bureaux ou à nos agents visiteurs. Nous nous efforçons toujours, dans la mesure de nos moyens, de vous rendre service.

Estimant qu'à l'heure actuelle un pareil ouvrage constitue un lien étroit et d'une absolue nécessité entre Praticiens et Laboratoires, nous sommes persuadés que le *Dictionnaire de Spécialités pharmaceutiques*, ce doyen toujours jeune et si moderne des ouvrages de documentation spécialisée, restera le guide précieux et l'ami fidèle, à portée de la main, dont vous continuerez à apprécier chaque jour les réels services.

LOUIS VIDAL.

Novembre 1937.

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques doit son excellente réputation au soin apporté à sa rédaction. Sa composition est cependant si complexe qu'une erreur a pu s'y glisser. Il va sans dire que nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en résulter.

DICIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques est une
œuvre de haute valeur scientifique et technique, qui
répond à un besoin urgent de la profession et du public.
Il est le fruit d'un labeur soutenu et d'une collaboration
fructueuse.

**" A 313 "****Usage externe.**

Solution huileuse de vitamine A et de ses produits de désintégration.

Indications. — Traitement des plaies atones, suppuration chronique, escarres, brûlures étendues, fistules, détermine un bourgeonnement très actif des tissus et provoque la cicatrisation.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de un cc.

Utilisation. — *Plaies atones, escarres, brûlures.* Répandre sur le tissu à traiter le contenu d'une ou plusieurs ampoules, recouvrir de gaze stérile et laisser en place 4 jours. *Fistules, Foyers d'ostéomyélites.* Injecter la solution dans le trajet fistuleux ou dans le foyer. Répéter les injections tous les 2 jours.

" A 313 "**Injectable.**

Solution huileuse de vitamine A pour injections intramusculaires.

Indications. — Traitement des infections généralisées. Scepticémies, Pneumonies, Fièvres typhoïdes. Ostéomyélites aiguës.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 0 cc. 5.

Utilisation. — Injections intramusculaires, une ampoule tous les 2 jours chez l'enfant, une ampoule tous les jours chez l'adulte.

Labor. pharmaceutiques CHABRE Frères
TOULON

ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.
Le plus puissant antiseptique urinaire.

Composition. — Citro-lactate de lithine.
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

Indications. — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.). Goutte, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.
Le flacon : 16 francs.

Laboratoire de l'ABSURIC

17, rue de Provence — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 76-18.)

ACAIOL

Dragées.

Composition. — Héxaméthylène-Tétramine, Salol, Benzoate de Soude, Salicylate de Soude, Benzoate de Lithine, Extrait d'Ache, Busserole.

Indications. — Médication antiseptique de toutes les affections Urinaires, Biliaires et Intestinales.

Doses quotidiennes (à prendre aux repas). —

Adultes : 3 à 9 dragées par jour.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour.

(Avaler sans croquer dans 1/2 verre d'eau ou infusion.)

Prix au public : 13 fr. 50 le tube.

Laboratoire LAMO

R. ROUSSEAU, Docteur en pharmacie,
49, rue du Château-d'Eau.

Dépôt général :

52, rue de Crimée — PARIS (XIX^e).

Tél. : Nord 16-71.

ACATAR

(a privatif, contre le catarrhe).

Médication balsamique par excellence.

Composition. — Pilules glutinisées à base de Baume de Tolu, Terpènes d'Abiès, Cinnamo-benzoate de soude, Goudrons de pinus et Juniperus (Harlem), Argent colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Véritable balsamique très doux n'irritant pas les reins, médication antiseptique et anti-infectieuse, modifiant les sécrétions, applicable dans tous les écoulements aigus ou chroniques, toutes manifestations catarrhales irritatives ou douloureuses des voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales (cystites, cystalgies, gonorrhées, prostatorrhées, néphrites, toutes pyélo-néphrites, tuberculoses rénale ou intestinale, etc...).

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 9 pilules par jour en 3 fois.

Le flacon : 16 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

ACÉCOLINE-SOLUTION

Chlorure d'acétylcholine en solution anhydre et stable, directement injectable par voie intramusculaire.

Boîtes de 6 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr.

Propriétés. — L'*Acécoline-solution* dilate les artères de la périphérie, résout les spasmes vasculaires et régularise la circulation périphérique. Elle renforce en outre puissamment le tonus des muscles lisses et rééquilibre le système neuro-végétatif. L'*Acécoline-solution* est parfaitement tolérée, elle n'a pas de contre-indication.

Indications et posologie :

- 1° *Affections artérielles périphériques* : Artérites chroniques, syndrome de Raynaud : 20 à 60 cgr. par jour.
- 2° *Affections veineuses périphériques* : Ulcères variqueux, 10 cgr. par jour ; Phlébites 10 à 40 cgr. par jour.
- 3° *Affections vasculaires générales* : Hypertension artérielle, angine de poitrine : 10 à 20 cgr. par jour.
- 4° *Affections neurologiques* : Ramollissement cérébral, 20 à 40 cgr. par jour ; troubles de la ponction lombaire, 20 cgr. ; sciatique, 20 cgr. par jour.
- 5° *Indications ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques* : Spasmes de l'artère centrale de la rétine, 20 à 40 cgr. par jour ; Glaucome, 20 cgr. par jour. Vertiges labyrinthiques, Bourdonnements d'oreilles, Ozène, 10 à 20 cgr. par jour.
- 6° *Indications gastro-entérologiques* : Hypochlorhydrie, Hyperchlorhydrie, 20 à 40 cgr. par jour. Atonie vésiculaire, 10 à 20 cgr. par jour.
- 7° *Indications phthisiologiques* : Sueurs profuses des tuberculeux, 2 à 4 cgr. par jour.

Boîtes de 6 ampoules de 10 cgr. — Prix : 30 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT
52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr : Chevrematte-90—Paris.

ACÉCOLINE-SPARTÉINE

Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-
line) 0 gr. 10

Spartéine (Sulfate) 0 gr. 05

*Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents
d'insuffisance ventriculaire gauche.*

Posologie. — Injection 1 à 3 ampoules par jour.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLINE-CAMPHRE

Vaso-dilatateur et Eupnélique

Acécoline (Chlorure d'Acétylcho-
line) 0 gr. 10

Camphre..... 0 gr. 20

*Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hyperten-
dus.*

Posologie. — 1 ampoule matin et soir.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLINE-YOHIMBINE

Hypotenseur et Sympathicolytique.

Acécoline (Chlorure d'Acétylcholine). 0 gr. 10

Yohimbine 0 gr. 01

*Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions
paroxystiques.*

Contre-indications. — Ramollissement cérébral
et spasmes des artères rétiniennees.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules
dans les cas d'urgence.

Prix : 30 francs.

ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

*Traitement des Ulcères variqueux, des Plaies atones
et des Dermatoses*

(Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de
zinc, de titane ; ichtyol, etc...)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

Le tube. Prix : 15 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32 Télégr : Chevrematte-90 — Paris

ACEPILINE

Composition. — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopécies post-fébriles, Alopécies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin, peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

Le flacon 250 cc. Prix : 28 francs.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).
(Tél. : Gobelins 39-44.)

ACÉRYL

Composition. — Extrait fluide concentré sucré et aromatisé, contenant les principes actifs du trèfle d'eau, du pissenlit, du maïs, de l'épine-vinette, de la benoîte, associés aux principes aromatiques de la verveine, de l'angélique et de l'écorce d'orange amère.

Propriétés et indications. — Médication apéritive et stimulante du foie et de l'estomac. — Spécifique de l'anorexie. — Uniquement à base de plantes. — Aucun produit chimique. — Aucun produit toxique.

Posologie et mode d'emploi. — Aucune contre-indication. Une cuillerée à café dans un 1/2 verre d'eau trois fois par jour, un quart d'heure avant chaque repas.
Enfants : demi-dose.

Prix : 18 francs le flacon de 125 cc. représentant 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

J. BLANCHARD

PONT-DE-VAUX (Ain).

(Tél. : 86.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le N° 1195-1.

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaïne.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS. (Tél. : Littré 26-92.)

ACÉTAMONE

Préparation à base d'acétate d'ammoniaque stabilisé chimiquement pur.

Composition. — Présenté dans une solution de pH optimum assurant une conservation indéfinie.

Une cuillerée à soupe = 1 gr. d'acétate d'ammoniaque stabilisé.

Propriétés. — Stimulant diffusible le plus énergique et le plus inoffensif, diaphorétique, tonique, anti-infectieux.

Indications. — Toutes les *maladies fébriles*. — *Maladies infectieuses* : grippe, rougeole, rubéole, varicelle, oreillons, scarlatine, etc. — *Les affections aiguës de l'appareil respiratoire* : angine, trachéite, bronchite, congestion pulmonaire, broncho-pneumonie, pneumonie. — *Les affections cardiaques* : myocardites, collapsus.

Présentation et prix. — Flacon de 150 cc. : prix 16 fr.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 3 à 8 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 3 à 8 cuill. à dessert par jour suivant l'âge.

Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café par jour à prendre pur ou dans un liquide tiède.

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD

Docteur ès Sciences.

Ancien chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris,

40, rue de Bellechasse, Paris (VII^e). (Tél. : Inv. 78-44.)

ACÉTYLARSAN

4 oxy — 3 acétylamino — phényl — 1 arsinat de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien toléré. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentations et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cm³. (Boîtes de 10.)

Acétylarsan infantile : solution à 9,4 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cm³. (Boîtes de 10.)

Injectons hebdomadaires ou bihebdomadaires (consulter la *Notice spéciale*).

Prix de vente :

A. Pour adultes : 30 francs.

A. Infantile : 20 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

Forme. — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

Formule. — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; Extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de lobellie 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dower, 0,06 pour 1 comprimé.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Indications. — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 403-1.

Prix : 12 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

ACOÉGÉNOL

Principes actifs. — Iodures de rubidium, de césium, de sodium, iode, mimotannin (tannin extrait du mimosa), teintures d'aconit, de gelsemium, de cimicifuga et de ballote.

Action. — Action principale sur la nutrition, action secondaire sur circulation et enfin action antispasmodique et sédative.

Indications. — Bourdonnements, vertiges, surdité.

Mode d'emploi. — Se prend avec de l'eau sucrée ou non, avec de l'eau vineuse ou avec une infusion. Pour les personnes particulièrement sensibles à l'iode le prendre dans de l'eau bicarbonatée ou dans du lait.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuillerées à café par jour, 24 jours par mois, 1 cuillerée avant chacun des 2 principaux repas. On peut augmenter la dose et prendre une troisième cuillerée à café le soir en se couchant. (Il est bon, surtout s'il y a de l'otosclérose, de prendre les gouttes Chauvin à l'Audisclérocure.)

Prescription. — Il est bon de faire suivre le produit du nom patronymique et de prescrire ainsi : un Acoégénol Chauvin.

Le flacon : 20 francs.

Établissements Alfred CHAUVIN
AUBENAS (Ardèche).

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur, charbon activé, carbonate de calcium amorphe, salicylate de bismuth, peroxyde de magnésium, belladone pulvérisée titrée (0,01 par dose).

Présentation. — Granulé fondant et poudre.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant, fixateur et sédatif. Entrave les processus inflammatoires. Ramène à la normale le chimisme de l'intestin, en régularise le péristaltisme. Empêche les fermentations anormales. Adsorbe les toxines microbiennes endogènes ou exogènes. Modifie la flore protéolytique.

Indications. — Colites, gastro-entérites, entéro-colites, fermentations, intoxications et auto-intoxications, infections intestinales, dysenterie, entérite des tuberculeux, colibacillose.

Posologie. — Une cuillerée à entremets croquée ou délayée dans un demi-verre d'eau le matin à jeun, et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.
(Voir Rect'Acolitol, pansement recto-sigmoïdien).

Prix : 16 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Élysées 17-46.)

ACONITINE HOUDÉ

Granules titrés à 1/10^e de milligramme.

Propriétés thérapeutiques. — Action analgésique, puis anesthésique, *élective*, sur les noyaux sensitifs bulbo-spinaux (Nerfs de la face, *trijumeau*).

Indications. — Médication *spécifique* des *névralgies faciales graves ou rebelles*. Très efficace dans certaines *sciaticques*.

Présentation. — Granules titrés à 1/10^e de milligramme de Nitrate d'aconitine (alcaloïde de l'*Aconitum napellus*).

Posologie. — Produit très actif à petite dose. Débuter par un granule (dépistage des intolérances). Augmenter jusqu'à 5 granules, par doses réfractées. Limite maxima : 10 granules (1 milligramme). Contre-indications : Insuffisance cardiaque ou urinaire.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 40-58.

ACTIBAÏNE

Solution d'*Ouabaïne Arnaud* à 2/100

L gouttes = 20 mg.

L'*Actibaïne*, outre sa maniabilité, l'absence d'effet toxique réel et d'accumulation, ne donne pas lieu aux phénomènes d'accoutumance, ce qui permet des thérapeutiques d'entretien continues et prolongées autant qu'il est nécessaire.

Indications. — Insuffisance ventriculaire gauche des aortiques et des hypertendus, Myocardites diverses à cœur régulier, toutes Cardiopathies décompensées, notamment pour réactiver la Digitaline et ses effets diurétiques. Aucune contre-indication.

Posologie. — A régler suivant l'intensité des troubles cardiaques et les résultats obtenus sur dyspnée, sommeil, diurèse et fréquence du pouls.

Doses d'attaque. — XL à LX gouttes d'*Actibaïne* (16 à 24 mg. d'*Ouabaïne Arnaud*) par 24 heures, à prendre en deux ou trois fois à distance de toute alimentation.

Doses d'entretien. — XXV à XL gouttes d'*Actibaïne* par jour (10 à 16 mg. d'*Ouabaïne Arnaud*) en deux prises par 24 heures.

Prix : 18 frs, 45

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

ACTICARBINE

2 formes, 4 formules.

Granulé anisé : Acticarbine simple : Charbon animal purifié ; charbon végétal suractivé, Hexaméthylène. Tétramine chimiquement pure ; *Acticarbine naphtolée* : Même association + 5 p. 100 benzonaphtol.

Poudre sans arôme, sans sucre (diabétiques).

Acticarbine simple : charbon animal purifié — charbon végétal suractivé — Hexaméthylène. Tétramine chimiquement pure.

Acticarbine naphtolée : Même association + Benzonaphtol + carbonate de chaux + magnésie calcinée + peroxyde de magnésium.

Contenance 125 grammes (flacon de 210 cc.)

Prix : Granulé 15 francs. Poudre : 16 francs.

Indications. — Toutes affections et infections gastriques, intestinales, biliaires, urinaires et troubles digestifs d'origine hépato-biliaire (auto-intoxication intestinale).

Posologie. — *Granulé* : 1 à 3 cuillerées à café à la fin des repas, croquées ou délayées dans un peu d'eau.

Poudre : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau.

Acticarbine poudre ne contenant pas de sucre peut être prescrite aux diabétiques.

Dans le cas où l'on recherche une action intense et rapide, prescrire *Acticarbine poudre* simple ou naphtolée selon les cas.

Intoxications alimentaires : empoisonnements : 3 à 4 cuillerées à soupe d'*Acticarbine* poudre délayées dans de l'eau (faire absorber ou introduire dans l'estomac par la sonde après lavage).

Par la finesse de leur grain, les Charbons utilisés dans les préparations de l'*Acticarbine* développent une surface absorbante et adsorbante considérable.

Echantillons d'*Acticarbine* sur demande (Médic. à conserver dans la trousse d'urgence).

Laboratoires SEDA

149, avenue des Minimes — TOULOUSE

ACTIFORMINE

Forme. — Granulé effervescent soluble dans l'eau.

Composition. — Extrait rénal, Uroformine, Pipérazine, Benzoate de soude, Lithine, Citrons.

Action. — Active la diurèse. Élimine acide urique, urates et oxalates, antiseptise les suppurations rénales et urinaires, diminue la viscosité sanguine. Régularise la circulation, la tension artérielle et la nutrition des tissus.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Lithiase hépatique et rénale, Hypertension, Artériosclérose, Infections des voies urinaires.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dissous dans un demi-verre d'eau au début des repas.

Flacon contenant 25 cuillerées à café de granulé (8 jours de traitement).

Laboratoires SEDA

149, avenue des Minimes — TOULOUSE

ACTIPHOS

A base de Phosphates Monométalliques de Magnésium, associés au Calolum, Manganèse, Lithium et Fer.

Caractéristiques. — Puissant modificateur du pH dans tous les cas d'alcalose sanguine.

Reminéralisateur et reconstituant puissant dans toutes les affections diathésiques caractérisées par un *Déséquilibre acido-basique* ou une *Reminéralisation*.

Mode d'action. — Rétablit l'équilibre acido-basique sans toucher à la réserve alcaline et sans déminéralisation par l'action de ses *Radicaux phosphatés non saturés*.

Avantages. — 1° Un effet plus rapide et plus énergique que l'*Acide phosphorique* officinal ou les autres Préparations spécialisées usuelles à base de cet acide, dont l'action est lente, puisqu'ils doivent d'abord faire subir une transformation totale à la réserve alcaline et l'acidification est faible, car l'acide carbonique est faible et l'élimination gazeuse est rapide.

2° Une augmentation plus régulière de l'acidité sanguine et une reminéralisation prolongée, contrairement à ce qui se passe avec les acidifiants énergiques, tels que les *Chlorures alcalins* : $\text{NH}^4 \text{Cl}$ ou Ca Cl^2 , bouleverseurs trop brusques du métabolisme minéral et aqueux et exerçant une action irritative sur les muqueuses gastriques.

3° Un effet acidifiant en agissant uniquement sur la teneur en CO^2 libre du sang, sans porter atteinte à la réserve alcaline. Le métabolisme minéral est donc intégralement préservé, tout en augmentant et en équilibrant la concentration en ions H du sang.

Forme. — Ampoules buvables de 3 cc. (**non injectables.**)

Posologie. — Dose de 24 heures :

Adultes : 2 à 4 ampoules suivant avis médical, à prendre pendant les principaux repas dans un verre d'eau coupée de vin ou sucrée à volonté.

Enfants : 1 à 2 ampoules suivant l'âge à prendre pendant les repas dans un verre d'eau sucrée à volonté.

Prix : 20 francs. (La boîte de 14 ampoules.)

Laboratoires du **GAMBÉOL**

J. Gautier, Pharmacien

42, rue Émile-Deschanel. — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 17-67.

ADONAL VICARIO

Phényl-éthyl-malonyl-urée.

Comprimés à 10 centigrammes et à 1 centigramme.

Sédatif énergique — hypnotique.

Anticonvulsivant, son emploi constitue le traitement de choix du mal comitial.

La forme spéciale des comprimés à 10 centigrammes permet la division facile soit en quatre parties égales, soit en deux (2 centigrammes et demi ou 5 centigrammes).

Les comprimés à 1 centigramme contiennent un peu de cacao.

Doses habituelles. — De 2 centigrammes et demi à 30 centigrammes par jour, à prendre loin des repas, pour les adultes.

Enfants : de 1 à 5 centigrammes.

La boîte de 20 comprimés à 10 centigr. : 8 fr.

La boîte de 60 comprimés à 1 centigr. : 6 fr.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Etalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XL gouttes ou 4 granules ou un suppositoire = 1 cc. d'une solution à 5 p. 1.000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale : XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Par voie rectale : 1 suppositoire une à trois fois par jour.

Adoverne « Roche »

Gouttes (flacon de 15 cc.).

Granules (flacon de 60).

Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-2 (*gouttes*), 504-3 (*granules*), 504-64 (*suppositoires*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ADRÉNALINE AGUETTANT

Entièrement naturelle — Pureté contrôlée.
Nous tenons à affirmer l'origine naturelle de
notre préparation.

L'adrénaline naturelle, bien purifiée, est plus active que la synthétique, dans la plupart des cas. Elle seule règle l'équilibre endocrinien.

Forme. — Produit cristallisé.

Solution: Ampoules injectables (tous dosages).

Flacons (15 et 30 gr. à 1/1000).

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON

(Tél. : Franklin 24-63).

ADRÉNALINE CARRION

Adrénaline *naturelle*, extraite des glandes surrénales.

Formes :

Solution au millième en ampoules, pour injections, et en flacon pour l'administration *per os* et l'usage externe.

Indications :

Adynamie, hypotension, Maladie d'Addison, Vomissements incoercibles de la grossesse, Ostéomalacie, Rachitisme, Phénomènes de choc. Crise nitroïde, Hémorragies, Applications locales.

Présentation et prix :

Le flacon de 10 cc. : 10 francs.

La boîte de 6 amp. de 1 cc. : 10 francs.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ADRÉNALINE CHOAY

Chlorhydrate d'Adrénaline physiologique.

Nature. — Principe hypertenseur, vasoconstricteur et cardiotonique extrait des capsules surrénales (*Adrénaline naturelle*).

Indications:

Applications locales: Hémostatique, Adjuvant à l'anesthésie locale.

Indications hypodermiques ou intramusculaires. — Hypotension, Etat de shock, Crises nitritoïdes, Asthme essentiel.

Par la bouche: Peu active. Préférer l'opothérapie surrénale.

Formes pharmaceutiques.

Flacons de 15 cc. de solution au 1/1000°.

(Vingt gouttes représentent 1 cc. de solution, soit un mgr. de chlorhydrate d'adrénaline).

Ampoules de solution au 1/1000° (1/cc. = 1 mgr.).

Ampoules de solution au 1/2000° (1/cc. = 1/2 mgr.).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

ADRÉNALINE CLIN

Adrénaline lévogyre chimiquement pure, exempte de toute adrénaline racémique.

Pouvoir rotatoire : 53°,3.

Propriétés. — Agent vaso-constricteur et hémostatique, ayant une action cardiotonique, antidépressive et antitoxique. Analgésique léger et antichoc.

Excitateur du système nerveux sympathique.

Indications. — Anesthésie locale, hémorragies ; phénomènes de collapsus, de choc ; syncope chloroformique ; infections générales avec adynamie ; asthme ; vomissements incoercibles de la grossesse ; intoxications aiguës ; asthénie ; crises nitritoïdes ; certaines algies ; ostéomalacie ; rachitisme ; maladie d'Addison ; certaines affections oculaires, etc...

Formes. — 1° *Solution aqueuse* (Chlorhydrate d'Adrénaline) au 1/1000. — Flacon de 5, 10, 30 cc. (20 gouttes = 0 gr. 001).

2° *Ampoules injectables* (Solution aqueuse) dosées à 1/10, 1/4, 1/2, 1 milligramme par cc.

3° *Ampoules compte-gouttes* de 10 cc. pour Collyres (Solution aqueuse à 1 0/00). Instillations nasales (Solution huileuse en ampoules compte-gouttes de 25 cc.).

4° *Granulés* au 1/4, 1/2, 1 milligramme. — Flacons de 50 granulés.

5° *Suppositoires* au 1/2 milligr.

Formes associées (cocaïne, etc...) en ampoules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachistisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules de 1 cc. boîtes de 6 ampoules au milligr. Solution au millième, flacons de 5 et 10 grammes.

Le flacon de 10 grammes.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

ADRÉNALINE SAUBA TABLETTES

Forme. — *Tablettes divisibles* en deux parties rigoureusement égales.

Composition. — Chaque tablette équivaut à 5 gouttes de solution d'Adrénaline à 1/1000^e; chaque demi-tablette à 2 gouttes et demie.

Avantages. — Stabilisation du principe actif. Lenteur obligatoire de l'absorption laissant le médicament un assez long temps au contact des muqueuses.

Propriétés thérapeutiques. — *Vaso-constricteur, Hémostatique, Stimulant de la circulation, Reminéralisant par fixation des sels de chaux et de magnésie.*

Indications. — Hémoptysies, Hémorragies internes, Hématémèse, Tuberculose, Rachitisme, Asthme, Accès pernicieux du paludisme, Crise nitritoïde, Iodisme, Maladie d'Addison, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi { Adultes : 4 tablettes par jour.
 { Enfants : 2 à 4 demi-tablettes suivant l'âge.

Les tablettes ne doivent pas être croquées ; les laisser fondre dans la bouche.

Prix : 11 francs.

Laboratoires SAUBA — MONTREUIL-PARIS.

Tél. : Avron 25-80.

ADRÉNARGOL

Composition :

Adréraline physiologique associée aux sels d'Argent : protéinate d'Argent et vitellinate d'Argent, en solution aqueuse, isotonique et stérile.

Avantages :

Bactéricide stable et énergique. Action rapide. Tolérance parfaite.

Présentation :

Ampoule nasale scellée très pratique à l'emploi. Olive compte-gouttes stérilisable.

Indications :

Infections du Rhino-Pharynx (Sinusites, Coryzas, Angines, etc.) : Antisepsie des Voies respiratoires, de l'Œil, de l'Oreille ; prophylaxie des maladies contagieuses (Grippe, Coqueluche, Rougeole, etc.).

Posologie :

Rhinologie : IV à V gouttes dans chaque narine, matin et soir, plus souvent si nécessaire.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade, 2 à 3 fois par jour.

Oculistique : introduire 2 fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Prix : 17 francs.

Durée du traitement : 15 à 25 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

ADRÉNINE

Soluté au millième de Chlorhydrate d'Adrénaline cristallisée.

Véritable principe actif, extrait des Capsules surrénales.

XX gouttes = un milligramme.

Anesthésie locale, Hémorragie, Phénomènes de Choc et de Collapsus cardiaque, Syncope chloroformique, Asthme, Vomissements incoercibles de la grossesse, Intoxications aiguës, Asthénie, Crises nitritoïdes, Maladies d'Addison, etc.

Dose forte :

Per os : C gouttes à doses fractionnées par 24 heures (toutes les heures X gouttes).

Conservation indéfinie.

Un flacon mal bouché s'évapore rapidement.

Flacon de 20 cc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

Tél. : Richelieu 35-10.

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes. — Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition. — Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie. — 3 doses par jour.

Prix : Cachets : 12 fr. Granulé : 10 fr.

Poudre : 10 fr.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie

GRANVILLE (Manche).

ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

Composition. — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter. » (*Bulletin Société Biologie*, mai 1922.)

Mode d'emploi. — Laisser fondre les *Adrénoïdes* dans la bouche. « Ce serait perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

Posologie. — Un *Adrénoïde* toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Tous états de dépression organique et circulatoire.

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte : 12 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ADRÉNOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — *Huile adrénalinée* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée d'action* est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

Indications thérapeutiques. — Sinusites, Hémorragies nasales, Catarrhe nasal, Troubles respiratoires et Coryza de l'enfance, Adénoidites aiguës.

L'Adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine), 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique (type Vaast grand modèle), avant les inhalations.

Prescription. — Un flacon *Adrénoléine Falvy*.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencé ès sciences. Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

ADRÉPATINE

Composition. — Association pluriglandulaire : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate. — Extraits végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé. Cupressus, Hamamélis. — Excipient antiseptique et calmant.

Propriétés et indications. — L'ADRÉPATINE est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3° Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique, est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des hémorroïdes internes et externes, des Rectites, Prostatites, du Prurit anal et des fistules.

Formes. — Suppositoires et pommade.

Posologie et mode d'emploi. — de 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de pommade est muni d'une canule rectale.

Durée moyenne des unités de vente : 12 à 15 jours.

Prix de vente { Boîte de 15 suppositoires..... 12 fr. 50
 au public { Tube de pommade avec canule rectale ... 12 fr. 50

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). — (Trocadéro : 62-24.)

ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.

Composition. — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Éphédrine Béral par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à dose égale elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses inconvénients.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment *Accès d'asthme déclenchés, États de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus* (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), *États hémogéniques, Purpuras, Anémies, Hémoptysies, Urticaire* (effet immédiat), etc.

Posologie. — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Prix : la boîte de 5 : 15 francs.

Formuler : Adréphédrine. Une boîte.

Laboratoire de l'Éphédrine BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

AÉINE

Médication type des troubles vago-sympathiques et particulièrement de l'émotivité et du trac.

Forme. — Petits comprimés jaunes de 0 gr. 25, non solubles.

Composition. — Complexe de cortico-surrénale (2 cgr.) associé à la Malonylurée (15 mgr.), Ephédrine (5 mgr.) et Peptone polyvalente.

Coefficient de toxicité nul, élimination en 1 h. 1/2 au lieu de 7 à 8 heures
Aucune contre-indication.

Indications. — Toutes affections ou symptômes sous la dépendance du déséquilibre vago-sympathique et endocrinien (instabilité vagale). C'est le terrain neuro-végétatif qui conditionne la maladie que le Dr Bayard a décrite sous le nom d'AÉISME (Anxiété, Emotivité, Irritabilité et Insomnies). C'est le médicament des névrodermites, de l'urticaire, de l'œdème de Quincke agissant par désensibilisation, de l'asthme, névrose des voies respiratoires, des troubles psychiques de la menstruation et de la ménopause. (C. Litt. avec préface du Prof. Laignel-Lavastine).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, 2 avant chaque repas ou en se couchant. 2 à 3 comprimés chez les enfants.

Prix : 12 fr. 50 le tube (pour 8 jours de traitement).

Laboratoire de l'AÉINE

6, place Clichy — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 65-18.)

AÉROCID

Conception entièrement nouvelle.

Traitement opothérapique de l'aérophagie et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par de nombreux auteurs.

Formule :

Parathyroïde.....	0,001
Hypophyse.....	0,05
Splénine.....	0,05
Surrénine.....	0,02
Hépatine.....	0,30

Indications. — Aérophagie, Asthme, Emphysème, Fausse angine de poitrine, Insomnie.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher, avec un verre d'eau.

Présentation :

Boîte de 20 cachets.....	20 fr.
Etui de 40 comprimés.....	20 fr.

Pour obtenir la guérison suivre le traitement 50 jours.

La Boîte-cure : 90 francs.

Laboratoire de l'AÉROCID

G. SCHMIT, pharmacien

71, rue Sainte-Anne — PARIS (II^e).

(Tél. : Richelieu 19-26.)

AÉROCOLYL

du Docteur Moity

Granulé Fondant.

Introduction dans la thérapeutique courante de trois corps nouveaux.

1° **GEL DE SILICE** en association synergique avec le *charbon suractivé* (aires d'absorption mutuellement augmentées de 50 p.100).

2° **LE SILICATE DE CALCIUM ACTIVE.** — 5 gr. absorbent 268 cc. de gaz de fermentation.

3° **LA FORMINE ARGENTIQUE** (combinaison d'argent et d'héxaméthylène-tétramine), antiseptique puissant non toxique.

Formule. — Gel de Silice, 5 (aire d'absorption $4,5 \times 106$ cc.).

Charbon activé, 15 (aire d'absorption $6,3 \times 106$ cc.).

Silicate de Ca activé, 7,50 (5 gr. absorbent 268 cc.) de CO_2 .

Formine argentique titrant 13 p.100 d'argent, 2.

Poudre de belladone, 0,15 pour 100 gr.

Indications. — Aérocolie, Aérophagie, Colites diverses, états infectieux du tube digestif, diarrhées, colibacillose, auto-intoxications, dermatoses.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café aux trois repas.

Prix : 16 fr. 50 la boîte contenant 125 grammes de granulé.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire M. de RIVE

J.-O. MOITY, Docteur en Médecine et en Pharmacie

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

199, Bd Bineau — NEUILLY (Seine).

Services commerciaux : 2, rue Mélingue, PARIS (19°).

AÉROPHAGYL

Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br sédatif et Ca antispasmodique.

Indications. — Spécifique de l'Aérophagie, dans toutes ses manifestations : digestives : éructations, ballonnements, aérocolie ; respiratoires : dyspnées, faux asthme ; circulatoires : tachycardie, palpitations, faux angor. Insomnies d'origine digestive. Gastrites nerveuses. Médication bromurée calcique dissimulée (0,25 CaBr par comprimé).

Posologie. — 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau au milieu des repas. En cas de crise, 2 comprimés à la fois.

Enfants : Demi-dose.

Présentation et Prix. — Boîte de 45 comprimés, pour 2 semaines de traitement : 15 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).

(Tél. : Nord 76-85.)

ÆSCULASE

Composition. — Alcoolature de marrons d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

Propriétés thérapeutiques. — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

Indications. — Tous les troubles circulatoires, Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

Mode d'emploi :

Troubles de la circulation : XV gouttes avant les deux repas. Hémorroïdes : pour éviter les crises X gouttes avant les deux repas.

Dans les crises aiguës : XX à L gouttes 2 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.
(Tél. : 308.)

ÆTHONE

Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.

Doses. — 1° Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge. de 1 à 2 ans : XII à XX gouttes. de 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes. de 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes. de 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes, et plus s'il est nécessaire.
------------------------	---	---

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée, de sirop de tolu additionné d'eau, ou dans une infusion de Guimauve sucrée avec du miel. L'Æthone doit être administrée 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

Prix : 10 fr. 80 le flacon.

Laboratoire de l'ÆTHONE

35, rue Boissonnade — PARIS.
(Tél. : Danton 92-10.)

AFFINEX

Spécifique *inoffensif* de l'obésité
de formule strictement végétale
(sans opothérapie ni produit chimique).

Composition. — *Fucus vesiculosus*, suc titré
d'*Aloe*, poudre de rhamnées et de *Rheum*.

Présentation. — Dragées : Le flacon de 60 : 19 fr. 70.

Avantages. — L'action amaigrissante du *Fucus* est
renforcée par celle d'un laxatif doux qui réduit
l'assimilation et « brûle » électivement les masses
adipeuses sans préjudice pour les muscles, sans
déprimer le sujet ni l'astreindre à un régime ali-
mentaire trop exclusif.

Moyenne d'amaigrissement : 2 kg. 500 par mois.

Mode d'emploi. — 1 (ou 2) dragées après chaque
repas.

Laboratoire du MENSUOSÉDYL

P. AUGIER, pharmacien

2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

Tél. : Archives 09-04.

AGARASE

(Comprimés.)

Régulateur et rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales. Laxatif des femmes, des hépatiques, des gros mangeurs, des coloniaux.

Composition. — Extrait de bile purifiée, Peptones de levure (Vitamine B), Extraits intestinaux (Duodénum), Agar-Agar, Ferments lactiques, etc.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes. Constipation des neuro-arthritiques, de la grossesse, des sédentaires. Colites et entérites diverses, Maux de tête, Migraines d'origine intestinale, Maladies cutanées de même origine.

Affections hépato-biliaires, Congestions hépatiques des coloniaux et des gros mangeurs, Ictères, Cirrhoses, Cholécystites, Angiocholites, Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés au repas du soir. A avaler avec un peu d'eau sans croquer.

Prix : 12 francs.

G. RÉAUBOURG et Cie,
Docteur en Pharmacie,
115, rue de Paris
BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

AGAROL

Traitement rationnel de la constipation.

Émulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée ou non, infusions, potages).

Composition :

Huile de paraffine, *spécialement traitée*, et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphtaléine chimiquement pure.

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices. Absence totale d'inconvénients.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion, ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : De 2 à 4 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.
(Tél. : 11-21-41.)

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-billaire.

Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.
Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.
Réalise le drainage des voies biliaires *per os* et le rend facile en clientèle.

Indications :

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.
Lithiase biliaire.
Ictère et Cholémie.
Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs.	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	} d'origine hépato-billaire.
Certains troubles généraux.	{	Céphalées, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.	

Contre-Indications (Temporaires).

Cholécystites aiguës.
Diarrhées aiguës.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau chaude.

Enfants : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

N. B. — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 18 fr. 50

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.
24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e)
(Tél. : Diderot 28-96.)

AGOMENSINE

CIBA

Extrait ovarien hydrosoluble.

Action physiologique. — Congestionnante de la muqueuse utérine, stimulante de l'ovaire, aide au déclenchement du flux menstruel et favorise l'apparition ou le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec la Sistomensine).
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures.

Flacon de 20 comprimés

— de 40 —

— de 100 —

Boîte de 4 ampoules

(Voir Sistomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

AGOREXINE

Gentiane, Condurango, Colombo, Simarouba, Camomille romaine, Badiane, muqueuse gastrique.

Toutes les Inappétences.

Posologie. — Flacon contenant 1 000 gouttes, 1/4 d'heure avant les deux principaux repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée :

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : A partir de 1 an : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'AGOREXINE

37, avenue de la République — PARIS (XI^e)

AGO SELS

Médication des Gastro-Hépatiques et Entéritiques.

Composition. — Chaque paquet rigoureusement dosé et soigneusement préparé contient :

Sulfate de Na.....	0,60
Phosphate de Na.....	0,40
Bicarbonate de Na	0,20

Posologie. — Un paquet le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède au bain-marie et un autre paquet le soir une heure avant dîner ou selon prescription.

Indications. — Syndromes gastro-hépatiques, Dyspepsies, Insuffisances hépatiques, Hépatisme et ses conséquences, Cholécystites, Entérite, Constipation, Intoxications intestinales, Anorexies digestives.

Présentation. — En boîte de 30 paquets : 10 francs. Aucune contre-indication.

Laboratoires FOSSET

MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

AGOZYMASE

Granulé de saveur aromatique.

Composition. — Sulfate de soude desséché, Sulfate de Magnésie desséché, Chlorure de magnésium, Peptone purifiée, Extrait de boldo.

Indications :

- 1° *Maladies des voies biliaires* : Congestion du foie, Cirrhose, Atonie et Stase vésiculaires, Cholécystite.
- 2° *Maladies gastro-intestinales* : Dyspepsie, Atonie gastrique, Flatulence, Constipation.
- 3° *Maladies cutanées* : Prurits généralisés et localisés. Urticaires, Eczémas, Prurigos, etc.
- 4° *Action dérivative intestinale* : Dans l'Hypertension artérielle, les Néphrites chroniques, les Migraines, les Céphalées.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé au réveil dans une infusion chaude ou dans eau de Vichy pendant 10 jours.

A renouveler après 5 jours de repos.

Prix : 15 francs.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue République — CHAMPIGNY (Seine

AIGUE D'OR

Analga du D^r Redier.

Composition :

Diméthyle amido-antipyrine.....	0,25	} pour un verre liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Héroïne.....	0,001	
Plantes sédatives	Q. S.	

Propriétés. — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

Indications. — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées*, *Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, *Gripes*.

Posologie. — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire, 1/2 heure après. *Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.*

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

Sans contre-indication.

Présentation. — Liqueur agréable.

Le flacon de 6 doses : 13 fr. 50.

Laboratoire de L'AIGUE D'OR

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord).

(Tél. : 5-45.)

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodo-gallate de bismuth spécialement porphyrisée).

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antiseptie de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Injection 25 francs.

Ovules : Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

Suppositoires : Prostatites. Hémorroïdes.

Prix : Ovules : 18 francs. — Supposit. : 15 francs.

Laboratoires PIALOUX

55, rue de Chabrol — PARIS (X^e). Tél. : Prov. 10-51.

ALBU-COLI

Granulé de saveur agréable.

Médicament spécifique des affections aiguës et chroniques des Voies Urinaires.

A base d'extrait de feuilles de Biguignan (*Psiloxylon Mauritianum* D. Th.)

Principales Indications. — Albuminuries, Colibacillose, Bactériuries, Lithiase rénale, Pyélo-Néphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Hypertrophie de la prostate, Manifestations de l'Arthritisme et de l'Artério-Sclérose. *Absence de toxicité* : Ne détermine ni congestion, ni inflammation ; tolérance absolue.

Posologie. — Deux cuillerées à café de Granulé Albu-Coli trois fois par jour en dilution dans un demi-verre d'eau (entre les repas).

Cette posologie peut être doublée selon avis du médecin (en particulier dans la Colibacillose).

L'Albu-Coli est en dépôt chez tous les Grossistes et en vente chez tous les Pharmaciens. Prix : 21 francs.

Laboratoires ALBU-COLI

84, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin : 58-67.)

E. LEMONNIER, pharmacien.

ALBURÉNOL

Composition. — A base de tannates additionnés d'extrait de kawa, de barbigflore, de maïs, de douce-amère et de saponaire.

Indications. — Albuminurie, œdèmes, néphrite aiguë, néphrite chronique, mal de Bright, cystite, calculs vésicaux, colibacillose, cellulite.

Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Liqueur agréable à absorber.

Le flacon de 250 gr. : 16 fr. 80

Posologie. — Une cuillère à soupe matin, midi et soir.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

ALCACYL WANDER

Composition. — Acétylsalicylate de chaux 0,5, alucol 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

Forme. — Comprimés.

Indications. — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciatiques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

P. BASTIEN, pharmacien
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

ALCALINOSE

Composition. — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs, Bicarbonate de sodium saturé.

Action. — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée de transit gastrique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées-mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.

Traitement pour 15 jours.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pyloréctomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses. Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : Poudre 8 fr. 50. Granulé 10 francs.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

ALCALISALYL

Association de salicylate et de bicarbonate de soude.

1° Granulé effervescent.

Composition. — Chaque mesure (5 gr.) dissoute représentante :

Salicylate de soude.....	1	gramme
Bicarbonate de soude	1	—
Sels alcalins (citrate).	1	—
Excipient.....Q. S. p.	5	grammes

2° Comprimés glutinisés.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Salicylate de soude.....	0 gr. 40
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 15

Avantages. — Antiacidosique grâce au bicarbonate et bien toléré par l'estomac.

Indications. — Toutes celles du salicylate de soude : Maladie de Bouillaud, Rhumatismes infectieux et chroniques, Affections hépato-biliaires, etc.

Mode d'emploi. — Une mesure dissoute dans un demi-verre d'eau sucrée de 3 à 10 fois et plus par jour. Ou de 5 à 20 comprimés par jour.

La boîte de granulé = 31 grammes de salicylate de soude : Prix : 20 francs.

L'étui de 80 comprimés : 32 grammes de salicylate : Prix : 18 francs.

AMPOULES pour Injection I. V.

Composition. — Solution contenant 1 gramme de salicylate de soude dans 10 cc. de sérum glucosé à 10 p. 100.

Avantages. — Avec cette solution, dont le pH constant est très voisin du pH sanguin, la sclérose de l'endovéine ne se produit pratiquement pas.

Indications. — Maladie de Bouillaud, Rhumatismes infectieux et chroniques, Encéphalites et séquelles, Chorée, Sclérose en plaques, etc.

La boîte de 3 ampoules de 10 cc.	10 francs.
— — — 6 ampoules de 10 cc.	17 fr. 50
— — — 3 ampoules de 20 cc.	13 francs.
— — — 6 ampoules de 20 cc.	22 fr. 50

Laboratoires GATEL-LÉGER

35 et 37, rue Joinville — LAVAL (Mayenne).

ALCAMFÉTOL

Composition :

Iodométhylate d'hexaméthylènetétramine (iode réel 45 %)	0 gr. 10
Camphosulfonate de sodium (camphre soluble)	0 gr. 20
Glyceryl Gaïacol	0 gr. 01
Eau bidistillée, q. s. pour	2 cc.

Avantages thérapeutiques. — 4 médications essentielles : de l'Iode, de l'Urotropine, du Camphre et du Gaïacol.

En une seule formule : *Solution aqueuse, stérilisée, à Ph constant.*

Indications. — Toutes infections chroniques ou aiguës (septicémies). Défaillance circulatoire. Troubles respiratoires. Maladies de la nutrition.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. 20 francs au public.

Posologie. — Injections hypodermiques ou intramusculaires indolores. La voie intraveineuse n'est indiquée que pour les cas urgents. Elle n'apparaît pas nécessaire pour les traitements courants.

Adultes : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Enfants : 1/2 à 1 ampoule de 2 cc. par jour.

L'Alcamfétol étant d'une innocuité absolue, ces doses peuvent être augmentées, dans les cas particulièrement graves, *mais sous la surveillance du médecin.*

Laboratoires DOR

DORANTOWICZ, Pharmacien

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

ALDINE

(Contre toutes algies.)

Calmant efficace de la douleur, effet immédiat.
Stimulant du système nerveux dans les états dépressifs.

Présentation. — Sous forme rationnelle d'un élixir agréable à prendre, sans pouvoir offensif sur l'estomac, l'ALDINE est une ingénieuse composition fondée sur les sédatifs les plus fidèlement victorieux de l'élément douleur associés à un stimulant général.

Indications. — Grippez, migraines, toutes névralgies, règles douloureuses, etc...

Posologie. — Médicament destiné aux adultes.
Une cuillerée à soupe pure ou dans un peu d'eau.
Par jour : de 2 à 4 cuillerées.

Prix : 10 fr. 50 le flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le numéro 339-6.

Laboratoires GAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 12-63.

ALEPSAL (Comprimés)

Calmant non déprimant.

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladone et caféine, l'ALEPSAL (0,10) supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence, ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

3 Dosages : 1^o Comprimés à 0 gr. 10 de Phényléthylmalonylurée.
2^o Comprimés à 0 gr. 05 de Phényléthylmalonylurée.
3^o Comprimés à 0 gr. 015 ou doses fractionnées.

Indications. — (Comp. à 0,10): Epilepsie, Insomnies rebelles. — (Petits dosages) : Etats anxieux, Troubles neuro-cardiaques, Angine de poitrine, Troubles nerveux chez les enfants, Coqueluche.

Posologie. — Epilepsie, Adultes : Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0,10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions et qu'en cas de diminution dans les doses, on devra procéder très lentement et par paliers successifs. Doses maxima des comprimés à 1 cgr. 1/2
Enfants : 1 an : 3 comp. par 24 h. ; — 5 à 6 ans : 7 comprimés ; — 10 ans 8 comp.

Bibliographie. — Communication à la Société Médico-Psychologique de Paris (1921), Thèse Dr Labarthe (1926). — Dr Rodiet, Médecin-chef des Asiles (Traitement de l'Epilepsie 1937). Professeur de Pathologie. G. Ferrua de Turin. Précis Clinique de l'Epilepsie (1931).

Prix : 8 et 9 francs.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché, à NEUILLY (SEINE).

ALEXIME

(Anolennement Alexine.)

Composition. — Formule et procédé du Laboratoire Joule, Acide phosphorique libre associé au phosphate de fer et de manganèse.

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, combat l'hypoacidité humorale, contribue à la reminéralisation.

Indications. — Anémie, asthénie, chlorose, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence, prébacillose, phosphaturie, pré tuberculose, déminéralisation, hypo-acidité, arthritisme, fatigues physiques ou nerveuses, rachitisme, etc.

Présentation. — Granulé rose de goût agréable.

Posologie. — Adultes et enfants de plus de 5 ans : 1 ou 2 cuillerées à café avant ou après les deux principaux repas dans un 1/2 verre d'eau sucrée ou non. *Enfants* de 2 à 5 ans : 1/2 cuillère à café à chaque repas.

Prix : le flacon, 14 francs.

Laboratoires de l'ALEXIME

Ch. PLAZENET, Pharmacien,

8, rue Riblette — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 36-36 et 36-37.)

ALGANE

Cytoplasma de *Laminaria Flexicaulis* déminéralisé par un procédé spécial qui respecte les principes de cette Algue. C'est l'origine de la partie active de l'huile de foie de morue.

Composition. — L'Algane agit :

- 1° Par son iode lié à la matière organique (2 mgr. par gr.).
- 2° Par ses traces catalytiques d'éléments minéraux (As. Mn, Mg, Fe, etc.).
- 3° Par ses graisses, ses protéines et hydrates de carbone qui en font un puissant suraliment.
- 4° Et surtout par sa haute teneur en vitamines naturelles A et D (sous forme d'algostérine, pigments carotinoïdes, fucoxanthiques et chlorophylliens).

Action. — Celle de l'huile de foie de morue, mais singulièrement exaltée et plus complète, en raison de sa plus grande richesse en vitamines A. Résultats plus constants, le produit étant soumis à un contrôle biologique.

Les deux plus remarquables actions de l'Algane consistent :

- 1° En une augmentation rapide de poids ;
- 2° En l'accroissement du pouvoir anti-infectieux de l'organisme.

Présentation

- 1° Cachets dosés à 1 gr. 25.
- 2° Granulés fondants renfermant 0 gr. 50 de poudre par cuillerée à café.

Posologie. — Chaque cachet correspond à 125 unités de vitamines D et 150 unités de vitamines A. Un cachet représente la quantité de vitamines D d'une cuillerée à soupe d'une bonne huile de foie de morue et la quantité de vitamines A de 3 cuillerées à soupe.

Adultes : 4 cachets par jour au minimum (2 au début de chaque repas).

Enfants : jusqu'à 15 ans, 1 à 2 cachets par jour ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés. Ces doses peuvent être augmentées sans inconvénient.

Administration du granulé. — Le granulé peut être absorbé directement comme une friandise : on le croque, puis on l'avale en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque. On peut également le dissoudre au préalable dans une petite quantité d'eau ou de lait.

Nota. — L'Algane en granulé possède un goût difficilement perceptible. Chez les sujets constipés, le mucilage contenu dans le produit provoque un effet laxatif qui ne peut être que bienfaisant.

Prix de la boîte (cachets ou granulés) : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 994/1 et 2.

Durée moyenne de la boîte : 10 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Péreire 14-08.)

ALGIPAN MIDY

Boîte de 6 ampoules pour injections intradermiques.

Composition :

Bichlorhydrate d'Histamine..... 0 gr. 000125

Monochlorhydrate d'Histidine 0 gr. 040

Pour une ampoule de 1 cc. en équilibre ionique stabilisé.

ASSOCIATION ANTIALGIQUE RÉVULSIVE NEUROTROPE

Dose et mode d'emploi. — Infiltration intradermique dans la zone de projection cutanée de la douleur, une séance tous les jours ou tous les 2 jours.

Indications. — Névralgies, Myalgies, Arthralgies, Algies viscérales, Douleurs de l'angine de poitrine, Crises solaires, Coliques hépatiques, Coliques néphrétiques, Douleurs d'origine ulcéreuse, Spasmes douloureux des artérites, Maladie de Raynaud, Etats anaphylactiques (asthme, urticaire, rhume des foins).

Chaque boîte contient une aiguille spéciale pour injection intradermique.

Prix : 24 francs.

Durée du traitement : 8 à 15 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

ALGOCRATINE

(Phénylamidoxanthine.)

Présentation. — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation plus rapide que la forme Comprimés).

Suppositoires : même dosage que les cachets.

Produit de prescription médicale.

Ne renferme aucun hypnotique.

Indications thérapeutiques. — Migraines, névralgies sciatiques, grippe, algies cancéreuses. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *régles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Élimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un second une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Suppositoires : Même posologie que les cachets.

Prix : Le tube : 7 fr. ; la boîte de 25 cachets : 18 fr. ; suppositoires : 12 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III —
PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 17-46.)

ALGONAL

Traitement des affections rhumatismales,
Arthrite, Goutte, Poly-arthrite.

En capsules kératinisées à base de iodure de lithium, Essence de Salicylate de Méthyle pur et désodorisé, Colchicine et Urotropine.

Mode d'emploi :

3 capsules le matin avant le petit déjeuner et 2 le soir avant le dîner.

Prix : 18 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dans l'essence de Gaulthéria pure associée à : iodure de lithium et formine.

Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

Posologie :

Trois capsules le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy), ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

Prix : 20 francs.

Compléter le traitement avec le *Baume Algopha*.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

ALIBOURINE B. E. A.

Formes :

1° Pommade en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hammélis et de Millepertuis, Lano-vaseline.

Indications :

Eczémas suintants, Impétigo, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Erysipèle, Brûlures, Engelures.

2° Solution concentrée : Flacon de 60 cc.

Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne, diluée dans un litre d'eau, une solution se rapprochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chimiquement pure. Ces deux préparations n'irritent jamais.

Prix : 7 francs.

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe. — Belfort.

ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Médication calcico-magnésienne, dont la présentation agréable, en bouillies ou entremets, en facilite l'administration aux sujets affaiblis et atteints d'inappétence.

Composition :

Carbonate de chaux .	0,30	Lactose	2,50
Phosphate de chaux .	0,20	Caséine purifiée ...	0,50
Glycéroph. de chaux.	0,05	Arrow-Root	4 gr.
Magnésie	0,05	Sucre	12 gr.
Eléments céréalo-lé-		Cacao vanillé	8,50
gumineux	5 gr.		

Pour 2 mesures.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule. Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Prix : 15 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX°).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

ALISAL

Comprimés gynécologiques.†

Formule. — Sulfate de cuivre, sulfate de zinc, alun de potasse, acide picrique, camphre, naphtolate de soude, trioxy-méthylène, *sulfate neutre d'oxyquinoléine*.

Prix : 18 francs.
403-42

ALISAL

Pommade

Traitement des dermatoses.

Formule. — Résorcine, Borate de soude, Acide salicylique, Eau d'Alibour, Extrait de Saturne, Huile de bouleau.

Indications. — Eczémas, Herpès génital, Impétigo, Brûlures, etc...

Prix : 12 francs.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 403-41.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI°).
(Tél. : Diderot 04-71).

ALLERGANTYL MILUC

Modificateur du terrain humoral

SOLUTION INTERNE. — Rate. Bardane.

Indications thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre normal du système endocrino-sympathique : Furunculose, Eczémas (adultes et nourrissons), Allergies cutanées, etc.

Furunculose. — *Fortes doses indispensables* : 3 cuillerées à soupe par jour et plus, suivant les cas.

Dermatoses. — *Doses faibles, mais prolongées*. 2 cuillerées à dessert par jour (20 jours par mois).

Demi-dose pour enfants.

2 demi-cuillerées à café pour nourrissons de 4 mois.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 18 francs.

POMMADE. — Noyer, Saponaire.

Traitement externe synergique à utiliser quelques jours après le début de la cure interne et tout en continuant l'ALLERGANTYL solution.

Prix : 9 francs.

Laboratoires MILUC, L. Ragoucy, Pharmacien

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI°).

Tél. : Odéon 02-53.)

ALLIOCARDIA

Régulateur de la Tension artérielle. Antiseptique pulmonaire de choix.

CŒUR

FOIE

POUMONS

REINS

Médicament cardiotonique non toxique.

Composition. — Synergie médicamenteuse à 5 éléments constitutifs : Allium sat, Cratægus, Camphora, Eucalyptol, Spartéine.

Le tout en pilules glutinisées, s'absorbant seulement en milieu intestinal et sans action malodorante sur l'haleine.

Indications. — Tous états pathologiques associant cœur et poulmon.

Hypertension solitaire ou associée avec syndrome aortique. Sclérose rénale. Gangrène pulmonaire. Bronchites fétides. Absès du poulmon. Coqueluche. Asthme. Catarrhe. Emphysème. Dyspnées asthmatiformes. Adjuvant dans les tuberculoses pulmonaires à forme conjective et avec expectoration.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, prises par 3 ou 4, à n'importe quel moment avant les repas.

Enfants : au-dessus de 5 ans, demi-dose.

Prix : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

ALLIOSOTE

Composition. — Allium, Créosote de Hêtre, Essence de Melaleuca : Antiseptiques et modificateurs des sécrétions bronchiques.

Drosera : Antispasmodique.

Emulsion d'Huile foie de morue.

Indications. — Bronchites, Gripes, Suppurations Pleuro-Pulmonaires, Congestion.

Présentation. — Emulsion huileuse (10 doses de 15 cc.).

Posologie. — Voie rectale avec sonde caoutchouc. Une dose dans un verre à Bordeaux de lait tiède, le soir au coucher. A conserver toute la nuit.

Prix : 20 francs.

D'HELIOT

DINARD (Ille-et-Vilaine).

ALLISATINE

Composition. — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, *inodores*, insipides.

Propriétés. — Stimulant des fonctions gastriques, puissant antidiarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour, à la fin des repas.

Prix

du flacon de 30 dragées : 12 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

ALLIUM COIRRE

(Marque Stasima)

Composition. — Préparation stabilisée, contenant tous les principes de l'ail cru.

Deux formes : Alcoolature et Pilules (une pilule correspond à environ X gouttes d'alcoolature).

Action. — Au point de vue *circulatoire* :

Abaisse la tension artérielle en augmentant l'indice oscillométrique ; l'allium est de plus cardiotonique (XXX gouttes en 2 fois).

Dans l'*Hypertension* : 2 jours de traitements, 2 jours de repos et ainsi de suite pendant 15 jours.

Au point de vue *antiseptique* :

Antiseptique pulmonaire (alcoolature), 50 gouttes P. J. en 2 fois. Antiseptique intestinal (pilules), 4 à 8 pilules P. J. en 2 fois.

Au point de vue *général* :

Reconstituant général et antiscléreux, 4 à 8 P. J. en 2 fois.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard Montparnasse — PARIS.

(Tél. : Ségur 02-79.)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

Constitution. — (Chlorhydrate de paramino-benzoyl-diéthyl-amino-éthanol).

Les solutions allocaine-adréraline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacts les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale, fonctions intellectuelles).

Indications. — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaine Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi, aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc. : 10 francs.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc. : 17 francs.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc. : 12 francs.

Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc. : P. P. M.

Solution C, à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc. : 19 francs.

Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc. : 16 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon. — LYON.

ALLOCHRYSINE LUMIÈRE

**L'or en combinaison sulfo-organique
par la voie intramusculaire.**

Adoptée par l'Assistance publique, inscrite au tarif
de l'A. G.

L'Allochrysine Lumière (thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium) est un composé dans lequel le métal est lié directement au soufre et dont la deuxième valence est occupée par un radical organique.

30 p. 100 d'or métallique.

Cette préparation (solution aqueuse), injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement. Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie.

Pas de contre-indications formelles ; cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales, les lésions intestinales. Dans les cas très rares de troubles anaphylactoïdes, la substitution au solvant spécial d'une ampoule d'**Emgé Lumière** en évite le retour.

Indications :

Tuberculose (pulmonaire et externe), **Rhumatisme** chronique infectieux, Syndromes infectieux divers.

Formuler :

Une boîte d'**Allochrysine Lumière**, contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution :

Une ampoule de 2 cc. d'**Allochrysine Lumière**,
Une ampoule de 8 cc. de sérum artificiel.

Il existe trois dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.
Bien spécifier le dosage désiré.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Débuter, pour tâter la susceptibilité du malade, par une ampoule de 0 gr. 05 ; continuer par injections de 0 gr. 10, puis 0 gr. 20. Une à deux injections par semaine jusqu'à dose totale, moyenne de 3 à 5 grammes.

Rhumatisme. — Débuter, pour tâter la susceptibilité, par 0 gr. 05, une injection tous les cinq jours ; continuer par une injection tous les 5 jours à 0 gr. 10, jusqu'à imprégnation moyenne de 3 gr. Employer, dans quelques cas, la dose de 0 gr. 20, à raison de une par semaine.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLONAL « ROCHE »

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine ; il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique ($C^{10}H^{14}O^3Az^2$).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil ; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie ; agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées ; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté ; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal ; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0 gr. 16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane, $\frac{1}{2}$ h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-5.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ALLOPHA-QUINA

Le cachet analgésique rationnel.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle	10 cgr.
Diméthylaminoantipyrine	30 —
Poudre de quinquina	10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois, sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

Toutes les algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

Fièvre-Grippe.

3 cachets à répartir dans les 24 heures.

Boîte de 12 cachets : Prix : 10 francs.

Boîte de 6 cachets : Prix : 5 fr. 50.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-36.)

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

Aloïne Houdé

Glucoside cristallisé de l'aloès des Barbades.

Indications :

Dyspepsies atoniques ou hypotoniques.

Constipation droite ou gauche.

Syndrome entéro-hépatique, *leiassthénie*.

Doses et mode d'emploi :

Comme stomachique :

1 granule par jour.

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir au repas.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.

Pâte poreuse, stable, non grasse.

Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras ou de vaseline souvent mal tolérés.

Ne tache pas le linge.

S'enlève facilement.

Répond à une classique formule de l'Hôpital Saint-Louis.

Indications. — Érythèmes fessiers des nourrissons, érythèmes intertrigo, rougeurs. Eczémas aigus et subaigus, eczémas suintants, coups de soleil, engelures, prévention des escarres, eczématisation des plaies, prurit, etc. Dermites irritables, dermites artificielles, eczémas des blanchisseuses et des laveuses, etc.

Mode d'emploi. — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Il existe également une poudre d'*Aloplastine*.

ALOPLASTINE ICHTHYOLÉE

Pâte à l'eau renfermant 5 p. 100 d'Ichthyol.

Présente les avantages de l'*Aloplastine* simple (absence de vaseline et de corps gras, pâte poreuse, facile à enlever), à laquelle s'ajoute l'action réductrice et kératoplastique de l'Ichthyol.

Indications. — Toutes celles de l'Ichthyol : acné, eczéma, séborrhée, furonculose, eczématides, parakératose, ulcère variqueux, lupus érythémateux, prurit, prurigo, psoriasis enflammé, etc.

Mode d'emploi. — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Laboratoires Biologiques de l'ILE-DE-FRANCE

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e)

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension, interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Prix de vente : 12 francs la boîte.

Laboratoire GOUZÈNE

139, rue de Paris — PANTIN (Seine).

(Tél. : Botzaris 00-97.)

ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Prix : 9 francs.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal simple-belladonné.)

Réducteur d'HCl.

Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale : l'Alucol, corps chimiquement défini, obtenu par procédé spécial, fixe HCl sans neutraliser ; il l'adsorbe et favorise :

- 1° La protection de la muqueuse stomacale par formation d'un mucilage colloïdal isolant en présence d'un excès de suc gastrique.
- 2° La fixation et l'entraînement par le mucilage ainsi formé des éléments fermentescibles et des entéro-toxines.

Formes. — Paquets, poudre, comprimés, granulés, cachets belladonnés. Paquets dosés à 3 gr. pour pansements gastriques et traitement des états aigus. Comprimés de 0^{gr},50. Cachets belladonnés (0^{gr},50 Alucol et teinture de Belladone V gouttes).

Doses. — Alucol simple : 2 à 6 gr. par jour une heure avant ou deux heures après les repas et davantage sur avis du médecin.

Alucol belladonné : 1 à 2 cachets à distance des repas, en cas de crises aiguës avec spasmes.

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY (Seine). — Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.

ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine à l'état gélatineux.

Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons.

Posologie :

Adultes : 2 à 10 comprimés ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Prix de vente :

Comprimés..... 4 fr. 50

Granulés..... 12 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ALZINE

Composition. — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

Forme. — Pilules enrobées au gluten F1-de 40.

Indications. — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

Doses. — Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour. Après la crise : 2 à 3 pilules par jour.

Dose préventive. — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Flacon : 40 pilules. — Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.
(Tél. : Parmentier 31-29.)

AMBOCURINE

Granulé.

Composition :

Carbonate de Bismuth.....	10 gr.
Bromure de potassium	7 gr.
Carbonate de chaux.....	13 gr.
Magnésie lourde	5 gr.
Extrait de Belladone	0,06
Extrait de Fèves de Calabar.....	0,04
Sucre granulé gr. pr	100 gr.

Propriétés. — *Toutes gastralgies sans exception, qu'elles soient conditionnées par une vago ou une sympathicotomie.*

Doses :

Enfants au-dessus de 15 ans : 1 cuillerée à café midi et soir dans un peu d'eau avant de manger.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II°).
(Tél. : Louvre 53-16).

AMIBIASINE

Extrait de *Garcinia* composé.

Fournisseur des Ministères des Colonies et de la Guerre.
Non toxique. Sans contre-indication.

Présentation :

Liquide. — Solution brune stabilisée, de saveur amère, en flacon de 60 cc. (12 cuillerées à café titrées à 0 gr. 10 de principe actif par cuillerée).

Comprimés. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 05 de principe actif, en étui de 2 tubes : 40 comprimés

Suppositoires. (Voir à *Suppositoire Amibiasine*.)

Propriétés. — Désinfectant et antiparasitaire puissant, antidiarrhéique énergique sans action constipante, calmant des douleurs abdominales et du ténesme sans opiacés. Cicatrise la muqueuse intestinale et rétablit l'intégrité fonctionnelle du foie.

Indications. — Toutes parasitoses intestinales : Amibe, *Lamblia*, *Trichomonas*, *Schistosomum* *Mansoni*, *Ankylostomes*, Dysenteries et diarrhées de toutes natures et origines, aiguës et chroniques. Diarrhée symptomatique des tuberculeux, des appendicites chroniques, des typhoïdes, Hémorragies intestinales, *Melæna*, Entérites chroniques, muco-membraneuses, entérocolites, Fermentations intestinales, fétidité des selles, Colibacillose, eczéma.

Diarrhées infantiles (Voir *BIOENTÉRIASE*).

Posologie. — En faisant prendre l'AMIBIASINE dans de l'eau sucrée ou, mieux, du café noir sucré, on lui enlève toute amertume. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans être croqués.

Formes aiguës : 6 à 9 cuillerées à café ou 8 à 12 comprimés par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillerées à café ou 4 à 8 comprimés par jour.

Administrer le médicament à ces doses et dès amendement des symptômes ramener les doses à 3 cuillerées à café ou 4 comprimés par jour, pendant une huitaine de jours.

Cure d'entretien : 2 cuillerées ou 4 comprimés par jour, 10 jours par mois pendant 1 à 3 mois.

Régime habituel des entéritiques en notant de s'abstenir du lait, des œufs, du bouillon de légumes. Boisson : thé léger, eau sucrée ou eau rouge.

Diarrhée infantile. — Formuler AMIBIASINE BB : 1 à 3 cuillerées à café par jour jusqu'à disparition de la diarrhée.

Prix du flacon :

Solution : 16 francs. — Comprimés : 12 francs.

Laboratoire de l'AMIBIASINE
69, rue de Wattignies — PARIS.

AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfractions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à 3 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre : 14 francs.

(Boîte aluminium).

La boîte, Comprimés, Cachets : 18 francs.

Le flacon de Dragées : 17 francs

Le tube de Comprimés : 9 francs

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

AMIFLORINE

Gouttes.

Présentation. — En flacon-compte-gouttes.

Principes actifs. — Extrait de marrons d'Inde, d'Hamamélis virginica, de Gui, de Viburnum, d'Hydrastis canadensis.

Indications. — Troubles de la circulation, maladies des vaisseaux, varices, phlébites, accidents de retour d'âge.

Mode d'emploi. — XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, 3 fois par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AMINOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldibutyl-aminopropanol, adrénaline, essence de niaouli, camphre, baume du Pérou, borate de soude, vaseline, huile de vaseline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, vaso-constrictive et décongestive.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires supérieures : Coryza, Sinusite, Laryngite, Pharyngite, Rhino-pharyngite, et toutes infections et inflammations du carrefour rhino-pharyngien.

Présentation et prix. — Un tube : 13 francs.

Deux dosages : *Adultes* et *Enfants*.

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes et enfants* : matin, midi et soir, placer gros comme un pois d'AMINOLÉINE à l'entrée de l'orifice narinaire et aspirer fortement en obturant l'autre narine. Pratiquer la même opération sur l'autre côté.

**Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

AMINOPHYLLINE CARÉNA

(Théophylline-éthylène-diamine synthétique française).

Le plus puissant dilateur des artères coronaires.
Augmente de 80 p. 100 le débit coronarien.

Démonstration expérimentale. — La ligature d'une artère coronaire chez le chien provoque, sur l'électrocardiogramme, l'onde en dôme caractéristique de l'obstruction coronarienne. La théophylline éthylène-diamine amène le retour du tracé à la normale.
Communication Société française de cardiologie, 23 mai 1937.)

Indications cliniques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).
Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).
Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stockes).

Présentations :

Caréna comprimés	dosés à 0 gr. 10.	} Voir CARÉNA.
gouttes	— 0 gr. 01.	
suppositoires	— 0 gr. 40.	
ampoules intramusculaires	(2 cc. = 0 gr. 50).	} Voir Caréna injectable.
ampoules intraveineuses	(10 cc. = 0 gr. 25).	

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

AMIPHÉDRINE

Composition. — Chlorhydrate d'éphédrine naturelle, Véronal, Dionine, Sulfogaiacolate de potasse, Asprine, Kola pulvérisée.

Action. — Antidyspnéique, analgésique et hypnotique léger, non toxique, antispasmodique, décongestionnant bronchique, tonicardiaque et diurétique.

Indications. — Etat grippal, céphalées et courbatures, Rhinites, Prévention des sinusites, Rhume des foins, Rhinite spasmodique, Asthme essentiel, Asthme cardiaque, Bronchites, Emphysème, Oppression.

Posologie. — *Dans le traitement d'attaque :* 3 cachets d'Amiphédrine par jour, avant les repas.

Dans la période d'état : 1 cachet d'Amiphédrine matin et soir.

Présentation. — Boîte de 8 cachets : Prix 8 francs.

Laboratoire de l'AMIPHÉDRINE

Lucien HUGON, docteur en pharmacie

6, place Jean-Jaurès — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 18-85.)

AMIPHÈNE CARRON

Le plus puissant antiseptique intestinal.

Antidiarrhélique iodé.

Présenté en cachets de 25 cgr. de : Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse $C_6H_4O_5SKI + 3aq$.
Création du Laboratoire Carron, l'*Amiphène* contient 31 p. 100 de son poids en iode dissimulé et possède les qualités suivantes :

- 1° *Ne fatigue pas l'estomac*, parce que inattaquable par le suc gastrique.
- 2° *Toxicité nulle. Pas d'iodisme*. Chez l'animal, le chat supporte par kilo et sans aucun trouble *per os* 5 gr. d'Amiphène ; en injection sous-cutanée : 2 gr. 50. Tolérance absolue chez l'homme avec de hautes doses et un traitement prolongé (observations multiples).
- 3° *Antisepsie intestinale parfaite*. Combat les fermentations et les putréfactions intestinales (nombreuses analyses coprologiques).
- 4° *Rapidité de l'action curative*. Remarquable.

Indications. — Toutes les diarrhées quelle qu'en soit l'étiologie, aiguës ou chroniques, Diarrhées banales, Fermentations ou putréfactions intestinales, Entérocrites muco-membraneuses, Diarrhées tuberculeuses, Diarrhées colibacillaires, Diarrhées des pays chauds, suites de Dysenterie.

Mode d'emploi et posologie. — 2 à 8 cachets par jour à prendre au début de chaque repas.

Alcaliniser l'intestin dans le cas d'acidité pathologique.

Boîte de 12 cachets : 20 francs.

(C. R. Académie de médecine, 19 novembre 1929 ;
Société de gastro-entérologie, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, décembre 1929 ;
Société de pathologie exotique, janvier 1931.)
Échantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

AMPHOMUTH

Bismuth métallique colloïdal en extrême dispersion huileuse amicroscopique.

Ampoules de 2 cc., dosées à 0 gr. 040 de bismuth métal par cent. cube. Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien.

Ses avantages sont : assimilation facile, toxicité faible, absence de douleur, grande activité.

Posologie et mode d'emploi. — L'AMPHOMUTH est habituellement administré par séries de 12 injections musculaires fessières de 2 cc., deux fois par semaine, avec un repos de trois semaines avant la série suivante. Mais le médecin est seul juge des doses, de la durée de traitement et de l'intervalle à laisser entre chaque série.

Adultes : environ 2 centimètres cubes d'AMPHOMUTH.

Enfants : jusqu'à 3 mois : 1/10 à 2/10 de centimètre cube.

De 3 mois à 1 an : 2/10 à 4/10 de centimètre cube.

De 1 an à 8 ans : 4/10 de centimètre cube à 1 centimètre cube.

De 8 ans à 16 ans : 1 centimètre cube à 2 centimètres cubes.

La boîte de 12 ampoules injectables de 2 cc. : 24 francs.

Laboratoires RONCHÈSE DE THÉRAPEUTIQUE

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris, 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34

AMPHOPROPHYL T. A. B. RONCHÈSE

à ingérer.

Vaccin antitypho-paratyphique *Préventif*.

Composition. — Suspension de corps microbiens de bacilles typhiques et paratyphiques A. et B. avec addition des lysats correspondants.

Indications. — *L'Amphoprophyl T. A. B.* à ingérer est un agent *préventif* des affections à bacilles d'Eberth et à bacilles paratyphiques A. ou B.

Posologie. — *Adultes et adolescents :* Pendant 6 jours consécutifs, avaler le matin à jeun (au moins une heure avant le petit déjeuner) une pilule de bile et, un quart d'heure après, absorber le contenu d'une ampoule de vaccin dilué dans un peu d'eau.

Enfants : demi-dose.

Innocuité absolue ; Aucune réaction ; Peut-être appliqué à tous les âges.

Cette vaccination doit être renouvelée chaque année.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile : 20 francs.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS

A. D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

AMPHO-QUINTIVACCIN

Ampho-vaccin à ingérer pour le traitement de la coqueluche et de ses complications.

Composition. — Bacilles de Bordet et Gengou, pneumocoques, pneumobacilles, streptocoques, staphylocoques, entérocoques, micrococcus catarrhalis, coccobacilles de Pfeiffer, B. pyocyaniques.

Indications. — L'Ampho-Quintivaccin est un agent de grande efficacité dans le traitement de la coqueluche et de ses complications. Par suite de sa composition bactérienne étendue, il prévient les complications de cette maladie.

Posologie. — Pour les nourrissons : 1 ampoule par jour en deux fois.

Pour les enfants : 1 ampoule le matin, une le soir.

Pour les adultes : 3 ampoules par jour.

L'administration du vaccin doit avoir lieu loin des repas, de préférence après une quinte. Innocuité absolue — aucune réaction — aucune contre-indication.

En boîtes de 10 ampoules de 2 cc..... 25 fr.

En coffrets de 24 ampoules de 2 cc. 50 fr.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS
A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e).

Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOSTABYL

du docteur MOITY

Médication stabilisatrice et équilibrante des dystonies vago-sympathiques et méta-sympathiques.

Tonicardiaque, Sédatif, Régulateur des systèmes neuro-végétatifs et autonomes périphériques

Formules. — Ess. marjolaine, 0,066. — Ext. de ballote, 0,01. — Ext. anémone, 0,01. — Ext. passiflore, 0,02. — Ext. crætgus, 0,04. — Ext. de boldo, 0,01. — Ext. valériane, 0,05. — Peptones polyvalentes, 0,03. — Ext. de jusquiame, 0,01. — Phényl-éthyl-urimido-propane-diméthyl-aminophényl-diméthyl-pyrazolone, 0,05

Par comprimés

Doses. — 3 à 6 comprimés par jour par prises séparées.

Diffusion. — Strictement médicale.

1° **Troubles cardiaques** : tachycardie, palpitations, éréthisme, angine de poitrine, spasmes vasculaires, hypertension artérielle.

2° **Troubles digestifs** d'origine nerveuse : dyspepsies nerveuses, spasmes digestifs.

3° **Troubles respiratoires** : asthme, dyspnée, coryza spasmodique,

4° **Troubles nerveux** : nervosisme ; états anxieux, névralgies, migraines, insomnies, psychasthénie, émotivité, surmenage nerveux, mal de mer.

5° **Troubles endocriniens** : hyperthyroïdie, Basedow, dysménorrhée, règles douloureuses, ménopause, tétanie.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Prix : 40 comprimés, 16 fr. 50.

Laboratoire J.-O. MOITY
Ex-interne des hôpitaux de Paris
Docteur en médecine, Docteur en Pharmacie
199, boulevard Bineau. — NEUILLY-PARIS

AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-Vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedländer*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

Indications. — Véritable gargarisme sec aux antiviruses. Immunisant et curatif. — *Traitement des angines, irritations de la gorge*, toutes les infections buccales : *gingivo-stomatites*, *pyorrhée alvéolaire*, *accidents de dents de sagesse*, etc... — Leur rôle *prophylactique* en période de grippe est des plus importants.

Doses. Mode d'emploi. — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

Le flacon de 70 comprimés : 14 francs.

Laboratoires des Ampho-Vaccins

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOTONYL « LERSAM »

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonyl-urée (<i>gardénal</i>)...	0,02
Extrait de belladone	0,002
Para-acetphénétidine (<i>phénacétine</i>)	0,10
Extrait fluide d'aubépine	0,05
pour un comprimé.	

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Analgésique. Sédatif général. S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques. Spasmes douloureux, Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix : Le tube de 40 comprimés : 17 fr. 50. (Admis aux A. S.).

Échantillons, littérature :

Laboratoires LERSAM

André INGÉ, pharmacien.

92, boulevard Murat — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-35.)

AMPHO-VACCINS RONCHÈSE

Lysat bactérien ou filtrat de cultures et bactéries entières.

Vaccins à ingérer : Amphoprophyl T. A. B. (préventif) ; Ampho-Quintivaccin (contre la coqueluche), anti-infectieux, antistaphylococcique, antityphoïdique T. A. B. (curatif), intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins injectables : anti-infectieux, antistaphylococcique, intestinal, pulmonaire, urinaire.

Vaccins Pansements : antipyogène, rhino-pharyngien, Rhino-Amphogel (gelée à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien).

Pyo-Amphogel (gelée à base d'ampho-vaccin antipyogène).

Ampho-tablettes comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Voir : Amphoprophyl — Ampho-Quintivaccin — Ampho-tablettes — Pyo-Amphogel — Rhino-Amphogel — Vaccins Ronchèse.

Laboratoires des Ampho-Vaccins
A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie.

21, boulevard de Riquier — NICE.
Dépôt à Paris, 62, rue Charlot (III^e).
Tél. : Turb. 72-34.

AMPOULES ANTI-H

(H = symbole de l'acidité).

Médication stomacale.

Présentation. — 14 ampoules buvables.

Indications. — Traitement héroïque et d'une innocuité absolue des gastralgies, dyspepsies, hyperchlorhydrie, hypermotricité et spasme du pylore, ulcères.

Composition. — Suspension colloïdale de silicate d'alumine et de sodium.

Mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau après les 2 repas, ou au moment des douleurs.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires REYGAGNE
160, avenue d'Italie — PARIS.
(Tél. : Gobelins 90-00.)

AMPOULES BOISSY

pour inhalations.

AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-1

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

AMPOULES BOISSY D'IODURE D'ÉTHYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 160-4

Indications. — *Asthme, Emphyseme, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main. Durée d'utilisation : suivant fréquence des crises.

Prix : 15 francs la boîte de 12 ampoules.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV°).
(Tél. : Gobelins 06-89.)

AMPOULES DE PANTOPON

« ROCHE »

(Opium total injectable.)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. *Enfants* : 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON « ROCHE » représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon « Roche »,
= 0,50 ctg. de teinture d'opium.
= 0,025 mgr. d'extract d'opium.
= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 ampoules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 504-22.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

AMPOULES DE SPASMALGINE « ROCHE »

(Antispasmodique vrai.)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Pantopon « Roche ».

Deux centigrammes Papavérine « Roche ».

Un milligramme Atrinal « Roche ».

(Voir page spéciale Spasmalgine « Roche ».)

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voies hypodermique et intramusculaire).

(Boîte de 6).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-37.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°). (Tél. : Archives 91-10).

AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous-cutanée, en association avec divers rectorporants et toninervins.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante dans toutes les ampoules de la boîte : 1, 2, 3, ou 4 mgr. par ampoule, selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4 mgr., suivant la demande.

II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill. Le type en est la formule suivante :

Série A : { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc.
Sulfate de strychnine.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°). — (Tél. : Turbigo 63-40.)

AMPOULES OPHIDIOS

Composition. — Neurotoxine de venin de cobra.

Indications. — Douleurs et algies rebelles, en particulier algies cancéreuses, algies tabétiques, névralgies du trijumeau, ischialgies, radiculites, polynévrites, myalgies, zona, sciatique, rhumatisme chronique.

Présentation et prix :

1° Ampoules de concentration A : chaque ampoule contient 1 cc. de solution faible dont 1 cc. correspond à 10 unités souris.

30 francs les 3 ampoules.

2° Ampoules de concentration B : chaque ampoule contient 1 cc. de solution moyenne dont 1 cc. correspond à 25 unités souris.

30 francs les 3 ampoules.

3° Ampoules de concentration C : chaque ampoule contient 1 cc. 1/2 de solution forte dont 1 cc. correspond à 30 unités souris.

30 francs les 3 ampoules.

Augmenter progressivement les doses par 1/2 cc.

Posologie { Ampoules A : une injection tous les 2 ou 3 jours.
Ampoules B : une injection tous les 4 ou 5 jours,
Ampoules C : une injection tous les 7 ou 8 jours.

Injectons hypodermiques.

Remarque. — Ne pas utiliser la teinture d'iode pour désinfecter la peau.

Contre-indications. — Grosses lésions hépato-rénales, traitement iodé, traitement radiothérapique.

Laboratoires OPHIDIOS

67, rue de Grenelle, PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 72-70.)

AMPOULES REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicyllique injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu. Toutes les algies rhumatismales. Sciatique. Lumbago.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées ou intramusculaires *loco dolenti*. Le Reipar porte l'acide salicyllique là même où il doit agir.

Pour la voie intraveineuse : Intra-Reipar (*Voir ce mot*).

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 18 francs.

Prix spéciaux pour pharmaciens, cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques.

Échantillons et littérature sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER
RETHEL (Ardennes).

AMYBDINE

Composition. — A base d'Acide-7-Iodo-8-Oxyquinoléine - 5, Sulfonique solubilisé par addition d'une proportion titrée de bicarbonate de sodium ; ainsi solubilisé, cet acide contient 27 p. 100 d'iode environ.

Indications. — Traitement spécifique des dysenteries amibiennes et bacillaires.

Traitement de certaines maladies infectieuses des voies urinaires et biliaires.

Forme :

1° Pilules dosées à 0 gr. 25 (bicarbonate de soude compris).

2° Poudre solubilisée.

En flacons de : 10 gr., 25 gr., 50 gr.

Laboratoire de l'AMYBDINE

E. RUEYRES, pharmacien

44, avenue Pasteur — COURBEVOIE-
PARIS — Tél. : Défense 02-02.

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance des Céréales germées.

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indications thérapeutiques. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Prix : le flacon sirop 17 fr. 50 ;

La boîte de comprimés : 13 fr. 75.

Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER

10, rue Clapeyron — PARIS.

(Tél. : Europe 58-97.). — C. 150.854.

ANACLASINE INFANTILE

États digestifs et cutanés. — Anaphylaxie.

Composition — Hyposulfite de soude et de magnésium associés à des polypeptides spécifiques.

Indications :

Troubles digestifs : Etat saburral, inappétence, nausées, déficience hépatique, intoxication alimentaire, troubles de l'assimilation.

Dermatoses : Urticaire, eczéma, prurit, œdème de Quincke, éruptions.

Phénomènes neuro-endocriniens et diathésiques : Migraines, Insomnies, Vaso-dilatation et Vaso-constriction périphériques, Accidents sériques.

Posologie :

Granulé : Jusqu'à 3 ans : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Au delà de 3 ans : 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, de lait ou à croquer.

Laboratoires A. RANSON

Docteur en pharmacie

96, rue Orfila — PARIS (XX^e Arrondissement).
(Tél. : Ménilmontant 62-81, 62-82).

ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Cytophylaxie.

L'Anaclasine Ranson (ἀνά — contre, κλασις — choc) est une préparation anti-anaphylactique polyvalente et cytophylactique.

Forme. — Comprimés et Granulé.

Action. — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépato-biliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension.

Composition. — L'Anaclasine comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés halogénés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et, d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques (20 peptones différentes).

Indications. — Anaphylaxie alimentaire, états, hépatiques, intolérance digestive, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foins, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes.

Doses journalières. — *Adultes* : 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants : au-dessus de 10 ans : de 1 à 3 comprimés par jour, ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Anaclasine infantile (Voir ci-contre la notice).

Durée du traitement : minimum 15 jours.

Prix : Granulé : 18 francs. — Comprimés : 16 francs.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Mémilmontant 62-81 et 62-82.)

ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A. solution, B. cachets.

A. Solution.

Une cuillerée à soupe contient :

Pyramidon.....	0 gr. 30
Antipyrine	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine	0 gr. 10
Caféine	0 gr. 05

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café pleine d'eau chaude et très sucrée. Il est important de sucrer largement.

Prix : 14 fr. 50.

B. Cachets.

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon.
Indications. — Migraines, Névralgies, Sciatique, Paludisme.

Prix : 11 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

ANALGÉSOL

Présentation. — Pommade pour l'usage *externe*.

Composition. — Menthol, *Salicylate de Galacol*, Excipient.

Indications. — *Curatif* : Névralgies intercostales, Névralgies faciales, Névrites, Rhumatismes, Sciatiques.

Préventif : Angine, Otite, Oreillons.

Posologie. — *Névralgies intercostales* : 3 applications à 1/2 heure d'intervalle, en onction locale, continuer 3 applications par jour pendant 4 à 5 jours.

Névralgies : Faciales dentaires, etc... 2 à 3 applications à 1/4 d'heure d'intervalle.

Névrites, Rhumatisme, Sciatique, Lumbago, 3 applications par jour pendant 5 à 6 jours.

Préventif : une application matin et soir sur les régions Parotidiennes et Sous-Maxillaires.

Contre-Indications. — Ne jamais appliquer sur les muqueuses.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires **MARCEL LOGEIS**

27, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Suff. 03-38.)

ANALPYRINE

Antinévralgique.

Composition. — Chlorhydrate d'amyléine, salipyrine, pyramidon, en milieu alcalin caféiné.

Indications. — Névrites, névralgies, sciatiques, céphalées de la grippe ou des pyraxies, rhumatisme articulaire, arthrites douloureuses.

Algies du cancer du tabes. Coliques hépatiques et néphrétiques (traitement symptomatique seulement).

Présentation. — En flacons de 60 cc.

Posologie. — Doit être prise à la dose de XXX gouttes, dans un peu d'eau, de préférence loin des repas. Cette dose peut être renouvelée sans inconvénient jusqu'à 10 à 12 fois par 24 heures, selon l'intensité de la douleur et la réceptivité du malade. Dose maxima : 60 à 700 gouttes par jour.

S'abstenir chez les albuminuriques.

Le flacon, prix au public : 13 francs.

Laboratoires de l'ANALPYRINE

M. BÉRTRAND, Pharmacien

NOMEXY (Vosges).

ANAPEPTONE VASSAL

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés de *peptones polyvalentes* de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de gélatine, de végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

Doses moyennes. — 1 ou 2 comprimés 1 heure avant les repas principaux.

La boîte de 50 comprimés suffit à une cure : 20 francs.

Échantillons gratuits.

Laboratoire LÉON DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

ANAPYOL

Pommade antiseptique cicatrisante.

(Formule expérimentée à l'hôpital Saint-Louis.)

Composition :

Oxyde jaune de Hg.....	5 gr.
Acide salicylique.....	2 gr.
Ichthyol	3 gr.
Oxyde de zinc	15 gr.
Lano-vaseline	75 gr.
Essences antiseptiques et aromatiques.	Q. S.

Indications :

Topique d'une efficacité reconnue dans toutes les lésions suppurées et infectées de la peau, **Anapyol** est d'un emploi courant dans la clientèle où il peut être prescrit pour les affections suivantes : eczémas chroniques et eczémas aigus *infectés*, ulcères variqueux et ulcérations de toutes natures, pyodermites, impétigos, gourme, acné, séborrhée, dartres, blépharites.

Prix : 12 francs.

Laboratoires FABIU

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85.)

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

Forme. — Liquide rosé pour usage externe, entièrement miscible à l'eau (inhalations froides, compresses, gargarismes).

Indications. — Rhumes, Sinusites, Grippe, Toux spasmodiques, Coqueluche. Prophylaxie des contagions, Angines.

Mode d'emploi. — *Pure* : pulvérisations ou aspersions dans les pièces, sur vêtements, draps, linge, *mouchoirs*.

Inhalations froides sur mouchoir et dans les mains.

Diluée (Toux, grippe, coqueluche) : *compresses* sur la gorge et la poitrine.

Diluer dans 4 parties d'eau chaude. Recouvrir de coton cardé ou d'une étoffe de laine. Laisser en place toute la nuit.

Gargarisme : angines, adénoïdites, 1/2 cuillerée à café d'Anaquintine, plus une cuillerée à café de Borate de Soude dans un verre d'eau chaude.

Anaquintine gouttes nasales.

(Voir RHINAQUINTINE.)

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)

et LIVAROT (Calvados).

ANAUURAL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, phényl-méthyl-malonylurée, borotartrate de calcium.

Indications. — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

Doses. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 francs (20 jours de traitement).

Laboratoires BARTHELEMY

1, place Forbin
AIX-EN-PROVENCE
(Tél. : 1-70.)

ANAXÉRYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les nos 363-25 et 28.

Forme. — Pommade (tube) et savon.

Composition. — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiparasitaire, Antipsoriasique.

Indications. — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

Mode d'emploi. — Appliquer l'ANAXÉRYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate. Éviter le contact de l'Anaxéryl avec les muqueuses.

Le tube (grand modèle) : 12 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 62-30.)

ANDROCALCION

Forme H

Composition. — Association de Calcium, de Magnésium, de Phosphore, combinés à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *Traitement* de ses accidents. Troubles endocriniens, nervosité chez la femme non mariée.

Propriétés. — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

Préparation. Doses. — Quatre dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

Forme E

Composition. — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, *Lobe antérieur d'hypophyse*. Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

Présentations et Doses. — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 fois par jour 3 à 4 dragées par 24 heures, 12 jours par mois.]

Prix : 22 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Sûren 53-70 et 53-71.)

ANDROSTHÉNOL

Complexe d'extraits androïque et thymique, désalbuminé et délipidé.

Indications. — *Chez l'enfant et à la puberté* : traitement de la cryptorchidie, retard de la puberté, syndrome adipo-génital, intelligence tardive, inattention. — *Chez l'adulte* : asthénies musculaire ou intellectuelle, hypogénitalisme, accidents urinaires dus à l'hypertrophie de la prostate.

Posologie. — *Enfants* : 1 ampoule buvable ou 5 dragées par jour. — *Adultes* : 2 ampoules buvables ou 10 dragées par jour, à prendre à jeun ou très loin des repas.

Présentation

Boîte de 10 ampoules buvables	24 francs.
Étui de 40 dragées	12 —

Laboratoires du DOCTEUR DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII°).

(Tél. : Lab. 72-73, 4 lignes groupées.)

ANDROSTINE

CIBA

Extrait orchitique hydrosoluble.

Action physiologique. — *Chez la femme* : Équilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. (Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas.) *Chez l'homme* : Activa-trice de la spermatogenèse. — *Dans les deux sexes* : Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.]

Indications. — *Chez la femme* : Troubles de la ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme* : Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes* : Obésité, engelures, acrocyanose, diabète.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comp. par jour, 1 amp. tous les 2 jours.

Flacon de 40 comprimés.

Boîte de 4 ampoules.

(Voir Perandrone.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ANDROVAR

(Gouttes).

Traitement de choix des troubles ovariens.

Composition : { Orchitine (discrète).
Gouttes à base { Thyroïde (dose réduite).
d'extraits { Hypophyse (lobe antérieur).

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne : Puberté, Aménorrhée, Dysménorrhée, Nervosisme, Carence sexuelle (célibataires et veuves de fait et de « principe »), Ménopause, Obésité.

Présentation :

Gouttes : Flacon compte-gouttes de 20 cc. = soit 600 gouttes environ. Prix : 25 francs.

Demi-flacon compte-gouttes de 10 cc. = soit 300 gouttes environ. Prix : 15 francs.

Posologie :

XXX à LX gouttes *pro die* en deux ou trois fois, loin de repas si possible (sinon, faire absorber avant le repas dans un peu d'eau).

Laboratoires ANDROVAR

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ANDROVULES

(Ovules.)

Traitement de choix des affections gynécologiques liées ou non à une insuffisance ovarienne. (Opothérapie complémentaire par voie naturelle.) Antiseptique, Décongestif.

Composition. — Orchitine (absolument discrète), Sulfate neutre d'oxyquinoléine, Glycérine solidifiée.

Indications. — D'une part, toutes les affections gynécologiques (métrites, salpingites, annexites, etc.) et, d'autre part, tous les troubles de la fonction ovarienne (aménorrhée, dysménorrhée, nervosisme, carence sexuelle, etc.). (*Voir également Androvar.*)

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher (faire garnir la malade).

Le traitement de 20 jours par mois pour les cas rebelles sera très utilement complété par l'**Androvar**.

Les Androvules ne tachent pas.

Laboratoires de l'ANDROVAR

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ANÉGRINE

Composition :

Acide quinoléique carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara.

Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en 2 ou 3 fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

Prix : Comprimés : 17 francs. — Cachets : 18 francs.

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : + Alésia 22-46.)

ANEXOL

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam. toluène monochl. (chloramine T.)

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Principe de la javellisation
sans ses inconvénients.

Formes. — Double boîte de 80 comprimés
Boîte de 40 —

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Sterilisation de l'eau....	1 comprimé.
Gargarismes	1 à 2 comprimés.
Urologie et gynécologie..	2 à 4 —
Pansement des plaies ..	4 à 6 —

La dissolution se fait immédiatement,
même à froid.

Prix : la double boîte : 14 fr. La boîte : 8 fr.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
Tél. : 32.

ANGÉIOL

Gouttes.

Cure spécifique des malaises de l'Hypertension artérielle.

Composition. — Extraits sélectionnés de citronnelle, fleurs d'oranger, tilleul, uva-ursi, prêle, genêt...

Doses et mode d'emploi. — XV gouttes dans un demi-verre d'eau froide sucrée ou non, trois heures après le repas du soir, ou le matin à jeun une heure avant le petit déjeuner, pendant 20 jours. Arrêt de 10 jours et reprise du traitement, autant de fois qu'il sera nécessaire.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nervin, faible hypotenseur, il donne une rapide sensation d'euphorie. Goût agréable.

Indications. — Vertiges, céphalées, obnubilations, tachycardies simples ou à paroxysmes, angoisses, états spasmodiques, myocardites.

Prix : le flacon pour 45 jours de traitement environ : 24 francs.

Demandez échantillons copieux à la :

Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques.

10, rue du Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE (Vendée).

Dépôt : **ÉTABLISSEMENTS DARRASSE FRÈRES**, 13, rue Pavée,
Paris, et leurs succursales : Rouen, Caen, Rennes, Tours, Moulins, Lyon, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Montauban, Narbonne.

ANGIHORMOL

du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition :

Pancréas (Extrait total)	}	0,05
Ovarine		
Orchitine		
Hypophysine (glande totale).....		
Prostatine.....	}	à 0,02
Placentine		
Parathyroïdine.....		
		0,001

Propriétés. — L'*Angihormol*, grâce aux propriétés énergiques des glandes endocrines, agit tout particulièrement sur les veines et sur les varices en stimulant les contractions du muscle veineux, atone.

Indications. — Porteurs d'Ulcères Jambiers des deux sexes. Varices, hémorroïdes, périphlébites (déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux).

Remarques. — L'emploi de l'*Angihormol* doit être suspendu pendant la période de menstruation.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas.

Demander les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

ANGIOLYMPHE

Extrait végétal d'Orchidées (*Orchis mascula*).

Profond modificateur du terrain dont il exalte les réactions de défense, AUCUNEMENT TOXIQUE. Ne provoque aucune réaction générale ou de foyer,

Indications. — Prétuberculose, tuberculose. Etats déficients.

Dans les formes pulmonaires :

EUPHORIE manifeste. BAISSSE de la température. DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs et autres symptômes.

AUGMENTATION de l'Appétit, du Poids, des Forces. AMÉLIORATION rapide de l'état général.

AMELIORATION des signes stéthoscopiques. DIMINUTION et DÉGÉNÉRESCENCE des Bacilles de Koch.

Dans les formes ganglionnaires osseuses, etc. AMÉLIORATION rapide de tous les symptômes.

Posologie. — 2 à 5 cc. en une injection intramusculaire quotidienne par séries de 8 à 12. Repos d'une dizaine de jours et reprise.

Compresses dans les manifestations chirurgicales (fistules, etc.).

Prix : 30 francs.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine)

(Tél. : Défense 12-11.)

ANGIOSÉDINE

Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Formule. — Ext. mou de passiflore, de crataegus, de jusquiame, gardénal, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hamamélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés de 0,50.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 614-1.

Prix : 20 francs.

Pharmacie LACOR

81, rue de la Roquette — PARIS.

ANGIOXYL

Nature. — Extrait pancréatique désinsuliné hypotenseur à action trophique sur les vaisseaux, titré physiologiquement.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites de toute nature. Ulcères gastriques, ulcères variqueux. Maladie de Basedow, Anxiétés, Troubles de la Ménopause.

Formes. — 1° Angioxyl-Ampoules, en boîtes de 10 ampoules ; 2° Angioxyl-Sirop, en flacons de 150 cc. environ.

Pour un traitement de 5 à 10 jours.

Doses. — De 1 à 3 ampoules par jour en injection intramusculaire pendant 18 jours.

Ou 2 à 3 cuillerées à dessert de sirop par jour.

Aucune contre-indication.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Le flacon de sirop : 20 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

ANGORAL

Antispasmodique, Régulateur du système vago-sympathique.

Sédatif de l'angoisse, des palpitations, de l'éréthisme cardiaques.

Thérapeutique d'action constante des arythmies fonctionnelles.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Tachycardies, palpitations, extrasystoles, angoisses cardiaques, angine de poitrine, Insomnies.

Déséquilibres du système vago-sympathique cardiaque, notamment ceux de la ménopause et de la maladie de Basedow.

Troubles précurseurs de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.

Composition. — Un comprimé contient :

Extrait stabilisé de fleurs de	
Cratægus	0 gr. 03
Extrait stabilisé de Valériane.	0 gr. 03
Extrait stabilisé de Passi-	
flore	0 gr. 01
Sulfate de spartéine (du	
genêt)	0 gr. 015
Phényléthylmalonylurée	0 gr. 03

Avantages. — *Dosage optimum et constant des sédatifs* du système nerveux extracardiaque et des *médicaments régulateurs* de la contraction et de la conduction intracardiaques.

Posologie. — *Dose moyenne* : 1 à 2 comprimés au début des deux principaux repas jusqu'à sédation des phénomènes pathologiques.

Suspendre quelques jours et reprendre la médication s'il est besoin.

Prix : 14 francs le tube (8 à 15 jours de traitement).

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PÉRIGUEUX.

(Tél. : 4-43.)

ANICTÉROL

Composition :

Extrait mou d'artichaut Dausse.....	0,05
Extrait mou de Boldo Dausse.....	0,02
Calomel.....	0,001
Noix vomique pulv.....	0,01
Mucilage végétal.....	0,15
Excipient. Q. S. pour 1 comprimé de 0,30.	

Mode d'action. — L'ANICTÉROL constitue par ses propriétés cholagogues, anti-infectieuses, laxatives, stimulantes et diurétiques, la meilleure des cures de désintoxication générale.

Indications. — Toutes les affections hépatiques et intestinales liées à des états d'insuffisance biliaire ou d'origine infectieuse.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 6 et même 10 comprimés par jour, de préférence dans l'intervalle des repas, avec un peu d'eau ou de tisane.

Prix. La boîte de 50 comprimés : 14 francs.

G. ROUSSY, Pharmacien

164, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Gutenberg 67-13 et 67-14.)

ANIODOL EXTERNE

Le plus puissant antiseptique externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons ; ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Prix :

Poudre, comprimés, solution externe :
9 francs.

Ovules : 14 francs.

Savon, vaseline : 2 fr. 75.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — Nanterre (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les
Docteurs. (Tél. : Longchamp 07-26.)

ANIODOL INTERNE

Le plus puissant antiseptique interne, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes, rectites, prostatites.

Suppositoires, Pommade.

Formule simple. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

Formule composée. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive), Adréaline, Eucaïne, Menthol.

Administration. — *Crises aiguës :* Suppositoires Anoïde, formule simple. *Cas habituels :* Suppositoires Anoïde, formule composée. Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

Mode d'emploi. — *Suppositoires :* Un le soir en se couchant. *Crises aiguës :* Un matin et soir.

Prix : 16 francs.

Pommade : Application locale, matin et soir. } Traitement.
Prix : 13 francs. } pour 10 jours.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

MA. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur,
116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 12-35.)

ANOREXYL

Composition :

Association de Condurango, Badiane, Colombo, à une Vitamine B et à la Génésérine.

Propriétés thérapeutiques :

Provoque l'appétit, stimulant gastrique, régularise les fonctions de l'estomac, calme les troubles sympathiques et du plexus solaire.

Indications :

Toutes les inappétences, insuffisances gastriques, Gastropathies douloureuses, Troubles nerveux des fonctions digestives. Pas de contre-indications.

Doses :

Chez l'adulte : XXX à L gouttes, un quart d'heure avant le repas dans un peu d'eau.

Chez l'enfant : au delà d'un an, XII à XV gouttes deux fois par jour un quart d'heure avant le repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 16 francs.

Laboratoires ARMORIL

6 bis, rue Belloni — PARIS (XV°).
(Tél. : Suffren 64-97.)

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique, Goutte, Lumbago, Sciatique, Migraines, Névralgies, Grippe, Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X°)

ANTALGYL

du Docteur Moity

Deux présentations :

1° **Antalgyl Cachets.** — Spécifique radical de toute douleur, apaisant neuro-végétatif. Innocuité absolue pour la muqueuse stomacale. Euphorie rapide.

Formule. — Ether diéthylique de l'urimidopropane (1,3), en combinaison équimoléculaire avec la diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone (1,23), 0 gr. 50 par cachet. (Excipient inerte magnésie hydratée Q. S.).

Indications. — Migraines, névralgies, rhumatismes, lumbagos, sciatiques, menstrualgies, coliques hépatiques et néphrétiques, algies post-opératoires. Un cachet d'Antalgyl épargne souvent une piqûre de morphine. Pas d'accoutumance, pas de contre-indications.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Prix : 12 francs la boîte de 12 cachets.

2° **Antalgyl baume.** — Au salicylate de Méthyle dissimulé et à odeur agréable.

Indications. — Rhumatisme, circulation; points de côté, sciatiques, névrites, névralgies, rhume négligé, pleurites, lumbagos, goutte torticolis, entorses, foulures.

Formule. — Acide salicylique, 2 gr. Camphre du Japon, 5 gr. Salicylate de méthyle, 10 gr. Ess. de citronnelle, 5 gr. Méthane trichloré, 5 gr. Oxyde d'éthyle, 5 gr. Teinture térébenthinée de capsicum, 40 gr. p. 100 cc.

Mode d'emploi. — Frictions légères 3 à 4 fois par jour. *Ne pas employer en compresses.*

Prix : 12 francs le Flacon de 100 gr. environ.

Peuvent être présentés aux Assur. Sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire J.-O. MOITY, Docteur en médecine,
Docteur en pharmacie. ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau. — NEUILLY-PARIS

ANTASTHÈNE CARRION

Composition. — Association de glycérophosphates à un extrait cérébral et spinal.

Formes. — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

Posologie et mode d'emploi :

Enfants : 1 injection tous les 2 jours. 2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour. 4 comprimés par jour aux repas.

Présentation et prix. — Boîtes de 12 ampoules ou de 50 comprimés : la boîte, 20 francs.

Durée moyenne des unités de vente : 12 à 24 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ANTÉLOBINE

Composition. — Hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse, physiologiquement titrée. Pour injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de l'ovaire et du testicule agit par leur intermédiaire sur l'ensemble du tractus génital.

Indications et posologie. — 1° Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien : aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la formation. Prescrire, alors, 1 ampoule quotidienne de 100 unités, 6 jours par mois, de préférence dans la première moitié de la période intermenstruelle ; 2° dans les méno-métrorragies, injecter 100 unités quotidiennes dans la semaine précédant la date présumée des règles ; une fois les règles déclenchées, injecter 250 à 500 unités par jour ; 3° Cryptorchidie, infantilisme masculin, impuissance : pratiquer des séries de 15 à 20 injections de 100 unités, séparées par des périodes de repos de 8 à 10 jours ; 4° Alopécie séborrhéique : 2 à 3 injections de 500 unités par semaine.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. à 100 unités-rat, prix : 50 francs. Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. à 500 unités-rat, prix : 50 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

ANTÉPARSINE GRÉMY

Composition. — Extrait antéhypophysaire mixte (gonadostimulines).

Titrage biologique. — 1 unité lapin ou 100 unités physiologiques par ampoule.

Indications. — Insuffisance endocrinienne de la puberté. Ectopies testiculaires. Hypofonctionnement ovarien et troubles ménopausiques. Hyperfolliculinémie. Stérilité. Déficiences glandulaires masculines, impuissances, séborrhée, alopecies. Sénilité précoce.

Forme. — Ampoule injectable par voie sous-cutanée.

Prix. Boîte de 3 ampoules.	20 fr.
— de 5 ampoules.....	30 fr.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Indications. — Hémorragies et États hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase préopératoire.

Présentation. — Boîtes de 1 ampoule de 10 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cm³. à renouveler au besoin après quelques heures.

Prix de vente :

L'ampoule..... 25 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHIOMALINE

(Antimonio-thiomalate de lithium).

Composé organique titrant 16 % d'antimoine, contenant du soufre dans sa molécule.

Indications. — Lymphogranulomatose inguinale, subaiguë (maladie de Nicolas et Favre), Rétrécissement du rectum, Leishmanioses, Kala-Azar, Bouton d'Orient, Bilharzioses vésicale intestinale, hépatique.

Présentations. — Boîtes de 10 ampoules de 1, 2 et 3 cm³, d'une solution à 6 % de sel. Boîte de 5 ampoules de 4 cm³.

Posologie. — Injections intramusculaires parfaitement tolérées. Séries de 12 à 20 injections (2 ou 3 par semaine).

Adulte : débiter à 0 gr. 03 de sel en augmentant chaque fois de 0 gr. 03 jusqu'à 0 gr. 18 ou 0 gr. 24.

Enfant : Selon l'âge et le poids, réduire les doses de 2 à 5 fois.

Prix de vente :

La boîte d'amp. de 1 cm³. : 15 francs ; 2 cm³. : 20 francs.

3 cm³. : 25 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHRASEPTOL

Granulé urotropine, charbon, citrate de soude et magnésie.

Propriétés. — Absorbant, Antiseptique intestinal, biliaire, urinaire, Cholagogue, draine la vésicule. Laxatif léger.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Colite, Appendicite chronique, Cholécystite, Infections des voies urinaires et biliaires, Migraines, Colibacillose, Syndrome entéro-rénal. Angiocholite, Lithiase.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café une heure après le repas, midi et soir.

Prix : 15 francs.

Durée : 9 à 10 jours.

Pharmacie BAUDE
SAINT-AUBERT (Nord).
(Tél. : 16.)

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Colchicine en solution iodosalicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode	1 gr. environ.
Excipient. Q. s. pour 100 cc.	

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Par 24 heures 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE
DE LA PLACE ROYALE**

4, rue Colbert — REIMS

Compte Postal Paris 182-35. R. C. Reims 14101.

(Tél. : Reims 48-34.)

ANTI-ASTHÉNIE LAURIAT (Ex-Lauriatol)

Propriétés. — Reconstituant général, accroît le dynamisme des cellules nerveuses, accélère les échanges nutritifs.

Indications. — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, pré tuberculose, tuberculose, croissance.

Composition. — Pour un comprimé :

Nucléinate de Manganèse.....	0, 025
Extrait sec de Noix vomique.....	0, 0025
Salicine cristallisée.....	0, 05
Quassia amara.....	0, 05
Condurango.....	0, 05
Glycérophosphate de magnésie.....	0, 05
Phosphate tricalcique.....	0, 20
Excipient (Talc, Gomme).....	0, 20

Forme et Avantages. — Comprimés dragéifiés inaltérables, pratiques à emporter, aucune saveur désagréable.
Conservation indéfinie.

Posologie :

Adultes : 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

Enfants : au-dessus de 8 ans : 1/2 dose. Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés.

Laboratoires LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

ANTI-ASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées, digitale et menthol.

**Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.
Calme la toux.**

Mode d'emploi. — Faire brûler une pincée de poudre sur une soucoupe et aspirer doucement la fumée par les narines.

Indications. — Crises d'asthme, Emphysème, Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes, Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais
aux mêmes principes.

Prix : l'étui (poudre) : 10 francs.
la boîte (cigarettes) : 6 francs.

L. N. C. n^{os} 474-1 et 2.

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 07-05.)

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A chaque variété d'asthme, son traitement approprié.

Médication de fond :

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobélie, Belladone.

Médication complémentaire :

particulière à chaque variété d'asthme.

Anti-Asthmine A Iodurée. Asthme sec. Emphysème.

Anti-Asthmine B. Balsamiques, expectorants ; asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthmine C. Iodure-caféine : asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

Anti-Asthmine E. Éphédrine naturelle à donner de demi-heure en demi-heure dès le début de la crise.

L'Anti-Asthmine E prévient et jule la crise.

Posologie :

Adultes :

Comprimés : 2 à 3 par 24 heures.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants 10 ans : demi-dose.

Prix : 17 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ANTIDERMITE

PATE MOLLE

(Aucune contre-indication.)

Propriétés. — Médication antiphlogistique antiprurigineuse, calmante, émolliente, résolutive, cicatrisante.

Composition. — Camphre, poudres inertes (carbonate de Ca de Mg ZnO). Liniment oléo-calcaire.

Indications. — TOUTES DERMITES :

Dermatoses irritables et suintantes : Eczémas aigus, subaigus, infectés (croûtes laiteuses des campagnes).

Dermatoses bulleuses : Brûlures, coups de soleil, radiodermites.

Dermatoses érythémateuses.

Dermatoses prurigineuses : Prurits divers : prurigos si souvent rebelles (prurigos infantiles), simples ou eczématisés.

Plaies variqueuses lymphangitiques douloureuses.

Dermo-épidermites érythémato-érosives du siège (érythro-dermies des nouveau-nés).

Prix. Grand modèle : 13 francs. Petit modèle : 7 francs.

Laboratoires Dr H. AURIOL

Docteur en médecine, pharmacien de 1^{re} classe.

4, rue de Metz — TOULOUSE.

ANTI-DIABÈTE H

Composition :

A base de *Vaccinium*, de *Fabiana* et de *Galéga*.

Indications :

Diabète et toutes ses manifestations et complications : gangrène, ulcères, phlegmons, asthénie génitale diabétique. — Incontinence urinaire.

Aucune contre-indication.

Dispense de régime

Présentation :

Une boîte de 20 cm. × 10 cm. pour un traitement de 8 à 15 jours.

Posologie :

1 cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Prix : 16 fr. 80

Laboratoire **ALPHA**

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

Indications thérapeutiques. — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante et lutte contre l'amaigrissement causé par l'excès de désassimilation.

Composition et Mode d'emploi :

Elixir contenant $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 30 \text{ extrait de kola par verre à} \\ \text{liqueur.} \\ 0 \text{ gr. } 021 \text{ saccharine par verre à li-} \\ \text{queur.} \end{array} \right.$

1 à 2 verres à liqueur après chaque repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Produits **GONNON**

J. et C. **GONNON**, Pharmaciens

14 rue Victor-Hugo — LYON.

ANTIDIABÉTIQUE REQUIS

Extrait concentré glyciné, inaltérable, de Vitamines B et de Diastases végétales.

Composition. — Feuilles de Noyer, Feuilles de Géranium Robert, Myrtille des Vosges, Boldo, Artichaut, Gui, Combretum R, Noix vomique, Arrhénal.

Propriétés. — Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Acétonurie, Acétonémie, Hyperglycémie, Vertiges, Troubles de la vue, Plaies et dermatoses d'origine diabétique, etc.

Dans les diabètes graves : Auxiliaire précieux de l'insuline à laquelle il convient de l'associer à la dose de 6 cuillerées à café par jour.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour aux repas soit pur, soit additionné d'eau fraîche aromatisée au citron, à l'orange, à la menthe, etc.

Enfants : 1 cuillerée et demie à café au-dessous de 10 ans diluée dans 3 cuillerées à soupe d'eau fraîche ou de lait, à prendre en 3 fois avant les repas du matin, de midi et du soir.

Durée des flacons de vente, à la dose normale de 3 cuillerées à café : 16 à 17 jours.

Prix au public : 30 francs.

Laboratoire des Antidiabétiques REQUIS

163, boul. de la Croix-Rousse — LYON. (B 18-87).

ANTIDOULEUR BARBESSOU

Liqueur de goût et de saveur agréables.

Indications. — Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Lumbagos, Règles douloureuses, Grippe, Algies diverses.

Composition

Phényldiméthyl - diméthylamino - pyrazolone	2 gr. 05
Salicylate de Phényldiméthyl - pyrazolone	2 gr. 05
Triméthyldioxypurine	1 gr. 525
Excipient hydro-alcool, sucré à l'angélique	Q. S. p. 100 cc.

Posologie. — 2 cuillerées à café : jusqu'à 6 par jour.
— *Enfants* : 1/2 dose.

Avantages. — Action rapide, sûre, constante, pas d'accoutumance, pas d'accumulation.

Prix au public : 8 fr. 50 (le flacon de 10 doses).

Laboratoires BARBESSOU

10, allées Damour, BORDEAUX.

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes, de bouillon-lysât.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 25 francs.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents : Anthrax, Furunculose. Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo-Streptocoques : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïde.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoulé dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 francs.

Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 15 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dower, phénacétine et pyramidon, caféine, codéine (1 centigr. par cachet). Ni quinine, ni antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — GRIPPE, aux premiers frissons, prescrire de préférence : 1 cachet vers 17 heures ; 1 cachet vers 21 heures ; 1 cachet le lendemain matin ; 1 cachet le lendemain soir, si besoin est, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

Pour les adultes seulement.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique.

Indications. — État grippal et fébrile, Courbature, Maux de tête, Névralgies, Influenza et complications.

Prix : 6 francs.

Durée du traitement : 3 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

ANTIMYCOSE

Pommade Dermatophile.

Composition. — Acide salicylique, Sous-nitrate de bismuth, Salicylate de mercure, Essence d'eucalyptus, Menthol, Vaseline et Lanoline.

Propriétés. — Traitement radical des mycoses et affections multiples microbiennes et parasitaires de la peau dues à la chaleur. La pommade dermatophile antimycose a profité des recherches des laboratoires tropicaux et, en particulier, de ceux de Ceylan et Calcutta, et donne des résultats constants lorsque le mode d'emploi est rigoureusement observé. Si les récidives partielles sont immédiatement traitées, la guérison est la règle.

Indications. — Toutes les infections des plis cutanés, depuis l'intertrigo simple du pli génito-crural, des aisselles, du sillon sous-mammaire, des espaces interdigitaux jusqu'aux infections mycosiques graves, aux eczémas et aux panaris de même nature.

En général, toutes les pyodermites, bourbouilles, etc...

Mode d'emploi : 1^o Décaper la région malade avec une compresse stérile et de l'eau bouillie sans savon ;

2^o L'assécher par tamponnement ;

3^o Appliquer la pommade en couche uniforme et légère trois fois par jour jusqu'à guérison définitive (huit jours après guérison apparente).

Prix : 15 francs le tube.

Laboratoires L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Tél. : Odéon 73-92.)

ANTINÉASE

Composition. — Gélose, kaolin, magnésium hydrocarbonaté. Forme granulée, 50 0/0 des principes médicamenteux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastrique, transforme l'excès nuisible de HCl en chlorure de magnésium naissant.

Indications. — Aigreurs, hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac. Prévient le cancer.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin à jeun et 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 12 fr. 50.

Durée de la boîte 12 à 14 jours.

M. SALAVERT

Pharmacien de 1^{re} classe

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

Tél. : 243.

ANTIPHLOGISTINE

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria. Eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties d'environ : 150 grammes, 300 grammes, 450 grammes, 900 grammes, 2 kg. 300. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

Prix. Format 0, 150 grammes : 9 fr. 50.

—	I, 300	—	18
—	II, 450	—	27
—	III, 900	—	45
—	IV, 2 kg. 300	—	88

Antiphlogistine gynécologique (boîte format I et gaze préparées) : 28 francs.

Boîte gazes préparées. 11 francs.

Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE

F. TILLIER, Pharmacien

11, rue du Petit-Parc. — SAINT-MAUR, près PARIS.

Tél. : Gravelle 06-44. — R. C. Seine 56-956.

N° 433 du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

ANTIPIOL

Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.

Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

Quatre formes :

- 1° Pommade pour pansements non adhérents.
- 2° Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3° Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino et oculistique.
- 4° Ovules pour gynécologie.

Indications. — Furoncles, Phlegmons, Absès, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gerçures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau, Affections gynécologiques.

Prix : Pommade et ampoules 12 fr. Ovules 18 fr.

Ces produits peuvent être prescrits pour les Assurances Sociales.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.



ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum.

Myagrium, Laurinum, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSITOIRES ANTIRRHOÏDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde, doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 26 francs. — Le demi-flacon : 14 fr. 85.

La boîte de supposi-cônes : 12 francs.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

Indications. — Traitement étiologique du *Rhumatisme chronique* de la *Sciatique*, du *Lumbago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

Composition. — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium ; calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

Forme. — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

Mode d'emploi très important. — Sept petits paquets par jour, d'heure en heure, ou de demi-heure en demi-heure, sans discontinuer, malgré les repas ; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (30 petits paquets) 12^r 50

Triple boîte (12 jours de traitement) 33 fr. 50

Boîte-cure (21 jours de traitement) 50 fr. »

Remboursable par les caisses d'Assurances sociales.

La triple boîte et la boîte-cure renferment de gros paquets ; spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans ces boîtes ; le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau et absorbera toutes les heures pendant 7 heures, ou toutes les demi-heures pendant 3 heures et demie, une cuillerée à soupe de cette solution.

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PÉRIGUEUX

(Tél. : 4-43.)

ANTISEPTOMA

Spécifique des affections gastro-intestinales, complétant le pouvoir absorbant du *Charbon activé*, par l'adjonction de *Salicylate*, d'*Urotropine* et de *Benzonaphtol*.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Fermentations intestinales, dilatation d'estomac, aérophagie, ptose abdominale, pyrosis, Etats préulcéreux, insuffisance biliaire, cholécystite, colibacillose, intoxications.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café *après* le repas.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle sous le n° 1403-1.

L. ROBERT, Pharmacien.

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 70.)

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques antimicrobiens.

Antivirus colibacillaire. — Antivirus staphylocoocci-
que. — Antivirus streptococcique. — Antivirus
mixte (strepto-staphylococcique).

Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 francs.

— de 12 — 4 cc. — : 20 francs.

— de 6 — 4 cc. — : 10 francs.

Antivirus puerpéral (streptococcique).

En boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 20 francs.

Antivirus gonococcique (Gonolyt).

En boîtes de 6 ampoules 10 cc. : 24 francs.

Antivirus { 1 boîte de 1 ampoule rectale de
typhique. { 125 cc. : 20 francs.

Antivirus { 1 boîte de 2 ampoules buccales de
mélitococcique. { 50 cc. : 20 francs.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

Antivirus mixte en pommade (Arapal):

10 francs et 5 francs.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Produits de « La BIOTHÉRAPIE »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

ANURIQUE DUPLEX

Composition :

CCl^3CHO — $\text{C}^{11}\text{H}^{12}\text{N}^2\text{O}$ — KBr —
 $\text{C}^{17}\text{H}^{23}\text{NO}^3$.

Indications. — Incontinence d'urine infantile,
Chorée, Sommeils agités et Tics nerveux de
l'enfance.

Mode d'emploi :

3 ans, 2 cuillerées à café par jour.

5 ans, 3 cuillerées à café par jour.

7 ans, 4 cuillerées à café par jour.

9 à 12 ans, 4 à 6 cuillerées à dessert.

90 à 95 p. 100 de guérisons dans l'Incontinence
d'Urine infantile.

Prix : 28 francs.

Durée d'une unité: environ 8 jours.

Laboratoires DREYER-DUFER

NOGENT-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 0-17.)

Échantillon sur demande.

ANUSOL

Composition. — Suppositoires et pommade anti-hémorroïdaires à l'iodorésorcinosulfonate de bismuth.

Indications. — Traitement rationnel, efficace et sans danger des hémorroïdes, rectites, fissures, érosions et états inflammatoires de la muqueuse anale, **prostatites**, hypertrophie de la prostate. L'Anusol calme les douleurs, arrête le saignement, décongestionne et cicatrise.

Mode d'emploi. — Cas aigus : un suppositoire matin et soir ; applications de pommade sur les muqueuses anales externes.

Traitement d'entretien : un suppositoire tous les soirs puis tous les deux soirs à garder pendant la nuit.

Enregistré au Lab^{re} Nat^l de Contrôle des Médicaments. Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Quérault, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85 - 16-86 - 16-87.)

En Belgique : **LABORATOIRES SUBSTANTIA**

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

ANXIOL (comprimés)

Forme pharmaceutique et composition :

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0,01	Extrait d'Euphorbia.....	0,02
Hypophyse.	0,02	— de Cratægus ..	0,02
Belladone stabilisée	0,01	— de Scille	0,005
Phényléthylmalonylurée			0,01

pour 1 comprimé. (Flacon de 30 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'*Equilibre humoral* par une action simultanée, légèrement *Excitante* sur le *Sympathique* et *Inhibitrice* sur le *Pneumogastrique*. L'association éphédrine-hypophyse a l'avantage d'une action *rapide* et *durable* par la voie *buccale*.

Indications thérapeutiques. — *Asthme bronchique*, *Emphysème*, *Dyspnées asthmatiformes*. *Rhume des foins*. *Vertiges*. *Migraine*. *Hypotension* avec état dépressif. *Spasmes viscéraux*. *Dysménorrhée*. *Petit mal des rayons X*. *Allergies diverses*. ■

Mode d'emploi. — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun le matin, 2 le soir et 2 en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée.

Prescription (strictement médicale). — 1 étui comprimés *Anxiol Falvy*.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

AORTOL

Composition :

Solution de trinitrine 1 p. 100	1/2 goutte.
Teinture de cratægus.....	III gouttes.
Nitrite de soude pulvérisé.....	0,01
Silicate de soude pulvérisé.....	0,015
Scille pulvérisé	0,015
Extrait de valériane stabilisé	0,03
Extrait de gui stabilisé	0,025
Scammonée	0,015

Il existe deux formes d'Aortol :

1° Dragées rouges répondant à la formule ;

2° Dragées blanches ne contenant pas de trinitrine.

Avantages. — Vaso-dilatatoire puissant ne provoquant pas de phénomènes réactionnels, sans action nuisible sur la muqueuse gastrique, étant donnée la glutination des dragées.

Indications. — Spasmes vasculaires, Tachycardie, Arythmie, Angines de poitrine, Fréthisme cardiaque, Cardialgie, Dilatation aortique, Hypertension, Artériosclérose, Troubles congestifs. Action cardio-rénale incontestable.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour : 2 au commencement des repas.

Prix : 20 francs le flacon.

Laboratoires A. CAPITREL

16, bd des Filles-du-Calvaire — PARIS. Tél. : Roq. 33-63.

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales :
Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis et Viburnum.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).

Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste,
PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie
chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur,
préparé d'après les travaux des professeurs
Ch.-Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique ; sans action sur le rein, ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Prix : 9 fr. 75.

Laboratoire de l'APHOSAL

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 13-81.)

APIOL TANIT

Composition. — Capsules d'Apiol jaune
pur dosées à 0 gr. 25.

Indications thérapeutiques. — Emploi
habituel de l'*Apiol*. Règles douloureuses
et irrégulières.

Mode d'emploi. — Pendant les quatre jours
qui précèdent les règles, prendre matin,
midi et soir, une capsule d'*Apiol Tanit*
dans une infusion chaude de *Tisane Tanit*.
Cette dose peut être doublée si nécessaire.

Prix : 15 francs.

ROUANET, Pharmacien
ANTIBES (Alpes-Maritimes).

Approvisionnement pharmaceutique O. C. P.
et Grossistes.

APIOLINE de CHAPOTEAUT

Composition. — L'Apioline est le principe actif des graines de l'*Apium petroselinum*. Sa préparation rationnelle ainsi que sa pureté en font un produit efficace et *sans danger*.

Propriétés. — Emménagogue, régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée, aménorrhée, troubles de la puberté et de la ménopause.

Présentation. — Capsules dosées à 20 cgr. d'Apioline.

Posologie. — 2 à 3 capsules par jour à prendre au moment des repas, 4 à 5 jours avant l'apparition des règles. Continuer cette dose pendant la durée de l'écoulement mensuel.

Effectuer une cure de consolidation le mois suivant et le troisième mois si nécessaire.

Prix : 16 francs la boîte de 20 capsules.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

VIAL et Co, 8, rue Vivienne — PARIS

(Tél. : Gutenberg 27-03.)

APIVÈNE

Composition. — *Solution injectable de venin d'abeilles désalbuminée et titrée.*

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc. titrées à 1,5 US et 1 ampoule titrée à 0,15 US (ampoule jaune).

Propriétés thérapeutiques. — Action antalgique due à une « neurotoxine ». Action antirhumatismale.

Indications. — Sciatiques, radiculites, névralgies, névrites rebelles, zonas, etc. Rhumatismes chroniques ou déformants, lumbagos.

Mode d'emploi. — Pratiquer l'injection en totalité de l'ampoule jaune (ampoule à 0,15 US). Puis tous les 3 jours pratiquer une injection intramusculaire ou sous-cutanée (autant que possible *in loco dolenti*) en commençant par 1/4 et augmentant la dose par 1/4 jusqu'à 1 cc.

Il faut en général 6 injections pour une sciatique et 12 pour les rhumatismes chroniques.

Apivène Onguent. — (Association des salicyliques et de l'Apivène.) Traitement des Algies et des Rhumatismes par voie externe.

Prix : 14 fr. 70 le tube de 35 grammes.

Préparé par les LABORATOIRES PORSIN

39, rue Claude-Bernard — PARIS (V^e). Tél. : Gob. 80-34.

APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipoidé de muqueuse gastrique.

Donne de l'appétit. — Aide la digestion.
Favorise l'assimilation des médicaments.

Ne contient ni AS ni P.

Posologie :

Flacon contenant 1.000 gouttes. 1/4 d'heure avant les repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée.

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : à partir de 1 an : I à 2 gouttes par année d'âge.

Aucune contre-indication.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'APPETYL

37, avenue de la République — PARIS (XI^e).

AQUINTOL MIALHE

Spécifique de la Coqueluche, des Toux Spasmodiques et Coqueluchoïdes — Calme la Toux des bronchites chroniques. Aucune toxicité, goût agréable, guérison rapide. Dès les premiers jours, la toux est modifiée, le malade n'éprouve plus ni suffocation ni vomissement, et il retrouve l'appétit et le sommeil.

1^o Sirop à base de Chloro-Bromo-Fluor.

Doses :

Au-dessus de 6 mois.....	2 à 4 cuillérées à café.
Moins de 5 ans.....	3 à 8 —
Moins de 15 ans.....	4 à 8 — à dessert.
Adultes.....	5 à 8 — à soupe.

Flacon 250 cc. Prix : 20 francs.

2^o Double Flacon Sirop Aquintol (500 cc.)

Prix : 30 francs.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.
Conservation indéfinie.

3^o Gouttes.

Deux formes : 1^o Sucrées ; 2^o Glycérinées (Diabétiques).

Doses :

Les gouttes seront toujours prises dans un demi-verre d'eau :	
De 6 mois à 2 ans.....	XV gouttes 2 à 3 fois par jour.
De 2 ans à 5 ans.....	XV gouttes 3 à 8 fois par jour.
De 5 ans à 15 ans.....	XXV gouttes 4 à 8 fois par jour.
Adultes.....	L gouttes 4 à 8 fois par jour.

Flacon 30 cc. Prix : 13 francs.

LABORATOIRES MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e). — Tél : Richelieu 35-10.

ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies infectées, Brûlures, etc.

Présentation. — En tubes.

Grand modèle : 10 francs.

Petit modèle : 5 francs.

H. VILLETTE et C^{le}, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

ARCICA

Composition. — Ampoules buvables renfermant par dose cinq mgr. d'arséniate de soude associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et du condurango.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

Indications. — Nutrition défaillante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

Nota bene. — L'Arcica répond aux desiderata de certaines caisses concernant les lois sociales actuelles : ce n'est ni un vin, ni un élixir, ni un aliment. C'est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liqueux ou d'eau sucrée.

Dose journalière. — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

Prix : 21 fr. 50 la boîte de 10 ampoules.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

ARGENT-BOULARD

En ampoules buvables.

Indications. — Grandes Infections (septicémies, érysipèle, etc...), diarrhées chroniques, tabes, sclérose en plaques, épilepsie, grippe, anthrax, pneumonie, infections puerpérales, colibacillose.

Composition. — Chaque ampoule contient :

1° De l'Argent sous forme de complexe organo-métallique ;

2° Des levures vivantes, dans leur milieu isotonique ;

Posologie. — Une ampoule par jour ou une ampoule tous les 2 jours en cas de traitement prolongé, de préférence le matin à jeun.

La métabolisation est déjà faite en grande partie par les levures et l'assimilation est extrêmement rapide.

Verser le contenu de l'ampoule dans un liquide quelconque, de préférence sucré et tiède (eau, vin, bière, tisane).

Prix : 25 francs la boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5.

Voir aussi les autres complexes organo-métalliques :

Or-Boulard, Iodure-Boulard, Magnésium-Boulard, Hydrargyre-Boulard, l'alternance quotidienne de deux complexes Boulard étant souvent recommandable.

Laboratoire CERBELAUD

Docteur en Pharmacie,

Ancien interne des hôpitaux de Paris.

82, avenue de Suffren — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 16-66.)

ARG-EPH (GOUTTES)

Gouttes nasales.

Composition :

Argyrol de Barnes	3 gr. 33	} pour 100 grammes.
Chlorhydrate d'éphédrine naturelle .	0 gr. 25	

Présentation. — Solution. En flacon de 10 grammes.

Indications. — Coryza aigu et chronique. Sinusite, Catarrhe du rhino-pharynx, Rhume des Foins, Céphalées d'origine nasale, Surdité par catarrhe du rhino-pharynx. Congestion des trompes d'Eustache et dans tous les cas où une désinfection nasale s'impose.

Posologie. — *En gouttes.*

Comme préventif. *Adultes* : IV gouttes. *Enfants* : II gouttes, dans chaque narine, matin et soir.

Comme curatif. *Adultes* : IV gouttes. *Enfants* : II gouttes dans chaque narine, 4 fois par jour.

En pulvérisations. — 4 fois par jour avec pulvérisateur de modèle ordinaire.

Autres indications. — Toutes affections oculaires : Conjonctivites, Blépharites, Kératites, etc., 1 goutte dans chaque œil 2 à 4 fois par jour,

Prix : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 783-3.

R. CUNIASSE, Pharmacien,

63, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Wagram 39-93.)

ARGOLACTA

Spécialité constituant le traitement rationnel de tous états infectieux d'origine intestinale. Chaque boîte d'Argolacta, vendue 15 francs au public, contient :

- 1° Une cure de démicrobisation par pilules glutinisées à base d'argent colloïdal, libérant leur principe actif en milieu intestinal. (40 pilules par boîte). Formule : Collargol, 0,02. Excipient, Q. S. pour 1 pilule.
2° Un ensemencement de germes utiles et de produits stimulant la muqueuse :

Ferments lactiques spéciaux sélectionnés et garantis conservés vivants à l'état léthargique pour une durée pratiquement illimitée.

A ces ferments, sous forme de comprimés, sont associées les diastases : pancréatine et entérokinase (20 comprimés par boîte).

Formule. — Poudre de ferments lactiques, 0,70. — Poudre de pancréas, 0,02. — Poudre d'intestin, 0,05. — Excipients, Q. S. pour un comprimé. Formules enregistrées au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les numéros 1481-1-1 et 1481-1-2.

Indications. — Infections généralisées à point de départ intestinal : à colibacille, à paracolibacille, à entérocoques, et leurs conséquences : infection vésiculaire, infection biliaire, troubles du système nerveux.

Infections intestinales à point de départ alimentaire, ou saisonnières. Dyspepsies intestinales, diarrhées, constipation, colopathies muco-membraneuses, colites simples, entérites, entéro-colites.

Gripes intestinales, dermatoses, urticaires, acné, furonculose.

Posologie. — Suivre les instructions contenues dans la littérature accompagnant le conditionnement. (Doses pour adultes et enfants.)
Durée du traitement 15 jours.

Echantillons médicaux expédiés sur demande de MM. les Médecins.
Fabriqué par le Laboratoire de recherches et Réalisations Scientifiques, 140, rue Lamarek, Paris (18^e). Tél. : Mar. 29-54.

ARGYBIL

Composition. — Complexe d'Argyrol de Barnes (Vitellinate d'argent) et de bile.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 15 francs. (Traitement pour 1 mois).

LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III — PARIS.

(Tél. : Élysées 17-46.)

ARGYCUPROL

Association stable d'argent colloïdal 10 p. 100
et de cuivre colloïdal 0,1 p. 100.

Activité remarquable. Tolérance parfaite.

Forme — Boîte de 6 ampoules injections.

Mode d'action :

L'Argent : Spécifique du Gonocoque.

Le Cuivre : attaque les microbes associés que n'atteint pas l'argent.

Avantages. — Action polyvalente. Aucune causticité. Ne provoque pas de rétrécissement en raison de son action kératolytique sur l'Epithélium de la muqueuse.

Indications :

Chez l'homme : Blennorrhagie aiguë (traitement abortif). Guérison très rapide. Blennorrhagie chronique et ses complications. (Instillations uréthrales, grands lavages.)

Chez la femme : Blennorrhagie aiguë ou chronique. Affections gynécologiques (gonococciques ou simples) : Métrites, vulvo-vaginites, salpingites, etc... (Injections-Tampons.) Ophtalmologie. Dermatologie.

Prix : 20 francs, la boîte de 6 ampoules-injections.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe.

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Défense 12-11.)

ARGYRESCINE MARS

Tire son nom de l'Argyrescine, l'alcaloïde le plus actif du marron d'Inde.

Composition. — Extrait physiologique de Marron d'Inde, extrait d'hamamélis, de noix vomique, etc...

Indications. — Toutes affections ayant pour origine une mauvaise circulation et l'inflammation des veines.

Mode d'emploi. — Dose normale, X gouttes deux fois par jour aux repas. Dans le cas de crise aiguë d'hémorroïde, donner XV gouttes toutes les dix minutes jusqu'à cessation de la douleur, puis continuer à la dose normale. Chez la femme enceinte, X gouttes deux fois par jour en cas de varices, hémorroïdes, lourdeurs des jambes.

Résultat. — Disparition en quelques heures de tous ces troubles.

Contre-indications. — Néant.

Remarque. — Dans tous les cas, faire prendre l'ARGYRESCINE MARS en gouttes, la pommade ne servant qu'à hâter la guérison des ulcères et des hémorroïdes, si elle est employée en même temps. La pommade n'est employée seule pour les engelures.

Échantillons sur demande.

Prix. Gouttes ou pommade : 15 francs.

Le flacon contient 500 gouttes environ.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22,

Et chez tous les grossistes.

ARGYRINE

Glucoside du Marron d'Inde.

Forme. Composition :

Granules : Argyrine, cinq milligrammes ; *Pommade* : Suppositoires Argyrine associée au benjoin et au Borate de soude. Ni belladone. Ni adrénaline.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et vaso-constricteur rapidement efficace dans les douleurs et hémorragies hémorroïdaires.

Apporte un soulagement et une amélioration durables dans les troubles circulatoires.

Mode d'emploi. — Granules : 1 à 2 avant chacun des 3 principaux repas.

Suppositoires : 1 le soir au coucher.

Pommade : en onction, le soir de préférence.

Prix :

Granules	14 fr.
Suppositoires et Pommade.....	12 fr.

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 32-88.)

ARGYROPHÉDRINE

Gouttes nasales.

Composition. — Argyrol de Barnes, Chlorhydrate d'Ephédrine naturelle, en solution isotonique stabilisée par procédé spécial.

Présentation. — 3 dosages. Ephédrine. Argyrol.

Solution faible.....	1/2 p. 100	1 p. 100.
— normale	1 —	1 —
— forte	3 —	1 —

Indications. — Rhinites aiguës, rhinites chroniques, asthme, rhume des foins et tous les cas nécessitant une désinfection nasale parfaite.

Posologie. — En pulvérisations, cinq fois au moins par jour, avec tout pulvérisateur ou vaporisateur ordinaire.

En gouttes, le contenu d'un demi-compte-gouttes dans chaque narine, 5 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès — SURESNES (Seine).
(Tél. : Longchamp 17-37.)

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Hémostatique « per os » et injectable.

Admis dans les hôpitaux de Paris. Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique non anaphylactisante de *Pectine* associée à son coferment minéral (calcium).

La *Pectine*, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, *C. R. Ac. Méd.*, 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix ... 22 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — : .. 13 50

Indications. — Toutes hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc., et à *titre préventif* : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Posologie. — *Chirurgie* : 1 à 4 ampoules, dans un peu d'eau sucrée ou aromatisée, durant les 10 heures qui précèdent l'opération, et, après l'opération, 1 à 3 ampoules en 2 heures.

Médecine : dans les hémorragies faibles, 1 à 4 ampoules en 24 heures à 2 heures d'intervalle ; dans les hémorragies prononcées, 1, 2 ou 3 ampoules à 20 minutes d'intervalle et une 4^e ampoule 1 heure après l'ingestion de la précédente.

Dans les cas d'urgence : en injections intramusculaires ou intraveineuses, à raison de 5 cc. S'emploie aussi par voie rectale.

Petite chirurgie, stomatologie : en application locale.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

38, bould du Montparnasse — PARIS (XV^e).

Tél. : Littré 98-89.

ARHÉOL

$C^{16} H^{24} O$

Principe actif de l'essence de Santal.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur, n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Forme. — 40 capsules à 0 gr. 18 (10 à 12 par jour en trois fois).

Le flacon : 18 francs.

Deuxième présentation : Flacon de 40 capsules de 0 gr. 50 pour la cure à haute dose réalisant le traitement radical et spécifique de la blennorrhagie, 12 capsules par jour en trois fois et trois heures avant ou après les repas.

Le flacon : 38 francs.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

ARRHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Prix : 17 francs.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal, Antiseptique, Décongest., cicatrisant. Résolutif. Non caustique.

Ovules à 1 % (Pansem. vag.).

Poudre à 1 % Alcaline (Inject. gynécologie, toilette muqueuse, yeux, O. R. L.).

Pommades :

Aristargol à 10 % : Dermatologie-Gynécologie.

Aristargol Stovaïne : Antihémorroïdale (1 % de stovaïne).

Prix de vente au public : 15 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, r. de la Fraternité — SAINT-MANDÉ
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

ARISTOPLASTIC

Aristoplast élastique.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 540-15.

Composition. — Pansement instantané, antiseptique, élastique. Agents antiseptiques : Biiodure de mercure, Sulfonaphthalène Azonaphthol disulfonate de Sodium.

Avantages. — Facilite la formation du tissu cicatriciel. En effet, grâce à un procédé, couvert par des brevets que la Maison Vigier a pris en France et à l'étranger, ce pansement instantané combine l'indépendance absolue de la compresse médicamenteuse recouvrant la plaie, au maximum d'élasticité du tissu élastique qui supporte la compresse. L'aération de la peau saine, au voisinage de la plaie, se fait librement. Antiseptique de puissance extrême, sans contre-indication.

Indications. — Pansements au voisinage des articulations.

Présentations :

Boîte métallique 6 pansements.

Boîte contenant des bandes de 0,25, 0,50 et 1 mètre ; largeur de 4 et 7 centimètres.

**Anciens Etablissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie**

9, r. de la Gare — LEVALLOIS-PERRET (Per. 57-41).

ARKHÉBIOS

Composition. — Soluté concentré, stabilisé, d'ACIDE PHOSPHORIQUE et de phosphates de : Calcium, Magnésium, Potassium et Sodium.

Cette préparation correspond au tiers de son poids d'Acide Phosphorique total, en un mélange équilibré de 1/5 à l'état libre et 4/5 sous forme de combinaisons monométalliques.

Ne contient ni Fer, ni Manganèse, qui sont de puissants antifixateurs du Calcium.

Indications. — Puissant régénérateur polyvalent des forces vitales, Reminéralisant, Recalcifiant, Toutes dépressions morales et physiques, Asthénies, Anémies nerveuse, somatique, musculaire. Surmenages, Nervosisme, Spasmes nerveux, Convalescence, Rachitisme, Etats préneoplasiques, Colibacilloses, Aérophagie.

Présentation. — Gouttes, en un flacon de 40 centicubes.

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* : XX à XXV gouttes dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas ; ou bien XL à L gouttes en une fois, le matin à jeun. Ces doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge, dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Flacon de 40 cc. Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél : Littré 98-89.)

ARMANITE

Manganite d'argent Ag_2O 2MnO_2 . — Bactéricide. Non toxique. Kératoplastique. Possède un pouvoir oxydant considérable, augmentant sa puissance bactéricide et la rendant durable.

Les taches dues au manganite d'Ag s'enlèvent facilement à l'eau et au savon.

Armanite, suspension aqueuse à 0,5 p. 100. — (Flacon de 100 cc.).

Uréthrites gonococciques aiguës et chroniques.

Injections uréthrales.

Armanite, suspension aqueuse à 1 p. 100. — (Flacon de 100 cc.).

Gynécologie. Chirurgie générale. Blennorragies.

Tamponnements. Injections uréthrales. Lavages uréthro-vésicaux (de 10 à 20 cc. par litre d'eau).

Armanite ovules suppositoires. — (Boîte de 10.)

Armanite pommade. — (En tube).

Ulcères variqueux, Plaies atones. Infections cutanées. Brûlures. Prurit périnéal.

Armanite poudre. — (Poudrier de 25 gr.).

Cicatrisant hémostatique indolore.

Laboratoires de l'ARMANITE

J.-O. PERROTIN, Pharmacien de 1^{re} classe

1 et 3, Villa Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 00-53.

ARQUERITOL LESURE

1° Huile injectable d'amalgame d'argent à 40 p. 100 de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, tolérance parfaite grâce à l'action de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique.

Flacon de 5 gr. pour une série de 6 à 8 piqûres : 25 francs.

Se fait aussi au titre de 16 p. 100.

2° Suppositoires d'Arquéritol.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS. Tél. : Littré 99-74.

ARRHÉNAL ADRIAN

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Présentation. — a. Gouttes.

b. Ampoules à 5, 10 et 20 centigr. c.) Granules à 1, 2 et 5 centigr.

d. Comprimés à 25 milligrammes.

Indications thérapeutiques. — Préparation permettant la thérapeutique arsenicale intensive par voie buccale. Tuberculose, asthme, bronchite chronique, Maladies consomptives, chlorose, scrofule, anémie, maladies de la peau, fièvres paludéennes.

Posologie. — Gouttes dosées à 2 milligr., 12 à 30 par jour. Ampoules, 1 à 2 par jour. Granules, 1 à 3 par jour. Comprimés, 1 à 3 par jour.
 Gouttes et ampoules..... 20 francs.
 Granulés et comprimés..... 16 —

ARISTÉNAL

Présentation. — Comprimés dragéifiés sans saveur ni odeur désagréables, dosés à 10 centigr. de carbonate neutre de quinine et à 1 centigr. d'arrhénal Adrian.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhume de cerveau, de la grippe et de l'asthme des foins. Antiseptique général interne, décongestif des voies respiratoires. Stimulant des défenses organiques.

Posologie. — Adultes : 6 dragées par jour.
 Enfants : 3 dragées par jour.

Le tube 14 francs.

Société française des produits pharmaceutiques

Anciennement ADRIAN & C^{ie}.

9 et 11, rue de la Perle. — PARIS (III^e).
 (Tél. Archives 97-80, 81, 82.)

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Composition. — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoïétique, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies, le surmenage des écoliers, et les convalescences.

Mode d'emploi. — De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

Prix : 15 francs la boîte de 60 pilules.
pour traitement minimum de 15 jours.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie

CHATEAUDUN (Eure-et-Loir).

(Tél. : 68.)

ARSAMINOL

Composition. — Solution stérilisée, à la concentration de 26, 13 p. 100 de « 3-acétylamino-4-oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol », titrée à 0 gr. 05 d'arsenic par centimètre cube.

Propriétés. — Produit arsenical pentavalent, injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire, à des doses réellement tréponémicides. Grâce à la technique de sa préparation, qui permet d'obtenir un corps à l'état de pureté parfaite, débarrassé de tous les isomères toxiques et grâce à la présence d'un groupement amino-alcool, qui favorise la très large tolérance de l'organisme pour le produit, l'Arsaminol n'a aucun des inconvénients des arsénobenzènes ou des autres arsenicaux pentavalents.

Injections indolores

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations ; spirochétoses, amibiases, trypanosomiasés, paludisme.

Posologie. — Consulter notices spéciales.

Formes. — Ampoules de 3 cc. (0 gr. 15 d'As.) et de 5 cc. (0 gr. 25 d'As.)

Pour les Enfants : Arsaminol infantile, solution dosée à 13,06 p. 100 en ampoules de 1 cc. 5 (1 cc. correspond à 0 gr. 025 d'arsenic).

Laboratoires CLIN-COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatique-artéritique.

L'Arséniodé donne toujours de l'appétit.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfants : deux gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : X à XX gouttes, 2 fois par jour.

Durée moyenne : enfants 15 à 20 jours.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23.)

ARSÉNOBENZÈNES CLIN

(Arsénicaux trivalents.)

NÉO-TRÉPARSÉNAN (Novarsenobenzol Codex)

Diamino-dihydroxy-arsénobenzène monométhylène sulfoxyaté de sodium.

Poudre d'un jaune citron parfaitement homogène, facilement soluble dans l'eau. Elle s'altère en présence de l'oxygène, soit à l'état sec, soit surtout en solution aqueuse.

Indications. — *Syphilis* : toutes ses formes cliniques, toutes ses périodes. Hérédosyphilis. Traitement d'attaque et de consolidation.

Spirochetose et infections parasitaires : Paludisme, amibiases, Pian. Recurrente. Angine de Vincent. Infection Puerpérale.

Posologie. — Injections intraveineuses.

Formes. — Boîtes d'une dose. Boîtes de 10 ampoules de même dose. Boîtes de 6 ampoules à doses progressives : 0 gr. 15, 0 gr. 30, 0 gr. 45, 0 gr. 60, 0 gr. 75, 0 gr. 90, 1 gr. 05.

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Diamino-dihydroxyarsénobenzène diméthylène sulfite de sodium. Mêmes caractéristiques et indications que le NÉO-TRÉPARSÉNAN.

Posologie — Injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses. Une à deux par semaine, à doses progressives.

Formes. — Boîtes d'une dose. Boîtes de 10 ampoules de même dose : 0 gr. 02, 0 gr. 04, 0 gr. 06, 0 gr. 12, 0 gr. 18, 0 gr. 24, 0 gr. 30, 0 gr. 36, 0 gr. 42, 0 gr. 48, 0 gr. 54, 0 gr. 60.

Laboratoire CLIN. — COMAR et Cie
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSÉNOMYL

Nouvel arsénobenzol.

Très puissant tréponémicide en solution aqueuse stable préparée d'avance ou en poudre.

Indolore en Injection Intramusculaire.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre de Malte, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du Sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intramusculaires de solutions d'ARSÉNOMYL aqueuses glucosées préparées d'avance et indolores. Poudre.

Posologie. — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 1 gr. 05, suivant les malades.

Chez l'enfant les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02, 0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20.

Prix :

Ampoule 0 gr. 30 : 8 fr. 80 ; 0 gr. 50 : 12 fr. 65 ; 0 gr. 70 : 14 fr. 30.
0 gr. 90 : 16 fr.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,
12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine). (Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

ARSÉDOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux.

Sérum glucosé avec addition de Gaïacol et de Chloroforme acétone pour injections hypodermiques et intramusculaires de Sulfarsénol.

— Indolores —

Présentation. — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Boîte de 1 ampoule : 1 fr. 50.

Boîte de 6 ampoules : 7 fr. 50.

Boîte de 12 ampoules : 14 francs.

Voir *Sulfarsénol*.

Mode d'emploi. — Utiliser :

1 ampoule jusqu'à 30 cg.

2 ampoules de 30 à 60 cg.

3 ampoules au delà de 60 cg.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

CH. DESGREZ, Docteur en Pharmacie

19-21, rue Van-Loo. — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ARSHÉMO-FER-B

Forme. — Cachets (boîte de 30 cachets). Traitement de 15 jours.

Propriétés thérapeutiques et indications. — Puissant régénérateur du sang, Traitement rationnel et complet des diverses anémies. Chloro-anémies, états cachectiques survenant après les fièvres intermittentes. Maladie de Basedow, faiblesse physique et intellectuelle, Grossesses.

Formule. — Chaque cachet contient :

Hémoglobine.....	0,05
Nux. vomica.....	0,02
Méthylarsinate de Sodium.....	0,02
Oxalate ferreux.....	0,15
Gluko-phosphate de Calcium.....	0,15
MgO lourde.....	0,15

Arshémo-Fer-B =

globules rouges + hémoglobine ++ coagulabilité +++

Posologie. — *Enfants* au-dessus de 12 ans : 1 cachet par jour avant les repas.

Adultes : 2 à 3 cachets par jour avant les repas.

H. BENOIT

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris.

POLIGNY (Jura).

(Tél. : 84.)

ARTÉRIOCRINOL

Chimiothérapie et opothérapie associées.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, Hypotenseur, Vaso-dilatateur et régulateur tensionnel, Antisclérosant.

Indications. — *A titre préventif* : tout sujet présentant, soit une tension ascendante, soit de la sclérose artérielle débutante, soit des spasmes viscéraux ou périphériques.

A titre curatif : chez tout malade présentant des manifestations rattachées aux trois mécanismes déjà cités ou à leur réunion. *A titre indicatif* : artérite des membres, Angine de poitrine, Manifestations nerveuses ou sensorielles, Phénomènes rénaux, digestifs, respiratoires, des hypertendus, etc.

Composition. — Trinitrine, caféine, silicate de soude, phényléthylmalonylurée, extraits de gui, hépatique et musculaire.

Forme. — Dragées à noyau mou.

Posologie. — 4 dragées par 24 heures espacées, en dehors des repas, à croquer.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEMASLES

VIENNE (Isère).

ARTÉRIOLEX EX MINÉRALOGÈNE

Spécifique de l'Artério-Sclérose.
Silicate de Soude titré soluble, assimilable.

Poudre : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Comprimés : 4 à 8.

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café.

Dissoudre avant d'absorber.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

ARTÉRIO-PHAN

Traitement anti-uréique et cholestérolitique
(préventif de l'artériosclérose et du cancer).

Formule :

Chlorophyllate de soude	0,002
Extrait de cynara	0,10
Chlorure de magnésium	0,10
Silicate de soude	0,10
Thyroïde.....	0,001
Hypophyse antérieure	0,001
Parathyroïde.....	0,0005

Indications :

- 1° *A titre préventif* : Cholestérinémie, hypertension légère ou intermittente, artériosclérose au début, ascendance cancéreuse, traitement préventif à la suite d'ablation chirurgicale des tumeurs.
- 2° *A titre curatif* : Artériosclérose confirmée, athérome, aortite, néphrite scléreuse, thrombose, hémiplegie, essoufflement et défaillance du cœur chez les scléreux.

Laboratoires A. MOURÉ

5 bis, boulevard des Italiens (Passage des Princes) —
PARIS (II^e). (Tél. : Rich. 82-56).

ARTÉRIO-VEININE

Composition. — *Cratægus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamélis* (Extraits stabilisés), *iode peptonisé*.

Indications. — Troubles de la ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes (Conservation indéfinie).

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen

PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 22-32.)

ARTHRILYSE

Granulé effervescent.

Composition. — Acide pénylesinchnoninique, Pipérazine, Urotropine, Salicylate de lithine, Phosphate de soude, Citrate de soude, Boldine.

Propriétés. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'acide urique. Cholagogue. Eupeptique. Antivisqueux. Décongestif.

Indications. — Arthritisme. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte aiguë et chronique. Gravelle et Lithiase rénale. Coliques néphrétiques. Artériosclérose. Troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires. Auto-intoxication. Dyspepsies. Hyperviscosité sanguine.

Posologie. — Traitement d'attaque : de 3 à 5 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau. Traitement d'entretien : de 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

ARTICHOLINE

Drainage biliaire.

Composition. — Sels de magnésium et extrait total d'artichaut en granulé.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café dans 3/4 de verre d'eau chaude le matin à jeun.

15 jours par mois.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ARTOBYL

Forme. — Dragées.

Composition :

Extrait spécial de feuilles

d'artichaut..... 0,20

Boldine 0,001

Cascara pulvérisé..... 0,05

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire, Constipation chronique.

Doses. — 1 à 2 dragées à chacun des 2 repas.

Laboratoire DAGONNOT

11 bis, place de l'Hôtel-de-Ville —
CANNES (Alpes-Maritimes).

ARTREX-CROZ

Indications. — Traitement rationnel du rhumatisme sous toutes ses formes et des algies.

Composition. — Pyramidon, acide phényl-cinchonique, carbonate de lithine, soufre lavé, aspirine, lactose.

Doses. — 3 à 6 cachets par jour.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ARTROCOLCHINE « C »

Goutte, Rhumatisme, Arthritisme.

Composition :

Acide Acétyltriméthylcolchicinique.	0,0027
Résine de Gaïac	0,33
Hexaméthylènetétramine.....	0,65
Iodure de Potassium.	2
Excipient	Q. S. pour 100 grammes.

Propriétés. — Analgésique par la ColchiCÉine; Antiseptique urinaire par l'Hexaméthylènetétramine, diurétique et diaphorétique par la Résine de Gaïac; Modificateur de la nutrition par l'Iodure de Potassium.

Indications. — Spécifique de la goutte aiguë ou chronique, du rhumatisme, de la sciatique, des névralgies, des névrites et des myalgies d'origine goutteuse et rhumatismale.

Avantages. — L'ensemble de l'association à base de ColchiCÉine donne une action synergique très nette sans toxicité appréciable et sans les dangers de la Colchicine. Il n'y a donc à craindre, en principe ni diarrhées, ni vomissements.

Posologie. Forme et Mode d'emploi :

Sirop à prendre *loin des repas* à la dose de une cuillerée à bouche une ou deux fois par jour dans un demi-verre d'eau.

Se conformer aux indications du médecin.

Prix : 24 francs, le flacon.

Produits PHARMA-SCIENTIA

26, rue Gay-Lussac, Paris (V^e). (Tél. : Odéon 32-24.)

Concess^{re}, Louis BRUN, pharmacien, 26, rue Vauquelin, PARIS.

ARVENSYL

Formule :

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCC).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

Indications. — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

Prix : 17 fr. 75

Laboratoires GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

ASCÉINE

Analgésique, sédatif, antirhumatismal.

(Acide acétyl-salicylique Para-acétyl-phénétidine
Caféine.)

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur et des clochers thermiques.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc..., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour ;

Enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Tube de 20 comprimés.

Laboratoires O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ASCIATINE

Diméthylamino-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchloral.

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

Action élective dans le domaine du trijumeau.

Indications. — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

Présentation et posologie. — Comprimés à 0 g. 25, 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

Prix de vente : { La boîte de 12 comprimés : 5 fr. 50
— 24 — 10 francs

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipoïde hépatique phosphoré et iodé. Elle renferme les vitamines A et C, la vitamine D à l'état naturel, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

Indications. — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, prétuberculose.

Trois formes. — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Prix : 18 francs.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Prix : 18 francs.

Toutes pharmacies, ou à défaut chez :

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : + Alésia 22-46.)

ASÉBORHAL-NADOR

Séborrhée. Pelade. Remède Anticalvitie.

Indications. — Assure l'élimination du flux séborrhéique.

Permet d'enrayer dès la première application la chute des cheveux. Réussit dans les cas où tout autre moyen a échoué.

Une repousse accélérée de cheveux sains est visible à partir de la cinquième semaine du traitement ASÉBORHAL-NADOR. La croissance et le développement des nouveaux cheveux s'opèrent normalement, et la calvitie est en bonne voie de guérison.

Une chute de cheveux n'est plus à craindre.

Forme. — Liquide, odeur agréable.

Doses. — *Légère séborrhée*: enfants, cas de jeunes gens, âge de puberté: chaque semaine, une application ex-séborrhéique (aucune chute n'est à craindre).

Séborrhée, pellicules, calvitie naissante: chaque semaine au moins deux applications.

Cas séborrhéiques calvitie avancée: trois-cinq applications par semaine.

En outre, pour une calvitie de longue date, appliquer l'ASÉBORHAL-NADOR tous les soirs directement sur les racines.

Pelade, dartres farineuses: pendant deux mois, chaque semaine, trois applications.

L'ASÉBORHAL-NADOR agit par absorption, il faut en donner régulièrement et abondamment pour lui permettre son action curative.

Très jeunes enfants et bébés: 15-20 grammes dilués d'un tiers d'eau; une à deux applications par semaine. A employer pur en cas de croûtes ou autres affections.

Composition de l'Aséborhal-Nad. — Extrait de plantes stimulantes sans matières grasses, rigoureusement exempt d'alcaloïdes et de matières minérales toxiques, certifié par le Laboratoire Municipal de Paris.

Composition du Nador. — Extraits fluides de *Sapindus Saponaria*: 21,00. *Areca Catechu*: 20,00. *Symphytum Officinale*: 17,00. *Quillaja Saponaria*: 26,00. *Betula Alba*: 16,00. *Acidum Salicylicum*: 0,10.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 1668-1.

Effets et durée du traitement — Les cheveux vont se renouvelant sans cesse de la profondeur vers la surface du cuir chevelu. La durée d'un cheveu sain est d'environ quatre ans.

Chez les sujets séborrhéiques, l'insuffisance de ces fonctions amène la calvitie. Le cuir chevelu se transforme en partie ou totalement en une substance insoluble et difficilement perméable, la « kératine », qui en même temps s'imprègne de graisse (le sébum).

L'ASÉBORHAL-NADOR a les rôles de dépurateur, de formateur de cellules, d'alimenteur des artérioles nourricières. En conséquence, il y a lieu d'en faire dès les premiers symptômes de l'affection séborrhéique et d'en continuer l'emploi pour la prophylaxie et dans la thérapeutique de la séborrhée et de la calvitie; son emploi constant permet au follicule pileux un fonctionnement sain et normal.

Présentation. — Le flacon de 38 fr. et le litre à 66 fr.

Préparateur: **M. BOUTARIC, Docteur en Pharmacie.**

LES LABORATOIRES NADOR

25, rue de Tocqueville — PARIS (XVII^e).

Tél.: Wagr. 39-74.

ASÉPHÉINE

Dragées répondant à la formule suivante :

Chlorhydrate d'éphédrine.....	0,01
Bromhydrate de papavérine.....	0,03
Iodure de codéine	0,02
Iodure de caféine	0,10
Extrait mou de lobélie	0,005

Par dragée.

Propriétés. — Médicament symptomatique de toutes les variétés d'asthme et de dyspnée asthmatiformes. Action régulière et efficace, tolérance gastrique parfaite. Aucune accoutumance et ne provoque jamais de troubles nerveux.

Indications. — *Asthme* : Atténue les crises, espace les accès, diminue la violence des crises ultérieures et supprime certains symptômes spasmodiques. — Médicament d'entretien électif entre les crises d'asthme. En cas de crises très aiguës, s'il convient d'adjoindre les médications héroïques habituellement employées. L'Aséphéine constitue cependant un traitement très précieux. — *Manifestations respiratoires ou rhinopharyngées de l'asthme, rhume des foins, trachéo-bronchites spasmodiques.* — Prise au début et durant toute la saison critique, l'Aséphéine supprime et atténue les crises. — Par son action calmante et tonocardiaque légère, elle est indiquée, également, dans les dyspnées asthmatiformes des asthmes vieilliss des hypertendus, des bruthiques.

Forme. — Tubes de 20 Dragées.

Laboratoires CLIN. — COMAR et C^{ie}.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, fleurs blanches, ulcérations du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir. *Comprimés* : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire: Une Aseptone, poudre ou comprimés.

Prix au public : 12 francs.

Revient à 0 fr. 35 par injection.

Littérature et échantillons.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 00-51.)

Remboursé par les A. S.

ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

Indications. — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour, Prix : 14 fr. (pour 20 jours de traitement.)

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

ASTASOL DOUETTEAU

Composition. — Poudres de plantes sélectionnées d'HYDRASTIS et d'HAMAMELIS rendues d'assimilation facile.

Formule rationnelle permettant l'emploi de ces deux plantes *sans incompatibilités chimiques*. Action thérapeutique *plus puissante que celles des extraits et teintures*.

Forme. — Cachets de petit diamètre.

Indications. — Troubles du système veineux, Stases veineuses, Varices, Congestions, Phlébites, Hémorroïdes.

Doses. — 3 cachets par jour avant les repas. Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 233-2.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg Saint-Honoré. — PARIS (VIII^e).

ASTHMASÉDINE

Respiratoire, Décongestif, Cardio-tonique, Diurétique.

Composition. — Pour 1 cuillerée à café :

Chl. d'Ephédrine	0,015	Iodure de potassium.....	0,20
Phényléthylmalonylurée..	0,015	Teinture de belladone	0,25
Caféine	0,10	Teinture de lobélie	0,50
Benzoate de soude	0,10	Excipient spécial	Q. S.

Traitement de la Crise d'Asthme et du Terrain Asthmatique. **Asthme.**
Emphysème. Dyspnées. Troubles Cardio-Vasculaires.

Doses moyennes : Pour éviter les crises d'asthme : Prendre entre les accès une cuillerée à café au début des 2 repas, pendant 2 jours. Puis 2 matin et soir au début des repas pendant 10 jours. Cesser 4 ou 5 jours et refaire une cure semblable.

Pendant les crises : 2 cuillerées à café au début des 3 repas, soit 6 par jour dans un peu d'eau sucrée.

En cas de crise subite et seulement en dehors des périodes de traitement 1 cuillerée à café toutes les heures pendant 4 heures.

Demi-dose pour les *Enfants* à partir de 10 ans.

Prix : 18 fr.

Laboratoires HENRI SCHÉHADÉ

Pharmacien de la Faculté de Paris.

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 53-05.)

ASTHMATYL

Indiqué dans le traitement de l'asthme, emphysème, toux quinteuses.

Deux Formes :

1^o *Asthmatyl* (gouttes).

Chlorhydrate d'éphédrine, iodure de sodium, triméthylxanthine, lobélia, datura, serpolet, benzoate de soude, euphorbia helioscopia.

Posologie :

De 1 an à 2 ans	10 à 15 gouttes.
De 2 ans à 5 ans	15 à 20 —
De 5 ans à 10 ans	20 à 25 —
De 10 ans à 15 ans	30 à 40 —
Adultes	40 à 50 —

Prendre deux doses semblables dans les 24 heures dans eau sucrée ou tisane.

Prix : 16 francs le flacon de 30 cc.

2^o *Asthmatyl* (comprimés).

Chlorhydrate d'éphédrine, datura stramonium, euphorbia helioscopia.

Posologie. — Pour les *adultes* seulement, 2 à 6 comprimés par 24 heures
 Prix : 16 fr. 50 le tube de 30 comprimés.

L'*Asthmatyl* (comprimés, gouttes) est inscrit au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 1244-5 et 1244-6.

Laboratoire R. et M. GUIGNARD

Docteurs en Pharmacie et en Médecine.

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Central 01-35).

ASTHMÉDRINE

Composition :

Iod. de caféine stabilisé	0,40
Chl. Morphine	0,0015
Chl. d'Ephédrine	0,02
Teint. Datura.....	0,15
Teint. Belladone	0,25
Teint. Euphorbia pilulitera.....	0,10
par cuillerée à dessert.	

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Oppressions, Toux rebelles, Intoxications par les gaz, et toutes dyspnées.

Posologie. — Pas de contre-indication. Une cuillerée à dessert au lever; une au coucher.

Emploi. — Diluer dans un peu d'eau. Prendre ensuite lait ou tisane. Pour les enfants (10 ans) et les vieillards : cuillerées à café. Le flacon, vendu 20 francs, dure 10 jours.

N. B. — *Asthmédrine* comporte la prescription et la surveillance médicales que notre littérature préconise. Echantillon sur demande.

Laboratoires ÉTIENNE
19, avenue Secrétan — PARIS.
(Tél. : Nord 89-34.)

ASTHMO-ACTINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.
Le plus fort **Elixir antiasthmatique** connu.

Composition. — **Synergie totale :** Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindelia 0,10, et...

... **Nouveauté.** — Ext. Actæa 0,05. Ext. nat. surrénale au 1/1000 0 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

Indications. — Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...

Action rapide curative et préventive.

Posologie. — **Adultes :** 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait. **Enfants :** à partir de 6 ans, 1 à 3 cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 15 jours.

Laboratoires G. BERTHON, Pharmacien O
DORNES (Nièvre).

ASTHMOSINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-cardiaque, Diurétique.

Composition. — Heureuse association de substances non toxiques, à action synergique, absolument inoffensives.

Un cachet contient :

Acide valérianique	0,007	Caféine	0,043
Théobromine (essai physiologique)	0,36	Acide acétylsalicylique ...	0,24
		Valériane pulvérisée	0,10

(Procédé spécial de préparation).

Indications. — Médication héroïque contre l'Asthme dit essentiel ou asthme nerveux. Soulage immédiatement les crises aiguës. Efficace aussi dans les cas d'emphysème aigu ou chronique dans les bronchites, dans la dyspnée brightique ou cardiaque. Bons résultats chez les gazés.

Action rapide, curative et préventive.

Posologie. — *Crise aiguë.* Dès le début de la crise un cachet dans une infusion de tilleul, camomille ou feuilles d'oranger. Si nécessaire un deuxième cachet deux heures après et au besoin, exceptionnellement, un troisième 4 heures après le second.

Etat chronique. — Un cachet le soir dans une infusion.

Pour les enfants, leur donner, une seule fois par 24 heures, un des cachets spécialement préparés à leur usage. S'il n'est pas possible de le leur faire absorber, il conviendrait de mettre le contenu dans de la confiture ou de la crème et de faire suivre d'une boisson chaude.

La boîte de 12 cachets. *Adultes:* 10 fr. 60. *Enfants:* 6 fr. 40.

Laboratoires L. TATTEVIN, Docteur en Pharmacie,
3, rue Emile-Burgault — VANNES.

ATENS

Hypotenseur.

Composition. — Pour une pilule :

Tétranitrate d'Erythrol	0,003
Diméthylxanthine (Théobromine)	0,128
Phosphate de Calcium	0,022
Extrait de Viscum Album	0,060
Phényléthylmalonylurée	0,010
Extrait de Belladone	0,0025

Propriétés. — Régulateur du travail du cœur. Hypotenseur. Vaso-dilatateur, diurétique.

Indications. — Association médicamenteuse à doses faibles, qui constitue un traitement complet, actif et sans danger, de l'Hypertension et de ses dérivés.

Forme et mode d'emploi. — Pilules rouges à prendre accompagnées d'un verre d'eau au milieu des repas.

Posologie. — 2 à 3 pilules par jour.

Se conformer toujours aux indications du médecin.

Prix de la boîte de 25 pilules : 16 francs.

N. B. — Le traitement par l'ATENS peut être heureusement complété par l'emploi du NESAL, sédatif nervin par excellence.

Produits PHARMA-SCIENTIA

26, rue Gay-Lussac, Paris (V°). (Tél.: Odéon 32-24).

Concessionnaire L. BRUN, Pharmacien, 26, rue Vauquelin PARIS

ATOCRAZINE

Association médicamenteuse parfaitement tolérée à base de **Crésophanyl**, de **Pipérazine**, d'Acide quinique.

Traitement prolongé de la **Diathèse arthritique**. 2 cachets par jour en traitement intermittent, 10 à 20 jours par mois.

La boîte de cachets de 0 gr. 50 : 24 fr.

Produits STENE

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

ATOMINE

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

Indications. — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciatiques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

Doses. — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre.

Cas chroniques ou atténués : 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 15 francs.

Absorber avec tisane sucrée.

Laboratoires L. Boize et G. Allioz,
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.
(Tél. : Parmentier 31-29.)

ATOQUINOL

CIBA

Spécifique antigoutteux
Phénylcinchoninate d'allyle

Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général : Goutte, Rhumatisme goutteux, Dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — États aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

États chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de granulé.

(Voir *Sanoquinol*.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

ATOSPIRINE

Association d'Acide acétylsalicylique, d'acide phénylcinchoninique, de caféine, et constituant le type parfait de la *Synergie médicamenteuse renforcatrice*.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1134-5.

Indications. — Diathèse arthritique, Goutte, toutes Algies, États grippaux et leurs complications.

Présentation. — Boîte de 20 cachets de 0,50 centigrammes.

Posologie. — 2 à 6 cachets par jour.

Prix : 14 francs, remboursé aux Assurances sociales.

Laboratoire A. LUCIEN

19, rue du Bac — PARIS (VII^e).
(Tél. : Littré 55-03.)

ATURAL

Supprime l'intolérance pour le lait.

Travaux du Professeur Louis Gaucher

Composition. — Poudre à base de sérum antilab-ferment et de citrate de soude.

Action. — Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum du cheval.

Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale. Facilite aussi la digestion des aliments en permettant les contractions et l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte avec ses conséquences : Diarrhée verte, vomissements, gastro-entérite des nourrissons. Troubles digestifs chez l'adulte après les repas.

Mode d'emploi : Une mesure pour 100 gr. de lait
Dans l'alimentation ordinaire 2 mesures dans un peu d'eau après le repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique
10, rue de Strasbourg, Paris (X^e). Tél. : Nord 46-14.

AUBELIODE

Gouttes.

Combinaison stabilisée et équilibrée de :

Peptone iodée..... 50

Hamamélis (Extrait fluide)..... 25

Aubépine (Extrait fluide)..... 12

Intrait de Passiflore, etc. Q. S. P. 100 gr.

En un flacon normal de 45 cc. = 1 500 gouttes.

Prix : 18 francs. (pour 15 jours de traitement)

Il existe un double flacon de 90 cc. = 3 000 gouttes.

Prix : 30 francs (économie : 6 francs).

Posologie :

100 gouttes
d'AUBELIODE = $\left\{ \begin{array}{l} 50 \text{ gouttes Peptone iodée.} \\ 25 \text{ gouttes Hamamélis.} \\ 12 \text{ gouttes Aubépine.} \end{array} \right.$

Doses :

100 à 160 gouttes par jour.

en deux fois aux repas

Action :

Active circulation et diminue viscosité et tension.

Accélère nutrition, échanges, hématose.

Équilibre système nerveux et vago-sympathique.

Composants et Propriétés :

Iode (Peptone) : Fluidifiant, Vaso-dilatateur,
Hypotenseur, Oxydant, Antiseptique, Stimulant.

Hamamélis : Décongestionnant, Hémostatique,
Tonique et Trophique veineux.

Aubépine, Passiflore : Sédatifs, Antispasmodiques,
Cardiotoniques et Hypotenseurs.

Indications :

Vaisseaux : Ménopause, dysménorrhée, artério-
sclérose, hypertension, phlébites, varices, hémor-
roïdes, pléthore, cyanose, asthme, emphysème,
bronchites.

Nutrition : Arthritisme, goutte, rhumatisme chro-
nique, lymphatisme, obésité.

Système nerveux : Éréthisme cardiaque, anxiété,
insomnies.

Littérature et échantillons à la disposition de
MM. les Docteurs.

Laboratoires OPOS

60. rue Nationale, 1 et 3 rue Soumet,
CASTELNAUDARY (Aude). (Tél. : 3-10.)

AUDIGÉNINE

Forme. — Comprimés.

Composition. — Di-iodo-antipyrine (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

Indications. — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdit . Vertiges. Bourdonnements.

Mode d'emploi. — 2 comprim s au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit  tre interrompu 10 jours chaque mois).

Litt rature et  chantillons :

Laboratoires E. VAILLANT et Cie
19, rue Jacob — PARIS (VI ).

AURIXEMA

Pommade anti-ecz mateuse semi-fluide.

Composition :

Para aminobenzoate de butyle normal (Paraforme).....	0 gr. 25
Hu�le essentielle de Melaleuca viridiflora rectifi�e.....	1 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Protochlorure de Mercure.....	3 gr.
Sulfate de zinc	1 gr.
Oxyde de zinc.....	10 gr.
M�tadioxyph�nol	1 gr.
Camphre.....	1 gr.

Pour 100 grammes.

Propri t s. — Analg sique, antiseptique, k ratoplastique.

Indications. — Traitement des ecz mas et imp tigos de l'oreille, des narines et en g n ral de toutes l sions ecz mateuses ou imp tigineuses.

Pr sentation. — Tube avec long embout sp cial.

Prix : 12 francs.

Peut  tre prescrit aux Assurances sociales.

Enregistr  au Laboratoire National de Contr le des M dicaments sous le n  888-11.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue M lingue — PARIS (XIX ).

AXYOL

du Docteur P. Bourggraff.

Composition. — Iodo-amido-féculose dépourvu de toute trace d'iode libre.

Propriétés. — Grâce à ses propriétés biologiques, l'Axyol active l'apparition des bourgeons charnus et aseptise les plaies.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères de jambes, plaies infectées, fistules.

Mode d'emploi. — Se rapporter aux différents opuscules publiés par le Laboratoire du Praticien.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien

HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.).

AZAMA

(Gouttes)

Présentation. — En flacon compte-gouttes.

Principes actifs. — Teinture de Lobélie, Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Hoquet, Mal de mer.

Mode d'emploi. — XX gouttes de la solution dans un peu d'eau sucrée, quatre fois par jour et au moment des accès.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AZIGOL THÉVENOT

Crises convulsives. États nerveux.

Composition. — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsénium et de Piscidia.

Forme. — Dragées.

Indications. — Toutes crises nerveuses, Épilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité, Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Phényléthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

Dose. — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

Enfants : 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 20 francs.

Laboratoires THÉVENOT — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Extraits spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, irradiés aux rayons ultra-violet.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — États de dénutrition et de carence. Anémies.

Doses et mode d'emploi :

A. *Ampoules.* — Injections sous-cutanées et mieux intramusculaires (tous les jours ou tous les 2 jours).

B. *Pilules glutinisées.* — 6 par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

Tél. : Aut. 81 45 (deux lignes groupées).

AZUFROL

Soufre colloïdal.

Description. — 1° *Capsules* glutinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre colloïdal par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de Sulfurion (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Prix : 25 francs pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

Présentation. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

Posologie. — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

Indications. — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 14 francs.

La boîte contient 30 cuillerées à café environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

Laboratoire PARET

28 (ex 22), rue Guibal — MARSEILLE.

BABEURRE DARDELET

pour Nourrissons ou Adultes.

Le Babeurre Dardelet. — Médicament héroïque de la diarrhée verte et entérite. D'un goût agréable, il est non seulement employé pour les Nourrissons, mais aussi pour les Adultes.

La Soupe de Babeurre est du Babeurre additionné de 2 p. 100 d'Arrow-Root.

Ce qui fait la supériorité de ces deux produits est leur homogénéité absolue. Ni dépôts, ni grumeaux. On peut les donner à la tétine.

Conservation sous le vide.

Se fait en 1/4 de litre. Prix : 3 francs départ usine.

Notre emplacement au centre de la France sur une grande ligne nous permet de livrer instantanément toute commande en Province.

(Voir rubrique *Laits DARDELET.*)

Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET

Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne).

(Tél. : 4.)

La Maison est à la disposition des Docteurs, désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

BABEURRE GUIGOZ

(Soupe de Babeurre en poudre.)

Grandes facilités de préparation *par simple adjonction d'eau froide.*

Stabilité et homogénéité parfaites (pas de grumeaux).

Conservation facile.

Substantielle, quoique extrêmement digestible en raison de l'adjonction de dextrines ; peut être administrée même à des prématurés et constituer le régime exclusif du nourrisson pendant un temps prolongé.

Peu acide. Facilement acceptée.

Grande valeur thérapeutique en raison de son acidité naissante et non seulement préexistante comme dans les babeurren liquides.

Indications. — Gastro-entérites, diarrhées infantiles, eczémas. Réalimentation.

Dose. — De 60 à 200 gr. de poudre par jour pour 400 à 1 300 gr. d'eau suivant l'âge du nourrisson, soit environ 1 cuillerée à soupe pour 45 à 50 grammes d'eau.

Voir : { Lait en poudre GUIGOZ.
Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.
Lait Déchloruré GUIGOZ.
RAVIX (Lait GUIGOZ irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

BABEURRE NESTLÉ en poudre ÉLÉDON

ne contenant ni sucre ni farine.

Babeurre 1/2 gras, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs, et à l'alimentation mixte.

Composition :

Matière grasse.....	14,0	p. 100
Matières protéiques	29,5	—
Lactose	40,0	—
Cendres	6,5	—
Acide lactique.....	6,0	—
Eau	4,0	—

420 calories par 100 gr.

Pureté absolue, composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.

Indications. — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson. Alimentation des intolérants au lait, des prématurés et des enfants menacés par les troubles digestifs (colonies).

Posologie. — (Voir dépliant joint à la boîte.)

Prix. La boîte de 250 gr. : 12 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

BABEURRE NUTRICIA

Composition. — Lait écréméensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

Présentation. — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré, babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

Le Babeurre Nutricia est également présenté en poudre, soluble, pur, permettant par simple addition d'eau la reconstitution du babeurre naturel pur.

Indications thérapeutiques. — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment. Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

Mode d'emploi. — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

Léon CLAEYS

1, boulevard Saint-Martin — PARIS (III^e).

Tél. : Turbigo 92-60.

BABEURRES CARRION-LAGNEL

Pour l'alimentation des nourrissons et des adultes (Prématurés, sujets débiles, entéritiques, hépatiques, etc.).

Présentation et prix.

1^o Babeurre *acide*.

2^o Babeurre *doux*.

Le flacon de 250 cc. : 3 francs.

3^o *Bouillies* au babeurre, maltées et autres sur demande.

Le flacon de 250 cc. : 5 francs.

(Livraisons quotidiennes à domicile, dans Paris.)

Laboratoires CARRION-LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS
(XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

BABEURRES « LA FAYE »

Pour enfants et adultes.

Préparés avec du lait frais à la ferme de « La Faye », à Marlhès (Loire).

Les Babeurres La Faye sont le résultat d'une fermentation lactique spéciale sur du lait très frais privé de sa matière grasse et non un résidu de la fabrication de beurre, d'où leur goût agréable.

Ils sont *liquides* afin de conserver toutes leurs propriétés (lactosérum, caséine modifiée). D'une conservation parfaite, d'une digestibilité incomparable, ils sont constants, sûrs et efficaces et ne demandent aucune manipulation. Ils sont présentés sous trois formes :

Babeurre léger (étiquette bleue) pur, sans farine, 498 calories au litre, acidité 3 grammes, 35 grs. de sucre au litre. Indiqué pour les prématurés, débiles, vomisseurs et pour les hépatiques.

Babeurre (Soupe) (étiquette blanche). Mélange de farines 3 %: 764 calories, acidité 7 grammes, 75 grs. de sucre au litre. Aussi nourrissant que le lait. *Le plus employé* à cause de son pouvoir calorique et thérapeutique et de sa grande facilité d'assimilation. Indiqué dans tous les troubles digestifs même légers, intoxications, dermatoses, intolérance lactée, et aussi comme complément du sein et pour éviter les troubles du sevrage.

Babeurre gras (étiquette rouge). Même composition que le Babeurre (soupe) ordinaire avec 35 grammes de matières grasses, 1 072 calories, 75 gr. de sucre au litre. Suralimentation des convalescents (particulièrement après-typhoïde, colibacillose), prétuberculeux, enfants aux intestins délicats, anorexiques. Bien supérieur au yoghourt.

Posologie. — Ces trois babeurres, présentés en boîtes de 430 grammes, et 200 grammes s'emploient *de la même façon que le lait naturel* en tenant compte de leurs indications particulières. En cas de troubles graves, multiplier au début le nombre des repas en diminuant les doses.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Fournisseurs des Hôpitaux et des Municipalités de Lyon et de Saint-Étienne depuis 25 ans.

Échantillons et documentation sur demande adressée :

Ferme de LA FAYE

MARLHES (Loire).

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie. Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation.

Formes. — Ampoules injectables de 1 cc., ampoules. Buvables de 5 cc., cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours ou prescrire une à deux ampoules Buvables tous les deux jours. On prescrira en même temps, l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 25 francs.

La boîte de cachets ou de dragées : 16 francs.

La boîte de 12 ampoules Buvables : 20 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e). (Tél.: Archives 41-65.)

BACTÉ-RICYL

Antiseptique physique
agissant par sa Tensio-Négativité.

Puissant bactéricide. Non toxique. Non irritant.
(Odeur et goût agréables. — Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution stable, concentrée de ricinoléate de triéthanolamine à 30 p. 100.

Indications. — Désinfection de la cavité bucco-pharyngienne. Angines, Amygdalites, Stomatites, Gingivites. Prévention des maladies infectieuses à point de départ pharyngé : Gripes, Fièvres éruptives, Maladies épidémiques. Soins gynécologiques et obstétricaux : Leucorrhées, Vaginites (blennorragiques ou autres). Ulcérations de toute nature, etc.

Mode d'emploi.

Gargarismes, lavages buccaux, pulvérisations :

1 mesure de la pipette jaugée pour un grand verre d'eau.

Lavages gynécologiques et chirurgicaux :

1 à 3 mesures de la pipette jaugée pour 1 litre d'eau.

Prix : 10 francs.

Laboratoires A. WELCKER et C^{ie}

72, rue du Commerce — PARIS (XV^e).

(Tél.: Vaugirard 42-40.)

BACTURYL**Comprimés.****Formule:**

Hexaméthylène-tétramine.	0,15
Acide Benzoïque	0,15
Salol.	0,20
Bleu Méthylène	0,015
Pour 1 comprimé dragéifié.	
50 comprimés. Prix : 18 francs.	

Indications:

Pyuries, Bactériuries, Colibacilloses, Pyé-
lites et Pyélo-néphrites, Cystites, Prosta-
tites, Urétrites.

Dose moyenne:

2 comprimés avant chacun des 3 repas.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE**J. DEDIEU, Pharmacien.**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.
(Tél. : 820-04.)

BAIN BAGNOR RADIOACTIF

Le seul approuvé et autorisé par l'établissement ther-
mal de

Bagnoles-de-l'Orne.

Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de
Bagnoles-de-l'Orne, suractivé par le bromure de ra-
dium. Prépare et prolonge la cure de Bagnoles-de-
l'Orne.

Indications thérapeutiques. — Troubles circulatoires
de toutes natures. Phlébites, varices, stase veineuse.
Rhumatismes chroniques, névralgies et toutes affec-
tions douloureuses.

Forme. — En paquet pour bain de 200 litres. Faire
dissoudre au moment de l'emploi.

Posologie. — Cure intensive : 3 bains par semaine pen-
dant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine. Repos couché
après le bain.

Prix du bain : 10 francs.

Les 10 bains : 95 francs.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA**D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.**

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme. — Poudres dont les dissolutions successives dans l'eau du bain sursaturent cette eau d'acide carbonique.

Indications. — Maladies des organes circulatoires (Cœur, Hypertension, Artério-sclérose), Maladies dites d'échanges internes (Goutte, Rhumatismes), du Système nerveux (Névralgie, Neurasthénie, Surmenage cérébral, etc.).

Mode d'emploi. — Verser successivement les sachets 1 et 2 dans le bain en brassant l'eau. Se plonger dans l'eau en laissant agir le dégagement gazeux. La température sera de 30 à 35 degrés, sauf indications spéciales du médecin. Durée du bain : 15 à 20 minutes.

Prix : 10 francs.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

(Tél. : Lamartine 92-52.)

BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatismes, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

Prix : 6 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Élysées 17-46.)

BAIN DE BOUCHE A LA DUNA-CAINE A. D.

Bain de bouche anesthésique, ne s'emploie jamais pur, mais dilué.

Indications. — *Stomatologie*: douleurs post-opératoires, stomatites, ulcérations gingivales, prises d'empreintes, pointes de feu, galvano-cautérisations.

O.-R.-L.: Angines, processus phlegmasiques, abcès de l'amygdale, ulcérations diverses, dysphagie d'origine cancéreuse ou tuberculeuse.

Mode d'emploi. — En gargarismes, en bain de bouche, en tamponnement local.

Le flacon est à diluer dans un quart, un demi ou un litre d'eau bouillie suivant la concentration voulue. (Voir Notice détaillée.)

Présentation. — Flacon de 40 cc. avec mesure graduée permettant la préparation d'une petite quantité de solution au moment du besoin.

Prix : 16 francs.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e)

BAIN DE BOUCHE ESTÈVE

Chloral hydraté..... 2 gr.

Acide thymique : à saturation

Glycérine 30 gr.

Alcool de menthe : à saturation

Colorant rose.

Eau chloroformée..... Q. S. p. 100 cc.

Une cuillerée à dessert pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Cicatrisant, Désinfectant, Post-Opératoire, Alvéolites, Stomatites, Abcès.

Prix au public : 7 francs. Taxe comprise.

Laboratoire ESTÈVE

187, rue de la Croix-Nivert — PARIS (15^e)

Tél. : Lecourbe 92-16

BAIN FLÉVAR

Miné et, Synthétique, Radifère

Traitement à domicile des : Phlébites, Varices, Hémorroïdes et des Troubles de la Circulation veineuse.

Le « FLEVAR » se présente sous la forme d'une poudre qui, par ses analogies chimiques avec les eaux les plus réputées des Sources thermales azotées et chloro-sulfatées calciques et par ses propriétés radio-actives *contrôlables*, donne à l'eau du bain, pris chez soi, les mêmes résultats thérapeutiques.

LE BAIN FLEVAR produit 250 millimicrocuries d'émanation du Radium (Radon) par bain de 200 litres d'eau.

Il ne se recommande d'aucune station. — Il convient à toutes.

Prix de la boîte pour un bain : 10 francs.

Fabrication et dépôt général :

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, bicarbonate de sodium, perborate de sodium, nitrate d'uranium.

Présentation. — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

Indications. — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

Posologie. — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuiller à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 157 fr. 50 ;
au Corps Médical, 96 fr. 50.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

Pilules Salvia : Traitement interne des stases veineuses, varices, hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de *Teskra*. Une pilule avant les 2 principaux repas.

L'étui de 30 pilules : 15 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV°). — (Tél. : Suffren 31-75.)

BALDISÉDAN

BALsamique, **DI**urétique, **SÉ**datif, **ANT**iseptique.

Présentation. — Flacon de 50 pilules glutinisées.

Composition. — ACIDE CAMPHORIQUE, hexaméthylène-tétramine, térébenthine de Venise, extrait mou d'uva-ursi, salol, benzo-naphтол.

Indications. — Cystites, Colibacilluries et toutes Pyuries, Pyélo-néphrites, Cholécystites, Gonorrhées et toutes complications.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et *sédatif* génito-urinaire. Aseptise et clarifie les urines par modifications du pH urinaire.

Contre-indication. — Aucune, tolérance parfaite.

Posologie. — 4 à 5 pilules avant chaque principal repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Robert COLAS
133, rue Lecourbe — PARIS.
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

BALLOTYL

Agent le plus efficace de la Phytothérapie Antispasmodique. Sédatif du Grand Sympathique.

Composition. — Ballote stabilisée contenant entre autres constituants de la *Choline*, antispasmodique vasculaire et puissant hypotenseur.

Formes pharmaceutiques. — Liquide ; Dragées ; Suppositoires.

Indications. — Insomnie, Vertiges, Tous états névropathiques, sympathicotoniques ou vago-toniques.

Posologie : 4 prises de XXX à LX gouttes ou 4 dragées par jour (avant les 3 repas et le soir au coucher) ; 1 suppositoire le soir au coucher.

Laboratoire de Phytothérapie de Paris

M. GUILLON, pharmacien.
113, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).
Tél. : Roquette 70-76.

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique. — Tablettes comprimées effervescentes.

Composition. — Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action. — Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

Indications. — Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi. — Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 5 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, Bd Saint-Michel — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 22-01.)

BALSAFORMINE

(Dragées de)

Formule :

Anhydrométhylène citrate d'hexa-	
méthylène-tétramine pure ...	0 gr. 25
Térébenthine de Venise purifiée....	0 gr. 15
Par dragée.	

Mode d'action. — Agit comme antiseptique et calmant des organes génito-urinaires et désinfectant général.

Indications. — Infections du tractus génito-urinaire et des voies biliaires. Pyérites et Pyélonéphrites, Colibacillose urinaire, Bactériurie, Cystites et Catarrhes vésicaux, Urétrites, Prostatites, Vésiculites, Lithiase et Calculose urinaire, Coliques hépatiques et néphrétiques, Gripes.

Prix : le flacon de 50 dragées : 18 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires du GAMBÉOL

42, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 17-67.)

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoates Aldéhyde benzylique.

Formes. — Sirop, Comprimés.

Caractéristiques. — Produit non toxique, plus calmant que le bromoforme et les narcotiques. *Chez les enfants*, il peut être administré à *partir de 5 à 6 mois*. Antiseptique des voies respiratoires. Expectorant, Diurétique, Toni-Cardiaque.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, BRONCHITES, GRIPPE, toux émétisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards*, Insomnies.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour. *Insomnies* : adultes et enfants, 1 cuillerée à soupe le soir au coucher ou pendant la nuit.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

BALSAMORHINOL

Définition. — Huile balsamique, antiseptique, décongestionnante, cicatrisante ; d'odeur agréable ; non irritante.

A base : 1° d'essences végétales (en particulier d'essences de zestes de fruits) dont l'action est bien établie contre les divers microbes qui hantent habituellement les muqueuses des voies aériennes supérieures, et dont la vertu cicatrisante a été éprouvée ; 2° de principes décongestionnants, calmants, qui soulagent d'emblée.

Indications. — Le Balsamorhinol vise avant tout la désinfection efficace du nez et du rhino-pharynx. Des travaux récents ont montré l'importance capitale de ce dernier comme porte d'entrée d'infections non seulement régionales mais aussi broncho-pulmonaires, méningées, sanguines. Pratiquement, et en bref, les indications sont les suivantes :

Coryzas aigus et chroniques ; *rhinites* torpides ou spasmodiques ; *rhume des foins* (*hay fever*) avec ou sans *asthme* ; *sinusites* ; *rhino-pharyngites* ; *laryngites* ; *trachéites* ; *bronchites* ; *infections grip-pales* ; *toutes infections à point de départ rhinopharyngé.*

Présentation. — Flacon avec bouchon compte-gouttes très pratique.

Mode d'emploi :

De 2 à 4 fois par jour. Soit en *instillations*, à la dose de III à IV gouttes dans chacune des fosses nasales ; soit en *pulvérisations* (3 ou 4 jets du pulvérisateur à l'entrée des narines, pendant qu'on inspire largement) ; soit (de préférence) à la fois en instillations et en pulvérisations.

Prix : Flacon de 20 cc., 13 francs.

Laboratoire FIDES

R. VOUZELLAUD, Docteur en Pharmacie

14, rue de la Comète — PARIS

(Tél. : Invalides 64-13.)

BALSOFORME

Mélange de Schleich additionné de Goménol
Prevet.

(Formule du Dr Siauve-Evausy.)

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

Indications. — Anesthésie générale, Prévention des complications pulmonaires post-anesthésiques.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules compte-gouttes de 60 grammes. S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombredanne. Une ampoule suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Prix de vente :

L'ampoule..... 10 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

BALSOFUMINE

Présentation. — Inhalation balsamique liquide. 2 formes:
Balsofumine simple ou mentholée à 1 p. 100 ou 4 p. 100.

Composition. — Acide oxybenzoïque, benjoin et baume du Pérou désempyreunatisés, essence de thym, eucalyptus, essence de lavande, alcool à 80 degrés.

Balsofumine mentholée.

Additions de 1 p. 100 ou 4 p. 100 de menthol.

Indications. — Lénitif, décongestionnant et calmant pour rhinites, laryngites, sinusites, rhumes et trachéo-bronchites.

Balsofumine mentholée

à action spéciale en sinusites.

Posologie. — 1 cuillerée à café par inhalation, 2 à 6 inhalations par jour.

Prix : 16 fr. 50 le flacon, pour 20 jours de traitement.

Laboratoire de CHIMIO-OPOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo. — PARIS (II^e).

(Tél. : Central 95-18.)

BALSORHINE

(Ancien Balsorhinol)

La BALSORHINE Huile, Capsules et Pommade remplace le Balsorhinol.

Huile balsamique, éphédrinée à 0,50 p. 100.

Composition. — Essence de Niaouli, terpinol, essence de pin sylvestre, essence de lavande, essence de badiane, éphédrine base, huile végétale.

Présentation :

1° Flacons munis de compte-gouttes.

2° Capsules gélatinées.

Posologie. — Instillations ou pulvérisations.

Prix: 12 francs le flacon-compte-gouttes pour 20 jours de traitement ; 10 francs la boîte de capsules pour 8 jours de traitement.

Laboratoire de CHIMIO-OPOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo — PARIS.

BANDE MÉRINOS « BÉBÉ »

Bande Rationnelle du premier âge, Extensible, chaude, lavable.

Composition. — Fil crêpe (sans caoutchouc) et laines mérinos, 1^{er} choix.

Indications. — Pour soutenir les organes fragiles du bébé jusqu'à 18 mois.

Maintient sans comprimer.

Entretient la chaleur autour du ventre.

Poreuse : Laisse respirer l'épiderme.

Présentation :

Bande n° 1 (9 cm.) jusqu'à 6 mois.

Bande n° 2 (14 cm.) de 6 à 18 mois.

Prix au public : n° 1 : 9 fr. ; n° 2 : 13 fr.

Dépôt général :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes, — PARIS (XIII^e).

BARBIFLORINE

(Hépariflorine liquide suractivée.)

Priorité. — La barbiflore (*Orthosiphon stamineus*) et le *phyllanthus* javanais ont été introduits dans la pharmacopée courante par « Angla », respectivement en 1934 et en 1937.

Composition. — Solution hydro-glycérinée de Barbiflore, *Cynara scolymus* et *Phyllanthus javanais*. Goût agréable.

Propriétés. — Puissant diurétique végétal atoxique. Hépatotonique de choix. Uréopoiétique et protéolytique. Sclérolysant. *Spécifique naturel de l'instabilité humorale.*

Indications. — Oliguries, Cirrhoses, Ictère, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie, Athérome, Œdèmes et Ascite, Lithiases urinaire et biliaire, Insuffisance hépatique ou hépatorénale, Infiltration calcaire, Hypertension, Suites d'infections, Prophylaxie post-opératoire, etc.

Posologie. — 3 cuillerées à café et plus par jour, aux repas ou dans une infusion chaude.

Flacon de 125 cc. : 15 francs.

Bibliographie et échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA » MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique. »

BARDANE STABILISÉE

(Extrait de racine.)

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médication abortive de la Furunculose, Spécifique de la furunculose vraie, mais sans action sur la Folliculite ou sur les autres inflammations superficielles.

Formes spécialisées. — Pilules et Dragées DAUSSE de Bardane stabilisée, dosées à 0 gr. 20 d'extrait mou par pilule ou dragée.

3 pilules matin, midi et soir, soit 9 pilules par jour, pendant 4 ou 5 jours.

EXTRAIT FLUIDE DE BARDANE DAUSSE

Prendre 4 à 6 cuillerées à café par jour, en nature ou dans un peu de tisane dépurative.

Élixir Dépuratif Dausse préparé avec l'extrait fluide.

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

BARYTOL

Sulfate de baryum poudre, produit rigoureusement pur, inaltérable, d'une innocuité absolue pour examens radiologiques par voie buccale et rectale.

Préparation :

1° *Pour ingestion par voie buccale* : Prendre un récipient contenant 200 à 250 grammes d'eau froide ou tiède, verser par petites quantités le *Barytol*, soit 150 grammes, en agitant constamment avec une cuillère et dans le même sens jusqu'à émulsion complète. Le lait de baryum ainsi préparé reste homogène et assure une image parfaite.

2° *Pour administration par voie rectale* : opérer de la même façon, mais en employant 600 grammes d'eau et 400 grammes de *Barytol*.

Prix en pharmacie : 150 grammes : 10 francs ;
400 grammes : 20 francs.

En vrac, prix spécial pour radiologues, hôpitaux, cliniques.

Émulsionneur prix médical : 15 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, rte de Genas — LYON (III^e). (Tél.: Vil. 93-88.)

BARYX COLLOIDAL

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Poudre colloïdale dosée à 84 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-2.

Avantages. — Facile à diluer. Donne une émulsion très stable. Sans aucune adjonction alimentaire. Conservation parfaite. Examens des contours, Étude du relief des muqueuses. Lavements barytés.

Posologie :

Estomac 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 fois.

Région cæco-appendiculaire 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit 300 gr. dans 450 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Lavement baryté 5 à 600 gr. dans 1 litre 1/2 d'eau.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans la quantité d'eau indiquée en agitant rapidement avec une cuiller jusqu'à complet mélange.

Présentation. — Boîte de 150 grammes. Prix : 10 francs.

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1^{re} rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél.: n° 71).
R. C. Rambouillet 5-184. — Compte Chèques postaux : Paris 1857-27.

BARYXINE

Pansement gastro-intestinal baryté.

Poudre colloïdale à base de sulfate de baryum chimiquement pur, spécialement préparé.

Formule :

Sulfate de baryum chimiquement pur spécialement préparé ..	3,9425
Agar-agar pulvérisé	0,25
Excipient	0,8075

Pour un paquet de..... 5 gr.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-3.

Propriétés. — Grâce à la stabilité de sa solution dans l'eau et à ses qualités d'adhérence, la *Baryxine* pénètre dans l'estomac sous forme d'un liquide homogène qui laisse déposer sur la muqueuse une couche protectrice uniforme.

L'addition d'agar-agar, sans provoquer d'accoutumance, combat une paresse intestinale fréquente chez les malades du tube digestif.

Indications. — Ulcérations, Gastrites, Dyspepsies, Entéro colites.

Posologie. — Dose moyenne : trois à six paquets par jour en plusieurs fois.

Présentation. — Boîte de 30 paquets de 5 grammes : Prix : 13 fr. 50

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise).

(Tél. : 71).

R. C. Rambouillet 5-184. Compte Chèques postaux : Paris 1857-27

BASEDOWINE

Indications. — Maladie de Basedow fruste et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienne. **TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE** et **RÈGLES DOULOUREUSES.**

Composition. — Extrait thyroïdien, Ovarine et Hormone Ovarienne lipodique cétosoluble, un dérivé bromé en très faible dose.

Particularités. — Médication parfaitement inoffensive.

Traitement d'essai de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

Posologie. — 1 à 4 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Prix : 20 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 98-89.)

BASMYL

Composition par dragée :

Castoréum	0,025
Bromure de Codéine	0,01
Dionine	0,005
Extraits d'Aconit	0,004
De Belladone.....	0,004
D'Ipéca.....	0,005
D'Erisimum et de Grindelia	aa 0,05
Thiocol	0,10

Forme. — *Comprimés dragéifiés.*

Indications. — Toux spasmodiques. Affections pulmonaires, Emphysème, Spécifique du spasme dans toutes les affections trachéo-bronchiques.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour, à distance des repas.

Prix : 12 francs la boîte de 20 dragées. Durée de la boîte : 6 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1206-1.

A. BOUCHAND, Pharmacien

à MELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 46.)

BAUME ADOL

Composition. — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, *Gaïacol*, Menthol, Chloroforme.

Action thérapeutique. — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle. *Décongestionnant antifébrile. Action précieuse dans les affections bronchiques et pulmonaires (Gaïacol).*

Indications. — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

Mode d'emploi. — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 9 francs.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.

78, Cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques	6	Salicylate d'amyle	4
Beurre de muscade	2	Acide salicylique	3
Vaseline	60		

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant. Révulsif pulmonaire. Odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, fongues, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration, recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Prix : 10 fr. 50 (pour 10 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

BAUME BENGUÉ

Analgésique.

Composition. — Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications. — Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi. — En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Prix : 9 francs.

Laboratoire du Docteur BENGUÉ et fils

Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

BAUME CRESA

A base de Crésotate de Glycol.

Préparation d'odeur agréable, opiacée et belladonnée.

Traitement local externe des douleurs.

Rhumatisme, Goutte, Sciatique, Lumbago, etc...

Le flacon de 20 grammes : 15 francs.

Produits STÈNE

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général.

Baume benzo-tannique.

Mode d'emploi. — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein :
7 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique	2 gr.
Dermatol	0,50
Baume du Pérou	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Prix, le tube : 5 fr. 50.

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

BAUME DU D^r BAISSADE

adopté par les hôpitaux de Paris (Saint-Louis).
et de province ; par les Ministères des Colonies
et de la Marine.

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Antiprurigineux et analgésique, supprime immédiatement les démangeaisons et la douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furonculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onctions douces (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 12 francs et 18 francs.

Laboratoire du Baume du D^r BAISSADE

Saint-Loup — MARSEILLE.

BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis
(Dermatothérapie).

Composition. — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

Indications. — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit, etc...

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Le flacon d'environ 80 gr. : 16 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous le n° 306-3.

H. ROUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe
20, rue Saint-Lazare — PARIS.
(Tél. : Trudaine 20-81.)

BAUME KALENDOL

Composition et forme. — Pommade en tube à base de bismuth, Teinture spéciale de Calendula, Extr. de ratanhia, associés à un excipient nouveau.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, antiseptique, cicatrisant.

Indications. — Gerçures et crevasses des seins, Rougeurs et feux des bébés, brûlures, engelures. Coups de soleil, Impétigo et plaies de toutes sortes.

Mode d'emploi. — En applications, recouvrir de gaze et de coton.

Huit jours de traitement.

Laboratoires COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

BAUME LARTIGOL

A base de chloral, camphre, acide salicylique et menthol. Odeur agréable, incolore.

Mode d'emploi. — Étendre avec les doigts sur la région douloureuse et faire des frictions douces pendant 5 minutes.

Indications. — Contre les névralgies et douleurs de toute nature, assouplissement des articulations avant ou après les exercices sportifs.

Prix, le tube : 13 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : de 2 à 4 semaines.

ÉTABLISSEMENTS FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : 21-55 et 21-58.)

BAUME-PANTHÉSINE

A base de Panthésine « Sandoz », anesthésique local.

Propriétés. — Calmant analgésique non révulsif pour toute douleur et névralgie *accessible extérieurement* (douleurs musculaires, articulaires, cutanées) et pour toute démangeaison. Modère les processus inflammatoires en neutralisant par sa réaction basique l'acidité des tissus enflammés et en supprimant les réflexes axoniques.

Indications. — Névralgies intercostales, pleurodynie, névrites, arthralgies. Rhumatisme aigu et chronique. Pseudo-rumatisme infectieux. Sciatique. Contusions douloureuses. Coup de soleil. Erythème actinique. Lumbago. Crises hémorroïdales, tout prurit.

Prix : 1/2 tube : 7 francs. Tube entier (20 gr. env.) : 12 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BAUME RAFAX

Composition. — Borate de soude, sulfate double d'alumine et de potasse, alcool, huile d'amandes douces.

Indications. — Le *Baume Rafx* est indiqué dans le traitement des maladies de la peau, en particulier dans l'eczéma, dartres, acné, psoriasis, ulcères et *Brûlures*.

Avantages. — Agréablement parfumé, le *Baume Rafx* ne contient aucun acide et son emploi est rigoureusement sans danger.

Présentation et prix :

Flacon : 25 fr.

Un seul flacon suffit pour un traitement normal.

Agence Générale des Produits RAFAX

4, rue Boulard — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 96-72.

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.
Ne tache pas le linge.

Indication :

Traitement externe des douleurs rhumatismales et des névralgies.

Présentations et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.
Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté non compressif.

Le tube de crème : 8 francs. — Le flacon : 11 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean- Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

BAUME ROBUR

Toutes douleurs Rhumatismales, Névralgiques
et Musculaires.

Formule :

Extrait de belladone	0 gr. 30
Salicylate d'Amyle	5 gr.
Camphre	4 gr.
Menthol.....	2 gr.
Chloroforme.....	3 gr.
Teint. de Capsicum	4 gr.
Ess. de lavande.....	1 gr.
Ess. de Cèdre	3 gr.

Lanovaseline pour 100 grammes.

En tube de 90 grammes.

Mode d'emploi. — En massages et applications.

Le remarquable pouvoir de pénétration et d'entraînement dans les tissus de l'essence de Cèdre triple l'efficacité du Baume Robur.

Prix : 11 francs.

Échantillon et Littérature:

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS

(Tél. : 15-56.)

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Sélénia** est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 13 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par **O. DAVID** et ses fils

Pharmaciens, 49, rue de Bitché — COURBEVOIE

(Seine). (Tél. : Défense 01-41.)

BAUME THOMAS

Formule :

Scuroforme	5
Borate de soude	4
Excipient insoluble, Q. S. pour 100 gr.	

Présentation. — Pâte de goût et d'odeur agréables.

Indication. — Douleurs de la dentition chez les nourrissons.

Avantages. — Ne fond pas dans la bouche, malgré les suctions de l'enfant, reste en contact avec la gencive pendant toute la durée de la friction et assure ainsi rapidement une anesthésie prolongée. Absolument inoffensif. Quinze ans d'existence. Nombreuses attestations médicales.

Posologie et mode d'emploi. — Effectuer avec le doigt recouvert d'un peu de Baume Thomas des frictions sur les gencives douloureuses aussi souvent que nécessaire, après avoir lavé la bouche de l'enfant.

Prix : 9 fr. 35 le tube pour une dentition.

Enregistré au Lab. N° de Contrôle sous le n° 650-2.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

BAUMIX

Formule :

Menthol	0 gr. 281
Calomel à la vapeur	2 gr. 81
Peroxyde de zinc	7 gr. 025
Baume du Pérou	5 gr. 62
pour 100 gr.	

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle 322-1.

Indications thérapeutiques. — Ulcérations variqueuses. Brûlures et toutes plaies de toute nature.

Chaque pot est accompagné d'un mode d'emploi très détaillé.

Livré en pot aluminium de 60 cgr.

Prix : 10 fr. 50.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

BAUMOLACPININE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuillerées à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	30 gr.....	6 fr. 50
		— de	150 gr ...	26 fr. 50
		— de	500 gr ...	70 fr. »
		— de	1 000 gr ...	125 fr. »

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Lamartine 92-52.)

BBDERM MARS

Pommade adhésive contre toutes les dermites simples et particulièrement contre celles des nourrissons. Recouverte d'une simple couche de poudre de talc, elle forme à elle seule un véritable pansement qui protège la peau.

Formule. — Oxyde de zinc pur, sous-gallate de bismuth, lanoline, vaseline.

Mode d'emploi. — Étendre une couche bien homogène sur toutes les parties atteintes et poudrer. Renouveler ce pansement au moins une fois par jour, après avoir enlevé la vieille pommade à l'aide d'un tampon d'ouate imbibé d'huile.

Indications. — Dermites, prurits, etc. C'est le préservatif et le curatif par excellence de tous les érythèmes des nourrissons. Dans les dermatoses suintantes et impétigo, employer le **BBDERM ECZÉMA** après lavages à l'eau Sanubrolée. (Voir à l'article **SANUBROL MARS**)

Bbderm spéciaux :

Bbderm simple : toutes dermites des nourrissons.

Bbderm Eczéma : impétigo, eczéma et toutes dermites suintantes.

Prix : 10 francs le tube.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

BÉATOL

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nerveux. Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1^{re} Forme: AMPOULES

Composition:

Diéthylmalonylurée	0,125
Bromhydrate de scopolamine.....	0,00012

Pour 1 cc. en ampoules de 2 cc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

2^e Forme: LIQUIDE

Composition:

Diéthylmalonylurée	0,18
Extrait de jusquiame	0,015
— fluide de valériane	0,10

Pour une cuillerée à café.

Mode d'emploi.

- a. *Calmant nerveux* : 1 cuillerée à café le matin au petit déjeuner ; renouveler, suivant besoin, dans la journée, la dose de 1 cuillerée à café.
- b. *Hypnotique* : 1 cuillerée à café avant le repas du soir et une seconde cuillerée à café au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, une troisième cuillerée à café dans la nuit, si besoin.

3^e Forme: COMPRIMÉS

Composition:

Diéthylmalonylurée	0,18
Intrait de valériane	0,10
Extrait de jusquiame	0,02

Pour un comprimé.

Mode d'emploi:

- a. *Calmant nerveux* : 1 comprimé le matin au petit déjeuner ; renouveler, suivant besoin, dans la journée la dose de 1 comprimé.
- b. *Hypnotique* : 1 comprimé avant le repas du soir et un second au coucher à prendre dans de l'eau ou une infusion, un troisième comprimé dans la nuit, si besoin.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées.)

BÉCALCIOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie (non aurique) des Tuberculoses osseuses, ganglionnaires et pulmonaires.

Composition :

Association de catalyseurs en solution huileuse colloïdale contenant :

Manganèse	0,09 mgr.
Cuivre.....	0,08 mgr.
Calcium	0,05 mgr.
Potassium	0,02 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Bécaciol-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines, arrêt et reprise du traitement s'il est nécessaire. Il est recommandé d'associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

BEDENAL

*Spécifique des troubles nerveux de l'enfance
de l'adolescence.*

Composition. — Association des éléments modificateurs du « terrain » (vitamines B. D. E., hypophyse), des éléments sédatifs nervins végétaux (salix, alba, passiflora incarnata), de la phényléthyl-malonylurée, à petite dose.

Indications :

Avant 3 ans : Agitation habituelle nocturne et diurne, spasmophilie.

Après 3 ans : Onychophagie, tics, terreurs nocturnes, incontinence d'urine, onanisme, troubles de la puberté, etc...

Forme. — Granulé délicieusement parfumé.

Posologie :

Avant 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Après 3 ans : 3 cuillerées à café par jour (une cuillerée une demi-heure avant chacun des trois repas).

Prix : 13 fr.

**Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE
LAURENÇON et Cie, pharmaciens**

11, rue François-Giraud
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

BÉGESSOL BOUCHEREAU

Chimiquement : Éthylbromogalacolate d'Hexaméthylène-amline. Produit nouveau cristallisé, hydrosoluble, d'activité antiseptique générale 5 fois 1/2 celle du galacol.

L'action bactéricide vis-à-vis du bacille de Koch est très supérieure à celle de la créosote et du galacol

Dépourvu de causticité et de toxicité, ne provoquant pas d'hémoptysie, il est d'absorption pulmonaire rapide, contrairement au sulfogalacolate de potassium, d'action bactéricide nulle et non retrouvé dans le poumon. (Gordonoff, *Annales de Médecine*, oct. 1935.) Il amène vite chute de la température, sédation de la toux, excitation de l'appétit avec modification de l'expectoration.

Indications. — Affections de l'appareil respiratoire — Tuberculose — Pleuresies — Pneumonies — Bronchites.

Forme. — 1^o Ampoules dosées à 1 gr. de produit actif en tube fermé à dissoudre dans 20 cc. eau bidistillée (Voir indications de traitement).
2^o Sirop contenant par litre 10 gr. Bégessol avec 250 gr. de sirop de codéine. 3 à 4 cuillères à soupe par jour (adultes).
(*puissant sédatif de la toux*)

Boîte de 4 ampoules fermées avec 4 ampoules de 20 cc. Eau bidistillée,

Prix public..... 45 francs

Sirop. Prix au public..... 15 francs (Lab. Contr. N° 1621-2)

Laboratoire P. BOUCHEREAU, Docteur en Pharmacie

Lauréat de la Faculté de Paris.

Bd Aristide-Briand, Champigny-sur-Marne (Seine). Dépôt O. C. P.

BELCARMINE

Association de Belladone, Charbon, Formine.

Formule. — Une cuillerée à café de granulé contient : Teinture de Belladone, teinture de Jusquiame : àà 5 gouttes. Formine 0 gr. 15. Charbon animal 0 gr. 50. Charbon végétal 1 gr.

Présentation. — Cachets. — Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entérocrites, cholécystites chroniques, angiocholites, fermentations intestinales constipation chronique, aérophagie.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café ou cachets après les repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : Boîte modèle courant : 13 fr. (Durée moyenne 6 jours).

Flacon Cure : 31 francs.

Laboratoire R. THIRODE

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,
33, Grande-Rue — BESANÇON.

(Tél. : 0-37.)

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval,
Sérum hématopoiétique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 20 francs la boîte de 6 ampoules.

Compléter le traitement par l'usage de la
SANGUIPLASMINE

Granulé préparé avec le Caillot sanguin :
Hémoglobine, 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 13 francs le flacon.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences,
Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT.

(Tél. : Molitor 01-90.)

BELLADENAL

Association de Phényl-éthyl-malonylurée et de
Bellafoline.

Sédatif nervin général et des cas résistants.

Indications spéciales. — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse. Mal de mer.

Présentation. — Tubes de 20 et flacons de 100 et de 500 comprimés.

Boîtes de 5 et de 25 ampoules.

Posologie. — *Comprimés* : 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour. Enfants : 2 à 4 demi-comprimés.

Belladenal injectable : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

Prix :

Le tube de 20 comprimés : 12 francs.

Le flacon de 100 comp. : 48 fr.

Le boîte de 5 ampoules : 22 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLADONE DAUSSE

Préparation titrée chimiquement et contrôlée physiologiquement, à prendre par gouttes.

Titration chimique et contrôle physiologique. La méthode suivie pour le titrage chimique des alcaloïdes de la Belladone ne fournit pas de renseignements précis sur la quantité de principe actif (Atropine) contenue dans la préparation. Le titre alcaloïdique trouvé correspond à un ensemble hétérogène d'alcaloïdes. On ne saurait donc se fier à un titre alcaloïdique de ce genre pour conclure à la valeur thérapeutique du médicament. Le contrôle physiologique devient ici obligatoire ; il a pour base l'action du médicament sur l'appareil cardio-inhibiteur.

La Belladone Dausse est titrée à 0,001 d'Alcaloïdes totaux et 25 unités physiologiques par gramme de préparation.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Toutes les indications ordinaires de la Belladone, comme sédatif du système nerveux et modérateur des sécrétions, dans les affections des voies respiratoires et digestives, dans les affections nerveuses.

Posologie :

Adultes : X gouttes par prise, de 3 à 6 fois par jour, dans une tisane.

Enfants : II gouttes par jour et par année d'âge.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

BELLAFOLINE

Alcaloïdes totaux de la Belladone

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

Posologie :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : X à XX, trois fois par jour.

Ampoules : 1/2 à 2 par jour (injections sous-cutanées, intramusculaires et endoveineuses indolores).

Sirop : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Naupathie :

Bellafoline : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

Belladénal : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

Prix :

Comprimés : 10 francs. — Gouttes : 12 francs.

Ampoules : 12 francs. — Sirop : 12 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLASODINE

Traitement Alcalino-Sodique Belladoné, établi d'après la formule du P^r Bourget.

Formule :

Sulfate Soude anhydre.....	0,30
Phosphate Soude anhydre.....	0,20
Bicarbonate Soude anhydre.....	0,15
Citrate Soude anhydre	0,10
Belladone pulvérisée	0,01

Essence de Badiane pour aromatiser, pour un paquet n° 30.

Avantages. — Produits chimiquement purs et anhydres. Prix établi judicieusement, moins cher qu'une préparation magistrale tarif A. G.

Indications. — Toutes celles de la Solution de Bourget : insuffisances hépatiques et biliaires, gastralgies, dyspepsies, pyrosis et toutes dermatoses d'origine digestive.

Posologie. — *Adultes* : 1 paquet le matin à jeun et le soir avant dîner dans un verre d'eau tiède ou dans une infusion de badiane, pensée sauvage, etc.

Enfants : 1 paquet le matin

Prix : 11 francs pour 15 jours de traitement.

Laboratoire Y. RAVALEC, Pharmacien.

13, Grande-Rue — HERBLAY (S.-et-O.). — Tél. : 83.

BELLERGALE

Modérateur de l'éréthisme nerveux. Traitement du terrain névropathique et de l'émotivité. Régulateur des dystonies neuro-végétatives. Supérieur aux valérianes et valériانات, plus actif et effets constants.

Composition. — Comprimés dragéifiés renfermant :

Tartrate d'ergotamine (Gynergène) : 0 mgr. 3.

Alcaloïdes totaux de la belladone (Bellafoline), 0 mgr. 1.

Phényl-éthyl-malonylurée : 2 cgr.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 dragées par jour. Dans les cas résistants, aller jusqu'à 6 dragées par jour puis, quand le calme renaît, revenir à la dose habituelle.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour à partir de 5 ans.

Prix :

Flacon de 25 : 12 francs. Flacon de 100 : 42 francs

Flacon de 250 : 95 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLINGUOL

Traitement du diabète.

Organothérapie Bellas.

Présentation. — En boîtes de 35 comprimés : 30 francs.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Extrait de rate, Poudre de bile.

Indications. — Toutes formes de diabète après l'âge de 40 ans. Particulièrement indiqué dans les cas de plaies diabétiques ou plaies accidentelles chez les diabétiques.

Posologie. — 3 à 9 comprimés par jour à prendre 1/2 heure avant les repas, matin, midi et soir.

Dans les cas de glycosurie persistante chez des malades impatients et habitués à ne reconnaître une amélioration de leur état que dans la diminution immédiate du taux de sucre dans l'urine, ce résultat peut être obtenu en administrant des doses massives, soit 9 comprimés par jour. Toutefois à cette dose le Bellinguol provoque parfois des troubles intestinaux (diarrhée) ne présentant aucun danger, mais souvent pénibles. Il vaut donc mieux faire patienter le malade et persister avec des doses moyennes pour arriver normalement au même résultat.

Régime. — Le régime habituel, mais moins rigoureux, est à suivre.

Enreg. au Labor. nat. de Contrôle des médicaments. N° 167-16.

Dépôtaires pour la France et les colonies.

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, Pharmacien, 3, place Intérieure-St-Michel - TOULOUSE
(Tél. 213-06).

BEMAX

Le produit naturel le plus riche connu en **Vitamines B**.

(15 unités internationales par gramme en vitamines B¹.)

Constitué de germes de blé sélectionnés et stabilisés, contient en outre des vitamines A et E en quantité notable. Teneur en phosphore 2,66 p. 100 en P 2 05.

Indications. — Toutes déficiences en vitamines B, et spécialement : Traitement curatif de la constipation et de l'atonie gastrique. Affections de la peau ; ulcères.

Grossesse et allaitement (dans ce cas, tripler ou quadrupler la dose, un minimum de 500 unités par jour étant nécessaire).

Enfants sous-alimentés, débilités ou simplement de constitution délicate ; rachitisme.

Convalescences.

Diabète (augmente la tolérance des hydrocarbures).

Doses. — Le traitement doit être prolongé au moins un mois. 1 cuillère par jour : à soupe pour les adultes ; à café ou à dessert pour les enfants.

Se prend dans **du potage** du café, des compotes, etc.

Prix : 12 francs et 20 francs (durée : 3/4 semaines ; 6/8 semaines).

Laboratoire LACOMBE

Rue Barbès — COURBEVOIE.

(Tél. : Défense 10-48.)

BENSAMINE

Composition. — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

Indications. — Voies urinaires : urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. Syndrome entéro-rénal. Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles. Etat général : Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

Formes :

- 1° Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous). — 12 fr. 50.
- 2° Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour. — 14 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisypilitique énergique.)

Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacydylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15, ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à faits comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzo-bismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant, pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

Composition :

Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10
Extr. fluide valériane fraîche stabil...	1 000
Alcoolature de Passiflora Incarn.....	1 000
Teinture de Cratægus oxyacantha ...	1 000

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Éréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 13 fr. Comprimés, 15 fr. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 80-76.)

BENZO-GYNŒSTRYL

Folliculine cristallisée du D^r Roussel à l'état de Benzoate de di-hydro-folliculine (Benzoate d'Œstradiol).

Voie intramusculaire. — Ampoule de 1 cc. contenant 1 mgr. d'hormone, soit 10 000 U. I. (1935) en solution huileuse.

Indications. — Infantilisme utérin, aménorrhée, oligoménorrhée, dysménorrhée, ménopause naturelle ou artificielle. Vomissements et troubles de la grossesse.

Posologie. — Si la fonction ovarienne n'est pas abolie; 1 à 4 injections réparties au cours des 2^e et 3^e septénaires de la période intermenstruelle.

En cas de carence totale, 4 injections dans le mois en maintenant entre elles un intervalle de 7 à 8 jours.

Boîte de 2 ampoules. Prix au public : 25 francs.

Voir aussi **Gynœstryl** et **Benzo-Gynœstryl** 5.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
Tél. : Littré 58-43.

BENZO-GYNÆSTRYL 5

Folliculine cristallisée du Dr Roussel à l'état de benzoate de di-hydro-folliculine (Benzoate d'Œstradiol).

Ampoule de 1 cc. contenant 5 mgr. d'hormone, soit 50 000 U. I. (1935) en solution huileuse (voie intramusculaire).

Indications. — Troubles fonctionnels ou généraux résultant des déficiences ou des carences ovariennes graves ou rebelles.

Posologie. — Si la malade est encore réglée : 1 à 4 injections par mois au cours des deuxième et troisième septénaires de la période intermenstruelle.

Si la malade est aménorrhéique, régler la posologie suivant le but à obtenir en utilisant une dose minima de 2 ampoules par mois.

Boîte de 1 ampoule. Prix au public : 40 francs.

Voir aussi GYNÆSTRYL et BENZO-GYNÆSTRYL.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

BENZO-IODHYDRINE

La BENZO-IODHYDRINE n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des Cardio et des Artérioscléreux, des Goutteux, des Emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Le flacon : 14 francs.

Renseignements et échantillons :

H. RIVIER, Pharmacien

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine.)

(Tél. : Alésia 22-46.)

BENZOQUINOL

Composition. — Benzoate de quinoléine, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, aconit, créosote iodée, essence de niaouli.

Propriétés. — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

Indications. — *Coqueluche, asthme, emphyseme, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

Caractéristiques. — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — En inhalations, XV gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas âge, les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

Remarque. — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au **Benzoquinol**.

Prix : 12 francs.

Laboratoires **KERFYSER**
DUNKERQUE.

BENZOSULFÈNE

Dragées glutinisées d'Hyposulfite de Na, Hyposulfite de Magnésium et Benzonaphtol.

Indications :

Intolérances alimentaires, Dermatoses, Eczéma, Urticaires, Déficiences hépatiques, etc.

Doses :

Adultes : 1 dragée avant chacun des 3 repas (à avaler sans croquer).

Enfants : 1 à 2 dragées par jour.

Laboratoire **MARTINIE**

62, avenue Philippe-Auguste—PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n^o 1122-5.

BENZYLOCALCIUM

Récalcification (vitaminée-phosphorée) intensive, renforcée par le Fenugrec désodorisé.

Assimilation assurée par les actions combinées :

- 1° Antispasmodique et hypnotique du noyau Benzylique ;
- 2° Antitoxique de la substance génératrice de vitamine B.

Formule :

Benzylohypophosphite de calcium.....	7 gr. 50
Fenugrec désodorisé	4 gr.
Substance véhicule de vitamine B.....	1 gr.

Deux formes : Granulé et cachets.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé, ou un cachet 3 fois par jour, avant les repas.

Enfants : 1 demi-cuillerée à café ou un cachet 2 fois par jour.

Indications. — Adénopathie ; Prétuberculose ; Débilité ; Amaigrissement.

Prix :

Cachets	16 fr.
Granulé	15 fr.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

Tél. : Carnot 78-11.

BÉTUL-OL MIDY

Composition. — Menthol et chloral, en solution dans le salicylate de méthyle.

Propriétés. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications — Lumbagos, Sciatiques, Douleurs des articulations, Névralgies, Névrites, points de côté, douleurs thoraciques, courbatures.

Forme. — Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Posologie et mode d'emploi. — Le BÉTUL-OL MIDY peut être employé, soit sous forme d'onctions et de frictions, soit sous forme d'enveloppements.

1° *Onctions et frictions :* Enduire la région douloureuse avec une pièce de flanelle imbibée de BÉTUL-OL. Frictionner *doucement et longtemps*. Recouvrir avec la flanelle, puis avec un taffetas gommé imperméable et une couche de coton.

2° *Enveloppements :* Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé, puis de coton. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour.

L'absorption du BÉTUL-OL se fait si rapidement par la peau que, 10 minutes après, on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prix : 18 francs. Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

BEVITA

Composition. — Levure de bière purifiée, désamertumisée et séchée, de goût agréable.

Protéines	56	p. 100
Hydrates de carbone	26	—
Lécithine	1	—
Glutathion	0,65	—
Vitamines B ¹ , B ² , B ³ , B ⁴ , B ⁵ , B ⁶ .		

Indications. — Convalescence, Affections cutanées, Staphylococcie, Diabète, Anorexie, Dyspepsie, Entérococolite chronique, Constipation, Ulcère gastro-duodénal, Vomissements de la grossesse, Hypovitaminose B de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.

Posologie. — *Enfants* : 5 à 10 grammes, soit 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Adultes : 10 à 30 grammes.

Remarque. — Le goût agréable de BEVITA en permet l'utilisation infantile. Il est recommandé de l'ajouter aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux légumes ou pâtes, ou encore de l'absorber délayé dans un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 10 fr. 75 le flacon de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. (Tél. : 11-35.)

BEVITINE

Vitamine B1 cristallisée.

Vitamine B1 cristallisée, antinévritique. Comprimés et solution aqueuse.

Vente limitée à la France, Colonies Françaises, Pays de protectorat et sous mandat français.

Indications. — Bériberi, troubles du métabolisme, de la nutrition des nerfs, Névrites, polynévrites (toxiques, infectieuses, gravidiques, diabétiques), névralgies, funiculites, myéloses, chorée, sclérose en plaques, diabète, anorexie du jeune âge.

Présentations et posologie.

Comprimés dosés à 0 gr. 005 (tubes de 20). 1/2 à 1 comprimé par jour suivant l'âge.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 002 de Vit. B1 =.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 01 de Vit. B1 =.

Injectons sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses (0 gr. 002 à 0 gr. 01 *pro die* suivant la gravité des cas. Séries de 10 à 12 injections).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

Tél. : Balzac 22-94.

BEXININE

Sirop anticoquelucheux.

Composition. — Association d'essences aromatiques antiseptiques des bronches (eucalyptol, niaouli, cyprès, serpolet) et d'antispasmodiques (bromoforme, benzoate de benzyle, droséra et grin-délia).

Indications. — Efficacité remarquable dans le traitement de la *coqueluche*, toux spasmodiques, toux rebelles, catarrhe bronchique.

Posologie. — Peut être prescrit depuis l'âge de deux mois : X à XXX gouttes en 3 fois par 24 heures.

Enfants de 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

Enfants de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Adultes : 6 à 10 cuillerées à soupe.

Prix du flacon : 17 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments, n° 1463-1.

Laboratoires de la Bexinine L. COLIN

19, rue Saint-Jean — CAEN (Calvados).

BI-ACTIVAL

Magnésium vitalisé, sous forme de complexe organo-métallique, élaboré par un ferment vivant.

Sous cette forme, le Magnésium est énormément plus actif et immédiatement assimilable.

Indications :

- 1° Stimulant très énergique du système osseux, nerveux, et du système glandulaire en général.
- 2° Traitement de choix des affections intestinales : diarrhées infantiles, entérites, diarrhées banales, colibacilloses, constipation, accidents de la peau, qui en sont les conséquences habituelles. Furonculose, acné, etc...

Posologie :

Une ampoule par jour à jeun, par voie buccale, dans de l'eau, du vin, du café tiède, ou de la bière.

Laboratoire ROUSSEAU

49, rue du Château-d'Eau — PARIS (X^e).

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 035 de bismuth métal par cent. cube.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le D^r L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydrosolubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série par 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 32 francs.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, Place Lucien-Herr — PARIS (V^e).

(anciennement 43, rue Tournesfort). (Gobelins 26-21.)

BI-CI-PA

Sirop eupeptique de l'enfance.

Régulateur et stimulant des fonctions digestives.

Bicarbonate de soude	1 gr.
Citrate de soude	1 —
Papaïne liquide à 50 p. 100....	2 —
Teinture de Belladone	III gouttes
Sirop simple..... Q. S. pour	120 cc.

Indications. — Troubles digestifs au cours de l'allaitement artificiel, Inappétence, Vomissements, Constipation. Etats spasmodiques de l'estomac. Agitation nocturne. Troubles cutanés. Acétonurie.

Posologie :

Nourrissons : une cuillerée à café avant chaque tétée ou mélangée au biberon.

Jeunes enfants : une cuillerée à dessert avant chaque repas.

Prix : 14 fr. 50, taxe comprise.

Laboratoires du BI-CI-PA

G. et P. MOISIÈRE, Pharmaciens.

62, rue du Gros-Noyer — ERMONT (Seine-et-Oise).

(Tél. : 163.)

Dépôt : O. C. P.

BI-CITROL MARINIER

**L'Agent rationnel de la Médication
citratée.**

**Citrates monosodique et trisodique en granulé
soluble de goût agréable.**

**Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux,
Décongestif.**

Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau
chaude, au cours du repas ou au moment
des malaises.

Insuffisance hépatique, Arthritisme :

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans
un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée
à café avant chaque repas.

Hyperviscosité sanguine :

(Pléthore, Hypertension, États congestifs,
Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau
trois fois par jour avant les repas.

Pneumonie :

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois
heures.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Prix du flacon : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Con-
trôle des Médicaments sous le N° 48-1,
le « BI-CITROL » peut être légalement
prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,
PARIS

BIÈRE DES NURSES

La bière du Corps Médical (38^e année).
En usage dans les Établissements Médicaux.
Non Alcoolisée quoique très riche en malt sans colorant, de conservation garantie car très pure, de saveur identique aux bières supérieures du Commerce, celle Bière de Santé est recommandée aux Alcooliques, Nourrices, Enfants, Vieillards, Convalescents, etc., outre son usage à table.

Livraisons : Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.

Expéditions ailleurs de « **Concentré des Nurses** ». Transport commode et bon marché.

CORPS MÉDICAL. — Tarif de Gros et échantillons gratuits sur simple demande.

La Bière des NURSES
à BOURG-LA-REINE (Seine)

BILAXYL

Le laxatif des Hépatiques.

Composition :

Bile poudre	0 gr. 05
Agar-Agar	0 gr. 03
Evonymine verte	0 gr. 02
Podophyllin	0 gr. 02
Diacétyl-dioxyphénylisatine .	0 gr. 005
Extrait de Belladone.....	0 gr. 005 cinq milligr
Extrait de Jusquiame	0 gr. 005 — —

Pour 1 comprimé dragéifié.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés. — Laxatif cholagogue, rééducateur intestinal.

Doses. — 1 à 2 comprimés au début du repas du soir.

Prix au public : 12 francs les 40 comprimés.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

BILEYL

Sels biliaires dépigmentés et décholestérinés.

Forme. — Globules kératinisés, étui de 60 globules, 14 francs (chaque globule contient 0 gr. 20 d'extraits biliaires). 4 à 8 globules par jour après les repas.

Indications. — Les stases biliaires, Ictères, Constipation, Insuffisance biliaire, Cholémie familiale.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiase biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

Prix : 15 francs.

R. RABY, pharmacien

ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

(Tél. : Grésillons 03-15.)

BILIBOLDO

Forme. — Pilules glutinisées.

Composition. — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiase biliaire, Ictères, Constipation.

Doses. — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 12 francs les 60 pilules.
(30 jours de traitement).

Laboratoires BARTHÉLEMY

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE.
(Tél. : 1-70.)

BILICRINOL

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue et anti-anaphylactique.

Indications. — Insuffisance hépatique, Congestion du foie, Lithiase biliaire, Ictère, Cholécystite, Troubles anaphylactiques, Migraines, Dermatoses, Urticaire, Constipation par insuffisance hépatique, Troubles digestifs d'ordre hépatique, Anorexie, Vertiges, Nausées, etc...

Composition. — Peptones, bile dépigmentée et décholestérinée, sulfate de magnésie desséché.

Forme. — Granulé.

Posologie. — Le matin à jeun ou demi-heure avant les repas dans un quart ou un demi-verre d'eau.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café.

Enfants : 3 ans, 1/2 cuillerée à café.

8 ans, 1 cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère).

BILIFLUINE

du Dr L. BIGNON, de Vichy.
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères.

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal. Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures, et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

La boîte de 45 pilules ou dragées. Le flacon de sirop. Prix au public : 18 francs.

Produits « STÉNÉ »

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

BILIFLUOL

Peptones magnésiées,
Phytothérapie hépatobiliaire.

Composition :

Sulfate de Magnésie desséché	15
Peptone de viande purifiée	5
Extrait de boldo	0,80
Extrait d'artichaut	0,20
Citrate de soude	4
Hyposulfite de Magnésie	15
Saccharose aromatisé..... Q. S. pour	100

Indications. — Insuffisance hépatique et ses conséquences. Antiarthritique.

Présentation. — Granulé. Boîte métallique de 120 gr. environ. Durée moyenne : 15 jours. Prix : 18 fr. 75.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède.

(Se coucher 10 minutes sur le côté droit).

Laboratoires du BILIFLUOL

G. VAN ECKE, pharmacien.

44, rue Marcel-Sembat — AULNAY-SOUS-BOIS
(Seine-et-Oise). (Tél. : 552).

BILIOGASTRINE

Médication anaphylactique.

Forme. — Granulé légèrement effervescent.

Composition. — *Citrus Vulgaris*, *Kinkelibah Raimbaultii*, *Orthosyphon Staminus*, Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Indications. — Troubles et Dermatoses d'origine gastro-intestinale de l'*Adulte* et de l'*Enfant*, Urticaire, Intolérance gastrique du jeune âge.

Posologie. — Autant que possible, prescrire la Biliogastrine le matin à jeun et le soir vingt minutes avant le repas

Enfants : 1 à 4 ans, 1/2 cuillerée à café par jour en 3 fois.

Adultes : 2 à 4 par jour, puis augmenter la dose suivant l'âge.

Prix : 17 fr. 50 (8 jours).

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

(Tél. : 22.)

BILIVACCIN

1^o *Antityphique.*

2^o *Antidysentérique.* — 3^o *Anticholérique.*

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication. Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun trois matins de suite une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, un comprimé de vaccin.

Prix : Dose pour adultes : 10 francs.

Dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr.

H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 11-23.

BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs, une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 20 francs la dose.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Produits de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

BILLABSTINE

Simple et Laxative.

Composition. — Extraits biliaires, Ferments lactiques, Pancréatine, Extraits d'artichauts, Extrait de Coto.

Laxative : Extraits Cascara et Bourdaine, Évoynimine brune.

Posologie. — *Simple* : 4 comprimés par jour un peu avant les repas, midi et soir. En cas de dysenterie grave, la dose peut être augmentée, sans inconvénient, jusqu'à 10, 12 ou 14.

Laxative : 1 à 3 comprimés le soir.

Indications. — Dysenteries, Infection intestinale, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Angiocholite, Entérite. *Entérites à forme dysentérique.* Constipation chronique. Atonie de l'intestin.

Prix : *Simple* : Le tube, 16 francs. Traitement normal 15 jours.

Laxative : Le tube, 11 francs, 20 à 40 jours de traitement.

Laboratoires BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS.

BINIDIA

Suspension de **Bismutho-8-Oxyquinoléine** à 10 p. 100, rendue pénétrante par l'addition de 1 p. 1000 d'isopropylnaphtalène sulfonate de soude.

Propriétés. — Antiseptique génito-urinaire local, non toxique, non caustique, très bien toléré, pénétrant et adhérent.

Indications. — Métrites, endométrites, vulvites, vaginites d'origine bactérienne, en particulier gonococcique. Vulvo-vaginites des petites filles.

Mode d'emploi. — Le BINIDIA s'emploie pur en instillations, tamponnements ou mèches.

Présentation. — Flacon à large col de 120 cc. environ, permettant le prélèvement direct au moyen de la seringue de Bonneau.

Prix : 30 francs.

Établissements KUHLMANN
Produits R. A. L. Spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).
(Tél. : Élysées 99-51 à 57.)

BINOXOL

Bismutho-8-oxyquinoléine.

(Produit synthétique, défini et pur.)

Propriétés. — Antiseptique gastro-intestinal dépourvu de toute toxicité et dont l'oxyquinoléine s'élimine par les voies urinaires. Inaltérable.

Indications. — Diarrhées infectieuses et parasitaires, Fermentations, Diarrhées infantiles. Particulièrement efficace dans le traitement des diarrhées des tuberculeux. Oxyurose.

Antisepsie urinaire : pyélonéphrites, cystites, urétrites.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cachets à 0 gr. 50 par jour avant les repas. Dans les cas graves, jusqu'à 8 par jour.

Enfants : 6 mois-1 an : 1 paquet à 0 gr. 25 par jour en 2 fois ;

1 an-2 ans : 2 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Au-dessus de 2 ans : 3 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Présentation :

<i>Adultes</i> :	{ Tube de 12 cachets ou 15 comprimés à 0 gr. 50.	12 fr.
	{ Boîte de 100 cachets à 0 gr. 50.....	75 —
<i>Enfants et</i>	{ Boîte de 12 paq. ou tube de 15 compr. à 0 gr. 25.	8 —
<i>Nourrissons</i> :	{ Boîte de 100 paquets à 0 gr. 25.....	45 —

Établissements KUHLMANN
Produits R. A. L. spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).
(Tél. : Élysées 99-51 à 57.)

BIOCALCIUM

Composition :

Gluconate de chaux, chl. d'Histidine, chl. de choline, cacodylate de soude.

Il existe une forme non arsénée, exempte de cacodylate de soude.

Indications :

Chaque fois qu'il est nécessaire de :

1° Obtenir un relèvement rapide de l'état général ;

2° Stimuler les réactions de défense et les centres de production globulaire ;

3° Augmenter le taux du calcium sanguin et rétablir l'équilibre glycémie-cholestérolémie.

Notamment dans les états tuberculeux et pré-tuberculeux (parfaitement toléré même dans les tuberculoses évolutives), anémies, paludisme, les chocs traumatiques (fractures), interventions opératoires, hémorragies. Traitement préparatoire avant les opérations. Tétanie, spasmophilie, déséquilibre du système neuro-végétatif.

Posologie :

Adultes : une ampoule de 5 cc. en injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours.

Enfants : 1/2 ampoule.

L'injection est indolore. Si besoin, faire tiédir l'ampoule

Prix : 20 fr.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

BIOCALCOSE

Tonique, Stimulant, Reminéralisant intégral.

Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hydrophosphites ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose ; Fluor ; Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.

Constitue une véritable synthèse minérale de la matière vivante.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reminéralisant.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 à 4 au-dessus de cet âge. Croquer ou dissoudre dans un peu d'eau et prendre aux repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél.: Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte-90—Paris.

BIOCÉANE OLIVIÉRO

Eau de mer intégrale 100 p. 100 ionisée, stabilisée.

Véritable Lymphé marine. Sérum marin. Ampoules buvables et injectables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

Action thérapeutique. — *Athrepsies, Diarrhées et vomissements* des nourrissons; Colibacillurie.

Toutes Phosphaturies, le pH urinaire est abaissé à 6-5 1/2.

Toutes déchéances, Fatigues, Surmenages, Précancér.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.
Adultes : 2 à 4 ampoules par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire OLIVIÉRO
BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 27-06.)

BIOCRINA

Ampoules buvables (tubes scellés) de 5 cc.
(Méthode de Whipple).

Association d'Extrait de foie de cheval, de Plasma sanguin défibriné de cheval et de Nucléinate de fer soluble. (Procédé Alf. Daniel-Brunet et Oliviéro).

Indications. — Anémies, Hypoglobulie, Hypohémoglobinémie, Consommation, Atonicité, Convalescences.

Dose et mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau : eau sucrée, — eau gazeuse, — infusion froide, — à prendre 1/4 d'heure environ avant les deux principaux repas.

Enfants : à partir de 5 ans : 1 ampoule par jour avant l'un des repas.

Adultes : 2 ampoules par jour.

Prix : 28 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
62, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE
Tél. : Auteuil 11-86.

BIODARCINE

Elixir.

Puissant tonique, régénérateur, accélérateur de la nutrition et stimulant des fonctions vitales.

Composition :

Teinture de fénugrec désodorisé	6,25
— de cacao	5
— de coca	34
— de gentiane	5
Acide phosphorique	4
Glycéro-phosphate de soude liquide 40 p. 100	2,90
Phosphate de soude	3,70
Teinture de noix vomique	15

Excipient liquide aromatisé et Malaga : Q. S. pour 1000 cc.

Indications. — Convalescence, surmenage, états anémiques, neurasthénie, dépressions nerveuses, suites opératoires, pré-tuberculose, tuberculose, lithiase, faiblesse etc...

Ne contient pas d'arsenic. — donc pas de risque d'hémoptysie chez les bacillaires.

Présentation. — Flacon 1/2 litre environ.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à café. — *Adolescents* : 1 cuil. à soupe.

— *Adultes* : 1 verre à liqueur. Prix au public : 18 fr. 90.

Enregistré au laboratoire de contrôle des Médicaments sous le n° 888-8.

Laboratoire M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue Mélingue — PARIS (XIX°).

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude	0 gr. 05
Nucléinate de soude	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré	1 cc. 3
par ampoule,	

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

Prix : 13 fr. 75.

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Stryc	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

Prix : 11 fr. 75.

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude.....	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique	0 gr. 012
Sulfate de strychnine	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

BIOÉLIXIR

Reconstituant complet.

Composition. — Formule complète réalisant sous une forme euphorique (excipient = vins liquoreux de muscat).

1^o Une médication substitutive, Iode (iodure de fer), Phosphore (acides phosphorique et nucléinique), Arsenic (Méthylarsinate de soude), Calcium (chlorure de calcium);

2^o Une médication énergétique, comprenant :

a. Un amer héroïque (noix vomique).

b. Des amers exotiques (simarouba, coca, feuilles Yerba Santa).

c. Un stimulant nervin aromatique (écorce de Winter).

d. Un amer stomachique (condurango).

Indications. — Les convalescences médicales et chirurgicales, les anémies, l'asthénie, l'amaigrissement, les déchéances organiques.

Formes :

P. M. (450 cc. environ) : 16 francs.

G. M. (900 cc. environ) : 30 francs.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuillerée à bouche avant les deux repas.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00.)

BIOENTÉRASE

Admis à l'achat par le Ministère des Colonies.

Ampoules buvables.

Non toxique. Sans contre-indications.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pomiferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

Indications. — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons. Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocolite dysentérisiforme, colibacillose, eczéma, dermo-épidermite.

Propriétés. — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique, sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés. **Prévient ou fait disparaître l'athrepsie.**

Doses. — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTÉRASE s'emploie de la naissance à deux ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à leur sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'athrepsie.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou de l'eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables : 18 francs.

— 3 — 10 francs

Littérature et Échantillons :
69, rue de Wattignies — PARIS.

BIOGÉNOL

Composition. — Association Glycéro-arséniate de soude, Kola, Coca, Quinquina.

Indications. — Reconstituant général, accélérateur de la nutrition, tonique de la cellule nerveuse, stimulant de l'appétit. Anémies, Convalescences, toutes déficiences de l'organisme, Surmenage physique et intellectuel, Anorexie, Asthénie.

Formes. — Liquide, Granulé, Gouttes, Ampoules.

Posologie. — Liquide : un verre à liqueur avant les deux principaux repas.

Granulé : une cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas.

Ampoules : injection sous-cutanée, une ou deux par jour.

Prix : liquide et granulé : 16 francs ; Gouttes : 14 francs ; Ampoules : 12 francs (15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère).

BIOLACTYL

Ferments lactiques sélectionnés.

Formes :

Boîte de 10 flacons	24 fr.
— 6 flacons	18 —
— 2 flacons	8 —
Étui de 60 comprimés	14 —
Boîte de 6 tubes (caillage du lait).....	7 —

Indications :

Usage médical : Infections et auto-intoxications gastro-intestinales.

Posologie :

Comprimés : 1 à 6 par jour.

Culture liquide : 1 flacon par jour en 2 fois avant les repas (dans de l'eau sucrée).

Usage chirurgical : Pansements gynécologiques, Bouillie lactique (par mélange de poudre de lactose et biolactyl) pour pansements des périnés, Plaies infectées, Affections nasales et laryngées.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

BIOLIPASE « ROCHE »

Composition. — Extrait fermentaire lipolytique de foie de porc.

Indications thérapeutiques. — Cirrhoses avec ascite et œdèmes, ictères aigus ou prolongés par hépatite, états post-opératoires chez les sujets atteints d'insuffisance hépatique.

Contre-indications. — Cirrhoses avec ictère grave, ictères rétentionnels néoplasiques ou calculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule de 5 cc. par jour (10 Unités Butyrase par cc.) par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 6 jours. Deux jours de repos. Nouvelle série de 6 ampoules.

Selon gravité des cas : 3 à 6 séries.

Les injections de Biolipase « Roche » n'ont aucune action nocive sur les principaux appareils et sont toujours très bien supportées par les malades.

Recommandations très importantes. — Pendant la cure, faire observer au malade un repos absolu au lit, le soumettre à une alimentation lacto-végétarienne peu salée et n'appliquer aucun autre traitement. Ne pas faire d'injections de Biolipase « Roche » dans les 15 jours qui suivent une injection diurétique à base d'un dérivé mercuriel. Le traitement serait inefficace.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-76.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

BIONÉOL

Formes : 1^o Elixir.

	Par cuillerée à café.	Par cuillerée à soupe.
Méthylarsinate de soude	1 cgr.	3 cgr.
Acide nucléinique.....	2 cgr.	6 cgr.
Glycérophosphates.....	5 cgr.	15 cgr.
Strychnine (noix vomique)	0,1 de mgr.	0,3 de mgr.

2^o *Cachets.*

		par cachet
Méthylarsinate de soude	3 cgr.	—
Acide nucléinique.....	6 cgr.	—
Glycérophosphates.....	15 cgr.	—
Strychnine (noix vomique)	0,3 mgr.	—

Indications. — Anémies, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Neurasthénie, Paludisme, Débilité générale, Troubles de la croissance et de la puberté. Excitant de l'Appareil digestif.

Posologie :

De 3 à 6 ans, 2 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans, 3 — —

De 10 à 15 ans, 2 cuillerées à dessert par jour.

A partir de 15 ans, 2 cuillerées à soupe ou 2 cachets par jour.

A prendre après les repas.

Prix : *Elixir* : 14 fr., 10 jours de traitement.

Cachets : 14 fr., 15 jours de traitement.

Laboratoire du BIONÉOL

14, rue de Périgueux — ANGOULÊME.

BIO-ORGANIC

Granulés.

Reconstituant-type de l'enfant et des adultes délicats

Formule :

Tétragaïacolate de calcium.....	0 gr. 10
Inosito-héxaphosphate de calcium et de magnésium	1 gr.
Gluconate de calcium	4 gr.

Pour 100 gr.

Indications. — Troubles de la croissance, Déminéralisation, Faiblesse de constitution, Affections broncho-pulmonaires, Adénopathie, Lymphatisme, Convalescences.

Mode d'emploi :

Nourrissons : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant les 2 repas.

Adolescents ou adultes délicats : 1 cuillerée à bouche avant les 2 repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires P. REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00.)

BIOPHÈNE

Composition. — Chlorophylle, Carotène, Extrait de foie concentré et stabilisé, Extrait de rate concentré et stabilisé, Rumex crispus, Prêle, Carragaheen, Gluconates chaux, Ammonium, Magnésie, Manganèse, Plasma marin synthétique.

Indications. — Décalcification en général, tuberculose sous toutes ses formes, déséquilibre du système nerveux végétatif, Anaphylaxie, Hyperacidité gastrique, tous les états anémiques, Chlorose, surmenage, Insomnie.

Mode d'emploi. — Un cachet au milieu des 3 repas.

La boîte : 16 francs.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

BIOPHORINE GIRARD

Granulé.

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

Propriétés thérapeutiques :

Régulateur cardiaque, reminéralisant, apéritif, tonique, nerveux et musculaire.

Indications :

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Toutes convalescences, Surmenage physique et intellectuel.

Dose et mode d'emploi :

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 12 fr. 50

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48 rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire national n° 4551

BIOPHYTOL

Composition :

A. <i>Elixir.</i>	Extrait hématique total.....	10 cc.
	Méthylarsinate de sodium.....	0 gr. 03
	Nucléinate de manganèse	0 gr. 05
	Glycérophosphate de soude cristal	0 gr. 25
	Extrait de cola fraîche.....	0 gr. 75
B. <i>Comprimés.</i>	Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères. Q. S. P.....	15 cc.
	Extrait hématique total.....	0 gr. 60
	Méthylarsinate de sodium.....	0 gr. 01
	Nucléinate de manganèse	0 gr. 02
	Glycérophosphate de soude cristal	0 gr. 10
	Extrait sec de cola fraîche.....	0 gr. 07
	Sucre vanilliné. Q. S. P.	1 gr. 25

Indications. — Anémie, asthénie, surmenage, convalescences, ralentissements de la nutrition, amaigrissement, tuberculose, troubles de la croissance, lymphatisme, scrofule, rachitisme, paludisme, diabète.

Présentation et prix. — 15 francs le flacon de 187 cc. ou la boîte de 30 comprimés.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillère à soupe ou 2 à 3 comprimés au début des deux principaux repas. — *Enfants* : de 4 à 12 ans : 1 ou 2 cuillères à café ou 1 à 2 comprimés suivant l'âge, au début des deux principaux repas.

Laboratoire R. BOUYSSOU
CHAMBOIS (Orne).

BIOPLASTINE

Inscrite aux Assurances sociales.

Composition. — Association lécithine-éthers du cholestérol.

Propriétés. — Régularise le métabolisme cellulaire et le renouvellement azoté. Augmente le phosphate des tissus et provoque une augmentation de poids.

La BIOPLASTINE est entièrement assimilable.

Indications. — Tuberculose. Toutes les formes d'épuisement : croissance, rachitisme, lymphatisme, anémies, chlorose. Neurasthénie. Sénilité. Diabète. Autres maladies graves.

Présentation et prix. Type intramusculaire. — Amp. de 5 cc., la boîte de 6 : 28 fr. — Amp. de 1 cc. 5, la boîte de 10 : 19 fr.

Posologie. — 1 injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours. Il existe également un type spécialement préparé pour injection intraveineuse. 25 injections suffisent pour un traitement. Ces injections sont indolores.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). (Tél. : Dor. 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des Grandes Compagnies de Chemins de fer.

BIORÉGINE

Succédané de l'huile de foie de morue.

Vitamine C naturelle associée au tanin du noyer et du ratanhia iodotannique phosphaté.

Forme. — Élixir très agréable au goût.

Spécifique du Lymphatisme et de tous les états carentiels de l'enfant et de l'adolescent.

Le stimulant des scolaires. Reminéralisateur et tonique nerveux des adultes. Atoxique. Toujours bien toléré.

Posologie. — Par cuillerées à dessert ou à bouche 2 fois par jour avant les repas.

Enregistré au L. N. C.

Prix : 17 francs le grand flacon.

Dépôt OCP, toutes pharmacies et

Laboratoire CHAMBRON

PORTES (Drôme). Tél. : 21.

BIOSINE LE PERDRIEL

Glycérophosphate double de chaux et de fer effervescent.

Reconstituant énergétique. Ni intolérance, ni constipation, ni coloration des dents.

Indications. — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Suite de fractures, Hémorragies.

Doses. — 1 mesure (0,30 de Glycérophosphate) à 4 mesures par jour aux repas dans eau pure ou sucrée.

Prix : 18 francs.

LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

BIOSODINE

Composition. — Citrates alcalins naissants, phosphate de soude, bicarbonate de soude, sulfate de soude.

Indications. — Affections digestives, arthritisme, céphalées.

Présentation. — Granulé eupeptique, *effervescent*.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun, et avant les deux principaux repas.

Prix : 10 francs le flacon pour un traitement d'une semaine.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.
(Tél. : Avron 35-04.)

BIOSULFOL DUCATTE

Nouveau laxatif scientifique (à base de soufre).

Une forme : Dragées de 0 gr. 40.

Action thérapeutique et Usage. — Contre la constipation, les affections du foie et de l'intestin et leurs complications sur la peau.

Le *Biosulfol* a été réalisé par l'union des extraits biliaires et du soufre. C'est un laxatif à la fois doux et antiseptique.

Par ses extraits biliaires, le *Biosulfol* produit au même titre que la bile normale les mouvements péristaltiques de l'intestin. Par le soufre qu'il contient, le *Biosulfol* réalise l'antiseptie intestinale.

Le *Biosulfol*, par ses extraits biliaires, expulse microbes et toxines ; par son soufre, il les détruit.

Posologie et Mode d'emploi. — 1 à 4 dragées par jour.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS.

BIO-TITANE « PRIMA »

*Poudre médicale pour les soins de l'épiderme
du bébé et des adultes.*

Composition. — Oxyde de Titane, Ferments lactiques, Stéarate de zinc, Acide borique, Silicate de magnésie.

Indications. — Irritations et rougeurs des bébés, Démangeaisons, Varicelle, Impétigo, Urticaires, Erythèmes fessier, Escarres des vieillards, Eczéma.

Forme. — Boîte saupoudreuse.

Enregistrée au Laboratoire national de contrôle des médicaments, sous le n° 1 229-2.

Prix de vente au public : 8 francs.

Dépôt général :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

BIOTRIGON

Composition :

Élixir formule A. — Extrait fluide de fenu-grec désodorisé, Arrhénal, Manganèse.

Élixir formule C. — Extrait fluide de fenu-grec désodorisé. Chlorure de Calcium.

Dragées. — Extrait sec de fenu-grec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

INDICATIONS

Élixir formule A. — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

Élixir formule C. — Mêmes indications et malades présentant des lésions pulmonaires évolutives.

Dragées. — Mêmes indications.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au moment des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

BIOTRIGON HEPATIQUE
(Voir CARBOTRIGON)

Laboratoire Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

BIOXYOL

du D^r P. Bourgraff

Composition. — Anhydride titanique. — Diatomées stérilisées calibrées — Peroxyde de zinc (titré 50). — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — La pâte Bioxyol a une action très active sur les trois stades de la cicatrisation. Stimule la poussée vasculaire, active la poussée fibreuse, accélère et régularise l'épidermisation. Les cicatrices ainsi obtenues sont souples, non adhérentes aux plans profonds, à peine perceptibles.

Indications. — Plaies de toutes natures, post-opératoires, atones pertes de substances, ulcères phagédéniques, ulcères variqueux, etc... brûlures, radiodermites, chirurgie esthétique, varicelle.

Mode d'emploi. — S'en référer à l'opuscule édité par le Laboratoire du Praticien qui le tient à la disposition des médecins.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien,

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

BIPHÉDRINE

Vaso-Constricteurs + Antiseptiques

Biphédrine aqueuse : Ephédrine chlor. 1 %, Sol. au millième d'adrénaline 4 %, Novocaïne, Chlorétone.

États aigus : Coryzas, Rhinites, Rhumes de cerveau, Rhumes des foins, Sinusites, Asthme.

Biphédrine huileuse : Ephédrine base 0,50 %, Camphre, Eucalyptol, Essences terpéniques.

États subaigus et chroniques : Rhumes, Coryzas, Rhinopharyngites, Injections trachéales, Désinfection post-opératoire.

Mode d'emploi. — Instillations ou mœurs pulvérisations.

Particularité. — Un procédé spécial nous permet d'obtenir de l'éphédrine absolument pure, dénuée de propriétés irritantes, à action lente et prolongée. Notre huile végétale, rigoureusement neutre et stérile, ne rancit pas et ne laisse dans la gorge aucun goût âcre ou désagréable.

Prix : le flacon de 24 cc. : 13 fr. 50.

Laboratoires E. BOUCHARA

47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 94-65.)

BIS-HYD

Bismuth-Hydrargyre.

Ampoules de 2 cc. et 3 cc. dosées à 0,02 de Bimétal par centimètre cube. Suspension huileuse d'éléments *chimiques*: Iodo-bismuthate de quinine; traces de Hg et Cu (Catalyseurs) et d'éléments *biologiques*: Lipoides cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une *thérapeutique antisypilitique complète*.

« Il accroît par catalyse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. Schumacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action;

1° *Spécifique vis-à-vis du spirochète* par l'ensemble de ses composants chimiques;

2° *Non spécifique* mais immunisante de l'organisme par ses composants biologiques: lipoides cérébraux et testiculaires.

Posologie. — Traitement d'attaque: 2 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine.

Traitement d'entretien: 1 à 2 ampoules de 2 cc. par semaine.

Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier).

Prix:

La boîte de 12 ampoules à 2 cc.: 36 francs.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

BIS-KA-MA

POUDRE MICELLAIRE

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, édulcorant vanillé.

Action. — Réalise le pansement par « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux trois repas au moment des malaises ou des douleurs.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les aérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun dans un verre d'eau.

Le flacon. Prix : 20 francs.

La boîte triple dose. Prix : 45 francs.

DRAGÉE

Composition et Indications. — Les mêmes que BIS-KA-MA poudre. Les Dragées sont préparées spécialement pour les malades ambulatoires.

Sucer lentement 1 à 4 dragées au moment des douleurs.

L'étui aluminium pour la poche : 13 fr. 50.

Le flacon réserve de 4 doses : 35 francs.

SUPPOSITOIRE

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxidibromofluorescéine, Oxyde de Bismuth, Ephédrine, Jusquiame, Ciguë, Hédobutyl, Hypalène, Mucilage de Guimauve, Kaolin colloïdal.

Indications. — Hémorroïdes, Fissures anales, Ulcérations, Sphinctéralgies.

Au-dessus de 12 ans : 1 suppositoire après l'évacuation des selles et 1 suppositoire le soir au coucher.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 suppositoire.

Prix :

La boîte de 6 suppositoires : 13 francs.

La boîte de 18 suppositoires : 29 francs.

PANSEMENT RECTO-COLIQUE

Granulé à émulsionner dans l'eau pour lavement.

Composition. — Oxyquinoléine, Sous-Gallate de Bismuth, Ciguë, Mucilage de Guimauve, Hypalène, Kaolin colloïdal, Oxyde de Zinc.

Indications. — Colites, Rectites, Sigmoidites, Infections génito-urinaires, Salpingites.

Au-dessus de 12 ans : A) Lésions sphinctériennes ou génito-urinaires : 1 mesure de granulé dans 5 cuill à soupe d'eau tiède.

B) Lésions des côlons sigmoïde et iliaque : 2 mesures dans 10 cuill. à soupe d'eau tiède.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 ou 1/4 de dose.

La boîte : 18 francs.

La boîte triple dose : 40 francs.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis.

ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34.

BISMHYDRAL

Composition. — Association définie et stable de chlorure mercureux léger pur et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (D^r Milian). Chologogue doux.

Indications. — Syphilis (à toutes les périodes et sous toutes ses formes ; cure complémentaire d'entretien discrète par voie buccale, la boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies).

Insuffisance hépato-biliaire.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Posologie. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Prix : 13 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

BISMOKAOL

Pansement gastrique.

Action. — Associe l'action cicatrisante du bismuth et du kaolin à l'action sédatrice et analgésique de la belladone et de la codéine. (Ne constipe pas.)

Indications. — Ulcères, Hyperchlorhydrie, Gastralgie, etc.

Formule :

Kaolin colloïdal	72,5
Carbonate de bismuth léger.....	5
Magnésie hydratée	12,5
Codéine	0,10
Belladone pulvérisée	0,10

Pour 100 grammes.

Posologie. — De 2 à 4 paquets par jour, avant ou après les repas, de préférence le matin à jeun.

Présentation. — Poudre en sachets de 5 grs.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

BISMUCARBONE

Composition. — Charbon très pur à pouvoir absorbant décuplé par procédé spécial, bismuth (sous-nitrate) argent colloïdal, bile dépigmentée et décholestérinée, citrates de soude et de formine.

Forme. — Granulé fondant.

Indications. — Aérophagie ; Diarrhée verte des nourrissons ; Toutes les infections hépato-gastro-intestinales.

Fosologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à café en 3 ou 4 fois, par jour.

Enfants de 2 à 12 ans : 2 cuillerées à café en 4 fois, par jour.

Adultes : 1 à 5 cuillerées à café, par jour.

Se prend délayé dans de l'eau, vin ou lait, ou simplement en croquant ou laissant fondre le granulé dans la bouche comme un bonbon.

Prix : 15 francs.

Durée : environ 10 jours.

Échantillons :

Laboratoires du BISMUCARBONE

7, Petite-Place — DOUAI (Nord).

(Tél. : 2-38.)

BISMUSODINE

Granulée.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité — Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. — Antisepsie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

Prix : 16 fr. le flacon d'environ 25 cuill. à café.

Laboratoires S. A. R. L. au capital 100 000 fr.

O. CHAMARD et R. NIEL

Inspecteur des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

BISMUTH ADRIAN

Composition. — Complexe bismuthique riche en oxyde de bismuth hydraté, sans excipient ni produit étranger.

Propriétés. — Pansement gastrique. Saturant de l'acidité gastrique. Antiseptique et cicatrisant gastro-intestinal. Parasiticide intestinal. Antiseptique dermatologique. Utilisable pour le radio-diagnostic.

Indications. — Hyperchlorhydrie, aérophagie, entérites aiguës et chroniques, gastralgies, infection intestinale, ulcères de l'estomac et du duodénum, cancers gastriques et intestinaux, parasitose intestinale (ascaris, nématodes, oxyures), antisepsie des ulcères et plaies en dermatologie, irritations cutanées.

Indication particulière : examens radioscopiques.

Présentation. — Poudre.

Posologie et mode d'emploi :

1^o A l'intérieur : délayer la poudre dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Adultes : 5 à 20 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. suivant l'âge.

2^o Parasitose intestinale :

Adultes : 10 à 15 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. par jour.

Cure de 7 jours, faire suivre d'une légère purgation au calomel.

3^o A l'extérieur (dermatologie).

Poudre, pommade ou glycérolé à 5 % en applications locales.

Prix :

Boîte de 50 gr. : 18 francs.

Boîte de 100 gr. : 30 francs.

Boîte de 200 gr. (pour examens radioscopiques) : 54 francs.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anct. ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

BISMUTH B-3

Composition. — Suspension homogène de sels de Bismuth (carbonate, sous-nitrate et salicylate) dans un mucilage. Une cuillerée à soupe renferme 1 gr. de sels de Bismuth.

Indications. — Toutes les affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin, *ulcère*, colites, etc... Parasitoses intestinales (oxyures) Rectites (en petit lavement à garder).

Posologie. — 1° Affections gastriques 2 à 3 cuillerées à soupe par jour avant les repas.

2° Affections intestinales, 1 à 3 cuillerées à soupe par jour à jeun, ou une heure avant les repas.

3° Rectocolites, 2 à 5 cuillerées à soupe en lavement à garder toute la nuit.

Présentation et prix. — Crème aromatisée.

En flacon de 300 cc. : 20 francs.

En flacon d'un litre : 45 francs.

Laboratoires L. BORNÉ

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences.
5, boulevard des Brotteaux — LYON.

CRÈME DE BISMUTH

du D^r QUESNEVILLE

Préparation créée en 1856 et toujours préconisée depuis 80 ans dans toutes les indications du Bismuth en thérapeutique gastro-intestinale.

Innocuité et action favorable confirmées par la plus longue expérimentation.

Composition. — *Hydrate de bismuth neutre* obtenu à l'état de *précipité gélatineux* par le procédé du D^r Quesneville et conservé en suspension dans de l'eau. Sans mélange avec aucune matière étrangère.

Indications. — Traitement de tous états inflammatoires et affections lésionnelles du tractus digestif. Thérapeutique symptomatique des troubles fonctionnels (douleurs gastriques, pyrosis, spasmes, diarrhées, etc.).

Doses. — 1 à 5 cuillères-mesure dans de l'eau ou du lait (1 à 5 fois par jour), fournissant un lait de bismuth sans odeur ni saveur, facilement accepté.

La stabilité de l'hydrate de bismuth permet de lui associer d'autres médicaments sans altération (solutions d'alcaloïdes, teintures, sirops, produits opothérapiques, etc...).

Prix. Le flacon avec cuillère-mesure en os : 19 francs (100 cuillères-mesure).

Crème de BISMUTH CHLORO-MAGNÉSIEENNE du D^r QUESNEVILLE

Composition. — Addition de Chlorure de magnésium et de Phosphate bicalcique à la Crème de Bismuth du D^r Quesneville.

Reminéralisation magnésienne associée à l'action topique du Bismuth. Conditions favorables à la cicatrisation des lésions ulcératives ou autres, consécutives à des gastrites, entérites, colites *chroniques* et à certaines maladies infectieuses.

Application à la cure de la *colibacillose*.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans de l'eau deux fois par jour. Médication à renouveler périodiquement.

Le flacon pour 10 jours : 16 francs.

Laboratoire QUESNEVILLE

L. COLLESSON, Pharmacien, Licencié ès sciences,
5, rue d'Angoulême — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 18-08.)

BISMUTH DESLEAUX

Pansement Gastro-Intestinal Idéal.

Au carbonate de bismuth amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal de choix à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène et uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate.

Indications. — Ulcus, ulcérations gastriques et duodénales, hyperchlorhydrie, gastrites, ulcère peptique, entéro-colites, colibacillose, aérophagie, suites d'opérations gastriques, oxyurose.

Présentation. — Poudre impalpable de goût agreable. Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit.

Posologie. — *Pansement gastro-intestinal* : 12 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit 1 à 3 mesures 3 fois par jour, prises à jeun, matin, midi et soir, une 1/2 heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau.

Aérophagie : 6 à 12 grs. (1 à 2 mesures) par jour à jeun.

Colibacillose : 30 à 40 gr. par jour à jeun par cures de 7 jours.

Oxyures : Adultes, 30 gr. (5 mesures), enfants, 20 gr. (3 mesures) ; petits 10 gr. (2 mesures), par jour le matin à jeun. 2 à 3 cures de 7 jours espacées de 7 jours de repos, suivies d'une légère purgation.

Prix : 20 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Elysées 17-46.)

BISMUTHION

Description. — Le Bismuthion est un complexe colloïdal isotonique de Bismuth et or dans l'eau distillée, obtenu par procédé électrique et destiné au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement, syphilis nerveuses, tabès, hérédosyphilis.

Prix : 30 francs pour 6 à 18 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal à grains fins.

Ampoules.

De 2 cc. titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Sériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide,

Syphilis.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi. — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Prix : 24 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

BISMUTH TULASNE

Pansement Gastro-Intestina

Composition :

Sous-nitrate de bismuth polybasique 65 grammes

Kaolin lavé et gomme blanche, 35 —

Propriétés. — Pureté chimique contrôlée, degré d'acidité bien au point et constant garantissant une innocuité absolue même aux plus hautes doses. Action sédative, cicatrisante et antiseptique puissante et rapide. Forme avec l'eau un mélange homogène, facile à boire, adhérent fortement à la muqueuse et insoluble dans les sucs digestifs. Supérieur au carbonate de bismuth et aux sous-nitrates dits « légers ». Action laxative aux fortes doses (15 à 20 gr.), constipante aux faibles doses (5 gr.).

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boîtes de 10 sachets	22 fr.
— 30 sachets	55 —
— 100 sachets	154 —

Remboursé par les Assurances sociales. Contrôle n° 91-1.

Indications et Posologie (Chaque prise dans 2/3 de verre d'eau environ).

Estomac : Ulcères, Gastrites : 1 à 3 sachets (10 à 30 gr.) soit en une seule fois le matin à jeun, soit en 2 ou 3 prises, au réveil et une demi-heure avant les repas.

Dyspepsies : 1 sachet (10 gr.) en se mettant à table.

Vomissements, Aérophagie : 1 sachet dans un verre d'eau en 3 ou 4 fois dans la journée.

Le produit peut se prendre également après les repas.

Intestin : Entérocrites, Troubles fonctionnels (diarrhée, constipation), Fermentations, Ballonnements, Intoxications, Troubles circulatoires, nerveux (migraines), psychiques (angoisses), d'origine intestinale.

Avec diarrhée prédominante : 1 demi-sachet (5 gr. environ) une demi-heure avant les deux repas. Avec constipation : 2 sachets (20 gr.) le matin à jeun. Si cette dose occasionne une diarrhée anormale, on la fera diviser en deux prises, un sachet avant les deux repas.

Colibacillose : 1 sachet (10 gr.) une demi-heure avant les 2 repas.

Oxyurose. Adultes : 1 sachet et demi (15 gr. environ) le matin à jeun.

Cas rebelles : 1 sachet le matin à jeun et 1 sachet une demi-heure avant le repas du soir.

Enfants : de 3 à 7 ans : 1 demi-sachet (5 gr. environ) ; de 7 à 12 ans : 1 sachet (10 gr.). En une seule fois le matin à jeun ou en deux prises égales dans la journée comme ci-dessus.

Cures de 5 jours espacées par 6 jours de repos. Purgation entre chaque cure. Les lavements d'eau salée sont bien indiqués concurremment.

SOUS-NITRATE DE BISMUTH TULASNE

Pur

Composition. — Sous-nitrate de bismuth polybasique absolument pur.

Propriétés, Indications, Posologie. — Mêmes propriétés, mêmes indications et même posologie que le *Bismuth Tulasne*.

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boîtes de 10 sachets	28 fr
— 30 sachets	72 fr.
— 100 sachets	188 fr.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01)

BISSYL

Composition. — Silicate de Bismuth chimiquement pur.

Produit obtenu synthétiquement et se décomposant sous l'action du suc gastrique en acide silicique et bismuth à l'état de division moléculaire.

Propriétés. — Réunit les propriétés de l'acide silicique et du bismuth.

Denué de toxicité, anti-infectieux, anti-acide, cicatrisant. — Traitement gastrique et intestinal, efficace sous faibles doses. — Pas d'accoutumance, même après administration prolongée.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou chroniques du tractus gastro-intestinal : crampes, brûlures, dyspepsies hyper et hypo-acides. Leurs complications : gastralgie et gastrite, gastro-entérite, entérite, entérocolite, ulcus de l'estomac et du duodénum.

Présentation et prix. — 16 fr. la boîte de 20 cachets.

Posologie. — 1 ou 2 cachets avant les repas (plus si nécessaire). Reprendre 1 cachet après les repas en cas de douleurs.

Laboratoire du BISSYL

117 ter, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

(Tél.: Mont. 23-54).

BISTOMAX

Composition. — Carbonate basique de bismuth pur, léger, de fabrication spéciale.

Propriétés. — Pansement gastro-intestinal, anti-infectieux, cicatrisant, sédatif ; d'innocuité absolue.

Indications. — Poussées évolutives des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin : Ulcères, Colites, Colibacillose.

Présentation. — Poudre impalpable, donnant mélangée à l'eau un lait homogène de saveur agréable.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à potage (suivant les cas) prises à jeun trois fois par jour, dans de l'eau ou de la tisane, 1/2 heure au minimum avant les trois repas : matin au réveil, midi et soir.

Prix : 25 francs.

LANCOSME. — 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

(Tél.: Élysées 17-46.)

BIVATOL

Formule. — Carboxéthyl, Méthyl nonoate de bismuth. Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Indications thérapeutiques. — Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien. Provoque la négativation rapide et la disparition de tous accidents. A utiliser chez les hérédos et les femmes enceintes.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides :

Adultes : 12 ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 07 de bismuth métal.

Enfants : 10 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal. Chaque boîte constitue une cure.

Posologie :

Adultes : 12 injections de 2 cc. faites intramusculaires, à raison d'une tous les 2 jours pendant la première semaine, puis de 2 par semaine.

Enfants : 1/10 de cc. par semaine jusqu'à 3 ans ; 1/2 cc. par semaine de 3 à 5 ans : 1 cc. par semaine, à 10 ans.

La boîte de 12 ampoules de 2 cc. (*adultes*)..... 25 fr.

La boîte de 10 ampoules de 1 cc. (*enfants*) 20 fr.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

BLAGNY

Dans toutes les *toux* de toutes origines, s'administre facilement grâce à ses trois formes :

Gouttes, Dragées, Sirop.

Sa formule. — *Éthylmorphine, Codéine, Bromoforme, Éphédrine, Drosera, Aconit, Eau de Laurier-Cerise.*

Mode d'emploi. — *Adultes* : L gouttes = 1 cc., correspondant à 2 dragées et à 1 cuillerée de sirop, 4 à 5 fois par jour.

Enfants : de X à XXX gouttes suivant l'âge, 4 à 5 fois par jour. — 1 à 2 dragées par jour à partir de 10 ans.

Laboratoire du BLAGNY

René PALÉMA, Pharmacien,

85, rue Turbigo — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 12-39.

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée, et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1 *gramme par biberon et par mois d'âge*. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 *cuillerées par biberon*. A partir du 7^e mois : 1 *cuillerée à soupe par repas*, 1 1/2 à 2 *pour les adultes*.

Prix : La boîte 375 gr. 8 fr. 50.

Nota. — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Blécao. — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le *Blécao*, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle. Prix : La boîte 250 gr. 6 francs.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10 000 000 de frs
VILLEFRANCHE (Rhône).

BLENNOPIAT

Composition. — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine. Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

Action thérapeutique. — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

Indications. — Blennorragie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Urétrites.

Mode d'emploi. — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 15 fr. 50 la boîte.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe
78, Cours de la Liberté — LYON.
(Tél. : Moncey 13-37.)

BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie.

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragie aiguë et chronique, ainsi que ses complications.

Posologie. — 1 à 3 pilules, 3 fois par jour, une 1/2 heure avant les repas jusqu'à réaction locale et générale. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'activité spécifique de ce vaccin buccal anti-blennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Préventif et Curatif. Supprime rapidement l'écoulement. Jugule les douleurs. Évite ou guérit toutes complications.

Prix : 45 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 21-69.)

BLOCS « VECOR »

Complexe phytothérapique.

Forme. — Carrés fondants. Succédanés du café et du thé.

Composition. — Gui, Prêle, Aubépine, Oranger, Cassis, Anis.

Indications. — Hypertension, Palpitations, Azotémie, Sclérose, Aérophagie.

Mode d'emploi. — Solution chaude après les repas.

La boîte de 18 carrés : Prix : 20 francs.

Laboratoires H. AMMANN, Pharmacien
3, Impasse Adam
BOULOGNE-BILLANCOURT.
(Tél. : Molitor 01-90).

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Alcaloïdes totaux du Boldo.

Emplois thérapeutiques :

Toutes les *insuffisances hépatiques*. Cirrhoses hypertrophiques, Cholécystites chroniques, Lithiase biliaire, Congestion du foie, Ictère. Constipation chronique.

Mode d'emploi :

De 2 à 6 granules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.
(Tél. : Nord 40-58.)

BOLDOCHOL

Gouttes titrées.

Composition :

Extrait fluide de boldo	38 gr.
Extrait fluide d'artichaut	38 —
Extrait fluide de rhubarbe.....	11 —
Extrait fluide de combretum.....	11 —
Excipient. Q. S. pour	100 —

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Ictères, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Intoxications alimentaires, Dermatoses, Migraines, Urticaire, Troubles digestifs, Maladies des pays chauds, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : XXV à XXX gouttes.

Enfants : X à XV gouttes.

Deux fois par jour dans un peu d'eau de Vichy. Cure de trois flacons avec arrêt de dix jours entre chaque.

Prix : 16 fr. 50 le flacon de 45 grammes.

Laboratoire du BOLDOCHOL

145, Chemin de la Madrague-de-Montredon.
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).

BOLDOCRINOL

Anciennement : Boldobiline Jammes

Boldo et Opothérapie biliaire.

Opothérapique utilisé en parfait état d'activité thérapeutique grâce à une date limite d'utilisation portée sur chaque boîte.

Le BOLDOCRINOL est le plus physiologique des cholérétiques. Rééducateur idéal du foie et de l'intestin, il réalise un drainage biliaire sans brutalité, évitant surtout la violente chasse biliaire des sels magnésiens et sodiques.

Constipation, Hépatisme, Infections intestinales, Coliques hépatiques, etc.

6 à 8 comprimés par jour.

La boîte de 60 comprimés : 14 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — Paris (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 51-85.)

BOLDOCYNA**Composition :**

Boldine.....	0,001
Extrait sec purifié de <i>Cynara scolymus</i>	0,10
Pour 1 comprimé.	

Indications :

- 1° Dans les *affections hépatiques* : l'insuffisance hépatique, les congestions du foie, les hépatites simples ou avec ictères, les cirrhoses, les coliques hépatiques et leurs complications, les cholécystites.
- 2° Dans les *manifestations digestives, rénales, cardio-vasculaires, cutanées, humorales* des hépatiques.
- 3° Comme le complément naturel et indispensable des cures hydrominérales de Brides, Contrexéville, Pougues, Vals, Vichy, Vittel.
- 4° Comme préventif et curatif des affections hépatiques des pays chauds.

Posologie :

De 2 à 5 comprimés par jour au moment des repas.
Prix : 12 francs.

Laboratoires du BOLDOCYNA : A. JOURDIN
6, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

BOLDO GMET

Composition. — Extrait *total liquide sans alcool ni sucre* renferme tous les principes actifs de la feuille de boldo fragrans ; correspondant à 2 grammes de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Cholagène et cholagogue. Diurétique, Stimulant antiseptique du foie et de la vésicule. Facilite l'élimination des calculs.

Indications. — Tous les troubles hépatiques. Insuffisance, Congestion, Anorexie, Constipation, Entérocolite, Neurasthénie des hépatiques, Lithiase biliaire, Cholécystite, Pyélonéphrite, Grossesse, Cellulite.

L'absence d'alcool rend le Boldo Gmet plus efficace que les teintures ; la présentation liquide et la présence des huiles essentielles et des matières aromatiques le font préférer aux granules de Boldine (ne contenant que l'alcaloïde de la plante) et aux teintures ou autres extraits alcoolisés.

Très employé pour les coloniaux. Prépare le foie à la cure thermale (Vichy, etc...), dont il maintient les effets.

A donner un mois avant une intervention sur le foie ou la vésicule et au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude au repas du soir ou à défaut le matin à jeun.

Prix : Le flacon pour 1 mois : 18 francs.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoire GMET

27, rue du Fg.-Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10).

BOLDOINE ÉPARVIER

Forme. — Granulé fin sucré.

Composition. — 1 cuillerée à café équivaut à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

Action. — Cholagogue, Stimulant général, Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'éli-mination des déchets (urée).

Indications. — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies.

Posologie. — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude. « Très bien acceptée par l'enfant ».

Échantillons et littérature :

Laboratoires ÉPARVIER

26, grande rue Saint-Clair — LYON.
(Tél. : 150-21.)

BOLDOLACTIC LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Ext. de feuilles d'artichaut.....	0,10
Ext. de boldo	0,05
Ext. biliaires dépigmentés	0,05
Ferments lactiques sélectionnés	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02

Pour un comprimé.

Actions thérapeutiques. — Spécifique des mala-dies de la cellule hépatique et des voies biliaires.

Indications. — Ictère, Cholécystite, Angiocholite, Cirrhoses, Congestion hépatique, Dyspepsie bi-liaire, urticaire et dermatoses.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour, 3 à midi et 3 le soir avant les repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 14 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).
(Tél. : Moncey 14-35):

BOLDOLACTOL

Composition. — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires dépigmentés et décholestérinés et de boldine (1/2 mgr. de boldine par comprimé).

Propriétés. — Empêche les fermentations intestinales, excite la sécrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques, laxatif.

Avantages. — Conservation indéfinie, tolérance digestive parfaite.

Indications. — Affections hépatiques, Entérites, Auto-intoxication intestinale, Diarrhées paludéennes, Constipation chronique.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour
20 jours par mois.

La boîte de 60 : 12 francs.

Laboratoires A. SALLES

11, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

(Tél. : Provence 10-01.)

BOLDOLAXINE

Laxatif à base de feuilles fraîches de boldo.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes.

Avantages. — Laxatif physiologique. Action douce et certaine, assurant des selles naturelles. Dépourvu d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi. — Un comprimé une demi-heure avant le repas du soir.

Enfants : demi-comprimé.

Présentation et prix. — 12 francs le flacon pour 25 jours de traitement.

Laboratoire Émile CHARPENTIER

7, r. du Bois-de-Boulogne — PARIS (Tél. : Pas. 55-46.)

BOLDOLIVE

Composition. — Huile d'Olive Vierge naturellement neutre et stable combinée par procédé spécial avec Extrait total de Boldo (glucoside, alcaloïde et extrait sec).

Propriétés. — Excitant de la sécrétion biliaire. Agent de drainage biliaire. Rééduque la fonction intestinale. Constitue un pansement de la muqueuse.

Indications. — Angio-cholécystites, cholécystatonie, lithiase biliaire, typhlo-cholécystite, syndromes entéro-hépatiques, colites, stase intestinale droite, ictères et suites d'ictères.

Présentation et Posologie :

- 1° *En solution* : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun ou le soir au moment du coucher.
- 2° *En capsules* : 2 capsules de 3 grammes ; 3 capsules de 2 grammes ; 4 perles de 1 gramme ; correspondent à une cuillerée à soupe ; vingt minutes avant les repas.
- 3° *En suppositoires (adultes ou enfants)* : 1 ou 2 suppositoires à quelques minutes de distance le soir ou 1 suppositoire au coucher et un au réveil.

LES LABORATOIRES DU PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

(Voir Suppolive, Dermolive et Sulfolive.)

BOLDOMUCYL

(Granulé.)

Composition :

Mucilage gommeux Normucyl	45 gr.
Charbon végétal activé	10 gr.
Extrait de Boldo	1 gr.
Extrait d'Artichaut	1 gr.
Excipient non sucré. Q. S. pour	100 gr.

Mode d'action. — Accroît et accélère la sécrétion biliaire. Possède une action absorbante, antiseptique et antitoxique. Assure l'évacuation normale de l'intestin sans l'irriter.

Indications. — Constipation en particulier chez les hépatiques (syndrome entéro-hépatique). Intoxications intestinales. Insuffisance biliaire. Fermentations.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café au cours des deux principaux repas. Prendre le granulé sec, sans mâcher, et l'avaler en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix : 18 francs la boîte de 200 gr. de granulé (pour un traitement de 15 à 20 jours).

Laboratoires CHATRON

45, rue Cambronne — PARIS (XV°).

Tél. : Ségur 26-79.)

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Prix : 16 francs.

Traitement de l'unité vente : 20 à 25 jours.

Laboratoire VERNE

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE

Téléphone : 19-84.

BOLÉASE MONAL

Médication spécifique des maladies du foie et de l'intestin

Forme. — Globules glutinisés.

Composition. {	Extrait de Boldo	0,05
	— de Bile.....	0,10
	Calomel.....	0,005

Propriétés. — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestion, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérite muco-membraneuse, constipation, auto-intoxications.

Doses. — 4 à 6 globules par jour.

Le flacon de 50 globules : 14 francs.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.

BOLÈNE

Traitement de la Constipation
par régularisation des fonctions hépato-biliaires.

Composition. — Sels biliaires, Poudre de muqueuse intestinale, Hexaméthylène-tétramine, Rhamnus frangula, Agar-agar.

Mode d'action. — Rééducation et désinfection de l'intestin par l'association de l'opothérapie biliaire et intestinale à l'hexaméthylène-tétramine.

Action douce et régulière. Pas d'accoutumance.

Présentation. — Comprimés dragéifiés de 0 gr. 50.

Doses et mode d'emploi. — Commencer par 2 comprimés avant le repas du soir. Augmenter ou diminuer la dose suivant les résultats obtenus. Prix : 10 fr. la boîte de 60 comprimés (traitement de 25 à 30 jours).

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

BORICINE MEISSONNIER

Tétraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du baborate de sodium.

Infiniment supérieur à ses composants par :

1^o *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.

2^o *Sa solubilité.* — 16 p. 100 à froid } dans
75 p. 100 à l'ébullition } l'eau.
parties égales dans la glycérine.

3^o *Son pouvoir bactéricide.* — Stérilisant à 6 p. 100.

4^o *Sa non-précipitation des alcaloïdes et son inaction sur les n.é.taux.*

Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptie générale de la peau et des muqueuses, conjonctives, otites, ozène, stomatites, dermatoses, voies urinaires; gynécologie, plaies, brûlures. Bains.

Mode d'emploi :

En poudre : Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 8 gr. **Boricine.**

Laboratoires Jacques LOGEAS

71, avenue de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique
des Affections nerveuses de toute nature.

Constitution. — Solution aqueuse de Tartrate boricosodique chimiquement pur dosée à 1 gr. par cc.

Propriétés. — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

Indications. — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névrose, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du facies du malade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Administrer à doses progressives de 2 à 10 grammes par jour, mais, en raison de sa parfaite innocuité et de sa très faible toxicité, cette limite peut être, dans certains cas, notablement dépassée sans aucun inconvénient.

Demi à 2 cuillerées à café de solution en deux fois dans un demi-verre d'eau sucrée, à la fin des principaux repas.

<i>Enfants</i>	{	1 à 2 ans :	Demi	à 1 cuillerée	à café	{	de SIROP par jour.
		3 à 4 ans :	1	à 2 cuillerées	à café		
		5 à 7 ans :	2	à 4 cuillerées	à café		
		8 à 14 ans :	4	à 6 cuillerées	à café		

Formuler. — *Adultes* : Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE.

Enfants : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

Prix : 25 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances
cutanées ou muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; 3° Huile ; 4° Ovules à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqûres, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 11 francs ; tube, 10 fr. 50 Huile, 20 francs ; ovules, 18 francs.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL**, Pharmacien
4, avenue Orban.

BOUES RADIOACTIVES RHEMDA

L'activité permanente des Boues Rhemda est due à la présence de corps actifs tels que l'ionium, l'actinium, le polonium, l'uranium, séparés au cours de la fabrication du Radium et du Mésothorium.

De même essence que les Boues naturelles (Dax, etc.), mais 50 fois plus actives, elles conservent indéfiniment leurs propriétés.

Elles peuvent être utilisées pour les Rhumatismes divers, les Lumbagos, la Goutte, la Sciatique, les Maladies cutanées, les Ulcères variqueux et comme stimulantes sous forme de lotions, de bains, de cataplasmes ou d'emplâtres.

Mode d'emploi. — Pour un bain complet délayer de 250 à 300 grammes de Boue dans l'eau du bain. Pour les bains locaux délayer de 10 à 20 grammes par litre d'eau.

Boîte :	2 kg.	1 kg.	1/2 kg.
Prix au public :	50 fr.	38 fr.	23 fr.
Prix médical :	35 fr.	26 fr. 60	16 fr. 10

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Wagram 58-89.) R. C. 255-068 B.

BOULES QUIES

Dormir et travailler au milieu des bruits.

Boules plastiques adoptant exactement la forme du conduit auditif, point de fusion plus élevé que la température maximum du corps. Antivibrateurs, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Indications. — Accessoire précieux de la thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades. Contre les bruits de la rue, de l'usine, de l'hôtel, etc...

Permettent aux aviateurs d'atténuer à volonté les bruits des moteurs ou la déflagration des mitrailleuses (long usage).

Indispensables aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans les oreilles.

Echantillons sur demande :

Laboratoires « QUIES »

8, rue Auguste-Chabrières — PARIS (XV^e).

(Tél. : Lecourbe 85-68.)

BOVCARDIAC LEFRANCO

(Organozymothérapie Cardiaque).

Présentation et Composition :

Ampoules buvables.

Le *Bovcardiac* renferme par ampoule tous les ferments et principes solubles contenus dans 25 gr. de fibre musculaire de cœur de bœuf frais, concentrée à froid et dans le vide.

Propriétés. — Renforce la contractibilité du myocarde. Complète toutes les médications cardiaques.

Indications. — Asthénie cardiaque, irritabilité et instabilité, tachycardie, myocardite, asystolie, troubles cardio-pulmonaires, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Posologie. — 2 à 3 ampoules buvables par 24 heures dans 1/4 de verre d'eau, pendant 10 jours.

Même posologie, 3 fois par semaine dans les cures d'entretien.

Demi-dose pour les enfants.

Prix : 29 francs la boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

Les Laboratoires de la **CARNINE LEFRANCO**

ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

BOVHÉPATIC LEFRANCO

Composition :

Suc hépatique total et soluble concentré à froid...	50 gr.
Sirop simple vanilliné.....	35 —
Glycérine pure à 30°	15 —

Indications et Posologie :

Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses auto-toxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques...
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie, purpura...
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses. Forme sèche : Voir *Extrait hépatique Lefrancq*.

Prix : 29 francs la boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

Les Laboratoires de la **CARNINE LEFRANCO**

ROMAINVILLE (Seine),

(Tél. : Nord 19-52).

BOVSTROL LEFRANCQ

Complexe organochimique.

Auxothérapie.

Composition :

Sulfate de Strychnine	1/2 mgr.
Glycérophosphate de Na.	0,25
Suc musculaire de bœuf cru à haute concentration glycériné et sucré	13 gr.

Propriétés. — Tonique musculaire et nervin, aliment de la cellule nerveuse, mais non excitant, reminéralisant.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, rachitisme, lymphatisme, neurasthénie, tuberculose, anémies de toutes natures grossesse.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc.

Prix. — La boîte de 10 ampoules : 27 francs.

Le coffret de 20 ampoules : 48 francs.

Posologie. — 2 ou 3 ampoules par jour pendant 10 jours, arrêter 10 à 20 jours entre 2 cures. Demi-dose pour les enfants.

Nota. — Éviter absolument les liquides chauds, la chaleur détruisant les ferments de la viande crue.

Les laboratoires de la CARNINE LEFRANCQ

ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52).

BRADYGASTRINE DUCLOY

Modérateur de la sécrétion gastrique.

Formes. — Granulé. — Comprimés.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

Propriétés thérapeutiques. — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Modératrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 5%.

Indications. — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Contre-Indications. — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardiaques.

Posologie. — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

Prendre une nouvelle dose ; au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate ; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est passagère.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 21 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

BROMADYL VICARIO

Brom-diéthyl-acétyl-carbamide.

Comprimés à 50 centigrammes.

Sédatif léger

Particulièrement indiqué dans les troubles neurasthéniques, phobies, etc.

Provoque rapidement le sommeil et, au réveil, ne laisse pas au malade l'impression pénible de dépression nerveuse.

Posologie. — *Comme hypnotique*, 1 ou 2 comprimés dans une infusion chaude, le soir.

Comme sédatif, 1/2 ou 1 comprimé, 3 ou 4 fois par jour, dans l'eau froide.

Le tube de 10 comprimés : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action sédatrice et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 16 fr. 60. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 13 fr. 60. *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 16 fr. 60 — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 16 fr. 60.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS
(Tél. : Gobelins 23-90.)

BROMIASE

Description. — Capsules glutinisées contenant:

Bromure de potassium	0 gr. 30
Bromure d'ammonium	0 gr. 20
Levurine extractive	0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Prix : 30 francs pour 8 à 25 jours de traitement

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BROMOCARBONE

Bromure de calcium	0,12
Charbon activé	0,15
Sucre anisé	Q. S. pour une tablette.

Propriétés :

Du charbon activé : absorbe l'air dégluti et les gaz de fermentation. Fixe les toxines circulant dans le milieu digestif.

Du bromure de calcium : sédatif nervin antispasmodique.

Indications. — **AÉROPHAGIE**, dyspepsies nerveuses. Troubles intestinaux secondaires à un mauvais fonctionnement de l'estomac.

Posologie. — 3 à 6 tablettes par jour, sucées ou dissoutes dans un liquide.

Présentation. — 18 à 20 tablettes par tube.

La boîte de 3 tubes : 15 francs.

Laboratoire National de contrôle, n° 46.

Laboratoire LEURQUIN

50-52, rue Pierre-Legrand — LILLE. (Tél. : 311-05.)

BROMOCODÉINE CHENU

Présentée sous la forme pratique de comprimés dragéifiés kératinisés, ne se dissolvant que dans l'intestin et par suite sans action irritante sur l'estomac.

Composition. — Chaque comprimé renferme

Codéine	0,01	Aconit extrait.....	0,005
Belladone	0,01	Benzoate de soude	0,05
Terpine	0,05	Bromoforme spécial	0,10

Indications thérapeutiques. — Sédatif puissant de la toux (toux sèche, toux spasmodique et grippale, toux nerveuse, toux des tuberculeux).

Toutes les affections des voies respiratoires : bronchite aiguë et chronique, trachéite, laryngite, coqueluche, asthme et emphyseme.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par 24 heures. *Enfants* au-dessus de 8 ans : 2 à 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni croquer avec une gorgée d'eau ou une tasse d'infusion.

Prix de la boîte de 30 dragées : 12 francs.

Laboratoire Thérapeutique du Centre,
J. CHENU, Pharmacien de 1^{re} classe,
Ancien Chef du Laboratoire de Pharmacologie,
Lauréat et diplômé d'Hygiène de la Faculté de Médecine de Lyon.
MONTFERRAND (Puy-de-Dôme). — Tél. : 15-01.

BROMO-GARNAL

Sédatif nervin, Hypnotique.

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café :

Phényl-éthyl-malonylurée sodique	0,025
Na Br. chimiquement pur	0,25
Phosphoglycérate de Na	0,10

Indications. — *Toutes névropathies* : nervosisme, insomnie, excitation psychique, anxiété, épilepsie, convulsions de l'enfance, etc...

Avantages. — *Forme liquide* : action rapide et sûre, tolérance parfaite. Elimination totale, Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucun risque de toxicomanie. *Jamais de dépression consécutive. Ni goût (après dilution), ni odeur.* Ne contient ni sucre ni alcool.

Mode d'emploi. — Toujours dilué : eau (sucrée ou non), infusion, lait.

Posologie. — *Adultes*, comme sédatif nervin : de 2 à 4 cuillerées à café par jour, espacées. Comme hypnotique : 2 cuillerées à café au coucher.

Demi-dose pour les *enfants* au-dessus de 6 ans. Au-dessous de cet âge, X gouttes par dose et par année d'âge. De 2 à 4 doses par jour.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires du SIÈCLE
13, rue Boinod — PARIS (XVIII^e).

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale.
(Voir l'étude sur l'Iodogénol.)

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : Affections du système nerveux, Insomnie, Hystérie, Convulsions, Epilepsie, Névralgies, etc.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCC
COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 09-71.)

BROMOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe du Brome et d'une Albumine d'origine strictement végétale, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Etablissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire national n° 218-1.

(Tél. : Gobelins 06-89.)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome
et de Peptone trypsique.

Gouttes : XL gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* XX à L gouttes. *Enfants :* X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propriétés thérapeutiques. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

Posologie. — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS
(Tél. : Anjou 16-55.)

BROMURE DE CALCIUM

(Sirop Henry Mure, au)

Les convulsions de la première enfance, les coliques, les accidents et les douleurs de la dentition, l'agitation, l'insomnie, l'énervement.

Chez les enfants plus grands, le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium est le médicament qu'il faut donner contre les crises nerveuses, la Chorée, les toux nerveuses.

A donner aux enfants irritables, agacés, à ceux qui souffrent de névralgies, qui ont des colères sans motif et qui ne peuvent travailler sans être distraits. Rapidement leur caractère se transforme.

Ce sirop s'emploie aussi comme tonique.

Mode d'emploi. — Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium peut être administré sans danger dès la naissance jusqu'à la puberté.

La dose moyenne est de 2 à 3 cuillerées à café par année d'âge. En raison de l'innocuité du médicament et de la pureté du sel chimique qui entre dans sa préparation, cette dose peut être dépassée sans inconvénient.

Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium, d'un goût très agréable, se prend ordinairement pur. On peut aussi le donner dans du lait ou dans une infusion de tilleul.

Prix : 7 francs.

L. N. C. 428-4.

Laboratoires du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 18-54.)

BROMURE DE CODÉINE

Propriétés et indications thérapeutiques. —

Sédatif puissant des crises d'emphysème pulmonaire d'Asthme. Sous son influence, la dyspnée disparaît en peu de temps ; les crises d'étouffement cessent ou s'espacent.

Posologie. — 0,02 à 0,04 au moment de l'accès, en injections hypodermiques.

Mode d'emploi. — Les ampoules de Bromure de Codéine Dausse se délivrent en :

1 cc. dosées à 0 gr. 02 de Bromure par ampoule, et 2 cc. dosées à 0 gr. 04 de Bromure par ampoule.

Bien spécifier le dosage sur la prescription.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

BRONCHASMINE

Nébulisations buccales.

*Spécifique préventif et abortif de la crise d'asthme.
Résultat immédiat garanti, pas de contre-indication.*

Composition. — Extrait pur de glandes surrénales stabilisé selon technique spéciale en liquide physiologique; ne contient ni alcaloïde, ni toxique, ni stupéfiant.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations dans la gorge dès les premiers symptômes d'oppression suppriment radicalement et en quelques secondes la sensation d'étouffement.

Voir également *Garéphédrine, Diuréphédrine, Éphédrasmine.*

Prix :

Appareil complet avec étui et liquide 50 fr.
Flacon de rechange (pour plusieurs mois).... 15 fr.
Remise médicale 50 p. 100.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

BRONCHODERMINE

Laboratoires du Docteur TISSOT.

Sous ce nom (déposé) est présenté un nouveau produit à base de *corps gras, spécial, adhérent à la peau*, pour obtenir l'absorption simple et rapide des éléments les plus connus dans le traitement des voies respiratoires : Gaïacol, Sève de Pin, Terpinol, Eucalyptol et Héléline. La peau est l'agent *dyaliseur, absorbant à grande surface, le plus actif.*

En respectant les *voies stomacales, intestinales et rénales* (ce qui a son prix) on peut traiter par simple application tous les *rhumes, bronchites, pneumonies, gripes, pleurites, danger de bacillose, coqueluches, etc., etc...*

Mode d'emploi. — A tous les âges, étendre une bonne couche de Bronchodermine sur le dos, et au besoin la poitrine, recouvrir d'ouate ou de flanelle, la même, jusqu'à la fin du traitement.

Prix : 10 francs. — Taxe d'état comprise.

Laboratoires du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien.

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél.: Mont. 01-91.)

BRONCHO FAVROT

Sirop actif, agréable.

Toux, gripes, bronchites.

Par cuillerée à soupe :

Ephédrine	0,01
Sulfogaiacolate de K.....	0,40
Teinture Aconit.....	0,15
Teinture Drosera.....	0,15
Teinture Belladone	0,10
Eau laurier-cerise.....	0,20
Sirop Thébaïque.....	6
Elixir Garus.....	3
Excipient Q. S. pour	15 cc.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

BRONCHOFORME

Composition. — **Sirop** : Teinture de racines d'aconit, belladone, eau de laurier-cerise, benzoate de soude, sirop de bourgeons de sapin, de bromoforme composé et de cerises.

Comprimés : Bromoforme, Sulfate de strychnine (faible dose), codéine, arrhénal, terpène et extrait stabilisé de valériane.

Formes pharmaceutiques. — Sirop et Comprimés.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, suite de Gripes, Rhumes négligés, Catarrhes, Influenza, Asthme, Coqueluche, Laryngites, Trachéites, etc.

Doses. — **Sirop** : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.
Enfants : 3 à 5 cuillerées à café par 24 heures.

Comprimés : 4 à 5 par jour.

Enfants : 7 à 15 ans : 2 à 3 par jour.

Prix : Sirop : 15 fr. Comprimés : 12 fr.

Laboratoires DECHATRE-LEBAS, Pharmacien
20 bis, rue du Sergent-Godefroy,

MONTREUIL — PARIS. — (Tél. : Avron 14-69.)

BRONCHO-LACTOL

Composition. — Codéine; Teintures: Aconit et Belladone, Drosera et Grindelia; Tolu et Benjoin en nature, en suspension colloïdale, pour 100 grammes.

Propriétés. — Balsamique énergique, calmant et diurétique remarquable.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires; Bronchites aiguës et chroniques, Tuberculose pulmonaire, Coqueluche, etc...

Présentation. — Émulsion pectorale de goût agréable d'Orgeat.

Deux formes $\left\{ \begin{array}{l} a. \text{ Simple : Affections aiguës des voies respi-} \\ \text{ratoires.} \\ b. \text{ Gaïacolé à 0,30 \% ; suppuration chronique} \\ \text{du poudmon.} \end{array} \right.$

Aucune intolérance.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à potage par jour.
Enfants : par cuillerée à café, suivant l'âge, pur ou pour sucrer lait ou infusion.

Laboratoire du BRONCHO-LACTOL

6, place de l'Académie — ANGERS.

BRONCHOPHILOS

Sirop pulmonaire.

Particulièrement actif dans l'état grippal.
Neutralise les crachats muco-purulents, grâce à ses peptones sélectionnées.

Composition :

Peptone, Lactophosphate de Chaux, Gaïacol, Codéine, Teinture Lobélie, Teinture Aconit, Teinture Belladone, Décoction de Tolu.

Présentation :

Flacon 210 cc. Prix : 10 francs.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 10 à 15 ans, 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 4 à 10 ans, 3 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 1111-3.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

BRONCHO SANYL ESTÈVE

(Adultes)

Sulfogaïacolate de K.....	0,12
Chl. d'Ethylmorphine.....	0,005
Bromoforme.....	0,02
Teinture belladone	0,04
— aconit.....	0,01
Eau de laurier-cerise	1
Sirop de diacode.....	5
Sirop de polygala	2
Sirop de Dessesarts. Q. S. une cuillerée à soupe de 15 cc.	

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 4 cuillerées à café par jour.

Sirop actif.

Toux rebelles, Catarrhe, asthme, emphysème, bronchites.

Expectorant cicatrisant.

Prix au public : 15 francs.

BRONCHO SANYL ESTÈVE

(Enfants)

Eau de laurier-cerise	0,05
Benzoate de soude.....	0,03
Teinture rac. aconit	0,0035
— drosera	0,008
Sirop de diacode	0,18
Sirop de Dessesarts. Q. S. une cuillerée à café de 5 cc.	

Bébés jusqu'à 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

1 à 3 ans : 3 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix au public : 7 francs, taxe comprise.

*Sédatif, Expectorant, Rafraîchissant,
Ne constipe pas.*

Laboratoire ESTÈVE,

187, rue Croix-Nivert — PARIS (15^e)

(Tél. : Lecourbe 92-16)

BRONCHOSÉDOL

Forme. — Solution aromatisée à l'élixir de Garus.

Formule. — Chaque cuillerée à soupe contient :

Gaïacol.....	0,105
Terpine	0,26
Benzoate de Na.....	0,05
Codéine	0,0075
Acide salicylique.....	0,015
Biphosphate de Chaux	0,15

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et sédatif puissant des affections broncho-pulmonaires. Cicatrisant, récalcifiant.

Indications. — Gripes, Rhumes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhes, Tuberculose et toutes affections broncho-pulmonaires.

Mode d'emploi. — De 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, pur ou dans un peu d'infusion.

Pour les enfants : par cuillerée à café ou à dessert suivant l'âge.

Prix : 12 francs. — **Durée du traitement :** 4 à 5 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

PH. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques. — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, toux des tuberculeux, gazés de guerre.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dower codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01).....	0,10
Bromol (Tribromophénol).....	0,02
Extrait d'Aconit (titré Codex).....	0,0025
Extrait de Belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de soude.....	0,10
Enrobage au gluten et au baume de tolu.....	0,33

Forme et avantages. — Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin, pratiques à emporter. Dose uniforme. Volume réduit. Aucune saveur désagréable. Absence de sucre, donc recommandé aux diabétiques. Conservation indéfinie.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit s'il y a lieu.

Enfants : au-dessus de 8 ans : demi-dose.

Avaler sans sucer, ni croquer.

Prix : 11 fr. 90.

Laboratoires LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

BRONCHO-SÉRUM CONNAT

Forme. — Sirop.

Indications. — Bronchites, catarrhe, coqueluche, toutes affections pulmonaires.

Formule :

Codéine.....	0,025
Sulfogaïacolate de potasse	2,50
Lactophosphate de chaux	1,05
Teinture aconit	0,35
Stovaïne	0,008

Pour 100 grammes.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Préparation de goût très agréable.

Prix : 14 francs.

Laboratoires M. FOLLIET
RUMILLY (Haute-Savoie).

BRONCHO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN.)

Présentation. — En boîtes de 8 ampoules de 1 cc.

Prix : 40 francs.

La demi-boîte : Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Carnot 78-11.)

BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

Action thérapeutique. — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

Enfants de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures
Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 11 francs la boîte de 20 comprimés.

Laboratoires CH. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 67-05.)

BRONCUROL

Dragées glutinisées.

Composition. — Chaque dragée contient :

Créosote	0 gr. 05
Gluconate de chaux.....	0 gr. 10
Terpène	0 gr. 03
Extrait de grindelia	0 gr. 02
Extrait de drosera	0 gr. 01
Extrait de lobélie	0 gr. 002

Action. — Anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante par la créosote, tonique et récalcifiante par le gluconate de chaux, antispasmodique et expectorante par drosera, grindelia, lobelia, sédative des sécrétions bronchiques par terpène.

L'enveloppe de gluten se dissolvant seulement dans l'intestin en présence du liquide pancréatique, la créosote ne se trouve pas en contact avec la muqueuse stomacale.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires ; toux, catarrhes, bronchites chroniques, grippe.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 dragées par jour de préférence aux repas.
Enfants au-dessus de 6 ans : 1 dragée matin et soir.

Prix du flacon : 14 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Lab. 26-47.)

BRONPHELIA

Sirop éphédro - Benzothiocolé.

Antiseptique - Cicatrisant - Calmant.

Composition. — Chlorhyd. éthylmorphine ; Chlorhyd. éphédrine ; Teinture digitale ; Teinture aconit ; Teinture belladone ; Benzoate soude ; Sulfogaïacolate de potasse ; jus de cassis vitaminé ; Baume de tolu.

Indications. — Trachéo-bronchite, Catarrhes, Coqueluche. Laryngite, Pharyngite, Asthme, Toux nerveuses, Coryza aigu.

Présentation. — Flacon de 250 cc. Prix : 15 francs.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants de 8 à 15 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert, par 24 heures.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

BROSÉYL

Médication antinerveuse.

Forme pharmaceutique et composition. — *Dragées* à base de *brome colloïdal* associé aux *Ethers du Bornéol* et suc *frais* de Valériane. (Flacon de 60 dragées.)

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs sans déprimer, régît et discipline le système nerveux. Tonique et non toxique, le BROSEYL n'a aucun des inconvénients et additionne tous les avantages des bromures, valérianates et albumines bromées.

Indications. — Neurasthénie, épilepsie, insomnie nerveuse, névralgies, palpitations cardiaques, asthme nerveux, troubles de la puberté et de la ménopause, etc.

Mode d'emploi. — 1° *Sédatif*, 6 dragées par jour dans le courant de la journée.

2° *Contre l'insomnie*, 4 à 6 dragées en une seule fois, avec une infusion avant de se coucher.

Dragées à avaler sans croquer.

Prescription. — Un flacon BROSEYL FALVY.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès Sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

BRUZARINE

Farine lactée, maltée, vitaminée.

Goût exquis sans cacao.

Caractéristiques. — Aliment biologiquement complet, contenant tous les éléments nécessaires au développement normal et progressif des enfants, spécialement étudié au point de vue des vitamines de croissance et d'utilisation nutritive.

Propriétés. — Entièrement digestive et assimilable dès le Premier Age, augmente la valeur nutritive du lait. Favorise la dentition, prépare et facilite le sevrage.

Ne constipe pas. Régularise les selles.

Indications. — Aliment de choix des enfants dès l'âge de six mois, aliment de régime dans : sous-alimentation, retard de croissance, constipation.

Aliment de Régime des adultes.

Suraliment des vieillards et des convalescents.

Particularités. — Par sa préparation spéciale dérivée d'un biscuitage préalable dans des fours appropriés, BRUZARINE subit, dans sa constitution, un commencement de transformation qui la rend éminemment digestible et en fait un aliment parfait.

Prescriptions. — Habituer progressivement l'enfant à une nouvelle alimentation, commencer par une cuillerée de BRUZARINE par jour, et progresser peu à peu pour arriver à la quantité indiquée sur le mode d'emploi imprimé sur la boîte.

Mode d'emploi. — BRUZARINE se prépare à l'eau, au lait frais, sec ou condensé.

En cas d'intolérance lactée, BRUZARINE se prépare à l'eau ou au bouillon de légumes.

Prix. — Malgré sa qualité supérieure, BRUZARINE est vendue, à poids égal, meilleur marché que la plupart des farines destinées aux Bébés.

La boîte de 450 grammes : 9 fr. 75.

La boîte d'essai de 250 grammes : 6 francs.

Laboratoires ERLA — LATOUR, Pharmacien,
Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

BUCHOBLEU

ANTISEPTIQUE ET SÉDATIF URINAIRE

Composition : Bleu de méthylène..... 0,05
 Bromure de camphre..... 0,03
 Extrait de Buchu..... 0,02
 Extrait de Boldo..... 0,02

Propriétés. — *Antiseptique urinaire* par excellence grâce au *bleu de méthylène*, dont l'action *antinévralgique* est complétée par les propriétés sédatives du *Bromure de camphre* et du *buchu*. Le *boldo* intervient heureusement sur le foie, dont la déficience est fréquente chez les urinaires.

Indications. — Tuberculose urinaire, Blennorragie, Pyérites, Cystites, Prostatites. Il est *recommandé de faire alterner* les cures de Buchobléu et d'Uroclarol.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour.
 Boîte de 30 comprimés : 18 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments.

Laboratoires de l'UROCLAROL

117, r. Victor-Hugo, HOUPLINES (Nord). (Tél. : 11.)

BUCMINE ET BUCMINE-ORTHO

Composition. — *Bucmine simple* : Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine. *Bucmine-ortho* : même formule + extrait d'Orthosiphon stamineus.

Formes et doses. — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0,50, 2 à 4 par jour.

Indications. — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS.

BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

Formes. — Bouillon, comprimés, poudre et gouttes.

Indications thérapeutiques. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale). Dysenterie, Dermatose, Furunculose, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra. *Poudre* : Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

Modes d'emploi. — *Adultes* : Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon ou prendre 20 gouttes dans un peu d'eau sucrée, 4 fois par jour 1/2 heure avant le repas.

Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 12 fr. 50.

Le 1/2 flacon de bouillon : 8 fr. 75.

Le flacon de gouttes : 16 francs.

Laboratoire des Ferments

du Docteur A. THÉPENIER

10, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150-854. — (Tél. : Europe 58-97.)

C 40

Principe actif. — Oléates doubles de Cu et Mg.
Indications. — Traitement des cancers, fibromes et de toutes tumeurs malignes.

Formes :

C 40 Injectable. — En boîtes de 10 ampoules de 10 cc. et de 2 ampoules de 5 cc.

C 40 Comprimés. — En flacons de 120.

Doses :

Ampoules. — Faire 3 à 5 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour. Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy.

Comprimés. — Deux comprimés midi et soir, pris en mangeant.

Le traitement pourra être renouvelé dans le courant de l'année.

Prix : 50 fr. la boîte d'ampoules.

— 22 fr. le flacon de comprimés.

Laboratoires DROUET ET PLET
 RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

— Tél. : 32. —

CACHETS B. Q. S. C.

Stimulant de l'activité hépatique.
 Spécifique des maladies de l'estomac.

Composition :

Calomel, 1 ; — Salicylate de soude, 10 ; — Sulfate basique de quinine, 10 ; — Magnésie calcinée, 4 ; — Bicarbonate de soude, 4 ; — Benzoate de soude, 36 : — Carbonate de Ca, 36.

Posologie. — Un cachet avant chaque repas.

Présentation et prix. — 20 francs la boîte de 30 cachets.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1265-3.

Laboratoire A. GAULIER

38, rue Saint-Ferdinand — PARIS.

(Tél. : Étoile : 49-55.)

CACHETS DU D^r RICHOMME

Composition :

Phényl-diméthyl-pyrazolone	0,40
Diméthylamino-Antipyrine	0,10
Poudre d'ovaire	0,02
Carbonate de chaux précipité.....	0,10
Cascara sagrada pulvérisé.....	0,10

Pour un cachet.

Propriétés. — Régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée douloureuse, douleurs intermenstruelles.

Posologie et mode d'emploi. — A. Au moment des règles : 1 ou 2 cachets par jour dans un verre d'eau de Vichy ou une tasse de tisane.

B. En cas de douleurs intermenstruelles : 1 cachet, suivant le besoin.

Présentation et prix. — 12 francs la boîte de 6 cachets.

Laboratoires RICHOMME

19, rue Pache, 16, rue Camille-Desmoulins — PARIS
(Tél. : Roquette 86-08.)

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe.

Composition. — Codéine (1 cent. par cachet), Teinte d'aconit (III gouttes par cachet), Benzoate de soude, terpine, benzonaphtol.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : 12 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CACHETS LEKMA

Association végété-minérale agissant dans les troubles du métabolisme du soufre et dans les cas de déminéralisation avec déficience hépato-biliaire.

Composition. — Soufre colloïdal ; Calcium et magnésium assimilables ; Boldo ; Levure de bière.

Indications. — *Dermatoses Prurigineuses* : Eczémas, Acné, Prurits, Anaphylaxie, Urticaire, accidents sériques, Ulcérations infectées, Ulcères variqueux.

Posologie. — Un cachet matin, midi et soir au milieu du repas.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire GUIN
A CONTRES (Loir-et-Cher).

CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé.)

Propriétés thérapeutiques. — Laxatifs, cholagogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhéiques.

Composition :

Alpha :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15

Gamma :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15
Belladone	1 centigramme.

Mode d'emploi. — De 1 à 4 cachets par jour à prendre de préférence au début du repas du soir.

Prix : 10 francs.

Laboratoires PACHAUT
130, boulevard Haussmann — PARIS.
(Tél. : Laborde 16-72.)

CACHETS PULMONIX POLVI

Formule : Pulmonix Polvi.

Tannin à l'alcool	0,25
Phosphate de chaux	0,25
Sulfogaïacolate de potasse	0,25
Arrhénal	0,02
Dionine	0,01
Anesthésine	0,01
Poudre de kola	0,02

Lactose Q. S. pour un cachet.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques, disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires, du lymphatisme.

Antiseptique pulmonaire puissant, Reminéralisant, Eupeptique, Orexique, Phagocytogène.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Rhumes, Bronchites, Gripes, Dilatation des bronches Emphysème, Catarrhes bronchiques, Gazés de guerre.

Les Cachets *Pulmonix Polvi* associent à une activité de premier ordre une tolérance gastrique parfaite. Leur présentation sous cellophane assure une conservation indéfinie même pour les boîtes entamées.

Mode d'emploi. — 1 cachet avant le repas de midi et du soir.

Prix : La boîte de 60 cachets : 25 francs.

Laboratoires AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris.

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

CACHETS « ROCHE » DE THIICOL

1 cachet « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS « ROCHE » (Boîte de 20).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-48.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

CACHETS S. F. T.

Sédatif, Fébrifuge, Tonique.

Composition :

Sulfate de quinine	0 gr. 15
Carbonate de calcium	0 gr. 30
Acide acétyl-salicylique	0 gr. 50

Action. — Analgésique, Cessation très rapide de la douleur (10 à 20 minutes après l'absorption) par leur action sédatrice sur les fibres conductrices de la douleur.

Antipyrétique : Action élective sur le centre thermo-régulateur (tuber cinereum).

Action spécifique : Dans tous les états infectieux, en particulier : angines, gripes, sciaticques, névralgies, pseudo-rhumatismes, maladie de Bouillaud, associés à un traitement énergique d'assaut et dans l'intervalle du traitement.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par 24 heures et de préférence aux repas.

Enfants : 1 à 2 cachets.

Contre-indications. — Tuberculose avec sueurs nocturnes. Insuffisance cardiaque.

Présentation et prix :

Cachets : La boîte de 10 cachets : 7 fr. 40.

La boîte de 30 cachets : 20 francs.

Laboratoires GAULIER

38, rue Saint-Ferdinand — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 49-55.)

CACHETS SPÉVIN

Cure rationnelle d'amaigrissement.

Ni iode, ni produits opothérapiques. Aucun produit chimique nocif.

Indications. — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites « arthritiques » (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

Composition. — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

Présentation. — Cachets. Plusieurs numéros :

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 27 francs.

Laboratoires des produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaug. 21-10.)

CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le procédé Hélier.

Présentation et composition :

Sirop : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel).

Vin : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.

Granules : 2 cgr. de Cacodylate de soude.

Ampoules : 5 à 10 cgr. par cc.

Gouttes : 1 cgr. par V gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

Indications. — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

Posologie :

Sirop : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Vin : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Granules : 3 à 6 par jour.

Gouttes : V à XV gouttes par jour.

Ampoules : 1 par jour.

Durée moyenne d'une unité de vente :

Sirop : 5 jours. — *Vin* : 8 jours. — *Granules* : 25 jours. — *Gouttes* : 45 jours. — *Ampoules* : 10 jours.

Granules, Gouttes et ampoules : 8 fr.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

Enfants : Cacodyline A. 10 cgs. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgs. Cacodylate de soude (2 cc.).

Adultes : Cacodyline C, 30 cgs. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgs. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.). *Magnésie-Cacodyline*, Cacodylate de soude : 30 cgs. Chlorure de magnésium : 20 cgs. (3 cc.).

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

Indications. — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis.

Prix public : 22 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

CADIOR

Composition. — Complexe organo-métallique dépourvu de soufre, dans lequel l'iode, catalysé par le cadmium, ajoute sa puissante action antibacillaire à celle de l'or. Tolérance parfaite assurée par la présence de strontium et de calcium.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. (boîte de 6 pour injections intraveineuses ou intramusculaires.)

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes, Septicémies ; complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses ; rhumatismes chroniques ; mycoses ; convalescences traînantes, amaigrissements de causes indéterminées.

Mode d'emploi. — Une ou deux injections intraveineuses ou deux injections intramusculaires par semaine. Série de 25 à 30 injections.

(Pour technique détaillée du traitement, consulter littérature spéciale.)

Laboratoires LEOLERO — S. A.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

CAFÉDRINE

A la caféine iodurée et au chlorhydrate d'éphédrine.

Formes. — Élixir et dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiasthmaticque, Tonicardiaque, Diurétique.

Indications. — *Asthme essentiel ou réflexe, Emphysème, Oppressions, Rhume des foins, Rhinites, Bronchites aiguës ou chroniques, Insuffisances cardiaques, Néphrites chroniques avec mal de Bright, Rétentions chlorurée et uréique.*

Mode d'emploi. — *Élixir* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Dragées : 2 à 4 dragées par jour.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

CAFÉINE GRANULÉE HOUDÉ

Granulé titré à 2 p. 100.

10 centigrammes de caféine pure par cuillerée à café.

Propriétés. — Tonique nervin et musculaire. Diurétique énergique (sans céphalées). Toni-cardiaque, action vaso-dilatatrice sur les artères coronaires. Eupnéique puissant.

Indications. — Efforts intellectuels et sportifs, Névralgies, Dyspnées pulmonaires, Anorexie, Convalescence. Toni-Cardiaque d'appoint. A associer aux barbituriques dans l'épilepsie.

Posologie. — 2 cuillerées à café par jour (maximum 4), matin et midi. (Pas le soir, pour éviter l'insomnie.)

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

CALCÉRIODE MARIN

Médication bio-dynamique, Eau de mer, iode, calcium.

Composition. — Eau de mer suractivée en présence d'iode et de calcium organique, par un procédé spécial permettant d'obtenir un complexe véritablement « vivant ».

Médication dépourvue de toute toxicité.

Indications. — Avant tout, c'est un modificateur du terrain.

Anémies, Adénopathies. Toutes manifestations bacillaires, Insuffisances glandulaires, Bronchites chroniques, Troubles du développement, Décalcification.

Contre-indication : Hypertension.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour.

Enfants de 2 à 7 ans : 2 à 3 cuillerées à café.

Enfants de 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à soupe.

H. BOULAY, Pharmacien,

62, rue de Montreuil — PARIS. (Tél. : Diderot 33-69.)

CALCIBRONAT

Bromogalactogluconate de Calcium.

Combinaison bromo-calcique nouvelle associant en un seul médicament les effets sédatifs du Brome et du Calcium à dose efficace. — Médicament injectable. Agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. N'a pas les effets secondaires du Brome et des Bromures. Bien toléré par les centres nerveux ; à dose normale n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

Indications. — Toutes les indications de la médication Bromée et Bromurée.

Formes et Posologie :

Comprimés effervescents dosés à 0,45 de Brome : 1 à 4 par jour.

Granulé dosé à 0,45 de Brome par cuillerée à soupe : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

Ampoules de 10 cc. (renfermant par ampoule 0 gr. 186 de Brome) et de 5 cc. (dose de Br. moitié moindre) : 1 ampoule de 10 cc. tous les 2 jours, 1 amp. de 5 cc. tous les jours. Voie intraveineuse ou intramusculaire.

Prix : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Le tube de 10 comprimés eff. : 10 francs.} \\ \text{La boîte de 100 gr. de granulé : 10 francs.} \\ \text{La boîte de 5 amp. de 10 cc. : 25 francs.} \\ \text{La boîte de 10 amp. de 5 cc. : 42 francs.} \end{array} \right.$

PRODUITS SANDOZ, B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20 rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIGÉNOL

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale
(avec mouvements browniens).

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 17 francs le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

CALCIGÉNOL IRRADIÉ

Phosphate tricalcique en suspension colloïdale
(avec mouvements browniens)
et « Vitamine D » cristallisée.

(450 unités physiologiques par cuillerée à potage.)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 20 francs le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis
COURBEVOIE-PARIS (Seine).
(Tél. : Défense 02-69.)

CALCILINE

Forme. — Comprimés, granulé.

Quatre formules : Calciline pure, adrénalinée, méthylarsinée, irradiée.

Indications. — Anémie, lymphatisme, tuberculose, maladies des os, croissance, convalescence, grossesse, carie dentaire.

Doses. — 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois pendant 3 mois. Calciline irradiée : 1 à 5 mesures suivant âge.

Prix : Calciline, 12 fr. ; Calciline adrénalinée, 14 fr. ; Calciline méthylarsinée, 13 fr. ; Calciline irradiée : 16 fr.

Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 69-13.)

CALCIOCHOLINE

Composition. — Chlorhydrate de choline, Gluconate de calcium, Glycérophosphates de soude.

Indications. — *Tuberculose* dans toutes ses manifestations cliniques et sous toutes ses formes. *Prétuberculose* où la *Calciocholine* donne des résultats constants.

Présentation. — Discrète (le mot tuberculose ne figurant pas sur les conditionnements), en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Une ampoule intramusculaire profonde tous les jours ou tous les deux jours. Peut être faite aussi en injections intraveineuses sans avoir aucun choc à redouter et sous-cutanées (ces dernières parfois douloureuses).

Aucune contre-indication.

La boîte, prix au public : 20 francs.

Laboratoires de l'ANALPYRINE
M. BERTRAND, Pharmacien
NOMEXY (Vosges).

CALCIO DYNAMYL

Le plus pur gluconate de calcium français, le mieux assimilable, en solution à 10 p. 100 de Ca. Parfaitement toléré par voie endoveineuse et intramusculaire. Les comprimés (à croquer), très agréables au goût, remplacent avantageusement les solutions de chlorure de Ca. Aucune contre-indication.

Indications. — Amaigrissements, Asthénie, Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire et viscérale. Troubles nerveux, Tétanie, Anxiété. Hémorragies. Préparation aux interventions chirurgicales.

Formes. — 2 et 5 cc. en boîtes de 12 ampoules. Comprimés en boîtes de 32 comprimés.

Posologie. — Une injection quotidienne ou tous les 2 ou 3 jours, 4 à 6 comprimés par jour comme récalcifiant, 8 à 16 comme antihémorragique.

Laboratoires du CALCIO DYNAMYL

45, rue Lazare-Carnot — CLAMART (Seine).
(Tél. : Mich. 06-41.)

CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 cgr. de CaCl_2 naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

Comprimés : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants :

2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

Ampoules : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. —

Adultes, 1 tous les jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte-90 — PARIS.

CALCIUM CORBIÈRE

Composition :

Solution de gluconate de chaux pur à 10 p. 100.

Présentation :

En ampoules de 5 cc. par boîte de 12 et 24 ampoules

En ampoules de 10 cc. par boîte de 6 et 12 ampoules.

En ampoules de 2 cc. (infantile), boîte de 12 ampoules.

Propriétés :

Tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, Rachitisme, Rhumatismes, Fractures, Hémoptysies, Hémorragies gastriques, intestinales, rénales, Pleurésies, Ascite, Diarrhée des tuberculeux.

Associé au traitement par l'or, le Calcium Corbière atténue les accidents d'intolérance.

Emploi :

Indifféremment en injections intraveineuses ou intramusculaires, indolores.

Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Pas de contre-indication à l'emploi.

Prix de la boîte : 20 francs et 32 francs.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

CALCIUM FRANÇAIS

Formes et composition. — Gluconate de calcium présenté sous forme de :

Ampoules de 5 cc. et 10 cc. pour injections intraveineuses, intramusculaires ou voie buccale.

Cachets de 1 gramme.

Granulé (10 grammes = 1 cachet).

Mode d'action. — Hémostatique, régulateur des appareils circulatoire, hépatique, nerveux et sécrétoire, excitant de la contraction musculaire.

Avantages. — Causticité nulle, ne provoque aucun accident local ou général, absorption et assimilation faciles, action durable, produit intégralement français.

Indications. — Décalcification, rétention chlorurée, asystolie, hémorragies, hémophilie, spasmes, tuberculose et pré-tuberculose S. T. S. F., amaigrissement, mauvais état général, support des sels d'or, prévention des phénomènes de choc dus aux intraveineuses d'arsénobenzols, rachitisme, carie dentaire, fractures, grossesse, allaitement, phosphaturie, rhumatisme déformant.

Posologie. — Injections : 10 cc. par jour,

Voie buccale : 3 à 4 grammes.

Prix :

Boîtes de 10 ^a /10 cc.....	35 fr.	Boîtes de 5 ^a /5 cc.....	17 fr.
— 5 ^a /10 cc.....	20 —	— 125 gr. granulés à 10 o/o.	20 —
— 10 ^a /5 cc.....	30 —	— 24 cachets de 1 gr...	16 —

Laboratoire des Gluconates

R. de BOURRAN-CRABOS, Pharmacien,

7, rue de la Montagne-Sainte-Genève — PARIS (Ve).

(Tél. : Odéon 09-12.)

CALCIUM-PLÉ

Composition. — Gluconate de Calcium pur en solution aqueuse, stable, à 10 p. 100, suractivé par le Magnésium glycérophosphorique (2 p. 100) et par le Manganèse glycérophosphorique (0,02 cgr. p. 100).

Indications. — Anti-choc et spasmosédatif, Récalcifiant, Diurétique, Tonique neuro-musculaire, Anti-infectieux, Auro et Arséno-solvant.

Forme. — Ampoules (de 5 cc. ou de 10 cc.) injectables par voie endo-veineuse ou intramusculaire (indolore sans anesthésique).

Posologie. — Une injection tous les 2 jours ou chaque jour.

Prix : La boîte de 10 ampoules de 5 cc. ou bien de 5 ampoules de 10 cc. : 25 francs (remboursable par les Assurances sociales).

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).

(Tél. : Archives 83-52.)

CALCIUM-SANDOZ

Composition et propriétés. — Sel de chaux d'un produit d'oxydation du glucose réellement assimilable. *Glucono-galacto-gluconate de Calcium* pour les ampoules, les comprimés eff., le sirop; *gluconate de Ca* pour les autres formes. Teneur en chaux (CaO) du gluconate de Ca : 12,6 p. 100, soit 9 p. 100 de Ca élément. Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion Calcium. Injection intraveineuse sans inconvénient. Injection intramusculaire indolore.

Formes. — Ampoules à 10 et 20 p. 100; Poudre granulée (sans sucre); Comprimés effervescents; Tablettes chocolatées; Sirop.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule de 5 ou de 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Voie gastrique : par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois 2 tablettes chocolatées ou encore 2 fois un comprimé effervescent.

« Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuillerée à soupe 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Voie gastrique : par jour, 2 à 3 cuillerées à café de poudre granulée ou 3 fois une demie à une tablette chocolatée ou bien 2 fois 1/3 à 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuill. à café ou à dessert 2 à 3 fois par jour selon l'âge.

Ampoules de 10 cc., la boîte de 5 : 25 fr. — *Comprimés effervescents* : 10 fr.

Sirop G. M. : 18 fr. — *Poudre granulée* : 17 fr.

Tablettes chocolatées : 10 francs.

PRODUITS SANDOZ, B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIVITAM

Composition. — Solution de Chlorure de calcium dans des jus de fruits naturels (1 gr. par cuillerée à soupe).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles du chlorure de Calcium qui sont suractivées par les jus de fruits. Tonicardiaque, reconstituant, anti-hémorragique, stimulant de l'appétit, déchlорurant, adjuvant précieux dans l'accouchement.

Indications. — Hypocalcémie, chlorurémie, prévention d'hémorragie, d'inertie cardiaque ou utérine.

Mode d'emploi. — Se recommande par son goût agréable qui le fait accepter facilement.

De 1 à 4 cuillerées à soupe par jour suivant les cas.

Prix : 16 francs, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES
Route du Moulleau — ARCACHON.

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminoses, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés. (Dragées et granulés glutinisés ne se dissolvant que dans l'intestin.)

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillères à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 16 francs.

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoires des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe,
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

Indications. — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

Emploi et doses. — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 15 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande :

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 00-15.)

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase. (Voir *Prézymase*.)

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumatisme, etc...

Mode d'emploi. — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

Prix : 15 francs.

(20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Glacière 24-48.)

CALMABY

Composition. — Cachets de Calomel porphyrisé. S. N. Bismuth et Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Active la fonction hépatique, combat la cholémie ; Indiqué dans le Rachitisme tardif, les Infections intestinales, les Ulcérations stomacales. Peut servir comme cure d'entretien. Augmente la tolérance mercurielle ou iodée. Réussit dans l'AÉROPHAGIE.

Mode d'emploi. — Un cachet le matin à jeun et le soir au coucher, 15 à 20 jours par mois. Comme désinfectant intestinal, 3 à 5 cachets par jour pendant quelques jours.

Prix : 18 fr. 50 la boîte de 30 cachets.

En médecine infantile,
employer les comprimés de CALOBIL

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

CALMAG-NA

Forme. — Poudre impalpable, légèrement aromatisée.

Composition. — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, Bicarbonate de soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

Action thérapeutique. — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques. Action prompte et prolongée, sans formation d'acidité secondaire, ni de gaz. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

Indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsie, gastralgies, pyrosis, flatulence, atonie gastrique, aérophagie, ulcus gastrique et duodénal.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café délayée dans un verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-4.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, D^r en Pharm., 13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp 16-85 — 16 87

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge et le Grand-Duché de Luxembourg:

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

Prix : 24 francs belges, la boîte.

En Belgique, le Calmag-Na est en vente sous le nom de CALMAGNA.

CALMOBRO-NIEL (ex KALMOBROL)

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromuré liquide à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café = 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.)

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Prix : 17 fr. 50, le flacon de 30 doses.

Laboratoires S. A. R. L. au capital 100 000 fr.

C. CHAMARD et **R. NIEL**

Inspecteur des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

CALMOCARDINE LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Sulfate de quinine.....	0,05
Gardénal.....	0,005
Sulfate de spartéine.....	0,01
Bromure de camphre.....	0,025
Extr. de cratægus.....	0,015
Extr. de passiflora.....	0,015
Extr. de valériane.....	0,015

Actions thérapeutiques. — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

Spécifique des palpitations.

Indications. — Palpitations de cœur de toutes origines, Eréthysme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

Mode d'emploi. — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 20 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours A. Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35).

CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone, Extrait thébaïque, Camphre, Extrait d'anémone, Extrait d'hamamélis, Chlorhydrate de para-amino-benzoyl-diéthyl, Amino-éthanol, Onguent hydrargyrique double, Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blennorragies aiguës, cystites aiguës, blennorragies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE

192-194, rue Saint-Denis — PARIS (II^e).

Tél. : Gutenberg 41-01.

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Extrait Belladone, Jusquiame, Piscidia, Analgésine.

Convulsions, Hémorroïdes, Prostatites, Règles douloureuses, Coliques hépatiques, néphrétiques, Suite d'accouchement, etc. 1 à 3 par 24 heures.

1 à 5 ans 3 dosages ; au dessus de 15 ans

Bébés : 10 fr. — Enfants : 11 fr. 50 — Adultes : 13 fr.
la boîte de 6.

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

	3 dosages	Bébés jusq. 5 ans	Enfants	Adultes
Bromhydrate de quinine ..		0 gr. 035	0 gr. 07	0 gr. 10
Sulfate de quinine		0 gr. 065	0 gr. 13	0 gr. 20
Pyramidon		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénacétine.....		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Caféine		0 gr. 005	0 gr. 02	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

Tous les états fébriles, un matin et soir.

La boîte de 6 : 10 francs, 11 fr. 50, 13 francs.

Enregistrés au Lab. de Cont. des Médicaments] sous
les n^{os} 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Échant. : Laboratoires des CALMOSUPPOS
La MOTHE-SAINT-HÉRAY (Deux-Sèvres).

CALMOVARINE

Suppositoires analgésiques et sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocainum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat. Aucune toxicité. Aucune irritation pour les tissus. Administration facile. Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, Dysménorrhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokystiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux. Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorrhagie, Cystite, Prostatite, Affection de l'appareil urinaire chez l'Homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum, tous les matins ou tous les soirs, un Suppositoire suivant avis du médecin.

Cas très douloureux : Un suppositoire matin et soir.

Laboratoire CALMOVARINE

192-194, rue St-Denis — PARIS (II^e). Gut. 85-65.

CALOMEL VICARIO

En petits comprimés dosés à un milligramme, un quart et un demi-centigramme, un, deux et cinq centigrammes.

Ces comprimés présentent les avantages d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certaine et d'un dosage rigoureux.

Mode d'emploi. — Sucrer le comprimé et avaler ensuite une gorgée d'eau, à jeun de préférence.

Prix : La boîte de 80 comprimés : 7 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

CALSÉDINE

Composition. — Produit à base de Ca, Mg et Phosphore.

Ne renferme aucune substance toxique : ni barbituriques, ni alcaloïdes. Pas de Bromures.

Action. — Hypnotique ou sédative suivant les doses et le mode d'emploi.

Elle calme, en ne faisant intervenir que les ions minéraux de l'organisme. Elle fait dormir en utilisant un mécanisme naturel du sommeil.

Doses. — **Sédation nerveuse :** 1 à 2 comprimés 2 ou 3 fois par jour aux repas, ou *une* cuillerée à café de granulés pour *un* comprimé.

Somnifère : 4 comprimés à la fois (1 comprimé par 17 kg. de poids du sujet) 20 minutes environ avant l'heure habituelle du sommeil, diluée dans un peu d'eau, ou de liquide légèrement alcoolisé, bière, eau rougie, etc.

Si cette dose n'est pas suffisante, l'augmenter ou, s'il y a réveil avant la fin de la nuit, renouveler la même dose.

Indications. — Tous les états d'irritabilité nerveuse, toutes les insomnies dites nerveuses ; surmenage cérébral, génital ; excitations émotives, inquiétudes, angoisses ; excitation due au thé, café, tabac, alcool, etc.

Spasmes avec prédominance de l'élément névropathique.

Entéronévrose spasmodique, coelialgies ; Pollakiuries où prédominent facteurs nerveux ou réflexes.

Dans les prurits, d'origine nerveuse, les bouffées congestives de la ménopause ; dans les poussées hypertensives de l'hypertonie artérielle ; dans certains spasmes rythmiques du sommeil.

D'une façon passagère, la **Calsédine** diminue la fréquence du pouls et abaisse les deux tensions maxima et minima.

Prix : 16 fr. 50 le tube de 50 comprimés.

Prix : 17 fr. 50 la boîte de granulés.

Laboratoire GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

CAMFORMINE

(Camphosulfonate d'Hexaméthylène-Tétramine.)

Composition. — Résulte de la combinaison d'une molécule d'acide camphosulfonique avec une molécule d'Hexaméthylène tétramine.

Corps chimiquement défini, cristallisable, soluble dans l'eau, solution à 10 p. 100.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant tonique du cœur, action diurétique, anti-infectieuse, rétablit la tension, règle les mouvements intestinaux.

Indications. — Spécifique de toutes défaillances cardiaques : choc nerveux ou opératoire, syncopes, infections, hémorragies, cardiopathies, fléchissement sénile.

Est particulièrement indiquée dans les endocardites infectieuses, gripes, infections puerpérales, typhoïdes, pneumonies, chocs quelle qu'en soit la cause.

Présentation. — *Doses :* Ampoules de 2 et de 5 cc.

Injection intramusculaire ou intraveineuse de 2 et de 5 cc. et plus, suivant les indications. Pas de contre-indications, Pas de choc, Pas d'intolérance. Action rapide et puissante.

Solution à ingérer. — Dans les affections chroniques, les convalescences, chez les vieillards : 100 à 120 gouttes en trois fois dans la journée.

Prix :	{	Ampoules de 2 cc., la boîte de 10	15 fr.
		Ampoules de 5 cc., la boîte de 10	20 fr.
		Gouttes, le flacon	15 fr.

Laboratoire ARMORIL

6 bis, rue Belloni — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 64-97).

CAMPHOCALYPTOL

Indications. — Affections pulmonaires et maladies infectieuses, Grippe et complications, *Coqueluche*, Bronchites aiguës, chroniques, *Abcès du Poumon*, Pneumonie, Tuberculose, Accidents pulmonaires anesthésiques.

I. — CAMPHOCALYPTOL INJECTABLE

Ampoules de 2 cc., Ampoules de 5 cc.

Camphocalyptol gaïacolé : par amp. de 2 cc.

Gaïacol, goménol, eucalyptol	aa	0,10
Camphre		0,20
Acide phénique		0,01
Excipient huileux		Q. S

Camphocalyptol sans gaïacol : même formule sans gaïacol.

Ampoules de 5 cc. : formule gaïacolée, formule sans gaïacol : mêmes doses $\times 2,5$.

En injections intramusculaires : par jour : 1 cc. à 5 cc. et plus selon âge et gravité. Le *camphocalyptol* s'emploie aussi en lavements : une ampoule dans lait ou huile tièdes.

Boîte 10 ampoules de 2 cc. : 18 francs.

Boîte 6 ampoules de 2 cc. : 12 francs.

Boîte 6 ampoules de 5 cc. : 18 francs.

II. — CAPSULES DE CAMPHOCALYPTOL

Composition :

Codéine, éphédrine	aa	0,004
Essence de melaleuca vir.....		0,05
Eucalyptol		0,09
Terpinol		0,03
Camphre		0,01

Pour une capsule glutinisée, de 3 à 9 par jour en trois prises. Le flacon pour 7 jours environ : 12 fr. 50.

III. — SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

Pour adultes, pour enfants.

<i>S. Adultes</i>	{	Créosote émulsionnée.....	0,25
		Eucalyptol	0,03
		Stovaine.....	0,005
		Beurre de cacao .	Q. S. pour 1 suppositoire.

S. Enfants : le tiers environ des doses ci-dessus.

Un suppositoire matin et soir.

Suppositoires pour adultes ou pour enfants, la boîte 15 francs.

L. N. C. n° 314.38 et 39 ; 314.41 à 314.43.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII°).

(Tél. : Marcadet 14-14.)

CAMPHODAUSSSE

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Formes: a) Camphodausse.

b) Camphodausse spartéiné.

Mode d'emploi. — 1 à 10 cc., une ou plusieurs fois par jour, par voie *hypodermique* ou *intramusculaire*. Le Camphodausse simple peut être injecté par voie intraveineuse également.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

CAMPHOSTYL LACROIX

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1^o Absorption immédiate. 2^o Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3^o Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — 1^o *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules* — 1^o Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 : 2^o boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 : 3^o boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 25, 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes*. — XX à CXX gouttes par jour.

2^o *Camphostyl spartéiné*. — A. *Ampoules*. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,05 de Spartéine.

B. *Gouttes spartéinées* XX à LXXX gouttes par jour.

3^o *Camphostyl strychniné*. — Ampoules uniquement. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,001 de Strychnine.

Echantillon sur demande.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

<i>Camphostyl simple :</i>	{	Ampoules de 1 cc.	Prix : 13 fr. 50	la boîte de 12
		— de 2 cc.	— 16 fr.	— 12
		— de 5 cc.	— 16 fr.	— 6
<i>Camphostyl spartéiné :</i>	{	Gouttes	13 fr. 50	
		Ampoules	Prix : 10 fr.	la boîte de 6
		—	17 fr. 50	— de 12
<i>Camphostyl strychniné :</i>	{	Gouttes	14 fr. 50	
		Ampoules uniquement	10 fr. la boîte de 6 ; 17 fr. 50 la boîte de 12.	

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et fils, Successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e) Tél. : Nord 54-57.

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé du camphre naturel soluble dans l'eau (Campho-carboxylate d'ammonium), de diffusion rapide, sans réaction locale ni action secondaire : injections indolores.

Indications. — Les mêmes que celles des huiles camphrées (excitant du cœur et des centres nerveux, renforcé dans ses formes associées soit par la spartéine, soit par la spartéine et la strychnine : troubles cardio-vasculaires, états de choc, crises respiratoires, collapsus, maladies infectieuses) et de l'alcool camphré (analgésique et antiseptique : angines, prurits, brûlures).

Formes pharmaceutiques. — A. *Camphydryl simple*, à 5 p. 100 de principe actif, isotonisé.

1. Ampoules de 1, 2 et 5 cc. : 1 ou 2 par jour.
2. Comprimés effervescents, à 0 gr. 10 : 2 à 4 par jour.

Gargarismes : 1 ou 2 pour un verre d'eau.

B. *Camphydryl spartéiné*.

1. Ampoules de 2 cc. (0,03 spartéine base) 1 ou 2 par jour.
2. Ampoules de 5 cc. (0,05 spartéine base) 1 ou 2 par jour.

C. *Camphydryl strychno-spartéiné*.

1. Ampoules de 2 cc. (0,015 spartéine base et 0,001 strychnine).
2. Ampoules de 5 cc. (0,02 spartéine base et 0,002 strychnine).

Camphydryl spartéiné :

Ampoules de 1 cc., boîte de 10.....	14 fr. 50
— 2 cc., — 10.....	16 fr. 50
— 5 cc., — 10.....	28 fr.
Comprimés, flacon de 50.....	16 fr. 50

Camphydryl simple :

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	20 fr.
— 5 cc., — 5.....	20 fr.

Camphydryl strychno-spartéiné.

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	18 fr. 50
— 5 cc., — 10.....	28 fr. 50
— 5 cc., — 3.....	12 fr.

Laboratoires ROBIN,

13, rue de Poissy — PARIS (V^e).

Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.

CANOL

Composition :

Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Lawsonia.....	0,35235
Chimaphila.....	0,1425
Aphloïa.....	0,005
Lawsotanine.....	0,00015

Pour un cachet.

Absolument inoffensif, aucune contre-indication. Le Canol noircit les urines au début du traitement, ne s'accumule pas, peut être employée indéfiniment sans danger.

Indications :

Médication rationnelle des infections des voies urinaires et rénales. Traitement de l'albuminurie.

Albuminurie gravidique.

Néphrites.

Pyélo-néphrites.

Lithiase rénale. Colibacillose.

Cystites.

Hématuries. Diabète rénal.

Forme pharmaceutique :

Boîte de 30 cachets de 0,50 environ.

Posologie :

Dose moyenne. *Adultes* : 4 à 6 cachets par jour. *Enfants* : 1 à 3 cachets par jour, de préférence avant les repas.

Prix de la boîte de 30 cachets : 15 francs.

Correspondance et échantillonnage :

Laboratoire du CANOL

MAIZET (Calvados).

J. GAUDIN, Pharmacien.

Dépôt général : O. C. P. Paris.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 1426-1.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

CANTÉINE BOUTEILLE

Forme. — Élixir.

Composition :

Cratægus.....	XXV gouttes.
Passiflore	0 gr. 50
Hamamélis	XXX gouttes.
Salix Alba	0 gr. 025
Excipient : Q. s. par cuillerée à café.	

Indications. — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 04-02.)

CAPARLEM

La thérapeutique protectrice du foie.
Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

I. Sa formule. — *Huile de Haarlem d'origine*; pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du *Juniperus Oxycedrus*, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-sécréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholécystokinétique.

II. — Ses indications thérapeutiques fondamentales. — *a. Foie.* — Cholécystites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non. Calculs de transit et calculs sédentaires. Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécystectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lambliosés vésiculaires. Colibacillocholies.

b. Reins. — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

III. — Sa posologie habituelle. — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

IV. — Ses avantages. — Titrage rigoureux, Efficacité **officiellement** reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires Lorrains de Produits purs.

A. DESMOIRES, Directeur

ÉTAIN (Meuse).

(Tél. : 74.)

CAPSULES BRUEL

A l'Éther Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

Doses. — 3 à 15 capsules par jour.

Le flacon : 10 francs.

Renseignements et Échantillons :

H. RIVIER, Pharmacien

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 22-46.)

CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

- 1° Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).
- 2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyl-lique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Posologie :

Sirop : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

Capsules : 3 à 4 par jour ; 10 ans : 1 à 2.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CAPSULES HAARLEM BARDET

(Capsules Bardet)

Huile de Haarlem VRAIE, PURE, D'ORIGINE.

Composition. — Chaque capsule contient X gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable huile.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue puissant, fluidifiant la sécrétion biliaire.

Principales indications thérapeu-tiques. — Lithiase biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Angiocholites, Cholécystites, Asthme hépatique.

Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Pyélonéphrites, Goutte, Arthritisme.

Posologie. — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par jour. Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par jour.

A absorber au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle : N° 518-3.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CAPSULES HENRY

La potion de Chopart, formule du Codex, est une médication héroïque, mais de goût particulièrement intolérable.

Les *Capsules Henry*, permettant au malade l'absorption facile de ce médicament, le prescripteur obtiendra une action balsamique remarquable pour la blennorrhagie, la blennorrhée et la cystite, du fait d'une meilleure observation de la prescription.

9 à 12 capsules par jour.

La boîte de 50 capsules : 16 fr.

PRODUITS DU DOCTEUR HENRY PHILIPPE
36, quai Fulchiron — LYON.

CAPSULES HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

Voir :

HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

Forme. — Capsules de 0 gr. 20 spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 13 fr. 50.

Pharmacie SEQUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

CAPSULES KUCHNER au Mécaptol.

Affections bronchiques et pulmonaires.

Composition. — Héléline crist., Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

Action thérapeutique. — Calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration. Propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

Indications. — Bronchites simples et chroniques, Toux émétisante des tuberculeux, Toutes affections des voies respiratoires.

Posologie. — Six capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 12 francs.

Laboratoires L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne).

Tél. : 106.

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (extr.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpene 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogaiacolate de potasse) 0,04, par capsule.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Prix, le flacon : 12 fr. 50.

Laboratoires H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

CARB (Granulé)

Charbon activé et catalytique.

Pouvoir absorbant élevé et titré.

Indications thérapeutiques. — Médication absorbante et antitoxique. Aérophagie, Hyperchlorhydrie. Infection intestinale. Syndrome entéro-rénal toxique et infectieux. *Intoxications, Entérites.*

Posologie.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café.

Dose massive dans les intoxications aiguës.

Le flacon : 17 francs.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

A. GRIGAUT et A. BOUTRÔUX, Pharmaciens

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBAGOL MARINIER

Composition :

Charbon animal, Charbon végétal, Charbon activé (par procédé spécial évitant complètement toute impureté chimique ; chlorure de zinc, arsenic, etc.). Argent colloïdal.

Formes :

GRANULÉ friable légèrement aromatisé.
CACHETS (exempts de sucre).

Indications :

Tous les troubles gastro-intestinaux. Entérococolites banales ou muco-membraneuses et leurs conséquences. Toutes diarrhées. Irritations et infections intestinales. Colibacillose. Syndrome entéro-rénal. Intoxications alimentaires. Auto-intoxications.

Posologie :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas avec un peu d'eau ou de tisane.

Enfants : 1/3 à 1/2 dose.

Cachets : 1 cachet = 1 cuillerée à café de granulé.

Prix du flacon de granulé ou de la boîte de 30 cachets : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les Nos 48-2 et 48-3, le « CARBAGOL » peut être légalement prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,
PARIS.

CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 16 fr. 60.

Le Carbarsèno. — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 18 francs.

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 24 francs.

Le Carbalga. — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 18 francs.

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 18 francs.

Laboratoires MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBARGYRE

Charbon végétal activé et Argent associés en un complexe colloïdal.

Propriétés. — Antiseptique intestinal puissant, aucune toxicité, **absorbant, anti-toxique, anti-infectieux.**

Ne provoque jamais d'argyrisme.

Indications thérapeutiques. — *Colibacillurie, Syndrome entéro-rénal. Infections intestinales. Intoxications. Fermentations. Colites. Diarrhées.*

Deux formes :

Cachets : 1 cachet contient :

Argent colloïdal.....	0,02
Charbon actif titré	0,48

Granulé : 1 cuillerée à entremets contient :

Argent colloïdal	0,02
Peroxyde de magnésium ..	0,04
Urotropine	0,08
Charbon actif titré	1

Le **CARBARGYRE** se prend en général avant les repas.

Posologie. — Dose moyenne par 24 heures :

Adultes : granulé : de 2 à 3 cuillerées à entremets ; cachets : de 2 à 5 cachets.

Enfants : de 2 à 3 cuillerées à café.

Cachets : la boîte de 30 cachets : 18 francs.

Granulé : le flacon de 170 gr. : 18 francs.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. Laborde 08-51.

A. GRIGAUT et A. BOUTROUX

Pharmaciens

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 mgr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de mgr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 mgr. par 100 gr., soit 1/4 de mgr. par 5 gr. (cuillerée à café).
Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants:
1/10 de mgr. par cuillerée à café.

Prix : 16 fr. 60.

Laboratoire MONTAGU

4), boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBOBEL

Granulés au goût agréable.

Deux formules. — Boîte rouge : simple.
Boîte bleue : benzonaphtol.

Composition. — Charbon animal chimiquement pur — hexaméthylène tétramine pur — citrate de magnésie, avec ou sans benzonaphtol.

Indications. — Gastrites, aigreurs, inflammation des voies intestinales, biliaires et urinaires.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à prendre comme dessert. (Si possible ne pas mélanger à du liquide.)

Laboratoires du CARBOBEL

Dépositaires généraux pour la Belgique, le Congo Belge et le Grand-Duché de Luxembourg.

PECEBE

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

CARBO-BISMUTH ADRIAN

Ne contenant que du Carbonate de Bismuth chimiquement pur, légèrement sucré et menthé.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Indications thérapeutiques. — Forme pratique, active et inoffensive pour le traitement des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin : Hyperchlorhydrie, Ulcérations de l'estomac, Hémorragies intestinales, Fièvre typhoïde. Médication antidysentérique et antidiarrhéique, pansement gastrique.

Posologie. — 5 à 20 comprimés par jour, suivant les cas et suivant avis du médecin, soit à jeun, soit avant ou après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anciennement ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBO-COMBROSMOL

Médication végétale des infections gastro-intestinales et biliaires.

Composition. — Combretum, Buchu, Saponaire, Charbon végétal activé.

Forme. — Granulé fondant, aromatisé.

Propriétés. — Par le *Buchu* attaque l'élément infectieux hépatobiliaire ; par la *Saponaire* neutralise et élimine les toxines ; par le *Combretum* sollicite du foie un effort sécrétoire qui aide à l'élimination des éléments infectieux et toxiques ; par le *Charbon activé* adsorbe les bactéries et les toxines intestinales.

Indications. — Hépatites, ictères infectieux, angiocholites, cholécystites, colibacillose. Fermentations gastro-intestinales, auto-intoxication, états diarrhéiques, aérophagie.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, à chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences,
59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

CARBODAUSSÉ

Adsorbant à base de charbon activé.

Ce granulé a pour fonction essentielle la fixation et la destruction des poisons digestifs, quelle qu'en soit l'origine. Par le charbon, il adsorbe les toxines; le salol à très faible dose et l'urotropine en font un antiseptique puissant, agissant lentement et progressivement sur tout l'ensemble de l'appareil digestif et urinaire.

Posologie. — Une à deux doses à la fin des deux principaux repas.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

CARBOGENASE

Granulé.

Composition. — Extrait de Belladone, Citrate de soude, Hexaméthylènetétramine, Lactose, Carbonate de magnésie, Charbon dans excipient aromatisé.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Douleurs stomacales, Dermatoses par auto-intoxications, Affections urinaires.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café à la fin de chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Ph¹⁶
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de
Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

CARBOÏODURES FRAUDIN

Composition. — Iodure chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 33 d'iodure par cuiller à café.

Deux formes : 1. Carboïodure à l'iodure de potassium.
2. Carboïodure à l'iodure de sodium.

Propriétés. — L'iodure fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin).
La libération est intégrale, mais lente, ne causant ni intolérance stomacale, ni iodisme.

Indications. — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).
(Tél. : Molitor 02-62.)

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon activé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales, Colibacilloses, Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1^o Boîte de 30 cachets ;
2^o Poudre avec cuiller-mesure.
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

Doses. — *Adultes* : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — *Enfants* : 2 à 6 mesures *pro die*.

Prix : 16 fr. 50

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabète par Dyshépatie, Colibacilloses, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets.
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Prix : 17 fr. 50

Échantillons et Littérature sur demande :
19 rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBOLAXINE

Composition. — Graines sélectionnées de Psyllium enrobées de charbon activé (ACTICARBONE pur) 25 p. 100 et poudre de Belladone 0 gr. 015 par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Rééducateur intestinal, désinfectant énergique, antispasmodique.

Forme une gelée épaisse, riche en ACTICARBONE, qui pansela muqueuse intestinale, s'oppose au dessèchement des selles et absorbe les toxines de fermentation.

Indications. — Coprostase et conséquences toxiques. Entéocolites. Spasmes de l'intestin, Diarrhée, Fermentations, Colibacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas. 1 cuillerée dès amélioration. Puis : doses décroissantes.
Enfants : par cuillerée à café.

Prix : 16 francs. (Boîte traitement de 15 jours).

Laboratoire du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).
(Tél. : 1-59.)

CARBOLIN MIDY

Carbolin simple. — Boîte verte : 13 francs. Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé.

Carbolin composé. — Boîte rouge : 15 francs. Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé, Extrait de bile, Ferments intestinaux, Amylodiastase végétale, Extrait Bourdaine spécial.

Propriétés thérapeutiques :

Carbolin simple. — Régulateur physiologique de l'intestin, panse la muqueuse intestinale, absorbe les gaz, supprime les spasmes gastro-intestinaux.

Carbolin composé. — Stimulant physiologique de l'intestin, contrôle la digestion, assure la rééducation motrice des intestins paresseux.

Indications :

Carbolin simple. — La Coprostase et toutes ses conséquences. Aucune contre-indication. S'associe à toute médication complémentaire.

Carbolin composé. — Constipation chronique, Atonie intestinale, une selle par jour, sans spasmes, sans diarrhée.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café avant les repas. Mettre les graines sèches dans la bouche et les avaler avec une gorgée de liquide, sans les croquer,

Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Avantages. — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

Indications. — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

Emploi. — Par cuillerée à café, à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 13 francs.

Laboratoire NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

CARBONAL

Charbon Médicinal Supéractif

Ed. Urbain.

Carbonal Princeps. — Charbon végétal
supéractif *Ed. Urbain* pur.

Ne contient aucune trace de soufre et de produits cyanurés : ne renferme aucune substance minérale toxique, chauffé à sec ne dégage aucun produit empyreumatique.

Indications. — Intoxications, diarrhées, fièvre typhoïde et paratyphoïde, dysenterie, *suites opératoires* (gaz des opérés).

Posologie. — Trois cachets par jour au milieu ou à la fin des repas.

Carbonal Magnésien. — Association du charbon végétal superactif *Ed. Urbain* avec 0 gr. 20 d'hydrate de Magnésie.

Indications. — Fermentations stomacales, hyperacidité, affections ulcéreuses et cancéreuses de l'estomac.

Posologie. — Un cachet à la fin de chaque repas avec un peu d'eau ou d'infusion peu chaude.

Prix : La boîte de 30 cachets, 13 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 365-2 et 365-3.

Laboratoires du CARBONAL

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-27.)

CARBONAPHTOLAN

Composition et action thérapeutique. — Préparation associant le pouvoir adsorbant du charbon aux propriétés antiseptiques du soufre, de l'urotropine, du benzonaphtol et aux propriétés émollientes, évacuantes de l'agar-agar.

Indications. — Tous les cas de fermentations ou d'infections intestinales, Intoxications et auto-intoxications, Dermatoses d'origine intestinale.

Posologie. — Une cuillère à dessert à chaque repas.

Présentation. — Granulé fondant, très agréable au goût.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du D^r FONTENEAU

B.-F. DELAUNAY, Pharmacien
JOUÉ-LÈS-TOURS (Indre-et-Loire).

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément: le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum*: dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies: *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion*: dans les *fermentations intestinales*, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(anciennement, 7, rue des Archers).

CARBONATE DE CHAUX ADRIAN

Composition :

Carbonate de chaux pur, légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie.

Présentation :

Comprimés dosés à 25 centigrammes.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas et autant après le repas, si besoin.

Prix : Le flacon, 12 francs.

Société Française de Produits pharmaceutiques.

Anct. ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBONATE DE CHAUX LANCOSME

Présentation. — Boîte métal renfermant du Carbonate de chaux *précipité à froid, de très faible densité*, et de saveur très agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'acidité gastro-intestinale, anti-acide et adsorbant.

Indications. — Entéro-colite acide, diarrhée de fermentations, diarrhée saisonnière et des pays chauds, troubles digestifs des gros mangeurs, fétidité des selles, déviations du péristaltisme intestinal, hyperkinésie gastrique, régurgitations, pyrosis.

Posologie et mode d'emploi. — *Sauf prescription spéciale du médecin* : Mettre 2 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau ou une tasse de tisane, attendre 7 à 8 minutes en agitant de temps en temps et absorber une heure avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Le CARBONATE DE CHAUX LANCOSME est d'une innocuité absolue, il n'y a aucun inconvénient à doubler les doses ci-dessus indiquées.

Prix : 9 francs. (Traitement de 15 jours.)

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 17-46.)

CARBONÉSIE

Cachets et Granulé

Composition. — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, magnésie calcinée légère, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux.

Indications. — Gastro-entérites, fermentations intestinales, entérocolites, intoxications et auto-intoxications, diarrhées, colibacillose et ses conséquences.

Avantages :

- 1° Activité maximum vis-à-vis de toutes les toxines, grâce aux 3 charbons, à parties égales.
- 2° Ne constipe pas, grâce à la magnésie.
- 3° Ne contient aucun corps chimique irritant ni toxique.

Posologie :

Cachets : Un ou deux après chaque repas.

Granulé : De goût très agréable : 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas.

Prix :

Boîte de 30 cachets	15 fr.
Boîte de 100 gr. de granulé.....	15 fr.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85).

CARBOPHOS

Médication carbo-calcique.

Aucun toxique : ni belladone, ni opium.
Neutralisation des toxines intestinales et des acides de fermentation.

Récalcification du terrain tuberculeux.

Forme. — Cachets.

Composition. — Charbon végétal, charbon animal purifié, bromure de calcium, phosphate de chaux, carbonate de chaux.

Indications. — Colites chroniques avec fermentations acides et selles molles, diarrhée des tuberculeux, aérophagie, hyperchlorhydrie.

Doses. — 3 cachets par jour au début des repas.

La boîte (30 cachets) : 15 francs.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CARBOQUINOL

Comprimés à base de :

Sulfate neutre d'oxyquinoléine.	0 gr. 03
Hydrate de magnésie	0 gr. 05
Charbon végétal	0 gr. 10

Indications :

Colibacillose (syndrome entéro-rénal de Heitz-Boyer).

Gripes intestinales.

Tous les troubles *intestinaux, biliaires et urinaires*.

Avantages. — Antiseptique plus puissant que produits à base d'*Héxaméthylène-tétramine*.

Agit dans tous les milieux (acide, alcalin ou neutre), sans irriter les muqueuses.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés aux principaux repas.

Enfants : 1 à 2 comprimés aux principaux repas.

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés, pour quinze jours de traitement.

Laboratoire RAVALEC

HERBLAY (Seine-et-Oise). — Tél. : 83.

CARBOREXYL

Estomac-Intestin.

Principes actifs:

Charbon de peuplier léger et poreux à l'état d'extrême division, simple ou associé à l'Urotropine, au Benzonaphtol ou à la Belladone.

Composition:

Pour répondre aux exigences de la thérapeutique nous mettons à la disposition du corps médical 4 formules :

Carborexyl « S » (simple) chaque comprimé = 1 gr. de charbon.

Carborexyl « F » (forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine.

Carborexyl « NF » (naphto-forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine et 25 cgr. de Benzonaphtol.

Carborexyl « B » (Belladone) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 1 cgr. d'extrait et 1 cgr. de poudre de belladone.

Forme:

Comprimés friables, agréables au goût.

Indications:

Hyperacidité, Hypersécrétion, Dyspepsie, Aérocolie, Spasmes douloureux, Dilatation d'estomac, Syndrome entéro-rénal et entéro-hépatique, Colibacillose, Cholécystite, Diarrhée, Intoxication exogène et endogène.

Remarque importante :

Par sa composition, le *Carborexyl Belladone* trouve plus spécialement ses indications dans les cas de gastropathies douloureuses, spasmes du côlon et la constipation qu'ils provoquent. Etant donné son pouvoir toxique, il ne devra être employé que sur ordonnance du médecin.

Posologie :

1 à 3 comprimés par jour, à diminuer ou à augmenter suivant les indications du médecin traitant.

Mode d'emploi :

Croquer ou, de préférence, laisser fondre le comprimé dans la bouche.

Prix :

Carborexyl S	} La boîte 14 francs.
Carborexyl F	
Carborexyl NF	
Carborexyl B	: La boîte 15 francs.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion

A. CHATAIN, Docteur en pharmacie.

Ex-Interne en pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Corneille — LYON.
(Tél. : Lalande 41-81.)

CARBOS

Composition. — Le premier charbon animal activé obtenu chimiquement pur, sans Sulfures ni Cyanures.

Forme. — *Comprimés* de 1 gr. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 gr. de charbon par cuillerée à café.

Indications. — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — *Comprimés* : 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé* : 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR
D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocolites, Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 16 fr. 60.

Laboratoire MONTAGU
49, boulevard de Port-Royal — PARIS
(Tél. : Gobelins 23-90.)

CARBOSEPTINE

Infections gastro-intestinales, biliaires et urinaires.

Composition :

Hexaméthylènetétramine	1 gr. 50
Benzoate de Naphtol B.....	3 gr.
Salicylate de Bismuth	0 gr. 50
Charbon animal chimiquement pur	20 gr.
Sucre aromatisé à l'essence de Menthe	75 gr.

Principales indications. — Intoxication, auto-intoxication, aérophagie, infections gastro-intestinales, appendicite chronique, dilatation d'estomac, stase intestinale, colibacillose, Cholécystites et angiocholites, pyélites, cystites, prostatites, etc...

Deux formes :

Granulés ;

Cachets : offrent l'avantage de ne pas contenir de sucre.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 3 cuillerées à café, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau, à la fin de chaque repas.

Cachets : 1 à 2 cachets après les repas.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Laboratoires de Thérapeutique Générale SEDROB
P. BORDES, Pharmacien.

35, rue Périssé — TOULOUSE (Haute-Garonne).
(Tél. : 258-21.)

CARBOTRIGON

Synonyme Biotrignon Hépatique.

Composition :

Charbon végétal *activé*.

Extrait mou de fenu grec **désodorisé**,
présentés en granulé friable.

Propriétés :

Allie le pouvoir adsorbant et antitoxique du charbon activé aux propriétés stimulantes, nutritives et apéritives du fenugrec.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.

Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie :

1° *Voie buccale*. Solution glycéro-alcoolique à

2 p. 1 000 (XXV gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).

Petites doses : X à XXX gouttes par jour.

Doses moyennes : L à LX gouttes par jour.

Doses fortes : C gouttes par jour.

2° *Voie intraveineuse*. — Ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/2 à 1 cc. p. injec.

Indications. — Insuffisances cardiaques avec importante dilatation ventriculaire et rythme régulier. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 79-59.)

Belgique : *Agent général* : L. Prunières

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

CARDIOBROMINE

Cachets.

Théobromine invarisée d'un contrôle constant. Diurétique puissant ne donnant ni maux de tête, ni maux d'estomac.

Indications. — Affections rénales et cardio-rénales, albuminurie, œdèmes de toutes natures, urémie, uricémie, rhumatismes, intoxications, hydropisie, scarlatine, etc...

Posologie. — 2 à 4 par 24 heures.

Présentation.

Cardiobromine pure, scillitique, digitalique, ouabaïnée, strophantique, spartéinée, caféinée, phosphatée, lithinée.

Cardiobromine. Dragées opothérapiques à l'extrait de rein (néphrites aiguës).

Laboratoires BOULER

E. MAZARS, Pharmacien

26, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CARDIOFLORINE

(Dragées roses cardio-néphrotropées).

Priorité. — La barbiflore (*Orthosiphon stamineus*) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, *Adonis vernalis* et Scille.

Propriétés. — Diurétique cardiotonique. Désintoxicant et uréopoiétique de grande valeur. Remplace et continue l'action des digitaliques. Ne s'accumule pas.

Indications. — Insuffisances cardiaques et cardio-vasculaires, Insuffisance rénale, Artériosclérose, Hypertension, Œdèmes de toute étiologie, Troubles valvulaires, Syndromes neuro-cardiaques, Essoufflement, Obésité, Oliguries, etc.

Posologie. — 1 à 6 dragées dans les intervalles des repas, en moyenne 3 par jour.

Étui de 60 dragées : 15 francs.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA » MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique ».

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de *cratægus oxyacantha* et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de Pharmacologie Générale

VIAL et C^{ie}, 8, rue Vivienne — PARIS.

(Tél. : Gut. 27-03.)

CARDIO-STREPTINE

Vaccin polyvalent pour la Prémunition de la maladie rhumatismale et de ses complications cardiaques.

Corps microbiens + lysats + anatoxine.

Posologie. — 1 injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de $\frac{1}{4}$ de cmc.

$\frac{1}{2}$ cmc. — 1 cmc. — 1 cmc. $\frac{1}{2}$.

Prix. Les 4 ampoules de 2 cmc. : 40 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 24 j. à 1 mois.

Littérature et échantillons aux

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré —
PARIS.

Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes.)

CARDIRÈNE

Composition par cachet. — Digitale stabilisée 0,035, Scille 0,035, Buchu 0,22, Phosphate de soude 0,15, Théobromine recristallisée 0,30.

Forme. — Cachets.

Indications. — Tonique du cœur, Diurétique puissant, Maladies du Cœur et des Reins, Artériosclérose, Albuminurie, Hydropisie.

Action rapide et de longue durée sans fatigue de l'Estomac ni accoutumance.

Doses. — 2 à 3 pendant 5 jours, puis 1 pendant 10 jours. Cesser 10 jours et reprendre le traitement.

Prix : 16 francs la boîte de 24 cachets.

Durée de la boîte : 20 à 25 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle dans le n° 1403-2.

L. ROBERT, Pharmacien

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 0-70.)

CARDITONE

Propriétés thérapeutiques. — Cardio-pathies valvulaires compensées ; Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie. Hypotension essentielle.

Composition :

Extrait de Strophantus	0 gr. 001
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Muguet	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé de.....	0 gr. 35

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescription médicale.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

Tél. : Aut. 81-45 (deux lignes groupées).

CARÉNA

La première aminophylline française.

THÉRAPEUTIQUE CARDIO-RÉNALE

Composition. — Aminophylline synthétique pure (théophylline-éthylène-diamine). *Ni mercure, ni scille.* Sa solubilité lui assure une *prompte absorption* et une *action rapide*.

Action pharmacologique. (Voir *Aminophylline*.)

ANTALGIQUE CARDIAQUE,
DIURÉTIQUE ATOXIQUE
EUPNÉIQUE.

Dilate les vaisseaux coronaires, lève les spasmes coronariens, assure une meilleure nutrition du myocarde et accroît le débit systolique.

Dilate les vaisseaux du rein et augmente la diurèse.
« Lève les barrages » et soulage le travail du cœur dans les syndromes rénaux avec complication cardiaque associée.

Indications : Douleurs et oppressions des cardiaques.

Angine de poitrine. Infarctus du myocarde.

Aortites, Arythmies, Ascites et Œdèmes.

Oliguries des maladies infectieuses.

Dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes.

Avantages : *Rapidité d'action par voie digestive.*

Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Posologie :

Comprimés : dosés à 0 gr. 10 d'aminophylline.

1 ou 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour, à la fin des repas.

Boîtes de 40 et de 200 comprimés.

Gouttes : 1 goutte = 1 centigramme d'aminophylline.

X à XX gouttes dans un peu d'eau, 3 à 4 fois par jour, après les repas.

Suppositoires : dosés à 0 gr. 40. Un ou deux suppositoires par jour.

Ampoules. (Voir *Caréna injectable*.)

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

CARÉNA-CALCIUM

Théophylline calcique française

La théophylline calcique possède toutes les propriétés et indications de la théophylline-éthylène-diamine (Voir *Aminophylline* et *Théophylline*) ; mais son absorption intestinale est plus lente et, si son action est moins rapide, ses effets sont plus persistants.

L'ion-calcium augmente les propriétés diurétiques et toni-cardiaques de la théophylline (*Pr. Zunz*) et contribue à la diurèse chlorurée et aqueuse (*Pr. Blum*). La théophylline calcique est le médicament spécifique de la dyspnée de Cheyne-Stokes (*Vogl*).

Caréna-Calcium est indiqué chez les malades dont le tube digestif est délicat et chez les hyperchlorhydriques.

Présentations :

Comprimés : 3 à 8 comprimés par jour.

Ampoules intraveineuses (10 cc.) : 1 ampoule par jour.

CARÉNA INJECTABLE

L'aminophylline française injectable.

Indications. — *Tous les cas d'urgence :*

Infarctus du myocarde, crises graves d'angine de poitrine, œdèmes aigus du poumon (*Caréna + Ouabaïne*), anasarques des cardio-rénaux, dyspnées cardiaques, dyspnées des urémiques, oliguries infectieuses (*goutte à goutte intraveineux*).

<i>Ampoules Intramusculaires</i> (Cas habituels).	{	Ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 50 d'aminophylline ; injecter en plein muscle $\frac{1}{2}$, 1 ou 2 ampoules par jour.
--	---	--

<i>Ampoules Intraveineuses</i> (Cas spéciaux).	{	Ampoules de 10 centimètres cubes contenant 0 gr. 25 d'aminophylline ; injecter très lentement, en 3 minutes environ.
---	---	--

On peut utiliser par voie intraveineuse une demi-ampoule de 2 cc., diluée dans 10 cc. de sérum glucosé.

CARÉNA-OUABAÏNE]

Toutes les indications de l'Ouabaïne.

Propriétés. — L'association Caréna-Ouabaïne augmente l'énergie du cœur tout en assurant une meilleure nutrition du myocarde par la dilatation des coronaires. Caréna-Ouabaïne soulage la dyspnée et déclenche la diurèse.

Indications. — Toutes les formes d'insuffisance cardiaque.

Asystolie des aortiques. Œdème aigu du poumon.

Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Cœur des vieillards : traitement d'entretien.

Posologie. — Ampoules intraveineuses contenant 10 centigrammes de Caréna et un quart de milligr. d'Ouabaïne.

Injecter une demi à 2 ampoules, lentement, dans la veine, en suivant toutes les directives des traitements par l'Ouabaïne.

Remboursables par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

CARNINE LEFRANCO

Composition. — Suc musculaire de viande de bœuf crue concentré à froid sans addition de sang. Contient tous les ferments vivants, vitamines et antitoxines de la viande crue.

Présentation et Prix :

<i>Sirop</i> : flacon n° 1 de 500 cc.....	48 fr.
<i>Sirop</i> : flacon n° 2 de 250 cc.....	29 —
<i>Sirop</i> : flacon n° 3 de 150 cc.....	21 —
<i>Carnine concentrée en ampoules</i> : 10 ampoules buvables de 10 cc. La boîte.....	24 fr.

Indications et posologie. — Toutes les anémies, tuberculose, convalescence, troubles de croissance, etc.
2 à 3 ampoules ou cuillerées à soupe par jour dans un liquide froid ou tiède.

Remarque. — La *Carnine Lefrancq* peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait tiède, à la dose de deux cuillerées à café ou une ampoule.

Les Laboratoires de la CARNINE LEFRANCO
ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

CAROTTASE

Composition. — Poudre de carottes fraîches stabilisées à froid. 1 gr. de carottase = 4 gr. de carotte fraîche. Aliment végétal renfermant des sels minéraux naturels complètement assimilables, des substances albuminoïdes, des hydrates de carbone, de la cellulose ultra-divisée et des vitamines A, B, C.

Forme. — Poudre.

Indications. — Favorise le développement des enfants et des nourrissons, excite l'appétit, active la croissance, stimule les fonctions de la nutrition et régularise les fonctions intestinales.

Doses. — Après 2 mois, 1 pincée dans chaque biberon (0 gr. 50). — Après 3 mois, 1/2 cuillerée à café. — Après 6 mois, 1 cuillerée à café. — Après 8 mois, de 2 à 4 cuillerées à café.

Pour conserver à la Carottase toute son efficacité, *ne jamais faire cuire*, la délayer avec du lait bouilli et refroidi, puis l'ajouter au biberon, bouillies ou panades déjà préparées.

Pour les produits à base de poudres de légumes frais (carottes, tomates, épinards), voir également VÉGUVA et VÉGUMINE.

Durée moyenne de consommation : 1 mois.

Société anonyme des Établissements WANDER
CHAMPIGNY-sur-MARNE (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

CASCARA ÉPARVIER

« Pilules ÉPARVIER »

Forme. — Pilules dosées à 0,10 d'extrait de Cascara pur, *sans aucun drastique.*

Action. — Laxatif doux, *ne donnant pas de coliques.*

Indications. — Constipation de différentes origines et notamment d'origine hépatique. Laxatif de choix pendant la grossesse et l'allaitement.

Posologie. — 2 pilules le soir, *même si l'on a été à la selle dans la journée.*

Efficacité sûre. Accoutumance nulle.

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

CASCARA MIDY

A base de *Cascara Sagrada* naturel.

Pilules dosées à :

0 gr. 10 d'extrait hydro-alcoolique codex de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

0 gr. 20 de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Doses et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix : 8 francs.

Durée du traitement : un mois.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

CASÉONE FABRE

En poudre.

Diastases actives et pures de la digestion du lait et Ferments lactiques sélectionnés.

Indications. — Dans tous les cas de mauvaise digestion du lait. Troubles gastro-intestinaux de l'adulte et du nourrisson.

Assure la complète digestibilité du lait.

Emploi. — Préparation en cinq minutes de lait caillé non acideensemencé de ferments lactiques.

Le flacon : 20 francs.

Laboratoires FABRE

33, rue de la Haie-Coq — AUBERVILLIERS
(Seine). (Tél. : Flandre 21-40.)

CASOL

Présentation. — Sirop.

(Voir LUDIN.)

Prix : Le flacon : 20 fr.

Laboratoires REY

DIJON.

(Tél. : 22-12.)

CASSILAX

Traitement de la constipation.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Bourdaine, Podophyllin, Aloïne, Extrait de belladone, Ferments lactiques, Entérokinase, Séné, Agar-agar.

Indications. — Rééducateur de l'intestin, Entérites chroniques, Dermatose, Intoxication gastro-intestinale. Laxatif doux, non irritant. Sans accoutumance.

Posologie. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-29.

A. DJIAN, Pharmacien de 1^{re} classe
137, rue de Belleville — PARIS.

CASTANOL

Coqueluche. Toux des ganglionnaires.

Toux quinteuses rebelles.

Composition. — Extraits de feuilles de châtaignier *iodé*, de Drosera, d'Anémone, de Grindelia, de Balotte.

Aucun produit chimique,

Aucun toxique.

Délicieux au goût.

Fortifiant iodotannique de choix.

Posologie :

Enfants : au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

— de 1 à 2 ans : 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 ans : 4 — à café —

— de 4 à 8 ans : 4 — à dessert —

— de 8 à 12 ans : 3 — à soupe —

Adultes : 4 cuillerées à soupe.

Prix : 15 francs.

Pierre LACHAISE, Docteur en Pharmacie
9, place Municipale — TULLE (Corrèze.)

CATALYL

Solution de Chlorure de Magnésium pur associé au Chlorure de Calcium dans un liquide physiologique spécial. Activité intense, Toxicité nulle, Stabilité.

Seule préparation Magnésienne de goût vraiment agréable.
Suppression sur les conditionnements et la littérature de toute allusion au cancer.

Indications :

Asthénies, Surmenages, Hépatisme, Paludisme, Sénilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Diabète, *adjuvant puissant des traitements opothérapiques.*

Mode d'emploi :

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun, dans demi-verre d'eau ou de lait sucrés ou non. Dose variable.
Une cuillerée à café = 0 gr. 50 de $MgCl^2$ anhydre + 0 gr. 10 de Chlorure de Calcium.

Prix : 16 francs.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE.
(Tél. : Italie 16-91.)

CATAPLASME DU D^r LELIÈVRE

Antiseptique instantané, émollient, résolutif.

Approuvé par l'Académie de Médecine de Paris.

Avantages et indications. — Il est *instantané et économique*. Plus de manipulations compliquées, plus de linges.

Il est *antiseptique et résolutif*. — Abscesses, furoncles, anthrax, panaris.

Il est *anesthésiant*. — Contusions, entorses, brûlures, engelures, eczéma, zona.

Il est *antiphlogistique et émollient*. — Ecchymoses, épanchements, hydarthrose.

Il est *décongestif*. — Laryngites aiguës, faux croup et toutes inflammations.

Il est *inaltérable et remplace tous les pansements humides*.

Mode d'emploi. — Soumettre le cataplasme ou un morceau de cataplasme à une faible quantité d'eau tiède ou chaude jusqu'à parfait gonflement, l'appliquer sur la partie malade et recouvrir d'imperméable.

Comme *véhicule*, ce Cataplasme accepte et retient facilement les substances médicamenteuses les plus variées : laudanum, arnica, etc.

On obtient un *Cataplasme sinapisé* en le saupoudrant de farine de moutarde au moment de l'application.

Prix : la pochette de 5 catap. : 8 francs.

E. BOULLE, pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-Interne des hôpitaux. — Lauréat de la Faculté de Paris
19, rue de la Porte-Trivaux — CLAMART (Seine)

(Tél. : Michelet 15-70.)

CATEMÉNYL

Composition. — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamelis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de *marron d'Inde*, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erythrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, antiabortif ; d'*Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

Propriétés et indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphixie des extrémités.

Deux formes. — Gouttes et pilules.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes ou 2 à 4 pilules avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le numéro 489-I.

Traitement d'un mois. Le flacon : 15 francs.

Laboratoire du docteur **LALAURIE**

CUXAC-D'AUDE (Aude).

Dépôt général : **Office commercial pharmaceutique**,
1, rue du Temple — PARIS (III^e) et ses succursales.

CATHACIDE

(AMPOULES)

Curatif des États acidosiques.

Fixateur (par voie indirecte) des sels de calcium.

Propriété thérapeutique :

Neutralise l'acidose humorale pathologique, cause de la déminéralisation et des différentes manifestations liées à une rupture (vers l'acidose) de l'équilibre général acido-basique.

Composition

Solution injectable de citrate neutre de soude pur, en milieu aqueux (5 %), convenablement stérilisée.

Mode d'action :

Le Cathacide, introduit dans l'organisme, soit par voie hypodermique, soit par voie intraveineuse, se transforme par oxydation de la partie organique (ion citrique) en carbonate de sodium, développant ainsi dans l'intimité des tissus la faible alcalinité suffisante pour neutraliser, d'une manière efficace, progressive et durable, l'acidité pathologique. À noter que la plupart des manifestations acidosiques s'accompagnent des symptômes de déminéralisation. En effet, aussi longtemps que le terrain demeure acidosique, aucune fixation de sels de chaux ne peut se produire. Cette constatation, qui explique l'échec des traitements habituels, montre qu'il convient avant tout de neutraliser l'acidose pathologique. La fixation des différents sels (que l'alimentation normale suffit largement à fournir) se produira ensuite normalement.

Indications :

États légers d'Acidose. Carence minérale, rachitisme et déminéralisation, cozéma infantile, gourme, retard de dentition, carie dentaire, troubles de la puberté, lymphatisme, surmenages intellectuels et physiques, convalescences.

États chroniques d'Acidose. Ulcères gastriques et duodénaux, états allergiques en général, urticaire, maladie de Recklinghausen, déficience calcique, ostéomalacie, ostéophytes, vomissements de la grossesse, états pré-tuberculeux, etc...

États graves d'Acidose. États anaphylactiques, syndromes hémorragiques, anémies graves, néphrites aiguës, choc post-opératoire, brûlures étendues, coma diabétique, etc...

Posologie :

États légers (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ou 2 ampoules hypodermiques de 2 cc. par 24 heures.

États chroniques (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ampoule intraveineuse de 5 cc. (ou 2 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

États graves 2 ampoules intraveineuses 5 cc. (ou 4 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

Nota :

Dans tous les cas, le traitement doit être prolongé jusqu'à complète satisfaction confirmée.

L'efficacité et la rapidité d'action dépendent du stade d'acidose au cours duquel le traitement est instauré.

En général, la cure de Cathacide se traduit, au début, par une période de légère lassitude (1^{re} décade) suivie d'améliorations sensibles qui ne cessent de s'accroître (vitalité accrue, euphorie, augmentation de poids, raffermissement des tissus, etc...) ; ces résultats sont faciles à contrôler par les moyens habituels : pesées périodiques, analyses d'urines, taux de viscosité sanguine, etc...

Avantages :

L'injection est indolore. Ni réaction locale ou générale, ni contre indication, ni accoutumance.

Prix et Formes :

Coffret 20 ampoules hypodermiques de 2 cc.....				Frs. 25
Boîte 10	—	—	2 cc.....	— 18
— 10	—	intraveineuses	5 cc.....	— 28
— 5	—	—	5 cc.....	— 18

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Pharmacien

95, rue de Prony — PARIS (17^e). Tél. Galvani. 76-86.

CAVÉFORM

Simple ou benzonaphtolé.

Granulé ou cachet.

Composition :

	Granulé par cuiller à café.	Cachet.
Charbons :		
Animal exempt de cyanogène.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Végétal activé	0 gr. 50	0 gr. 25
FORMol naissant	0 gr. 20	0 gr. 10
(Héxaméthylènetétramine.)		
Avec ou sans Benzonaphtol.....	0 gr. 20	0 gr. 10

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique interne. Très puissant adsorbant des alcaloïdes, bactéries, toxines, gaz, poisons minéraux.

Indications. — Infections intestinales, urinaires et biliaires. Auto-intoxications. Colibacillose. Cystite. Diarrhée. Entérites. Empoisonnements aigus alimentaires. Fermentations intestinales. Mauvaise haleine. Urticaire.

Mode d'emploi. — Après chaque repas : 1 cuillerée à café de granulé ou 1 à 2 cachets.

Présentation pharmaceutique et prix :

Granulé friable : 12 francs le flacon.

Cachets : 15 francs la boîte de 30.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur.

Licencié ès sciences,

114, rue Solférino — LILLE.

CELLARGOS

Antiseptique intestinal.

Composition. — Cellocarbone (charbon spécial de coton activé). Argent colloïdal et Bismuthate d'oxybenzopyridine.

Antiseptique, absorbant, sans toxicité.

Indications. — Infections intestinales, Diarrhées estivales, Syndrome entéro-rénal, Colibacilloses. Fermentations, entérites, colites.

Posologie. — Prendre 1 ou 2 cachets avant ou après chaque repas principal.

Présentation. — En boîte de 30 cachets pour un traitement de 10 à 15 jours.

Prix : 12 francs.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél : Carnot 78-11.)

Bande plâtrée CELLONA

(Bande **Platrix** à prise rapide.)

Forme. — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale.)

Avantages :

- 1^o *Transport des bandes* : Encombrement réduit, légèreté.
- 2^o *Confection du plâtre* : Propreté ; à l'immersion, la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes ; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
- 3^o *Masse constituée* : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où : légèreté des appareils constitués, poids et encombrement réduits de moitié.

En fini, aspect extérieur lisse et brillant.

Mode d'emploi. — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en lissant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. A cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

Indications. — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques, etc...

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS : 104, Fg Poissonnière (X^e) — (Tél. : Lamartine 92-52.)

CELLULAX

Laxatif antitoxémique physiologique à base de celluloses végétales ; de présentation agréable.

Composition. — Ni drastiques, ni cathartiques.

Son de blé 20 p. 100 : Laxatif sélectionné, stabilisé, déshydraté, désamidonné. (Travaux du prof. Fiessinger.)

Lactose 20 p. 100 : Antitoxique, antifermentescible. (Travaux des auteurs américains.)

Gélose pure 6 p. 100 : Emollient, absorbe quinze fois son poids d'eau. Aucune autre substance médicamenteuse.

Indications. — Constipation chronique et rebelle ; atonie intestinale, dystonie gastrique, ptoses, aérocolie ; colites membraneuses, entérocolites, colibacillose, dermatoses, migraines, mauvaise haleine, grippe à forme intestinale.

Présentation. — Granulés sans odeur et de goût délicat.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café, à la fin des repas.

Enfants : au-dessous de 10 ans, une cuill. à café après le repas du soir.

Cure de dix jours par mois.

Laboratoire du CELLULAX

M. PION, Pharmacien,

Quai Jeanne-d'Arc — CHINON (Indre-et-Loire).

CÉPAINE

Spécifique certain de toutes les toux, bronchites, laryngites, affections respiratoires, pulmonaires.

Composition. — Gelsemium sempervirens, Lobelia Inflata, Drosera rotundifolia, Cepallium, Erysimum, Aunée, Myroxylon Balsamum, Sulfogaiacolate de Potasse, Phosphate de Codéine, Organes frais (poumon, glandes surrénales, hypophyse).

Indications. — Toux spasmodiques, coqueluchoïdes, catarrhales ; rhumes : Bronchites aiguës, chroniques, hémorragiques ; enrrouements ; coryza ; laryngites ; trachéites ; gripes ; angines ; douleurs intercostales ; points de côté ; tuberculose, etc...

Posologie. — *Enfants* : jusqu'à 1 an 11 gouttes 6 fois par jour dans un peu de lait, d'eau, de tisane, sucrés ou non.

De 1 an à 3 ans 5 gouttes 6 fois par jour.

— 3 ans à 8 — 10 — —

— 8 — 15 — 15 — —

Adultes 20 — —

La conservation de la Cépaïne est indéfinie, elle ne s'altère jamais. Elle présente sous un volume réduit et peu encombrant la valeur de trois grands flacons de sirop pour la toux. Sa préparation demande plus de trois mois.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU
27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles et les tranchées utérines.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix : 12 francs toutes variétés (10 doses environ).

Lab^{re} de la Cérébrine Fournier

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 50-57.)

CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opothérapique.

Composition. — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

Indications. — Etats pré tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

Action. — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

Posologie. — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

Enfants : (à partir de 10 ans seulement), 1 comprimé tous les deux jours.

Prix : 30 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS.

(Tél. : Odéon 56-67.)

CÉRÉBRON

Antitoxine cérébrale.

Traitement des états neurasthéniques et des maladies nerveuses.

Deux formes. — *Ampoules* de 2 cc. par injections sous-cutanées, *Capsules* pour médication interne.

Action thérapeutique et usages. — Lécithine et cholestérine en solution huileuse.

Le *Cérébron* apporte aux cellules nerveuses les éléments de défense utiles pour lutter contre les toxines ; c'est, de plus, un excellent tonique du système nerveux. Prescrit surtout dans la neurasthénie quelle qu'en soit la cause, chez les personnes dont l'état physique est affaibli en même temps que leur résistance nerveuse ; l'anémie cérébrale, les troubles de la mémoire, l'affaiblissement intellectuel consécutif même à certaines lésions du système nerveux.

Posologie, mode d'emploi. — Une ou deux ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Capsules, 6 par jour, 2 capsules avant chacun des trois repas.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS.

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Formes. — Gouttes acides, cachets et dragées neutres.

Compositions :

	Gouttes	Cachets	Dragées
Méthylarsinate de soude.....	0.015	—	—
Acide phosphorique.....	0.30	—	—
Vanadate de soude.....	0.001	0.001	0.0003
Nucléinate de Manganèse.....	0.05	0.05	0.017
Sulfate de Strychnine.....	0.001	0.001	0.0003
Glycérophosphates {	chaux.....	0.15	0.05
	magnésie.....	0.10	0.035
	fer.....	0.15	0.05
Carbonate de chaux.....	—	0.48	0.016

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, asthénies, anémies, lymphatisme, neurasthénies, maladies consomptives, gripes, convalescences, tuberculose.

Posologie :

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas. — De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge.

Cachets : 1 cachet avant chacun des deux principaux repas.

Dragées : 2 dragées le matin, midi, soir, avant les repas. — De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Echantillons sur demande :

C. DALIN, Pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B-36-32.)

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple)

Reconstituant physiologique.
Minéralisateur complet.

Os frais : Os longs d'animaux en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. Vitamines D naturelles).

Phytophosphine : dosée à 21 % de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Sels minéraux : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

Extrait parathyroïdien : Fixateur des sels minéraux.

Aucune contre-indication : ni Adrénaline, ni Surrénale.

Indications :

États pré tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescences, Surmenage.

Posologie :

Cachets : Adultes, 2 cachets. *Enfants*, 1 cachet.

Comprimés : Adultes, 2. *Enfants*, 1.

Poudre : Adultes, 2 cuill. à café. *Enfants*, 1 cuill. à café. *Nourrissons*, 1/2 cuill. à café.

Granulé fondant : Adultes, 4 cuillerées à café. *Enfants*, 2 cuill. à café. *Nourrissons*, 1 cuill. à café.

Prix :

La boîte de 40 cachets : 16 francs.

Granulé et poudre : 16 fr. 50.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CÉRÉOSSINE IRRADIÉE

(Céréossine survitaminée.)

Vitamine D titrée biologiquement,
Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».
(Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique.)

Indications :

Rachitisme, Pré-rachitisme, Croissance, Tuberculose,
Déminéralisation accentuée chez la femme enceinte et
la nourrice. Fractures, Chirurgie osseuse.

Posologie :

Cachets : prix 22 francs.

Chaque cachet contient une quantité de Vitamine D pure
correspondant à 2 600 unités internationales.

Adultes : 2 à 3 par jour.

Enfants : 1 par jour.

Granulé fondant : prix 20 francs.

Cent grammes de granulé fondant contiennent une quan-
tité de Vitamine D pure correspondant à 40 000 unités
internationales.

Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées. *Nourrissons* : 1 cuillerée à café
par jour.

Conservation :

Dans les cachets, la vitamine D cristallisée pure est
incluse en un granule à noyau gras recouvert d'une cou-
che de sucre glace.

Dans les granulés, la vitamine D est enrobée en un véhi-
cule stéarique additionné d'un réducteur.

Dans l'une et l'autre forme, la conservation de l'activité
de la vitamine D est donc parfaitement assurée.

CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

Par cachet 0,020 de méthylarsinate de soude.

Posologie : *Adultes* : 2 cachets.

Enfants : 1 cachet.

Prix : 16 francs.

CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

Posologie. — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 16 francs.

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

CERINIL

Neuro-toxine des Terres Rares.

Composition. — Chlorure de cérium, chlorure de sodium, bromure de radium (traces), eau bidistillée.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et ampoules de 1 cc. et 2 cc. (voie intraveineuse et intra-musculaire).

Propriétés thérapeutiques. — Agglutine le B. de Koch, neutralise les toxines, provoque l'oxydase permanente du sang. Augmente dans des proportions considérables le pouvoir défensif de l'organisme.

Indications. — Tuberculoses : pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, cutanée, Pré-tuberculose. Anémie, scrofule, chlorose.

Posologie. — 1^o Voie buccale, dose progressive de IV à X L gouttes par jour, avant les repas.

2^o Voie intra-veineuse ou intra-musculaire, toujours précédée par une cure buccale de quelques jours. Deux injections par semaine du contenu d'une ampoule.

Le CERINIL n'est pas toxique aux doses indiquées. Son emploi est à surveiller dans les tuberculoses aiguës et les états congestifs.

Prix : 25 francs les gouttes grand modèle.

13 fr. 50 les gouttes petit modèle.

25 francs ampoules de 2 cc.

20 francs ampoules de 1 cc.

Laboratoires DECHATRE-LEBAS, Pharmacien
20 bis, rue du Sergent-Godefroy — MONTREUIL-PARIS.
(Tél. : Avron 14-69.)

CÉTHOCAL

Formules du D^r LEMAY, pour l'emploi thérapeutique des Sels de Terres Rares, associées au calcium, pour le traitement des dermatoses.

POUDRE ET PÂTE CÉTHOCAL

Dermatoses, Eczémas, Lupus, etc...

Hygiène des Bébés et de la peau.

Incolores, Inodores et sans Corps Gras : 10 fr.

GOUTTES CÉTHOCAL

Adjuvant interne de tout traitement des dermatoses. XV à XX gouttes au début des repas : 15 fr.

AMPOULES CÉTHOCAL

Psoriasis, Désensibilisation, Asthmes : 25 fr.

OVULES CÉTHOCAL : 18 fr.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS (XII^e).

CHARBON FRAUDIN

Composition. — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés, doués d'une grande porosité.

Formes pharmaceutiques :

- 1° Granulés sphériques aromatisés à la menthe, ou à l'anis, avec ou sans naphtol B.
Charbon naphtolé — Charbon simple.
- 2° Comprimés sans sucre à 0 gr. 75.
- 3° Dragées de charbon simple aromatisées au cacao.

Propriétés. — Pouvoir absorbant et adsorbant considérable, grâce à la texture particulière des bois légers employés.

Indications thérapeutiques. — Aérophagie, Dyspepsies flatulentes, Gastro-entérites, Grippe intestinale, Intoxications de toute nature.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café par jour, à la fin des repas.

Laboratoires des CHARBONS FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).
(Tél. : Molitor 02-62.)

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

3 formes :

Anisés simples. — Anisés naphtolés. — Anisés magnésiens.

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, simple ou magnésien.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable. *Divisent et expulsent* mieux que les laxatifs.

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvois, Embarras et Fermentations intestinales. *Pour l'Estomac net et l'Intestin net.*

Dose. — 1 cuillerée à café, soit après chaque repas, ou le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible. La forme des grains supprime le spasme intestinal. Ne contient ni atropine, ni belladone. Peut être donné à tous les âges et dans tous les états.

Prix, taxe d'état comprise : Anisé simple : 8 fr. 50.

Anisé naphtolé : 8 fr. 50. — Anisé magnésien : 10 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT
L. ÉCHEMAN Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Montmartre 01-91.)

CHARRIER

L'Eau Minérale Naturelle Vivante.

Cette eau ne ressemble à aucune autre eau minérale, ni dans sa composition, ni par son action.

Eau froide (8°), à pH très bas : 4,2 non gazeuse, très digestive, très légère et très agréable à boire, à jeun et aux repas.

Pureté rare (23 milligrammes de résidu sec par litre), soit une eau 20 à 60 fois plus pure que les eaux de diurèse les plus réputées, donc *l'eau unique pour laver le rein et l'organisme.*

Acide silicique libre : 40 % de sa minéralisation totale, donc *l'eau la plus antiarthritique des eaux connues.*

Super-radioactivité : 12,5 millimicrocuries de radon (gaz émanation du radium) par litre d'eau (*Institut du Radium, P^r Lepape, du Collège de France, etc.*). Donc l'eau vivante par excellence.

Cuivre : 1 centième de milligramme par litre d'eau (*Académie de Médecine*). Donc l'eau de désintoxication certaine.

Action Diurétique et Antiseptique remarquable (désintoxication générale, arthritisme, goutte, rhumatismes, toutes **Colibacilloses**). Active et régularise les fonctions du **Rein** et de la **Vessie**, de l'appareil digestif et de ses annexes, de l'intestin ; elle facilite l'élimination de l'**Acide urique**, la disparition de l'**Albuminurie** et la diminution de l'**Urée** dans le sang.

EAU DE CHARRIER à LAPRUGNE (Allier). (Tél. : 2 à Laprugne.)
et 24, avenue de l'Opéra — PARIS. (Tél. : Opéra 74-58.)

CHASVERS MICHEL

Composition. — Le « CHASVERS MICHEL » est à base d'essence de chêne de Jérusalem.

Action. — Assure la destruction rapide de tous les vers intestinaux (Lombricoïdes, Oxyures, Ascarides, etc.)

Présentation. — Chasvers Michel *adultes* : en capsules renfermant 0,20 d'essence (prix au public : 5 francs).

Chasvers Michel *enfants* : en perles renfermant 0,10 d'essence (prix au public : 5 francs).

Posologie :

Chasvers Michel adultes : de 15 à 18 ans, une capsule le matin à jeun trois jours consécutifs.

Au-dessus de 18 ans : deux capsules le matin à jeun trois jours consécutifs.

Chasvers Michel enfants : de 8 à 12 ans, une perle le matin à jeun trois jours consécutifs.

De 12 à 15 ans : deux perles le matin à jeun trois jours consécutifs.

Enregistré au Lab. nat. de cont. des médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

CHÉLIBILE

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Produit se différenciant des préparations analogues par addition de Chélidoïne.

Formule. — Oléate de soude, Extrait de bile, Extrait de boldo, Podophyllin, Extrait Belladone, Chélidoïne.

Indications. — *Embarras gastrique*, Insuffisance hépatique, Drainage biliaire, Antisepsie hépatique et intestinale, Ictère, Coliques hépatiques.

Posologie :

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Enfants : 2 à 3 par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 882-5.

A. COUSIN

Pharmacien de 1^{re} classe

Rue Albert-I^{er} — BEAUMONT-SUR-OISE
(Seine-et-Oise).

CHÉLOÏDINE

Pommade résolutive et calmante
à base de Thiosinamine, salicylate de soude
et chlorhydrate d'amylène.

Dépourvue de toute toxicité.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Prix : 15 francs.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 14-12.)

CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Tricho-céphale, etc.

Seule présentation officinale, définitive et parfaite, inoffensive et sûre, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en *volume* et non en gouttes (1/4 de cc. par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge : maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Prix de vente : 15 francs.

Laboratoire L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne). — Tél. : 106.

CHIBROMERCUROBROME

Dérivé Bromé de la Fluorescéine Mercurique. Puissant antiseptique (50 fois plus que l'Argyrol à 5 p. 100).

Pour l'Ophtalmologie :

	Prix au public :
En pommade , à 1 p. 100.....	15 francs
En collyre , à 1 p. 100 (adultes) (en instillations uni ou biquotidiennes).....	15 —
En collyre , à 1 p. 100 (nouveau-nés) (deux gouttes dans l'œil de l'enfant à la naissance).....	6 —

Pour Chirurgie :

En solution , à 2 p. 100 (flacon de 30 grammes) (Pour badigeonnages, comme puissant désinfectant du champ opératoire)...	15 —
Pour plaies infectées, plaies suppurées (abcès, furoncle, flegmon, anthrax). Pour les lavages chirurgicaux, diminuer plus ou moins la dose d'eau.	

Pour Gynécologie :

En **solution**, 2 p. 100 pour désinfection préventive de l'accouchement, badigeonnage externe et interne, **ovules**, **ampoules**, etc.

Pour médecine générale

Examen dans toutes les maladies des femmes, en badigeonnage.	
Solution 2 % , flacon de 30 grammes. Ovules , boîte de 6...	15 —
En injections vaginales par ampoules, 1 % 1 cc., boîte de 12.	15 —
Maladies des voies urinaires, pour blennorrhagies, en désinfection du canal de l'urètre. Solution 2 % . Collutoire ..	10 —
n ampoules injectables 1 cc. 1 p. 100, par voie veineuse, pour infections généralisées, Septicémie, etc., boîte de 12.	14 —

Laboratoire H. CHIBRET 5, rue St-Hérem, Clermont-Fd (P.-de-D.)

Voir à Collyres **CHIBRET** et à Pommades **CHIBRET**.

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

Indications. — Petite et grande chirurgie, Pansements humides, lavages. Gynécologie, Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections; 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Prix : 4 fr. 75.

Laboratoire ADAM
Docteur en pharmacie
GRANVILLE (Manche).

CHLOMAG

Composition. — Chlorure de Magnésium. Bromure de Magnésium. Peroxyde de Magnésium.

Indications. — Tonique du système nerveux faisant disparaître la fatigue nerveuse. Action remarquable sur la peau; guérison de l'Acné, amélioration des Psoriasis et des Prurits. Véritable préventif des Néoplasmes et des Tumeurs. Résultats efficaces dans le Rhumatisme chronique et dans les manifestations de l'Arthritisme.

Posologie. — 2 comprimés par jour, les prendre le matin à jeun avant le premier déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Pour obtenir un résultat rapide dans la lutte contre l'Arthritisme et le Rhumatisme, il est nécessaire de renouveler la dose avant le repas du soir.

En flacon de 45 comprimés. Prix : 12 francs.

L. N. C. 428-2.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH
18, rue des Écoles — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 18-54)

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Sédatif nervin d'innocuité éprouvée, préférable aux uréides et opiacés.

Tous les mérites de la synergie chloral-brome et de l'état dissous.

Pas d'accoutumance.

Composition :

Représente, en milieu dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas les muqueuses (formule du D^r Dubois),
0 gr. 40 chloral, 0 gr. 60 bromure, par cuiller à soupe.

Posologie :

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à soupe ou à café suivant l'âge.
Névralgies, névroses, psychoses, malaises des hypertendus, tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux : chorée, épilepsie, coqueluche, dysménorrhée, etc. : 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café selon l'âge, dans les 24 heures.

Prix : Flacon 20 francs. — 1/2 flacon : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-3.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS.

CHLORALGINE

Formule :

Hydrate de chloral	15 gr. 35
Antipyrine	4 gr. 60
Chlorure de magnésium anhydre	1 gr. 20
Thymol	0 gr. 15
Arsénical d'appellation acide méta- aceylamino-paraoxyphénylarsinique..	0 gr. 76
Excipient pour 100 gr.	

Particularité. — Contient un Arsénical, de la série des Arsénobenzènes, stabilisé en solution.

Action. — Antiseptique, calmant, hémostatique, cicatrisant, spirillicide, *bactéricide*.

Indications :

1° Affections de la gorge : angines, laryngites, amygdalites, etc.

2° En stomatologie : abcès, pyorrhée alvéolaire, etc., et après toute intervention.

Présentation. — En 2 flacons :

G. M. : 12 francs et P. M. : 8 fr. 50.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un grand verre d'eau bouillie tiède en Gargarismes ou Bains de bouche, 3 fois par jour.

Laboratoires de la CHLORALGINE

3, Cours Gambetta — CAVAILLON (Vaucluse) (Tél. : 3-74)

CHLORALOSANE

(« Chloralose pur, exempt de parachloralose. »)

Propriétés. — Hypnotique de choix, non toxique, inaltérable.

Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Pas d'action nocive sur le cœur, le rein, les voies digestives.

Peut être prescrit aux femmes pendant la grossesse, aux vieillards, aux enfants.

Indications. — Insomnies nerveuses de fatigue, de surmenage, Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques, des neurasthéniques.

Auxiliaire des anesthésies générales, adjuvant aux cures de désintoxication (alcoolisme, morphinomanie).

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant coucher. Avant l'anesthésie générale : 2 comprimés la veille ; ou 2 heures avant à la place de la piqûre de morphine-scopolamine.

Après l'opération : 2 comprimés.

Présentation :

Flacon de 20 comprimés à 0 gr. 15 : 12 francs.

Établissements KUHLMANN

Produits R. A. L. Spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 99-51 à 57).

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten, inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T 0 gr. 05.

Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection de l'intestin (Fétidité des selles, etc.), sans porter atteinte à aucune de ses fonctions digestives.

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué. — Anesthésie locale, névralgies.

Flacons en métal à 50, 100 gr., vis ou à clapets et en verre de 15, 30, 50 gr. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.

Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.

Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur. — Bidons de 250, 500 grammes et 1 kilo.

Laboratoire du Docteur BENGUÉ et fils

Pharmaciens,

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

CHLORICAL

Forme. — Solution aromatisée au suc de fruits.

Composition. — Solution titrée de façon que 78 gouttes (1/2 cuillerée à café) correspondent à 1 gr. de chlorure de calcium cristallisé chimiquement pur, stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique. Déchlorurant. Recalcifiant.

Indications. — Traitement préventif des hémorragies post-opératoires, Epistaxis, Hémoptysies, Hématémèse, Toutes Hémorragies (pulmonaires, capillaires, cérébrales, etc...), Métorrhagies, Œdèmes, Néphrites, Pleurésies, Albuminuries, Tuberculoses, Grossesses, Allaitement, Croissance, Caries dentaires, Accidents sériques.

Mode d'emploi. — Aux repas, dans un peu d'eau sucrée.

Enfants au-dessous de 12 ans : 5 gouttes par année d'âge.

Adultes : de 60 gouttes à 2 cuillerées à café et demie. Suspendre la médication pendant huit jours après traitement de 3 semaines.

Prix : 16 francs.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

CHLORIDIA

Pepsine — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Prix : 17 fr. 60

**Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H
BRUN ET MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). Tél. : Arch. 87-44.
R. du C. Seine 218-670.

CHLORINOL

Forme pharmaceutique et composition. — Huile végétale neutre et stérile avec chlorétone, orthoforme, camphre et essences.

Propriétés. — Sédatif, décongestionnant et antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Huile de qualité *exceptionnelle* très *diffusible*, très *agréable*, associant à des médicaments actifs des essences dont le *choix* a été déterminé d'après leur *pouvoir antiseptique* et leur action *non irritante*.

Indications. — Toutes affections du rhinopharynx.

Présentation et mode d'emploi. — Deux formes :

1° *Liquide* : III à IV gouttes, 3 à 4 fois par jour, en instillations nasales ou en pulvérisations et en *injections intratrachéales*. (Flacon de 20 grammes.)

2° *Capsules* pour instillations nasales, 3 à 4 fois par jour. (Boîte de 20 capsules.)

Prescription. — Un flacon Chlorinol Falvy, ou une boîte capsules Chlorinol Falvy.

Flacon : 15 francs. — Capsules : 10 francs.

Les laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, r. des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

CHLORYPEPSINE

Comprimés.

Combinaison stable de HCL « ionisé » et pepsine.

Formule. — Chaque comprimé correspond à :

HCl dilué officinal..... V gouttes.

Pepsine titre 100 0 gr. 25

Action physiologique. — La Chloripepsine agit selon le moment de son absorption :

Avant ou au *début* du repas : stimule la sécrétion gastrique (HCl libre), complète et assure la digestion pepsique (HCl + pepsine), régularise le réflexe pylorique, agit sur les fermentations.

Après le repas, dans l'hyperchlorhydrie, son HCl libre déclenche une sécrétion de mucine qui protège la muqueuse et supprime la sensation de brûlures.

Indications thérapeutiques. — Insuffisances gastriques, Dyspepsies hypopeptiques, Hypo et anachlorhydrie, Pyrosis, Fermentations.

Posologie. — *Adultes* : de 1/2 à 3 comprimés généralement avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou coupée de vin.

Nourrissons : commencer par 1/2 comprimé.

Prix. Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e). Tél. : Laborde 08-51.

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. CaCl^2 .

Indications :

Recalcifiant : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme *préventif* des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite, Œdèmes.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;

L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

CHLOROFORME ADRIAN

Composition. — Chloroforme chimiquement pur, préparé spécialement pour l'anesthésie. Répond entièrement aux conditions de pureté exigées par le Codex français.

Indication. — Anesthésie générale.

Présentation :

a. Ampoules de 15, 30, 60 gr.

b. Flacons de 30, 60, 125, 250, 500 gr. et 1 kilog.

Prix : Flacon de 30 gr. : 7 fr.

— 60 — : 12 fr.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 15 gr. : 6 francs.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 30 gr. : 10 francs.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 60 gr. : 14 francs.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Anct. ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORO-MAGNÉSION

Composition. — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes — 1 gr. 20 $MgCl^2$ — 0 gr. 50 $CaCl^2$.

Indications. — Asthénie, Régulation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillômes, Cancer), Tremblements.

Emploi. — Dix jours sur quinze :

Adultes : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

Enfants : 3 fois V gouttes.

Nourrissons : 3 fois III gouttes.

Accidents Sériques. — **Urticaires** : C gouttes en 4 ou 5 fois dans la journée pendant 3 à 5 jours.

Enfants : LX gouttes.

Laboratoire National de Contrôle n° 27-1.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS. (Tél. : Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

CHLOROPHYLLE

DU DOCTEUR DAVID-GALATZ

Chlorophylle sodico-magnésienne cristallisée.
Solution concentrée à 10 % en ampoules de 5 cc.

Propriétés biologiques:

Cyto-régulateur. — Cyto-freinateur.

Actino-catalyseur.

Sensibilise les néoplasmes aux effets des rayons X.

Indications:

TOUS LES CANCERS

Cancers inopérables. — Cancers radio-résistants.

Cancers récidivants après traitement chirurgical
ou radiothérapique.

Toxémie asthénisante du cancer. Cachexie cancéreuse.

Lupus. Ulcères (adjuvant des U. V.).

Mode d'emploi:

Une ampoule chaque jour par voie intraveineuse (diluée et injectée lentement) pendant 12 à 15 jours. Pour les cancers superficiels ou accessibles, injecter 1 à 2 ampoules intratumorales avant radiothérapie.

Compléter la cure par l'administration quotidienne de 3 fois XX gouttes de PHYLLA. (Voir PHYLLA.)

Produits biochimiques spéciaux de la

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, Bd. de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e) (Invalides 43-60).

CHLORUMAGÈNE

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Poudre.

Composition. — Hydroxyde de magnésium pur
Codex de densité constante sans odeur ni saveur.

Propriétés. — Au contact du suc gastrique formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène (fluorure bromure, iodure); de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

Indications. — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse.

Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

Doses habituelles. — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 17 fr. 50 pour un mois.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

Comprimés glutinisés.

Composition. — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

Indications. — Acidifiant urinaire énergique, antilithiasique, adjuvant de la vaccinothérapie anticolibacillaire dans les manifestations urinaires.

Posologie. — 4 à 8 comprimés par jour. Avaler sans croquer à chacun des repas.

Prix du flacon : 15 francs.

LABORATOIRE D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.
(Tél. : Trinité 23-84.)

CHLORURE DE MAGNÉSIUM ADRIAN

Composition :

Chlorure de magnésium anhydre : 0 gr. 121 pour un comprimé dragéifié.

Propriétés :

Tonique général et nervin, préventif des néoplasmes, régulateur des fonctions digestives et hépatiques,

Indications :

Asthénie, surmenage, convalescence, épuisement, neurasthénie, troubles digestifs, dermatoses, verrues, thérapeutique antinéoplasique.

Présentation. — Comprimés.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 10 comprimés par jour.

Prix : 20 francs le flacon.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Anct. ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORURE D'ÉTHYLE ADRIAN

Composition. — Chlorure d'éthyle préparé spécialement pour le anesthésies locales et générales.

Indication. — Anesthésies locales et générales.

**Présentation
et prix :**

a. La boîte de 2 ampoules de	1 cc. :	3 fr. 50.
— 2 —	2 cc. :	4 fr.
— 2 —	3 cc. :	4 fr. 50.
— 2 —	4 cc. :	5 fr.
— 2 —	5 cc. :	6 fr.
b. La boîte de 1 ampoule de	10 cc. :	5 fr.
— 2 —	10 cc. :	7 fr. 50.
— 6 —	10 cc. :	16 fr. 50.
— 10 —	10 cc. :	26 fr.
— 1 —	25 cc. :	7 fr. 50.
c. La boîte de 6 ampoules de	1 cc. :	8 fr. 50.
— 6 —	2 cc. :	9 fr.
— 6 —	3 cc. :	10 fr.
— 6 —	4 cc. :	11 fr.
— 6 —	5 cc. :	13 fr.
— 6 —	25 cc. :	30 fr.
— 10 —	25 cc. :	60 fr.
Tube métal de 50 grammes : 15 fr. 50.		

**Société Française de Produits Pharmaceutiques
Anciennement ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e). (Tél. : Archives 97-80, 81, 82).

CHOCYNOL

Comprimés cholagogues et cholérétiques atoxiques.

Association des extraits stabilisés d'Artichaut et de Boldo aux Extrait Biliaire purifié et Extrait Hépatique total : 5 centigrammes de chaque par comprimé glutinisé et « dragéifié ».

Indications. — *Toutes insuffisances hépatiques.* Troubles circulatoires s'y rattachant. Insuffisance cardiaque, Hypertension, Cirrhoses infectieuses, toxiques, etc.

Troubles biliaires. — Lithiases, Ictères, Coliques hépatiques, Prurits, Migraines, Asthmes, etc. Auto-intoxications, Arthritisme, Dyspepsie d'origine hépatique, Paludisme, Foie des Coloniaux.

Présentation médicale. — La boîte (48 comprimés glutinisés) : 15 francs. (Soit 8 à 12 jours de traitement.)

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour répartis aux repas. *Aucune toxicité.*

Spécialité admise aux Assurances sociales.

Laboratoires du « CHOCYNOL »

G. et J. HUYGHE, Pharmaciens

BRAZEY-EN-PLAINE (Côte-d'Or). (Tél. : 19).

CHOLAGOL

Insuffisance Hépat-Intestinale.

Présentation. — Granulé (Cholagogue antiseptique et antitoxique).

Formule :

Calomel.....	0,05
Peptone de Witte.....	5,50
Sulfate de magnésie desséché.....	25 gr.

Indications. — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une exonération intestinale plus complète.

Ictères, Subictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépat-ointestino-rénale, Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

Posologie. — Une cuillerée à café, à dessert ou à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau chaude.

Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Prix : 17 francs.

Laboratoires REBOUL

E. MAZARS, pharmacien.

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CHOLAL

Ampoules buvables.

Traitement causal de la Lithiase Biliaire — Préventif et curatif.

La Lithiase biliaire est provoquée par la floculation et la coagulation de la mucine, entraînant ensuite la cristallisation de la cholestérine.

La cause déterminante de ce phénomène réside dans une tendance acidotique de l'ambiance hépato-biliaire mise en évidence par les travaux de Maclurj, Forbes, Neubauer, Lichtwitz, d'Amato, Thenard, Friedrichs, Scala, Bouchard, etc...

Reprenant les expériences de ces auteurs dont les résultats ont été examinés à la lumière des connaissances acquises en ce qui concerne les eaux minérales et les colloïdes dans le domaine humoral, et procédant à toute une série de travaux, il a été possible de réaliser un complexe proto-colloïdal capable de circuler sans altération dans l'organisme et d'agir spécifiquement sur le foie et la bile.

Composition et mode d'action.

Les complexes ioniques minéraux de Cholal sont de vrais proto-colloïdes qui, par catalyse, corrigent le déséquilibre acido-basique par action sur le terrain humoral et tissulaire, et ramènent l'ambiance hépato-biliaire à la faible alcalose physiologique.

Sous cette action, les calculs biliaires se désagrègent progressivement et sont éliminés, en même temps que l'ambiance, redevenue physiologique, s'oppose à la formation de concrétions nouvelles.

A la différence des cholagogues ou des cholérétiques habituels, Cholal constitue de ce fait le traitement *causal* de la lithiase biliaire, aussi bien préventif que curatif.

Indications.

Lithiase biliaire. — Congestion du foie — Coliques hépatiques — Ictère — Constipation d'origine hépatique — Troubles hépatobiliaires, etc...

Posologie.

Le traitement par Cholal sera conduit, bien entendu, en tenant compte de l'indication traitée ; son efficacité se traduira toujours, dès la première quinzaine, par différents symptômes : bien-être remarquable, éclaircissement du teint, disparition des divers troubles, etc...

Mais, pour être vraiment curatif, le traitement, à raison d'une ampoule par jour, devra être prolongé bien au delà de ces premiers symptômes d'amélioration.

La posologie *optima* devra généralement prévoir en pratique :

1^o **Traitement d'attaque.** — Prescrire, durant un mois au *minimum*, une ampoule par jour à prendre dans un verre d'eau le matin à jeun (une demi-heure au *minimum* avant toute autre ingestion).

Ce traitement d'attaque est justifié par le caractère causal de la médication et par l'origine toujours ancienne, souvent atavique, de la manifestation pathologique. Il appartient au médecin traitant de faire poursuivre ce traitement d'attaque, selon les cas, pendant plusieurs mois au besoin, en exigeant la persévérance.

2^o **Traitement d'entretien.** — Prescrire par la suite un traitement d'entretien avec décades alternées de cure et de repos ; enfin après satisfaction confirmée, il sera toujours indiqué, pour éviter les récidives, de conseiller ultérieurement une cure de printemps et une cure d'automne comportant, au début de chacune de ces saisons, deux ou trois décades de traitement, séparées par des repos équivalents.

Mode d'emploi.

L'ampoule doit être agitée avant d'être débouchée et le mélange Cholal-eau doit être préparé extemporanément.

Pas de régime spécial. Une alimentation variée est à conseiller. Toutefois, faire usage du vin avec modération, proscrire l'alcool et en général éviter tout excès.

Pas de contre-indication, ni intolérance, ni accoutumance. Le Cholal est inoffensif et sans saveur.

Présentation et Prix de Vente.

Coffret Cholal 30 ampoules (modèle normal)..... 35 francs.

Boîte — 10 — (petit modèle)..... 18 francs.

Littérature spéciale et échantillons sur demande aux :

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Phien, 95, rue de Prony — PARIS (17^e) — (Galvani 76-86.)

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

Réalisation en thérapeutique journalière de l'épreuve de Meltzer-Lyon.

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

Prix : 14 francs.

VINCENT, pharmacien.

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

CHOLÉFLUINE

Forme. — Granulé soluble, agréable au goût.

Composition :

Sulfate de magnésie	28 gr.
3 Peptones (Viande, Poisson, dite de Witte)	9 gr.
Hyposulfite de soude	4 gr.
Extrait de Boldo	2 gr. 50
Sucre parfumé. Q. S. pour	100 gr.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

Contre-indication (temporaire). — Cholécyститes aiguës.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

- 1° Peptone de viande.
- 2° Peptone dite de Witte.
- 3° Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, **Action antifloculente et anti-anaphylactique** par **Hyposulfite de soude**.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 53-16.)

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf, capsules dosées à 0 gr. 20.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Opothérapie biliaire.

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Prix : 13 fr. 50 (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

Indications. — Congestion du foie, lithiase, cholécystite, acholie, ictères, hépatites, cirrhoses, cholémie, phénomènes gastro-intestinaux, constipation, colite muco-membraneuse, arthritisme.

Prix : 13 fr. 50 (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉLYSE

Médicament spécifique et préventif de la Colique Hépatique et de la Lithiase Biliaire, à base d'Acide oléique pur, d'après les études du Dr ARTAULT DE VEVEY.

Mode d'emploi. — La CHOLÉLYSE, en capsules dosées à 0,50 d'Acide oléique, se prend à jeun, pendant 10 jours par mois par mesure préventive dans les cas de coliques mensuelles, ou en cas de crises, 2 à 3 capsules d'un coup, dose qu'on peut renouveler un peu plus tard.

Prix : 15 francs.

Préparé par

L. CARBOU, Pharmacien

8, rue Jean-du-Bellay — PARIS (IV^e).
(Tél. : Odéon 39-09.)

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : 10 fr. 50.

Flac. : 15 jours de traitement environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 12-63.)

CHOLÉO-FLUASE

Composition :

Sulfate de magnésie desséché	28 gr.
Peptone purifiée	5 gr.
Charbon activé	2 gr.
Surrénine	1 gr. 6
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé fondant.

Indications. — Agent cholagogue énergique. Traitement des troubles digestifs spéciaux d'origine hépatique. Migraines, vertiges, nausées, Urticaire, etc.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau tiède ou une infusion, 1/2 dose pour les enfants.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-2.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8).

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

Doses et mode d'emploi. — 6 dragées par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Dr Pierre ROLLAND

et DURET et RÉMY réunis

ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34.)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Forme : Comprimés. Formule nouvelle avec **Boldo total.**

Composition :

Boldo total.....	0,035
Entérokinase	0,05
Ferments lactiques sélectionnés...	0,005
Pancréatine	0,10
Extraits biliaires dépigmentés.....	0,10
par comprimé.	

Dose :

Adultes : 4 à 6 par jour, 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Troubles de la peau.

Prix : 14 fr.

Échantillons sur demande.

Laboratoire DAGUIN, à SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 00-27.)

CHOLÉOLAX COLAS

Association des trois Cholagogues vrais.

Forme. — Granulés friables, aromatisés à la vanille, agréables au goût.

Composition. — Huile d'olive vierge, Sulfate de magnésie desséché, Peptone de viande.

Propriétés thérapeutiques. — Draine la vésicule biliaire, Décongestionne le foie, Combat la constipation et les fermentations, sans irriter l'intestin.

Indications. — Infection et stase vésiculaires, Cholécystites aiguës et chroniques, Atonie de la vésicule, Hépatisme, Congestions actives et passives du foie, Constipation chronique et ses complications.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun pur ou dans un peu d'eau. *Enfants :* 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires Robert COLAS

133, rue Lecourbe — PARIS.

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

CHOLÉOPEPTINE

Le plus actif des Cholagogues.

Présentation. — Granulé soluble.

Composition. — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

Propriétés. — Augmente de plus de 50 p. 100 la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

Indications. — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère, Herpès, Migraines rebelles, Urticaires, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le Zona.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ; 10 jours par mois.

Dans le Zona, faire prendre en plus une cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

Enfants : De 1/2 à 1 cuillerée à café, le matin à jeun.

Prix : 18 francs.

Laboratoires MARCEL LOGEAI

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Suffren 03-38.)

CHOLÉO-ZYMATINE

Composition. — Peptones associées (Viande, Poisson, Lait, Œuf, Gluten), Formine (à faible dose), Sels de magnésie, Artichaut, Zymatine.

Propriétés. — Décongestionnant hépatique, Pansement intestinal, Cholagogue alcalin, Laxatif doux, Antiémétique, Antichoc.

Indications. — Affections hépato-biliaires, Anaphylaxies, Dermatoses, Troubles du sympathique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau (chaude de préférence) ou une cuillerée à café avant les repas.

Une boîte contient 8 jours de Traitement à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires LESCÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS (XV^e) Tél. Vaug. 08-19
et LIVAROT (Calvados).

CHOLÉRÈNE (comprimés)

Médication cholagogue.

Drainage des voies biliaires.

Solubilisation du Cholestérol de la bile.

Formule. — 1 comprimé *glutinisé* contient :

Extrait de boldo	0,01
Extrait de Romarin	0,02
Extrait d'Artichaut	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée	0,05
Oléate de soude	0,20

Indications thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Ictère catarrhal. Etats congestifs du foie. Coliques hépatiques. *Lithiase biliaire*. Cholécystites.

Posologie. — De 2 à 4 comprimés par jour avant les repas.

Cure d'entretien : 2 comprimés le matin à jeun.

La boîte de 45 comprimés : 18 francs.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, pharmaciens
Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CHOLERGINE

Médication Antitoxique,

Colloïdes et Lipoides. Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Soc. de Thérapeutique (1911-1912). — Académie de Médecine (1911). — Soc. Inter. de la Tuberculose (1911). — Académie des Sciences (1912). — Soc. de Biologie (1911). — Congrès de l'Ass. Fr. p^r l'Av. des Sciences (1911). — Soc. de Pathologie Comparée (1913-1914), etc...

Deux formules : Cholergine simple, Cholergine camphrée.

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.

Posologie et moded'emploi. — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection.

Injecter lentement.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux

Prix. La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

CHOLOFLUOL

Composition :

Sulfate de magnésium anhydre	20
Sulfate de sodium anhydre.....	2
Citrate trisodique	2
Bicarbonate de soude.....	1
Benzoate de soude	5
Chlorure de sodium	1
Chlorure de magnésium anhydre	0,50
Saccharose. Q. S.....	100 gr.

Propriétés. — Cholagogue, antiseptique des voies biliaires, stimulant et régularisateur des fonctions hépato-vésiculaires.

Indications. — Insuffisance hépatique, ictères, cholémie familiale, cholécystite, angiocholite et toutes infections des voies biliaires.

Présentation. — Granulé friable, entièrement soluble et sans goût.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 110 grammes.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillères à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède, 1/2 heure environ avant le petit déjeuner.

Laboratoire F. LAGARCE

Docteur en Pharmacie

13, place de la Nation — PARIS.

(Tél. : Diderot 61-05.)

CHOPHYTOL-ROSA

CRISTALLISÉ INJECTABLE

(AMPOULES de 5 cc.)

La médication active (préventive et curative) de la Rétention Azotée, de la Polysclérose et de l'Oligurie, à base du principe cristallisé de *Cynara* (artichaut) isolé par G. EDGARD-ROSA en Juillet 1933.

Forme et composition. — Ampoules injectables de 5 cc. contenant chacune 0 gr. 10 de principe actif.

Propriétés. — a. Stimule la cellule hépatique ;
b. Stimule l'épithélium rénal (active l'élimination uréique et la diurèse).

Indications. — Troubles hépato-rénaux :

- 1° Dysfonctionnement hépatique :
Hépatites subaiguës et chroniques ; Cirrhoses au début ; Foie cardiaque ; Congestion du foie ; Foie colonial ; Urticaire.
- 2° Surcharge cholestérinique des tissus : Xanthélasma ; Troubles oculaires ; Athéromes ; Polysclérose artérielle.
- 3° Dysfonctionnement rénal : Oliguries diverses (maladies infectieuses : grippe, pneumonie, etc.) ; Néphrites aiguës, infectieuses ou toxiques ; Manifestations du brightisme ; Azotémie « d'alarme » ; Néphrites hypertensives ; Infiltrations séreuses (œdèmes, ascites, pleurésies, etc...).
- 4° Traitement pré-opératoire et post-opératoire des affections génitales urinaires et gynécologiques comportant de la rétention azotée, l'élévation de la Constante d'Ambard (adénome prostatique, tuberculose et lithiase rénales, fibromes utérins et kystes ovariens).
- 5° Certaines manifestations anaphylactiques comme l'urticaire et autres chocs. — Sert de complément à l'auto-hémothérapie.
- 6° Certaines dermatoses prurigineuses ou non, psoriasis, érythrodermies, eczémas, prurigo des enfants, etc.

Posologie et mode d'emploi. — Traitement moyen de 12 à 24 injections, intraveineuses,

intramusculaires profondes ou hypodermiques)
 — légère sensibilité par cette voie — à raison
 d'une à deux piqûres tous les jours ou tous les
 deux jours. Cure intercalaire de **dragées** ou de
gouttes de Chophytol ou de **dragées de Cynuroi**.
 ½ dose ou dose entière chez les enfants suivant l'âge.

N. B. — Les premières injections s'accompagnent
 souvent d'une légère élévation de l'azotémie ; ce
 phénomène ne doit pas surprendre, car il traduit
 la transformation en un produit azoté d'élimina-
 tion facile (l'urée) des substances azotées en réten-
 tion dans les tissus. D'ailleurs, simultanément,
 la diurèse augmente, le pouvoir concentrateur du
 rein s'améliore et le débit uréique s'élève paral-
 lèlement, ce qui amène rapidement la Constante
 d'Ambard à la normale.

En ce qui concerne la cholestérinémie, les phéno-
 mènes sont absolument superposables. La preuve
 de l'amélioration du métabolisme cholestéri-
 nique est fournie par l'augmentation, dans des
 proportions considérables, du pouvoir choles-
 térolytique du sérum. De ce fait, il s'effectue une
 véritable « mobilisation » (hypercholestérinémie
 transitoire) de la cholestérine tissulaire en sur-
 charge, dont l'élimination est ainsi facilitée
 (hypocholestérinémie secondaire, en fin de cure).
 S'abstenir dans les cas de lésions rénales incurables
 médicalement (tuberculose rénale bilatérale,
 cancer, néphrite chronique, azotémique et hyper-
 tensive ou oedémateuse à la période terminale,
 anurie calculeuse). — **Le CHOPHYTOL Injec-
 table** n'agit que si le foie est encore capable
 d'être stimulé et si le pouvoir concentrateur du
 rein permet l'élimination uréique.

Références scientifiques. — Gazette des Hôpi-
 taux — Société de Thérapeutique, Société Médi-
 cale des Hôpitaux, Presse Médicale, D^r R. Picart:
 Thèse de Paris, 1935 ; D^r Albrecht : Thèse de Paris
 1937, etc.

Boîtes de 6, 12 et 25 ampoules.

Laboratoires ROSA

« La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 09-63.)

CHOPHYTOL-ROSA (DRAGÉES)

Cholérétique, tonique du foie et puissant diurétique à base d'extrait de feuilles d'artichaut (*Cynara-Scolymus*) s. l. f. G. Edgar-Rosa.

Communications à plusieurs sociétés médicales.

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — Chaque dragée contient uniquement 0 gr. 20 d'un extrait sec de suc épuré, désalbuminé et titré de *Cynara* traité à l'état frais s. l. f. G. Edgar-Rosa.

Indications. — Toutes insuffisances hépatiques, biliaires, rénales et leurs nombreuses conséquences :

- a. Troubles de l'excrétion biliaire : Ictère, Cholécystite, Lithiase, Cholémie, Coliques hépatiques, etc...
- b. Troubles d'origine hépatique ou rénale : Cirrhose, Urticaire, Maladies de la peau, Maladies de la nutrition, surcharges cholestériniques, Hypertension, Vertiges, Polysclérose, Oligurie, Azotémie, etc...
- c. Troubles lésant toujours le Foie et le Rein : Grippe, Fièvres infectieuses, Maladies des pays chauds, Affections cardiaques, etc...
- d. Et tous les cas où il faut réaliser une action cholérétique ou tonique hépato-rénale (complément de la Cure hydrominérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Peut s'administrer chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose). Étuis de 60 et 180 dragées (étui et triple étui).

Laboratoires ROSA

« La Feuille d'Artichaut en thérapeutique ».

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 09-63.)

CHOPHYTOL-ROSA (GOUTTES)

Comme le Chophytol dragées, est un tonique puissant de la cellule néphrotique et de l'épithélium rénal, à base d'un extrait liquide spécial de *Cynara* (Artichaut) s. l. f. G. Edgar-Rosa.

Indications. — 1^o Tous les états de déficience hépatique : Dysfonctionnement biliaire, Cholécystite, Cirrhose, Congestions actives et passives du foie, Urticaire, Dermatose ;

2^o Toutes surcharges cholestériniques : Xanthelasma, Polysclérose, etc...

3^o Toutes les manifestations de l'Insuffisance rénale aiguë et chronique.

4^o Tous les syndromes oliguriques primitifs ou secondaires.

En pédiatrie. — Trouve d'excellentes applications par son efficacité, son administration facile et ses multiples indications (en particulier dans les troubles digestifs et les affections cutanées).

Posologie. — (10 gouttes correspondent à 1 dragée).

Adultes : 60 à 120 gouttes par jour en 2 ou 3 fois aux repas, dans un peu de liquide sucré ou non.

Cure de 10 à 20 jours par mois.

Enfants : 30 à 60 gouttes par jour.

Nourrissons : 10 à 20 gouttes par jour.

Flacons de 400, 800 et 2 400 gouttes (1/2 flacon; flacon et triple flacon).

Laboratoires ROSA

« La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

CHRYSLMIODE AGUETTANT

Complexe antibacillaire Injectable.

Cette méthode de traitement a fait l'objet d'une communication parue dans le Lyon Médical du 31 juillet 1932.

Composition. — Principes balsamiques cholestérine-or-iode-bromure de Radium en solution huileuse.

Action. — Antibacillaire ; elle s'attaque à toutes les localisations de façon plus constante et mieux supportée que chacun de ses constituants employé isolément à forte dose.

Le radium exalte l'action totale.

Indications. — Bacillose pleuro-pulmonaire ; hémoptysies ; lésions bilatérales, localisations méningées et diverses (Péritonite, adénopathies, ostéites) ; lésions cutanées ; grippe (préventif des complications pulmonaires).

Contre-indications. — Tares viscérales ; bacilloses rénales.

Dose. — 1/2 cc., puis 1 à 2 cc. tous les deux jours.
Injections intramusculaires.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

CHRYSÉMINE

(Pyréthrines Carteret.)

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

Indications. — Employée dans tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, trichocéphales, lamblias, amibes, etc.), elle est également indiquée dans le traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhée à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, troubles nerveux dus aux toxines vermineuses, etc.

Formes. — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisée (*adultes*). (Équation d'équivalence : 1 perle = XL gouttes.)

Administration. — Les perles s'absorbent les unes après les autres dans une gorgée de liquide. Les gouttes se prennent dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits, des confitures, etc.

Posologie. — *Ascaris, Trichocéphales, tous Helminthes, Amibes, Lamblias, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 5 perles. — *Enfants* : L à CL gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos d'une semaine.

Oxyures. — *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, suivant l'âge. (XL gouttes pour un an, augmenter progressivement à raison de X gouttes par année d'âge.) A prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeaisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

Ténias. — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : 200 à 300 gouttes suivant l'âge. A prendre le matin à jeun pendant deux jours consécutifs. Diète hydrique la veille et régime alimentaire réduit les 2 jours de cure. Purgation saline ou huileuse le second jour 3 heures après la dernière dose.

Prix de vente au public : *Perles* : 20 fr. *Gouttes* PM. : 12 fr. GM : 20 francs.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél. : Opéra 43-79.)

CIBALGINE

Analgésique sédatif.

Diallylmalonylurée-Diméthylaminophényl-
diméthyl-pyrazolone.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif, sans opium, sans aucune substance du tableau B. Atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

Indications. — Toutes les algies : Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciatique, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace aussi dans les douleurs dysménorrhéiques.

Comprimés — Gouttes — Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés, XX à C gouttes, 1 à 2 ampoules, par 24 heures.

Flacon de 15 comprimés.

Flacon (gouttes).

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

CIMALVOL

Composition :

Gaïacol synthétique	0,05
Terpinol	0,05
Eucalyptol	0,05
Goménol	0,05
Essence bourg. sapin	0,03
Essence serpolet	0,02
Goudron de Norvège	0,10

Pour une capsule.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, antispasmodique, calmant de la toux, modificateur sécrétoire, expectorant.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, pneumonies, gangrène pulmonaire, tuberculose, séquelles d'intoxication par les gaz, grippe, emphysème, asthme.

Présentation et prix. — Un étui de 50 capsules : 8 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Laboratoires F. BAYLOT,

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 38-31.)

CINALOSE

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc.

Composition. — Chaque ampoule contient :

Cinnaméine du Baume		Lécithine	0 gr. 10
du Pérou	0 gr. 03	Cholestérine.....	0 gr. 04
Lipoides spléniques...	0 gr. 007	Lipoides hépatiques...	0 gr. 007
Camphre.....	0 gr. 09		

Huile d'olive neutre..... Q. S. p. 3 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de Combat de tous les états de Carence. Traitement antitoxique des états infectieux. Agent leucocytaire et phagocytaire. Facteur d'augmentation de poids au cours de la Collapsothérapie.

Indicatio n. — 1° Dans tous les cas d'infections aiguës (voies respiratoires, fièvres éruptives, maladies infectieuses, septicémies) :

2° Dans les différentes formes de la tuberculose pulmonaire, adénites, lupus, laryngites, tuberculose osseuse et rénale ;

3° Dans toutes les affections anergisantes et les états de dépression ;

4° Dans les périviscérités.

Posologie. — *Adultes* : Traitement d'attaque : 1 à 2 ampoules par jour en injections intramusculaires.

Traitement d'entretien : 1 ampoule tous les 2 jours.

Enfants : 1/2 ampoule par jour ou tous les deux jours.

Prix : 25 francs, taxe comprise.

Laboratoire de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX Docteur en pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine). Tél. Alésia 12-55.

CINARASCOL

Forme. — Pilules. Gouttes.

Composition. — Extrait fluide spécial de feuilles fraîches de *Cynara Scolymus* (artichaut) soluble, épuré, hyperconcentré (procédé professeur Quirin et Dagonnot).

Indications. — Lithiase biliaire, insuffisances hépatique et biliaire, entérite, arthritisme, urémie, hypertension.

Drainage hépatique et rénal d'innocuité absolue, sans contre-indication.

Doses. — 1 à 3 pilules à chacun des 2 repas.

XL à CXX gouttes (1 à 3 fois le contenu du compte-gouttes joint) à chacun des 2 repas.

Laboratoires DAGONNOT

11 bis, place de l'Hôtel-de-Ville — CANNES
(Alpes-Maritimes).

CINASCOL

Toutes affections du *Foie* et de l'*Intestin*.

Composition. — *Pour 1 dragée :*

Extrait de Bucchu.....	0,03
Extrait de Boldo	0,03
Ext. Scolym. Cinara sec	0,07
Evonymine	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée ...	0,07
Oléate de sodium.....	0,07

Forme. — Dragée à noyau mou glutinisée.

Indications. — Insuffisance hépatique, constipation, cholécystite, Entéro-colite muco-membraneuse, ictères, intoxications.

Doses. — 2 à 4 dragées par jour. Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 1081-1.

G. BAETZ, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

(Tél. : n° 21).

CINEYL

Composition. — Association de silicate de calcium, magnésium, fer, manganèse et codéine.

Indications. — Médicament de défense antibacillaire, Affections pulmonaires chroniques, Bronchites récidivantes, Toux, Grippe.

Présentation. — Comprimés.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS.

CINNOZYL

Composition. — Solution huileuse de :

Cinnamate de benzyle.....	0. 05
Cholestérine.....	0. 10
Camphre.....	0. 125
Huile d'olive pure	5. cc.

Pour une ampoule.

Propriétés. — Par les actions biochimiques de la cholestérine, du camphre, du cinnamate de benzyle, augmente la cholesterinémie et la résistance à l'infection tuberculeuse.

Indications. — *Tuberculose pulmonaire* dans toutes ses formes cliniques. Adjuvant précieux à la cure de pneumothorax artificiel. *Tuberculoses extra-pulmonaires* : Adénites tuberculeuses, tuberculoses osseuses, génito-urinaires, péritonéales, cutané-muqueuses. Fistules tuberculeuses. *Prétuberculose*, cure préventive chez les prédisposés : Enfants lymphatiques, scrofuleux, malades asthénisés, affaiblis, anémisés, en état d'anergie. *Convalescence* des maladies infectieuses et infections graves.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores sans aucune réaction.

Adultes : 5 à 10 cc. par jour, cures de 20 à 25 injections. Repos de 10 à 15 jours, puis reprise du traitement.

Enfants : Jusqu'à 4 ans : 1 à 2 cc. chaque jour, en augmentant progressivement les doses.

De 4 à 12 ans : Dose moitié moindre que celle de l'adulte.

Au-dessus de 15 ans : Mêmes doses, même technique que pour l'adulte.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

CINOL

Composition. — Cinnamate de soude synthétique chimiquement pur.

Indications. — Pré-tuberculose, tuberculose sous toutes ses formes.

Posologie et mode d'emploi. — Trois méthodes d'utilisation :

1^o Méthode intra-veineuse. Traitement des tuberculoses en évolution : 3 injections par semaine ; débiter par ampoules de CINOL intraveineux première série, continuer par ampoules de CINOL intraveineux deuxième série.

2^o Méthode intra-musculaire. S'adresse surtout aux formes de début, latentes, apyrétiques : 3 injections par semaine de 1 cc. de CINOL intramusculaire.

3^o Méthode buccale. A réserver aux cas d'imprégnation tout à fait au début, comme préventif et comme adjuvant des méthodes précédentes : 4 à 6 pilules par jour.

Références. — Académie de médecine, Société médicale des Hôpitaux, Société de Thérapeutique, Thèses de Paris, Bordeaux, Montpellier.

Prix : CINOL intra-veineux 1^{re} série : une boîte de 5 ampoules : 10 fr.

CINOL intra-veineux 2^e série : une boîte de 5 ampoules : 10 francs.

CINOL intra-musculaire : une boîte de 5 ampoules : 10 francs.

CINOL Pilules : une boîte de 50 pilules : 15 francs.

Laboratoires IMMUNOS

8, avenue des Sources — NICE.

(Tél. : 802-30.) — Adr. télégr. : IMMUNOS-NICE.

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

Prix : 12 francs.

LANDRIN et C^{ie}

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

CITRALIN

Granulé entièrement soluble.

Composition :

Sulfate de magnésie	21 gr. 40
Citrate de soude trisodique	18 gr. 60
Boldine	0 gr. 004
Excipient	Q. S. pour 100 gr.
Contenance de l'étui: 110 gr.	

Propriétés thérapeutiques. — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

Indications. — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats pléthoriques, Pneumonie.

Forme et mode d'emploi. — Granulé: 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

CITRA-QUINT

Granulé anticoquelucheux soluble.

Formule :

Citrate de soude.....	8 gr.
Bromure de sodium.....	6 gr.
Extrait de drosera Dausse.....	0 gr. 08
Extrait de grindelia Dausse.....	0 gr. 04
Extrait de thym Dausse.....	0 gr. 025
Excipient Q. S. p.	100 gr. de saccharine.

Action. — Antivomitif puissant, sédatif des quintes.
Antiseptique bronchique.

Indications. — Coqueluche. Toux spasmodiques.
Toux émétisantes.

Mode d'emploi. — 6 mois à 1 an : une demi-cuillerée à café 4 fois par jour.

1 à 4 ans : 1 cuillerée à café 6 fois par jour.

4 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert 6 fois par jour.

Laboratoires CORTEEL

74, rue de La Fère, SAINT-QUENTIN (Aisne).

CITRHEMOL

Forme et Composition. — Granulé friable soluble dans l'eau, aromatisé au citron, renfermant un gramme de citrate de soude par cuillerée à café (2/3 citrate monosodique, 1/3 citrate trisodique).

Indications. — Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Hyperviscosité sanguine, Hypertension, Rhumatismes, Goutte et toutes manifestations arthritiques, Intolérance gastrique des enfants, Vomissements, Pneumonie.

Posologie :

2 à 4 cuillerées à café par jour chacune dans un verre d'eau tiède de préférence avant ou pendant les repas, selon les indications.

Contenance : 125 grammes, soit 25 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national du Contrôle des Médicaments.

Laboratoires de la REXACARBINE

LAVIT (Tarn-et-Garonne).

CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude, 10. — Charbon animal, 90.

Action. — Eupéptique, cholagogue par le citrate, de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Se fait aussi en comprimés.

Prix : 15 francs.

Laboratoires WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROCHOLINE

Granulé de goût agréable.

Cholagogue. Décongestif.

Composition. — Citrate de soude 10, Hexaméthylène-tétramine 5, Sulfate de magnésie desséché 20, Lactose 30, Saccharose au citron. Q. S. p. 100.

Indications. — Affections hépatiques, Troubles digestifs, Lithiase, Affections urinaires, Hypertension, Viscosité sanguine, Varices, Phlébites, Arthritisme : Rhumatismes et Goutte.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café le matin, dans un demi-verre d'eau tiède.

Enfants (à partir de 5 ans) 1/4 ou 1/2 cuillerée.

Le flacon : 17 francs.

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59).

CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

Forme. — Granulés à saveur agréable.
Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique-comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

CITROLARGOL

Argent. sol et Citrate de Soude.

Action. — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

Indications. — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

Prix : 12 francs.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C^{ie}, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

CITRONAÏ

Composition. — Chaque cuillerée à café contient :
 Citrates trisodique et monosodique .. 0 gr. 50
 Iodure de Sodium 0 gr. 05
 Granulé sucre friable spécial stable. Q. S.

Propriétés. — Antivisqueux, Fluidifiant de la circulation sanguine, Antipléthorique, Anticongestif, Cholagogue.

Indications. — Troubles de la circulation artérielle et veineuse, tous états congestifs, hyperviscosité, *hypertension*, arthritisme et ses séquelles.

Présentation et prix. — Le flacon de granulé : 14 francs.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau avant les deux principaux repas.

Durée du traitement : 3 semaines.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires biochimiques de l'Est
J. FRECHIN

Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur,
 LURE (Haute-Saône).

CITRONEMA

Les applications des Citrates et du Magnésium.
 Granulé soluble, de goût agréable, contenant
 10 p. 100 de bicarbonate de Magnésium.

Indications. — Viscosité sanguine, Hypertension artérielle, Gastralgies, Vomissements, Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Goutte, Rhumatisme.

Doses moyennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Nourrissons : 1/3 à 1/2 cuillerée à café par jour.

Prix au public : 16 fr. 50.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, r. de la Fraternité — SAINT-MANDÉ
 (Tél. : Daumesnil 10-38.)

CITROPAÏNE DU D^r FONTAL

Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal (ext. de carica papaya).

Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, troubles digestifs du nourrisson, vomissements, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie :

Granulé : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Comprimés : de 6 à 9 par jour.

Cachets : de 2 à 3 par jour.

} 14 fr.

Enfants : 1/2 ou 1/4 des doses.

Laboratoires JICEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 14-89.)

CITROPEPTOL

Poudre isotonisante du contenu stomacal.
Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.
Diurétique.

Composition :

Citrate de soude	0,25
Phosphate de soude	0,15
Sulfate de soude anhydre	0,10
Sucre de lait pulvérisé	4,50
Huile volatile de citron	Q. S. pour 1 sachet.

Indications. — Digestions lentes, pénibles, Ballonnement, Somnolence après les repas, Gaz de fermentation, Aérophagie, Constipation.

Posologie. — *Doses moyennes* : 2 sachets par jour, aux repas.

Échantillons :

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

CITROPHOS

Granulé. — 2 formes : simple et belladonné. Une cuillerée à café contient 1 gramme de Citrate trisodique pur associé aux : Phosphate disodique, Sel de Seignette et Lactose.

Le CITROPHOS belladonné contient en plus V gouttes de teinture de belladone titrée.

Indications. — *Simple* : Hypertension, Viscosité sanguine, Insuffisance hépatique, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements.

Belladonné : Hyperchlorhydrie, Constipation spasmodique.

Doses. — 1 à 4 cuillerées à café par jour dans une tasse à thé d'eau tiède.

Le flacon (simple ou belladonné) : 15 francs.

Laboratoires H. NOE

SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord).

CITROSE-VICHY (Limonade)

Limonade purgative à base d'eau minérale de Vichy, aromatisée avec les sucres de fruits (orange et citron).

Composition. — Cette limonade préparée avec les sels de fruits associés au sel naturel de Vichy constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cc. répond à la formule suivante :

Sel de Vichy : 34,64 ; Sirop sucre : 33 ; Sel essentiel de tartre : 30,92 ; Ess. de citron : Q. S. ; Ess. d'orange : Q. S. ; Acide citrique : 0,25 ; Eau saturée de gaz naturel de source : Q. S.

Mode d'emploi. — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

Toutes Pharmacies : 6 fr. la bouteille.

Prix spéciaux au corps médical.

Dépôt : Laboratoires NOGUÈS,

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

CITROSODINE LONGUET

Réalise la médication citratée sous 2 formes :

Comprimés à 0 gr. 25.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

Vomissements des nourrissons (1 comprimé par biberon), et des femmes enceintes (4 à 6 comprimés 3 ou 4 fois par jour).

Hyperacidité gastrique et dyspepsie: 3 ou 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 ou 3 fois par jour.

Hypercoagulabilité sanguine: Etats pléthoriques, Stases veineuses, Phlébites, Thromboses, Pneumonies, 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café, granulé 4 à 8 fois par jour suivant indications.

Le flacon de comprimés ou de granulé: 14 fr. 50.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLÉAROL

Pour bains oculaires.

Composition. — Hydrolat d'Hamamélis borosalicylé adrèphédriné (sans caustique).

Propriétés. — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et Tonique des conjonctives et des paupières.

Indications. — 1° *Toutes inflammations et infections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.*

2° *Tous états inflammatoires professionnels (cinéastes et personnes exposées à des radiations lumineuses intenses ou prolongées).*

3° *Hygiène oculaire, Prophylaxie des poches palpébrales, Conservation de la blancheur de la sclérotique, de l'éclat et de la pureté du regard.*

Mode d'emploi. — Étendre le Clearol d'un ou deux volumes d'eau chaude. En remplir l'œillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au Clearol calment, décongestionnent et soulagent toujours.

Formuler: Clearol, un flacon.

Prix: 10 francs et 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

CLEINOL

Élixir reconstituant. Goût très agréable.

Composition. — Phosphore organique assimilable, Méthylarsinate de soude, Glycérophosphates, élixir à base de plantes aromatiques et digestives.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Anorexie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences.

Flacon de 310 cc. Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 10 jours.

Posologie :

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café ou à dessert par jour, selon l'âge.

Adolescents et adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir au début des repas.

Laboratoires du CLEINOL

LAVIT (Tarn-et-Garonne).

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 1 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 5 et 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Prix : 3 fr. 80 et 10 francs.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Échantillons médicaux sur demande :

**Laboratoire Pharmaceutique
DAUFRESNE**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

COAGULÈNE ET HÉMO-COAGULÈNE

CIBA

Hémostatiques physiologiques

A base d'extrait nématique total, renfermant les substances coagulantes du sang, et particulièrement des plaquettes sanguines. Accélération la coagulation, ils permettent de juguler les hémorragies inaccessibles et de corriger les déficiences sanguines des diathèses hémorragipares.

Hémo-Coagulène. — *Forme injectable*: ampoules de 5 cc. (Voie hypodermique, voie intraveineuse).

Coagulène. — *Forme buvable*: flacons-ampoules de 20 cc. (Voie buccale et applications locales).

Indications. — Hémorragies en général. Prévention des hémorragies chez les hémophiles et hémogéniques. Interventions hémorragiques: amvédalectomies, prostatectomies, etc. Hémoptysies. Hématémèses, métrorragies, Purpura, etc.

Doses. — *Hémo-Coagulène*: une ampoule tous les 2 jours ou tous les jours. — 1 à 4 ampoules par jour dans les cas graves.

Coagulène: 1 à 5 flacons-ampoules buvables par jour.

Boîte de 6 ampoules Hémo-Coagulène

Boîte de 5 ou de 2 flacons-ampoules buvables Coagulène.

Flacons de 2 et 5 gr. poudre de Coagulène;

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON (Tél.: Moncey 43-26.)

COALTAR SAPONINÉ LE BEUF

Forme. — Émulsion de coaltar.

Propriétés. — Antiseptique, cicatrisant, désinfectant.

Indications. — Plaies infectées ou non, Intertrigo des plis cutanés, Hyperhidrose plantaire, Pityriasis du cuir chevelu, Erysipèle, Anthrax, Furoncles, Stomatites, Angine banale, Dyphtérie, Leucorrhée, Cancer du col de l'utérus, Vaginite et Vulvite.

Prix : 9 francs.

LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

COBRATOXINE (KATOX)

Composition. — Le *Katox* est un venin de cobra à dynamisme auto-renforcé permettant l'utilisation de doses très faibles. Innocuité absolue.

Indications. — Action de longue durée et parfois définitive, par modification du terrain sur névralgies et névrites, radiculites, sciatiques, zonas, algies secondaires à des tumeurs en évolution, Tabes et douleurs fulgurantes, Spasmes, Eclampsie.

Posologie. — C'est la dose efficace la plus faible possible qui donne les meilleurs résultats ; toute quantité qui réactive la douleur est une dose trop forte. Chercher la dose optima en faisant des injections à des titrages progressivement croissants et s'efforcer de ne pas dépasser cette dose.

Le *Katox* existe en 4 séries de 8 ampoules (nouvelle présentation qui simplifie considérablement la technique. La boîte 64 francs.

COBRALLYRE

Cobratoxine non injectable en ampoule collyre.

Affections oculaires (kératites, iridocyclites, trachomes, spasmes, etc.)

Affections naso-pharyngées (rhume des foins, coryza, sinusites, ozène, etc.)

L'ampoule de 10 cc. environ : 22 francs.

Laboratoire de la COBRATOXINE

87, rue Denfert-Rochereau — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Odéon 29-35). (Adr. télégr. Cobratox Paris).

COCAÏNE MIDY

Pastilles de Cocaïne chloroborates.

Chaque pastille contient :

Stovaïne	0 gr. 001
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 001
Biborate de soude	0 gr. 025
Chlorate de potasse	0 gr. 075

Doses et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

Prix : 10 francs.

Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

CODÉPHRYL DUFOUR

Traitement des affections des voies respiratoires.

A base de : Terpène, Bromhydrate de codéine, Baume du Pérou, Chlorure d'ammonium, Emétine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Seigle ergoté.

Propriétés. — Fluidifiant et expectorant par la Terpène, le Benzoate de soude, l'Emétine, l'Ergot du seigle. Calmant par le Bromhydrate de codéine.

Antiseptique par le Baume du Pérou et le Chlorure d'ammonium.

Vagotonique par le Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Toux, Bronchites, Asthme et toutes affections des voies respiratoires.

Posologie :

Toux, bronchites sèches : 2 à 6 comprimés par jour.

Toux avec expectoration : 4 à 8 comprimés par jour.

Échantillon sur demande.

Le tube de 30 dragées : 15 francs.

Laboratoire de L'ÉDISTOL

H. DUFOUR, pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des hôpitaux de Paris,
40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). Tél. : 21-28.

CODÉRAX

Composition. — Chaque comprimé renferme :
Codéine, 2 cgr. Terpène et Sucres résineux pulvérisés de Styrax Benzoin, aa 0,10.

Forme. — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques ; conservation indéfinie.

Indications. — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

Insomnies : 2 comprimés au coucher.

Maladies d'estomac : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer.

Dose. — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

La boîte de 20 comprimés : 11 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 86-76.)

CODOCOL

Calmant de la Toux.

Composition. — Association de Thiophénolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages. — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gafacol.

Indications. — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, prétuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

CODOFORME

Composition. — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur. Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, aa V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indications. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathiques). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posologie. — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer. L'étui (4 à 5 jours de traitement).

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 13-20.)

COLARSÉNOL.

Collutoire inaltérable au Novarsénobenzol.

Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphthéries : adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo dentaire, stomatites et gingivites.

Mode d'emploi. — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Prix : { Le flacon de 30 cc..... 15 francs.
 { Le flacon de 20 cc..... 10 francs.

Enregistre au L. N. C. M. sous le n° 1226-1.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil — JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

COLARSÉNOL

Pommade nasale.

Composition :

Novarsénobenzol	1	gramme.
Chate d'éphédrine.....	1	—
Essences de Pin, de Cèdre, de Géranium. aa	1	—
Excipient Q. S. P.	100	grammes.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Désinfection du Rhino-Pharynx des porteurs de germes diphtériques.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil — JOINVILLE-LE-PONT

(Seine). (Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

COLAVÉ

Extrait spécial de Kola suractivé par addition de 1 p. 100 de caféine pure.

Forme. — Granulé fondant.

Indication. — Stimulant musculaire et nerveux, Tonique général, Régulateur du cœur, Convalescence, Dépression physique.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Durée du flacon : 12 à 15 jours.

Enregistré au laboratoire national de contrôle sous le n° 1107.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

COLCHICINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

La **Colchicine pure** cristallisée a été découverte par A. Houdé (1887).

Propriétés. — Augmente fortement les sécrétions. Excitant du sympathique. Modérateur des échanges nutritifs.

Indications. — *Spécifique* de la *goutte* : Accès aigus ou manifestations subaiguës ou larvées (rhumatismes goutteux).

Posologie :

Accès aigu : 3 granules le premier jour en 3 fois (1 à 2 heures d'intervalle).

2 granules le deuxième jour et jours suivants.

Traitement en 4 jours environ (ne pas dépasser 7). Cesser dès sédation, ou en cas de diarrhée.

Manifestations subaiguës (ou comme préventif) : 1 à 2 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

COLCHI-SAL MIDY

Composition. — Chaque capsule contient :

1/4 de mmg. de colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 d'Essence de Wintergreen (obtenue par fermentation et distillation de l'écorce de *Gaultheria procumbens*).

Propriétés. — Le COLCHI-SAL MIDY réunit dans une seule médication :

1° Les propriétés thérapeutiques de l'Essence de Wintergreen : *Anal-gésique, Antinévralgique, Antirhumatismal.*

2° Les propriétés thérapeutiques de la Colchicine : Spécifique de l'accès de goutte articulaire aiguë, et de toutes les manifestations douloureuses de la goutte typique et larvée.

Indications. — Accès de goutte, Rhumatisme goutteux, toutes névralgies, névrites et myalgies d'origine goutteuse. Lumbagos et sciatiques. Le COLCHI-SAL MIDY doit être essayé dans tous les cas de sciatique rebelle ; il réussit souvent là où tout a échoué.

Forme. — Capsules.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 16 capsules par jour, par prises fractionnées (2 à 3 capsules par prise).

Prix : 20 francs.

Durée du traitement : 8 à 10 jours

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

COLIFLORINE CARRION

Vaccin coli-entérococcique pour ingestion.

Composition. — Émulsion de colibacilles et d'entérocoques à 2 milliards de germes par cc. (soit 10 milliards par ampoule), obtenue à partir de souches multiples.

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Indications. — Infections intestinales aiguës et chroniques. Auto-intoxications d'origine intestinale. Syndrome entéro-rénal, entéro-hépatique etc. Septicémies et fièvres prolongées d'origine indéterminée. Vaccination préopératoire (appendicectomie, etc.).

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule *per os*, le matin à jeun, et une ampoule 2 heures après le repas du soir. (Enfants : demi-dose.) Dans les cas chroniques, une ampoule par jour pendant une ou plusieurs semaines.

Présentation et prix. — La boîte de 12 ampoules : 25 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

COLISEL

Composition. — Charbon animal et végétal ; chlorure de magnésium ; carbonate de chaux ; poudre titrée de Belladone.

Présentation. — Poudre, Granulé.

Propriétés. — Traitement actif des affections de l'intestin. Par son pouvoir absorbant et neutralisant supprime les fermentations et l'action nocive des toxines.

Indications. — Sédatif antispasmodique de choix, entérites et surtout entérocolites aiguës ou chroniques, associées ou non à d'autres maladies du tube digestif (gastro-entérite, appendicite chronique, cholécystites) ou à des affections des voies urinaires (syndrome entérorénal, pyélonéphrites à colibacilles).

Posologie. — 1 cuillerée à café matin, midi et soir après les repas dans un peu d'eau.

Prix : 14 francs.

Laboratoires J. LAROSE

54, rue de Paris — CHARENTON.

(Tél. : Ent. 01-41.)

COLITIQUE

Vaccin curatif anticolibacillaire.

**Adopté par le Ministère des Colonies
et par les Hôpitaux de Paris.**

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le colibacille.

Double action par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

Formes : *Buccale, la plus active.* Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.
Injectable (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications locales (6 amp. de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 25 fr. ; 5 ampoules, 13 francs.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

COLI-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

2 formes : Injectable, buvable.

Composition. — Lysat de Colibacilles (souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacillozes.

Posologie. — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.)
1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les 2 jours. *Coli voie buccale* (non injectable) ampoules de 3 cc. 1^{er} jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée; 2^e jour : 3/4 d'ampoule; ensuite une ampoule par jour pendant 8 à 10 jours.

Présentation. — 1^o Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2^o Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

COLIZYL

Antiseptique constant des voies urinaires
intestinales et biliaires.

Composition. — Tétraminoquinol (sulfate double d'orthoxyquinoléine et d'hexaméthylène-tétramine) bactéricide à action constante.

Extrait de Chimaphila : diurétique.

Extrait de Boldo : cholagogue.

Forme. — Comprimés glutinisés.

Propriétés. — *Agit quelle que soit la réaction du milieu* (acide, neutre ou alcaline). Désinfecte le contenu intestinal, régularise la fonction hépatique, éclairecit les urines, abaisse la température, calme la douleur.

Non irritant. Non toxique.

Indications. — *Infections intestinales* : entérites, flatulences, putréfactions intestinales, colites, auto-intoxications, colibacillose, parasites intestinaux (ténia excepté).

Infections biliaires : angiocholites, cholécystites, insuffisance hépatique, hépatites.

Syndrome entéro-rénal.

Infections urinaires : pyélonéphrites, cystites, prostatites, colibacillurie, gonococcie et ses complications (urétrites, métrites, salpingites).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour de préférence avant les repas (pas de contre-indication).

Prix : 16 fr. 50.

48 comprimés pour une durée moyenne de 12 jours de traitement.

Échantillons et Littérature à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoire du COLIZYL

R.-Paul CHANTEREAU

15, rue de Chilly — LONGJUMEAU (Seine-et-Oise).

Service Publicité.

Boîte Postale N° 27, PARIS (XVI^e).

COLLARGOPHÉDRINE

Solution d'éphédrine naturelle associée aux sels d'argent indolores.

Composition :

Sulfate d'éphédrine naturelle.....	0 gr. 50
Nuclargyl (protéose argentique indolore à 20 p. 100 d'argent).....	0 gr. 45
Nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminoéthanol (Nitrate de novocaïnium)	0 gr. 20
Argent colloïdal (Collargolum)	0 gr. 15
Camphre	0 gr. 01
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifiée.....	0 gr. 015
Pour 100 grammes.	

Présentation. — En flacon-ampoule compte-gouttes.

Action. — Décongestion, antiseptie de la muqueuse nasale, sans irritation, ni douleur, anesthésique, excitant de la rénovation cellulaire.

Indications. — Collargophédrine est indiqué dans toutes les affections nasales : catarrhe nasopharyngien, coryza spasmodique, coryza, sinusite, rhinite, rhume des foins, végétations, céphalée, rhino-pharyngite, œdème du pharynx et de l'épiglotte, états asthmatiques et dans les maladies infectieuses : état grippal, rougeole, scarlatine, angine, érysipèle, oreillons et toutes fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En instillation ou en pulvérisation :

Enfants : 1 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Adultes : 5 à 10 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Prix : 16 fr. 50.

En pulvérisation : 2 à 3 fois par jour.

Pulvo-Collargophédrine. — Flacon avec Pulvérisateur spécial.

Prix public : 23 fr. 50. Flacon de recharge : 14 francs.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

COLLOBIASE DE SULFHYDRARGYRE

Teneur en Soufre-Mercure colloïdal par centimètre cube environ 1/4 de millig. de Soufre et 1 millig. d'Hydrargyre.

Ampoules de 2 centimètres cubes.

Aspect. — Pseudo-solution de teinte gris bleu.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médicament anti-syphilitique de toutes les périodes de la maladie. Le soufre qu'il contient augmente l'activité du Mercure et explique l'action articulaire du médicament dans certains accidents spécifiques, tel le rhumatisme déformant.

Ce médicament est un des mercuriels les mieux supportés.

Mode d'emploi. — En injection, de préférence par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Posologie. — Voie intramusculaire : injection tous les jours ou tous les deux jours. Débuter par 1/2 cc. soit 1/4 d'ampoule ; augmenter de 1/2 cc. chaque fois pour atteindre 2 cc., dose à maintenir jusqu'à la fin du traitement (c'est-à-dire la dixième injection).

Par voie intraveineuse : procéder de même manière, mais par 1/4 de cc., c'est-à-dire 1/8 d'ampoule à la fois, jusqu'à 2 cc.

Opérer dans les deux cas par séries de 10 injections, avec 15 jours de repos entre chaque série.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

COLLOBIASE D'OR

Teneur en Or colloïdal bleu, environ 25 centièmes de mgr. par centimètre cube.

Ampoules de 2 cc.

Aspect. — Pseudo-solution de teinte bleutée.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médicament antitoxi-infectieux employé pour abaisser la température et relever l'état général, indiqué dans toutes les septicémies d'ordre médical : Pneumonies, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Fièvres éruptives, Méningites, Endocardites, etc., ou d'ordre chirurgical : Infections opératoires ou non, généralisées ou localisées, suppurantes, diffuses, etc...

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires ou intraveineuses

Posologie :

Adultes : Voie intramusculaire (région fessière) : 4 à 6 cc., soit de 2 à 3 ampoules par 24 heures.

Voie intraveineuse : Dose moyenne 1/2 cc. à 1,5 cc., soit 1/4 à 3/4 d'ampoule. La dose peut être portée, si nécessaire, à 2 cc., soit une ampoule par jour.

Localement : En injections traçantes autour de la plaie : 1 à 3 ampoules.

Enfants : Voie intramusculaire : 1/2 à 1 cc., soit 1/4 à 1/2 ampoule par 24 heures. Chez les tout jeunes enfants (nourrissons) : 1/2 à 1 ampoule en lavement.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

COLLOCRINE

Composition. — Synergie polyendocrinienne iodo-protéique et métaux colloïdaux catalyseurs.

Présentation unique. — Dragées.

Indications. — Rétablit le bon équilibre endocrinien. Troubles de la ménopause et de la puberté. (Par sa combinaison iodée et endocrinienne, réussit particulièrement dans les troubles circulatoires et nerveux de la ménopause.) Aménorrhée, Ovariectomie, Obésité, Sénilité précoce.

Convient aux deux sexes.

Posologie. — 3 à 8 dragées par jour (le matin à jeun et 20 minutes avant les repas).

Étui de 100 dragées : 20 francs.

Durée moyenne des unités ventes : 1 mois.

Laboratoires de la COLLOCRINE

M. Gadreau, Dr en Ph^{ie}, Ex-Int. des Hôp. de Paris.
155, bd Aristide-Briand — SAVIGNY-SUR-ORGE
(Seine-et-Oise). — (Tél. : Juvisy 398.)

COLLOÏDINE LALEUF

Composition. — Extrait total pluriglandulaire associé à l'Iodalbumine.

Propriétés et indications. — Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'Iodalbumine, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dûes à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justiciables du traitement à la COLLOÏDINE.

Formes. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 4 dragées par jour, suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Durée moyenne des unités de vente : 30 à 50 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 dragées : 24 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

COLLOÏDOGÉNINE

du Docteur BAYLE

Opothérapie splénique intégrale.

Nature. — Extrait total de rate.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.). La boîte de 6 : 24 francs.

2° Colloïdogénine sirop. Le flacon : 24 francs.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale). La boîte de 6 : 24 francs.

Indications. — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

Anémies, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

Convalescences, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation, déficiences organiques.

Action. — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

Emploi et doses. — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série, le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Au-dessus de 5 ans, injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans, injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 3 ans, 4 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

(Téléphone : Vaugirard 16-11.)

COLLOSOUFRE

Composition. — Soufre colloïdal vrai et stable à gros grains amicroniques, à réaction neutre et à charge électrique forte.

Propriétés. — Complément naturel des cures thermales et hydrominérales sulfureuses.

Indications. — Anémie pernicieuse, bacilloses, rhumatisme chronique, diabète, artériosclérose, néphrites aiguës et chroniques, ictères infectieux, cirrhoses, auto-intoxications, dermatoses d'origine interne, pneumonies, pharyngites, laryngites, bronchites chroniques, coryza.

Présentation et prix :

Cachets : 25 francs la boîte de 25 cachets.

Granulé : 15 francs le flacon de 150 grammes.

Posologie. — 1 cachet midi et soir, ou trois cuillérées à café de granulé par jour.

Laboratoires Lorvains de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

COLLOVACCINS

Collobacilline. — Extrait bacillaire colloïdal du Dr A. Grimberg.

Indications. — Toutes les tuberculoses externes, Adénites, Epididymites, Absès froids, Tuberculoses ostéoarticulaires, Fistules.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules à 1 cc. Concentrations A, B, C, D, E.

Posologie. — Injections intramusculaires en commençant par 0 cc. 1 de la concentration A et en augmentant les doses de 0 cc. 1 chaque fois. Une injection tous les 2 à 3 jours.

Prix : 50 francs la boîte de 6 ampoules.

Collovaccins injectables :

- N° 22. Antistaphylococcique.
 - N° 23. Antistreptococcique.
 - N° 24. Antigonococcique.
 - N° 25. Anticolibacillaire.
 - N° 26. Thyphoïdes.
 - N° 27. Entérites.
 - N° 28. Antipyogène.
 - N° 29. Pulmonaire.
 - N° 30. Antiblennorragique.
 - N° 31. Gynovaccin.
 - N° 32. Préopératoire.
- Injections intramusculaires.

Prix : 25 francs la boîte de 6 ampoules.

Collovaccins pansements :

- N° 2. Antiblennorragique.
- N° 3. Gynovaccin.
- N° 4. Furoncles, anthrax.
- N° 5. Rhinites, sinusites.
- N° 6. Colibacillaires.
- N° 7. Plaies infectées.
- N° 8. Infections puerpérales.

Prix : 20 francs la boîte de 3 ampoules.

Suppovaccins (suppositoires vaccins).

- N° 40. Prostatites, rectites.
- N° 41. Métrites, salpingites.
- N° 42. Colibacilluries.
- N° 43. Typhoïdes.

Laboratoire des COLLOVACCINS

74, rue Blanche — PARIS (IX^e).

COLLUNOVAR

Collutoire au Novarsénobenzol.

Indications. — Médication préventive et curative de toutes les angines. Angine de Vincent. Affections amygdaliennes. Pyorrhée alvéolo-dentaire, Stomatites, Gingivites.

Formule :

Novarsénobenzol	1 gr.
Citrate sodique	5 gr.
Niéraline 1/1 000	0,50

Pour 100 cc.

Posologie. — En badigeonnage léger sur les amygdales ou sur les gencives.

En gargarisme à la dose d'une 1/2 cuillerée à café par verre d'eau tiède.

Prix : 15 francs.

boires DEXO

pue—PUTEAUX (Seine).

COLLUSULFAR

Collutoire au Sulfarsénol.

Formule :

Sulfarsénol	5 gr.
Excipient. Q. S. pour	100 cc.

Solution stabilisée de Sulfarsénol de forte concentration qui lui assure une grande puissance antiseptique et une action antimicrobienne remarquablement polyvalente.

Indications. — Angine aiguë, Angine de Vincent, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi. — En badigeonnages : 4 par jour.

En bains de bouche : 1/2 cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède.

Formes :

Flacons. Grand modèle, de 30 cc. Petit modèle de 15 cc.

Prix de vente au public :

Flacons. Grand modèle : 15 francs. Petit modèle : 8 francs.

Laboratoires de Biochimie médicale

Ch. DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

COLLUTOIRE MEXYL

A l'Arsenobenzol pentavalent

(antispirillaire et calmant).

Traitement de toutes les Angines, Gingivites, Stomatites, Pyorrhée.

Agit rapidement sur l'élément microbien.

Agit rapidement contre la douleur.

L'arsenobenzol pentavalent employé assure une stabilité réelle à la solution.

La Mexycaïne (chlorhydrate de paraminobenzoyl-diéthylamino-éthanol), succédané de la cocaïne, de toxicité 10 fois moindre, anesthésie par contact sur lésions et irritations des muqueuses.

Badigeonnages et Gargarismes.

Flacons de 30 gr. Prix : 15 francs.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS.

COLLUTOIRE V.-E. DOUMER

Formule:

Bleu de méthylène V.-E.

Doumer..... 1 gr.

Résorcine..... 0 gr. 20

Excipient glycérimé. Q. s.

pour 100 gr.

Indications. — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

COLLYRES CHIBRET

(Chibrocollyres)

En ampoules compte-gouttes, contenant 10 cc. de liquide, pouvant se maintenir aseptique, ne modifiant pas la tension oculaire ni l'accommodation.

Chibroargyrol, Chibrocollargol, Chibrococaïne, Chibroprotargol, Chibroargent (Azotate), Chibrobleu (spécial), Chibroatropine, Chibroatropine et Cocaïne, Chibrohomatropine, Chibronovocaïne, Chibropilocarpine, Chibropilocarpine-Adrénaline, Chibrocuivre, Chibrozinc, Chibrozinc et Novocaïne, Chibroésérine, Chibroésérine et Adrénaline, Chibrofluorescéine, Chibroborate de Soude et Adrénaline, Chibroiodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Chibrocyanure de Mercure, Chibromercurobrome.

Collyres en ampoules de 1 cc. (pour nouveau-nés).
Chibromercurobrome, Azotate, Argyrol.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à

Laboratoire CHIBRET

5, rue Saint-Hérem, CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme). (Tél. : 3-36.)

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.)

Marque déposée « Optima ».

(Voir à *Chibromercurobrome* le libellé spécial.)

COLLYRE SPÉCIAL BLÜYL

Composition. — Cyanure de Mercure, Bleu de Méthylène, Chlorhydrate de Cocaïne, Eau distillée d'Hammélis, Excipient isotonique spécial.

Indications. — Conjonctivites chroniques, Conjonctivites des Neiges, Larmolements, Trachomes (cure de consolidation), Blépharites, Iritis, Kératites, Fatigue oculaire, Hygiène des yeux.

Indolore, sans danger. Soulagement immédiat, emploi prolongé sans inconvénient, pas de contre-indication. Recommandé à tous les surmenés visuels, aux automobilistes, alpinistes, coloniaux, etc...

Posologie. — II à III gouttes, 3 à 4 fois par jour.

Prix : 16 francs. Durée à l'usage : 2 mois environ.

Toutes les Pharmacies et Dépôt général :

Office Pharmaceutique (O. C. P.),

108, rue Picpus, Paris.

Laboratoire PHILBERT

6, avenue Mirabeau — NICE.

COLPOPHILE

Paquets de poudre soluble.

Formule :

Cérasine, Saponine, Acide Orthoxybenzoïque, Tétraborate de Soude, Sulfate d'alumine et de Potasse, Bicarbonate de soude, Parfum Q. S. pour 1 paquet.

Posologie :

- 1° Un paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède ;
- 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 3° Obstétrique, 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 4° Hygiène masculine ou Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 ou 1 litre d'eau en compresses ou lotions.

Prix :

La boîte de 30 paquets : 18 francs.

RICHER, docteur en Pharmacie

45, faubourg Saint-Denis, 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

COLTÈNE

Composition. — A base de Coaltar solubilisé, chloralé, mentholé et aromatisé.

Propriétés et indications. — Antiseptique et anesthésique pour soins de la bouche, de la gorge et du nez.

Posologie et mode d'emploi. — Le Coltène s'emploie à la dose de XX gouttes par verre d'eau chaude, en bains de bouche, en gargarismes ou en pulvérisations.

Dans tous les soins dentaires post-opératoires, après les extractions, dans les abcès, les fluxions dentaires et les plaies de la bouche, les gingivites, les stomatites, les angines, les amygdalites, les pharyngites et tout autre état inflammatoire de la muqueuse bucco-pharyngée.

Comme dentifrice, quelques gouttes dans un demi-verre d'eau froide.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt et vente en gros :

J. BLANCHARD, Pharmacien de 1^{re} classe
PONT-DE-VAUX (Ain).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1195-2.

COLUVAL

Collyre polyvalent.

Neutralisant, antiseptique, angiotonique
et astringent.

Composition. — A base d'eaux distillées d'*Hamamelis Virginica*, de Fenouil, de Rose, de Sureau ; d'acide borique et de borate de Soude.

Indications. — Toutes les infections de l'œil : conjonctivite, orgelets, blépharite, chalazions, kératite et kérato-conjonctivite, iritis, kérato-iritis, irido-cyclite, dacryocystite.

Le Coluval présente un pH = 8,5.

Mode d'emploi. — Bains oculaires, instillations, compresses.

Prix : Le flacon avec œillère (200 cc. env.) : 14 francs.
Le double flacon sans œillère (400 cc. env.) : 22 francs.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
Tél. : Galvani 84-41.

COMBEY-LAX

le délicieux laxatif.

Véritable confiture liquide absorbée comme une friandise par les enfants.

Composition exclusivement végétale aux sucs de fruits et plantes rafraîchissantes (Pomme de reinette, Cassia, anis, fenouil, etc...).

Action très douce, sans coliques et sans accoutumance, chez les nourrissons, les enfants, les adultes, (femmes enceintes ; opérés, convalescents et tous les organismes délicats).

Doses :

Enfants du 1^{er} âge : 1/3 ou 1/2 cuillerée à café.

Enfants au-dessus d'un an : une cuillerée à café ou une cuillerée à dessert.

Adultes : Une ou deux cuillerées à soupe.

Doses variables suivant les indications du médecin traitant.

Prix : 12 francs.

Laboratoires COMBEFREYROUX

134, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

Tél. : Oberkampf 51-10.

COMITIOL

Formules. — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

Indications. — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

Doses. — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

Enfants : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

Prix.	Formule faible.	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	12 fr.	16 fr.	18 fr.
— 30 —	30 —	40 —	50 —

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON.

COMPOSÉ GMET

Tonique aux effets précoces et durables.

Composition. — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

Propriétés. — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, pré tuberculose, Asthénies.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Crataegus Gmet, régulateur cardiaque).

Prix : le flacon pour 1 mois, 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

COMPRESSES GRASSES "ONCTUA"

Composition :

Para-Isopropylmétacrésol	0,35
Phenolum salicylicum	0,75
Oleum cacao	10
Paraffinum	15
Cera Alba	7
Adeps lanæ	7
Vaselinum	Q. S. p. 100 gr.
Baume du Pérou	1 %

Indications. — Tous pansements de brûlures, ulcères, furoncles, anthrax, abcès, escarres. Plaies diabétique.

Présentation et prix. — Carrés de tulle grec de 10 x 10. Compresses grasses de 10 x 10 ne séchant pas, s'enlevant rapidement, évitant l'arrachement des bourgeons d'épidermisation.

La boîte de 6 compresses : 8 fr.
 — 12 — 13 fr.
 — 20 — 18 fr.

Adresser les demandes :

Dépôt général **Établissements ÉCHARD-GILLIER**
 Pansements
 L'ARBRESLE (Rhône).
LORIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

N° 1. Bébé, la boîte de 2 : 15 francs.

N° 2. Enfants, la boîte de 2 : 18 francs.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre dans les mêmes proportions que la formule d'eau d'Alibour faible.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des fleurs blanches, impétigo, ecthyma.

Action. — Antiseptique d'usage courant, prophylactique, hygiénique, anticatarrhal.

Dose. — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 11 francs la boîte de 36 comprimés.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis
ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34.)**

COMPRIMÉS DE PROTO-GAMBIER

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable : le même que celui du Gambéol, du Ganderma et du Salvatyl.

Propriétés. — 1° Antiseptique, désinfectant et désintoxicant des voies gastro-intestinales ; laxatif et purgatif.

2° Cholérétique et cholagogue.

3° Vermifuge, diurétique et diaphorétique.

Indications. — Embarras gastriques, infections et fermentations gastro-intestinales, gastro-entérite infantile, grippe intestinale, dysenterie, fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, coli-bacilliose, constipation.

Hypersécréteur et hyperexcréteur biliaire.

Ictères, cholécystites, angiocholites, hépatites, cirrhoses, etc.

Cholémie familiale et toutes affections hépato-biliaires.

Dosages. — Comprimés à 1 mgr à 1 cgr., à 5 cgr.

Chaque comprimé porte sur l'un de ses faces, son dosage ; et sur l'autre une rainure en croix permettant de le diviser en 4 parties égales.

Présentation. — Ils sont délivrés en boîtes de 3 tubes : 2 en verre, 1 en aluminium contenant chacun 15 comprimés. Prix. Tous dosages. La boîte : 12 francs (30 jours de traitement en moyenne).

Le tube en aluminium permet le transport facile des comprimés pour toute personne vaquant à ses occupations en dehors de chez elle.

Doses moyennes et mode d'emploi. — Sous réserve des indications particulières du médecin traitant, les *Comprimés de Proto-Gambier* s'emploient habituellement aux doses suivantes :

1° 1 mgr. à 2 mgr. par jour, chez les enfants de moins d'un an (soit 1 à 2 comprimés, dosés à 1 mgr.), suivant l'âge.

2° 1/4 cgr. à 1 cgr. par jour, chez les enfants d'un à 4 ans (soit 1/4 à 1 comprimé, dosés à 1 cgr.), suivant l'âge.

3° 1 cgr. à 3 cgr., par jour, chez les enfants de 4 à 7 ans (soit 1 à 3 comprimés, dosés à 1 cgr.), suivant l'âge.

4° 2 1/2 cgr. à 15 cgr. au-dessus de cet âge (soit 1/2 à 3 comprimés, dosés à 5 cgr.).

Diminuer les doses de moitié si la médication doit être poursuivie plus d'une semaine sans interruption.

Prendre chaque comprimé (ou fragment de comprimé), dans une cuillerée à café, ou avec une gorgée d'eau alcaline (Eau de Vals, Eau de Vichy, ou, plus simplement, eau ordinaire additionnée d'une pincée de Bicarbonate de Soude).

Adoptés par le ministère de la Santé Publique.

Laboratoires du GAMBÉOL

J. Gautier, *, ☼, pharmacien de 1^{re} Classe.

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).

Fournisseur des Ministères de la Santé Publique, de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

(Tél. : Défense 17-67.)

COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-Intestinales Dermatoses.

Chaque flacon porte UNE ETIQUETTE PRECISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DUREE D'ACTIVITE REELLE ET INCONTESTABLE DU MEDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés ; Enfants : 1 à 2 comprimés. Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 10 francs.

Prix du flacon de 20 comprimés : 4 francs.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS.

(Tél. : 34-50.)

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 9 francs.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes). Comprimés n° 1 : Coqueluche.

Forme. — Comprimés solubles.

Comprimés Kléos aux polybromures n° 1.

Comprimés Kléos à la Phényléthylmalonylurée, n° 2.

Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques n° 3.

Posologie. — 1 comprimé par jour et par année d'âge dissous dans un liquide quelconque.

Avantages. — Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les N°s 963-1, 2 et 3.

Prix : 12 fr. 50.

Traitement : 3 semaines environ.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers, MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).

COMPRIMÉS NICAN

Par comprimé :

Chlorhydrate d'Éthylmorphine (Dionine N. D.), 0 gr. 01.

Benzoate de soude 0 gr. 25, Extraits Serpolet et Coquelicot (du sirop de Desessartz), Extraits Aunée et Marrube.

Sédatif de toutes les toux, *fluidifiant* et *expectorant*.

Complément pratique des **Gouttes Nican**, pour le traitement ambulatoire.

Bronchites saisonnières, Toux persistantes, Séquelles de Rhumes, Trachéites irritatives, Mucosités bronchiques.

Quand le rhume « traîne » et contre l'habitude de tousser.

Posologie. — *Adultes et adolescents :*

2 à 4 comprimés par jour dans les formes aiguës.

1 à 2 comprimés par jour, ou le soir au coucher, dans les formes chroniques.

Le tube de 20 comp. pour 5 à 10 jours de traitement.

Voir **Gouttes Nican** à base de Codéine et Bromoforme.

Laboratoires CANTIN

PALaiseau (Seine-et-Oise).

COMPRIMÉS ORTHO-MALLEVAL

Composition :

Paraminobenzoate de butyle.....	0,0045
Guimauve (rac. pulv.)	0,0135
Aldéhyde méthylprotocatéchique	0,0000006
Gomme et saccharose. Q. S. pour 1 comp. de 0 gr. 30.	

Propriétés. — Puissant anesthésique local.

Aucune toxicité. Léger antiseptique.

Indications. — Toutes affections douloureuses des voies aériennes et digestives supérieures : Stomatites, Angines, Pharyngites, Toux incoercibles, Certains cas de Gastralgies et d'Ulcus gastriques.

Mode d'emploi. Posologie. — Laisser fondre lentement les comprimés dans la bouche, ou, si on veut agir sur l'estomac, les avaler avec un peu d'eau.

10 à 20 comprimés par jour. .

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 911-1.

Laboratoire des Produits Ortho-Malleval
34, r. du Plat, 9, r. Sala - LYON - Tél. : Franklin 00-92.

COMPRIMÉS PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspondant à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Streptococciques, Staphylococciques et pyocyaniques.

Indications thérapeutiques. — Abcès, Phlegmons, Anthrax, Panaris, Furoncles, Sycosis, Orgelets, Pyodermites, Impétigo, Intertrigo, toutes les affections à germes Pyogènes

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Voies Respiratoires 0,05, Excipient Q. S. pour 1 comprimé de 0,50.

Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange, liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Voies Respiratoires.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Angine, Bronchites, Broncho-pneumonies, Grippe.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS INTESTINAL

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal.

Indications thérapeutiques. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases, Dysenterie bacillaire et tous états toxi-infectieux.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas, pendant 9 jours. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e). (Tél. : Turb 40-83.)

COMPRIMÉS PURGOS

Les **Comprimés Purgos**, aux sels concentrés de Vichy, de magnésie et de soude, ont été créés pour remplacer l'Eau Minérale de PURGOS dans tous les cas où il est difficile et même impossible de se la procurer, par exemple au cours d'un voyage, en excursions, et dans les pays lointains.

Composition. — Les **Comprimés Purgos**, dissous dans un peu d'eau minérale de Vichy, offrent toutes les qualités de l'eau minérale purgative et reproduisent exactement tous ses principes actifs.

Chaque comprimé représente en sels cristallisés :

Sulfate de soude	4 gr. 248
Sulfate de magnésie	0 gr. 747

Propriétés. — Les **Comprimés Purgos** ont une action toute particulière sur les voies digestives.

Indications. — Ils sont indiqués dans tous les cas d'atonie des voies digestives, dyspepsies, embarras gastriques, constipation chronique, maladies du foie, etc.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés } le matin à jeun.
Dose laxative : 2 à 3 comprimés }

En tube de 24 comprimés : 7 francs dans toutes Pharmacies.

Prix spéciaux pour le Corps Médical.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

COMPRIMÉS RECAL

Propriétés. — Reminéralisant. Recalcifiant.

Indications. — Décalcification, carie dentaire lymphatisme, rachitisme, fatigue, surmenage, grossesse, allaitement, dépression nerveuse, convalescence, neurasthénie, pré tuberculose, déminéralisation, consolidation des fractures, phosphaturie, scrofule, chlorose, anémie, diabète, tuberculose.

La boîte de 50 comprimés : 19 fr. 50.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule F.

Ils ne s'adressent qu'aux fillettes ou jeunes filles de 9 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés : 23 fr. 50.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule M.

Ils ne s'adressent qu'aux garçons ou jeunes gens de 10 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés : 22 fr. 50.

Les **Comprimés Recal — Puberté-Formule F** et les **Comprimés Recal — Puberté-Formule M** sont deux spécialités distinctes, qui constituent chacune un complexe endocrino-minéral à la fois reminéralisateur particulièrement puissant et médication *spécialement destinée à l'époque de la puberté.*

Composition :	Comprimés Recal.	Comprimés Recal, Puberté, formule F.	Comprimés Recal, Puberté, formule M.
Chlorure de magnésium sec	0 gr. 0023	0 gr. 0023	0 gr. 0023
Poudre de surrénale.		0 gr. 008	0 gr. 008
Poudre de thyroïde		0 gr. 01	0 gr. 01
Fluorure de calcium	0 gr. 01	0 gr. 01	0 gr. 01
Poudre d'ovaire ...		0 gr. 025	
Orchitine			0 gr. 025
Hydrocarbonate de magnésie léger...	0 gr. 05	0 gr. 05	0 gr. 05
Diphosphate tricalcique	0 gr. 15	0 gr. 25	0 gr. 25
Carbonate de calcium	0 gr. 30	0 gr. 13	0 gr. 13
Arrow-root	0 gr. 155		

Laboratoires FLEURY, Arcachon Tél.: 124.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences

Docteur en Ph^{ie}, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

COMPRIMÉS « ROCHE » DE THIOCOL

1 comprimé « Roche » de Thiocol = 0,50 cgr.
Thiocol « Roche ».

1 gr. Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés « Roche » (Boîte de 20).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-49.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

COMPRIMÉS ROY

Composition :

Comprimés de lactate mercurique, obtenu chimiquement pur par un procédé spécial, en union colloïdale avec les principes essentiels du lait.

Deux dosages : à 0 gr. 005 pour *Adultes*.

à 0 gr. 001 pour *Enfants*.

Propriétés :

Absorption facile, Tolérance parfaite. Maximum d'action.
Pas de saveur métallique. Conservation indéfinie.

Indications :

Traitement mercuriel de la syphilis (de cure et d'entretien).

Doses moyennes par jour :

Adultes : 4 comprimés de 0 gr. 005 (1 tube) en 2 ou 3 fois.

Les casser et les avaler, avec un peu d'eau ou de lait.

Enfants : par comprimé de 0 gr. 001 (correspondant à XX gouttes de la solution à 1 p. 1.000), ou par 1/2 comprimé.

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 05-46.)

COMPRIMÉS SÉRIQUES CLIN

Composition :

Sérum Clin antidiphtérique desséché (500 U. A. par cc.).....	0 gr. 075
Sérum Clin antistreptococcique desséché.....	0 gr. 075
Antivirus mixte strepto-staphylococcique.....	0 gr. 080
Excipient sucré et aromatisé, q. s. pour un comprimé de...	0 gr. 60

Indications. — Traitement local, prophylactique et curatif des angines et infections bucco-pharyngées.

En cas d'angine diphtérique, ces comprimés ne doivent être utilisés qu'en période de convalescence, comme traitement complémentaire.

Posologie. — Sucrer un comprimé toutes les 2 ou 3 heures.

Forme. — Flacon de 20 comprimés.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents

Au sel Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

Mode de présentation. — Les « Comprimés Vichy-État », présentés sous forme de pastilles effervescentes, permettent de préparer par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

Indications. — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

Posologie. — 3 à 4 Comprimés Vichy-État pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Georges PRUNIER et Cie

4, rue de la Coutellerie — PARIS — (Tél.: Arc : 00-35)
et Pharmacies.

CONES Solubles Antiseptiques RENDELL

Antiseptique extrêmement puissant sans aucune action caustique ou irritante.

Forme. — Les « cônes » sont des ovules de forme particulière facilitant leur utilisation et assurant leur conservation aseptique.

Composition. — Dichlorhydrate d'Iso-octyl-hydrocupréine ; Sulfate neutre de Quinine ; Sulfate d'Orthoxyquinoléine.

Indications. — Action spécifique sur les bactéries et les protozoaires des voies génitales féminines.
Prévention et traitement de toutes les infections d'ordre gynécologique.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Le cône introduit, avant le coucher, dans le vagin, doit y demeurer pendant toute la nuit.

Échantillon gratuit sur demande.

Prix : 20 francs la boîte de 12 cônes.

Dépôt général RENDELL

61, rue Dammremont — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 31-14.)

CONTINOL

Composition. — Association d'Ergot de Seigle, de Rhus aromatica et de Quinquina rouge.

Comprimés contenant 10 centigrammes d'extrait fluide d'Ergot, 10 cgr. d'extrait fluide de Rhus et 40 cgr. de poudre de quinquina rouge.

Propriétés. — Modificateur du système neuro-végétatif par l'Ergot et la Rhus. Tonique de l'état général par le Quinquina.

Indications. — Incontinence d'urine diurne ou nocturne.

Présentation. — Boîte contenant 45 comprimés, suffisante pour 1 mois de traitement.

Posologie. — Dose moyenne 2 à 4 comprimés par jour suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoire MASSON

2, place de la Porte-des-Ternes — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 08-65.)

CONVALBAÏNE

Toni-cardiaque.

Composition. — Association de Convallamarine (glucoside du muguet) et d'Ouabaïne.

Comprimés contenant 1/2 cgr. de Convallamarine et 1 mgr. d'Ouabaïne.

Propriétés. — Toni-cardiaque. Stimule d'autant plus puissamment le tonus du myocarde que les actions, synergiques, de la Convallamarine et de l'Ouabaïne se renforcent.

Indications. — Toutes les déficiences du myocarde :

Grande asystolie, Insuffisance ventriculaire gauche, Petite insuffisance cardiaque, Insuffisance cardiaque des myocardites chroniques, Insuffisance ventriculaire droite, Myocardites des maladies infectieuses aiguës, Arythmie extra-systolique, Tachycardies.

Présentation. — Boîte contenant 36 comprimés, suffisante pour un mois de traitement.

Posologie. — Dose moyenne 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 03-01.)

COPHED

Sirop calmant non hypnotique.

Asepsie des bronches

Traitement spécifique des Voies respiratoires.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 451-26.

Composition. — Association : Codéine, Ephédrine, Dionine, Belladone, Drosera, Sulfogaiacolate de Potassium.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Grippe, Laryngites, Pharyngites, Trachéite, Emphysème, Asthme, Coqueluche, Rhume des foins, Rhinites spasmodiques.

Posologie. — Le *Sirop Cophed* est d'un goût très agréable qui le fait accepter par les estomacs les plus délicats ; il peut être pris pur ou dans une infusion pectorale.

Les doses moyennes, sauf prescription spéciale du médecin traitant, sont les suivantes :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (au-dessus de 6 ans) : 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

G. ROUSSEAU, pharmacien de 1^{re} classe.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

COPREX

Laxatif très doux, garanti sans phénolphtaléine :

Son de grains d'orge, Sulfate de magnésie (à cette dose il agit en provoquant un léger flux de bile), Chlorure de magnésium (principe rééducateur des eaux de Châtel-Guyon), Extrait spécial de Cascara. *Cholagogue prudent.*

Deux formes : 1° Coprex : dragées ordinaires : une ou deux dragées, 1/2 heure de préférence avant l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

2° Coprex : dragées demi-dose : (représentant la moitié des dragées ordinaires), particulièrement recommandé aux personnes âgées, délicates, aux enfants, convalescents, opérés, accouchées. Prendre une dragée à la fois ou deux si l'effet est insuffisant.

Prix de la boîte : 9 fr. 75. Durée moyenne du traitement : un mois.

Laboratoires du FEMINADENE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

COQUELICÔNES

Suppositoires contre la toux.

Extrait de coquelicot, eucalyptol ozonisé, droséra.

AVANTAGES. — Evitent fatigue de l'estomac et perte de l'appétit. Fluidifiants, antiputrides et antiseptiques. Exempts d'héroïne, de morphine, d'extrait thébaïque, de dionine, de bromoforme, ils ne provoquent pas de torpeur. Effet rapide, tolérance parfaite, aucune toxicité.

INDICATIONS. — La toux, quelle qu'en soit la cause, depuis le simple rhume ; maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires, toux émétisantes, toux nerveuses, *coqueluche*, toux chez les diabétiques, *sédatif par excellence de la toux des tuberculeux*.

Formes. — Trois formes : Coquelicônes pour adultes, Coquelicônes pour enfants, Coquelicônes pour bébés.

Posologie. — Coquelicônes pour adultes, pour enfants ou pour bébés : 1 à 4 par jour (l'absence de toxicité permettrait de doubler cette dose).

Prix : 16 francs la boîte de 12.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 11-96.)

COQUELUCHYL

Baume

Baume aux essences pénétrantes de Cyprés (action préventive et curative spécifique de la coqueluche), Serpolet, Eucalyptus, Mélaleuca, Pin et Camphre ; véritable bain balsamique, application pratique de la méthode de Milne.

Son véhicule gras spécial permet la pénétration par la peau qui absorbe par dialyse les principes antiseptiques, plus rapidement et plus sûrement que par la voie digestive, que l'on a souvent intérêt à ménager.

Indications. — Le Baume Coqueluchyl est indiqué dans le traitement de la coqueluche, des affections broncho-pulmonaires de l'enfant et de l'adulte, dans la prophylaxie et le traitement des maladies infectieuses et en particulier de la grippe.

Mode d'emploi. — A tous les âges, faire de larges applications sur le thorax matin et soir.

Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Prix. — Le tube : 10 francs (35 gr.).

Inscrit au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 1244-7.

Laboratoire R. et M. GUIGNARD

Docteurs en Pharmacie et en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS.

(Tél. : Central 01-35.)

COQUELUCHYL

GOUTTES

(Exclusivement végétal.)

Gouttes à base d'extraits végétaux, *Euphorbia helioscopia* (réveille-matin, antispasmodique non toxique dont l'action vis-à-vis du Bacille de Bordet et Gengou est véritablement spécifique), *Ephedra*, *Grindelia robusta*, *Drosera*, *Cratægus*, *Passiflore*, *Coquelicot*, *Serpolet*, *Saule blanc*.

Indications. — Le *Coqueluchyl* est employé contre la coqueluche, dont il arrête l'évolution et évite les complications, et dans tous les cas de toux opiniâtre.

Le *Coqueluchyl*, non toxique, non irritant pour les voies digestives, n'a pas de contre-indication et peut être prescrit aux nourrissons.

Forme. — Gouttes concentrées.

Mode d'emploi et doses. — Dose habituelle dans les vingt-quatre heures :

Jusqu'à un an : 4 fois X gouttes.

De 1 à 3 ans : 4 à 6 fois XV gouttes.

De 3 à 12 ans : 4 à 6 fois XXX gouttes.

Au-dessus : 4 à 6 fois XL gouttes.

A prendre dans un peu d'eau ordinaire ou sucrée, ou de tisane.

Prix. — Le flacon : 16 fr. 50 (30 cc.)

Inscrit au Lab. Nat de contrôle des médic. sous le n° 1244-7.

Laboratoire R. et M. GUIGNARD.

Drs en Phie et en Médecine, 38, r. du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

CORAMINE

Toni-cardiaque stimulant.

CIBA

Diéthylamide de l'acide pyridine-b-carbonique.

Tonique du cœur, stimulant de la respiration et de la circulation.

Préparation aqueuse, très fluide. S'injecte facilement, n'est pas douloureuse et se résorbe rapidement. Action prompte et énergique. Bien tolérée par la voie buccale, elle permet d'instituer une médication cardiotonique intercalaire entre les cures de digitale ou de strophantus. Aucune toxicité.

Possibilité de traitements très prolongés.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes. — **Ampoules.**

Doses. — Voie buccale XX à C gouttes par 24 heures.

— parentérale 1 à 8 cc. —

Flacon (gouttes)

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 5.

— de 20 ampoules de 1 cc. 5.

— de 5 ampoules de 3 cc.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Bd de la Part-Dieu — LYON. (Tél. : Moncey 43-26.)

CORÉÏNE

Mucilage pur, sans adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal. Rien de commun avec les gommes.

La Coréïne est un mucilage pur, indigestible, indestructible.

Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

Formes. — Granulé, Paillettes, Semoule.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix :	{	Semoule.....	15 francs.
	{	Paillettes.....	18 francs.
	{	Granulé.....	20 francs.

La Coréïne est admise par l'Assistance publique et aux Assurances sociales.

Pour absorber la Coréïne.

Paillettes. — Le matin mettre dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et verser dessus un peu de lait... ou de café au lait à raison de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.

Mélanger *vivement* et absorber *de suite* comme un potage.

A midi et le soir, mélanger la paillette avec quelques cuillerées de purée de légumes, de compote, de potage.

Granulé et Semoule. — Se prennent comme tous les granulés.

Pansements Intestinaux Coréïnés.

3 à 4 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillante en battant continuellement avec un agitateur en verre pendant quelques minutes. Laisser reposer 1/4 d'heure. Ajouter eau bouillie chaude pour obtenir émulsion semi-liquide. Introduire dans l'intestin avec tube d'écoulement *large*. Régler le débit avec une *pince* au lieu de robinet.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

CORIZOL

Composition et forme. — Ephédrine naturelle, Cocaïne (dose légale), Résorcine, Antipyrine, Solution aqueuse, flacons de 24 cc. (Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 668-1).

Propriétés. — Emploi en oto-rhino-laryngologie, vaso-constricteur non irritant et non huileux, sédatif, antiseptique, antinévralgique.

Avantages. — Décongestionnement durable de la muqueuse nasale. Facilite la respiration et éclaire la voix. Emploi très facile au moyen du bouchon compte-gouttes à bout arrondi.

Indications. — Spécifique des affections de la gorge et du nez. Préventif des affections des voies respiratoires, rhume de cerveau, rhume des foins, coryza spasmodique, rhinites congestives, sinusites, asthme.

Mode d'emploi. — En instillations dans chaque narine, trois fois par jour, à titre préventif et curatif, au moyen du bouchon compte-gouttes spécial à bout arrondi.

Durée de l'unité : 10 à 15 jours.

Prescription. — Un flacon Corizol.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoires RENAULT

24, place des Vosges — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 64-26.)

CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

Composition. — Association d'Iodaseptine (43 p. 100 d'iode) et d'Iodure de sodium (84,6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur, dont elle régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Mycoses. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

Préparation. — Posologie :

Ampoules de 5 cc. (0 gr. 250 d'Iodaseptine, 0 gr. 221 d'Iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

Solution. — XX gouttes = 0,050 d'Iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

Dose. — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Séries de 12 jours par mois.

Prix : La boîte de 10 ampoules 5 cc., 26 francs.

Le flacon, 18 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicyllique (0 g. 50) et de Sanédrine (0 g. 015) pour un comprimé.

Indications. — Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non. Névralgies post-opératoires.

Présentation. — Tubes de 20 comprimés.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans un demi-verre d'eau.

Prix de vente :

Le tube de 20 comprimés 7 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

CRATÆGOL

Composition et propriétés thérapeutiques. — Préparation qui, sous une forme essentiellement assimilable, représente le complexus chimique, intégral et définitif, des principes actifs de l'Aubépine (Cratægus Oxyacantha). C'est donc à elle seule que doivent recourir les praticiens désireux d'utiliser les propriétés tonocardiaques, hypotensives et antispasmodiques remarquables que de nombreux expérimentateurs (Jennings, Clément, Reilly, H. Huchard, H. Leclerc, L. Rénon) ont reconnues à ce médicament.

Indications et posologie. — Sa posologie est la suivante : comme hypotenseur et cardiotonique, XXX gouttes par jour, en trois fois, aussi longtemps que l'exigera l'état de la circulation ; comme équilibrant du système nerveux, XX gouttes matin et soir : enfin une dose massive de XL à L gouttes au coucher permettra de bénéficier de ses vertus hypnogènes.

Prix : 14 francs.

Ne pas confondre avec la teinture d'aubépine.

Laboratoire G. BOULET

14, rue Eugène-Delacroix — PARIS.

CRATÆGUS GMET

Très agréable au goût.

Composition :

Extrait total sans alcool ni sucre du *Cratægus oxyacantha* correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés :

Régulateur du système neuro-végétatif hypotenseur-cardiotonique sédatif psychique.

Indications :

Tachycardie, arythmies, éréthisme cardiaque, plexalgies, cardialgies, prurit, céphalées, vertiges. Tous les troubles neuro-psychiques consécutifs aux soucis, surmenage, déceptions, inquiétudes; névroses sexuelles. Puberté, menstruation, ménopause. Psychasténie, manie avec ou sans idées délirantes d'origine réflexe. Agitation post-opératoire. Phobies. Enfants instables, difficiles ou agités. Réaction sympathique des cures thermales.

Posologie :

Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait.

La dose peut être triplée et exceptionnellement quintuplée dans les grandes agitations psychoses. Très efficace contre insomnie des angoissés. Aucune toxicité. Remplace avantageusement les barbituriques toujours dangereux.

Prix : Le flacon de 135 cc. : 18 francs.

Pour un traitement prolongé, conseiller : *Cratægus Gmet*, un « carton cure » (le contenu de 6 flacons pour le prix de 4) : 72 fr. au lieu de 108 fr.

Laboratoire GMET

(A. LOROT, Pharmacien)

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

CRAYON THOMAS

Complexe antidouleur de forme pratique et ne tachant pas. Association de l'iode à tous les calmants.

Composition. — Iode, Soufre, Menthol, Essence de térébenthine, Salicylate de Méthyle.

Indications. — Douleurs articulaires aiguës et chroniques, Goutte, Lumbago, Névralgies, Sciatique, Entorses, Foulures, Courbatures, Torticolis, Contusions, Courbature grippale, Douleurs tabétiques, Réactions glandulaires, Adénopathies.

Mode d'emploi. — 3 à 5 applications par jour, précédées ou suivies de nombreuses compresses d'eau chaude et salée (une poignée de sel par litre) pour la formation de sels alcalins dont l'action est indiscutable. Faire des applications successives suivies de massages progressifs (éviter les muqueuses et les plaies).

Prix modique : 12 fr. 50.

Laboratoires du DONAGOL

PÉRONNE (Somme) — Tél. 32.

CRÉAGÉNOL

Médication reconstituante et tonique.

Composition. — Inositophosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse. Gluconate de chaux, en granulé sucré.

Indications. — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme, Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

Mode d'emploi :

Adultes : une à deux cuillerées à café, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : une cuillerée à café, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût agréable.

Prix : 15 francs.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e)

(Tél. : Carnot 78-11.)

CRÉDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France
du 24 janvier 1930.

Indications :

Algies : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

Etats infectieux : Gripes, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

Nervosisme : Insomnie, Agitation, Anxiété.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

Boîte, 12 cachets : 9 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CRÈME MEGÈVE

Crème *très hydratée* à base d'alcools cholestériniques (éléments inodores donnant à la Lanoline son pouvoir absorbant), stable, neutre, inoxydable.

Peut servir de crème de ville, aussi bien que de crème de sports (montagne, mer).

Traitement ou prévention des coups de soleil, brûlures au 1^{er} degré, zona, érythème, dermites professionnelles ou médicamenteuses.

Principales présentations :

Petite boîte contenant	30 gr.
Grande boîte contenant	100 —
Tube	60 —

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,

Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
(Tél. : Péreire 57-41.)

CRÈME RÉSOLUTIVE du D^r RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à actions fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

Mode d'emploi. — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en vaporisation.

Laboratoires du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 65-97.

CRÉOFORMINE

Spécifique de la toux et de l'expectoration.

Composition. — Tannocréosoforme, 0,20. Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme, III gouttes. Codéine, 0,01.

Forme. — Comprimés glutinisés, digérés seulement dans l'intestin.

Indications. — Grippe, Toux catarrhales, nerveuses et spasmodiques, Coqueluche, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Ectasie bronchique, Entérite tuberculeuse.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 doses.

Avaler sans croquer.

Le traitement le plus actif et le plus économique
(30 comprimés par boîte).

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire de la CRÉOFORMINE

18, rue de Jouvence — DIJON (Côte-d'Or).

CRÉOFRUITS

Composition. — Créosote associée au Thio-col et au chlorure de Calcium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les propriétés de la Créosote, désinfecte l'arbre pulmonaire, stimule l'état général, désinfecte le sang et est indiqué dans toutes les tuberculoses.

Indications. — Réalise l'imprégnation calcichlorocréosotée, préopératoire ou prévient l'infection pulmonaire dans les meilleures conditions de goût et de digestibilité. Adénopathie trachéobronchique.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 13 francs, flacon 210 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

CRÉOSITOIRES

Nouvelle méthode d'imprégnation créosotée à base de
Créosote de hêtre pure éteinte.

Suppositoires actifs, indolores, non caustiques.

Composition :

	Adultes.	Infantiles.
Créosote pure éteinte.	0 gr. 50 (XX g ^{tes})	0 gr. 125 (Vg ^{tes})
Extrait thébaïque ...	0 gr. 015	Néant.

Indications. — Tuberculose pulmonaire. Gangrène pulmonaire. Absès du poulmon.

Curatif de toutes les affections pulmonaires aiguës ou chroniques. Prophylaxie des complications pulmonaires grippales et rubéoliques, et des accidents pulmonaires anesthésiques. Carminatif chez les opérés. Destruction des oxyures.

Prix de la boîte de 8. — Adultes : 15 fr. Infantiles : 12 fr.

Posologie. — 1 à 3 par jour suivant avis médical.

Enregist. L. N. C. M. sous n^{os} 663-1 et 2.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires MARGEX

13, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Botzaris 56-44.)

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène-Créosote. Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieure à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.

- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Prix : 1° 17 fr. — 2° 17 fr. — 3° 17 fr. — 4° 17 fr.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES
20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e)
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

CRÉO-SUPPO-CAMPBRE

Traitement des affections bronchiques.
Imprégnation créosotée par voie rectale.

Formule :

Adultes : Créosote XV gouttes. — Camphre..... 0 gr. 05
Véhicule spécial Q. S. pour 1 suppositoire.

Enfants : Créosote..... V gouttes. — Camphre..... 0 gr. 02
Véhicule spécial Q. S. pour 1 suppositoire.

Nourrissons : Créosote..... II gouttes. — Camphre..... 0 gr. 01
Véhicule spécial Q. S. pour 1 suppositoire.

Indications. — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agira de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.
Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme.
Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après toute infection, Grippe, Pneumonie
Broncho-pneumonie.

Dans la pré-tuberculose et la tuberculose non évolutive

Prix. — *Adultes :* 16 francs. — *Enfants :* 1- francs.

Laboratoires REBOUL

E. MAZARS, Pharmacien

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CRÉSENTYL

Le CRÉSENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminthique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRÉSENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lambli*a, *Balan*tidium, etc.). Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRÉSENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale :

4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

Vermifuge : *Adultes*, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 12 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr
PARIS (V^e).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI^e).

CRÉSOLARGOL

Suppositoires.

Médication créosotée par voie rectale.

	Adultes.	Enfants.
Créosote de Hêtre. {		
purifiée..... {	0,50	0,25
Argent colloïdal..... {	0,02	0,01

par suppositoire.

Indications. — Traitement et protection des Voies respiratoires : grippe, bronchite, états fébriles, toutes affections pulmonaires. Sans intolérance et sans contre-indication ni causticité.

Présentation. — En boîtes de 8 suppositoires : 16 fr.

Doses :

1 à 2 suppositoires par jour.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71).

CRÉSOPHANYL

Ester des acides crésotique et phénylcinchoninique.

Gouttes, Rhumatisme goutteux, Antiphlogistique, Analgésique.

Associe en un seul composé chimique défini les effets particulièrement appréciés de l'acide phénylcinchoninique et la médication homosalicylique.

Goutte, Sciaticque, Lumbago, Arthralgies diverses.

Dose moyenne : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 par jour, 2 à 6 cachets.

La boîte de cachets de 0 gr. 25 : 24 francs ;
en vrac : 10 francs.

PRODUITS STÉNÉ

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl-Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets d'un gramme dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets d'un gramme dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 gr. par jour.

Grippe : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

La boîte de 30 cachets ou comprimés à 0 gr. 50 : 16 francs. Prix public.

La boîte de 30 cachets à 1 gr., ou 30 comprimés à 1 gr. : 20 fr. Prix public.

Flacon vrac de 500 gr. : 125 francs net à MM. les Pharmaciens.

Flacon vrac de 50 gr. de poudre de Crésopirine : 20 fr. net le flacon à MM. les Pharmaciens.

Produits « STÉNÉ »

14 rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

CRÉSOTANOL

Traitement externe de la douleur.

Composition. — Crésotinate de Butyle et Crésotinate de Propyle à parties égales.

Indications. — Toutes les formes de rhumatisme aigu et chronique, sciatique, zona, névralgies de toutes sortes, douleurs musculaires, lumbago, torticolis.

Prix. — La boîte ou flacon : 12 francs.

Présentation. — Le CRÉSOTANOL est présenté sous forme de gouttes pour usage externe.

Mode d'emploi. — Employer exclusivement à l'extérieur. On verse X à XX gouttes de CRÉSOTANOL pour une surface de la grandeur de la paume de la main, on étale avec le doigt, on recouvre de suite avec un imperméable, soit taffetas gommé ou une feuille de gutta-percha et on recouvre d'une couche de ouate qu'on fixe avec une bande. Renouveler le traitement 2 ou 3 fois par jour.

Produits STÉNÉ

14 rue des Guillemites — PARIS (IV^e)

CRINEX

Gouttes, Dragées, Ampoules.

Composition. — Extrait ovarien total standardisé.

Contient toutes les hormones ovariennes.

Gouttes : Solution alcoolique 1 cc. (45 gouttes) correspond à 0 gr. 30 de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules : injectables, indolores, 10 unités Doisy-Curtis par cc. Solution aqueuse isotonique.

Indications. — Tous les troubles par insuffisance ou suppression de la fonction ovarienne : Puberté, menstruation, ménopause, castration.

Avantages. — Actif par voie buccale à faibles doses. Provient exclusivement d'ovaires frais, d'animaux jeunes. Stimule la sécrétion ovarienne insuffisante, se substitue à elle, quand elle fait défaut (ménopause, castration).

Crinex n'est pas une folliculine.

Posologie. — Pendant les 20 jours qui suivent les règles ou leur époque présumée, ou pendant les 10 jours qui les précèdent (certaines oligoménorrhées, dysménorrhées), faire prendre en 2 ou 3 prises *loin des repas*.

Gouttes : dose moyenne optima : XV à XL gouttes par jour (3 à 8 dragées).

Suivant le résultat, maintenir la dose initiale, l'augmenter progressivement jusqu'à XLV, LX ou XC gouttes, ou la ramener à V ou X gouttes.

Absorber les gouttes dans 1/2 verre d'eau.

Croquer soigneusement les dragées.

Ampoules : Injecter 1 ampoule tous les 1, 2 ou 3 jours suivant les cas.

Prix :

Le flacon (12 à 25 jours).....	18 fr.
Le double flacon.....	32 fr.
40 dragées	9 fr. 50
80 dragées	18 fr.
La boîte de 6 ampoules	20 fr.

Laboratoires CRINEX UVÉ

1, avenue du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e)
(Tél. : Alésia 28-51).

CRINHÉMOL

Composition. — Association endocrino-médicamenteuse. Extraits hépatique, orchitique, splénique. Fer. Arsenic. Acide phosphorique. Manganèse. Magnésium.

Indications. — Tonique général et nerveux. Hématopoiétique. Anémies de toute nature (médication pathogénique n'excluant pas les indications étiologiques). Asthénies. Convalescences. Anorexies. Déficiences fonctionnelles. Etats alcalésiques.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Deux ampoules par jour. Doses spéciales pour enfants et adultes. Préparation spéciale pour les tuberculeux (*Crinhémol T* sans fer ni arsenic). Prise quotidienne pendant 8 à 10 jours. Intervalles de même durée entre chaque cure.

Prix : 18 francs et 30 francs pour adultes (10 à 15 jours de traitement) ; 14 francs et 26 francs pour enfants (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère).

CRINOCARDINE LALEUF

Composition. — Crinocardine simple :

Extraits concentrés spéciaux de :

Myocarde, Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

Associations diverses :

Crinocardine Digitalique.

— Strophantique.

— Digitalo-Strophantique.

— Scillitique.

— Apocynique.

— Spartéinée.

Propriétés et indications.

Troubles cardio-vasculaires de toute origine, Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes, Spasmes, Angines de poitrine, etc.

Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences, Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

Formes.

Ampoules buvables et comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi.

1 ampoule (ou 5 comprimés) le matin, à jeun, dans un peu d'eau, pendant 10 jours consécutifs. Si nécessaire une seconde ampoule (ou 5 comprimés) au cours de la journée.

Durée moyenne des unités de vente.

10 jours.

Prix de vente au public :

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. (simple ou composée) :
30 francs.

Étui de 50 comprimés (simple ou composée)
20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

CRINOFLUX

Gouttes

Complexe ovaro-végétal Byla-Dausse stabilisé.

Composition. — Suc d'ovaires frais *Byla*, Intrait de Marron d'Inde *Dausse* aa 20 p. 100, Alcoolatures Anémone, Arnica, Noix vomique, Extraits Américains Berberis, Viburnum aa 10 p. 100.

Indications. — Traitement sûr et efficace de toutes les déficiences de l'appareil circulatoire. Très puissant régulateur du débit veineux, Anti-hémorroïdal remarquable, Sédatif utérin, Traitement des maladies de l'utérus et de ses annexes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, avant les repas. Dose pouvant être triplée sans inconvénients.

Prix : 18 fr. 50 le flacon pour 25 jours de traitement.
Enregistré au laborat. de Contrôle n° 1364-6.

Laboratoires du CRINOFLUX

41, rue Germain — LYON.

CRINO MENSTRYL

Régulateur des fonctions ovariennes.

Forme. — *Comprimés* (Ovaire, Folliculine, Lobe antérieur d'hypophyse).

Etui de 40 comprimés : 20 fr.

(4 à 6 comprimés par jour du 7° au 22° jour du cycle menstruel.)

Ampoules : 2 ampoules de lobe antérieur d'hypophyse 0 gr. 25, soit en hormones gonadotropes environ 25 U. Zondeck et Asheim.

2 ampoules de benzoate de dihydro de folliculine à 5 000 U. I. : 25 francs.

Le lobe antérieur d'hypophyse s'injecte généralement du 3° au 8° jour après la fin des règles.

La folliculine, du 10° au 18° jour après la fin des règles.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes, Aménorrhées, Oligoménorrhées, Dysménorrhées, Puberté, Ménopause, Migraines, Obésité, Stérilité, Leucorrhée.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

CRINOPANCRINE

Synergie endocrino-végétale, hypotensive et antispasmodique.

Forme. — Dragées.

Action. — Traitement de l'hypertension artérielle et de ses conséquences. Médication d'action constante et sûre favorisant l'équilibre du système vago-sympathique.

Composants. — Extrait de Pancréas désinsuliné (correspondant à 12,5 de son poids de substance fraîche), Chlorophylle, Nitrite de Sodium, Extrait sec de Scille (abaissement progressif du taux de l'Urée), Extrait sec d'Aubépine, Extrait mou de Belladone (0 gr. 0013 par dragée) (aucune adjonction de barbiturique).

Indications. — Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Spasmes vasculaires, Troubles visuels, Vertiges, Excitabilité, Angoisse, Émotivité, Insomnie nerveuse.

Posologie. — 3 à 6 dragées par jour avant les repas. — Traitement d'attaque : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des grandes hypertensions : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des hypertensions moyennes : 3 dragées par jour. Troubles névro-pathiques : 3 à 6 dragées par jour. — D'une innocuité absolue, les cures de CRINOPANCRINE peuvent être prolongées sans inconvénient. Inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 586-16. Admis aux Assurances sociales.

Prix : 17 fr. 50 (tube de 60 dragées).

(Littérature et échantillons.)

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). — (Tél. : Roquette 14-12.)

CRINO-SÉRUM

Modification

Pour éviter toute confusion le *Crino-Sérum* est dénommé *Crino-Enfant* ou *Crino-Adulte* suivant qu'il s'agit d'une médication pour enfant ou d'une médication pour adulte.

Le *Crino-Enfant* s'emploie de 0 à 10 ans.

Le *Crino-Adulte* à partir de 10 ans.

Le *Crino-Enfant* est un *incomparable tonique et régulateur* de l'enfance se présentant sous forme de sirop très agréable au goût. Les principaux éléments actifs qui le composent sont des extraits de thyroïde, parathyroïde, thymus, hypophyse surrénale, médullaire, hépatique.

Mode d'emploi :

De 0 à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 3 à 6 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Le *Crino-Adulte* s'emploie à partir de 10 ans. C'est un tonique de conception nouvelle, équilibrant nerveux et circulatoire des deux sexes.

Doses :

2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire MOURÉ (COTARD, pharmacien)

5 bis, boulevard des Italiens, Passage des Princes — PARIS (II^e).

CRINO-STHÉNYL

Complexe endocrinien des « glandes de l'énergie ».

Surrénale, Hypophyse, Glandes génitales,
Foie, Parathyroïde, Thyroïde.

Formes :

Étui : 40 comprimés : 18 francs.

(3 à 6 comp. par jour au milieu des repas.)

Sirop : flacon de 180 grammes : 18 francs

(1 cuillerée à dessert = 2 comprimés).

Ampoules inj. 6 ampoules de 2 cc. : 18 francs

(1 ampoule par jour).

Indications. — Asthénies, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences, Enfants instables, Inattention scolaire.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses, Asthme.

Présentations. — Ampoules contenant 0 g. 02, 0 g. 05, 0 g. 10, 0 g. 15, 0 g. 20, 0 g. 25, 0 g. 35, 0 g. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bidistillée est jointe à chaque dose.

Posologie et mode d'emploi. — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 g. 05 ou 0 g. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Asthme et arthrites 0 g. 02 à 0 g. 05. Prix de vente (suivant dosage et conditionnement).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

CRUXOL

Adjuvant complet de croissance des Enfants
Médication polyglandulaire et polyvitaminique
des Adultes et Personnes âgées.

Composition. — Hormone du lobe antérieur de l'Hypophyse agissant en corrélation avec les extraits endocriniens : Thymus, Thyroïde, Orchytique, Surrénal agissant à doses conjuguées.

Les 4 vitamines (unités actives).

Les sels minéraux de croissance.

L'extrait de Boldo (insuffisance hépatique).

Présentation :

Trois préparations suivant l'âge.

1° Cruxol Bébé :

En neige fondante pour les nourrissons, agissant en milieu neutre.

Préparation vitaminée avec sels minéraux lab ferment et papaine destinée aux nourrissons et jusqu'à 2 ans.

Prescrire. — Ne pas donner de jus de fruits acides. Mettre dans la bouche du bébé ou faire dissoudre dans quelques gouttes d'eau et donner au bébé avant chaque tétée ou biberon une dizaine de petits granulés neige fondante. Augmenter suivant le nombre de mois, la dose à utiliser dans les 24 heures allant de $\frac{1}{2}$ à 2 cuillerées à café.

La boîte : 18 fr. 50.

2° Cruxol granulé :

Pour les enfants de 2 ans à 7 ans, en tube métallique.

Prescrire. — Une cuillère à café de granulé à croquer avant chacun des 2 principaux repas.

Traitement à suivre pendant 20 jours de suite par mois, puis repos de 10 jours et reprendre le traitement (quelques mois).

La boîte : 20 fr. 50.

3° Cruxol (ampoules buvables), en boîte de 2 séries de 6 ampoules, à partir de 7 ans.

Prendre dans $\frac{1}{4}$ de verre d'eau sucrée le contenu d'une petite ampoule avant le repas de midi, et le contenu d'une grande ampoule avant le repas du soir.

Traitement à suivre pendant quelques mois : au début, trois semaines de suite sans interruption ; puis une semaine sur deux, sauf autres indications médicales.

La boîte : 22 fr. 50.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 37-45.)

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Adoptée par les Ministères de la Guerre, de la Marine et par l'Assistance publique.

La **Cryogénine Lumière** représente le médicament antipyrétique-analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux de toute origine.

La **Grippe** ne résiste pas à l'administration, à doses suffisantes, de **Cryogénine Lumière**.

Elle permet d'éviter les bains froids dans la **Fièvre typhoïde**.

Contre le **symptôme douleur**, la **Cryogénine Lumière** exerce une action nette, rapide, durable.

Aucune accoutumance ni accumulation.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Il n'existe aucune contre-indication.

Son innocuité absolue en fait le médicament de choix chez les enfants.

Indications :

Fièvre, Grippe, Douleurs, Névralgies, Dysménorrhée.

Formuler :

Un tube de comprimés à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Une boîte de cachets à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Doses :

Adultes : 1 à 6 comprimés ou cachets à 0 gr. 50 par jour et davantage en cas de besoin.

Enfants (doses moyennes) :

De la naissance à 15 mois, 0 gr. 10.

De 15 mois à 3 ans, 0 gr. 15 à 0 gr. 25.

De 3 ans à 5 ans, 0 gr. 25 à 0 gr. 40.

De 5 ans à 15 ans, 0 gr. 40 à 0 gr. 75.

A partir de 15 ans, 0 gr. 75 à 2 gr.

Ces doses peuvent être dépassées.

Laboratoires LUMIÈRE
45, rue Villon — LYON.

CRYOSAN

Composition. — Soufre combiné et dissimulé, térébenthine du pin purifiée, huile pyrogénée du *Juniperus oxycedrus*.

Propriétés. — Antiseptique, cytophyllactique, antiprurigineux désodorisant, cicatrisant.

Indications. — Eczéma sous toutes ses formes, psoriasis, lichens, mycoses diverses, herpès, urticaire et toutes dermatoses prurigineuses.

Présentation et prix. — 15 francs le flacon de 15 grammes.

Mode d'emploi. — Faire trois applications par jour à l'aide du pinceau joint au flacon.

Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

Constitution. — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

Indications. — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas.)

Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antiseptique générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNECOLOGIE, OPHTALMOLOGIE

Formuler : Usage interne : Etais de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophtalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Prix :

Usage interne : pilules : 20 francs; granulé : 25 francs.

Usage externe : sol. mère de 30 cc. : 25 francs. — Gynécologie : ovules : 25 francs. — Ophtalmologie : ampoules à 1 0/0 ou 5 0/0 : 9 et 12 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE : 45, rue Villon — LYON.

CRYPTHERMOL DEHAUSSY

Médication antisypilitique dissimulée.

Préparation à base de mercure permettant le traitement masqué ou ambulatoire de la syphilis et de l'hérédo-syphilis sans troubles gastro-intestinaux, même en cas d'intolérance hydrargyrique (Sirop et granulé de goût agréable, pilules glutinisées).

Dosage

Sirop : par cuillerée à soupe.

Iodure de potassium.....	1 gr.
Biodure de mercure.....	0 gr. 01

Pilules : par pilule.

Iodure de potassium.....	0 gr. 20
Biodure de mercure.....	0 gr. 002

Granulé fondant : par cuillerée à café.

Iodure de potassium.....	0 gr. 005
Biodure de mercure.....	0 gr. 0005

Posologie :

Adultes : *Sirop* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. — *Pilules* : 5 à 10 par jour.

Enfants : *Granulé* : 1 an : 1 ou 2 cuillerés à café par jour.

5 ans : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 5 à 10 cuillerées à café par jour.

Sirop. Prix : 18 francs.

Pilules. Prix : 22 francs.

Granulés. Prix : 15 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale. — LILLE

CRYPTHIOL

Composition. — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

Forme. — Capsulines glutinisées.

Action. — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final : l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

b. Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

Indications. — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

Posologie. — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

Prix : l'étui de 30 capsulines, 15 francs.
Durée moyenne de l'étui : 10 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).
(Tél. : Péreire 14-08.)

CRYPTOSOTE NEDA

Composition :

Antiseptique pulmonaire.	{	Créosote	0,05
Sédatif de la toux.			
Modificateur des sécrétions bronchiques.	{	Eucalyptol	0,01
Hémostatique, cicatrisant..		Tannin	0,05
Balsamique.....		Benjoin	0,05
Enrobage. {	Insoluble dans l'estomac.		
	Soluble dans l'intestin.		Par dragée.

Propriétés. — Antiseptique et tonique des voies respiratoires. Par son enrobage, la créosote n'irrite pas l'estomac.

Indications. — Bronchites, bronchites aiguës et chroniques, trachéites, congestions pulmonaires, asthme, tuberculose, catarrhes.

Présentation. — Boîte normale 60 dragées : 15 francs pour un traitement de 15 jours.

Boîte triple : 180 dragées : 30 francs.

Posologie. — 2 dragées au milieu de chacun des 2 repas.

Laboratoires DANEY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 27-10.)

CRYPTOTOXYL

Composition : Oléate, palmitate, ricinoléate de soude, bile.

Indications : Neutralisation des toxines microbiennes et de la morphine.

Prix :

17 francs le flacon de pilules.

Mode d'emploi : Dose utile 4 pilules par jour.

Produits STÉNÉ

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix { intraveineux, 30 fr. la boîte de 6 amp.
intramusculaire, 25 fr. la boîte de 6 amp.

H. VILLETTE, D^r en Pharmacie.

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

CUPRANINE

(Au sulfate de cuivre chimiquement pur.)

Indications. — Toutes staphylococcies. Dermatologie, Gynécologie.

Formes. — *Pommade faible* à 2 p. 1 000 (2 pour mille). Acné rosacée, impétigo, sycosis, eczéma, brûlures, escarres, ulcères non infectés, plaies chirurgicales, zona.

Pommade forte à 20 p. 1 000 (20 pour mille), Furoncles, Anthrax, Acné juvénile, Ecthyma ; eczéma séborrhéique, Papillomes, Favus, Trichophyties, Brûlures, plaies et ulcères infectés, Bubons, chancres mous.

Comprimés : effervescents, à 0,05. *En gynécologie* : Métrites, leucorrhée
Hygiène intime : 1 à 2 comp. pour 2 litres d'eau.

Ampoules : pour injections intraveineuses : de 5 cc. à 0,005 par cc. Anthrax, Furunculose, Suppurations profondes, Lymphangites, Streptococcie : 1 à 2 ampoules, 1 à 2 fois par jour. *Enfants* : 1/2 ampoule par jour.

Pratiquer l'injection avec une aiguille fine, aspirer un peu de sang dans la seringue. *Ne pas s'arrêter au léger coagulum brun qui peut se produire*, et injecter lentement.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE VICHY

P. V. LÉGER — ST-POURCAIN (Allier).

CUPRASE

du Docteur GAUBE du GERS contre le cancer.

Cuivre colloïdal albumonique. Guérit souvent, arrête toujours l'évolution du cancer. Une forme : ampoule de 5 cc. pour injections sous-cutanées.

Action thérapeutique et Usages. — Préconisée pour la décancérisation dans toutes les formes. La *Cuprase* possède de remarquables propriétés contre les néoplasies anciennes ou récentes, ulcérées, quel qu'en soit le siège.

Elle arrête le développement des tumeurs malignes ; elle est capable de supprimer avec le temps les tumeurs et les ulcères malins.

Posologie et Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, une ampoule de 5 cc. tous les 4 jours, d'abord, puis après la 4^e injection, une ampoule tous les 5, 6, ou 7 jours suivant tolérance.

Le *Cuprase* n'est point toxique.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS

CUPREMONE « F »

Médication Hormonique (folliculine) associée
au complexe végétal CUPREMONE

Composition. — Extraits Anémone, Cupressus, Crataegus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sèneçon, Viburnum.

Folliculine purifiée rigoureusement titrée : 2.500 unités physiologiques par 100 cc. de préparation.

Deux gouttes de *Cupremone F* correspondent à une unité physiologique de Folliculine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de choix des désordres génitaux et des troubles de la circulation sanguine.

Activité par voie buccale.

Forme et mode d'emploi. — Prendre XL à LXXX gouttes par jour, au début des 2 repas, dans un peu d'eau sucrée, 20 jours par mois, en dehors des règles.

Durée de l'unité de vente : 1 semaine environ.

Prix : 20 francs.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Danton 81-53.)

CUPREMONE SIMPLE

Composition. — Extraits fluides préparés dans le vide et d'action toujours égale et constante (Anémone, Cupressus, Cratoëgus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sèneçon, Viburnum).

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des troubles de la circulation sanguine.

Indications. — Régulateur et stimulant circulatoire. Inflammations et dilatations veineuses : Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Ulcères variqueux. Dépresseur et sédatif vasculaire : disparition des réactions douloureuses dues aux phénomènes congestifs. Sédatif utérin.

Forme et mode d'emploi. — XX à XXX gouttes avant les deux principaux repas dans un peu d'eau sucrée. Hémorroïdes : L gouttes.

Durée : 2 semaines.

Prix : 15 francs.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Danton 81-53.)

CUPRESSIODE FAVROT

Gouttes.

Spécifique des maladies de la cinquantaine chez l'homme.

Formule :

Iode assimilable.....	1 gr. 50
Ext. fl. Cupressus stabilisé ...	5 gr.
— Marron d'inde stabilisé.	5 gr.
— Gui stabilisé.....	10 gr.
— Aubépine stabilisé.....	2 gr. 50
— Genêt stabilisé.....	2 gr. 50
Alcoolature d'anémone.....	2 gr. 50

Excipient : Q. S. pour 100 gr.

Prix : 13 fr. 50.

Indications. — Troubles fonctionnels cardio-vasculaires. — Hypertension. — Artério-sclérose. — Angine de poitrine. — Spasmes divers.

Posologie :

XX à XXX gouttes à la fin des 2 repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires Dr H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

CUPROBALT

Composition. — Association de Silicates de manganèse, fer, cuivre, nickel et cobalt.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes. Toutes ses complications. Pas d'intolérance, ni d'incompatibilités.

Présentation. — Dragées.

Posologie. — Dose moyenne : 2 dragées avant chacun des 2 repas principaux. Dans les cas graves, cette dose peut être doublée.

Prix : 18 francs.

Laboratoire **GRYSA**

C. LÉTANG, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

7, rue Saint-André — LE MANS.

CUPROFORMINE

Composition. — Sulfate de cuivre pur, Trioxyméthylène, Perborate de soude, Excipient effervescent.

Mode d'action. — Par sa haute teneur en cuivre associé au trioxyméthylène et au Perborate de soude, la *Cuproformine* est un antiseptique puissant dans toutes les affections à streptocoques, à staphylocoques, et autres germes pathogènes.

Indications et Mode d'emploi.

- 1° En *Gynécologie*, hygiène intime, prophylaxie et traitement des affections septiques des organes génitaux : en injections, 1 comprimé pour 2 lit. d'eau.
- 2° *Antiseptique général et Dermatologie*, Plaies de toute nature, Ulcérations, Panaris, Pyodermites, Eczémas, Furoncles, etc., en lavages, applications, compresses : 1 comprimé pour 1 ou 2 litres d'eau.

Présentation et prix. — Comprimés très effervescents d'odeur agréable et ne tachant pas le linge : 16 francs.

Laboratoire **YVFAFD**

17, rue Soufflot — PARIS (V°).

CUPRO GLYCOL

Composition et avantages. — Le sulfate de cuivre utilisé depuis 1923 dans le traitement des Staphylococcies et des Streptococcies présente de gros inconvénients. Le professeur Lasausse démontre que ceux-ci disparaissaient en utilisant les sels de cuivre d'acides aminés et arrive à préparer une solution isotonique neutre, stable, non sclérosante et non douloureuse de Glycocolate de cuivre.

Indications. — Toutes les affections à Staphylocoques, furoncles, anthrax, acnés chéloïdiennes de la nuque, hydrosanédites, dermatoses, etc.

Des résultats fort encourageants ont été obtenus en traitant par le *Cupro Glycol* plusieurs cas de maladies de Nicolas Favre.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 ampoule de 10 cc. tous les 2 jours.

Enfants de 6 à 15 ans : Injecter 5 cc. tous les 2 jours.

Injections intraveineuses.

Présentation et prix. — Le *Cupro Glycol* se présente en boîte de 10 ampoules de 10 cc. de Glycocolate cuivrique à 0,25 p. 100 de cuivre métal, 20 francs.

Laboratoire du D^r RENAUD

2, place de la Duchesse-Anne — NANTES.

CUPROSTÉNOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie active des néoplasies cellulaires. Tumeurs malignes de toute origine tissulaire. Leucémies myéloïdes ou lymphatiques. Maladie de Hodgkin. Septicémies à streptocoques.

Composition :

Cuivre et Magnésium en solution huileuse colloïdale contenant :

Cuivre.....	0,12 mgr.
Magnésium	0,03 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intra-musculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Cuprosténol-capsules par la bouche.

Au bout de 5 semaines, arrêter le traitement quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire.

Autres formes : Cuprosténol-pommade et Cuprosténol-cire pour les ulcérations cutanées.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

CUPROXIL

Désinfectant gynécologique.

Composition. — 100 grammes contiennent :

Salicylate de soude.....	17,46
Sulfate de cuivre desséché	12,51
Acide borique	35,93
Chlorate de potassium.....	34,100

Propriétés. — Désinfectant gynécologique, Microbicide, Décongestionnant, Désodorisant.

Indications. — 1° Hygiène intime quotidienne.

2° Traitement des Leucorrhées en général, des Vaginites, Vulvites, Vulvo-Vaginites, Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, etc...

3° Blennorragie.

Avantages. — Antiseptique puissant, non caustique, ne tache pas le linge, d'odeur agréable (parfumé à l'eau de Cologne). Action décongestionnante et sédative. Sensation de bien-être.

Forme. — Poudre blanche, entièrement et rapidement soluble dans l'eau tiède, à laquelle elle communique une légère teinte vert clair.

Mode d'emploi. — Lavages, injections et irrigations tièdes (y compris la période des règles). Faire dissoudre le contenu d'un sachet dans 1 ou 2 litres d'eau.

Emploi général. — Désinfectant général en lavages externes, notamment en gargarismes. Prix de la boîte de 25 sachets : 12 francs.

Produits PHARMA-SCIENTIA

26, rue Gay-Lussac, PARIS (V^e) — Tél. : Odéon 32-24.
Concess^r L. BRUN, Ph^{ca} — 26, rue Vauquelin, PARIS.

CURAMIDA CHAPELLIER

Composition. — Sirop de sucres frais de géraniums, Rudbeckias, Tropéolons M, fleurs de Marronniers d'Inde iodés, Phosphate monocalcique, Iodure de Calcium, Sirop Antiscorbutique et Chicorée Cposée.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour (3 ans, 5 ans, 10 ans).

Indications. — Puissant tonique déterminant la fonte des **grosses amygdales** et la disparition des **végétations adénoïdes** des enfants.

Cure complète : 2 flacons de 3 à 7 ans.

3 flacons au-dessus de 7 ans.

Prix du flacon 1/2 litre : 27 fr. 50.

Laboratoire A. CHAPELLIER
CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (Haute-Loire).

CURASME

Composition. — Solution adrénalinée et éphédrinée.

Propriétés thérapeutiques. — Soulagement immédiat des crises d'asthme et dyspnées.

Forme. — Solution en ampoules.

Mode d'emploi :

A employer en pulvérisations dans la gorge à l'aide du Pulvérisateur Curasme.

Prix : Le Pulvérisateur avec 2 ampoules :
46 fr. 50.

La boîte de 4 ampoules de rechange : 18 fr.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition. — Association rationnelle de :
Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

Indications. — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

Posologie. — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 franc. — 6 cachets : 5 fr. 50.

Enregistrée au L. N. C. M. sous le N° 32-1.

Laboratoire

de la CURATINE BRUNET

23, rue des Ecoiffes — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 35-17.)

CURIOSAN

Composition. — Mercure rythrosine, sel nouveau ayant fait l'objet d'une thèse soutenue à la Faculté de Médecine de Paris (6 juillet 1926).

Présentation. — Solution aqueuse à 2 p. 100.

Indications. — Affections gynécologiques (Métrites aiguës et chroniques).

Affections des voies urinaires (Urétrites).

Affections cutanées microbiennes.

Mode d'emploi. — Posologie :

Attouchements ou Instillations intracervicales, Lavages urétraux en solution dans l'eau bouillie, de 5 à 20 cmc. pour 100.

Le flacon de 45 cmc..... 8 fr.

Le flacon de 180 cmc..... 20 fr.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43-45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine). — Tél. : Carnot 07-13.

CUROGÈNE

Élixir antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

Indications. — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Dysménorrhée, Grippe, etc.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 14 francs.

Le flacon de poche : 4 fr. 75.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, O. * * *

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

CUROVEINYL GEF

Élixir.

Composition. — Extraits fluides d'hamamelis, d'hydrastis, de cyprès et de marron d'Inde stabilisé, associés à l'extrait fluide de genêt et à la teinture de noix vomique.

Forme. — Élixir de goût très agréable, aromatisé à l'orange.

Propriétés thérapeutiques. — Régularise le flux circulatoire, tonifie les muscles vasculaires et normalise la tension artérielle.

Indications. — Troubles circulatoires, troubles des fonctions menstruelles, insuffisances veineuses.

Posologie. — Deux cuillerées à soupe par jour avant les repas.

Prix : 16 francs le flacon pour 7 jours de traitement.

Laboratoires GEF,

Franck GEORGET, Pharmacien

269, rue Judaïque — BORDEAUX. — Tél. : 870-26.

CUROZEMA

Médication opo-sérothérapique rationnelle des dermatoses chroniques et récidivantes et des états *arthritiques*.

Composition. — Sérums activés et organes frais de jeunes animaux.

Indications. — Eczéma et eczématides, Prurits localisés ou généralisés, Prurigo, Urticaires, Maladie de Quinck, Psoriasis, Impetigo, Acné, Certaines formes de Névrodermites et de Sclérodermites, Lichen.

Présentation. — Dragées en flacon de 90 (traitement d'attaque); de 40 (traitement d'entretien).

Mode d'emploi et doses :

Traitement d'attaque. — 9 dragées par jour prises par 3, à jeun, une heure avant les repas, pendant 10 jours.

Traitement d'entretien. — 4 dragées par jour, pendant 10 jours.

Prix : Trait. d'attaque: 30 fr. — Trait. d'entretien : 18 fr.
Voir également " OPOSERO VALTRY "

Laboratoires VALTRY

J. MAHEU, pharmacien de 1^{re} classe.

Docteur en médecine, Docteur ès sciences,

Membre de la Société de Pharmacie.

122, Champs-Élysées — PARIS (Tél. : Élysées 28-12).

CUSCUTINE FOULON

Indications. — Laxatif doux, très actif. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

Composition. — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscuta, Séné, Aloïne, etc.

Posologie. — Une à 2 pilules au repas du soir.

L'étui de 40 pilules : 5 francs.

Echantillons gratuits.

Laboratoires FOULON

20, faubourg Poissonnière — Paris (X^e).
(Tél. : Provence 29-48.)

CUTISANINE

Pour toutes irritations de la peau, crevasses, fissures, coups de soleil, plaies atones, eczémas, intertrigos, transpirations abondantes ou fétides, etc...

En poudre..... *la boîte.* 12 fr. 50

En pâte *le tube.* 9 fr.

Laboratoire R. B. D.

Dr J. WILLOT, Pharmacien.

37, rue du Vieil-Abreuvoir — ROUBAIX
(Nord.)

CUTOBRONCHYL

Forme. — Pommade exempte de matières grasses en tube.

Mode d'action. — Absorption intégrale des substances médicamenteuses par la peau grâce à son Excipient à base d'Extraits opothérapiques de peau animale, renfermant :

- a. Du Cholestérol, favorisant l'absorption des médicaments à travers les couches grasses de la peau.
- b. Des Diastases et des Hormones actifs de la peau.
- c. Un composé de Magnésie, catalyseur animal.

Substances médicamenteuses actives. — Camphre, Gaïacol, Acide Cinnamique et Salicylique, Essences stabilisées.

Indications. — Traitement des maladies des voies respiratoires et circulatoires, par médication cutanée au moyen d'extraits opothérapiques et catalysants de la peau.

Mode d'emploi. — Enduire deux à trois fois par jour, alternativement, la poitrine, le dos ou une autre partie du corps. Effectuer une bonne friction, afin d'obtenir une absorption complète et rapide.

Prix : 10 francs. Durée moyenne de traitement, d'un tube : 8 jours.

Laboratoires G.-R. STROHL

G. HORNUS, Pharmacien

2, rue Sédillot — STRASBOURG (Bas-Rhin).

(Tél. : 43-64.)

CYANHERMINE

pour traitements antisypilitiques
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur)	0 gr. 01 cgr.
Sérum isotonique	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 fr. 50.

Laboratoire National de Contrôle n° 339-5.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

CYNABILINE

Médication végétale et opothérapique associées destinée au traitement des déficiences entéro-hépatiques.

Composition. — Principes actifs de l'artichaut frais (plante fraîche stabilisée), du Kinkéliba, du Romarin et du Boldo. — Extrait désalbumine et délipoidé de foie frais. — Extrait de bile. — Citrate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule la cellule hépatique, la sécrétion et l'excrétion biliaire, supplée par ses extraits d'organe aux déficiences momentanées. — Régularise la fonction hépatique par l'artichaut. — Analgésique et tonique par le Kinkéliba et le Romarin. — Décongestif vésiculaire par le citrate de soude.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire. — Ictères. — Lithiases. — Hépatisme tropical. — Constipation. — Intoxications. — Hépatites. — Hépatomégalie. — Cirrhoses diverses. — Hypotonies entériques. — Prurits. — Asthénies.

Présentation. — Liquide sirupeux aromatisé de saveur agréable.
Le flacon : 19 fr. 50

Posologie. — Une à cinq cuillerées à café par 24 heures dans un peu d'eau ou de vin avant les repas.

Laboratoires de la CYNABILINE.

38, Quai des Minimes — TOULOUSE (Haute-Garonne).

M. MUSELIER, Docteur en Pharmacie

Ex-interne des Hôpitaux de Marseille

Ancien préparateur à la Faculté de Médecine.

Dépositaires Généraux :

Établissements SILBERT & RIPERT Frères

30, Rue Bénédit — MARSEILLE.

CYNARA (Artichaut)

Edgard-Rosa.

En 1927, les Laboratoires Rosa introduisaient dans la thérapeutique courante les premiers produits *per os*, à base d'un extrait de **Cynara-Scolymus** (Artichaut) :

Chophytol-Rosa (dragées et gouttes.)

Cynurol-Rosa (dragées).

En 1933, **G. Edgar-Rosa** isolait à l'état cristallisé le principe actif du **Cynara** que les Laboratoires Rosa ont spécialisé sous le nom de :

Chophytol-Rosa cristallisé injectable.

De nombreux travaux et Communications scientifiques ont consacré la valeur thérapeutique de ces produits.

Voir donc, à leur rubrique, ces trois spécialités qui constituent la gamme complète des applications de la *Cynarathérapie*.

Laboratoires ROSA

" La Feuille d'Artichaut en thérapeutique "

11, rue Roger-Bacon

PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63 .

CYNARINE (Artichaut)

Edgard-Rosa.

N. B. — Le mot **Cynarine** est parfois employé pour désigner le principe actif du **Cynara** (Artichaut.)

En 1927, les laboratoires Rosa introduisaient dans la thérapeutique courante les premiers produits *per os*, à base d'un extrait de **Cynara-Scolymus** (Artichaut):

Chophytol-Rosa (dragées et gouttes).

Cynurol-Rosa (dragées).

En 1933, **G. Edgard-Rosa** isolait à l'état cristallisé le principe actif de **Cynara** que les Laboratoires Rosa ont spécialisé sous le nom de :

Chophytol-Rosa cristallisé injectable.

De nombreux travaux et communications scientifiques ont consacré la valeur thérapeutique de ces produits. Voir donc, à leur rubrique, ces trois spécialités qui constituent la gamme complète des applications de la **Cynarathérapie**.

Laboratoires ROSA

“ **La Feuille d'Artichaut en thérapeutique.** ”

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 09-63.)

CYNÉFLUINE

du Docteur Moity.

Granulé soluble à base d'extrait d'artichaut.
Drainage biliaire idéal, Cholagogue, Cholérétique, Spécifique hépato-biliaire rationnel, Tonique du foie.
Anti-anaphylactique.

Formule :

Peptone de viande 2 ; Peptone d'œuf 2 ; Peptone de poisson 2 ; Peptone de fibrine 2 ; Hyposulfite de soude 2,50 ; Extrait total d'artichauts 5 ; Sulfate de magnésie 25 ; Sucre glace Q. S. p. 100.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède ; se coucher ensuite dix minutes sur le côté droit.

Dans les eczémas, migraines, névralgies, urticaires, prendre en plus une cuillerée à café vingt minutes avant les repas.

Prix : 15 francs. Boîtes de 125 grammes.

Peuvent être prescrits aux Assurés sociaux.

Laboratoire J.-O. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,
ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE

CYNUROL-ROSA (DRAGÉES)

Antiurique, antiseptique et diurétique.

« Dragée la boue urique et sauvegarde l'appareil urinaire. »

« Il assure la véritable cure de diurèse et d'élimination urique et abaisse le taux de l'urée, de l'acide urique et de la cholestérine chez les rénaux et les arthritiques, dont il améliore la tension. »

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — *Extrait de feuilles d'artichaut* (Cynara scolymus). Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phényle-Pipérazine.

Indications. — a. *Maladies dialytiques* : Rhumatisme, Arthritisme, Urémie, Uricémie, Polysclérose, Lithiase biliaire et urinaire, etc.

b. *Affections vésico-rénales* : Cystite, Urétrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, Prostatite, Oligurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : Grippe, Angine, Fièvres diverses, etc.

d. Et toutes les fois où il faut réaliser une action antiurique, antiseptique ou diurétique (complément de la cure hydrominérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Peut s'administrer chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose).

Etui de 60 dragées.

Laboratoires ROSA,

« La Feuille d'Artichaut en thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e). (Tél. Etoile 09-63.)

CYPROVEINOL

**Millefeuille-Ficaire-Cupressus
sans Hamamélis ni Marrons d'Inde.**

Indications. — Congestions prostatiques, Congestions veineuses ; Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

Deux formes :

Gouttes : 30 gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau bien sucrée.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

La boîte de 12 suppo : 15 francs.

Le flacon (traitement 25 jours) : 15 francs.

Laboratoire DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07.)

CYSTOCONE

Suppositoire.

Composition. — Association de l'Acide Cyclopentenylallylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine et la Belladone.

Action. — Antalgique, Antispasmodique, Décongestionnant.

Indications. — Chez l'homme : Cystites, Prostatites et Urétrites aiguës et chroniques. — Chez la femme : organes génito-urinaires, Angoisse et douleurs pré- et post-opératoires de l'appareil urogénital.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 suppositoires CYSTOCONE par 24 heures, de préférence le matin au réveil et le soir au coucher, autant que possible après l'évacuation de l'intestin.

Adolescents : au-dessus de 15 ans : 1 suppositoire CYSTOCONE le soir au coucher.

Prix :

La boîte de 6 CYSTOCONE : 15 francs.

La boîte de 18 CYSTOCONE : 33 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis.**

ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34.)

CYSTOFLORINE

(Dragées bleues néphro-pyélotropes).

Priorité. — La barbiflore (*Orthosiphon stamineus*) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale. Hexaméthylène-tétramine. Chlorure de tétraméthylthionine. Camphre monobromé.

Propriétés. — Diurétique antiseptique et sédatif, *médication spécifique des affections génito-urinaires*. Décongestif des organes pelviens. Antiinfectieux chromothérapique (colore l'urine en vert). Désintoxicant général.

Indications. — Cystites, Néphrites, Pyélo-néphrites, Bactériurie et Pyurie, Colibacillose, Oligurie, Urétrites, Hémorroïdes, Prostatisme, Métrites et Annexites, Ecoulements muqueux ou muco-purulents, etc.
Chez l'enfant : Enurèse, Rougeole, Scarlatine, etc.

Posologie. — *Adultes :* 5 à 10 dragées par jour avant les repas. *Enfants :* depuis 1 dragée (tolérance parfaite).

Etui de 60 dragées : 15 francs.

Bibliographie et Echantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique ».


CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue. (Vitamines A et D.)

Formes :

1° *Gouttes* : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)

2° *Granulé* : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

Indications. — Anémies, avitaminoses, adénopathies,  croissances, rachitisme, inappétence.

Posologie :

Gouttes. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

Gouttes. Adultes :

XXX à XL gouttes. A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

Granulé. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Granulé. Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix. *Gouttes* : 12 francs. { *Traitement.*

Granulé : 15 francs. { pour 8 à 10 jours.

Laboratoires MARTIN

25-27, rue du Commandant-Rivière,
COLOMBES (Seine). (Tél. : Charlebourg 03-62).

CYTO-CHOLINE

Composition :

Chlorhydrate de Choline pur..... 2 centigr.
Sérum chloruré isotonisant..... 2 centicubes.

Indications. — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

Mode d'emploi. — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

Résultats. — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de sclérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Traitement pour 24 jours.

Boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27 rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII^e).

(Téléphone : Carnot 78-11.

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arsénée.

Le CYTO-MANGANOL constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les 2 jours pour les *adultes* ; une ampoule de 2 centicubes pour les *enfants*. Traitement pour 18 jours.

Présentation :

Cyto-manganol pour adultes.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : Prix : 22 fr.

Cyto-manganol infantile.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. : Prix : 16 fr.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

CYTOPAN

Forme. — Vin composé de goût agréable.

Composition :

CYTOPAN Simple : Acide phosphorique, teinture de noix vomique, kola.

CYTOPAN F : même composition que CYTOPAN Simple, avec extrait fluide spécial désodorisé de Fenugrec.

Indications. — Toutes décalcifications, prétéuberculose, faiblesse générale, asthénies de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

CYTOPAN F : celles du CYTOPAN Simple et plus spécialement amaigrissement, anémies, grossesse, lactation, faiblesse générale.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir, avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Ent. 01-41.)

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

<i>Cacodylate de soude chimiquement pur.</i>	<i>Trente centigr.</i>
<i>Sulfate de strychnine</i>	<i>Un milligramme.</i>
<i>Sérum isotonisant chloruré</i>	<i>Cinq centicubes.</i>

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 20 francs.

Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 14 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

CYTO-SIROP

Propriétés thérapeutiques. — Adjuvant rationnel de la croissance.

Indications:

- A. *Générales* : Toutes les périodes de croissance de l'enfant sain.
- B. *Particulières* : Débilité congénitale et retards de croissance. Paresse intellectuelle et inertie cérébrale. Incontinence nocturne des urines. Troubles liés à la diathèse lymphatique.

Avantages:

- 1° *Composition judicieuse* : Nucléinate de Soude, Glycérophosphate de Soude, Alcoolat de cacao, extrait fluide de Kola.
- 2° *Aucune contre-indication.*
- 3° *Goût très agréable.*

Posologie. — Avant ou après les repas :

De 2 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

De 6 à 9 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert.

De 10 à 15 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Prix : 16 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON,

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien.

183, rue de Rome — MARSEILLE.

DABOÏNE

Hémostatique local (Usage Externe).

Solution stérile en eau distillée de venin de vipère Daboïa.

Indications. — Toutes les hémorragies et tous les saignements du domaine de la petite chirurgie, de l'oto-rhino-laryngologie et de la stomatologie. Tous saignements en nappe.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Présentation :

Solution faible (au 1/50° de mmgr.).	
Boîte de 1 ampoule de 5 cc	15 fr.
— 3 — 5 cc	39 fr.
Solution moyenne (au 1/20° de mmgr.).	
Boîte de 1 ampoule de 5 cc	18 fr.
— 3 — 5 cc	48 fr.
Solution forte (au 1/10° de mmgr.).	
Boîte de 1 ampoule de 5 cc	20 fr.
— 3 — 5 cc	54 fr.
Flacon compte-gouttes de 20 cc	50 fr.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard du Montparnasse — PARIS (XV°).

Tél. : Littré 98-89.

DEBREYNOL

Composition. — Tous les principes actifs du Vin Debreyne de la Grande Trappe :

A base de Quinquina, Kola, Gentiane, renferme encore du Glycérophosphate de Chaux assimilable et du Sulfate de Manganèse : ce qui fait du Debreyne un *puissant reconstituant*.

Forme. — Comprimés dragéifiés, rigoureusement dosés. Deux comprimés correspondent à un verre à madère du vin phosphaté du Docteur Debreyne et peuvent remplacer ce vin.

Produit très apprécié aux Colonies et à l'Etranger.

Indications. — Fatigue, Surmenage, Epuisement, Anémie, Chloro-Anémie, Tuberculose, Affections des Voies respiratoires, Tuberculose, Grippe, Convalescences des maladies infectieuses.

Posologie. — Deux ou trois comprimés avant les deux principaux repas. *Enfants* : 1 à 2 comprimés selon l'âge.

Le flacon : 13 fr. 20.

Littérature et échantillons sur demande.

Sans contre-indications.

Produits Debreyne de la Grande Trappe.

L. BAILLEUL

MORTAGNE (Orne).

DÉCHOLESTROL

Cure de décholestérinisation.

Composition. — Sels alcalins anhydres, sulfate de magnésie desséché, à faible dose, hexaméthylène-tétramine 1 p. 100.

Propriétés. — Stimule et draine le foie, augmente le pouvoir cholestérolitique du sérum sanguin, aide à la résorption des scléroses.

Indications. — *Toutes les manifestations de l'Hépatisme* (cholémie, lithiase, insuffisance hépatique, migraines, urticaire, prurit, eczéma, dyspepsie hépatique).

Toutes les manifestations de l'arthritisme. Hypertension artérielle, diabète, goutte, obésité, artériosclérose ; surdité et troubles oculaires des scléreux, xanthome, xanthélasma des paupières, arc sénile, cataracte.

Mode d'emploi. — Un paquet matin et soir, 1/4 d'heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau ordinaire ou minérale tiédie, de préférence, pendant 12 jours par mois.

Laboratoire national de contrôle, n° 1219-1.

Prix : 16 francs.

Établissements Pharmaceutiques

M. et P. LEDENT — MONTREUIL-SUR-MER
(Pas-de-Calais). Tél. : 1-60.

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Prix : 18 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 08-00.)

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium.

Stimulant biologique général

par hyperminéralisation magnésienne.

Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale. Surmenage, Convalescence des maladies infectieuses, Dépression de certains malades devant être opérés. — Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. — Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes — Troubles cardiaques par hypervagotonie. — Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné, Verrues. — Adénome prostatique. — Lésions du type précancéreux et prophylaxie du cancer.

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

La boîte de 48 comprimés. Prix : 16 francs.

La boîte de 96 comprimés. Prix : 28 francs.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

VIAL et C^{ie}, 8, rue Vivienne — PARIS. (Tél. : Gutenberg 27-03.)

DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne droite.

Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréochimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

Emploi. — Anesthésie locale, régionale. Anesthésie par instillations, par contact. Endoscopies (bronchoscopies, gastroscopies).

Forme. — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 %, en ampoules de 1, 2, 5, 10, 50 cc. pour anesthésie locale, régionale. Ampoules spéciales pour l'anesthésie buccale et laryngopharyngée : Delcaïne « 838 ».

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr., tube de 0 gr. 50.

Les ampoules de Delcaïne ne contiennent pas d'Adrénaline.

Établissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 62-00, 62-01.)

DEMALGON

Composition. — Un comprimé = 0 gr. 18 de bromodiéthylacétylurée et 0 gr. 27 de diméthylaminophényldiméthylpyrazolone.

Action. — Synergie anti-algique à action rapide, sans accumulation ni accoutumance, ne déterminant aucune somnolence, anti-pyrétique.

Indications. — Toutes algies, céphalées, migraines, névralgies, sciatiques. Pulpite et toutes algies dentaires, dysménorrhée, douleurs tabétiques, maladies infectieuses fébriles.

Posologie. — Analgésique : 1 à 2 comprimés à renouveler si nécessaire.

Fébrifuge : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Un quart de dose pour les enfants.

Présentation et prix. — Tubes de 10 comprimés : 13 fr. 50.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd Latour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

DÉMORPHÈNE

Désintoxication rapide par les émulsions de lipides végétaux des morphinomanes, cocaïnomanes, opiomanes et tous intoxiqués (Procédé de MM. Delaville et R. Dupouy, Ac. de Médecine, 25 mars 1934).

Admis par le Service de la Santé de la Marine.
Autorisation Ministérielle du 26 octobre 1936.

Durée du traitement.

4 à 6 jours suivant le degré d'intoxication.

Disparition, au cours de la cure, de l'état de besoin si pénible et si redouté des malades.

Caractéristiques :

La morphine ou ses succédanés étant liposolubles (travaux d'Overton) se fixent rapidement sur la substance nerveuse riche en matières grasses et s'y intègrent en remplacement d'un des constituants normaux de cette substance.

Le **Démorphène** qui est une émulsion huileuse composée d'huile d'olives ricinée et lécithinée met en liberté le toxique fixé sur le système nerveux, le dissout et prend sa place dans la substance nerveuse.

Mode d'emploi :

Le **Démorphène** s'administre en injections intramusculaires, à raison de 25 cc. pro die, chaque injection étant de 5 cc. Avoir soin de bien agiter chaque ampoule avant usage. A ces injections on associera deux injections quotidiennes d'insuline de 15 unités chacune (augmentation des échanges nutritifs, deux injections de 2 cc. d'huile camphrée spartéinée. Aux vagotoniques on fera prendre 0,05 à 0,06 cgr. d'éphédrine par jour et on leur injectera avant les deux principaux repas une ampoule d'hypophyse et d'adrénaline. Chez les sympathicotoniques on remplacera l'éphédrine par de la gènesérine (L à XC gouttes par jour) et l'hypophyse adrénalinée par des sels de calcium. Pour favoriser le repos du malade on donnera des sédatifs du système nerveux (**Eunéryl**) à petites doses matin et soir. Une bonne évacuation intestinale sera assurée par des pilules laxatives et diaphorétiques (cascara, évonimine, podophyllin, pilocarpine).

Chaque boîte d'ampoules est accompagnée d'un schéma indiquant de façon précise la marche à suivre.
La boîte de 10 ampoules de 5 cc. 150 fr.

Laboratoire BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS.

(Tél. : Anjou 61-61.)

DENISOLINE

Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques ; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

Indications. — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéiques, Pityriasis.

Mode d'emploi. — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

DENTOMA

Pâte Dentifrice

Spirillicide par son sel arsenical stable, Microbicide par le chlorétone, Neutralise l'acidité buccale génératrice des caries, par la magnésie.

Exempte de pierre ponce. L'abrasif utilisé est de l'alumine qui ne raye pas l'émail mais blanchit admirablement les dents.

Indications. — Pyorrhées, gingivites, stomatites. Hygiène quotidienne de la bouche et des dents, Prévient la carie dentaire.

Le tube : 6 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

DEPRESSYTOL

Nouveau régulateur du débit artériel.

Composition :

Phényléthylbarbiturate double d'Yohimbine et de Quinine.....	0,026
Extrait de Cratægus.....	0,013
Extrait de Passiflore.....	0,013
Extrait de Gui.....	0,013

Indications. — Hypertension artérielle (disparition rapide et durable des mauxaises, baisse progressive, sans chute brutale, de la pression artérielle), l'érythisme cardiaque, angine de poitrine, états spasmodiques et retentissement circulatoire.

Posologie. — Une dragée avant chacun des deux principaux repas.

Observation. — Traitement peu onéreux, la boîte de 24 dragées, pour douze jours.

Le traitement. Prix : 18 francs.

R. DUNESME, Pharmacien

4 et 6, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

Tél. : NOR. 68-53.

DÉPURATIF CHAUVIN

(aux hyposulfites)

Principes actifs. — Hyposulfites de soude et de magnésie, extraits de badiane et d'anis vert. (Solution glycinée ne contenant ni iode, ni iodures, ni substances végétales dites à tort dépuratives.)

Action. — Réducteur, modificateur du tissu humoral, antianaphylactique, désensibilisant, antitoxique.

Mode d'emploi et posologie. — *Adultes* : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou d'eau additionnée de vin blanc, 2 fois par jour avant chacun des deux principaux repas. *Enfants* : de 5 à 7 ans, 1/3 de la dose ; de 7 à 14 ans, 1/2 dose ; à partir de 15 ans, dose normale.

Indications. — Affections cutanées, Eczémas, Furunculose, Urticaires, Intoxications du foie y compris intoxications thérapeutiques (comme préventif et comme curatif). Facilite la chrysothérapie et les traitements antisypilitiques, qu'elle rend inoffensifs. Ne fatigue pas l'estomac comme cela se produit pour les hyposulfites en cachets ou en comprimés. Son goût est facilement accepté par les malades, surtout si on ajoute un peu de vin blanc.

Prescription. — Prescrire ainsi : un Dépuratif Chauvin. (Les médecins qui n'aiment pas le mot « dépuratif » peuvent prescrire cette spécialité sous la dénomination : « Désensibilisant Chauvin. ») Peut se donner aux diabétiques.

Prix : 16 francs.

Établissements Alfred CHAUVIN
(Laboratoire des Tubes Blache)
AUBENAS (Ardèche).

DÉPURIODE

du Dr Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : à à 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Pour 1.000 cc.

Indications. — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses.

Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuill. à café.

Prix du flacon : 18 francs

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS (VI^e).

(Tél. : Danton 92-73.)

DÉPUROGÈNE

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et de Citrate de Soude.

Propriétés. — Épurative et Décongestive, selon la méthode du D^r A. Chaix, de Vichy. Puissant agent de décongestion et d'élimination de l'Urée et de la Cholestérine du sang.

Indications. — États pléthoriques, variqueux, hémorroïdaires, hypertendus.

Urémie, Diabète, Goutte, Rhumatismes, Artériosclérose.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Tube : 60 pilules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DÉPUROGÈNE « T »

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et d'extrait hépatique spécial.

Propriétés. — Épuratif et décongestif de l'organisme féminin, selon la méthode du D^r A. Chaix, de Vichy.

Indications. — Traitement par excellence de tous les troubles de la ménopause et des troubles congestifs dus à la stase veineuse et à l'intoxication du sang.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Boîte 60 pilules.

Laboratoire de LA LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DERCUSAN

Chloramine T 1,50 p. 100 en véhicule hydrocarburé.

Antiseptique cicatrisant.

Propriétés. — Antiseptique, cicatrisant, désodorisant des sécrétions fétides, épidermisant, antiparasitaire.

Indications. — Abscesses, adénites suppurées, blessures, brûlures, crevasses, chancres, désinfection des plaies, ecthyma, leucorrhée, parasites cutanés, processus septiques, suppurations, tumeurs de la peau, ulcères de toutes sortes et variqueux.

Facilité d'application. Action antiseptique constante. Non-adhérence des pansements. Non irritant quoique puissant bactéricide.

Prix au public :

Petit tube	5 fr.
Grand tube.....	10 —
Tube clinique.....	25 —
Canule Dercusan pour l'injection de l'antiseptique dans les cavités.....	15 —

Laboratoires SASSE

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

DERMACIDE PORCHER

L'abus des savonnages — *toujours alcalins* — détruit l'acidité naturelle de la peau et de certaines muqueuses, rendant celles-ci facilement infectables.

D'autre part, les acides diminuent les démangeaisons tandis que les alcalins les exacerbent (Darier).

Dermacide est un substitut réellement acide du savon (pH moyen 3,5).

Caractéristiques. — 1° Il contient à l'état libre : Acide Acétique 0,60 ; Tartrique, 1,10 ; Salicylique, 0,25 ; Benzoïque, 0,20 p. 100.

2° Son Acidité ionique (pH moyen 3,5) — *il rougit le Tournesol bleu* — est proche l'acidité naturelle de la peau (pH 4,5) ;

3° Il s'emploie, nettoie et mousse comme le savon ;

4° Les pouvoirs Antigénétique et microbicide de **Dermacide** liquide sont effectifs aux concentrations aqueuses respectives de 2 à 4 p. 100.

Indications. — Les infections de la peau, du cuir chevelu, des muqueuses.

Epidermomycoses en général, Eczémas, Eczématides, Intertrigos — Prurits sous toutes ses formes — Séborrhées grasses — Acnés — Psoriasis. — Pyodermites — (furoncles, impétigos, etc...).

Métrites, Vaginites, Prurits Vulvaires.

Mode d'emploi :

Dermacide liquide : l'employer comme agent de nettoyage et en lotions épidermiques, coupé de 1 à 4 fois son poids d'eau, laisser en contact quelques minutes, rincer ensuite à l'eau.

Cuir chevelu : nettoyage avec 2 cuillerées à bouche pour 1/4 de litre d'eau tiède rincer à l'eau.

Injections vaginales : 1 à 3 cuillerées à bouche pour 2 litres d'eau.

Dermacide pain. — Remplace le pain de savon dans tous les usages.

Dermacide pâte. — Sans corps gras, sèche rapidement et s'enlève à l'eau ; complète l'action des deux autres formes.

Traitement. — *Supprimer complètement l'usage des savons*, le remplacer, comme Agent de nettoyage, par **Dermacide** pain, ou liquide.

Sur les lésions accentuées, compléter, après quelques jours, le traitement ci-dessus par des applications de **Dermacide** pâte.

Sur la face, les lésions subaiguës, les plis, débiter par lotions de **Dermacide** liquide coupé de 4 à 6 fois son poids d'eau. Les premières applications déterminent parfois, pendant quelques minutes, des sensations de picotement qui disparaissent à la deuxième ou troisième application. Augmenter progressivement la concentration.

Sur les peaux sèches (dépourvues de graisse), ne pas employer **Dermacide**, à moins de faire suivre son usage d'applications de crème de lanoline.

Dermacide pain. — Boîte de 1 pain : 6 fr. 75 ; de 3 pains : 19 fr. 50

Dermacide pâte. — Tube (100 gr.) : 13 fr. 50.

Dermacide liquide. — Flacon : 16 francs. — GM : 35 francs.

Laboratoire PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e). Arch. 69-03.

DERMODULCIS LAGOUTTE

Composition et forme. — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : aa p. e.

Actions thérapeutiques. — Isolante, adoucissante, astringente, siccative. S'étend facilement et s'enlève aisément.

Indications. — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermites aiguës de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée. Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

Mode d'emploi. — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 10 francs.

Son efficacité est heureusement complétée par la DERMODULCIS (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 6 francs.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35).

DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.
(Extr. de hêtre).

Propriétés. — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

Indications. — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres) ; du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards, verrues plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circinné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 12 francs.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (cholagogue et diurétique), le **Raiforyl** (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires de la DERMOFAGINE

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER
(Pas-de-Calais). (Tél. : 537)

DERMOLIVE

Composition. — Pommade à base du support actif: *Oléostat* (nom déposé), Huile d'Olive *Vierge* solidifiée et saturée par procédé catalytique associé synergiquement aux acides benzoïque et borique, Kérosène et essences.

Propriétés. — L'Huile d'Olive, support actif, garde ses vertus naturelles, son affinité extraordinaire de pénétration à travers le derme ainsi que sa richesse en vitamines.

Indications. — Toutes les dermatoses (eczéma, zona, acné, furonculose), Cicatrisation de toutes les plaies (brûlures, engelures). Toutes indications de chirurgie et d'obstétrique.

Mode d'emploi. — Bien nettoyer la plaie. Appliquer largement *Dermolive*, qui fond aussitôt et imprègne profondément la partie malade. Recouvrir d'une compresse. Renouveler matin et soir.

Grand tube. — Petit tube.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

(Voir *Boldolive*, *Suppolive* et *Sulfolive*.)

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil.)

Forme avec le Zébo-Plastol et le Crémo-Plastol le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes, destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol est la préparation qui convient au plus grand nombre de cas ; il calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les *Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres : eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Enregistrés au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous les n° 1-1, 1-2 et 1-8.

Prix : 22 francs, le 1/2 pot 13 fr. 50.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS. (Tél. : Archives 37-44.)

DERMOSE ANTI-IMPÉTIGINEUSE

(Pâte de Hodara)

Formule :

Oxyde de plomb	14
Précipité blanc	14
Acide borique	14
Oxyde de zinc	14
Véhicule gras	44

Indications. — Impétigo, Acné, Affections cutanées torpides et infectieuses, Furoncles, Eczémas des fosses nasales, Pyodermites.

Prix au public : Tube : 12 francs.

Laboratoires SASSE

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

DERMOSPLÉNINE

Extrait désalbuminé aqueux de rate.

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques.

Prurits — Urticaires — Œdème de Quincke.
Ampoules de 2 centicubes correspondant à 25 gr. de rate fraîche de veau.

Mode d'emploi. — *Injection intramusculaire.* —

Commencer le traitement par l'injection de 2, 3, 4 ou même 5 ampoules à la fois selon la gravité du cas traité ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à 1, 2 ou 3 ampoules, également tous les 2 jours.

Références cliniques et échantillons :

Liposplénine du D^r Groc.

J. OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

DERPHYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 363-39.

Forme. — Poudre.

Composition. — Stéarates métalliques.

Propriétés dermatologiques. — In-
fermentescible, hydrofuge, antiseptique,
isolante.

Indications. — Toilette des nourrissons, der-
mites, intertrigo, prurits, macérations,
urticaire, impétigo, dartres, piquûres d'in-
sectes, coups de soleil.

Présentation. — Boîte poudreuse.

La boîte poudreuse : 8 fr. 50 (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30).

DÉSARTYL ex-DÉTENSYL

Hypotenseur vé géto-polyhormonique.

Composition. — Gui, Hépatine, Pancréine, Pul-
mine.

Dose. — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence
avant les repas) amènent un abaissement rapide
et durable de la tension artérielle. — Les symp-
tômes alarmants sont immédiatement amendés.

Indications. — Hypertension artérielle, troubles
de la ménopause, menaces d'hémorragie céré-
brale chez les pléthoriques, troubles oculaires et
auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées : 16 francs.

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances
Sociales.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du Dr Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque:

1° Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 40 francs.

Traitements adjuvants et de maintien:

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 60 fr., seul : 25 fr.

Trachéol : Le flacon : 20 francs.

Seringue spéciale pour injections trachéales : 60 fr.

Pilochlorine : Pilules, le flacon : 25 francs.

Traitement forme bronchitique:

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 40 francs.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

DÉSITIN

Pommade à base d'huile de foie de morue.

Composition. — Pommade à base d'huile de foie de morue cru, contenant par son procédé de fabrication un optimum contrôlé de vitamine A et D, oxyde de zinc et talc.

Indications. — Toutes les lésions et affections de la peau : plaies, brûlures, ulcères variqueux, eczémas, intertrigo, prurit, etc. DESITIN, isolant et protecteur idéal, est spécialement adapté pour les soins des nourrissons.

DÉSITINOL

Pommade semi-fluide à base d'huile de foie de morue.

(Sans oxyde de zinc, sans talc.)

Indications. — Plaies et brûlures étendues, plaies infectées, plaies osseuses, plaies chroniques, ostéomyélite, phlegmons, etc.

Présentation. — Tubes, tubes d'essai et modèle hôpital.

Produits SYNERGA

8, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

Provence 95-03.

DÉTERGINE

Pommade aux Peroxydes, Gaïacol, Principes résineux.

Traitement des Plaies.

Plaies en général (abcès, furoncles, anthrax, brûlures, escarres, fistule, fissures anales, gerçures, impétigo, eczéma, engelures ulcérées et toutes suppurations, plaies post-opératoires, ulcères variqueux, pyodermite).

Détersif énergique: Nettoie, décape, déterge rapidement toute plaie, même la plus infectée, c'est là son originalité.

Convient également à l'eczéma consécutif aux plaies post-opératoires.

1/2 tube : 8 fr. }
Gros tube : 13 fr. } pour la France.

Laboratoire du Docteur BOURDEAU

PARTHENAY (Deux-Sèvres).

DEXOPLASMA

Opothérapie anti-anémique.

Composition :

Extrait de foie	0 gr. 03
Extrait de rate	0 gr. 03
Extrait de groseille	0 gr. 01
Nucléinate de manganèse	0 gr. 015
Nucléinate de cuivre.....	0 gr. 0025
Sérum, hémoglobine, glycérine. Q. S. p	5 cc.

Indications. — Anémies de toutes natures (médicales et chirurgicales), Chlorose, Asthénie, Surmenage, Convalescence, tous états dépressifs..

Présentation. — Deux formes :

Ampoules buvables de 5 cc. — Sirop.

Posologie :

Ampoules buvables : 1 à 3 ampoules par jour selon âge.

Sirop : Adultes : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

— *Enfants :* 5 cuillerées à café par jour.

(Peut être pris pur ou dilué dans un peu d'eau).

(Ampoules (12 ampoules de 5 cc.) : 21 francs.

Prix { Sirop : 17 fr. 50.

{ Ampoules (vrac) : 31 fr. 25 (la boîte de 25 amp. vrac).

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

DEXTROSOL

« d » glucose raffiné $C^6 H^{12} O^6 \cdot H^2 O$.

Présentation. — Poudre blanche, sucrée, soluble.

Indications. — Toutes les indications du glucose et notamment état d'hypoglycémie et d'acidose, insuffisance hépatique, affections allergiques, myocardites, maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie), surmenage, asthénie. Sucre de choix dans l'alimentation des enfants. Administration pré- et post-opératoire.

Mode d'emploi. — A incorporer aux boissons, eau, thé, lait, café, jus de fruits.

Adultes : dose variable. Tolérance parfaite de quantités importantes, en raison du pouvoir sucrant trois fois moindre que celui du saccharose.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par biberon de 100 grammes.

Prix : 6 francs la boîte de 250 grammes.

Société des PRODUITS DU MAIS

29, rue de Berri — PARIS. Tél. : Ellysées 72-06.

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours ; diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 26 francs, pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien
21, rue Chaptal — Paris (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIABÉTOSAN

Comprimés.

Insulinoïde végétal obtenu par dialyse de germes d'une espèce sélectivement cultivée d'orge, et dont la germination est conduite dans des conditions de temps et de température rigoureusement déterminées, sans aucune autre association chimique ou organique (C. R. *Académie des Sciences*).

Propriétés thérapeutiques. — Action hypoglycémiante constante et prolongée. Diminution parallèle des taux de sucre sanguin et urinaire.

Indications. — Diabètes moyens et légers. Hyperglycémie, Polydipsie, Polyurie. Meilleure utilisation des substances hydrocarbonées. Dermatoses. Cures d'engraissement. Adjuvant de l'insuline dans les diabètes graves permettant le remplacement d'un quart ou d'un tiers environ des unités d'insuline.

Posologie. — *Adultes*: 8 à 12 comprimés par jour, en trois fois au cours des repas.

Enfants: demi-doses.

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

DIADERMINE

Crème.

Excoipient pour pommade. Crème de toilette.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure. Touchers*, ne graisse pas et n'abime pas les gants.

Massages, Soins de la peau. Brûlures, Engelures, Gerçures du sein. Erythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 7 fr. 75 ; Tube : 5 fr. 50.

DIADERMINE U. V.

Crème.

A base de crème Diadermine et de sels de quinine. Empêche la photo-sensibilisation de la peau par les rayons ultra-violets.

Indications. — *Évite et guérit les coups de soleil* (supprime la douleur en quelques minutes. Fait disparaître l'érythème en 24 heures).

Protection de la peau au cours des traitements par rayons ultra-violets ou rayons X (empêche la radiodermite).

Mode d'emploi. — *Préventivement.* Enduire la partie à protéger d'une légère couche de Diadermine U. V.

Curativement. — Mettre sur l'érythème une couche épaisse de Diadermine U. V. Panser sous gaze stérilisée.

Prix de vente au public : Grand tube : 20 francs ; Tube moyen : 8 fr. 50.

DIADERMINE B. B.

Poudre.

Poudre minérale hygiénique stérilisée à 125° (complément de la crème Diadermine pour les soins de la peau).

Présentation. — En boîtes poudreuses hermétiques (en aluminium) et stérilisées.

Indications. — Toilette des nouveau-nés : érythème fessier. *Adultes* : toutes irritations de la peau, intertrigo, dermatoses. *Feu du rasoir*, transpiration.

Prix de vente au public : la boîte 6 fr. 50. Recharge 4 fr. 25.

Conditions spéciales au Corps Médical.

Remise 40 p. 100.

Échantillons sur demande à :

BONETTI Frères

60, rue Étienne-Dolet — MALAKOFF (Seine).
(Tél. : Alésia 24-01 et 24-02.)

DIAGNOTHORINE

Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Indications. — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenue par l'emploi de la GELOBARINE (Voir Gélobarine). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

Présentation. — Flacons de 60 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé pendant les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également être administrée par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Prix de vente : Le flacon de 60 cm³. : 15 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DIAL

Diallylmalonylurée

CIBA

HYPNOTIQUE ANTINERVEUX.

Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

Indications. — Insomnie nerveuse en général : agités, émotifs, surmenés. Etats d'excitation psychique et de nervosisme. Agitation dementielle.

Doses. — 1/2 à 2 comprimés (au coucher pour les insomnies du soir ; au réveil pour celles du cours de la nuit).

Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 12 fr. le flacon

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

(Tél. : Auteuil 20-21.)

DIASES

Composition. — Farines fraîches diastasées non stérilisées renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber.

Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité. Elles assurent une alimentation rationnelle, sans aucun surmenage des organes digestifs.

Les repas de Diases, prédigérés pendant leur cuisson, conviennent aux organismes les plus délicats.

Variétés :

Diasé Cacao : Diasé de gourmandise pour déjeuner et goûters.

Diasé Céréale : Donne des bouillies très fluides pour l'alimentation au biberon. Convient à tous les estomacs délicats. Ne contenant aucun condiment, elle est naturellement fade et doit être accommodée selon le goût du consommateur.

Diasé légumineuse : Permet de préparer instantanément des potages excellents dont la condimentation peut être complétée suivant le goût de chacun.

Boîtes
de
300 grs net,
1 kilo
net,
et
3 kilos
net.

Indications :

Bébés : au moment du sevrage.

Enfants : pendant la période de croissance.

Adultes : tous régimes.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid 3 fortes cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diasé dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit : elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

PROGIL, Sté An. au capital de 50 000 000 fr.

10, quai de Serin — LYON (IV°).

Tél. : Burdeau 85-31.

Laboratoires à RIS-ORANGIS (S.-et-O.).

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant Intensif.

Composition et formes.

Diastogène simple. — Elixir (légèrement alcoolisé). Arsine, stimulant de la nutrition. Nucléine manganésifère, catalyseur nutritif, excitant de centres hématopoïétiques.

Kola fraîche stabilisée, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

Adultes : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Indications. — Reconstituant type, le plus agréable.

Diastogène F. (Cachets).

Complexe Diastogène (Arsines, nucléine manganésifère, kola fraîche) plus Fenugrec *total*, inclus en un comprimé glutinisé parfaitement toléré.

Adultes : 1 à 3 cachets par jour, *au milieu des repas*.

Indications. — Convalescences, asthénies avec amaigrissement, diabète.

Il existe une forme Diastogène F cachet, non arsenié.

Diastogène hépto-splénique granulé.

Application pratique de la méthode de Whipple : extrait titré de foie frais et de rate fraîche associés au complexe Diastogène (non arsenié) renforcé par addition de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Adultes : 4 cuill. à café par jour.

Enfants : 10 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; 5 ans : 1 à 2 cuill. à café ; 1 an : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

Indications. — Convalescence de l'enfant, Anorexie, Asthénies.

Prix : 17 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines
et hormones des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisse, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

Doses. — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'élixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'élixir dans de l'eau sucrée.

Prix : Taxe d'état comprise.

Elixir : 15 francs. — *Pilules* : 12 francs.

Laboratoires du Docteur **TISSOT**

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

31, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

DIATHERMIE

A. Diathermie médicale.

- 1° Troubles de la circulation artérielle et veineuse ;
- 2° Douleurs thoraciques d'origine pleurale et douleurs abdominales : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;
- 3° Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies
- 4° Névralgies et névrites ;
- 5° Trophicité des tissus : paralysies, poliomyélite.

B. Diathermie chirurgicale. Diathermo-coagulation.

Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions en dermatologie, en gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en ophtalmologie, ainsi qu'en chirurgie générale.
Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

DIATHÈS

« MÉTÈRE »

Indications. — Contre toutes les manifestations de l'Arthritisme. Rhumatisme. Asthme. Rhume des foin. Goutte. Fibromes. Obésités. Troubles hépatiques et circulatoires. Eczémas.

Composition. — Solution huileuse colloïdale de Manganèse et de Fer contenant 0,13 mgr. de Manganèse et 0,03 mgr. de Fer par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. Prendre en même temps 2 capsules par jour de Diathès-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines arrêter quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire. Associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

DIATOL

du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Pulvis-Diatomei, lavée, stérilisée, calibrée, anhydre, Talcum.

Propriétés. — Le *Diatol* pâte neutre très poreuse active le « restitutio ad integrum ».

Indications. — Eczémas suintants, prurigineux des membres inférieurs pré ou post-ulcéreux. Toutes dermatoses irritées.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther, appliquer en couche de un demi-centimètre d'épaisseur sur toute la surface des lésions. Le pansement doit être fait en évitant l'emploi du coton.

Demander les brochures des Docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczéma pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

DIBROMOTYROSINE « ROCHE »

Composition. — Dérivé bromé de la tyrosine dont l'action sédatrice complète et consolide l'action en quelque sorte spécifique de la diiodotyrosine. Ne provoque aux doses thérapeutiques aucun phénomène de bromisme.

Indications thérapeutiques. — Renforce la diiodotyrosine contre les symptômes nerveux du Basedow. Remplace les bromures dans toutes leurs indications.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par jour.
Tube de 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-79.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10).

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

4 p. 100 d'iode total.

Dont 3 p. 100 d'iode libre.

Avantages :

- 1° *Toxicité abaissée* : des lapins de 2 kg. tolèrent 20 cc. par jour.
- 2° *Causticité supprimée*, car l'iode est adsorbé. Phénomène comparable à l'action du charbon sur les toxines intestinales.
- 3° *Activité augmentée* du fait de la division colloïdale.

Le Dicaliode est l'iodique des *petites doses*, parce que *très actif*.

Le Dicaliode est l'iodique des *hautes doses*, parce que très actif et *facilement toléré*.

Mode d'emploi. — Se prescrit en cc. ou par gouttes dans du lait, avant ou pendant les repas. 1 cc. = XXXVI gouttes.

Indications. — Dicaliode à petites doses : 1 à 2 cc. par jour. Goître. Enfants : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. *Hypertension*. Affections du cœur et des vaisseaux, de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphysème, coqueluche, tuberculose). Affections de la peau : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 5 à 10 cc. et plus par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, pl. V.-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien

4, Avenue Orban.

DICODÉINE LAFRAN

Indications. — Toux rebelles et toutes affections broncho-pulmonaires. Efficacité rapide.

Composition. — Codéinéméthylcodéine : 0,13 ; Aconit : 0,01 ; Belladone : 0,02 ; Terpène : 0,055 ; Benzoate de soude : 0,08 ; Glycyrrhizine et Excipient : Q. S. p. 1 comprimé dragéifié.

Posologie. — Doses pour 24 heures :

Adultes : de 5 à 6 dragées.

Enfants : de 10 à 15 ans : 4 dragées ; 5 à 10 ans : 2 à 3 dragées. A prendre entre les repas avec un peu d'eau ou une tisane.

On peut également les sucer.

Littérature et Échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 12 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 36-78.)

DIDIAL

CIBA

Hypnotique — Analgésique

Diallylmalonylurée et éthylmorphine

N'EST PAS AU TABLEAU B.

Un comprimé contient : Diallylmalonylurée : 0 gr. 11 ; Ethylmorphine : 0 gr. 015.

Pouvoir narcotique prononcé et action nettement analgésique, d'où indication lorsque l'insomnie est sous la dépendance de la douleur ou de l'anxiété.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur ou de l'anxiété : algies, traumatismes, tabes, cancer. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas, dans les autres cas.

Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIEMENAL

Indications. — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Composition. — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 16 fr. 50 (en France).

Laboratoire J. DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Tremblay 12-04.)

DIÉNOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Rougeole, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Infections septicémiques et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

Compositions. — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

Forme :

1^o Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules, pour injections.

2^o Tubes-doses isotoniques de 40 cc. :

En boîte de 3 tubes.

En boîtes de 6 tubes.

Par tube isolé.

Pour emploi par voie rectale (V. R.).

Mode d'emploi. — Une ampoule toutes les 12 heures en injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse.

Par la voie rectale : 3 tubes-doses par jour. Quand on ne veut pas employer le *Diénol* en injection hypodermique, on opère par voie rectale à l'aide des Tubes-Doses.

Prix de la boîte de 6 ampoules... 14 fr.

Prix de la boîte de 3 T.-doses
(V. R.) 15 fr.

Prix de la boîte de 6 T.-doses
(V. R.) 27 fr.

Prix d'un Tube isolé (V. R.) 4 fr. 50

J. DEPRUNEAUX

Pharmacien de 1^{re} classe

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

Tél. : Tremblay 12-04.

DIENTYL « INAVA »

(Dragées anticolibacillaires).

Vaccin anticolibacillaire polyvalent par voie buccale d'un usage commode contre les infections colibacillaires.

Le *Dientyl* tire son pouvoir immunisant du coli-bactériophage et des antigènes concentrés et solubilisés qu'il contient. Par sa composition, il agit également contre la constipation chronique.

Indications. — Préventif et curatif des Infections colibacillaires, Syndrome entéro-rénal, Entérocolites, Cystites, Pyélonéphrites et Constipation chronique.

Mode d'emploi. — Prendre chaque matin à jeun, pendant 20 jours, 3 à 5 dragées. Boire ensuite la contenance d'un demi-verre de liquide (eau, tisane, lait, café, etc.).

Prix : 12 francs l'étui de 50 dragées.

E. GUIGNIER, pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30).

DIGALÈNE « ROCHE »

**Digitale injectable
étalonnée physiologiquement.**

Glucosides totaux de la feuille de Digitale pourpre titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Posologie et modes d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 ampoule de 1 cc. = 75 unités-grenouille = 0 gr. 05 de feuille de Digitale titrée (standard de la S. D. N.).

1 cc. de Solution = 150 unités-grenouille = 0 gr. 10 de feuille de Digitale titrée.

1 Comprimé = 75 unités-grenouille = 0 gr. 05 de feuille de Digitale titrée.

Doses faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

Doses moyennes ou sédatives :

Adultes : XX à XL gouttes : 1 à 2 comprimés ou 1 à 2 ampoules (voie intramusculaire).

Enfants : V à X ou XV gouttes.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : LX à CLXXX gouttes ; 3 à 6 ampoules (Voie intramusculaire ou endoveineuse). *Enfants* : V à XX gouttes et même 1 à 2 ampoules (cas désespérés).

Propriétés thérapeutiques. — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indications thérapeutiques. — Chaque fois que le cœur faiblit.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-9 (*ampoules*), 504-11 (*solution*), 504-10 (*comprimés*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

DIGASTRINE

(Cachets)

Composition. — Benzoate de naphtol, Charbon spécial, Poudre de belladone stabilisée.

Mode d'action. — Sédatif, absorbant, antiseptique ; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

Indications. — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocolite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas. Prix : 15 francs.

Laboratoire de la DIGASTRINE

M. DELORME, pharmacien

11, r. St-Agricol, AVIGNON (Vaucluse) (Tél. : 1-00).

DIGESTIF HARVEY

Benzonaphtol	50 centigr.
Carbonate de chaux	25 —
Salicylate de bismuth	25 —
Hydrate de magnésie	50 —
Pepsine extractive	10 —
Maltine	05 —
Sucre anisé	6 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de l'acidité gastrique et des fonctions digestives.

Formes. — Granulé d'un goût agréable, pouvant être croqué.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Entérites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau, après chaque repas. Avant d'absorber le granulé, le laisser pendant vingt minutes en contact avec l'eau.

Prix au public : 10 francs la boîte de 90 grammes.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.

DIGESTONIC

Composition. — Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydroglycérique de *Sedum telephum* et de *Gonolobus condurango*.

Forme. — Elixir.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 18 fr. le flacon de 80 cc. environ.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIGEX

Antigastralgique, réalisant la saturation totale de l'acidité stomacale.

Composition. — Carbonates de chaux, soude et magnésie, Kaolin pur lavé, Magnésie hydratée, Phosphate tricalcique, crème de tartre, peroxyde de magnésie, condurango, fenouil, acide acétyl-salicylique. Sucre de lait.

Forme. — Paquets.

Indications. — Dyspepsies, aigreurs, brûlures d'estomac, ballonnements, nausées, vertiges, crampes, ulcères gastriques et duodénaux.

Doses :

Un à deux paquets après les repas. Durée du traitement : quinze jours.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403-7.

Laboratoire REIVILO

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).

(Tél. : Diderot. 04-71).

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.
Association digitaline-ouabaïne.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours).

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Rémarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

Belgique : Agent général **L. Prunières.**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

DIGICARDINE

Composition, présentation et prix :

Pilules kératinisées.

La boîte de 40 pilules : 15 francs.

Poudre de feuilles de digitale stabilisée.....	2 cgr. 5
Scille.....	3 cgr.
Théobromine chimiquement pure.....	5 cgr.

Indications. — Insuffisance cardiaque, partielle ou totale, insuffisances cardio-rénales, rétentions chlorurées ou azotées avec ou sans hypertension, cardiopathies aiguës et chroniques, retentissement cardiaque des maladies pulmonaires, infectieuses ou rénales, éréthisme cardiaque, tachycardie, arythmie, palpitations.

Posologie :

Dose asystolique : 0,25 cgr. à 1 gr. en 4 jours (10 pilules par jour).

Dose hyposystolique : 0,50 cgr. à 1 gr. en 10 jours (2 à 4 pilules par jour).

Dose eusystolique : 0,25 cgr. à 0,50 cgr. par mois (1 pilule par jour pendant 10 jours, 1 ou 2 fois par mois).

Laboratoires IMMUNOS

8, avenue des Sources — NICE.

(Tél. : 802-30.) — Adr. télégr. : IMMUNOS-NICE.

DIGIFOLINE

CIBA

Préparation digitalique totale.

Extrait digitalique contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

Stable, d'action constante, toujours bien tolérée.

Rigoureusement dosée.

Indications. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale

Formes pharmaceutiques :

Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Ampoules de 1 cc. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Tube de 25 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIGI-LANATINE OU LANATINE

Soluté au millième du Totum Glycosidique de Digitalis Lanata.

Cinquante gouttes = Un milligramme.

Remplace avantageusement et plus sûrement la poudre et l'infusé de la feuille de Digitale.

Totum glycosidique soluble dans l'eau, d'où élimination plus rapide et accumulation moindre.

Action rapide, Constante, Durable, Action physiologique constante et continuellement contrôlée, Ralentit, Renforce, Régularise le cœur, Provoque la diurèse, Réduit les œdèmes, Insuffisance cardiaque, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux, Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie :

Cardiotonique : V à X gouttes par 24 heures.

Sédatif : X à XX gouttes par 24 heures.

Antiasystolique : jusqu'à C gouttes par 24 heures.

A haute dose : 2 mgr. par 24 heures (X gouttes toutes les heures).

Diurétique puissant, à cet effet sur ordonnance médicale seulement, solution à 5/1 000.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).
(Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé
Complexe cristallisé isomorphe des glucosides *initiaux*
(A, B, C) du *Digitalis lanata*.

Avantages. — Toutes les propriétés d'une macération de feuilles fraîches de digitale qui serait parfaitement préparée, de composition toujours identique, d'activité constante.

Le Digilanide est remarquablement toléré par la voie gastrique, les voies intraveineuse, intramusculaire et rectale. Son action est plus rapide que celle des autres digitaliques et ses effets diurétiques plus nets. Sa posologie est plus maniable, son élimination plus facile en cas de surdosage.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques.

Dosage. — 1 mgr. = 400 unités grenouille = 3 unités chat.

Formes. — *Gouttes* : 1 cc. = un demi-milligr. = XL gouttes du compte-gouttes normal. *Dragées* dosées à un quart de milligr. *Suppositoires* dosés à un demi-milligr. *Ampoules* de 2 et de 4 cc. : 1 cc. = 0 mgr. 2.

Posologie :

Voie gastrique. — *Solution.* Dose forte : $\frac{3}{4}$ de cc. ou XXX gouttes, 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Reprendre si nécessaire au bout de 8 à 10 jours.

Dose moyenne : $\frac{1}{2}$ cc. ou XX gouttes, 3 fois par jour pendant 8 à 10 jours.

Dose faible (dose d'entretien cardiotonique) : $\frac{1}{4}$ de cc. ou X gouttes, 3 fois par jour.

Dragées : dosées chacune à $\frac{1}{4}$ de milligr. — 2 dragées correspondent à XL gouttes ou 1 cc. de la solution gastrique.

Dose moyenne : une dragée, 3 fois par jour.

Voie rectale. — *Suppositoires* : un à deux par jour.

Voie veineuse. — Une ampoule de 4 cc. par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler, s'il y a lieu, après 5 à 8 jours ou remplacer par l'administration gastrique ou rectale.

Voie intramusculaire. — Une ampoule de 2 cc., 1 à 2 fois par jour.

Prix :	{	Le flacon de 10 cc.....	12 francs
		Le tube de 20 dragées.....	12 francs
		La boîte de 6 ampoules de 4 cc.....	18 francs
		La boîte de 6 ampoules de 2 cc.....	12 francs
		La boîte de 6 suppositoires.....	12 francs

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII°).

DIGI-MIAL-BAINE

Composition :

Cinquante gouttes contiennent :

1/3 de mgr. de Digitaline cristallisée ;

2/3 de mgr. de Ouabaïne cristallisée.

Ralentit, renforce, régularise le Cœur. Provoque la Diurèse. Réduit les Œdèmes. Insuffisance cardiaque. Endocardite-Myocardite. Péricardite. Soutient admirablement le Cœur dans tous les états infectieux. Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie.

Cardiotonique : V à X gouttes par jour.

Sédatif : X à XV gouttes par jour.

Anti-asystolique : jusqu'à LX gouttes dans les 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon. de 12 cc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).

Tél. : Richelieu 35-10.

DIGISTABILINE

Gouttes - Pilules au 1/10^e mlg. et au 1/4 mlg.

Ne peut être prise que sur prescription et sous contrôle médical.

Indications. — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires.

Composition. — La *Digistabiline* en « gouttes » et en « pilules » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

Mode d'emploi. — La préparation liquide est logée en compte-gouttes. Elle peut être facilement dosée.
— VII gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline crist.

Pharmacie Centrale de Belgique

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications. — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes. — Granules roses au 1/10^e de milligr., flacons de 50.

Solution au 1/1000^e, flacons de 10 et 5 cc.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

DIGITALINE-MIALHE

Soluté au millième de Digitaline Cristallisée.
Cinquante gouttes = 1 milligramme.
Supériorité incontestable sur toutes les préparations de *Digitalis Purpurea*.

Action rapide, Constante, Durable.

Pureté chimique, Action physiologique constante et continuellement contrôlée. Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes (employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Préparée uniquement par les **Laboratoires Mialhe**.
Ralentit, renforce, régularise le cœur. Provoque la diurèse. Réduit les œdèmes, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, péricardite. Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux.
Médication spécifique du cœur gauche.

Doses :

Cardiotonique : III à IV gouttes par jour.

Sédatif : V à X gouttes par jour.

Antiasystolique : jusqu'à L gouttes dans les 24 heures.
Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cmc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).
Tél. : Richelieu 35-10.

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila (1872), Prix Desportes (1904),
décernés par l'Académie de Médecine de
Paris.

La Digitaline Nativelle ralentit, renforce,
régularise le cœur, provoque la diurèse,
réduit les œdèmes.

Indications. — Insuffisances cardiaques,
Cardiopathies valvulaires, Myocardites,
Asthénie cardiaque (maladies infectieuses
et opérations), Arythmies, Auricular
Flutter.

Formes. — *Solution* au 1/1.000. *Granules*
au 1/10 de mg. *Ampoules* au 1/4 de mg.
pour injections intramusculaires.

Doses.

Per os : Dose faible (d'entretien) : 1/2 mg.
en 5 jours.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mg. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mg. 1/2 à 3 mg.
en 10 jours (jusqu'à saturation).

Injections : 1 cc. d'une ampoule matin et
soir le premier jour, puis 1 cc. d'une am-
poule par jour les 3 ou 4 jours suivants.

Ampoules. Prix : 16 frs., 40.

Granules. — : 12 frs., 30.

Solution. — : 16 frs., 40.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

DI-iodo-TYROSINE BYLA

Composition. — Di-Iodo-tyrosine = acide aminé iodé contenant 58 p. 100 de son poids d'iode organique.

Indications thérapeutiques. — Tous états d'hyperthyroïdisme, notamment maladie de Basedow et certains troubles de la ménopause (bouffées de chaleur, métrorragies, etc...) liés à une suractivité de la thyroïde.

Nous attirons également l'attention sur la **Di-Bromo-Tyrosine Byla** (acide aminé bromé, contenant 47 p. 100 de son poids de brome organique) qui remplace avantageusement, parce que plus assimilable, les bromures dans toutes leurs indications. La **Di-Bromo-Tyrosine Byla** s'associe à la **Di-Iodo-Tyrosine Byla** contre les troubles nerveux du Basedow.

Présentation, Posologie. — Comprimés de Di-Iodo-Tyrosine Byla à 0,10. Comprimés de Di-Bromo-Tyrosine Byla à 0,25. Boîtes de 20 comprimés ; un à trois comprimés par jour.

Prix : 20 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

DIIODOTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique
de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

Indications thérapeutiques. — Tous les états hyperthyroïdiens ; tous les symptômes basedowiens.

Posologie. — 1 à 3 comprimés dosés à 0 gr. 10 par jour. (Tube de 20 comprimés.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-59.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

DILUBYL

Cholagogue. Laxatif.

Forme. — Dragées, granulé.

Composition. — Extraits purifiés stabilisés d'artichaut, boldo, combretum, évonimine verte, entérokinase, bile, ferment lactique, charbon activé.

Indications. — Insuffisance hépatique, coliques hépatiques, lithiasse biliaire, cholémie familiale, diabète, constipations atoniques et spasmodiques, intoxication intestinale, dyspepsies, prurit, dermatoses, hypertension, migraines.

Mode d'emploi :

Dragées : 1 à 4 par jour aux repas, doubler la dose dans les états aigus.

Granulé : 1 à 4 cuillerées à café par jour, 1/2 dose pour les enfants:

Prix. Boîte 50 dragées ou granulé : 15 francs.

Laboratoires A.-G. BERTON

61-63, rue Damrémont — PARIS (XVIII^e).
(Tél.: Montmartre 20-14.)

DIMÉTOL VICARIO

(Synonyme : Lycétol.)

Granulé effervescent de goût agréable.

Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.
Innocuité absolue.

Assimilation facile sans aucun trouble digestif.

Indications :

Diathèse urique, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques, Arthritisme, Rhumatisme, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi :

De 2 à 6 cuillerées à café dans un grand verre d'eau tiède, à jeun ou entre les repas.

Prix. — L'étui : 16 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e)

DINITRA

Dinitrophényl-lysidine pure.

Comprimés dosés à 0 gr. 036.

Animateur des combustions cellulaires.

Moins toxique que la thyroxine.

Plus actif que l'opothérapie.

Permet des traitements prolongés.

Dinitra active l'oxydation des réserves, élève le métabolisme basal, sans action secondaire sur aucun organe. Favorise l'élimination des déchets organiques.

« C'est, a dit le Professeur Pouchet, un médicament très important et très intéressant, dont il serait difficile de se passer actuellement. » (*Communication à l'Académie de Médecine, séance du 18 février 1936*).

Ralentissements de la nutrition.

OBÉSITÉ

Hyposphyxies ; États dépressifs.

Posologie classique. — 1 comprimé par 10 kilos de poids (dose à atteindre progressivement).

Dose maxima : 10 comprimés par jour.

ARTHRITISME

Hypothermies ; Hypométabolismes.

A faible dose :

2 à 4 comprimés par jour (dose non amaigrissante)

TOLÉRANCE REMARQUABLE

Dinitra respecte le cœur, le foie et les reins.

Prudence chez les albuminuriques et diabétiques

Voir **Opo-Dinitra**.

Boîtes de 60 et de 300 comprimés.

Ampoules injectables (1/2 cc. = 1 comprimé).

Remboursable par les Caisses d'Ass. Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, boul. de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).
Invalides 43-60.

DIOCAMPHINE BORNE

Association synergique *Dionine Borne* (codéthyline),
Camphre.

Sédatif analgésique tonicardiaque

Dyspnée, Toux rebelles, Angor, Eréthisme cardiaque, Spasmes, Vomissements incoercibles, Algies, Distonies douloureuses, vago-sympathiques, Insomnies, Anxiété, Agitation.

Formes :

Diocamphine Gouttes (X gouttes = 1 centigr. *Dionine Borne*);

Diocamphine Comprimés (1 comprimé = 1 centigr. *Dionine Borne*);

Diocamphine Suppositoires (1 suppositoire = 3 centigr. *Dionine Borne*);

Diocamphine Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 2 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble);

Diocamphine chirurgicale, Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 4 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble; 2/10 mmgr. Scopolamine HBr.

Doses :

Faibles : X gouttes, 1 comprimé, 1/2 ampoule.

Moyennes : XX gouttes, 2 comprimés, 1 ampoule
1 suppositoire.

Fortes : XL Gouttes, 4 comprimés, 2 ampoules ou
mieux, 1 ampoule chirurgicale concentr. double.

Une, deux ou trois fois par jour si besoin.

Médicaments enregistrés au Laboratoire national de
Contrôle remboursés par les Assurances sociales.

Laboratoires. BORNE

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél.: Plaine 02-78.)

Échantillons à volonté pour votre trousse d'urgence.

DIONINE BORNE

Composition et présentation. — Dragées que l'on peut sucer, croquer ou avaler (légère amertume), dosées chacune à 1/2 ctgr. de **Dionine** (Méthyl Codéine, ou codéthylène. **Dioninum du Codex**) chimiquement pure, ne contenant plus aucune trace de morphine libre.

Sans accoutumance. Tableau A, toxicité très faible.

Remède spécifique symptomatique de toutes les Toux.

Analgésique, Antispasmodique, Hypnotique très doux.

Posologie. — *Adultes : Selon le Codex.*

Doses maxima pour 24 heures : 20 ctgr. (40 dragées).

Doses maxima pour une prise : 5 ctgr. (10 dragées).

Faire prendre les dragées 2 par 2, trois à six fois par jour selon l'effet désiré. Pour les enfants de 5 à 12 ans diminuer les doses de moitié.

Prix : 14 francs la boîte de 40 dragées.

Voir à **Thiosidal** : Association **Thiocol Dionine**, sirop et comprimés.

Voir à **Diocamphine** : Association **Dionine camphre**.

Laboratoires de la DIONINE BORNE

SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Pl. 02-78.)

DIONOL (SIROP)

Composition. — Méthylcodéine (1 cgr. par 5 cc. de Sirop Dionol). Hydrolat de laurier-cerise, Benzoate de soude, Sève de Pin d'Arcachon.

Propriétés. — Spécifique de la toux. Sédatif, Hypnotique.

Indications. — Grippe, Bronchite, Congestion pulmonaire, Pneumonie, Asthme, Emphysème, Coqueluche, Phtisie, Tuberculose laryngée, Insomnie.

Posologie. — *Ne se prend que par cuillerées à café.*
1 cuillerée à café = 1 centigramme de méthylcodéine.

Adultes :

Toux : 4 à 8 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnies : 2 à 3 cuillerées à café au coucher.

Enfants :

Toux : 2 à 4 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à café au coucher.

Présentation et prix : Sirop, 1 flacon de 125 cc. : 14 fr. 80, pour un traitement de 5 à 8 jours.

Laboratoires FLEURY. — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie,

Lauréat du Ministère de la Santé publique.

DIORINE

(Granulés.)

Présentation. — En flacon.

Principes actifs. — Pipérazine, Benzoate de soude, Carbonate de lithium, Urotropine, Bicarbonate de soude, Acide tartrique.

Indications. — Dissolvant de l'acide urique, antiseptique urinaire et biliaire, arthritisme, obésité, rhumatismes goutteux.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

Mode de présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

Mode d'action. — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

DIPENTYL

Thérapeutique de l'obésité la plus active et la plus rationnelle.

AMAIGRISSEMENT DURABLE

Composition.

Folliculine : V Unités internat.	Lobe ant. de l'hypophyse...	0.005
Orchitine..... 0.02	Thyroidine.....	0.015
Thymusine..... 0.005	Phosp. de potassium tribas.	0.055
Par comprimé dragéifié :		

Originalité. — Véritable traitement de base de l'obésité, parce qu'il régularise le fonctionnement des glandes internes (ovaire, thyroïde), grâce à ses principes opothérapiques, associés aux électrolytes activateurs.

Mode d'emploi. — Sur prescription et sous contrôle médical : 1 à 3 comprimés par jour, à la fin d'un des repas.

Indications. — Obésité chez les pléthoriques, les sédentaires, les insuffisants digestifs, les neuro-arthritiques.

Obésité de la puberté chez les jeunes gens ou jeune filles hypophysiques hypoglandulaires.

Obésité de l'adulte dépendant d'une insuffisance glandulaire thyroïdienne, ovarienne, testiculaire spontanée ou artificielle.

Obésité de la Ménopause — Carences endocriniennes — Ralentissements de la nutrition — Etats dépressifs — Hypothermie.

Contre-Indications. — Albuminurie — Diabète.

Présentation. — Boîte de 40 comprimés dragéifiés.

Boîte-cure de 200 comprimés.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien interne des Hôpitaux
42, Boulevard Saint-Marcel. — PARIS. (Tél. : Gobelins 36-96.)

DIPHASOL

Antiseptique général pour usage externe.

Poudre contenant 7 p. 100 de diphénolate d'Hexaméthylène-amine produit chimique cristallisé *non caustique, analgésique cicatrisant d'activité antiseptique double du phénol*, étudié par MM. Tiffeneau et Bouchereau (communication à la Société Thérapeutique, décembre 1920)

Composition. — 7 p. 100 diphénolate d'Hexaméthylène-amine
93 p. 100 carbonate monosodique.

Sans toxicité et sans odeur phénolée.

Mode d'emploi :

1° En pansements pour plaies, abcès, urticaire, prurit, etc : 1 cuillère à soupe par 250 cc. d'eau bouillie tiède.

2° En gargarismes pour angines, stomatites, lavage de bouche : 1 cuillère à café par verre d'eau.

3° Pour usage gynécologique, dose variant d'une 1/2 cuillère à 1 cuillère à soupe par litre d'eau.

Prix : 12 francs, la boîte de 200 grammes.

(Laboratoire Contrôle 1621-5.)

Dépôt O. C. P.

Laboratoire P. BOUCHEREAU

Docteur en Pharmacie, lauréat de la Faculté de Paris

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : 197.)

DISMINE FAVROT

Capsules glutinisées — Granulé.

Composition. — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma crenata*) } \overline{aa} 0 gr, 05 et Salicylate de Phényle.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Antiseptique urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

MODE D'EMPLOI

Forme capsule. — Prescrite à la dose de 6 à 9 capsules par jour prises dans une gorgée d'eau à raison de 3 au lever, 3 au déjeuner et 3 au coucher.

Forme granulé. — De préférence avant les repas, prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour, et absorber ensuite un peu d'eau.

La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Prix : 19 francs.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

DISONYL

Composition :

Extrait pancréatique désinsuliné, Phényl-éthyl-malonyl-urée, Trinitrine.

Indications :

1^o Troubles fonctionnels cardiovasculaires (Tachycardies, Extra-systoles, Algies cardiothoraciques, petits Spasmes artériels).

2^o Dystonies neuro-végétatives (Anxiétés, Insomnies nerveuses, Vertiges).

Forme. — Boîte de 60 dragées, pour un traitement de 10 à 20 jours.

Posologie. — 2 à 6 dragées par jour, à prendre un quart d'heure avant les repas.

Prix de la boîte : 16 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

DITHIORAL

Dithiosalicylate de magnésie R. A. L.

Propriétés. — Antirhumatismal, analgésique, antitoxinique.

En un seul composé chimiquement défini, réalise simultanément les médications *salicylée* et *soufrée*.

Le Dithioral est très bien supporté par l'estomac.

Pas d'intolérance, pas d'action secondaire.

Indications.

Rhumatismes aigus, chroniques, déformants.

Algies : Sciaticques, Lumbagos.

Névralgies : dentaires, faciales.

Migraines.

Mode d'emploi.

Dose usuelle : 1 à 2 comprimés par jour.

Dose d'attaque : 2 à 6 comprimés espacés dans la journée, accompagnés d'un peu de liquide.

Présentation.

Boîte de 20 comprimés à 0 gr. 50 : 16 francs.

Établissements KUHLMANN

Produits R. A. L. Spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Elysées 99-51 à 57.)

DIURÈNE

(Extrait total d'*Adonis vernalis*.)

Formes. — Liquide ("Ordinaire" et "Concentré").
Pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, cardiaque et diurétique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Contient tous les principes actifs de l'*Adonis*.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'Arythmie, d'Asystolie, d'Œdème, dans toutes les Affections du foie, Néphrites, Artério-Sclérose.

Posologie :

Diurène ordinaire : 2 à 6 cuill. à café	} par jour.
Diurène concentré : 1/2 à 2 cuill. à café	
Diurène pilules : 4 à 12 pilules	

Prix de vente au public :

Liquide : 15 francs ; pilules : 12 francs.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél. : Opéra 43-79.)

DIURÉPHÉDRINE

Élixir.

Chl. Ephédrine naturelle.....	2 cgr.
Iodure de Sodium et Caféine.....	30 cgr.
Teinture Adonis Vernalis.....	X gouttes.

Par cuillerée à café.

Action. — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchosécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

Indications. — Traitement de fond, Asthme bronchique, Emphyseme, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie, Gazés, Toux.

Posologie. — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir (à diluer dans un peu de liquide).

Voir également : **Garéphédrine, Éphédrasmine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 18 francs le flacon de 25 cuillerées à café.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

DIURÉTIQUE GMET

Composition. — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

Propriétés. — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué. Aucune toxicité.

Indications. — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, grip-pés, etc. Ascites et tous épanchements séreux, Rhumatismes.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses, en général suffisantes, peuvent être augmentées dans les grandes oliguries.

Le flacon de 210 gr. Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

DIUROBROMINE

Composition :

Théobromine pure isotonisée et recristallisée.

Forme :

Cachets de 0 gr. 50.

Indications :

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 14 francs.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROCALCINE GROS

Association Calcium-Théobromine.

Indications. — Diurétique cardio-rénal.

Propriétés. — Pouvoir diurétique exalté.

Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

Posologie. — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 12 francs les 24 comprimés à 0 gr. 50.

Durée moyenne : 8 jours.

DIUROCALCINE IODURÉE

Indications. — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

Dose. — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Prix : 15 francs. (durée moyenne : 8 jours).

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 0-55.)

DIUROCARDINE

Composition. — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

Propriétés. — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

Forme. — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

Doses. — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

Dose cardiotonique. — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Dose cardiotonique d'entretien. — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROCYSTINE

Composition. — Benzo-camphorate de Lithine, Terpene, Castoreum.

Forme. — Cachets.

Indications. — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorrhagie. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

Boîte : 30 cachets. — Prix : 17 francs.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROPHYTE

Extrait total d'Orthosiphon stamineus.

Extrait total d'Humulus lupulus (Houblon).

Préparés par un procédé spécial, présentés sous forme de solution concentrée sucrée et aromatisée à l'orange.

Propriétés. — Diurétique végétal atoxique, ne contenant ni alcool, ni produit chimique.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, ou même plus suivant avis du médecin, diluées dans de l'eau. A prendre au moment des repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Ségur 79-58.)

DMELCOS

Stock-vaccin antichancrelleux.

Émulsion de bacilles de Ducrey (225 millions par cm^3), injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications. — **Traitement du Chancre mou et de ses complications : Bubon, Phagédénisme, Paralyse générale (pyrétothérapie).**

Présentations et mode d'emploi. — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Prix de vente

La boîte de 6 ampoules : 30 francs.

CUTI-DMELCOS. — Diagnostic du chancre mou par intradermoréaction. Ampoules de $\frac{1}{4}$ de cm^3 , titrées à 450 millions de germes par cm^3 . (boîtes de 5 ampoules).

Prix de vente :

La boîte : 10 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

Composition. — Carbono-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre, granulé et comprimés.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Œnophos.*

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Lactophosphite. Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récidive post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre <i>Doloma</i>	16 fr. 50
— granulé <i>Doloma</i>	18 fr.
— 10 ampoules <i>Doloma</i>	18 fr.
— 100 comprimés <i>Doloma</i>	18 fr. 50

Communications : à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer, juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Patriciens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à :

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

DOLOPHOS

Composition. — Anhydroinositophosphate de chaux et de magnésie, Chlorure de magnésium, Carbonate de manganèse, Carbonate de magnésie.

Mode d'action et avantages. — Le DOLOPHOS constitue un médicament d'ionisation magnésienne renforcée, de conservation parfaite, se présentant sous forme de granulé sucré agréable au goût.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales et hépatiques, déminéralisation et asthénie, arthritisme, tumeurs bénignes et malignes, prophylaxie du cancer, médication post-opératoire du cancer. Affections de la peau.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 3 cuillerées par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du DOLOPHOS

59-61, rue de Saint-Quentin — CAUDRY (Nord).

DOLOZYMES

Forme. — Cachets.

Acide Phénylcinchonique. — Acide Thymique. — Acide Acétyl-salicylique. — Soufre pur. — Poudre de Globulaire.

Indications thérapeutiques. — Rhumatismes musculaires et articulaires, Névralgies, Sciatique, Goutte, Maux de Reins, Lumbagos.

Mode d'emploi. — Un ou deux cachets avant les repas de midi ou du soir, dans une infusion chaude ou dans un verre d'eau sucrée alcaline.

Prix : 16 francs.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

DOLPYC

Thérapeutique, thermogène et révulsive.

Composition. — Alcaloïdes totaux de piments de solanées, Chloroforme, Essences de serpolet, lavande, thym, géranium.

Avantages. — Puissant révulsif et sédatif, d'odeur agréable, dont on peut aisément doser l'action. Ne détermine *aucune irritation de la peau*.

Indications et mode d'emploi. — Dans tous les cas où une révulsion est indiquée : Rhumatismes articulaire, aigu et chroniques, Sciatiques, Lumbagos, Points de côté, Pleurites, Entorses, Sequelles de fracture, Contusions.

Appliquer sur la région douloureuse une très légère couche de *Dolpyc* recouverte d'un carré de flanelle ou de coton cardé. Action renforcée par la chaleur humide (compresses chaudes).

Présentation et prix. — 11 francs le tube pour 20 applications environ.

Recommandation importante : Eviter le contact du *Dolpyc* avec les muqueuses et les parties sexuelles.

Laboratoires René KROTOFF

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 6196.)

DOLYSINE

Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.

1^o *Cachets.* — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50.
Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses. — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr.

2^o *Topique.* — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amylosalicylique en solution éthérée aromatisée. Badigeonnages suivis d'enveloppements.

Le flacon : 9 fr.

3^o *Pommade.* — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr.

Enreg. au Laboratoire N^{al} de contrôle N^o 1612-1-2-3.

M. ROCHEREAU, Pharmacien
ex-interne des Hôpitaux de Paris
SALBRIS (Loir-et-Cher).

DONAGOL

Chlorure de zinc électrolytique.

~~Spécifique~~ Spécifique gynécologique pour injections.

Indications. — *Affections gynécologiques* (Leucorrhée métrite du col, avec ou sans ulcération, Vaginite, Vulvite, Ulcérations néoplasiques du col, Infections gonococciques, Sécrétions fétides, Ecoulements mucopurulents).

Soins pré ou post partum. — *Hygiène intime journalière.*

Forme. — Comprimés dosés à 0,50 de ZnCl^2 pur.

Mode d'emploi. — 1 comprimé par litre d'injection (à prendre très chaude et en position couchée).

N. B. — Demandez-nous des échantillons de DONAGOL liquide (solution de ZnCl^2 à 45 p. 100) pour attouchements vaginaux, spécifique du traitement des Erosions et Ulcérations du Col. Bien sécher la lésion attouchée et ne pas laisser de tampon à demeure.

Prix très modique : 15 francs. la boîte de 48 comprimés.

Laboratoires du DONAGOL

PÉRONNE (Somme). — (Tél. : 32.)

DO.SA.NO.SAL

DOuce amère, **SA**ponaire, **NO**yer, **SAL**separeille.

Formule du D^r MARTIN DU THEIL

Forme. — *Granulé soluble.*

Composition. — Ce granulé contient par cuillerée à café : Extraits de douce-amère, 0 gr. 09696 ; de saponaire, 0 gr. 04848 ; de noyer, 0 gr. 07272 ; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

Propriétés. — Diaphorétique, diurétique.

Indications. — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

Doses habituelles. — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.

Prix : 19 fr. 80 pour 10 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

DOSURINE (TROUSSES)

LES EXAMENS D'URINES ET LE DOSAGE DES ÉLÉMENTS ANORMAUX (Sucre-Albumine)

sont grandement facilités par l'emploi des

« Trousse Dosurine »

qui assurent à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousse, sous la forme d'un petit livre facilement transportable, se présentent sous 3 modèles :

- 1° **Trousse Index** « *La Dosurine* » qui permet de décélérer la présence de l'Albumine ou du Sucre.
- 2° **Trousse A** « *La Dosurine* » destinée à doser l'Albumine contenue dans l'urine.
- 3° **Trousse D** « *La Dosurine* » destinée à doser la quantité de sucre (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 30 fr. (franco par poste : 31 fr. 50).

Ampoules de renouvellement :

La boîte de 10 : 12 fr. 50 (par poste, 13 fr. 80).

La boîte de 20 : 24 francs (par poste, 25 fr. 50).

Remise de 25 % à MM. les Docteurs.

Envoi franco notice sur demande.

LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS.

Chèques postaux n° 1352.39, Paris.

(Tél. : Archives 71-92.)

DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée.
4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

Avantages. — 1° Efficacité accrue par absorption *progressive*. 2° Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3° Tolérance parfaite de l'estomac.

Indications. — Toutes les indications du Chlorure de Calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme *re-calcifiant, antispasmodique, antianaphylactique*, contre les engelures, on préfère les *doses faibles* : 1 dragée au début de chaque repas avec une gorgée d'eau et une entre chaque repas (6 par jour), pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps.

Comme *hémostatique, antialbuminurique, déchlorurant, antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours.

Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

Prix : 16 francs la boîte.

DRAGÉCALCION GRANULÉ

Granulé de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosé à 0,25 par cuillerée à café : 2 cuill. à entremets = 1 gr. de chlorure de calcium.

Indications. — Pour les petits *enfants* et pour tous ceux qui ne peuvent avaler les dragées : toutes les indications du Chlorure de calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme ci-dessus : une cuill. à café = 1 dragée.

Prix : 16 francs la boîte.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 11-96.)

DRAGÉES BENQUÉ AU MENTHOL

Composition. — Mentho-cocaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne.)

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antisepsie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour, Laisser fondre dans la bouche.

Prix : 5 francs.

Laboratoire du Docteur BENQUÉ et fils
Pharmaciens
16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Flacons de 100 et de 50 *dragées*.

Composition. — Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques. — Épilepsie, Affections nerveuses.

Posologie. — Par dragée :

Kbr	1 gr.
Arsenic	1 milligr.
Picrotoxine	1/2 milligr.

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.
(Doses supplémentaires en cas de besoin.)

Littérature et échantillons sur demande.

Prix au public : Le flacon de 100 dragées : 21 fr. 50.

Laboratoire J. MOUSNIER-DELERME

Nouvelle adresse :

28, rue Velpéau — ANTONY (Seine).

(Tél. : 225.)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

Propriétés. — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 13 fr. 60.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus total..... 0,01 pour une dragée.

Spartéine..... 0,01 —

Caféine..... 0,06 —

Ext. de Scille..... 0,04 —

Propriétés thérapeutiques. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Laboratoire LE BRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-34.)

DRAGÉES LUMEVAL

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	} aa 0 gr. 03
— — Passiflore.....	
— — Cratægus.....	
Butylethylmalonylurée.....	

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 27-2.

Prix : 15 francs l'étui de 42 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

(Tél. : Roq. 49-22.)

Descouraux et Fils, Pharmaciens

Docteur en Pharmacie.

DRAGÉES

MANNET FERRO-ERGOTÉES

Composition :

Ergot de Seigle	5 cgr.
Fer	10 —

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoire MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

DRAGÉES **NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »**

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, du *surmenage intellectuel*, des *dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Formule B. Spéciale pour diabétiques.

Prix : 13 francs. ■

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, rue Louis-Blanc — PARIS (X^e).

DRAGÉLINES

Composition. — Graine de lin dragéifiée à l'Agar-Agar et à la Gomme Caraya, activée par le Diacétylisatine.

Propriétés thérapeutiques :

Cure émolliente et mucilagineuse des atonies intestinales. Constipations opiniâtres et post-opératoires.

Forme. — Petites dragées.

Mode d'emploi. — De une à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : le flacon 12 fr. 50.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

DRAGUROL

Diurogène Hépat-Rénal - Excréteur Azotémique

Composition. — Par cuillerée à café :

<i>Ext. fl. Orthosiphon</i>0.65	Extrait mou Artichaut...0,16
Extrait fl. Adonis Vernalis...0.25	Extrait mou s. am. Cascara 0.01
Formine Lambiotte0.20	Excipient aromatisé..... Q. S.

Action thérapeutique. — Provoque une Diurèse abondante, prompte. Draine et excrète tous déchets organiques (acide urique, urée, chlorures, cholestérine, etc.). Aseptise les états infectieux. Abaisse le taux d'urée sanguine. Stimule les fonctions hépatobiliaires. Nettoie le philtre urinaire et les voies biliaires. Accélère la nutrition. Normalise les fonctions hépat-entéro-rénales.

Indications. *Tous troubles du Métabolisme de l'eau d'origine rénale, hépat-rénale, cardio-rénale* (lithiasiques, congestifs ou infectieux) consécutifs à une crise aiguë ou nécessitant une cure de fond. *Azotémie* et symptômes, *Cardiopathies*, *Affections néphro-pyéliques*. *Oliguries*. *Albuminuric*. *Rétentions* (chlorurée, etc.). *Diathèse neuro-athritique*. *Toutes Lithiases*. — *Insuffisances hépatiques et biliaires* — Hépatisme infantile (action remarquable). Accidents cutanés par auto-intoxication.

Avantages. — Forme : *Liquide* (action rapide et sûre). Saveur agréable. Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Ni effets secondaires, ni contre-indications, n'irrite jamais.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau gazeuse sucrée ou non. — *Enfants* : 1/2 dose.

Prix : 15 francs le grand flacon.

Laboratoires du Siècle.

13, rue Boinod, PARIS (XVIII^e).

DRAINOBYL

du Docteur L. Lafay

Agent de drainage des voies biliaires. Synergie hépatophile de formule toute nouvelle. Pas de contre-indication.

Forme. — Granulé effervescent, soluble, de goût agréable (limonade).

Composition :

Catalyseur nickel	0,01
Catalyseur cobalt.....	0,01
Teintures de boldo, romarin, pissenlit, combretum,	5
Hexybrésorcine.....	0,03
Chlorétone	0,05
Salicylate de soude	6
Benzoate de soude	6
Bicarbonate de soude	10
Excipient. Q. S.....	100

Indications. — *Spécifique de la crise aiguë de coliques hépatiques. Traitement de toutes les carences hépatiques douloureuses ou non :*

Coliques hépatiques, Crises douloureuses du foie et des reins, Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiase, Ictère, Cholécystites, Insuffisances hépatiques ; foie des coloniaux, des paludéens, des amibiens, Insuffisance hépatorénale, tous les troubles d'origine hépatique.

Posologie. — *Adultes : 1° Crise aiguë de coliques hépatiques :* Tous les 1/4 d'heure, et jusqu'à cessation des douleurs, prendre deux bonnes cuillerées à café de DRAINOBYL dissoutes dans un demi-verre d'eau, se coucher un instant sur le côté droit.

2° Cholécystite chronique, congestion du foie, etc. : Prendre matin et soir, à jeun, 1 ou 2 bonnes cuillerées à café dissoutes dans un demi-verre d'eau.

Enfants : Donner à jeun, suivant l'âge, 1/4 à 1 cuillerée à café dissoute dans 1/4 de verre d'eau.

Durée d'une boîte : environ 10 jours de traitement.

Prix : 16 francs.

**Laboratoire du Docteur L. LAFAY
(LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens)**

54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence
PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 21-06.)

DRAINOL

Agent de drainage des voies biliaires.

Stimulant des fonctions hépatiques.

Sédatif des spasmes biliaires.

Désensibilisation.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur très agréable.

Composition :

Peptones de viande.....	2 gr. 500
— de poisson.....	0 gr. 500
— d'œuf.....	0 gr. 166
Extrait total de Jaborandi.....	0 gr. 333
Extrait sec d'artichaut.....	0 gr. 830
Chlorure de magnésium.....	0 gr. 333
Sulfate de magnésie P. C.....	16 gr.
Lactosérum.....	30 gr.
Pour 100 gr. de saccharure.	

Indications :

- 1° *Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires* : Insuffisance hépatique, Cholémie, Congestion du foie, Cirrhoses, Ictères, Lithiasse biliaire, Cholécystite chronique, Angiocholites.
- 2° *Troubles dyspeptiques d'origine hépatique* : Somnolences post-prandiales, Dyspepsies secondaires, Vertiges et nausées, Inappétence, Constipation.
- 3° *États anaphylactiques d'origine alimentaire* : Prurit et urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Rhume des foins, Asthme, Dermatoses.

Particularités. — Le plus actif et le plus doux des médicaments de drainage biliaire, parce que sans action drastique sur l'intestin. Par son *Jaborandi*, évite toute réaction violente. Par son *Lactosérum*, agit à la fois sur l'évacuation biliaire et sur la diurèse.

Posologie :

Adultes : Le matin, à jeun, une demi-heure avant toute alimentation, deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède. Cette dose peut être portée, suivant indication médicale, jusqu'à 4 et 6 cuillerées à café.

Enfants : demi-dose ou quart de dose selon l'âge.

Prix : 18 francs

Traitement de 20 jours, soit 2 cures.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Pharmacien.

95, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 90-60.)

DRINAL

Cachets. Comprimés.

Composition :

<i>Pour</i> <i>1 cachet :</i>	{	Aspirine	0,30
		Pyramidon	0,10
		Phénacétine.....	0,10
		Caféine	0,05
		Poudre de Dower.....	0,03
<i>Pour</i> <i>1 comprimé :</i>	{	Poudre d'aconit.....	0,005
		Carb. de chaux	0,10
		Aspirine.....	0,30
		Acétanilide	0,10
		Caféine	0,05
		Phényléthylmalonylurée...	0,10

Indications et doses. — *Cachets* (en boîte de 10) : Grippe, fièvre, rhumatismes, etc., 2 à 4 par jour.
Comprimés (en tube de 15) : Névralgies, migraines, douleurs, maux de dents, etc., 2 à 4 par jour.
 Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1082-1.

A. MIRONNEAU, pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18.)

DROSOL

Gouttes.

Composition. — Drosera, Grindelia, Lobélie, Terpène, aromatisées à l'orange.

Indications. — Coqueluche, toux rebelle, asthme, bronchites, gripes, laryngites, trachéites, toux spasmodique.

Mode d'emploi. — Prendre *loin des repas* (1 heure avant ou 2 heures après).

Posologie :

Nourrissons : II à X gouttes, trois fois par jour.

Enfants : XV à L gouttes, — — — —

Adultes : LX gouttes et plus, — — — —

Coqueluche : mêmes doses, mais augmenter d'une goutte par prise, tous les jours, le deuxième jour de traitement.

Ne pas dépasser 100 gouttes pour les nourrissons et 200 gouttes pour les enfants, par jour.

Prix : 13 francs.

Laboratoires JEAN BOUTES

rue Clément-Ader — MURET (Haute-Garonne).

DRYCO

Lait sec. — Activé par les rayons ultra-violet.

Analyse approximative :

Matières grasses	12 p. 100.
Sucre de lait	46 —
Matières azotées.....	32 —
Sels	7 —
Eau	3 —

Indications. — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

Pour nourrissons : digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

Pour adultes : régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

Doses. — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée (6 à 7 gr.) et 50 gr. d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Prix : 5, 14 et 56 francs.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 59-09.)

DUNA-CAINOL

Pommade sédative.

Principe Actif. — *Duna-Caine L. P.*

Excipient. — Constitué par une graisse animale à pénétration rapide et intégrale, dépourvue de toute action irritante.

Indications. — Pommade sédative des douleurs de la peau et des muqueuses : prurit anal et vaginal, prurit sénile, prurit diabétique, hémorroïdes, brûlures, urticaire, zona, radiodermite, plaies cancéreuses, algies, démangeaisons.

Contre-indication. — Eczémas évolutifs et toutes affections dermatologiques non justiciables d'un traitement par les anesthésiques.

Mode d'emplo. — *S'il y a plaie*, appliquer une compresse enduite de *Duna-Cainol*.

S'il n'y a pas plaie, onction plus ou moins prolongée avec le *Duna-Cainol* et laisser en place une compresse enduite de pommade.

Prix : 12 francs.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

DYNAMINE CONNAT

Forme : Elixir.

Indications. — Asthénie, Neurasthénie, Amaigrissement, Convalescence.

Formule :

Glycérophosphate sodique	0 285
Nucléinophosphate sodique	0 20
Méthylarsinate sodique	0 17
Strychnos vomica ext.	0 003

Pour 100 gr.

Posologie. — Un verre à liqueur avant les repas.

DYNAMINE CONNAT S. A.

Formule sans arrhénal.

Préparation très agréable au goût.

Prix : 16 francs.

Laboratoires M. FOLLIET
RUMILLY (Haute-Savoie).

DYNAMOGÉNINE du Docteur Chaboud.

Extrait Fluide Américain.

Composition :

Quinquinas, 11 gr. ; Kola 8 gr. 8 ; Noix vomiques, 1 gr. 55 ; Arrhénal, 0 gr. 12 ; Acide orthophosphorique, 0 gr. 12 ; Cannelle, 0 gr. 33 ; Vanille, 0 gr. 12 ; Cacao, 0 gr. 75 ;
pour 100 cc. de véhicule (alcool à 60° et glycérine).

Propriétés. — Tonique énergique, Puissant fortifiant, Régénérateur puissant du sang et des muscles.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage, Neurasthénie, Convalescence de maladies graves (gripes, bronchite, pneumonies, etc.), suites de couches, pré-tuberculose, faiblesse générale, manque d'appétit.

Posologie. — Un quart d'heure avant chacun des deux principaux repas, dans la valeur d'un verre à bordeaux de vin sucré ou d'eau sucrée :

Adultes : Une cuillerée à café.

Enfants, au-dessus de 8 ans : 1/2 dose.

Suspendre pendant une dizaine de jours entre chaque flacon.

Durée. — La cure normale est de trois flacons. Le flacon dure dix jours environ. Prix : le flacon 15 francs.

(Peut être prescrit aux assurés sociaux).

Laboratoires de la DYNAMOGÉNINE

Boîte postale 33.

AIX-LES-BAINS (Savoie).

DYNOSTHÈNE

Comprimés.

La cure magnésienne rationnellement conduite par adjonction d'un complexe polyminéralisé équilibré et assimilable.

Indications. — Tous les états de carence magnésienne.

1° Syndromes neuro-dépressifs (Psychasthénie ; surmenage intellectuel, débilité génitale).

2° Convalescence des maladies infectieuses asthéniantes (grippe, fièvre typhoïde, etc.).

3° Atonie digestive ; constipation atonique.

4° Prophylaxie du cancer ; prévention des récives post-opératoires.

Composition. — Complexe *phospho-magnésien* polyminéralisé.

(Chl. de Magn. Magnésie calcinée, Glycéroph. de Magnésie, Glycéroph. de Ca., Phosphore organique, Nucléinate de fer et Manganèse.

Forme et Posologie. — 1 boîte de 45 comprimés.

2 à 5 comprimés par jour avant ou pendant les repas, de préférence le matin et à midi.

Traitement. — Ininterrompu pendant quelques semaines (aucun inconvénient à être continué pendant plusieurs mois).

Adjuvant des cures thermales (Vichy, Vittel, etc...)

aucune Aucune contre-indication.

Prix : 17 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Ph^e. 183, rue de Rome — MARSEILLE.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du D^r HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

Laboratoire

de Physiologie du PUIITS-d'ANGLE

Le Puits-d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

Dépôt pour la France :

Laboratoires CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Représentant pour la Belgique :

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES.

DYSPNÉ-INHAL

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foin, Coryza spasmodique, Rhinite, Obstruction nasale.

Composition. — Solution pour pulvérisation buccale d'adrénaline stabilisée et activée à dose infinitésimale.

Avantages. — Supprime toute crise, même violente en quelques secondes. Supprime les piqûres. Innocuité permettant l'application aux jeunes enfants.

Mode d'emploi. — Quelques gouttes dans l'atomiseur spécial de poche. Au moment de la crise faire une pulvérisation dans la bouche en aspirant. La crise cesse instantanément.

Prix : Pulvérisateur : 35 francs.

Liquide (pour 2 mois) : 15 francs.

Prix spécial au médecin pour usage personnel.

A. FOURTON, Docteur en Pharmacie

38, rue du 11-Novembre

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).

(Tél. : 1-21.)

DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.

Indications. — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

1^o Forme gouttes :

Emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois, aux repas, dans un peu d'eau.

Vieillards : XXX gouttes au total par jour.

Enfants : de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— — 12 à 16 ans : XII — —

— — 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

2^o Forme élixir :

Emploi et doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe à chacun des repas de midi et du soir.

Vieillards : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : de 16 à 18 ans : 1 cuillerée à café. Au-dessous de cet âge, prendre uniquement le DYSTHÈNE-GOUTTES.

L'élixir peut être absorbé pur ou partie égale d'eau.

Prix : 17 francs.

Durée moyenne : 15 à 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine). (Tél. : Grésillons 00-15.)

DYSTONINE

(Comprimés.)

Composition. — Chaque comprimé renferme:

Ethyl-phényl-malonyl-urée	0,01
Extrait de <i>Cratægus</i>	0,05
Bromure de Calcium	0,10
Poudre de Parathyroïdes.....	0,0003

Propriétés. — Sédatif et Régulateur des troubles neuro-végétatifs, cardio-tonique, antispasmodique.

Indications. — Tous troubles et dérèglements du système vago-sympathique, Emotivité, Anxiété, Nervosité, Angoisse, Dépressions, Insomnies. — **Aérophagie**, Dyspepsies nerveuses, Entérocolites spasmodiques, Spasmes cardio-vasculaires. — Angor, Troubles endocriniens.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour de préférence avant les repas.

Prix : 15 francs la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires CHATRON

45, rue Cambronne — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-79.)

EAUX-MÈRES

Eaux chlorurées, bromoiodurées, sodiques et magnésiennes. Un litre d'eau contient 322 grammes de sels provenant de la concentration des eaux salées naturelles par la chaleur après extraction de la majeure partie du chlorure de sodium et conservant dans de fortes proportions des chlorure de potassium, sulfate de sodium, sulfate de magnésium, sulfate de calcium, chlorure de calcium, carbonate de calcium, silicate de sodium.

Indications. — 1^o Maladies de l'enfance : lymphatisme, scrofule, rachitisme, scoliose, séquelles de paralysie infantile, anémie ;

2^o Maladies de la femme : aménorrhée, dysménorrhée, fibrome utérin, métrite, salpingite, ovarite.

Contre-indications : tuberculose pulmonaire, affections organiques du cœur, néphrite chronique, maladies aiguës et affections cancéreuses.

Présentation et prix. — 1^o Sels pour bains et paquets de 2 kilogs : 9 fr. 20 ;

2^o Eaux-mères pour bains et irrigations vaginales, compresses pansements, en bouteille de 1 litre, environ : 5 francs ;

3^o Eaux-mères concentrées pour injections vaginales, en boîte de 6 ampoules de 20 cc., stérilisées : 18 francs.

Établissement Thermal

DE SALIES-DU-SALAT (Haute-Garonne).

ECZÉDA

Ichtyosalicylé.

Pommade polyréductrice, doit à son excipient spécialement étudié :

Son grand pouvoir absorbant.

Ses qualités d'épidermisation.

Ses propriétés antitoxiques.

Indications. — *Dermatoses suintantes et prurigineuses* : Eczémas sous ses différentes formes ; Érythèmes, Prurits ; Eczéma et Érythème fessier des nourrissons — *Brûlures. Engelures. Plaies.*

Prix : 9 francs.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux
PARIS (IV^e). Tél. : Arch. 69-03.

ECZOSEC PORCHER

Pâte adhésive sans corps gras. Sèche rapidement.
Ne tâche pas. S'enlève à l'eau.

Véritable pansement dermatologique ne nécessitant l'emploi ni de bandes, ni de gaze, ni de poudre.
Protège la peau et permet la perspiration.

Mode d'emploi. — Etendre en couche mince mais homogène, et laisser sécher simplement. Ne jamais mettre de pansement, ni poudrer. Renouveler chaque jour l'application après avoir enlevé la couche précédente soit avec un tampon d'ouate imbibé d'eau, soit avec de l'huile.

Indications. — *Eczémas secs. Dermites, Prurits. Pré-servatif et curatif des différentes formes d'Erythèmes : Erythèmes solaires, Erythèmes des nourrissons*
Erythèmes provoqués par le vent, les reflets de la neige, les piqûres d'insectes.

Dans les *Dermatoses suintantes*, complément de l'*Eczéda* comme pansement de jour.

Eczosecs spéciaux : *Ichtyolé (Dermites eczémateuses). Benzoïque (Dysidroses parasitaires). Sulfocamphré (Affections acnéiques).*
Prix : 14 francs.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV°).

Tél. : Arch. 69-03.

ÉDISTOL

Composition. — Acide borique, tartrique, citrique ; menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol, pinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antisepsie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Échantillon sur demande.

Prix : G. M., 13 fr. ; P. M., 8 fr. 75.

Laboratoire de l'ÉDISTOL

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,

Anc. interne des hôp. de Paris,

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). Tél. : 21-28.

EDRICAMPHRE

Forme pharmaceutique et composition. — Ampoules de 2 cc. de solution aqueuse correspondant à 2 cgr. d'*Ephédrine naturelle* et 20 cgr. de *Camphre*. (Boîte de 5 ampoules.)

Propriétés et avantages. — L'EDRICAMPHRE est le médicament type de la *défaillance du cœur périphérique*. Facilité de l'injection sous-cutanée. Indolence absolue, diffusion et absorption rapide. Pas de rétention ni d'abcédation.

Indications thérapeutiques. — Tous états *hypotensifs* (choc toxique, infectieux ou traumatique).

Avant, pendant et après les *interventions chirurgicales*.

Accidents sériques et post-opératoires.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 ampoules par jour en injections *sous-cutanées* ou intramusculaires.

Prescription. — 1 boîte ampoules EDRICAMPHRE FALVY.

L'EDRICAMPHRE existe également sous la forme *gouttes* (même composition) pour instillations et pulvérisations nasales et pour l'usage interne (XX à XL gouttes 3 à 5 fois par jour) dans l'asthme, le coryza spasmodique et les états allergiques.

Prix : 18 francs.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

ÉDUCTYL

Suppositoire antidyschésique « sui generis ».

Mode d'action. — Dégagement lent dans le rectum de gaz carbonique (méthode du Professeur Ch. Glaesner), ce qui déclenche promptement le réflexe dilatateur.

Avantages particuliers. — 1° Remplace les purgatifs et les lavements ; 2° Ménage le tube digestif ; 3° Emploi propre et aisé.

Indications. — Toutes formes de constipation rectale ou rectosigmoïdienne, surtout chez les dyschésiques habituels, les hémorroïdaires, les congestifs pelviens, et chez les constipés occasionnels : infectieux, opérés, parturientes, malades alités de tout ordre.

Posologie. — Un suppositoire au moment voulu ; un deuxième une demi-heure après dans les cas opiniâtres.

Boîtes de 6	7 fr.
— de 12	12 fr. 50
— de 25	22 fr. 50

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

EFFLOZONE LABOCIP

L'oxygénothérapie Intégrale à la disposition du médecin.

Solution oxygénifère agissant par libération *lente* de 2 volumes d'O. atomique.

Composition :

Ozonide de terpènes	4, 00	{ pour 100 grammes d'eau distillée.
Chlorure de sodium.....	0; 50	

Caractéristiques. — L'Efflozone Labocip est une solution aqueuse isotonique d'ozonide terpénique stabilisé, exempt d'alcool, saturé d'oxygène ionisé, se dégageant extrêmement *lentement* par simple dissociation moléculaire à la température de 37°.

Aucune formation de composés de substitution ou produits de combinaison toujours toxique, caustique, irritant et congestionnant.

Par conséquent, aucun parallèle possible avec les autres antiseptiques, l'eau oxygénée, tous les persulfates et peroxydes en particulier.

Action thérapeutique: Antiseptique, décongestionnant, désodorisant, cicatrisant.

Présentation et Posologie. — 1° *Solution pour usage externe:*

- Angines microbiennes, affections stomatologiques, antiseptie et cicatrisation rapide après extractions dentaires (une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède en gargarismes ou bains de bouche).
- Action antiseptique dans les affections O. R. L.
- Désinfection des plaies, ulcères (une cuillerée dans 1/2 litre d'eau).
- Affections gynécologiques (injections lentes d'un litre d'eau tiède additionné de 2 à 3 cuillerées à soupe et en tamponnements pur ou dilué à 50 p. 100).

Prix: 15 francs le flacon de 250 cc.

2° *Solution spéciale pour usage interne:*

- Désinfectant remarquable du trajet digestif.
- Modificateur des échanges nutritifs, régularisateur de l'équilibre vago-sympathique et du pH, éliminateur des déchets par combustion accélérée (apport d'O. atomique combinable, suivi d'une notable augmentation de décharge azotée).

Troubles digestifs: Maladies de la nutrition, arthritisme, diabète, amaigrissement dû à un défaut d'assimilation, asthme (X à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée 1/4 d'heure au moins avant les repas).

Prix: 15 francs le flacon pour traitement de 25 jours environ.

3° *Forme injectable (Ampoules de 2 cc.).*

En injections intramusculaires profondes.

Mêmes indications que pour la forme interne, mais offrant l'avantage d'une action plus énergique et plus rapide. En outre, pneumonie, broncho-pneumonie, pré-tuberculose.

Prix: 20 francs la boîte de 12 ampoules d'Efflozone Labocip et de 12 ampoules d'eau bidistillée à mélanger dans la seringue extemporanément.

Tous échantillons sur demande.

Laboratoire de l'EFFLOZONE LABOCIP

René CERBELAUD, Docteur en Pharmacie, Ancien interne de :
Hôpitaux de Paris.

82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 16-66).

EGIDOL

Vaccin polyvalent en comprimés.

Entérites, colibacilluries, Staphylococcies.

Mode d'emploi. — Un comprimé à chaque repas, quinze jours par mois.

Prix de la boîte de 30 comprimés :
12 francs.

DURSENT, Pharmacien

74, rue Blanche — PARIS (IX^e).

EKTAL

Formes. — Granulé et comprimé.

Formule. — Peptone viande, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, fluorure de magnésium, tartrate de potasse et de soude.

Indications. — Congestions du foie et de la vésicule, cholécystite chronique, syndrome entéro-hépatique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de granulé ou 5 comprimés le matin à jeun

Prix : 15 francs.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Mon. 33-86.)

EKTOGAN-BOCQUILLON

A base d'un peroxyde de zinc spécialement préparé, dont la partie active a pour formule $2 (Zn^+ C^{12} O^{16} H^{32})$, l'Ektogan-Bocquillon dégage d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc...).

Indications. — Chirurgie, Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Obstétrique, Gynécologie, Soins des nouveau-nés.

EKTOGAN-POUDRE pour désinfection, désodorisation et cicatrisation, avec action desséchante de toute plaie. Traitement de l'Hyperhidrose.

Prix : le flacon poudreur : 15 francs.

EKTOGAN-POMMADE pour cicatrisation et traitement des dermatoses et brûlures.

Prix : le tube : 13 fr. 50.

Pansements à l'**EKTOGAN** : gaze, mèches (largeur 1 cm., 2 cm. 5 et 5 cm.), ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux.

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX
12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Trudaine 09-64.)

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine carbonique.

Indications. — Rhumatismes musculaires ou articulaires, aigus ou chroniques, goutte, sciatique, lumbago, etc.

Mode d'emploi. — 4 cachets par jour (2 avant chaque repas) pendant 4 jours.
Repos 4 jours.

Présentation :

Boîte. G. M. de 32 cachets dosés à 0 gr. 20 : 16 fr.

Boîte. P. M. de 16 cachets dosés à 0 gr. 20 : 8 fr. 50.

Durée moyenne des unités vente :

G. M. : 12 jours. — P. M. : 4 jours.

Laboratoires de Biochimie médicale.

CH. DESGREZ

Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ÉLASTOPLASTE

Forme essentielle. — Bandes de 1 et 2 m. 1/2 de long et de 3 à 30 centimètres de large.

Composition. — Sparadrap adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre crêpe) et d'une masse adhésive au ZnO.

Formule A : Entièrement enduite (occlusive).

Formule B : Partiellement enduite.

Formule C : Ajourée.

Formule S : Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

Indications :

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs).

Extensions continues (formule A ou B : 2 m. 1/2 × 6 et 8 cm).

Traitements des ulcères variqueux (formule A : 2 m. 1/2 × 8 cm).

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m. 1/2 × 3 cm)

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

Autres présentations :

Elastodoigts : noir ou chair.

Elastoplaies : existe en 4 × 4 cm. — 6 × 4 cm — 6 × 6 cm, etc...

Sparalsa : Pansement élastique en largeur, portant une compresse au Dermatol dans le sens de la longueur; existe en 4, 6 et 8 cm. de large.

Elastovaccin : Protecteur après vaccination.

Elasto-yeux : S'adapte à la forme de la tête.

Elastocapsil : Emplâtre élastique au Capsicum.

Elastofuron : Emplâtre au Vigo, élastique et poreux.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence 104, Frg Poissonnière — PARIS (X^e). (Tél. : Lamartine 92-52.)

ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège.

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphyseme, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Prix : le flacon 10 francs.

L. N. C. n° 474-3.

Laboratoire FAGARD

44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 07-05.)

ÉLECTRARGOL

Composition. — Argent colloïdal électrique à petits grains, isotonique et stabilisé, titrant 0,40 0/00.

Propriétés. — Antimicrobien, leucocytogénétique, sans toxicité
Anti-infectieux polyvalent local et général.

Indications. — Septicémies, Pneumopathies graves, pleurésies, méningites aiguës, maladies générales, infectieuses, suppurations et infections en chirurgie générale, urologie, gynécologie et obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

Forme et mode d'emploi.

1° *Ampoules* : de 1, 2, 5, 10, 25 cc., pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Doses variables suivant la gravité des cas : de 5 à 50 cc. et plus par jour.

2° *Ampoules compte-gouttes stérilisées* de 25 cc., pour instillations nasales et oculaires.

3° *Ampoule* de remplissage du flacon compte-gouttes.

4° *Flacons stérilisés* de 50, 100, 250 cc., pour pansements, lavages, injections locales.

5° *Pommade* : Tubes de 30 grammes.

6° *Ovules* : Boîtes de 6 ovules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ELGINE JULIEN

Comprimés.

Composition :

Collargol argent colloïdal 0,05 cent.

Benzoate de soude 0,40 —

Formine..... 0,20 —

En comprimés glutinisés.

Indications. — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion.

Prix : 12 fr. 50. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris,

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 80-76.

ÉLIPOL

Principe actif. — Dinitro 4—6--0--Crésol chimiquement pur.

Indications. — Embonpoint, obésités, oreximanie, sédentarité, ralentissements de la nutrition.

Forme. — Comprimés glutinisés.

Doses. — 1 comprimé par fraction de 10 kg. de poids, soit :

De 70 à 80 kg	7 comprimés.
De 80 à 90 kg	8 —
De 90 à 100 kg	9 —
100 kg. et au-dessus	10 —

(dose quotidienne usuelle.)

Prix : 16 francs la boîte de 70 comprimés.

60 francs la boîte de 350 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
Tél. 32.

ÉLIXIR BONJEAN

Composition. — Éther et plantes aromatiques.

Mode d'action. — Tonique puissant des voies digestives.

Indications. — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

Enfants : Demi-dose.

Prix :

Le flacon : 17 fr. Le demi-flacon : 9 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL
Pharmaciens de 1^{re} classe
AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

ÉLIXIR DÉRET

Composition. — Solution vineuse d'iodure double de tanin et de mercure (0 gr. 0275 d'iode et 0 gr. 005 de Hg par cuillerée à soupe).

Propriétés. — Absence d'accidents d'hydrargyrisme grâce à la présence du tanin ; innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhées).

Indications. — Antisypilitique doux, convenant aux personnes qui ne peuvent supporter un traitement mercuriel ou arsenical interne. Particulièrement recommandé chez les enfants.

Traitement d'entretien de la syphilis et de l'hérédo-syphilis par voie buccale chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes.

A ses propriétés d'agent thérapeutique mercuriel, l'Elixir Déret ajoute celle d'être un *tonique* actif.

Posologie:

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

A prendre en deux fois, dans un verre à liqueur gradué, pour éviter la réaction qui se produirait sur le métal de la cuiller, doses pouvant être doublées en cas de besoin.

Forme. — Flacons de 300 cc.

Permet le traitement d'entretien dissimulé.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉLIXIR DUCHAMP

Assurances Sociales. Accepté par la Commission.




Composition. — Extrait d'eaux de Foie de Morue, Quinquina, Arrhénal et Phosphates, Cacao vanillé.

Propriétés thérapeutiques. — D'un goût exquis, apéritif puissant, tonique, reconstituant et hématopoïétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

Indications. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle, Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence, Lymphatisme, Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 22 fr. le flacon de 350 cc.

Laboratoires C^{te} RENÉ de GRAUWE,   
Pharmacien de 1^{re} classe.

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

ÉLIXIR DUCRO

Agent dynamique aux oranges amères et phosphore assimilable.

Tonique *antianorexique* très agréable : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuillerée à soupe ou 1 verre à liqueur, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

Eupeptique, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action d'*épargne* : pneumonie, grippe, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuillerée à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les 2 heures.

Prix : le flacon, 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-2.

DURIEZ

20, place des Vosges. — PARIS

ÉLIXIR DU DOCTEUR MIALHE

Pepsine ou pancréatine.

Préparation. — Suc gastrique ou pancréatique complet. Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années. (*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique ou pancréatique fait défaut : Dyspepsies, Douleurs nerveuses, Digestions lentes et difficiles, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur immédiatement après le repas.

Demi-dose pour les enfants.

Conservation : 5 années.

Contenance 250 cmc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart. — PARIS (2^e). Tél. : Rich. 35-10.

ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.

Aliment complet de surassimilation.

Composition. — Pepsine, diastase, pancréatine, *en milieu alcalin* de lactates et de sels de Vichy.

Propriétés. — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses; émulsionne et saponifie les corps gras.

Indications. — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait des fonctions intestinales*, combat la constipation et la diarrhée, même chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence : anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactie.

Mode d'emploi. — 1° *Premier âge* : 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée). — 2° *Enfants* : 2 ou 3 demi-verres à liqueur. — 3° *Adultes* : 4 à 5 verres à liqueur.

Par jour et après le repas ou les tétées.

Prix du flacon :

A Marseille : 15 fr. — Hors Marseille : 18 fr.

Laboratoire de l'ÉLIXIR DUSSAUD

1, rue Fondère — MARSEILLE.

ÉLIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérapeutiques. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début ou à la fin de chaque repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68 10)

ÉLIXIR GODFRIN

Formule. — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ; Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégorique, 12 gr. : Sirop de cachou, 40 gr. pour 125 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Antidysentérique, astringent, sédatif.

Indications. — Diarrhées de toute nature, Entérites et entéro-colites, Dysenteries amibiennes et bacillaires.

Mode d'emploi. — *Cas aigus.* — Prendre toutes les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. — *Enfants de plus de 10 ans* : 1 cuillerée à dessert. — *Enfants de 6 à 10 ans* : 1 cuillerée à café. Ne pas donner au-dessous de 6 ans.

Cas chroniques. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, loin des repas.

Prix : 8 francs.

H. PERIGNON, Pharmacien de 1^{re} classe.

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 117-1.
(Tél. : Gravelle 20-50.)

ÉLIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'insuffisance *gastrique* dans toutes les formes de l'*Hypochlorhydrie*.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Indications. — Insuffisances gastriques, Hypochlorhydrie, *Aérophagie*, Régime déchloruré, Vomissements de la grossesse et de la tuberculose, Gastro-entérites, Ptoses gastriques, Inappétence, etc...

Posologie. — Un verre à liqueur pur ou coupé d'eau, après chaque repas.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 37-45.)

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,007 Bi-iodure de mercure. — 0,075 Iodure de potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un *goût très agréable*, et une parfaite *tolérance* pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

ÉLIXIR MANNET FERRO-ERGOTÉ

Composition :

Ergot de Seigle 5 cgr.

Fer..... 10 —

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

ÉLIXIR RODI

Traitement arsenico-mercuriel dissimulé.

Formule. — Contient par cuillerée à soupe :

Iodure d'arsenic.....	0,005
Iodure d'Hg	0,01
Iodure de K	0,25

Dans un véhicule de goût agréable, « non alcoolisé ».

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au milieu des 2 principaux repas dans un peu d'eau.

Enfants (très bonne tolérance) : 1 cuillerée à café par jour en 2 fois pour les nourrissons.

Ensuite, 1 cuillerée à café par 3 ans d'âge.

Indications :

Traitement complémentaire et d'entretien de la S. acquise ; traitement facile de la S. héréditaire des enfants ; traitement efficace des S. tertiaires grâce à la présence d'iodures ; traitement dissimulé (Dépuratif tri-iodé) de toutes les formes : S. conjugale, cas douteux, traitement discret dans les affections évoluant sur terrain syphilitique ou hérédo-syphilitique (dermatoses, eczéma, ulcères variqueux, incontinence d'urine, migraines, épilepsie, rhumatismes, etc.).

Se prescrit généralement par cure de 20 jours (2 flacons) tous les 3 mois.

Prix : 18 francs.

Laboratoires FABIOW

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85.)

ÉLIXIR SPES DU D^r GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Composition de l'Elixir. — Iodure double d'Arsenic et de Mercure. Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au **Sirop de Gibert**.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

l.....	0,008	} correspondant à {	0,01 Biiodure Hg.
Hg.....	0,003		
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

Indications. — *Syphilis et Hérédo-syphilis.* Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses :

{	<i>Nourrissons :</i> 1 demi-cuillerée à café par jour.
	<i>De 1 à 3 ans :</i> 2 demi-cuillerées à café par jour.
	<i>De 3 à 7 ans :</i> 2 cuillerées à café par jour.
	<i>De 7 à 15 ans :</i> 2 cuillerées à dessert par jour.
	<i>De 15 à 20 ans :</i> 3 cuillerées à dessert par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du **verre gradué** qui accompagne chaque flacon.

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'**Elixir Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 18 francs.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Mareadet 37-98.)

ELKIN (Dragées, Granules).

Bile, Soufre, Pancréatine.

Sans aucun drastique.

Indications thérapeutiques. — **Digestions incomplètes**, Somnolence, Ballonnement, **Douleurs Post-Prandiales**, Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire, Insuffisance pancréatique, Dermatoses hémoclasiques, Rougeurs de la face, Urticaire, Eczéma, Acné juvénile.

Présentation et Posologie. — Pour les **Adultes**: Forme **dragées** (à 0,05 par pilule dragéifiée), une ou deux pendant ou après les deux principaux repas. (Avaler sans croquer.)

Pour les **Enfants**: forme **granules** (à 0,01 par granule), deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert : compote, confitures, etc.).

La boîte de 40 dragées ou 60 granules : 15 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07).

EMBROCAN (O. C. P.)

L'embrocation au tiers d'essence de térébenthine pure sans aucune addition de rubéfiant.

Composition. — Essence de térébenthine pure, une partie. — Savon liquide, 2 parties. Ne dessèche pas l'épiderme comme la solution alcoolique, ne rancit pas comme la solution huileuse. Massage, frictions, applications.

Aussi agréable à employer qu'un Cold-Cream.

Prix : 12 fr. 50.

Nous délivrons également, sous le nom de *Térébane*, l'Essence de térébenthine pour dilutions aqueuses. Solution limpide se mélangeant à l'eau en toutes proportions. Echantillon sur demande.

Laboratoire SAPORTA

59, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 02-27.

EMBRYHORMONE

Cure de Revitalisation.

Forme. — Ampoules buvables de 10 cc.

Composition. — Association d'extrait d'embryon de poulet et d'hormones désalbuminées et concentrées d'extrait hépatique de glandes surrénales, de glande thyroïde, de glande interstitielle en solution phosphorique et catalysée par le chlorure de zinc et de manganèse.

Propriétés. — Chez les personnes âgées, améliore la capacité de travail physique et intellectuel. Recommandé dans tous les cas d'Euphorie, dans toutes déficiences organiques, déséquilibre nerveux, troubles endocriniens, troubles du sympathique, Déphosphorisation, anémie, surmenage, fatigue cérébrale.

Mode d'emploi. — Une ampoule par jour, dix jours par mois.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 403-49.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

EMBRYOCHOC

Composition. — Extrait d'embryons de poulets desséchés, parfaitement toléré, de conservation pratiquement indéfinie.

Indications. — 1° A titre **préventif**, pour prévenir l'état de choc.

2° Dans tous les cas où l'opéré est en état de « choc ».

Posologie. — Ampoules d'extrait sec, soluble, à administrer :

a. Par voie buccale : à l'état sec, c'est-à-dire tel quel ou dilué dans un peu d'eau.

b. Par voie rectale, en suspension dans 200 cc. sérum hypertonique ou physiologique (salé ou sucré).

1° *S'il s'agit d'une intervention bénigne, chez un malade en bon état et dont les examens sont normaux :*

Dans la soirée qui suit l'opération, une ampoule que l'on fait prendre en deux fois, à une demi-heure d'intervalle, soit par voie buccale ou rectale, ou sous les deux formes associées.

2° *S'il s'agit d'une opération grave que l'on prévoit être de longue durée, traumatisante :*

Le matin qui précède l'opération, une ampoule comme ci-dessus : le soir qui suit l'opération, en lavement, avec du sérum hypertonique, une seconde ampoule.

Aucune contre-indication.

Déposé au Laboratoire du Contrôle des Médicaments sous le n° 1303-2.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin, Paris (IV°).

Tél. : Turbigo 40-83.

EMBRYOCYTOL

Comprimés renfermant la totalité des produits organiques et minéraux de l'embryon de poulet.

Embryothérapie des cas légers. Cure complémentaire de l'*Embryol*.

Indications. — Toutes les déficiences organiques. Troubles endocriniens. Dépression nerveuse. Fatigue. Inappétence. Amaigrissement. Convalescence. Sénilité précoce.

Posologie. — 6 comprimés par jour, deux avant chaque repas. Demi-dose pour les enfants jusqu'à 10 ans (avaler sans croquer).

Prix du flacon de 42 comprimés de 50 cgr. : 18 francs. Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 783-10.

Laboratoire de l'EMBRYOL

32, rue Desrenaudes — PARIS (XVII°).

Tél. : Galvani 63-29. Adr. tél. : Embryol-Paris.

EMBRYOL

Méthode de Carrel pour la culture des tissus « in vitro » adaptée à la thérapeutique humaine.

Jus embryonnaire *fruits* d'embryons de poulet renfermant l'hormone stimulante à l'état vivant.

EMBRYOL BUVABLE

Boîte de 10 amp. 5 cc. (1 unité-embryon par amp.) Prix : 48 fr.

Adultes : 2 amp. par jour dans eau froide 1/4 d'heure avant repas.

Enfants jusqu'à dix ans : Demi-dose.

Opérés : voie rectale, 3 doses de 5 amp. dans 30 cc. sérum physiologique (matin opération, 1 heure et 4 heures après).

EMBRYOL INJECTABLE (Décret n° 92 du 23/12/1936).

Boîte de 5 injections intramusculaires de 10 cc. Prix : 35 fr.

Adultes et enfants : Pour déficiences organiques et endocriniennes : série de 10 injections (1 inj. par jour). Pour maladies anaphylactiques : série de 15 injections (1 inj. tous les 2 jours).

Nourrissons : Demi-dose.

Indications de ces 2 formes : Déficiences organiques : anémies, asthénies, déséquilibre nerveux, troubles endocriniens et sympathiques, insuffisance du myocarde, convalescence, choc opératoire, maladies anaphylactiques.

Pour cure complémentaire : prendre **Embryocytol**.

EMBRYOL PANSEMENTS :

Boîte de 3 amp. de 10 cc. (2 unités-embryon par amp.) Prix : 30 francs.

Indications. — Plaies atones, ulcères.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous les nos 783-5.9.7.

Laboratoire de l'EMBRYOL

32, rue Desrenaudes — PARIS (17°)

Tél. Galvani 63-29. — Adr. tél. : Embryol-Paris.

EMBRYOTONYL

Composition :

Extrait d'embryons de poulet desséchés, parfaitement toléré, de conservation pratiquement indéfinie.

L'EMBRYOTONYL, extrait d'organes embryonnaires frais, d'âge fœtal identique, a donc une activité constante, correspondant à la forme logique d'administration de l'opothérapie polyglandulaire (A. Carrel, Fischer, C. Richet et R. Carnot).

Indications :

Insuffisance organiques, congénitales ou acquises en particulier.

Enfants : prématurés, débiles et retardés.

Convalescents.

Troubles ovariens : Ménopause.

Asthénies de l'âge mûr et de la vieillesse.

Posologie :

Ampoules buccales d'extrait sec, très soluble, à prendre telles qu'elles, ou délayées dans un peu d'eau, de préférence dans la première moitié de la journée, avant les repas.

Adultes : 2 ampoules par jour. Cas graves : de 3 à 4.

Enfants (à partir de 2 ans) : 1 à 2 ampoules par jour.

Nourrissons : 1 ampoule par jour, en deux fois, délayée dans du lait.

Aucune contre-indication.

Déposé au Laboratoire du Contrôle des Médicaments sous le n° 1303-1

Boîte de 8 ampoules.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin, Paris (IV^e).

Tél. : Turbigo 40-83.

EMGÉ LUMIÈRE

Prophylaxie et traitement de tous Troubles liés à un état d'instabilité humorale.

L'**Emgé Lumière** correspond à la formule $S^2 O^3 Mg$. Son action est complexe, nous vous l'exposons ci-dessous.

Sous la forme de Comprimés :

Il est le médicament des maintes Constipations.

Il est indiqué dans les Diarrhées post-prandiales ;

Il est particulièrement efficace dans les insuffisances hépatiques ;

Il réalise une médication des manifestations anaphylactiques, luttant contre l'instabilité humorale ;

Il est un antiseptique bronchique pulmonaire ;

Il est le médicament type des Toxémies d'origine intestinale ;

Il permet de réaliser la reminéralisation magnésienne, et maintient ou rectifie l'équilibre neuro-végétatif.

En résumé, les comprimés d'**Emgé Lumière** sont essentiellement régulateurs des fonctions digestives.

Ampoules d'**Emgé Lumière**, pour injections **intra-musculaires**, est un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie, mais il est surtout un médicament anti-choc omnivalent.

C'est la médication type de toutes les manifestations dites arthritiques. — Elles exercent une action directe sur l'équilibre humoral. — En injections **intra-veineuses**, c'est une médication héroïque des états dépressifs de la cyclothymie. — Indications particulières en **psychiatrie** (Epilepsie, Manie, Accès anxieux).

Indications. — Tous états d'instabilité humorale (anaphylaxie), Insuffisance hépatique et pancréatique, Désintoxication par formation de sulfo-conjugés atoxiques.

Formuler. — Une boîte de comprimés d'**Emgé Lumière**, dosés à 0 gr. 60.

Une boîte de 3 ampoules de 10 cc. d'**Emgé Lumière**, à 10 p. 100.

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour (avalés tels quels avec un peu d'eau) au milieu des repas.

De l'injection intra-musculaire quotidienne à 3 ou 4 par semaine. Aucune réaction locale ni générale.

Injection intra-veineuse, 1 tous les deux jours (administrer lentement).

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

Caoutchoutés, Adhésifs (formule de l'hôpital Saint-Louis).

Oxyde de zinc : Eczémas torpides, Lichénisation.

De Vidal : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

Huile de cade : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Colopastre. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

Gaze anadhère. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 65-97.

Détail : Phie 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

ENCYTAL CORDONNIER

Association de Fer, Manganèse, Vanadium en combinaison organique, et d'extrait hépatique, de glandes surrénales, de rate.

Présentation. — Sirop de goût agréable (durée moyenne 15 jours, 18 francs).

Indications. — Toutes les anémies, tous les états de fatigue. Donc : accidents de la puberté des jeunes filles, Convalescence des malades et des opérés, Etats pré tuberculeux.

Action contrôlable par le Laboratoire : la valeur globulaire évolue vers l'unité.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café 2 fois par jour, dans un liquide quelconque.

Prescription. — Encytal Cordonnier un flacon.

En dépôt chez tous les Droguistes.

Préparé par le

Laboratoire d'applications biologiques (Labiola)

P. CORDONNIER, Pharmacien

52, rue de Cambrai — LILLE.

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

ENDOCAÏNE-ADRIANINE

Composition :

Association de l'adrénaline physiologique pure et du para-aminobenzoyldiéthylaminoéthanol (Novocaïnum).

Indications :

Anesthésique employé principalement en chirurgie dentaire.

Présentation et prix. — 2 formes :

- a. Ampoules de 1 cc. contenant 1 cgr. d'endocaïne, et 1 goutte d'adrianine.
- b. Ampoules de 1 cc. contenant 2 cgr. d'endocaïne et 1 goutte d'adrianine.

La boîte de 6 ampoules : 7 fr. 50.

— 12 — : 11 francs.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anct. ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ENDOLACGÉNINE

Composition. — Extrait total de glandes mammaires en activité et de placenta.

Propriétés. — Détermine une rapide excitation sécrétoire de la mamelle suivie d'une activité régulière et constante. Provoque dès le 2^e jour une turgidité de la mamelle suivie 3 ou 4 jours après d'une sécrétion lactée très nette.

Posologie :

3 comprimés du 1^{er} au 6^e jour ;

6 comprimés du 6^e au 12^e jour ;

9 comprimés du 12^e au 18^e jour.

Ensuite diminuer la dose graduellement selon la tolérance individuelle.

A prendre en trois doses avant les repas. Le flacon de 50 comprimés : 30 francs.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grandes compagnies de chemins de fer.

ENDO-OVARINA

Composition. — Extrait total concentré d'ovaire.

Propriétés. — Compense chez la femme l'insuffisance ovarienne. Est recommandée en particulier à l'époque de la puberté et pour corriger les troubles de la ménopause. Elle fait disparaître les malaises dont souffre la femme : migraines, règles douloureuses, etc., et permet de rester très longtemps jeune.

Présentation :

Ampoules de 1 cc. la boîte de 6 amp	16 fr.
Comprimés la boîte de 50.....	20 —
Flacon de 60 grammes	22 —

Posologie :

Solution de XX à XXX gouttes par jour.

Comprimés : De 4 à 8 par jour.

Ampoules : 1 injection de 1 cc. par jour.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grandes compagnies de chemins de fer.

ENDOPANCERINE

Insuline Française présentée sous forme liquide pour injections hypodermiques.

Endopancrine tube de 5cc. Chaque cc. titré à 20 unités cliniques

Endopancrine 40 : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

Endopancrine 5 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.

Endopancrine 10 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.

Endopancrine 20 : boîte de 10 ampoules de 1 cc. titré à 20 unités cliniques.

Endopancrine huileuse : tube de 3 cc. un cc. = 100 unités cliniques.

Indications : Diabète et ses complications — Acidoses — Vomissements incoercibles de la grossesse — Dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant — Troubles trophiques des nourrissons — Insuffisances hépatiques — Artérites oblitérantes — Troubles Parkinsoniens — Ménorrhagies d'origine ovarienne — Ulcérations chroniques — Furunculose chronique.

Dose du début dans le diabète : 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Endopancrine : 15 francs. — Endopancrine 40 : 28 francs.

Endopancrine 5 : 12 francs — Endopancrine 10 : 21 francs.

Endopancrine 20 : 28 francs. — Endopancrine huileuse : 60 francs.

Demandez nos notices :

« La thérapeutique du diabète par l'Insuline. »

« Les applications de l'Insuline en dehors du diabète. »

Pour recevoir, à titre d'échantillon gracieux, le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire utiliser.

Laboratoire de l'Endopancrine

48, rue de la Procession — PARIS (15^e).

(Téléphone : Ségur 26-87.)

ENDOTHYMUSINE

Extrait de thymus injectable délipodé
et désalbuminé.

Indications. — Retard de croissance de l'enfant, arrêt de croissance du nourrisson, achondroplasie, ectopies testiculaires, troubles des règles chez la jeune fille, syndromes d'obésité dystrophiques de la période prépubère.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube
Chaque centimètre cube = 1 gr. de thymus frais. Prix : 18 francs.
— — — = 3 gr. de thymus frais. — : 24 francs.
— — — = 5 gr. de thymus frais. — : 30 francs.
— — — = 10 gr. de thymus frais. — : 45 francs.

Conduite du traitement. — Série de 12 injections à raison de 3 par semaine. *Adultes* : commencer par 5 gr., faire 10 gr. si nécessaire. *Enfants* : commencer par 1 gr., faire 3 gr. si nécessaire. Intervalle d'un mois entre les deux séries pendant lequel il est bon de donner 2 cachets par jour de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50. Pour les enfants indociles qui ne supportent pas les piqûres, remplacer celles-ci par 2 cachets de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50 de poudre de thymus avant les principaux repas.

Laboratoires de l'ENDOPANCRINE
48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
(Tél. Ségur : 26-87.)

ENDOXIDINE

Traitement de l'obésité
par l'opothérapie embryonnaire.

Composition. — Extrait embryonnaire séché dans le vide et pulvérisé. Ne contient pas de thyroïde.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule les combustions organiques et provoque l'utilisation des réserves adipeuses. Détermine une diminution progressive du poids sans provoquer le moindre trouble. Constitue le traitement de choix pour les malades ne supportant pas les préparations thyroïdiennes.

Posologie :

4 comprimés	par jour	pendant la première	semaine.
6 —	—	—	la deuxième —
8 —	—	—	la troisième —
10 —	—	—	la quatrième —

Ne pas dépasser la dose de 10 comprimés par jour.

A prendre avant les repas : la moitié de la dose au repas de midi et la moitié au repas du soir.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE
25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).
(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des hôpitaux et des grandes compagnies de chemins de fer.

ÉNERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

Forme. — Sirop agréable.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

ENERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

Forme. — Granulée.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Convalescence, prétuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc...

Prix : 15 fr. 75.

Laboratoire D^r RUIN,

Pharmacien des Hôpitaux

10, rue du Bloc — AMIENS (Somme).

ÉNÉSOL

Composition. — Salicylarsinate de mercure (38,46 0/0 de Hg. métal et 14,4 0/0 de As sous forme dissimulée).

Propriétés. — 70 fois moins toxique que le biiodure. Ne donne pas de phénomènes de stomatite. Indolence de l'injection. Activité spéciale accrue du fait de l'arsenic. L'élément arsenical, d'autre part, agit comme antitoxique à l'égard du mercure que l'on peut administrer à doses plus fortes sans accidents.

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, surtout cures d'entretien. Syphilis tertiaires et Syphilis anciennes. Psoriasis.

Posologie. — Doses moyennes : 2 cc. correspondant à 0 gr. 06 d'Enésol par jour.

Doses massives ou de saturation : Injections intramusculaires de 4 à 6 cc. (soit 12 à 18 centigr. d'Enésol), tous les 2 ou 3 jours. Injections intraveineuses de 2 à 10 cc. (soit 6 à 30 centigr. d'Enésol), selon le sujet, l'urgence et la gravité, tous les 2 ou 3 jours.

Formes. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. d'une solution dosée à 0 gr. 03 par cc.

Collyres d'Enésol à 0 gr. 03 d'Enésol par 10 cc. : Affusions ou instillations oculaires de quelques gouttes d'Enésol plusieurs fois par jour (Complications oculaires de la syphilis).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉNIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

Propriétés thérapeutiques. — L'*Éniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Prix : 14 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Caumartin 30-50.)

« Sel de fruit » **ENO** « Fruit Salt »

Poudre fine, entièrement soluble dans l'eau avec effervescence. Ne contient ni sucre, ni édulcorant, ni sulfates alcalins.

Très agréable à prendre.

Indications :

Troubles de l'appareil digestif. Régularise le fonctionnement de l'estomac. Active les digestions paresseuses (ballonnements, malaises après les repas). Modère l'hypersécrétion pathologique (brûlures, renvois acides). Particulièrement efficace dans les écarts et changements de régime, dans les vomissements simples ou gravidiques.

Sur l'intestin, action laxative, douce et régulière, très indiquée chez les femmes enceintes et les enfants.

Affections du foie. Soulage cet organe en favorisant ses sécrétions.

Arthritisme, goutte, obésité, éruptions cutanées, migraines. Contribue à l'élimination des déchets toxiques qui, dans ces affections, encombrant l'organisme.

Doses :

Adultes : 1 cuiller à café dans un verre d'eau, le soir au coucher ou le matin au réveil.

Enfants (à partir de 6 ans) : 1/3 et 1/2 cuiller.

Prix : 11 fr. 75 et 20 fr. 75. Durée : 3 et 6 semaines.

Laboratoire LACOMBE

rue Barbès — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-48.)

ENTÉRARGOL

Spécifique puissant de toutes les affections intestinales

Composition. — Association d'Argent Colloidal, Sulfate Neutre d'Oxyquinoléine et Magnésie légère.

Propriétés. — Bactéricide et Antiseptique Intestinal, Stable, Atoxique, ne constipe pas, n'irrite pas.

Indications thérapeutiques. — Entérite, Diarrhées, Dysenterie, Affections à colibacilles, Typhoïde, Grippe intestinale. Diarrhées des nourrissons et des enfants.

Présentation.

Granulé : *Nourrissons* dès le premier âge, et *Enfants* jusqu'à huit ans
Pilules : *Enfants* à partir de huit ans et *Adultes*.

De 10 à 15 jours de traitement. Prix : 16 francs.

Posologie. — *Nourrissons* : Dès le premier âge et jusqu'à 6 mois : 1 cuillerée à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

De 6 à 18 mois : 1 cuill. et demie à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une jour.

Enfants : De 18 mois à 4 ans : 1 à 2 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour.

De 4 ans à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour. A faire prendre avant les tétées ou repas.

Enfants à partir de 8 ans : 1 à 2 pilules avant chacun des principaux repas.

Adultes : 2 à 3 pilules avant chacun des principaux repas. Peut être prescrit aux Assurés Soc.

Laboratoires PHOSMA, Marcel FREMONT, docteur en Médecine de la Faculté de Bordeaux, Ph^{en} de 1^{re} classe.

143, cours de la Somme — BORDEAUX

ENTÉRASPIRINE SANOVA

Synergie médicamenteuse plus active que l'aspirine seule et sans dommage pour l'estomac et le cœur.

Formule pour une dragée :

Bromhydrate de quinine	0,03
Pyramidon	0,02
Aspirine	0,35
Caféine	0,02

En deux noyaux solubles l'un dans l'estomac et l'autre dans le duodénum.

Le Bromhydrate de quinine tonifie l'estomac, — la caféine le cœur, — l'aspirine n'est mise en liberté que dans l'intestin.

Indications. — Antithermique, antirhumatisme, antialgique, anti-infectieuse et tonocardiaque.

Doses. — 1 ou 2 comprimés, jusqu'à 6 ou 8 par jour, de préférence aux repas.

Pourquoi prendre 0,50 d'aspirine si 0,35 suffisent.

Pourquoi prendre 1 gr. d'aspirine si 0,70 font mieux.

Prix : 6 fr. 50.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

ENTÉRIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant désinfectant intestinal.

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme. Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles.

Posologie.

Nourrissons : 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'Entériode

39, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 65-16.)

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

Indications. — *Maladies des voies digestives* : Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilisation, constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, colites, entérocrites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleixner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

Asthme, Rhume des foies, Emphysème. Dyspnée provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

Maladies de la peau : Eczémas, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furunculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodermie, etc.

Affections du foie : Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

Colibacillose, Cystites à colibacille.

Certaines formes de rhumatismes aigus ou chroniques, troubles de la ménopause.

Certaines migraines, neurasthénies.

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

Deux formes. — 1^o Ampoules à injecter ; 2^o Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 30 francs.

Durée moyenne du traitement des unités de vente :

Au début du traitement 10 à 20 jours ; ensuite 15 à 30 jours et plus, suivant indications du médecin traitant.

Lab. DUCATTE, 31, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 78-10.)

ENTÉROBYL DEHAUSSY

En une seule prescription réalise effectivement :

Le drainage médical des voies biliaires ;
La désinfection atoxique de l'intestin et de la bile évacuée.

La désensibilisation de l'organisme.

Composition :

Cholérétiques et cholagogues : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptides.

Antiseptiques : Hexaméthylènetétramine, Charbon animal pur.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

Posologie et Formes. — Granulé. Cachets.

Drainage biliaire : 1 à 4 cuillerées à café ou 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

Cure d'entretien : 1 à 2 cuillerées à café, ou 1 à 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 16 fr. 50

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ENTÉROCOCÈNE CARRION

Vaccin entérococcique buvable.

Composition. — Emulsion d'entérocoques de Thiercelin, 2 000 millions de corps microbiens pour 1 cc. d'eau physiologique (soit dix milliards par ampoule).

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Indications. — Grippe, infections gastro-intestinales et généralisées (Entérites coloniales).

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 3 ampoules 2 fois par jour, avec un peu d'eau ; le matin à jeun et 2 heures avant le repas du soir.

Enfants : Demi-dose.

Nourrissons : Une ampoule par jour en plusieurs fois.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 20 francs.

La boîte de 6 ampoules : 12 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ENTÉRODAUSSE

et

ENTÉRODAUSSE CALCIQUE

(Antisepsie du tube digestif.)

Granulé se présentant sous deux formes :

1^o **Entérodausse magnésien** (à base de Phosphate de soude et Hydrate de Magnésie) pour les constipés, applicable aux troubles suivants :

a. Affections gastriques : Goufflements, Flatulences, Aérophagie, Digestions difficiles, Haleine fétide, langue saburrale.

b. Affections intestinales — Putréfaction et fermentation intestinales : selles fétides, Entérites sèches, Aérocolie, Rectocolites graves, Sigmoidites avec fausse diarrhée, Syndromes entéro-rénaux (infection rénale et vésicale d'origine intestinale, Colibacillose), Appendicite chronique ;

2^o **Entérodausse calcique** (à base de Sous-Gallate de Bismuth et Carbonate de chaux) pour les diarrhéiques :

Mêmes indications que précédemment, bien que plus spécialement applicable aux entérites et colites diverses.

Dose et mode d'emploi. — Ce sont les mêmes pour les deux produits : Entérodausse simple et calcique.

Chez les adultes : 1 à 2 cuillerées à café au début de chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Chez les enfants : demi-dose.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

ENTÉROFAGOS

Bactériophages intestinaux polyvalents.

Composition. — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

Dose. — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

Indications. — Entérites, colites, dysenteries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacillooses diverses, syndrome entéro-rénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 18 francs.

la boîte de 5 ampoules : 10 francs.

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances sociales.

**Laboratoire de Biologie médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

ENTÉROHÉPATINE

Rééducateur opo-physiologique de l'intestin.

Composition. — Ext. fl. intestinal. Extr. fl. pancréatique. Extr. fl. hépatique. Extrait salicaire, Teinture Belladone. Acide lactique.

Indications. — Toutes formes d'Entérites, Diarrhées, Dysenteries indigènes ou exotiques. Atonie intestinale.

Mode d'emploi et présentation :

Flacon pour *adultes* : 3 cuillerées-mesure par jour.

Flacon pour *enfants* (compte-gouttes) : II gouttes par année d'âge, 3 fois par jour.

ENTÉROHÉPATINE SB.

Même formule, moins la Teinture de Belladone.

Mêmes indications, mêmes doses.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires Henri FOUCHER

77, boulevard de Grenelle — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 11-45.)

ENTÉRO-PANSEMENT

du Docteur ZIZINE

Protection, désinfection de la muqueuse intestinale.

Composition. — Deux formules :

Simple. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Lactose.

A l'ipéca. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Ipéca.

Forme. — Granulé fondant aromatisé.

Propriétés thérapeutiques. — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant. Infections et intoxications intestinales ; leurs conséquences. Fermentations intestinales ; ballonnement abdominal. Dermatoses d'origine intestinale. Colites infectieuses et parasitaires. Entérite des pays chauds. Entérocolite. Colibacillose (localisations hépato-vésiculaires et rénales).

Propriétés thérapeutiques spéciales à l'ipéca. — Amibiase, Dysenteries à Protozoaires.

Posologie. — *Adultes* : de 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, à jeun ou au repas (à croquer ou délayer dans un peu d'eau).

Enfants : de 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Prix de la boîte : 18 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie,
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Facultés de Médecine
de Paris et de Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

ENTÉROSALICYL

Salicylate de Soude en capsules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin.

Suppression totale de toute irritation gastrique.

Composition. — 2 dosages : Normal, 0 gr. 50 par capsule. Infantile, 0 gr. 25 par capsule.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme aigu à forme extra-articulaire, Pseudo-infectieux, pseudo-tuberculeux, Sciatique, Goutte, Troubles hépatiques, Maladie de Basedow. (Dans les cas graves de R. A. A. compléter par *Glucosalyl*, en injections intraveineuses. Dans les Rhumatismes chroniques : *Sulfosalyl* « per os », et *Histalgine*, en piqûres intradermiques.)

Posologie. — Celle du Salicylate de Soude. Jusqu'à 15 grammes et plus par 24 heures.

Enfants : 1/2 à 1 gramme par année d'âge. De préférence pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Prix : Boîte normale 16 fr. 50. Quadruple boîte 35 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1001-7.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale (Sarein)

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37).

ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaphtyle, 0 gr. 05 par comprimé ou par cuillerée à café de granulés.

Indications. — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticaire, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Fétidité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

Avantages. — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépato-toxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants, de préférence sous la forme de « granulés ».

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour en dehors des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café de granulés par année d'âge et par jour.

Prix : le flacon de comprimés ou granulés : 12 francs.

Laboratoires de L'ENTÉROSEPTYL

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 35-51.)

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent

Immunisation antityphique par voie gastro-intestinale.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants. S'emploie à titre curatif et préventif.

Propriétés :

Durée de l'immunité variable selon les individus : elle est en général de deux à trois ans. En période d'épidémie et en cas de séjour dans les régions contaminées, renouveler l'immunisation au bout d'un an.

Efficacité de même ordre que celles des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée, mais aucune contre-indication, pas de réaction, rien à changer aux occupations habituelles ni au régime normal.

Le procédé le plus simple, le plus inoffensif d'immunisation et de traitement contre la Fièvre typhoïde, les Fièvres paratyphoïdes (A et B). Efficacité attestée par des rapports officiels et de nombreuses observations. Plus de 500.000 expériences sans un seul échec.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

Doses. — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.

Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

Formuler : Une boîte de 28 pilules d'Entérovaccin Lumière.

Prix : 18 francs.

VACCINOTHÉRAPIE CURATIVE

L'Entérovaccin Lumière est également utilisé avec succès à titre curatif, dans le traitement des états typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution. L'employer à la même dose.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Colibacilles, Staphylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie *buccale*.

Indications. — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome entero-rénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

Enfants : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

Nourrissons : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

7, rue Desrenaudes — PARIS

(Tél. : Carnot 78-11.)

ENTÉRO-VIOFORME

CIBA

Antiseptique intestinal

Iodochloroxyquinoléine

Agent chimiothérapique d'action hautement spécifique dans les dysenteries infectieuses ou parasitaires, aiguës ou chroniques. Non toxique et non irritant, son usage peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire par périodes de traitement de 10 à 12 jours.

Indications. — *Dysenteries parasitaires et infectieuses* : d. amibienne, d. bacillaire, suites de dysenteries. Infections à *Balantidium* et *Lamblia*. Dysenteries et diarrhées d'origine non définie.

Doses. — Cas aigus : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour aux repas pendant dix jours, puis suspension et reprise. *Cas chroniques* : 1 ou 2 comprimés par jour, trois ou quatre jours par semaine.

Prophylaxie : 1 comprimé tous les deux jours.

Tube de 20 comprimés

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ENTÉROXIN

Composition. — Vaccin buccal polyvalent (cultures stérilisées de B. Coli, entérocoque, staphylocoque et corps microbiens en suspension).

Présentation. — Ampoules de 10 cc., en boîtes de 8 ampoules.

Mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules dans 1/2 verre d'eau froide sucrée, 3/4 d'heure avant le petit déjeuner, 10 à 20 jours par mois. Aucune contre-indication.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LECLERC S. A.

10, rue Vignon — PARIS.

ENZYPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Diastase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan, la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique, que détruit par le suc intestinal dès leur arrivée dans le duodénum.

Doses. — 2 ou 3 dragées au début ou pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

ÉPANAL

Régulateur du déséquilibre vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonylurée	0 gr. 02
Extrait hydroalcoolique de cratægus ...	0 gr. 03
— — — de valériane	0 gr. 03
— — — de passiflore ...	0 gr. 02
— — — de saule blanc..	0 gr. 02
— — — de ballote	0 gr. 02
Poudre de marjolaine.....	0 gr. 02
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 03

Par comprimé dragéifié et glutinisé.

Principales indications. — Tics, Chorée, Epilepsie, Névrose, Mélancolie, Anxiété, Hyperémotivité, Vertige, Insomnie, Tachycardie.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour.

Prix : le tube de 40 comprimés : 16 francs.

Laboratoires E. BOUCHARA

47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 94-65.)

ÉPHASMA

Médication pathogénique de l'asthme.

S'attaquant à tous les facteurs de la crise :
Sympathique par l'éphédrine.

Parasympathique par la belladone.

Bulbaire par la lobélie et l'euphorbe.

Cardio-pulmonaire par l'iodure de caféine.

Bronchique par le benzoate de soude.

Traitement de la crise. — Un à deux comprimés dès l'apparition des signes avant-coureurs. Trois comprimés dans les 24 h.

Traitement de fond. — Un comprimé par jour, 10 à 20 jours par mois.

Prendre le comprimé finement écrasé dans une tasse d'infusion ou dans un peu d'eau bien sucrée.

Prix : 17 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ÉPHÉDERMINE BÉRAL

Crème-pâte sans graisse à l'Éphédrine naturelle zincique.

Mode d'emploi. — En application comme une pâte et autant que de besoin.

Indications. — Toutes affections cutanées prurigineuses. Eczémas suintants. Dermatoses allergiques, Hémorroïdes, etc.

Prescrire : ÉPHÉDERMINE BÉRAL. Un tube.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

Deux formes : comprimés et ampoules.

3 centigrammes d'Ephédrine naturelle et 5 centigrammes de Caféine par comprimé ou par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'Ephédrine et des Ephédroïdes, mais avec, en plus, l'action diurétique et toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations, de toute action déprimante sur le myocarde, et des troubles de la miction.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués chez les sujets hypocardiotoniques enclins aux palpitations, et chez les sensibilisés vésicorénaux.

1 à 2 comprimés d'Ephédraféine dans les 2 heures précédant l'accès.

Les ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachi-anesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

1 à 2 cc. 10 minutes avant l'intervention ou au moment des chocs.

Prescrire :

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 14 francs.

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 15 francs.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Ephédrine Béral par centicube.

Pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses :

1 à 4 centicubes par jour. S'emploient aussi en pulvérisations nasales, et pour autres applications externes de l'Ephédrine.

Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL.

Une boîte : 10 francs ; grande boîte : 16 fr.

Laboratoire de L'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRASMINÉ

Pulvérisations nasales.

Solution physiologique.

Sulfate éphédrine naturelle 2 p. 100

Adrénaline physiologique 1 p. 10.000

Action. — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale. Inhibition des ramifications terminales du sympathique.

Indications. — Obstruction nasale, Asthme, Rhume des foins, Rhinites, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhino-pharynx, Migraines. Infections grippales.

Mode d'emploi. — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Garéphédrine, Diuréphédrine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 12 francs le flacon pour un mois environ.

Pulvérisateur spécial de poche en étui peau : 25 francs.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

ÉPHÉDRINE BÉRAL (Grains d')

Grains dosés à 1 cgr. d'Éphédrine naturelle Béral par grain. Entièrement solubles.

Les mieux appropriés à l'éphédrinothérapie fractionnée, notamment chez les intolérants et pour la prophylaxie des chocs thérapeutiques (injections arsenicales, sériques ou autres).

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 10 grains par jour : 1 grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection choquante. Peuvent être dissous dans un peu d'eau.

Prescrire : **GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL.** Un flacon. Prix : 13 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE naturelle BÉRAL

Produit français intégral.

Formes pharmaceutiques spécialisées :

Grains d'Éphédrine Béral. Dosés à 1 cgr. d'éphédrine par grain, 13 francs.

Éphédroïdes Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine naturelle, 12 francs.

Éphédraféine Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. de caféine, 14 francs.

Éphétropine Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine-caféine et hyosciamine-barbiturique, 16 fr.

Éphédromel Béral. Sirop mellité à 1/2 cgr. d'éphédrine par cuillerée à café, 14 francs.

Éphéiodine Béral. Élixir de Lobélie à 3 cgr. d'éphédrine iodée, par cuil. à café, 16 francs.

Éphédrampoules Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine par cc., 10 francs.

Éphédraféine injectable Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine + 5 cgr. caféine par cc., 15 francs.

Spartophédrine Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. spartéine par cc., 15 francs.

Adréphédrine Béral. Ampoule à 1/4 mgr. d'adrénaline et 3 cgr. d'éphédrine par cc., 15 francs.

Éphédrisol Béral. Hydrolat d'éphédra à 3 et 5 p. 100 d'éphédrine, 15 francs.

Éphédropries Béral. Poudre à priser à 3 cgr. d'éphédrine par prise, 12 francs.

Éphédermine Béral. Gelée-pâte sans graisse à 2 p. 100 d'éphédrine, 12 francs.

Nasophédrine Béral. Pommade nasale (huile gélifiée) à 3 p. 100 d'éphédrine, 10 francs.

Oléophédrine Béral. Huile d'éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine, 12 francs.

Mydriédrine Béral. Ampoule-collyre à 4 p. 100 d'éphédrine, 18 francs.

Clearol. Bain oculaire à l'hamamélis adréphédriné, 9 francs et 15 francs.

Rhinodrops Béral. Capsules nasales à l'huile d'éphédra chlorétonée, 10 francs.

(Voir annonces concernant chacun des produits.)

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE HOUDÉ

(Chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.)

Propriétés. — Sympathicotrope. Excitant du centre respiratoire bulbaire. Relâche les muscles lisses de la paroi bronchique. Hypertenseur par vaso-constriction périphérique. A petites doses, ralentit et soutient le cœur. Tonique général. *Antianaphylactique.*

Avantages. — Non modifiée par les sucs gastro-intestinaux, comme l'adrénaline, ce qui permet de l'employer *per os*.

Indications :

- a. *Essentielles*: Asthme sous toutes ses formes. Dyspnée. Urticaires.
- b. *Secondaires*: Rhume des foins. Dysménorrhée. Réactions sériques. Hypotension permanente d'allure idiopathique. Myasthénies et myopathies. Syndromes vagotoniques. Enurésie.

Présentation. — Granules à 1 cgr.

Posologie et mode d'emploi. — *Asthme*. 2 à 3 granules le plus près possible du début de la crise.

Répéter cette dose 25 minutes après, si pas d'amélioration nette.

Traitement de fond : même dosé, le matin au réveil et le soir vers 4 heures.
Hypotension permanente: 4 granules par jour en 3 fois, par séries de 10 à 12 jours.

Urticaire : 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. — (Tél. : Nord 40-58.)

ÉPHÉDRISOL BÉRAL

Hydrolat d'Éphédra à 3 p. 100 d'Éphédrine naturelle, sans adjonction d'anal-gésiques.

Pour **pulvérisations** nasales, préventives et curatives des crises d'asthme, du rhume des foins et contre les coryzas, rhinites, sinusites, céphalées et surdités catarrhales, etc...

(Éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche, étui métal : 22 francs).

Prescrire ÉPHÉDRISOL BÉRAL, un flacon : 15 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRIVAÏNE

Solution aqueuse d'Éphédrine naturelle associée au nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminométhanol et aux essences antiseptiques.

Action. — Décongestion, Antisepsie de la muqueuse nasale, Asthme, Coryza, Rhumes des foins, Sinusites, Affections congestives du rhino-pharynx, Infections grippales.

Composition :

Sulfate d'Éphédrine naturelle	0,75
Nitrate de para-aminobenzoyl-diéthylaminométhanol.....	0,30
Sérum isotonique stabilisé, saturé d'essences aromatiques et antiseptiques S. Q. pour 100 gr.	
Prix au public :	16 fr. 50.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Enregistré au Lab. national de Cont. des Médicaments.

Laboratoires M. De RIVE

Services commerciaux

2, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

ÉPHÉDROCURE

Pommade nasale.

Formule. — Chlorhydrate d'éphédrine : 1 gr. ; Chlorhydrate d'amyline : 0,20 ; Soufre précipité : 0,25 ; Métadioxypnéol : 0,30 ; Camphre : 0,40 ; Sulfo-ichtyolate d'am., 0,25 ; Baume du Pérou : 1,50 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Excipient non mentholé, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, rhinite, ozène, sinusite, affections des voies respiratoires.

Présentation. — Tube avec embout spécial à injection nasale.

Enfants et adultes : Introduire 2 à 4 fois par jour gros comme un pois de la pommade dans chaque narine.

Prix au public : 10 fr. 50

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous le n° 888-6.

Solution huileuse :

Formule. — Ephédrine base : 0,50 ; Paraforme : 0,40 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 2,60 ; Myrtol : 0,30 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0,55 ; Métadioxypnéol : 0,12 ; Huile d'olive médicinale neutre et stérilisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, coryza, sinusite, céphalée, ozène, prophylaxie de l'asthme et de l'emphysème (en pulvérisations ou en instillations).

Présentations :

a. **Ephédrocure Huile.** — Flacon de 30 cc. (à compte-gouttes nasal intérieur) pour instillations. *Enfants et adultes :* III à VI gouttes dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

Prix : 16 fr. 50.

b. **Pulvo-Ephédrocure.** — Flacon (avec pulvérisateur spécial).

En Pulvérisations : 3 à 4 fois par jour dans chaque narine.

Prix : 23 fr. 50. Flacon de recharge : 14 francs.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 888-5.

Rhino-Capsules :

Même formule que la solution huileuse (L. N. C. M. 888-9).

Indications. — Traitement préventif de la grippe, du coryza, du rhume des foins, de la sinusite, de l'asthme et de toutes les affections du rhino-pharynx.

Présentation. — Boîte de 20 capsules nasales longues.

Enfants : 1/2 capsule dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Adultes : 1 capsule dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Prix au public : 12 francs.

Comprimés :

Forme A. — 0,015 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée, par comprimé.

Forme B. — 0,025 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Rhinites, toux spasmodiques, Bronchites chroniques, Etat d'hypotension.

Prix : Forme A, 13 francs, Forme B, 15 francs.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 888-7.

(Publicité exclusivement médicale.)

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés à 3 centigr. d'Éphédrine naturelle Béral.

Indications. — Toutes celles de l'Éphédrine naturelle.

Posologie et mode d'emploi. — Débuter par un Éphédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Éphédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Éphédroïde le matin.

Chez les hypocardiotoniques et les sujets enclins aux palpitations, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphédrافéine qui évitent les palpitations.

En cas d'insomnie ou d'agitation, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphétropine qui contiennent les correctifs appropriés.

Prescrire : Éphédroïdes Béral, un flacon : 12 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDROLÉNOL

Composition :

Combinaison d'éphédrine base, de camphre et d'huiles essentielles sélectionnées, en véhicule huileux neutralisé et stabilisé par un procédé original.

Se fait à 1 % d'éphédrine et à 1/2 % d'éphédrine.

Présentations et mode d'emploi :

Flacon d'huile à 1 %. —

Instillations, pulvérisations : 15 francs.

Capsules nasales à 1 %.

Instillations 15 —

Flacon d'huile à 1/2 % (éphédrolénol dédoublé).

Instillations, pulvérisations } 15 francs.
Injections intratrachéales }

Capsules nasales d'huile 1/2 %.

Instillations 15 —

Ampoules d'huile 1/2 % de 5 cc.

Injections intratrachéales.. 15 —

Pommade (excipient spécial sans vaseline), tube à canule : 9 fr. 50.

Indications :

Coryza, rhinites atrophiques et hypertrophiques, ozène ; sinusites, pharyngites, rhume des foins, végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale.

Asthme : Augmentation de la résonance de la voix chez les chanteurs. L'Ephédrolénol dédoublé donne des résultats remarquables en médecine infantile. Il peut être employé même chez les nourrissons.

Caractéristiques :

Préparation agréable, non irritante, non toxique. Inscrit au Laboratoire de contrôle des médicaments.

Laboratoire MERLET

24, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

ÉPHÉDROLYPTOL

Composition :

Solution aqueuse d'essence d'eucalyptus de sulfo-camphonate de soude et de Ch^{te} d'éphédrine.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. renfermant 0,01 d'éphédrine pour injections intramusculaires.

Indications :

Toutes les affections aiguës ou chroniques broncho-pulmonaires, Catarrhe bronchique, Asthme, Pneumonie, Bronchopneumonie.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, calmant de la toux et de l'oppression.

Laboratoire MERLET

24, Bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

ÉPHÉDROMEL BÉRAL

Sirop mellité contenant un demi-centigramme seulement d'Éphédrine naturelle Béral par cuillère à café.

Indications. — Application de l'éphédrino-thérapie à la médecine infantile, notamment contre l'Asthme infantile, la Trachéite spasmodique, la Coqueluche et l'Énurésie. Aimé des enfants.

Posologie. — 1 à 6 ans, 2 à 8 cuillerées à café; 6 à 12 ans, 2 à 8 cuillerées à dessert.

Prescrire : ÉPHÉDROMEL

Un flacon : 14 francs.

Laboratoire de **L'ÉPHÉDRINE BÉRAL**
194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRO-RHINOL

à l'Éphédrine végétale lévogyre.

Forme. — Pommade et Solution huileuse.

Composition. — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

Indications. — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foins, Céphalée d'origine nasale.

Mode d'emploi. — *Pommade* : 3 fois par jour ou plus gros comme un pois dans chaque narine.

Solution huileuse : En instillations. *Adultes* : V à X gouttes 3 fois par jour dans chaque narine.

Enfants : I à III gouttes, 2 fois par jour.

En pulvérisations avec le pulvérisateur spécial Ephédro-Rhinol.

Prix : Pommade, 11 francs. Solution, 13 francs.

Vaporisateur et solution : 22 francs.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

ÉPHÉIODINE BÉRAL

Élixir de Lobélie à 3 centigr. d'Éphédrine et 25 cgr. NaI par cuillerée à café.

La meilleure de toutes les préparations éphédriniques dans les Périodes intercalaires de l'Asthme et contre les Bouffées asthmatiformes des Catarrheux bronchiques et des Emphysémateux.

Dilate les bronches, facilite l'expectoration, soulage toujours. S'applique à tous les cas.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et au début des accès.

Prescrire : ÉPHÉIODINE BÉRAL

Un flacon : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉTROPINE BÉRAL

Comprimés contenant chacun 3 cgr. d'éphédrine associée à hyosciamine, caféine et acide barbiturique.

Contiennent tous les correctifs électifs des effets secondaires de l'Ephédrine.

Sont particulièrement indiqués contre l'asthme rebelle avec agitation ou insomnie.

Constituent la préparation de choix pour l'administration de l'Ephédrine le soir, en prévision d'accès nocturnes.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés dans les 2 heures précédant l'accès.

Prescrire : ÉPHÉTROPINE BÉRAL, une boîte.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

ÉPHOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — Huile éphédrinée au centième (éphédrine *naturelle* chimiquement pure) avec addition d'acétone-chloroforme et orthoforme. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

Avantages. — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Epholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

Mode d'emploi. — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

Prescription. — Un flacon *Epholéine Falvy*.

Prix : 18 francs.

Les laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél.: Étoile 18-26.

ÉPHYDION

Éphédrine. Dionine.

Composition. — Association synergique d'Ephédrine naturelle, Dionine, Belladone, Benzoate Na, Drosera et Grindelia. Sous forme de comprimés glutinisés qui se dissolvent dans l'intestin et respectent intégralement l'estomac.

Action thérapeutique. — Antispasmodique, Anti-dyspnéique, Analgésique, Hypnotique léger, Ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — Sédatif puissant de toutes les formes de la toux (Spasmodique, Quinteuse, Coqueluchoïde, Emphysémateuse, Névropathique, Réflexe). Calme remarquablement la toux des tuberculeux et leur assure sans fatigue stomacale repos et sommeil.

Posologie. — 5 comprimés par jour. 6 à 8 dans les toux rebelles. Grands enfants : 2 à 5 comprimés par jour.

Gouttes Ephydion. — Un cc. ou XXX gouttes = un comprimé. *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge 5 à 8 fois par jour.

Sirop Éphydion. — 3 à 4 cuillerées par jour.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ

RENNES (Ille-et-Vilaine).

ÉPICRAL

Ἐπικρασις, action de tempérer les humeurs, et Ἐπικραταῖν, fortifier. **Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée** (1 mgr, Arséniate Soude, 2 mgr. Iode organique, 6 mgr. Lactate mercurique. etc., par cuillerée à soupe).

D'emploi très commode, de saveur très agréable, parfaitement toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

Originalité. — Formule bien spéciale, très active et sans aucun inconvénient, avec lactate mercurique (sel de mercure le mieux toléré), Arsenic, Iode (dose très faible), citrate de soude (rôle très important), etc...

Propriétés thérapeutiques. — Antisyphtillique, tonique, agit très favorablement sur les sécrétions (glandes endocrines, foie, muqueuses...) et sur la circulation (diminue la viscosité sanguine, abaisse la tension, etc.).

Augmente l'appétit et améliore toujours l'état général.

Indications. — Toutes les manifestations de l'Hérédo-syphilis, prophylaxie pendant la grossesse. Ses résultats sont tout particulièrement remarquables dans les troubles endocriniens et de croissance, dans les affections hépatiques, nerveuses et circulatoires. Comme il est tonique, qu'il agit très favorablement sur les sécrétions et la circulation, et que son emploi améliore toujours l'état général, il est très souvent prescrit, avec profit, en dehors de toute manifestation spécifique.

Posologie habituelle. — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Lab^{re} Nat^l de Contrôle des Médicaments sous le n° 699-2.

Prix : 15 fr. 75.

Laboratoires G. LAMBERT O. ✱, Docteur en Pharmacie

6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54.)

ÉPIPALINE

Pommade vitaminée

Augmente la défense naturelle de la peau et active la réparation des tissus.

Compositions. — Huile de Flétan (33 %) particulièrement riche en Vitamines A et D.

Excipient composé exclusivement de produits d'origine animale et végétale, de tolérance parfaite.

Propriétés. — Action puissante due à sa pénétration facile dans l'intimité des tissus :

1° Décongestionnante et sédative.

2° Régénératrice et cicatrisante.

3° Anti-infectieuse par la vitamine A (sans adjonction d'aucun antiseptique).

Indications. — Lésions cutanées banales, dermites aiguës, intertrigo, érythème des nourrissons, crevasses du sein.

Brûlures de quelque origine qu'elles soient.

Radiodermites accidentelles ou thérapeutiques.

Plaies atones, ulcérations chroniques, ulcères variqueux.

Affections gynécologiques, ou obstétricales.

Affections anales, hémorroïdes, fissures douloureuses.

Affections rhino-pharyngées.

Enregistré au Laboratoire de contrôle sous le N° 1050-4.

Prix de vente : Le tube 12 fr.

Laboratoire du Docteur JOUVE

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI^e)

ÉQUISÉTOL

Médication végétale des déficiences fonctionnelles du foie.

Composition. — Prêle, Romarin, Artichaut, Eucalyptus, Polypode, Saponaire.

Forme. — Granulé fondant, aromatique, agréable.

Propriétés. — Stimulant rationnel et doux de la fonction hépatique, ne provoquant jamais de réaction douloureuse vésiculaire.

Indications. — *Insuffisance hépatique*, congestion chronique du foie, cholémie familiale, états gastro-hépatiques, cholélithiase.

Posologie. — 1 cuillerée à café, 3 fois par jour, avant les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires STELVIA
Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences,
59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Kléber 88-70.)

ÉRANOL

Iode colloïdal physico-chimique à micelles de sens électropositif.

La première préparation d'iode présentée sous la forme micellaire.

L'*Éranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Éranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa haute teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance (enfants, vieillards) et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Résultats thérapeutiques inégalés. Jamais d'iodisme.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Lymphatisme, Hypertension, Arthritisme, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, Mycoses, Basedow, Goitre, Angor, etc.

Forme. — Flacon, avec compte-gouttes.

Mode d'emploi et Posologie. — Pendant les repas ou entre les repas, dans du vin, de l'eau rouge et toute boisson.

Adultes : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour.

Enfants : II à V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Nourrissons : II à V gouttes *pro die*.

Laboratoire de L'ÉRANOL

45, rue de l'Échiquier — PARIS (X^e).

(Tél. : Provence 48-40.)

ERGÉPATINE

**Médication hépatique de drainage et de désintoxication
des voies digestives.**

Formule :

Peptone de viande purifiée.....	3 gr. 75	Extrait mou de Boldo ..	0 gr. 50
Peptone de poisson.....	2 gr. 25	Extrait mou d'Artichaut.	0 gr. 50
Peptone d'œuf.....	1 gr. 50	Salicylate de soude.....	3 gr.
Sulfate de magnésie desséché	25 gr.	Charbon animal déca-	
Extrait mou de Genièvre	0 gr. 50	nuré	4 gr.
		Podophyllin	0 gr. 05
		Sucre parfumé Q. S. p.	125 gr.

Granulé fin, agréable, très soluble. Prix : 16 francs.

Particularités. — Association des 3 peptones au Sulfate de magnésie, au Salicylate de Soude, et aux extraits végétaux (boldo, artichaut, genièvre) ; antiseptique (charbon) et laxatif.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin et à midi.

Indications. — Maladies du Foie et des voies biliaires. Intoxications. Anaphylaxie. Maladies de la peau. Urticaire. Migraines. Constipation par insuffisance biliaire.

Laboratoires du PLASMOCALCIUM
(Chlorure de Calcium-assimilable.)

J. C. ARNAULT
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE (Oise).
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

ERGOCOLINE

Stimulant et régulateur de l'intestin.

Enterokinase.....	0 gr. 005
Extraits biliaires	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 02
Poudre de belladone.....	0 gr. 005
Poudre de jusquiame.....	0 gr. 0075
Evonymine.	0 gr. 01
Extrait d'hamamélis.....	0 gr. 05
Poudre de jaborandi	0 gr. 02

Pour 1 comprimé.

Particularités. — Laxatif, non douloureux, sans toxicité, ni accoutumance.

Contient de l'hamamélis (décongestif pelvi-rectal) et du jaborandi (excito-sécréteur de l'intestin).

Emploi. — 1 à 2 comprimés le soir au repas.

Indications. — Constipation (chez la femme en particulier). Stase intestinale. Intoxications d'origine intestinale. Hépatisme.

Prix : 10 fr.

Laboratoires de la BIOPAUSINE
(Spécifique circulatoire tonique.)

P. TAVERNIER — Docteur en Pharmacie.
32, rue de l'Ouest — PARIS.
O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

ERGOPHOS

Principes actifs. — Ergostérine irradiée, Acide orthophosphorique, Phytosphosphine (sel calco-magnésien de l'acide anhydro-oxyméthylène diphosphorique).

Indications. — Carences vitaminiques D (Rachitisme), Carences phosphocalciques (Ostéomalacie, tétanie, caries dentaires, fractures à consolidation lente, état pré-tuberculeux).

Formes : A = Solution concentrée.

B = Gouttes (enfants de 1 an à 8 ans).

Mode d'emploi :

Solution : 1 cuillerée à café à chacun des 2 principaux repas, diluée dans un grand verre d'eau mélangée ou non de vin, sucrée de préférence.

Gouttes : III gouttes par année d'âge, à chacun des 2 principaux repas, comme ci-dessus.

Prix : { Solution 18 fr.
 { Gouttes 15 fr.

Durée du traitement : 15 à 20 jours.

Laboratoires S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

C. CHAMARD et **R. NIEL**
Inspecteur des Pharmacies Docteur en Pharmacie
3, rue Royet — LYON-CALUIRE
Tél. : Burdeau 23-31.

ERGORONE

Solution glycéro-alcoolique de vitamine D cristallisée, titrée à 12.000 unités internationales par cm³, soit 400 unités pour une goutte.

Indications. — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant.

Présentation et posologie. — Flacons de 15 cm³.

Nourrissons : III à IV gouttes par 24 heures.

Enfants : VI à X gouttes par 24 heures.

Adultes : X à XX gouttes par 24 heures.

Prix de vente : Le flacon : 15 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac, 22-94.)

ERGOTINE BONJEAN

Contient les principes actifs de l'ergot de seigle extrait par un procédé spécial.

(Procédé Bonjean, approuvé par l'Académie de médecine.)

Indications thérapeutiques. — Hémorragies de toutes natures : utérines, pulmonaires, gastro-intestinales. Fibromes, Hémorroïdes, Métorrhagies, Hémoptysies, Rétentions urinaires.

Formes. — Ampoules injectables indolores de 1 cc. dosées à 0 gr. 15 d'Ergotine Bonjean par ampoule, et correspondant à 1 gramme d'ergot de seigle.

Dragées. — Chaque dragée correspond à 0 gr. 15 d'extrait mou ou 1 gramme d'ergot de seigle.

Extrait mou : pour préparations magistrales.

Solution : XV gouttes correspond à 0 gr. 15 d'Ergotine.

Posologie. — *Adultes.* — Ampoules : suivant le succès de son action (1 à 4 par jour). La boîte de 6 amp. : 15 fr. Dragées : 4 à 6 par jour avant chaque repas.

Le flacon de 30 dragées : 13 francs.

Solution : XV gouttes, 4 à 6 fois par jour.

Le flacon de 30 grammes : 12 francs.

Enfants : 1/2 dose.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.)

ÉRYLSULFURE ÉON

Composition. — Sirop stable et facile à prendre, au *Monosulfure de Sodium* à odeur et saveur dissimulées. (Un centigramme par cuillerée à soupe.) — Petite dose d'Aconit, Goudron, Erysimum. Enregistré au L. N. C. M. Autorisé pour Assurances Sociales.

Propriétés thérapeutiques. — Élimination d'H₂S par la muqueuse des voies respiratoires, dont il active, fluidifie les sécrétions et facilite l'expectoration. Améliore les bronches sensibles. Sèche les gorges irritées. Cicatrise les granulations. Fait disparaître l'enrouement. Désencombre et assainit l'arbre respiratoire.

Indications. — Fragilité ou irritation chronique des voies respiratoires supérieures et moyennes.

I. Pharyngites. Laryngites. Enrouement. Extinction de voix. Suites d'angines.

II. Bronchites chroniques. Toux persistantes. Rhumes fréquents. Catarrhes. Asthme. L'Erysulfure fluidifie puis assèche les sécrétions persistantes.

III. Suites de Grippe, de rougeole, de coqueluche.

Posologie. — Le sirop d'Erysulfure Éon se prend une heure avant ou deux heures après les repas, avec une boisson chaude quelconque, aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe 2 à 3 fois par jour.

Douze à seize ans : 1 cuillerée à dessert 2 fois par jour.

Huit à douze ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Cinq à huit ans : 1/2 ou 1 cuillerée à café 1 à 2 fois par jour.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire ÉON

DINAN (Côtes-du-Nord).

ÉRYTHÉMA

(Pommade)

Médication rationnelle des épidermes lésés.

Composition. — Pommade à base de Calcium, Magnésium et Extrait d'Aunée.

Indications. — Toutes lésions de l'épiderme, Dermatoses aiguës et chroniques, en particulier : Érythèmes des nourrissons, Crevasses des seins, Eczémas, Prurit, etc...

Présentation. — Pommade en tube.

Posologie. — Une application matin et soir.

L'Érythéma ne tache pas.

Laboratoires de l'ÉRYTHÉMA

139, rue Jean-Jaurès

MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ÉRYTHRA

Chimiothérapie élective de la ROUGEOLE

Lactate d'amidopyrine pur à pH = 3,2.

Solution titrée : 1 goutte = 1 cgr.

Antithermique puissant, bien toléré par les enfants, même à dose élevée, sans action secondaire sur le rein.

Indications :

ROUGEOLE

Fièvres éruptives, saisonnières, septiques.

Arrête la poussée fébrile,

Abrège l'évolution,

Évite les infections secondaires.

(Thèse Boz, Paris, 1933.)

TYPHOÏDE

plus pratique que les bains froids, abaisse efficacement la température, augmente la résistance de l'organisme. (Thèse Bernard, Paris, 1935.)

GRIPPE

Néuralgies, migraines, lombagos.

Zona, rhumatisme articulaire aigu.

Le plus maniable des antithermiques.

Posologie. — Administrer dans de l'eau sucrée ou de l'eau gazeuse.

Rougeole :

Enfants : IV gouttes par année d'âge. } toutes les

Adultes : L à LXXX gouttes. } 4 heures.

Typhoïde :

Enfants : IV gouttes par année d'âge. } toutes les

Adultes : L à LXXX gouttes. } 8 heures.

Grippe, pyrexies, algies :

Enfants : I à II gouttes par année d'âge. } toutes les

Adultes : XXX à LX gouttes. } 6 heures.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques
39, boul. de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).
Invalides 43-60.

ÉTHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Composition. — Éther sulfurique pur à 66° du Codex français.

Indication. — Anesthésique général.

Présentation et prix :

a. Ampoule de 50 gr. : 13 francs.

— 100 — : 18 —

b. Flacon de 50 gr. : 6 fr. 50.

— 100 — : 11 francs.

— 125 — : 13 —

— 250 — : 20 —

Société française de Produits Pharmaceutiques.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ÉTHYL-PNEUMINE « LERSAM »

Spécifique des affections pulmonaires aiguës.

Composition. — Solution d'alcool éthylique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 10 cc.

Indications thérapeutiques. — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves : pneumonies, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.*

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc. Traitement des intoxications barbituriques.

Doses. — *Adultes : Cas graves : 20 à 40 cc. par voie intraveineuse ou intramusculaire, répétées tous les jours.*

Cas moyens ou légers : 10 cc. par voie intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants : Au-dessous de 6 ans : 5 cc.

Au-dessus — : 10 cc.

Prix. — La boîte de 6 ampoules : 20 fr. Admis aux A. S.

Échantillons, Littérature :

Laboratoires LERSAM

André INGÉ, pharmacien.

92, boulevard Murat — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-35.)

EUBINE

Composition. — Chlorhydrate de dihydrooxycodéïne.

Propriétés. — Remplace la morphine. Absence d'accoutumance. Quatre fois moins toxique. Injection indolore.

Indications. — Toutes douleurs, cancer, tuberculose, coliques hépatiques et néphrétiques, douleurs fulgurantes et crises gastriques du tabès, névralgies, sympathalgies.

Son action est particulièrement favorable dans les crises douloureuses accompagnées de vomissements.

Présentation :

10 ampoules à 2 centigrammes.

10 ampoules à 1 centigramme.

10 suppositoires à 2 centigrammes.

20 cachets à 2 centigrammes.

Les ampoules et les cachets sont inscrits au tableau B. La prescription des suppositoires est libre.

Posologie et mode d'emploi :

Chirurgie : Injecter 3/4 d'heure avant l'opération une ampoule de 2 centigrammes, et 1/4 d'heure avant une ampoule de 1 centigramme.

Laboratoire KOEHL

18, rue de Ménilmontant — PARIS

(Tél. : Ménil. 63-95.)

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire).

Composition. — Eucalyptol 0,15 cgr. ; Gaïacol, 0,025 mgr. ; Acide phénique, 0,01 cgr. ; Camphre, 0,10 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc., le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

Formes. — Amp. de 1, 2 et 5 cc. gaïacolées ou non gaïacolées. — Caps. glutinisées. — Sirop. — Suppositoires.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Anti-oxydant, Antithermique, Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses, Coqueluche.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 9 par jour, 3 à chaque repas. En injections intra-musculaires.

Adultes : 1 à 5 cc. par jour.

Enfants de 1 à 3 cc., suivant l'âge et le cas.

Sirop : *adultes* 4 cuillerées à soupe par jour ; *enfants* par cuillerées à café ou à dessert suivant l'âge.

Dans le traitement de la Coqueluche, émulsionner le contenu d'une ampoule dans 1/2 verre d'eau de guimauve et donner chaque jour en lavement à conserver.

Laboratoire LE BRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-34.)

EUCHOL INJECTABLE

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Composition. — Complexe actif retiré de l'extrait de *Cynara Scolymus Euchol* 0 gr. 15 par ampoules de 5 cc.

Nota. — Ce corps est l'un des principes actifs de l'*Euchol* qui se trouve dans le commerce sous forme de comprimés depuis de nombreuses années. Il a fait l'objet dans notre laboratoire d'une étude attentive d'extraction et de dosages définis, suivie d'une expérimentation physiologique rigoureuse d'abord sur cobayes et lapins, puis sur l'homme par plusieurs médecins des hôpitaux de Paris.

Provoquant des schoks à l'état naturel, ce corps a été légèrement modifié chimiquement et est devenu de ce fait tout à fait inoffensif tout en conservant ses propriétés thérapeutiques. L'extrait de *Cynara*, tel qu'il se trouve dans le commerce normalement, pourrait occasionner des désordres par injections.

Propriétés thérapeutiques. — Ce corps active les fonctions du foie par contact immédiat et sanguin avec cette glande.

Comme conséquence de son action tonique cellulaire hépatique, signalons l'élimination plus intense de l'urée sanguine et la diurèse uréique.

Il augmente le pouvoir dissolvant du sérum sanguin vis-à-vis du cholestérol et évite ainsi le premier stade de la sclérose des parois artérielles.

Indications. — Insuffisance hépatique à syndrome hépato-rénal ; Cirrhose avec ascite ; Cholémie familiale ; Lithiase biliaire et rénale ; Migraines hépatiques ; Hypercholestérolémie ; Hypertension ; Brightisme ; Petite urémie de Widal.

Posologie. — Une injection intramusculaire, en général tous les deux jours (prendre six comprimés d'*Euchol* pendant le jour intercalaire). Par voie intraveineuse, injecter seulement la moitié de l'ampoule.

Nota. — L'*Euchol injectable* peut être donné aussi par voie buccale ou en lavement.

Voie buccale.

Adulte : Une ampoule par jour.

Enfants : (Jusqu'à 10 ans) une 1/2 ampoule.

Voie rectale.

Adulte : Deux ampoules.

Enfants : Une ampoule (à ajouter à une décoction de guimauve).

L'*Euchol injectable* (remboursable par les Assurances Sociales) est fabriqué par le

Laboratoire MORELLET, à Bagnoles-de-l'Orne.

**J. MORELLET, ancien interne
des Hôpitaux de Paris.**

EUCHOL MORELLET

Comprimés.

Composition. — Extrait stabilisé sec de cynara. (artichaut), 0 gr. 30 par comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés :

Tonique hépatique cellulaire.

Cholérétique.

Décongestionnant des voies biliaires.

Abaisse le taux de l'urée dans le sang.

Lutte contre les dépôts tissulaires de cholestérine.

Diurétique puissant.

Remarque. — L'EUCHOL ne contient toujours que de l'artichaut. Il est le *premier* et il a été le *seul* jusqu'à fin 1933 à ne contenir que de l'artichaut.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à avaler par jour. Dose de 2 comprimés au moment des repas.

Indications :

Ictère catarrhal.

Cholécystite et angiocholite.

Toute insuffisance hépatique.

Cholémie familiale.

Cirrhose.

Lithiase biliaire et rénale.

Coliques

Congestions

Migraines

Constipation

Intoxications

Urticaire

Arthritisme

Cholestérinémie.

Etats uricémiques, hypertension.

d'origine hépatique.

Prix au public : 18 francs.

8 à 11 jours de traitement par boîte.

Enregistré sous le n° 336-1 au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (remboursable aux Assurances Sociales).

Laboratoire MORELLET

J. MORELLET, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
BAGNOLES-DE-L'ORNE (Orne).

EUGLYMA

Forme. — Solution titrée de chlorure de magnésium pur, de goût agréable.

Composition. — XXXV gouttes renferment 0 gr. 60 de chlorure de magnésium pur.

Indications. — Asthénies, Dépressions neuromusculaires, Dermatoses, Lésions du type pré-cancéreux, Prophylaxie du cancer, Affections dues au mauvais fonctionnement des voies digestives, biliaires et rénales.

Particularités. — Mauvais goût du chlorure de magnésium absolument masqué.

Posologie. — XXXV gouttes midi et soir, avant le repas dans un demi-verre d'eau.

Échantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamelis-Viburnum Gossypium.

Propriétés thérapeutiques. — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

L'Eugynol permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge. Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques. — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

Dose. — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 francs (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12, 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

EUNÉRYL

Médication de l'anxiété et des dystonies neuro-végétatives, antispasmodique et tonique.

Composition :

Phényléthylmalonylurée soluble.....	4 grammes.
Hyposulfite de magnésium.....	10 —
Extrait fluide d'Adonis vernalis.....	16 —
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.
X gouttes — 0,01 de phényléthylmalonylurée.	

Propriétés thérapeutiques :

La phényléthylmalonylurée, obtenue en Solution rigoureusement stable par un procédé spécial, est mieux assimilée et agit à doses plus réduites.

L'hyposulfite de magnésium, régulateur du tonus vago-sympathique, est un stimulant qui permet d'éviter la légère action dépressive de la phényléthylmalonylurée. De plus, grâce à l'antagonisme, existant entre le magnésium et le potassium, le magnésium procure la sédation des phénomènes d'hyperpotassiémie avec décharge d'adrénaline notés chez les émotifs.

Enfin, l'Adonis vernalis, en plus de ses propriétés cardiotoniques et diurétiques, exerce une action sédative sur certains centres moteurs cérébraux et médullaires régissant le système musculaire (Masslow).

Indications :

Dystonies neuro-végétatives, anxiété, hyperémotivité, instabilité, irritabilité, syndrome solaire, légères insomnies, cauchemars, convulsions, etc...

Formes. — Gouttes.

Posologie :

Adultes : L à LXXX gouttes par jour,

Enfants : XV à XXX — —
en trois fois avant les repas.

Prix. — Le flacon de 20 grammes (800 gouttes)
17 francs.

Laboratoires BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 61-61.)

EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications. — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiasse biliaire; Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — Pilules dosées à 0 gr. 03 d'Evonymine, de l'*Atropurpureus americanus*, et à 0 gr. 03 d'extrait de boldo — 1 à 4 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Prix : 9 francs.

Pour un traitement de 15 à 30 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél.: Gobelins 06-89.)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault*.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-2.

EUPAVÉRYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine
chimiquement pur.

Indications. — Spasmes viscéraux, Asthme, Coqueluche, Déséquilibres vago-sympathiques.

Présentations :

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

Adultes : de 0 gr. 05 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

Enfants : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Ampoules. Prix : 15 francs.

Gouttes. Granules. Prix : 20 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

(Tél.: Laborde 16-72.)

EUPEPTIQUE MONAVON

Composition. — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure	0 gr. 12
Diastase	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Digère les viandes et les féculents.

Avantages. — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

Indications. — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau. Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codéine 0,02 + Teinture rac. aconit 0 gr. 20 ; formiate sodique, 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indications thérapeutiques et posologie. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonies, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Prix : Sirop : 16 fr. — Prix : Pastilles : 7 fr. (8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,
4, avenue Orban.

EUPHORYL

Cachets, Dragées, Intraveineux.

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Indications. — a. *Dermatoses prurigineuses* : Eczémas secs et suintants Prurits, érythrodermies, dermites alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Psoriasis, toxidermatoses. Accidents de l'Aurothérapie.

b. *Manifestations anaphylactiques* : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladie sérique, Asthme, Rhume des foins, Coryza et toux spasmodiques, Chocs anaphylactiques.

Posologie. — *Cas moyens* : 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures. (30 cachets ou 50 dragées par boîte).

Cas aigus : 1 injection intraveineuse bihebdomadaire, avec prise de 2 cachets ou 4 dragées, les jours intercalaires.

Nota. — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Prix : Cachets : 18 fr. — Dragées : 15 fr. — Intraveineux : 30 fr., 18 fr.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 52-12.)

EUPHORYL-INFANTILE

(Granulé soluble)

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées. Anaphylaxie alimentaire.

Formule. — Hyposulfites alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — Granulé soluble de goût agréable facilement accepté par les enfants les plus jeunes (8 à 10 jours de traitement par boîte).

Indications. — L'Euphoryl-Infantile est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1^o *Dermatoses prurigineuses.* — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermites médicamenteuses, érythrodermies, toxi-dermatoses, strophulus. Prurits, herpès, trichophyties, pityriasis.

2^o *Troubles digestifs.* — Anorexies, Vomissements, État saburral des voies digestives, Intoxications alimentaires, Constipation des nourrissons, petite insuffisance hépatique.

3^o *Anaphylaxies.* — Urticaires, Migraines, Œdèmes de Quincke, Accidents sériques, Asthme, Rhume des Foins, Toux et coryza spasmodiques.

Posologie et mode d'administration. — L'Euphoryl-Infantile doit être prescrit à la dose de une cuillerée à café par année d'âge.

Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait. Chez les nourrissons, il se dissout aisément dans les biberons.

Prix : 18 francs.

Laboratoires ANA

18, Avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 52-12.)

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Crataegus oxyacantha.....	31	centigr.
Extrait fluide de passiflora incar-		
nata	50	—
Extrait fluide de Paullinia sorbilis	16	—
Extrait mou de Valeriana offici-		
nalis	12	—
Alcoolature de Ballota nigra.....	98	—

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications. — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses, Angoisse de la ménopause.

Propriétés thérapeutiques. — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballote. Elle est tonocardiaque par le *Crataegus oxyacantha*. Par la Passiflore, elle est sédatrice de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au *Paullinia sorbilis* (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 16-55.)

EUPLASTYL

Forme. — Pommade très pénétrante, demi-grasse, ne formant pas de croûte, et sans odeur.

Indications. — Calmant instantané de tout prurit ou douleur, antiseptique puissant, cicatrisant extraordinairement rapide.

Toutes lésions cutanées : ulcères, brûlures, eczémas secs, prurits, impétigos, etc...

Composition. — Huile de chaulmoogra, sulfo-ichtyolate d'ammoniaque, sulfate de cuivre, para-aminobenzoate de butyle, oxyde de zinc et de titane.

Mode d'emploi. — En couche épaisse sur la lésion.
Le tube normal : 5 francs.

Le triple tube pour dermatoses étendues ou rebelles :
14 francs.

La poudre EUPLASTYL, au prix de 5 francs la boîte, complète utilement l'action de la Pommade, très efficace pour le poudrage des bés, pour les dermatoses bénignes et pour la transpiration excessive.

Laboratoire SICA

R. MICHY, Pharmacien,

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Dose et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suite de la Grippe.

Prix : 16 fr. 50 (10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).
(Tél. : Galv. 86-17.)

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 16 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de
l'Eupnogénol.

F. VELLAY

Pharmacien de 1^{re} classe.

116, avenue Berthelot
VIENNE (Isère).

EUPNOL (Poudre et Pastilles)

Asepsie des muqueuses des premières voies respiratoires (nez et gorge).

Composition. — Menthol, terpinol, eucalyptol, essence de pin sylvestre, acide benzoïque.

Propriétés. — Décongestionnant, désinfectant non caustique, non toxique des fosses nasales, du pharynx et de la trachée.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie, rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites.

Mode d'emploi. — *a.* Poudre : 1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations, lavages et gargarismes.

b. Pastilles : Sucr 8 à 10 par jour.

Prix : Poudre, le flacon : 15 francs.

Pastilles : 5 fr. 50 la boîte.

L. N. C. 314-33 et 34.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 14-14.)

EUQUINARGOL

Formes :

Suppositoires dosés pour bébés et enfants.
— — — adultes.

Composition. — Euquinine, Analgésine, Collargol, Cinéol.

Propriétés. — Analgésiques, Antiseptiques.

Indications — Tous états fébriles, infectieux et pulmonaires.

Doses. — 1 ou 2 suppositoires par 24 heures, suivant la température.

Prix : *Bébés, enfants* : 10 francs.

Adultes : 12 francs.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

EURECTOL

(Pommade et Suppositoires.)

Indications. — Hémorroïdes, Prurit anal, Rectite, etc.

Composition. — *Extrait spécial d'Arum triphyllum* (nouveau spécifique vaso-constricteur à électivité hémorroïdale), hamamélis, marron d'Inde, orthoforme, stovaine et extraits biliaires.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnant. Calmant. Vaso-constricteur analgésique, antiseptique. Action rapide et sûre *loco dolenti*.

Dose et mode d'emploi. — Chaque soir, étant couché, introduire dans le rectum, soit de la pommade ou de préférence un suppositoire. Continuer pendant 8 jours. Interrompre une semaine. Terminer le traitement par une nouvelle cure de 8 jours.

Crises aiguës : Traitement matin et soir.

Traitement pour 8 jours : 13 francs.

Littérature et Échantillons.

Laboratoires J. PERROCHON
TOURS.

EURINASE (Pilules)

Composition :

Hexaméthylène tétramine	0,06
Benzoate de lithine	0,050
Chlorhydrate de tétraméthylthionine ...	0,002
Excipient dont Carbonate de magnésium.	Q. s. p. une pilule

Propriétés. — Antiseptique et désinfectant des voies urinaires, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Pyélite, pyélonéphrite, colibacillurie, cystite, prostatite, orchite, hypertrophie prostatique, catarrhe vésical, blennorrhagie chronique, pyurie, coliques néphrétiques, lithiase rénale, goutte, rhumatisme chronique, arthritisme, lumbago, colibacilliose.

Présentation. — Une boîte de 75 pilules : 20 francs, pour un traitement de 9 à 12 jours.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour.

Notices et Échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

EUSEDYL

Suppositoires.

Composition. — Association de : chl. de méthylcodéine 0,03 ; ext. de belladone, 0,01 ; bromhydr. de scopola-mine, 0,0002 ; phényléthyl-malonylhurée, 0,03, et d'oua-baine crist., 0,0005.

Indications. — Syndromes douloureux abdominaux et pelviens. Névralgies et Myalgies. Néoplasies. Dyspnée des asthmatiques et cardiaques. Grande et petite chirurgie.

Avantages. — Innocuité (peut être prescrit chez les insuffisants cardiaques).

Prescription facile (aucun produit du tableau B).

Administration aisée.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures (ne pas prescrire chez l'enfant).

Prix : 16 francs la boîte normale de six suppositoires.

48 francs la quadruple boîte.

Laboratoire de l'EUSEDYL,

32, rue des Vallées — COLOMBES (Seine).

Tél. : Charlebourg 02-45.

EUSKINE

1° *Crème EUSKINE* (Crème au Stéarate neutre).
Dermatoses irritables. Constitue une crème excellente d'entretien pour les peaux grasses. Remplace avantageusement la vaseline dans ses applications.

2° *Baume EUSKINE faible* (Pommade à l'Ichtyol et goudroline).

Dermatoses subaiguës, eczéma subaigu, eczématides, eczéma variqueux, eczéma anal et vulvaire, eczéma artificiel des mains.

3° *Baume EUSKINE fort* (Pommade au camphre, soufre, goudroline et ichtyol).

Dermatoses sèches, torpides, non inflammatoires. Eczéma chronique plus ou moins lichénifié.

Tubes de 10 francs.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis. — 1, rue d'Enghien
PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée.)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose. — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 francs.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Muscle cardiaque	0 gr. 50
Parenchyme rénal	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille	0 gr. 06
Scammonée	0 gr. 04

Pour un comprimé.

Doses et mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension qu'il compense en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

Prix : 20 francs.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

ÉVATMINE CARRION

Médication adrénalino-hypophysaire de l'asthme.

Composition. — Solution injectable renfermant 1 demi-milligramme d'adrénaline naturelle, associée à l'extrait d'hypophyse.

Forme. — Ampoules de 1 cc.

Indications. — Crise d'asthme, Toux spasmodique.

Contre-indication : hypertension notable.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire au moment des crises 3 à 4 ampoules dans les 24 heures s'il est besoin S'assurer que l'injection n'est pas poussée dans un vaisseau.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules 1 cc. : 15 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ÉVINE

Poudre soluble Évine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, détersive, décongestionnante, sédative, cicatrisante, non caustique. Ne tache pas.

Indications. — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

Posologie. — 1° Hygiène féminine : 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3° Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4° Hygiène masculine : 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5° Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions compresses).

Ovules Évine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36°,5. Ne tachent pas.

Indications. — Toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Évine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever.

Prix : Poudre : 14 francs. — Ovules : 16 francs.

Laboratoires ÉVINE

15, boulevard des Batignolles — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 35-63.)

ÉVOLAXINE

(Le laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoides ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaires, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatoses, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences,

Ancien Chef de Laboratoire

à la Faculté de Médecine de Paris.

4, rue de Bellechasse — PARIS. (Tél. : Littré 97-95.)

ÉVONYL

Composition. — Extraits biliaires de glandes intestinales, Évonymine, Fucus, agar-agar, ferments lactiques, podophyllin, phénolphtaléine, etc., en milieu ergostérique irradié donnant à la synergie médicamenteuse un coefficient supérieur pour sa valeur thérapeutique.

Propriétés. — Laxatif doux, absolument certain. Cholagogue de premier ordre. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

Indications. — Constipation aiguë ou chronique. Insuffisance hépatique, cholécystites, lithiases biliaires, hypertension.

Forme. — Tablettes dragéifiées.

Posologie. — *Adultes* : Deux tablettes le soir au repas (à avaler sans mâcher).

Enfants : Une tablette.

Prix au public : 15 francs pour un mois.

Laboratoires FLUXINE

J. BONTHOUX, Pharmacien

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

EXENTÉROL

Composition. — Pansement-vaccin intestinal constitué par le mélange extemporané d'une ampoule de vaccin, (contenant 65 milliards de bacilles coli, entérocoques, Gärtner, Proteus, Fæcalis, Lactis) et d'une mesure de granulé mucilagineux spéciaux.

Présentation :

Adultes : boîte de 8 ampoules de 10 cc. et 8 doses de granulé mucilagineux : 24 francs.

Enfants : boîte de 8 ampoules de 5 cc., et 8 doses de granulé mucilagineux : 18 francs.

Propriétés. — L'*Exentérol* assure un contact prolongé du vaccin et de la muqueuse. Il favorise d'autre part l'acheminement des matières fécales, évitant ainsi les fermentations intestinales qui accroissent l'infection.

Indications. — Entérites, entérocrites, infections intestinales, syndromes entéro-rénaux, colibacillooses, auto-intoxication.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour.

Échantillons.

Laboratoires du D^r DEBAT,

60, rue de Monceau — PARIS.

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

EXHEPA

Extrait de foie en poudre.

Indications. — Anémie pernicieuse et autres genres d'anémie grave, Tuberculose, Convalescence.

Forme. — Tubes contenant l'équivalent de 100 grammes de foie frais.

Boîtes de 5, 10, 20 tubes.

Mode d'emploi. — Délayer la poudre dans un liquide froid ou mieux tiède, mais jamais bouillant.

Posologie. — De 1 à 4 tubes par jour suivant les cas.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France : **Jean DEDIEU**

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

EXOBOL

Guérison de la constipation.

Deux formes : **Emulsion, Comprimés.**

1^o Forme émulsion. — Emulsion d'huile de paraffine pure, de goût extrêmement agréable, d'action certaine.

Ne produit aucune action irritante, aucun suintement.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour à prendre au milieu des repas.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

2^o Forme comprimés. — Mucilages, extrait spécial de foie, boldo et diacétyldioxyphénylisatine, action sûre, ne provoquant pas de coliques, ni d'accoutumance.

Posologie. — 1 à 4 comprimés au milieu du repas du soir ou avant de se coucher.

Enfants : moitié ou tiers de ces doses.

Prix : Forme émulsion.

Le grand flacon	22 fr.
Le moyen flacon	13 fr. 50
Le petit flacon	7 fr. 50

Forme comprimés. Le flacon : 13 francs.

Établissements MOUNEYRAT

VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

EXSUGYL

du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum per-oxydatum (titre 50), Amylun tritici, Pulvis diatomei, Talcum.

Propriétés. — Poudre éminemment absorbante, anti-prurigineuse, microbicide.

Indications. — Eczémas suintants rebelles, toutes dermatoses avec exosérose, Dermite par irritation.

Mode d'emploi. — Sous forme de compresses de gaze matelassées d'*Exsugyl* dans les affections suintantes.

Demander les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

EXTENSOPLAST

Albuplast élastique.

Bandes adhésives extensibles en *largeur* ou en *longueur*, recouvertes d'une masse adhésive identique à celle de l'Albuplast.

Se présentent en bandes de 1 mètre ou 2 m. 50 de long et de toutes largeurs de 2 à 30 centimètres de large.

Peuvent être livrées :

1° Entièrement enduites	{	extensibles en <i>largeur</i> ou en <i>longueur</i> .
2° Partiellement enduites (striées) ..		
3° Perforées		

Indications. — Traitement des ulcères variqueux. Pansements aux articulations. Prévention et traitement de luxations, entorses. Renforcement des articulations (sports d'hiver).

Le type extensible en largeur se prête particulièrement à l'utilisation dans les cas ci-dessus.

Dimensions les plus usuelles : 1 m. \times 3, 1 m. \times 5, 1 m. \times 7, 2^m,50 \times 5, 2^m,50 \times 7, 2^m,50 \times 10 cc.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
(Tél. : Péreire 57-41.)

EXTRAIT DE BILE LEFRANCO

Composition. — Extrait sec et soluble de bile de bœuf intégrale, concentrée dans le vide et à froid.

Action. — Les extraits biliaries possèdent une double action :

Hépatique : « Les vrais cholagogues et les meilleurs sont la bile et les sels biliaries ». (Professeur Læper).

Intestinale : La bile agit sur la motilité de l'intestin et sur les sécrétions, elle favorise la formation du bol fécal et son évacuation.

Indications :

Constipation : Par sa double action, l'extrait de bile réalise le drainage hépato-intestinal idéal ; c'est le laxatif physiologique par excellence, le seul qui ne soit pas irritant pour la muqueuse. Constipation atonique avec hypocholie.

Insuffisance biliaire : Inappétence, nausées, pesanteur épigastrique et asthénie postprandiale.

Présentation. — Globules glutinisés dosés à 0,10 d'extrait sec de bile totale correspondant à plus de dix fois son poids de bile fraîche.

Prix : la boîte de 60 globules : 15 francs.

Posologie. — 6 à 12 globules par jour, de préférence 10 à 15 minutes avant les repas.

Laboratoires de la CARNINE LEFRANCO

ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52).

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15, verre compris.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

EXTRAIT HAMYD

Composition. — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

Propriétés. — Vaso-constricteur. Décongestif pelvien et vasculaire. Sédatif gastrique.

Indications. — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies réflexes.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau 1 ou 2 fois par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

EXTRAIT HÉPATIQUE LEFRANÇO

Composition. — Extrait intégral de tissu hépatique desséché dans le vide et à froid. Seul extrait renfermant les globulines actives du tissu hépatique et les principes antitoxiques du foie.

Indications. — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses auto-toxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques...
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie, purpura...
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses.

Présentation. — Globules glutinisés, dosés à 0 gr. 25 d'extrait correspondant à plus de dix fois son poids de tissu hépatique.

Prix : La boîte de 40 globules : 21 francs.

Posologie. — 4 à 8 globules par jour, au cours des repas de préférence.

Laboratoires de la **CARNINE LEFRANÇO**

ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

FA-NER-VAL

Facit-nervum-valldum.

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Granulé.

Composition. — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

Indications. — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

Doses habituelles. — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Prix : 19 fr. 80 pour 8 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 25-51.)

FANGO-FISCH

Forme : présenté :

En poudre et ramené à l'état de boue par addition d'eau. Sous forme de Cataplasme prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

En application directe sur la peau à des températures variables. Par applications du cataplasme amené par immersion dans l'eau bouillante, à la température appropriée.

Indications. — Affections chroniques douloureuses musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

Contre-Indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Présentation et prix :

En paquet de : 1 kg. 500 : 16 francs. 4 kg. 500 : 45 francs.

Pour Clinique et Hôpitaux, prix spéciaux sur demande, par 100, 1.000 kilogs, etc.

En cataplasme :

A = 15 x 40 cm. (rectangulaire) 20 francs.

B = 25 x 40 cm. (rectangulaire) 25 francs.

C = 20 x 40 cm. (rectangulaire) 25 francs.

Centre d'Applications à Paris.

« Au Centre Français de Médecine et de Chirurgie »

12 rue Boileau — PARIS (XVI^e).

(Renseignements sur demande.)

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

(Tél. : Lamartine 92-52.)

FANTINE ADOUE

Composition. — Farine alimentaire. Non étuvée. Vivante. Cuticule, Embryon, Phosphore végétal. Ni lactée, ni maltée, sucrée.

Vitamine B. — La cuticule du grain contenue dans **Fantine Adoue.**

1° Agit comme « facteur de l'appétit ».

2° Evite l'Amidonisme. L'amande du grain n'est bien assimilée qu'en présence de cuticule.

3° Evite les carences salines.

4° Evite la carence en cellulose (constipation).

Variété. — Nous changeons les farines à chaque fabrication. 16 formules qui passent successivement, évitant l'accoutumance et l'inappétence.

Deux formes. — Sans vous inquiéter de cette succession formulez simplement :

Ou **Fantine Adoue sans cacao.**

Uniquement céréales. *Nourrissons.*

Ou **Fantine Adoue légèrement cacaotée.**

Céréales et légumineuses. Enfants, Femmes enceintes et nourrices, Vieillards, Tuberculeux.

Pharmacies: La boîte : 8 fr. 75.

FANTINE ADOUE

36 bis, rue Scaliger — BORDEAUX.

(Téléphone : 64-53).

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates,
Blutées au minimum.

Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

Farines de Fruits :

Farine de Châtaignes, Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'Orge.

Rapidoats : Petits flocons d'Avoine. Cuisson 5 minutes.

Blokao : Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

Riz — Tapiocas — Féculs — Arrow-Root.

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

Laboratoire des Établ. AUG. BLOCH et FILS

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).

Fondés en 1811.

Médaille d'or : Paris 1867-1878-1892. — Bruxelles 1888.

FÉCULYSE HEUDEBERT

Composition. — Diastases actives de céréales associées à une protéine alimentaire neutralisant l'acidité stomacale.

Formule : Pouvoir diastasique Caséine..... 1,2
Matières azotées..... 13,3
Matières minérales Cl Na 3,3
Lactose..... 55,2

Excipient aromatisé au café. Q. S. pour 100 grammes.

Principe. — 1° Faire digérer les hydrates de carbone en suppléant, par l'action des diastases, à la déficience partielle ou totale du ferment salivaire ;

2° Diminuer l'acidité gastrique en excès et permettre à la diastase son action maxima.

Indications. — Dyspepsies des hydrates de carbone, hyperchlorhydrie, flatulence, fermentations intestinales, suralimentation (tuberculeux, nourrices). Régimes post-opératoires, Mastication insuffisante résultant d'une dentition défectueuse.

Mode d'emploi. — La FECULYSE se prend dans un liquide chaud (50° environ) ou froid, tel que : café, lait, infusion (menthe de préférence) ou eau.

Doses : *Adultes* : Au petit déjeuner et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à soupe.

Dans les cas d'Hyperchlorhydrie : prendre une cuillerée à dessert avant et après chaque repas et au moment des crises.

Enfants : Le matin et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à café — ou plus, selon l'indication du médecin.

Prix : 15 francs

Laboratoires HEUDEBERT Fils

Charles HEUDEBERT Fils, Pharmacien

4, rue Lamartine — NANTERRE (Seine).

FÉLAMINE

Association d'acide cholique cristallisé pur et d'hexaméthylène-tétramine.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 0 gr. 30.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par hypocholie, insuffisances hépatiques.

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1° Cas aigus et subaigus : 3 à 6 dragées ; 2° Cas chroniques : 3 à 4 dragées par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

Prix du flacon de 50 dragées : 20 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

FÉLISÉDINE

Médication synergique complète, à la fois régulatrice et sédative, des Dystonies du Sympathique et des Insomnies.

Formule:

Extrait de Cratægus	0,05
Chlorhydrate de Papavérine	0,01
Phényléthylmalonylurée	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Extrait de Boldo	0,01
Extrait d'Anémone.....	0,03
Extrait de Valériane stabilisée	0,05
par comprimé.	

Indications. — *Nervosisme, Emotivité, Etats anxieux, Psychasthénie, Surmenage, Troubles cardiaques, Palpitations, Tachycardie, Troubles de la Ménopause, Insomnies.*

Posologie:

- 1° Comme équilibrant du système nerveux : 2 à 6 comprimés par jour.
- 2° Contre l'insomnie : 2 à 4 comprimés le soir.

Laboratoires du Docteur LAVOUE
RENNES

FÉMINADÈNE

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phényléthylmalonylurée.

Indications. — *Nervosité féminine dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale.*

Anxiété, émotivité, dépression, subagitation, insomnies, etc...

Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches.

Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

Doses. — 4 dragées par jour, en moyenne.

Prix de la boîte : 22 francs.

(Pour un traitement de deux semaines.)

Laboratoires du FÉMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

FENUCALCIUM

Forme. — Cachets.

Formule. — Hémoglobine, Phytosphosphine, Protosalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhénal, 0,015, Poudre de Fenugrec.

Indications. — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, Etats pré-tuberculeux.

Posologie. — Un cachet au début des trois repas. Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-4.

Prix : 20 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71.)

FENUCINE

Fenugrec traité spécialement et sans odeur.....

Céréalophosphates de Ca et Mg.....	0,90 par cachet
Poudre d'os frais total.....	0,15 ou
Nucléinate de Manganèse	0,15 cuillerée
	0,02 de granulé.

Propriétés. — Stimulation de l'appétit. Action puissante sur le métabolisme. Fonction hématopoïétique. Recalcification.

Indications. — Anémies, Asthénies, Perte de poids, Diabète, Grossesse, Lactation.

Aucun produit toxique, aucun extrait glandulaire. Donc aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 30 cachets ou granulé.

Posologie. — 3 cachets par jour au milieu des repas, ou 3 cuillerées à café de granulé. Dose pouvant être doublée.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LAMBERT

Place du Châtelet — ORLÉANS.

Tél. : 34-50.

FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécithine, calcium, fer et manganèse organiques.

Propriétés. — Stimulant puissant de l'appétit. Agent d'augmentation de poids. Producteur d'énergie et de forces.

Indications. — Tous les cas d'amaigrissement : maigreur habituelle, amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, amaigrissement chez les nerveux, stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Mode d'emploi. — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'élixir.

Dose journalière moyenne : 4 cachets ou dragées pour les adultes. : *Elixir* : 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants, 2 cuillerées à soupe pour adultes. *Granulé* : 2 à 4 cuillerées à café pour les enfants.

Boîte de 100 cachets. Boîte de 36 cachets.

Tube de 50 dragées. — Elixir. — Granulés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

FENUROBUR

Cachets et granulé.

Puissant agent de l'augmentation du poids, excitomoteur et reconstituant.

Formule :

Fénugrec désodorisé.....	0,90
Poudre de rate	0,014
Poudre de surrénale	0,002
Oxyde de magnésium.....	0,083
Pour 1 cachet n° 50 ou 10 gr. de granulé.	

Mode d'emploi. — 3 à 6 cachets par jour au milieu des repas.

Granulé : 3 cuillerées à café par 24 heures pour les enfants, 3 cuillerées à soupe par 24 heures pour les adultes.

Amaigrissement, Convalescences, Asthénies, Croissance.

Prix :

18 francs la boîte de 50 cachets.

16 francs le flacon de granulé.

Durée moyenne de la boîte vente : 15 jours.

Échantillons et littératures.

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS.

(Tél. : 15-56.)

FER BRAVAIS

Assurances Sociales.

Accepté par la Commission.

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 100 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

Propriétés thérapeutiques. — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang) ; donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (I goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée.

Examen du sang avant et après le traitement par le Fer Bravais.

(Moyenne de très nombreux cas.)

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminu- tion.
Globules rouge.	3.500.000	4.500.000	30 %	10 %
Globules bl ..	7.150	6.500		
Hémoglobine.	60 %	85 %	40 %	

Prix : 22 francs le flacon pour un mois.

15 francs le 1/2 flacon pour 15 jours.

Lab^{res} C^{te} René de GRAUWE, ,

Pharmacien de 1^{re} classe,

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

FERMENTERYL

(Comprimés)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base d'extract de bardane stabilisée, Entérokinase, Levure de bière, Ferments lactiques, Bioxyde d'étain et d'Orthoxyquinoléine.

(Boîte de 50 comprimés.)

Propriétés. — Dépuratif, régulateur de la leucocytose, antiseptique bactéricide et antitoxique, modificateur du milieu intestinal.

Indications. — Intoxications intestinales. Troubles généraux d'origine digestive ou infectieuse, asthénie, colibacillose. Troubles cutanés : Furoncles, anthrax, folliculites, urticaire, etc.

Mode d'emploi. — 6 à 9 comprimés par jour (2 à 3 au début de chacun des trois repas).

Pour les enfants : 3 à 5 comprimés par jour.

Prescription : 1 boîte comprimés FERMENTERYL.

Les Laboratoires A. FALVY

Pharmacien, Licencié ès sciences,

Ex-interne Lauréat des hôpitaux de PARIS.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

FERMENTS LACTIQUES FABRE

Comprimés.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés : 150 millions par comprimés, excipient 0 gr. 320.

Doses. — 9 à 10 comprimés par jour.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, Entérites, Dermatoses, Constipation.

Présentation. — Boîtes de 3 étuis de 10 comprimés chacune.

Prix : 10 francs.

Laboratoires FABRE

33, rue de la Haie-Coq — AUBERVILLIERS
(Seine). (Tél. : Flandre 21-40.)

FERMENTS LACTIQUES FABRE

En cultures pures.

Composition. — Sur lait écrémé, stérilisé ;
8 à 10 milliards de ferments lactiques sélectionnés par centimètre cube.

Traitement des Infections intestinales aiguës et chroniques et de toutes leurs conséquences.

Cas aigus : 2 à 3 flacons par jour.

Cas subaigus : 1 flacon par jour.

Désinfection intestinale : 1 flacon 3 jours par semaine.

Prix :

La boîte de 7 flacons 35 fr.

La boîte de 3 flacons 15 fr.

Laboratoires FABRE

33, rue de la Haie-Coq — AUBERVILLIERS
(Seine). (Tél. : Flandre 21-40.)

FEROGYL

Composition. — A base de composés ferriques, extrait de fèves de Saint-Ignace et traces d'arsenic.

Propriétés. — Fortifiant sans alcool, ne constipe pas.

Indications. — Anémies, asthénie, amaigrissement, déminéralisation, rachitisme, scrofule, tuberculose.

Aucune contre-indication.

Prix : 18 francs.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe, matin et soir avant les repas. *Enfants* : 5 à 10 ans : 1 cuillerée à café, 10 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir, avant les repas.

Laboratoire Central de la Bastille
3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 38-31.)

FER-OVARINE VITALIS

(Pilules)

Contre anémie et insuffisance ovarienne.

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Indications. — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée, Anorexie.

Deux pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois. Prix : 16 francs la boîte.

FERANDRINE VITALIS

(Dragées) 2 à 5 par jour.

Composition. — P. orchitique, fer, manganèse, hypophyse.

Indications. — Infantilisme, troubles de la puberté, Fatigue de l'adolescence, Paresse intellectuelle, Impuissance en général, Énurésie, etc...

Chez la femme : Carence sexuelle, Troubles complexes des femmes privées de maternité, ménopause. La Férandrine chez la femme est une médication de remplacement.

Prix : 16 francs la boîte.

Échantillons et notices documentaires.

Laboratoires BEAULIEU

40, bd de Charonne — PARIS; — (Tél. : Diderot 34-55.)

FERROPHYTINE

CIBA

Phosphore organique et fer colloïdal.

Sel ferrique neutre colloïdal de l'acide inosito-phosphorique, contenant fer (7,50 %) et phosphore (6 %) sous une forme très assimilable.

Stimulant de l'hématopoïèse et de la nutrition —

Médicament type des états anémiques et chloroanémiques accompagnés de dénutrition.

Parfaite tolérance.

Indications. — Toutes affections déglobulisantes.

Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Doses. — *Adultes* : 1 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

Boîte de 30 cachets.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

FERROXYLINE

Hémostatique à base de Ferripyrine.

Formes :

1° Gaze imprégnée stérilisée à 120°, pliage accordéon, en boîtes de fer scellées.

Pour les opérations d'O. R. L., gaze spéciale de 1 m. \times 0,015 à prescrire sous le nom de « FERROXYLINE O. R. L. ».

2° Ouate imprégnée non stérilisée.

Indications :

Gaze : soit en chirurgie, soit en O. R. L., soit en gynécologie, assure une hémostase instantanée sans adhérer à la plaie.

Ouate : petites plaies hémorragiques, épistaxis.

Laboratoires ÉPARVIER

26, Grande-Rue, Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

FERYDAL

Composition. — Fer colloïdal assimilable.

Deux formes. — *Enfants, Adultes.*

Indications :

Enfants : Anémie du nourrisson et de la seconde enfance, Anorexie, Nervosisme, Insomnie, Convalescences.

Adultes : Anémies, Paludisme, Hémorragies, Grossesse, Traitement ferrique pré-natal, Convalescences, Dépressions nerveuses, Prurit.

Doses :

Enfants : A donner aux tétées ou aux repas : de 6 mois à 18 mois : 2 à 3 cuillerées à café ; de 18 mois à 3 ans : 3 à 4 cuillerées à café. A partir de 3 ans : 2 cuillerées à dessert.

Adultes : Adolescents : 2 cuillerées à dessert ; *Adultes* : 2 cuillerées à soupe.

Le FERYDAL se prend pur, ou dans un peu d'eau gazeuse (eau de Seltz, limonade) au début des repas.

Enfants : Prix : 16 francs.

Adultes : Prix : 18 francs.

Durée moyenne du traitement de l'unité de vente :

Enfants : 10 à 15 jours. — *Adultes* : 9 à 12 jours.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charraas — CLERMONT-FERRAND.

FILHOSA

Pâte escharotique de FILHOS

Traitement de la métrite endocervicale.

Pâte homogène non grasse ayant toutes les propriétés déshydratantes du caustique de Filhos (chaux vive : 1 ; potasse caustique : 5).

Facile à manier et de conservation indéfinie.

Guérit les endocervicites chroniques les plus rebelles.

Evite la sténose consécutive à la cautérisation au crayon comme celle produite par un fragment détaché et abandonné dans la cavité cervicale.

Permet au malade de continuer ses occupations.

Seul traitement local indiqué après les applications : injections vaginales avec les comprimés :

GYNOSTER.

Laboratoires Robert COLAS

133, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

FILTRAXYL

Pâte-vaccin pour massage des gencives, à base de filtrats microbiens de streptocoques, staphylocoques, entérocoques, bacilles pyocyaniques, provenant d'infections buccales.

Traitement des Pyorrhées aiguës, Stomatites, Gingivites tenaces.

En massage des gencives 3 fois par jour.

Prix. Le tube : 9 fr. 50.

L. N. C. M. N° 574-6.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS.

FIXASE

Reminéralisateur effectif.

Présentation. — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

Composition. — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice *sous forme utilisable.*

Posologie. — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

Indications. — **Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.**

Prix : 12 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-1.

FIXASE IRRADIÉE

(Fixase + Vitamine D cristallisée.)

Titrée à 1000 unités internationales par *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

Poudre : Même posologie que la FIXASE.

Cachets : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour.

Enfants : 1 à 2 par jour.

Prix :

Poudre : 18 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Cachets : 20 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 10 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 342-3 et 4.

Laboratoire PARET

28. (ex 22) rue Guibal — MARSEILLE.

FIXOPHOS

Reminéralisation, Reconstitution organique. Rétablissement de l'équilibre du système nerveux.

Composition. — Un cachet FIXOPHOS contient : Arrhénal : 0 gr. 01 ; Inosito-hexaphosphate de calcium et de magnésium : 0 gr. 15 ; Phosphate bicalcique : 0 gr. 20 ; Glycéro-phosphate de calcium : 0 gr. 15 ; Phosphate de magnésium : 0 gr. 04 ; Hydroxyde de magnésium : 0 gr. 10 ; Sulfate de manganèse : 0 gr. 05 ; Protoxalate de fer : 0 gr. 05 ; Extrait sec de quinquina rouge : 0 gr. 08 ; Quinquina jaune pulvérisé : 0 gr. 05 ; Noix vomique pulvérisée : 0 gr. 01 ; Rate desséchée et pulvérisée : 0 gr. 05 ; Parathyroïdes desséchées et pulvérisées : 1 milligr. ; Chlorate d'adrénaline naturelle, un dixième de milligr.

Formes :

Cachets (en boîte de 30). Prix au public 22 fr. 50

Granulé. Prix au public 18 fr. 60

Indications. — Dénutrition, Faiblesse générale, Surmenage, Phosphaturie, Convalescence, Croissance, Neurasthénie, etc. Toutes maladies par carence. Toutes déficiences du système nerveux.

Posologie. — Doses moyennes :

Adultes : 2 à 3 cachets par jour, 4 à 6 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 1 cachet par jour, 2 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Un cachet correspondant à deux cuillerées à café de granulé.

J. SALMON, Pharmacien de la Faculté de Paris,

151, rue de Charenton — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 40-83.

R. C. Seine 378-645.

FLAVUROL

Dibromoxymercuri fluorescéine

Antiseptique puissant

Pommade à 1 %. — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma, Eczémas infectés, Staphylococcies cutanées, Sycosis, Balanites, Ulcérations de toute nature.

Solution à 2 %. — Désinfection pré-opératoire, Absès, furoncle, anthrax, ulcérations de toute nature, plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules, otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auriculaires, etc...

Solution à 1 %. — Traitement des urétrites, cystites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie obstétricale, Ophtalmologie.

Crayons, bougies et ovules à 1 %. — Traitement des métrites et des vaginites.

Bougies à 1 %. — Traitements des urétrites aiguës et chroniques, des rétrécissements de l'urètre, des prostatites.

Pilules. — Traitement des colibacilloses, diarrhées et toutes infections intestinales.

Le tube de pommade 1 % Prix public 9 fr. 50

Le flacon solution 1 % — 18 fr.

Le flacon solution 2 % — 10 fr.

La boîte de 6 crayons 1 % — 18 fr.

La boîte de 6 bougies 1 % — 18 fr.

La boîte de 6 ovules 1 % — 20 fr.

Le flacon poudre de 2 grammes. Prix au pharmacien. 7 fr. 50

Le tube de pilules 12 fr. 50

Produits STÉNÉ

14, rue des Guillemites — Paris (IV^e).

FLÉTASE

Succédané de l'Huile de Foie de Morue particulièrement riche en Vitamine A. Huile de Foie de poisson raffinée, présentée sous forme de solution huileuse (25.000 unités intern. de Vit. A par cm³.)

Indications :

Enfants : Croissance retardée ou insuffisante. Troubles digestifs, anorexie, états ganglionnaires, infections chroniques du rhino-pharynx et des bronches.

Adultes : Convalescences, Grossesse, Anémie.

Présentation et Posologie. — Flacons de 10 cm³.

Enfants au-dessous de 5 ans : I à V gouttes par jour.

Enfants à partir de 5 ans : V à X gouttes par jour.

Adultes : X à XX gouttes par jour.

Prix de vente :

Le flacon : 12 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FLÉTOBIOL

Composition :

Complexe : d'huile de foie de Flétan (Halibut) (vitamines A et D), biologiquement activée par un apport de vitamine D naturelle; d'extrait de Malt (vitamine B); de jus d'orange et de citron concentrés (vitamine C).

Le Flétobiol comporte des teneurs en vitamine A (minimum 500 unités internationales par cc.) et en vitamine D (minimum 100 unités internationales par cc.) lui conférant des effets de croissance et antirachitique *au moins équivalents à ceux d'un volume égal d'huile de foie de morue.*

Avantages :

Le Flétobiol est supporté sans inconvénient par les estomacs les plus délicats.

Est absorbé avec plaisir par les enfants et les adultes, grâce à son goût très savoureux.

Peut et doit être pris à toute époque de l'année.

RECONSTITUANT COMPLET

(Vitamines A, D, B, C.).

« Flétobiol » remplace l'huile de foie de morue et ses succédanés.

Indications :

Enfants : Croissance difficile, troubles de la dentition, rachitisme, manque d'appétit, rhumes, convalescence après maladies de l'enfance, etc.

Adultes : Anémies, convalescence, prétuberculose, grossesse, etc.

Posologie :

Enfants : de 1 à 3 ans : une cuillerée à café par jour;
de 3 à 5 ans : deux cuillerées à café par jour : ensuite :
une à deux cuillerées à dessert par jour

Adultes : 2 à 3 cuillères à dessert ou à soupe par jour.

Prix : 17 fr. 50.

(Flétobiol est employé dans la plupart des hôpitaux de Paris et de province.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 442-7.

Le produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances Sociales.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire du FLÉTOBIOL

DARRASSE, Pharmacien,

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 84-40.)

FLORHÉPATINE

Calmant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

Composition. — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

Indications. — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

Mode d'emploi. — *Crises légères* : 1 à 4 verres à madère par 24 heures ; se prend pure ou additionnée d'eau simple ou minérale avant ou après les repas.

Crises aiguës : Il est indispensable de prendre 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à cessation des douleurs.

Enfants : 1/2 dose.

Flacon de 500 cc. Prix : 16 fr. 75.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

FLOR-PEYOTL

Régulateur du grand sympathique. Antispasmodique parfait tout en étant un stimulant des systèmes nerveux et musculaire.

Thérapeutique certaine du déséquilibre du sympathique, des états chroniques du système nerveux sous toutes leurs formes, en un mot des états neuro-musculaires déficients : dépression, neurasthénie, myasthénie, mélancolie, fatigue, états spasmodiques et anxieux, nervosisme, insomnie, au début de cardiaques.

Toni-sédatif de choix sans accoutumance, sans accumulation, sans toxicité.

Composition :

Extrait fluide à P. E. de Peyotl.....	35
— — — Passiflore	20
Teinture de Cratægus	10
Excipient. Q. S. pour.....	100

Posologie. — Suivant l'âge et la gravité de l'affection, de X à L gouttes dans un peu d'eau, au début de chacun des trois repas.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Présentation. — Flacon de 30 grammes. Contient pour environ 15 jours de traitement.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du Docteur L. LAFAY

LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens

54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence — PARIS (IX°).

Tél. : Trinité 21-06.

FLUASE

(Gouttes.)

Composition. — Extrait fluide d'Hamamelis, d'Hydrastis, de *Cimicifuga racemosa*, de Marron d'Inde stabilisé, Teinture de noix vomique.

Mode d'action. — Tonique et stimulante par sa Noix Vomique, Vaso-constrictive par son Hamamélis et son Hydrastis, Analgésiante par son Marron d'Inde et son *Cimicifuga*, qui est en même temps un bon toni-cardiaque.

Indications thérapeutiques. — Stases sanguines, Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause et de la puberté, Ménorrhagies, Métorrhagies, Dysménorrhées, Aménorrhées, Douleurs utérines, Métrites.

Doses et mode d'emploi. — XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin sucrés avant les principaux repas.

Dans les états aigus, augmenter les doses jusqu'à XXX gouttes trois fois par jour.

Prix du flacon pour un mois et demi de traitement :
15 francs.

Laboratoire ARDISSONE-GAYRAUD

ALLAUCH (Bouches-du-Rhône).

FLUDIOSE

à l'Iodure de Manganèse.

Composition :

Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Forme pharmaceutique :

Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications :

Lymphatisme, Rachitisme, Prétuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo.

Mode d'emploi et doses :

En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cgr. 25 d'iodure de manganèse pur et 2 mmgr. 5 de méthylarsinate de soude.

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.

Par son Iodure de Manganèse, la « Fludiose » dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Pas d'iodisme.

Pas de constipation.

Prescrire : *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 15 francs.

Laboratoire de MÉDECINE

EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).
(Tél. : 0-50.)

Échantillons et littératures à la disposition
de MM. les Docteurs.

FLUIDOBILE

Composition. — Comprimés à base des extraits suivants : Feuilles d'Artichaut-Biliaire-Boldo-Cascara-Chardon Bénit-Belladone.

Indications. — Insuffisances hépatiques, Insuffisances biliaires, Coliques hépatiques, Ictères, Lithias biliaire, Congestion du foie.

Migraines, Urticaire, Arthritisme, Maladies de la Peau, Constipation chronique, Hémorroïdes.

Doses et mode d'emploi :

Maladies du Foie. — 1 à 2 comprimés à la fin des deux principaux repas.

Migraine, Urticaire. — 1 à 2 comprimés dès la sensation de malaise.

Constipation chronique. — 2 comprimés le soir en se couchant et, si besoin est, un autre comprimé le matin à jeun.

Maladies de Peau, Hémorroïdes, Arthritisme. — 1 à 2 comprimés le matin à jeun.

Prix au public : 14 francs.

Enregistré au Lab. Nat. de cont. des Médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

FLUOBYL

Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Composition. — Lactosérum ; Citrate de Magnésie ; Peptone de Fibrine sèche.

Indications. — Drainage des voies biliaires. *Maladies du foie* : Ictères ; Cholécystites ; Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie : 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher dix minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Suivre le traitement deux semaines par mois.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.

Tél. : Maillot 17-75.

FLUODYLE

Forme : AMPOULES.

Chaque ampoule renferme :

Fluorure de sodium.....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 12 francs.

Forme : GRANULÉ.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 12 fr. 50.

Établissements **SABATIER**

A. EMPTOZ, Pharmacien

10, rue Pre-Ducreux - PARIS (XVI^e). (Tél. : Auteuil 06-40.)

FLUOKOL

Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe.

Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

Propriétés. — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

Indications. — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.). Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation. Toutes intoxications.

Doses et mode d'emploi. — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Prix : 17 fr. 50 la boîte pour 10 à 15 jours de traitement.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire). (Tél. : 38.)

FLUOSALYL BEAUGOURDON

Formule. — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

Propriétés. — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

Usages. — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

Emploi. — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Prix : Liquide : 16 fr. — Pâte : 7 fr. 50. — Brosse : 12 fr.

Laboratoires BEAUGOURDON, pharmacien.

43, avenue Kléber - PARIS (XVI^e). — (Tél. : Passy 83-68.)

FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

Principes actifs. — Sulfonate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

Indications. — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

Dose. — XXV gouttes 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT

à GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grésillons 05-21.)

FLUVIA

(Comprimés hypotenseurs.)

Composition. — Principes hypotenseurs, extraits du *Rhamnus Alaternus* L.

Propriétés. — Médicament exclusivement végétal et atoxique.

Action hypotensive durable contrôlée physiologiquement.

Amélioration considérable des troubles fonctionnels.

Indications. — Hypertension artérielle simple ou compliquée d'insuffisance ventriculaire gauche, d'insuffisance rénale.

Dose moyenne. — Trois comprimés par jour pendant quinze jours chaque mois.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

FLUXIDIA

Composition. — Teinture de Teskra, Alcoolature stabilisée de marron d'Inde, Hamamélis, Hydrastis, Viburnum, Sénéçon, Iode, Tannin.

Indications. — Traitement des maladies provenant des troubles de la circulation du sang.

Doses. — XXX gouttes deux fois par jour.

Prix du flacon : 18 francs.

Produits STÉNÉ

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

FLUXINE (gouttes)

XX gouttes =

0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.

IV gouttes d'alcoolat concent. d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable, radioactivée
par les rayons ultra-violet.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Troubles veineux des deux sexes, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux; métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, ménopause, règles douloureuses, certaines névralgies, prostatite, etc.

Mode d'emploi. — X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 francs pour 1 mois.

Laboratoires **FLUXINE**

J. BONTHOUX, pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

FOKIÉNYL

Composition. — Capsules de Fokiéniol à 0 gr. 10. Le Fokiéniol est l'alcool sesquiterpénique $C^{15}H^{26}O$, isolé de l'huile essentielle du Fokiéna *Hodgensii* (Haut-Tonkin).

Propriétés. — Balsamique, Sédatif, Cicatrisant, Décongestif.

Avantages. — Non toxique. Parfaitement toléré par l'estomac, l'intestin et le rein. Agit à faible dose. Ne présente pas de contre-indications.

Indications. — Urétrites gonococciques ou non, **Cystites** (disparition immédiate de la Pollakiurie et des douleurs à la miction). Pyélonéphrites, Congestion du rein, etc...

Posologie. — 6 à 9 capsules par jour.

Présentation et prix. — 18 fr. 50 la boîte de 50 capsules. Durée moyenne : 7 jours de traitement.

LABORATOIRES BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS (XIX^e)

(Tél. : Combat 11-02.)

FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire.

Indications. — Aménorrhée de la puberté, de l'âge adulte et de la ménopause. Hypoplasie utérine. Diabète ovarien. Sclérodémie.

Mode d'emploi. — Tous les jours ou tous les 2 jours, faire une injection intramusculaire, pendant les huit jours qui suivent les règles.

Contre-indications. — La FOLLESTRINE GRÉMY est formellement contre-indiquée au début de la grossesse : elle peut avoir une action abortive à cette époque.

Médication associée. — La FOLLESTRINE GRÉMY et l'OCRÉINE GRÉMY peuvent être employées en médication associée dans le traitement des déficiences ovariennes ; il est nécessaire alors de les administrer de la façon suivante :

Dès la fin des règles jusqu'au 14^e jour environ, FOLLESTRINE GRÉMY 1 injection intramusculaire par jour ou 6 à 10 granules.

Du 15^e jour jusqu'au 1^{er} jour des règles suivantes, OCRÉINE GRÉMY : 4 à 6 pilules par jour loin des repas ou 1 injection intra-musculaire.

Granules (chaque granule équivaut à 250 unités internationales).

Ampoules (chaque ampoule équivaut à 500 unités internationales).

Prix : *Ampoules* : 30 francs. *Granules* : 20 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

Première préparation d'hormone ovarienne active
par voie buccale.

(Acad. Méd., 27 Janvier 1931.)

(Soc. belge de gyn., Février 1931.)

Activité buccale contrôlée.

Composition. — Solution huileuse, concentrée,
d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

Mode d'emploi. — *Trois doses par jour à inter-
valles de 4 heures au minimum, pendant les repas
de préférence.*

Traitement type d'attaque.

40 capsules à doses croissantes :

Matin, midi et soir.	{	pendant 3 jours	: 1	+	1	+	1 ;
		les 2 jours suivants :	2	+	2	+	2 ;
		les 2 jours suivants :	3	+	3	+	3.

Cures d'entretien.

15 à 20 capsules par mois : 1 capsule matin, midi et
soir : pendant 5 à 7 jours.

Date du traitement. — *Quand les règles existent :*
les capsules seront toujours absorbées dans les
dix jours précédant la date présumée des règles.

Dans tous les autres cas (castration, aménorrhées) :
la cure sera régulière et mensuelle (première se-
maine du mois par exemple).

Dysménorrhées : Commencer 1 ou 2 jours avant le
début présumé des règles et poursuivre jusqu'à
cessation des troubles (6 à 9 capsules peuvent
suffire).

Cas spéciaux de stérilité, sclérodermie, diabète
ovarien, épilepsie menstruelle, etc...

La boîte de 40 capsules pour une cure de
1, 2 ou 3 mois : 40 francs.

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 37-14.)

FOLLICULINE CRINEX**(Voir CRINEX)**

Crinex n'est pas une folliculine, mais un
Extrait ovarien total standardisé.

Autres produits opothérapiques des
Laboratoires CRINEX-UVÉ :

OREX (Extrait testiculaire à usage
féminin).

FRÉNOVEX

Extrait mammaire et corps jaune.

FOLLICULINE CRISTALLISÉE**du Dr ROUSSEL**

Voir :

GYNOESTRYL,**BENZO-GYNOESTRYL,****BENZO-GYNOESTRYL 5.**

FOLLI-LOBINE

du D^r Fraysse.

Deux formes : Pilules, Ampoules injectables (Voir aussi *Opothérapie du D^r Fraysse*).

Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse. Le lobe antérieur renforce l'action de la folliculine.

Pilules. — Glutinisées, actives par voie buccale, non détruites par l'action des sucs digestifs qui décomposent la folliculine.

1 pilule = 10 unités-rats.

Doses : 2 à 6 par jour, espacées dans la journée.

Ampoules. — 20 unités-rat par ampoule : 10 U-R, Folliculine. 10 U-R. Lobe antérieur.

Doses : 1 ampoule par jour pendant 6 jours, 10 jours avant les règles.

Indications. — Déficiences ovariennes en général. Troubles menstruels, Puberté et Ménopause.

Flacon de 50 pilules.

Flacon de 100 pilules.

Boîte de 6 ampoules injectables de 2 cc.

Traitement : 3 semaines.

Laboratoires du D^r FRAYSSE et Cie

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88.

FONDANT DE SOUFRE DAUSSE

Composition. — Collobiase de soufre : 15 mgr. par cuillerée à café.

Présentation. — Fondant blanc d'une saveur sucrée et très légèrement sulfurée.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Modificateur de la nutrition soufrée ; Arthralgies, formes légères du rhumatisme, névralgies, arthritisme, affections cutanées, laryngites, trachéo-bronchites.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, ou plus, suivant indication du médecin.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

FONDANT IODOTANNIQUE

Composition. — Par dose (contenu de la capsule) : Iode dissimulé 1 cgr., tormentillo-tanin 15 cgr., Fondant de teinte chamois clair, de saveur agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les actions antiscrofuleuses et sclérolytiques de l'iode ; propriétés toniques du tormentillo-tanin, incomparablement supérieures à celles du tanin ordinaire ; succédané de l'huile de foie de Morue et des préparations anti-scorbutiques.

Indications. — Adénites, Scrofules, Arthritisme, Rhumatisme, Obésité, Emphysème, Dermatoses.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 6 doses par jour.

Enfants : de 1/2 à 5 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant, reminéralisateur, d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

Doses. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait : une cuillerée à soupe pour une tasse.

Prix : { La boîte de 250 gr. : 6 francs.
 { La boîte de 1 kg. : 20 francs.

Laboratoires du FORCIVAL

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

FORIOD

Tétraiodophénolphtaléinate de Sodium.

Substance opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

Indications. — **Cholécystographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.**

Posologie et mode d'emploi. — Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Voie buccale* : Méthode des doses fractionnées (dite de Sandström), le premier soir prendre 1 flacon de Foriod Poudre composée ; le lendemain, 1 flacon de Foriod Poudre composée en deux prises (la 1^{re} moitié le matin, la 2^e le soir). Examen radiologique le lendemain matin.

2° *Voie intraveineuse* : Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile. Examen de la 8^e à la 24^e heure après l'injection.

Prix de vente :

L'ampoule de poudre : 12 fr. 50. — Le flacon de dragées : 25 francs. —

Le flacon de poudre composée : 25 francs.

Le nécessaire (pour méthode de Sandström) : 40 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FORMOBENZYL

Désinfecte l'arbre bronchique, tient le cœur, calme la toux.

Composition. — Goménol à 20 %, camphre, orthoformiate d'éthyle.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou subaiguës de l'appareil respiratoire. Bronchites, congestions pulmonaires actives, broncho-pneumonies et pneumonies.

Complications respiratoires de la grippe et de la rougeole. Coqueluche. Toux spasmodiques.

Ampoules huileuses. — *Adultes* : 5 cc. *Enfants* : 3 cc.

Posologie. — Injection intramusculaire : 1 ou 2 ampoules par jour.

Voie rectale : une ou deux ampoules par jour en lavement, étendues d'un volume égal d'huile d'olives.

Lavement évacuateur au préalable.

Gouttes. — *Enfants* : par 24 heures : X gouttes par année d'âge.

dix ans : LX gouttes ; *adultes* : CXX gouttes.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

FORMOCARBINE

Composition :

Association du Charbon Animal, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la Formine (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût, avec ou sans addition de Benzonaphtol.

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtholée.

Le granulé de Formocarbine n'est pas dur à la dent, fond très bien dans la bouche, se désagrège instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Infections gastro-intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Diarrhées, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose, Aérophagies, Intoxications alimentaires.

Infections biliaires. — Désinfecte par la Formine la Vésicule et les canaux en même temps que son Charbon animal absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la Veine porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Hépatisme.

Infections urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystites, Pyélonéphrites, Urétrites, Prostatites, Colibacillurie.

Syndrome entéro-rénal.

Radiologie.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Dans les grandes crises d'*Aérophagie* ou dans les cas d'*Intoxication alimentaire*, la dose devra être portée à 3 cuillerées à soupe, une toutes les demi-heures.

En *Radiologie* : Pour obtenir l'absorption complète des gaz qui dilatent les organes et gênent l'examen : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans les 48 heures qui précèdent cet examen.

Prescrire :

Formocarbine simple ou *Formocarbine naphtholée* : 1 flacon. Il est à remarquer que la Forme Naphtholée ne provoque jamais de constipation.

Prix : le flacon : 12 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Oise).

(Tél. : 0-50.)

Echantillons et littérature à la disposition de
MM. les Docteurs.

FORMOCARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur activé (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

Forme. — Granulé rond anisé.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie, Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines, Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général toutes les manifestations anaphylactiques.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.
Enfants : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge.
Avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

(Tél. : 30.)

FORMOCHOLINE

Drainage des voies biliaires.

Propriétés. — Cholagogue, renforçateur du pouvoir antitoxique du foie, évite l'encombrement de la vésicule biliaire et des canaux excréteurs.

Indications. — Cholécystites, angiocholites, affections hépatiques des pays chauds, maladies de la nutrition, goutte, diabète, obésité, tous syndromes gastriques réflexes et dermatoses sous la dépendance d'un dysfonctionnement hépato-vésiculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin dans un quart de verre d'eau légèrement tiédie.

Présentation et prix. — Granulés : 16 fr.

Durée moyenne du traitement des unités :
10 à 12 jours.

Laboratoires du Dr ADLER

36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Arch. 63-27.)

FORMOSALINE HOUDÉ

Discoïdes titrés de 50 centigrammes.

Composition :

Hexaméthylène-tétramine	24 cgr.
Salol	25 —
Arbutine	1 —

Propriétés. — Ajoute à celles de la formine, celles du salol, antiseptique intestinal et urinaire, antithermique et analgésique, et celles de l'arbutine, antiseptique spécialement urinaire.

Indications. — Cystites, néphrites, début d'encéphalite léthargique, cholécystites chroniques, grippe, fièvre typhoïde, etc. (toutes maladies infectieuses). Traitement des plaies sanieuses (antiseptique interne).

Doses. — 4 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

FORMULE JACQUEMAIRE N° 60

Composition. — Chaux, fer, manganèse, silice, phosphore en milieu magnésien prépondérant.

Sa formule diffère de la VERRULYSE par des proportions différentes en magnésies (hydroxyde et non chlorure) et l'addition de silicate de soude.

Forme. — Cachets ouvrables, contenant une poudre que, pour les enfants ou adultes ne pouvant avaler les cachets, on peut faire prendre dans un aliment (potage, purée, compote, etc.).

Propriétés. — Reconstituant cellulaire par reminéralisation polyvalente à prépondérance magnésienne. Redresse et élimine toute production cellulaire anormale. Supprime le terrain physiologique dégénéré par déminéralisation, propice à l'anarchie cellulaire et au développement soit des tumeurs malignes, soit des maladies infectieuses. Véritable aliment minéral, subvient à la carence minérale de l'alimentation.

Relève l'état général en huit jours.

Indications. — Toutes les proliférations anormales épidermiques ou des tissus profonds, verrues, papillomes, végétations, kératoses séniles ou autres ; améliore ou freine les tumeurs ; évite le terrain précancéreux.

Toutes les débilites par sub-minéralisation ou déminéralisation. Enfants débiles, malingres. Adultes surmenés et déprimés. Transformations de la quarantaine.

Dermatoses diverses.

Complément de l'alimentation journalière.

Posologie. — 2 cachets par jour au milieu des repas.

Remarques. — Formule Jacquemaire n° 60, comme une formule magistrale, conserve le secret du diagnostic, parce que les boîtes, les conditionnements ne portent que la posologie sans aucune indication. Cette qualité est très précieuse pour la prescription chez les précancéreux. Dans tous les cas, le prétexte de la prescription est la reminéralisation.

Le traitement peut se prolonger indéfiniment, car Formule Jacquemaire n° 60 ne contient que les éléments minéraux qui devraient toujours se trouver dans les aliments.

La boîte de 80 cachets pour 40 jours : 16 francs.

Laboratoires FLUXINE

J. BONTHOUX, Pharmacien

VILLEFRANCHE (Rhône).

FORNOSE

Pommade nasale sans essences.

Novocaïne, Adrénaline, Baume du Pérou,
Ichtyol, Résorcine, Oxyde jaune de Hg,
Excipient fondant.

Cicatrisante, Désodorisante, Non irritante.
Tous états congestifs du nez et de la gorge.

Soins pré-opératoires et post-opératoires.
Furunculose du nez, Ozène, Antisepsie res-
piratoire.

Étaler comme un pois de pommade à l'in-
térieur de chaque narine 2 ou 3 fois par
jour.

Le tube : 6 francs.

Échantillons.

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).
(Tél. : Observatoire 01-83.)

FORTOSSAN

CIBA

Préparation phosphorée pour enfants.

Sel sodique neutre de l'acide inosito-hexa-
phosphorique.

Médicament reconstituant et rectificateur de
la nutrition spécialement préparé pour
la pratique infantile. Très assimilable,
parfaitement toléré.

Indications. — Retard du développement
et de la dentition. Scrofulose et tuberculose
infantile. Convalescence des maladies infec-
tieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait
du biberon ou les bouillies, à la dose de
2 à 4 cuillerées à café par jour, suivant
l'âge.

Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu, LYON.

FORTOSSAN IRRADIÉ

CIBA

Préparation phosphorée avec vitamines.

Puissant antirachitique par association de la vitamine D au phosphore organique végétal. La vitamine D développe, dans ces conditions, le maximum de son efficacité thérapeutique sans aucun effet secondaire: ni anorexie, ni diarrhée.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Anémie infantile, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, Caries dentaires.

Doses. — 1/2 à 4 cuillerées à café par jour.
Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

FOSFOMAGNYL DU D^r CHURCHILL

**Cytophylaxie leucogène. Association
de phosphore et de chlorure
de magnésium.**

Forme. — Comprimés.

Composition :

Chlorure de Magnésium chimique-

ment pur.....	0 gr. 30
Hypophosphite de Magnésie.....	0 gr. 10
Hypophosphite de Chaux	0 gr. 05
Hypophosphite de Manganèse...	0 gr. 02

Posologie. — 4 comprimés par jour. Deux avant le petit déjeuner du matin et un autre avant chacun des deux autres repas. Si le comprimé est trop gros pour être avalé en entier, le partager en deux. Pour en faciliter l'absorption, il est préférable de l'écraser et de le mélanger avec un peu de café, de potage, ou tout autre liquide, ou mieux encore, dans une cuillerée de confitures ou de miel.

Indications. — Asthénie, Régulateur des fonctions hépatiques, Préventif de l'artério-sclérose, Anémies, Faiblesse générale, Stimulant de l'activité cellulaire.

Produit Français. Prix 21 francs.

**Laboratoire des Produits du
D^r CHURCHILL**

12, rue Castiglione — PARIS (I^{er}).
Tél. : Opéra 72-96.

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOÏDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyl sirop : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyl pilules : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyl liqueur : liquide opalin glyciné menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-indication. — État congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire :

Sirop de FOSFOXYL CARRON (16 fr. 50)

ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** (14 fr. 50)

ou **FOSFOXYL LIQUEUR** (15 fr. 50)

afin d'éviter les substitutions.

Laboratoires du FOSFOXYL

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques
assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition
et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électricité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination.	Titre.	Mode d'emploi.
CALCOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Ca	13,19 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Calcium.	8,51 % de Calcium.	(Sirop pour enfants.)
MAGNESOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mg	13,65 % de Phosphore.	4 à 8 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Magnésium.	5,28 % de Magnésium.	
MANGANOFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Mn	12,57 % de Phosphore.	4 à 6 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Manganèse.	11,34 % de Manganèse.	
CUPROFOSYL (C ¹⁰ H ¹⁶ PO ³) 2 Cu	12,57 % de Phosphore.	2 à 4 comprimés par jour.
Terpénolhypophosphite de Cuivre.	12,77 % de Cuivre.	

Prix de l'unité : 12 francs.

Littérature et Échantillons sur demande aux

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Urane, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON.

FRANCALCIUM

Calcithérapie.

Composition. — Acétylglycocolate de calcium.

Présentation :

- 1° En solution à 20 p. 100 (sans odeur ni saveur).
- 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 2 ou 10 ampoules).
- 3° En comprimés de 15 cgr. (boîte de 45 comprimés).
- 4° *Francalcium B.* (Quinate de Ca). Ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intra-musculaires indolores (boîtes de 2 ou 10 ampoules).

Indications cliniques :

- a. *Indication recalcifiente* : Rachitisme, Retard de consolidation des fractures, Carie dentaire, Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale, Grossesse.
- b. *Indication anti-hémorragique* : Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales, Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
- c. *Indication de résorption* : Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques. Diarrhées des tuberculeux.
- d. *Indication anti-choc* : Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
- e. *Indication spasmo-sédative* : Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.

Indication anti-rhumatismale : Polyarthrites chroniques.

Posologie :

En solution : 2 fois par jour, avant chacun des 2 principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

	Enfants : au-dessous de 12 ans.	Adultes :
Indication recalcifiente.....	II gouttes par année d'âge.	XL gouttes.
— anti-rhumatismale ...		XL —
— anti-hémorragique ...	VIII gouttes par année d'âge.	CXX —
— anti-choc	XX à LXXV gouttes.	CXX —
— spasmo-sédative	L à C gouttes.	CXX —
	Deux fois par jour, avant les repas.	
Comprimés de 15 cgr. d'acétylglycocolate de Ca	1 comprimé.	2 ou 3 comprimé.
Ampoules de 5 cc. à 10 % pour injections intra-veineuses ... (Aspirer un peu de sang dans la seringue et injecter très lentement.)	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.
Ampoules de 5 cc. à 10 % pour injections intra-musculaires .	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses qui peuvent varier suivant les malades.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. — 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé, ou sur tissu élastique. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

A. KRAUS, Pharmacien de 1^{re} classe
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, rue Godot-de-Mauroy — PARIS.

Usine à Courbevoie.

(Tél. : Caumartin 24-54.)

FRANLAXOL

Granulé mucilagineux, évacuant, non irritant, non putrescible, non digestible.

Composé formé d'un mucilage de lin associé à divers mucilages végétaux purs, spécialement choisis. Il possède la propriété d'augmenter considérablement de volume dès qu'il est placé dans un milieu liquide. Dans le milieu intestinal, il forme une masse volumineuse, onctueuse, égale à environ cinquante fois son volume primitif, qui facilite la libération de l'intestin sans fatiguer sa musculature.

Indications. — A prescrire dans toutes les constipations atoniques ou spasmodiques, dans toutes les stases cœcales ou cæco-ascendantes, sigmoïdiennes ou rectales.

Mode d'emploi. — Mettre le granulé à sec dans la bouche et avaler à l'aide d'une gorgée de liquide.

Adultes : une ou deux cuillerées à café après les repas et suivant les indications du médecin.

Enfants : une cuillerée à café après les repas.

Prix : 17 francs la boîte de 200 gr. net.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FREINOLUTÉINE VOGEin

Chaque comprimé renferme 0,05 de Corps jaune privé de sa folliculine et des hormones excitatrices pour ne laisser subsister que ses effets inhibiteurs et freinateurs et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Son rôle est de déclencher le mécanisme régulateur de la fonction menstruelle. Elle diminue les hémorragies utérines d'origine ovarienne, notamment les ménorragies de la puberté. Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.

Son action n'est pas brusque et se fait surtout sentir au cours des règles qui suivent l'administration du médicament.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas 5 à 6 jours avant l'époque présumée des menstrues.

Le flacon : 15 francs.

Laboratoires VOGEin

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

(Tél. : Danton 83-24.)

FRÉNASMA

Eupnéique phyto-hormonique.

Composition. — Éphédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

Forme. — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

Indications. — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysèmes, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foins, Rhinites spasmodiques, Etats allergiques (urticaire, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

Posologie. — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

Enfants à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-2.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du FRÉNASMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 76-24.)

FRÉNOVEX

Médication opothérapique des hémorragies utérines.

Composition. — Extraits spéciaux de glande mammaire et de corps jaune. (Procédé Crinex).

Gouttes : Solution alcoolique 1 cc. (40 gouttes) correspond à 1 gr. 5 de glande mammaire fraîche et 0 gr. 08 de corps jaune.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Mode d'action. — Freine l'hyperactivité ovarienne. Décongestionne l'utérus. Assainit la muqueuse utérine.

Indications. — Métrorragies, Ménorragies, Hyper-Polyménorrhées, Fibromes et polypes saignants, Hémorragies *postabortum*. Hyperfolliculinie.

Posologie. — Faire prendre pendant 20 jours par mois : Dose moyenne : XV à XL gouttes ou 3 à 8 dragées par jour, en 2 ou 3 fois *loin des repas*. Suivant résultats augmenter à LXXX, C gouttes ou diminuer.

Hémorragies graves : 1 à 6 cuillerées à café par jour. Innocuité absolue.

Prix : Gouttes ou Dragées : 16 francs (20-30 jours).

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Alésia 28-51).

FRIGYL

Suppositoires.

Analgésiques, Antipyrétiques, Anti-infectieux.

Composition. — Deux formules :

	Bébés.	Enfants,	
0,075Argent colloïdal	0,10
0,10Sulfate Quinine	0,15
0,05Pyramidon	0,10

Par suppositoire.

Indications. — Tous cas d'hyperthermie chez l'enfant (Grippe, Rougeole, Scarlatine, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Accidents de la dentition, etc...).

Mode d'emploi. — Suivre les indications du médecin. Dose moyenne par 24 heures : 1 à 3, suivant l'âge.

Laboratoires FRIGYL

F. MONTANTON, pharmacien
BUZANÇAIS (Indre). — Tél. : 52.

FRUCTUVAL

Jus de Raisins frais concentré.

Dietétique et applications médicales.

Composition. — Pur jus de raisins frais concentré dans le vide et à froid. Non stérilisé, sans aucun antiseptique et contenant donc intactes et exaltées ses Vitamines, ses Diastases, ses Levures.

Propriétés. — Ne fermente pas, même en bouteille entamée, grâce à son procédé de stabilisation à froid. Coûte bon marché parce qu'une bouteille de FRUCTUVAL provient de 6 bouteilles de jus ordinaire et suffit pour une cure de 25 jours. Concentré au maximum sous la forme liquide, il permet une cure de raisins intégrale en toutes saisons.

Laxatif, Cholagogue, Diurétique, *élimine les toxines, diminue l'acide urique, atténue les fermentations intestinales.*

Indications. — Maladies de l'intestin, de l'estomac, du foie, du rein, de la vessie, de la peau, rhumatisme, hypertension artérielle, scorbut, infections diverses.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe 3 fois par jour : à jeun, à midi et au coucher.

Prix :

La bouteille : 26 francs,
pour une cure de 25 jours.

La demi-bouteille : 15 francs,
pour une cure de 12 jours.

Laboratoire du **COMTAT VITICOLE**
AVIGNON (Vaucluse).

FRUGEOLINES-VICHY

Composition :

Extrait biliaire dépigmenté	0 gr. 05
Poudre de glandes intestinales	0 gr. 05
Sels extraits des eaux du bassin de Vichy.....	0 gr. 05
Extrait de Cascara	0 gr. 025
Lactose.....	0 gr. 075

Forme. — Lentilles dragéifiées de 0 gr. 45.

Propriétés thérapeutiques. — Agent régulateur de la sécrétion biliaire et intestinale. Aucune toxicité.

Indications. — Toutes les formes de la constipation ; lithiases biliaires ; coliques hépatiques ; cholémie ; acholie ; ictères, entéro-colites.

Doses et mode d'emploi. — 2 FRUGEOLINES-VICHY avant déjeuner et 2 autres avant dîner. Cette dose peut être augmentée ou diminuée suivant le tempérament de chacun, mais ne doit pas excéder la dose de 6 FRUGEOLINES-VICHY par jour.

Pour les enfants à partir de 10 ans : la moitié des doses ci-dessus.

Prix de vente au public : le flacon de 60 dragées 11 fr. 20.

Laboratoire Médico-Pharmacologique de Vichy.
1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier).

FUCOGLYCINE du D^r GRESSY

Forme. — Sirop.

Composition. — Principes iodo-phosphorés naturels et hydrocarbonés du fucus.

Indications. — Scrofule, Lymphatisme, Tuberculose, etc.

Posologie. — Mêmes doses que l'huile de foie de morue.

Prix : 14 francs.

LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e).

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Composition. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café.

Poudres. 1 à 3 mesures.

Cachets. 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 11 francs la boîte.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, rue Auguste-Comte — LYON.

(Tél. : Franklin 07-04.)

FUCUS GMET

Composition. — Extrait total, sans alcool, du *Fucus vesiculosus*. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

Indications. — Obésité, Scrofule.

Posologie. — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

Prix : 18 francs.

Pour traitement prolongé conseiller le « carton cure » : le contenu de 6 flacons standard pour le prix de 4. (72 fr. au lieu de 108).

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

FUCUSOL

Composition. — A base d'algues marines (Fucus vesiculosus et fucus serratus).

Indications. — Traitement végétal absolument sans danger de l'obésité et de l'embonpoint selon la méthode de Duchesne-Duparcq.

Ne contient ni nitrophénols, ni extrait thyroïdien.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.
2 à 3 cuillerées à café de granulés par jour.

Boîte de 60 pilules.

Boîte de 200 pilules.

Granulés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS

(Tél. : Archives 44-59.)

FUMAR DU Dr FOURNIER

Principe actif. — Solution de Fumarate de Plomb, non toxique aux doses thérapeutiques.

Indications. — Cancers inopérables, non susceptibles de curiethérapie, ou après échec de ces méthodes.

Toutes tumeurs bénignes ou malignes.

Traitement post-opératoire (prévient métastases).

Contre-indication. — Aucune.

Forme :

Ampoules de 10 cc. (60 francs).

Ampoules de 20 cc. (100 francs).

En boîtes de 6.

Doses. — Intraveineuse quotidienne de 10 cc. pendant 18 jours, comme traitement d'attaque.

Littérature. Références sur demande.

Laboratoire du FUMAR

Marcel GRELLIER, Pharmacien

SAINT-SEVER (Landes).

FUROPLAST

Enregistré au Laboratoire national sous n° 540-18.

Traitement des Furoncles par l'emplâtre de Vigo phéniqué.

Emplâtre caoutchouté (même masse adhésive que l'Albuplast) maintenant une rondelle de Vigo phéniqué ou — pour être employé quand le furoncle a crevé — un emplâtre au dermatol.

Avantages. — Permet le traitement des furoncles, soit par le docteur, soit par le malade lui-même, si celui-ci doit reprendre ses occupations ou ses déplacements avant achèvement du traitement.

Un *Furoplast élastique* (*Hermoplast*, enregistré sous n° 540-19) est particulièrement indiqué dans le cas de furoncles intéressant les parties du corps où un pansement rigide pourrait difficilement se maintenir.

Présentations :

Boîte ronde métal : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Boîte carton : 3 emplâtres Vigo, 3 compresses dermatol.

Elastique (*Hermoplast*) : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie, Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pereire 57-41.)

GADIODINE

Manifestations externes de la Tuberculose, Adénopathie,
Végétations adénoïdes.

Composition :

Iode métallique.....	2,50
Benzimide sulfimique.....	0,20
Huile foie de morue.....	1 kg.

Indications. — Combat toutes les manifestations de la Tuberculose, de la Scrofule, du Lymphatisme. Permet de faire absorber de grandes quantités d'huile de foie de morue et des doses importantes d'iode par tous les malades et sans répugnance.

Intolérance gastrique nulle.

Posologie. — Dose initiale. *Adultes* : 2 cuillerées à café par jour. Augmenter progressivement jusqu'à 4 à 6 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge.

Durée du flacon : 10 jours environ.

Contenance : 500 cc.

Prix : 15 francs.

Laboratoire des LICES

38, rue des Lices — ANGERS (Maine-et-Loire).

(Tél. : 32-30.)

GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

Action. — La GADUAMINE agit :

Par les principes hydrosolubles du foie, comme anti-anémique et antitoxique.

Par les vitamines naturelles A et D, comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

Principales indications. — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile ; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

Mode d'emploi. — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Durée moyenne du flacon : 28 jours.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires RENARD et C^{ie}

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Pereire 14-08.)

GADUASE

Tonique et stimulant général d'action rapide et durable. Succédané classique et agréable (sirop framboisé) de l'huile de foie de morue.

Composition :

Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

Convient à tous les âges.

La GADUASE active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indication.

Indications. — Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Asthénie, Déminéralisations, Convalescences et toutes les insuffisances fonctionnelles.

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : 1/2 à 1 cuillerée à café *pro die*.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Adolescents et adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Flacon (210 cc. environ) : 10 francs.

Grand flacon (400 cc. environ) : 16 francs.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

GAÏACAMPHRE

Présentation :

Quatre formes : *Ampoules, Comprimés, Sirop, Suppositoires.*

1° *Ampoules* de 2 et 5 cc.

Solution aqueuse de camphre (camphosulfonate) et de Gaïacol (glycéryl gaïacol) indolore, de résorption rapide, non toxique.

Formule des ampoules :

Ether monoglycérique du gaïacol..... 0 gr. 05

Camphosulfonate de sodium 0 gr. 17

Eau distillée q. s. pour 1 cc.

Correspondant à 0 gr. 10 de camphre et 0 gr. 05 de gaïacol par cc.

2° *Suppositoires* : adultes et enfants.

3° *Comprimés* :

Présentés en enrobage se dissolvant en milieu intestinal seulement.

Formule des comprimés :

Dionine 0 gr. 005

Glycéryl gaïacol..... 0 gr. 10

Camphosulfonate..... 0 gr. 05

Alcoolature de racine d'aconit... III gouttes.

4° *Sirop* : formule du sirop :

Glycéryl gaïacol 1 gr.

Camphosulfonate 0 gr. 2

Teinture d'Aconit 0 gr. 5

Dionine 0 gr. 06

Eau de Laurier-cerise..... 4 gr. 5

Eau distillée et sucre q. s. p. 100 cc.

Indications. — Toutes affections bronchiques ou pulmonaires aiguës, toutes suppurations chroniques pulmonaires.

Préventif des complications pulmonaires d'origine médicale ou chirurgicale.

Prix :

Ampoules : 20 fr. la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

20 fr. la boîte de 7 — de 5 cc.

Comprimés : 12 fr. 75 la boîte de 30 comprimés.

Sirop : 12 fr. 75 le flacon.

Suppositoires : la boîte 15 francs.

Nous préparons aussi le **Gaïacampbre** sous toutes ses formes avec Ephédrine.

Mode d'emploi :

Ampoules : Adultes, de 1 à 4 par jour ; *Enfants*, 1 par jour ou tous les 2 jours.

Comprimés : Adultes, 3 à 6 par jour ; *Enfants*, au-dessus de 5 ans, 1 à 3 par jour suivant l'âge.

Sirop : Adultes, 4 à 5 cuillerées à soupe par jour ; *Enfants*, au-dessus de 5 ans, 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Suppositoires : un le soir de préférence.

Laboratoires PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES. (Tél. : 923.)

GAÏARSENAN DUCATTE

Remède de la grippe et de ses complications.

Solution aqueuse de cadodylate de gaïacol chimiquement pur et de strychnine.

Deux formes : *Ampoules* de 1 cc. pour injections sous-cutanées, — *Dragées* de 0 gr. 25 pour médication interne.

Action thérapeutique et usage. — Prescrit dans la grippe et ses complications, dans les formes aiguës (broncho-pulmonaire ; gastro-intestinale ou nerveuse), dans la convalescence même après disparition complète des symptômes généraux (neurasthénie post-grippale).

Posologie et Mode d'emploi :

Ampoules : Une à deux injections sous-cutanées par jour selon la gravité de l'infection.

Dragées : Deux à trois dragées par jour selon le cas.

L'emploi du *Gaïarsenan Ducatte* n'exclut pas les autres médications symptomatiques ni l'observation des règles d'hygiène et de prophylaxie. Les injections pratiquées dans la région fessière avec les précautions d'usage seront faites très lentement, ce qui les rend indolores.

Chez l'enfant au-dessous de quinze ans la grippe se différencie peu d'une bronchite vulgaire.

Laboratoires DUCATTE
191, rue Saint-Honoré — PARIS.

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.

Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte simple : 16 fr. 50.

La boîte triple : 42 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.
VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1^{re} class .

GALAPHOS

L'allaitement maternel à condition qu'il soit *riche* et *abondant* constitue le régime alimentaire par excellence du nourrisson.

Composition :

Mamelline 1 gr. ; Placentine 1 gr. ; Extrait de Galéga 8 gr. ; Cannelle pulvérisée 1 gr. ; Fenouil pulvérisé 1 gr. ; Nucléinate de manganèse 0 gr. 50 ; Hexa-ino-sito-phosphate de Ca et Mg. 4 gr. ;

Excipient... Q. S. p. 100 grammes.

Mode d'action. — Association opo-phyto-chimiothérapique, le *Galaphos* a une action polyvalente.

Galactogène par les extraits opo et phytothérapiques.

Reminéralisante et reconstituante par la présence des ions P, Ca, Mg et Mn.

Indications. — Insuffisance lactée sous toutes ses formes, déficiences organiques consécutives à la grossesse, la maternité et l'allaitement, Asthénies, etc... Aucune contre-indication.

Posologies. — Trois à quatre cuillerées à café par jour à la fin des repas.

Présentation et Prix :

Granulé : le flacon de 100 grammes : 16 fr. 85 ; pour 10 à 12 jours de traitement.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1578-1.

Laboratoire du GALAPHOS

P. Wilson-Carli, Pharmacien de 1^{re} Classe.

92, rue Camille-Pelletan, 2, rue d'Amiens — MARSEILLE. (T. : 04-09.)

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Prix : 6 francs.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier),

Mode d'action. — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

Indications. — Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes.

Formes et posologie :

1° Cachets à 1 cgr., 2 ou 3 chaque jour (10 jours de trait.).

Prix : 20 francs.

2° Cartouches de pommade blanche pour frictions à 50 %.

Prix : 20 francs.

Adultes : 1 chaque jour (8 jours de traitement).

Enfants : Fractions suivant l'âge (15 jours environ de traitement).

3° Suppositoires adultes à 10 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 20 francs (12 jours de traitement).

Suppositoires enfants à 5 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 18 fr. 50 (12 jours de traitement).

Laboratoire du Gambéol — 42, rue Émile-Deschanel
COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

GAMOSTYL

Composition. — Or colloïdal, Argent colloïdal, Rhodium colloïdal, Quinine colloïdale.

Présentation. — Ampoules de 3 cc.

Indications. — États infectieux, Abscesses, Anthrax, Appendicite, Cholécystite, Grippe, Pneumonie, Fièvre typhoïde ou paratyphoïde, Poliomyélite, Erysipèle, Variole, Paludisme, Rhumatisme aigu ou chronique.

Posologie. — Injection intramusculaire.

Adultes : 1 collampoule par jour.

États aigus : 2 collampoules par jour.

Enfants : la dose se calcule d'après la méthode de Burnton : âge de l'enfant + 1, multiplié par la dose pour les adultes, divisé par 25.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Carnot 07-13.)

GANDERMA

Composé renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au principe actif du Gambéol et à l'oxyde de zinc.

Formule :

Protochlorure de mercure léger et dissociable	5 gr.
Sulfate de cuivre anhydre pulv.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc pur pulv.....	1 gr.
Oxyde de zinc pur pulv.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	75 gr. 50

Indications. — Toutes affections et infections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne. Acnés, Dartres, Ectymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, Impétigos, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites et toutes infections.

Présentation. — En tubes étain imprimés.

Prix : Le tube : 13 fr. 50 au public.

Laboratoire du GAMBÉOL

12, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 17-67.)

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, etc.
Antispasmodique (méthode des doses réfractées). Angor, migraine, prurits, entérocolites, dysménorrhée.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 10 (tubes de 20)	6 fr. 50
— à 0 g. 05 (tubes de 30)	6 fr. 50
— à 0 g. 01 (tubes de 80)	5 fr. 50

Doses par 24 heures :

Adultes : 0 gr. 05 à 0 gr. 30.

Enfants : 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

Gardénal injectable : ampoules dosées à 0 gr. 04 ou à 0 g. 20 de gardénal (boîtes de 5 ampoules de 1 c^m³.).

Strychno-gardénal : dragées dosées à gardénal 0 g. 05

Sulf. de Strychnine 0 gr. 0003 (Fl. de 40 dragées)

Dragées dosées à gardénal 0 gr. 10 et sulf. de Strychnine 0 gr. 0006 (Fl. de 30 dragées.)

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GARÉPHÉDRINE

Comprimés.

(Anciennement **GARDÉPHÉDRINE**)

Chl. Ephédrine naturelle 3 cgr.

Phényléthylmalonylurée..... 1 cgr.

Action. — L'addition de ce sédatif à très faible dose évite les troubles parfois provoqués par l'éphédrine dans les cas d'asthme nerveux (palpitations, tremblements, insomnies).

Indications. — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphysème, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foins, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Hypotension, Toux spasmodique.

Posologie. — Un comprimé avant ou au début de la crise. Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine, Ephédrasmine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et Littérature sur demande.

Prix : 14 francs le tube de 20 comprimés.

Laboratoires THORAL

LE MONT-DORE (Puy-de-Dôme).

GARGARISME DU MONT-DORE DU D^r SALYS

A base de Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications. — Toutes affections de la bouche et de la gorge.

Propriétés. — Antiseptique buccal très actif, mais non toxique, non caustique, parce que ne coagulant pas les albumines.

Mode d'emploi. — En gargarisme une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient. Il peut s'employer pur en badigeonnage comme collutoire.

Durée moyenne de l'unité vente : 10 jours.

Prix : 10 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

GARGARISME SALMON EN TABLETTES

Action microbicide, calmante, anesthésiante, Antisepsie des Voies respiratoires supérieures.

Composition de chaque tablette :

Stovaine 0,0005 ; Alcoolature de racines d'Aconit 0,005 ; Diamino-acridine 0,0001 ; Menthol 0,002 ; Terpène 0,0002 ; Eucalyptol 0,0002 ; Codéine 0,0002 ; Soufre colloïdal 0,001 ; Borate de soude 0,015 ; Chlorate de potasse 0,02 ; Excipient aromatisé à l'anis. Q. S. pour 1 tablette de 1 gr ;

Indications. — Tous maux de gorge : amygdalites, angines, laryngites, etc. Maladies de la bouche, Stomatites, gingivites, etc.

Affections des Voies respiratoires : trachéites, bronchites, toux diverses, asthme, emphysème, etc. Prévention des maladies contagieuses à porte d'entrée respiratoire.

Le **Gargarisme SALMON** en tablettes est particulièrement recommandé pour l'hygiène de la voix aux chanteurs, acteurs, orateurs, etc..

Mode d'emploi :

Adultes : 8 à 15 tablettes par jour.

Enfants au-dessus de 4 ans : demi-dose.

Présentation. — En boîte de 57 tablettes. Prix : 6 fr. 90.

Laboratoires SALMON

J. SALMON, Pharmacien de la Faculté de Paris,

151, rue de Charenton — PARIS (XII^e). Tél. : Diderot 40-83.

GARGYL

Collutoire, Gargarisme.

Composition. — Guimauve, Mauve, Coca, Salicylate de soude, Résorcine, Phénosalyl, excipient Glycérine.

Propriétés. — Antiseptique, émollient, sédatif.

Indications. — Toutes les affections de la gorge et de la bouche. Amygdalites, Angines, Abscesses, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi :

Pur. — En badigeonnage comme collutoire, toutes les 3 heures.

Dilué. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie tiède pour gargarismes. Très actif et de goût agréable.

Prix : 7 francs.

Laboratoires R. CHEMINEAU

VOUVRAY (Indre-et-Loire). Tél. : 30.

GASMANYL

Agent régulateur des Fonctions digestives.

Composition :

Carbonate de chaux	7,
Hydrate de magnésie	5
Bicarbonate de soude	3
<i>Génatropine</i>	0,004
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé.

Indications. — Toutes les insuffisances gastriques.
Stimulant des fonctions digestives. Calmant des douleurs stomacales.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour après les repas ou au moment des crises douloureuses.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-3.

E. VERDON

Docteur en pharmacie

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8).

GASMAR LEGENDRE

(Comprimés dragéifiés à croquer.)

Composition. — A base de ferments digestifs frais, associés aux sels chimiquement purs de sodium (Bourget), de magnésium, de bismuth, et à la noix vomique (amer excito-moteur).

Indications. — Véritable *spécifique-digestif* complet.
Dyspepsies, **gastralgies**, gastrites, insuffisances gastriques, Insomnie gastrique, etc.

Avantages. — Pas de toxicité, ne constipe pas, s'élimine bien. Pas d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi :

Après les repas ou au moment des douleurs.

Adultes : 3 à 10 comprimés par 24 heures.

Enfants (à partir de 5 ans) demi-dose.

Prix au public : 15 francs (20 jours de traitement).

Littérature et échantillons :

Laboratoires LEGENDRE et C^{ie}

Section DS — HOUILLES (S.-et-O.).

Dépôt général pour la vente en gros :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1045-3.

GASTÉOSE

Comprimés effervescents à base de Sulfate de Magnésie, Sulfate de Soude, Citrate de Soude, Azotate de Potasse.

Dyspepsie, Gastralgie, Infections du tube digestif, Insuffisance hépato-rénale, Fermentations, Constipation, Urticaire, Dermatose.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour dans un grand verre d'eau le matin à jeun et aux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

GASTIASE

Régulateur des fonctions gastriques, intestinales et hépatiques.

A base de sels sodiques et de sels magnésiens desséchés et chimiquement purs.
En comprimés effervescents.

Posologie. — Laisser dissoudre dans un verre d'eau 2 comprimés le matin à jeun et 2 le soir avant le repas.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude,
Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille d'Eau d'Evian, on réalise la solution de Bourget. Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun. La solution est d'absorption facile.

Indications. — Insuffisances glandulaires du tube digestif ; prescription courante dans la thérapeutique du foie, de l'estomac, de l'intestin : hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dyspepsie, entérites, etc. Contribue au traitement des dermatoses et intoxications intestinales.

Prix : 15 francs.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

GASTRHÉMA

Méthode de Castle.

Composition. — Extrait de muqueuse d'antre pylorique de porc (opothérapie gastrique anti-anémique).

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureusement dosées, d'une saveur agréable, contenant toutes les hormones de l'organe frais.

Indications. — Toutes les Anémies, Asthénies, Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques, Convalescences, Dyspepsies, Hypochlorhydric, Hypopepsie, Hémogénie.

Sans contre-indications.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour dans un liquide froid, avant les repas.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Admis par les Assurances sociales sous le n° 703-1.

Laboratoire du GASTRHÉMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX°).

(Tél. : Roquette 76-24.)

GASTRICINE DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillottes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab. pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse, anémies en général (méthode de Castle).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter 1 cuillerée à café de GASTRICINE.

Prendre une gorgée de *temps en temps pendant le repas.*

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr. 50

Unité de vente : traitement de 8 à 10 jours.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle, 146-1.

GASTROBELLONE

Pansement gastrique belladonné.

Composition. — Granulé à base de poudre de Kaolin, Gélose et extrait de Belladone.

Propriétés. — Le Kaolin, pansement gastrique par excellence, calme efficacement les douleurs provoquées par l'irritation de la muqueuse stomacale.

La *Belladone* vient ajouter son action bienfaisante sur les spasmes douloureux gastro-intestinaux et la *Gélose* augmentant le volume du bol fécal accélère le transit intestinal.

Indications. — Manifestations douloureuses de l'Hyperchlorhydrie (Crampes, brûlures, etc...). Coliques, Diarrhées.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café de granulé avec un peu d'eau avant, après ou pendant les repas selon les indications du médecin.

Laboratoire ROUSSEAU, Docteur en Pharmacie

49, rue du Château-d'Eau — PARIS (X^e).

Tél. : Botzaris 39-78.

R. C. Seine 293-724, chèques postaux Paris 1151-08.

GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatation
de l'Estomac, Ulcères.**

GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie	0 gr. 20
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. S. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

Prix : 12 fr. 50.

GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth	2 gr. 50
— de magnésie	0 gr. 30
— de chaux	0 gr. 30
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
Kaolin	5 gr.
Bromure de sodium	0 gr. 25
Codéine	0 gr. 005
Extrait de jusquiame	0 gr. 02
Sucre	6 gr.

Essence d'anis Q. s. p. aromatiser.

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Prix : 20 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

GASTROCAOL

Pansement gastrique.

Composition. — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés-porphyrisés.

Forme. — Poudre insoluble en sachets de 20 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut* et *doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace.

Mêmes doses — Jamais toxique.

Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux

Indications. — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum. — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

Doses. — 1° Moyennes : 20 gr., par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2° D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3° Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

Mode d'emploi. — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

Prix. — 13 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET
BENDERITTER ET C^{ie}, à VENDOME
(Loir-et-Cher).

GASTROCARBONE

Charbon végétal activé.

Charbon animal.

Charbon minéral (graphite).

Carbonate de chaux, Magnésie Hydratée
sous forme d'excellentes pastilles à la
régliste.

Pastilles : sucer 3 ou 4 pastilles par jour.
Régularise les fonctions intestinales sans
provoquer la constipation.

Pyrosis, Spasmes, Aérophagie, Diarrhées,
Infections intestinales.

Prix : 14 francs la boîte de 35 pastilles.

Labor^{re} du GASTROCARBONE
SAINT-LOUIS (Bouches-du-Rhône).

GASTROCITRINE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin.

Forme. — Granulé fondant, agréablement parfumé au citron.

Composition :

Sulfate de soude	10 p. 100
Phosphate de soude	10 —
Carbonate acide de Sodium	15 —
Citrate Neutre de Sodium	15 —

Indications. — Dans tous les troubles gastro-intestinaux se traduisant
par :

- 1° Langue saburale et mauvaise haleine au réveil. Vertiges.
- 2° Somnolence après les repas. Migraines.
- 3° Démangeaisons. Urticaire.
- 4° Alternatives de diarrhée et de constipation.
- 5° Intoxications alimentaires. Congestion du foie.
- 6° Inaptitude au travail.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café bien pleines dans un verre d'eau le matin
à jeun, et au besoin dans la journée.

Enfants : 1 cuillerée à café rase.

Nota. — Pour obtenir meilleur effet et bien meilleur goût, il est recom-
mandé de faire dissoudre le granulé dans un verre d'eau.

Laboratoire de la GASTROCITRINE
LUC-SUR-ORBIEU (Aude).

GASTROCLEAN

Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.
Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

Gastroclean est le remède spécifique et souverain des Dyspepsies, des Affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique et des infections biliaires et auto-intoxications.

Gastroclean neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

Dose et mode d'emploi.

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

(Durée du traitement de l'unité 10 à 12 jours)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél: Ar. 63-27.
En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

GASTRONALDINE

Estomac, Foie, Intestin.

Forme. — Paquets.

Formule. — Hépatine, Rénine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium.

Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé

Indications. — Aérophagie, Hyperchlorhydrie, Hyper-sécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcération de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Maux de tête, Insomnie, Congestion du foie et des reins.

Mode d'emploi. — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 francs la boîte de 28 paquets.

La demi-boîte 9 fr. 50.

Laboratoires M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 54-69.)

GASTRONIGER

Thérapeutique rationnelle de toutes les lésions de la muqueuse gastro-intestinale.

Composition. — Charbon animal pur, kaolin. — Excipient : Q. S.

Indications. — Ulcères gastriques et ulcères duodénaux, spasme pylorique, *douleurs tardives*, ballonnements, brûlures, vomissements, intoxications intestinales.

Mode d'emploi. — Un paquet délayé dans 1/3 de verre d'eau, pris le plus tard possible, au moins 2 heures, après le repas du soir.

La boîte de 10 sachets : Prix : 16 francs.

Laboratoires COUVERT

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

GASTROPANSEMENT

du **D^r ZIZINE**

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

Forme. — Paquets.

Composition. — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des ulcères gastriques et des gastro-pathies douloureuses.

Indications. — Hyperchlorhydrie.
Gastrites.
Spasmes du pylore.
Atonie gastrique.
Dyspepsies réflexes.
Ulcères.

Posologie. — Prendre le matin à jeun, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 19 francs.

Laboratoires du Docteur **ZIZINE**

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

GASTROPEPTYL

Formes pharmaceutiques. — 1° Granulé : 2° Comprimés. (150 gr. granulé environ ou 50 comprimés.)

Composition. — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la musculature gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

Indications. — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, aigreurs.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

Prescription. — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés Gastropeptyl.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

GASTRO-SÉDATIF-ATCIA

Formule :

Citrate de soude	6,57
Bicarbonate de soude	6,57
Carbonate de chaux	26,28
Carbonate de magnésie.....	26,28
Hexaméthylènetétramine.....	0,85
Sucre Q. S. p.....	100 gr.
Phényléthylmalonylurée.....	0,34
Essence de menthe	0,21

Le *Gastro-Sédatif-Atcia* se prend à dose d'une, au besoin deux cuillerées à café, délayées dans un quart de verre d'eau, après chacun des deux principaux repas. En cas de troubles persistants, cette dose peut être renouvelée à tout moment du jour et de la nuit.

Indications. — Toutes affections stomacales : Ulcérations stomacales, Gastralgies, Gastrites, Hyperacidité, Fermentations, Dyspepsie nerveuse, Dyspepsie hypersthénique, Hyperchlorhydrie, Troubles du sympathique d'origine gastro-hépatique :

a. Palpitations, Arythmies ;

b. Douleurs avec lenteurs digestives.

c. Anxiété d'origine digestive, Insomnies.

Prix : 15 francs.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

GASTRO-SODINE

Composition :

	Normale.-B.	Bromurée.-C.	Citratée.-S.	Sulfatée.
Bicarbonate de soude.	0,80	0,80	0,80	0,20
Phosphate de soude..	0,40	0,40	0,40	0,40
Sulfate de soude.	0,20	0,20	0,20	0,80
Bromure de Sodium.....	0,20			
Citrate de soude.....		0,40		

Propriétés et indications. — Gastro-entérites simples, gastro-entérites neuro-arthritiques, gastro-entéro-hépatites, Troubles circulatoires, Hypertension, Viscosité sanguine.

Forme. — Granulé.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.

Durée moyenne des unités de vente : 20 jours.

Prix de vente au public :

Normale, bromurée, sulfatée	10 fr. 75.
Citratée.....	12 fr. 75.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 69-13.)

GASTROZYMASE

Composition. — Ferments gastriques naturels.

Indications. — En plus du pouvoir de substitution utilisable en cas d'hypo-pepsie ou d'apepsie, le système des ferments gastriques (zymases), rassemblés dans la GASTROZYMASE, a la propriété de stimuler les fonctions digestives déficientes et de les régulariser, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes. Les troubles gastriques, qu'ils proviennent d'hypo- ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie.

Forme. — Comprimés effervescents.

Posologie. — Comme médicament de substitution ou régulateur gastrique : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

GASTRUTH

Cachets

Assure la digestion aisée de tous les aliments.

Composition :

Pepsine en poudre Codex.	0 gr. 20	S. N. Bismuth Codex...	0 gr. 20
Pancréatine Codex.....	0 gr. 15	Carbonate de Magnésie..	0 gr. 20
Maltine Codex.....	0 gr. 15	Carbonate de Chaux....	0 gr. 20
Noix vomique pulvérisée.	0 gr. 01	Bicarbonate de Soude...	0 gr. 25

Pour un cachet.

Originalité. — Les cachets GASTRUTH apportent à l'estomac le concours des trois ferments indispensables à une rapide et complète digestion : **pepsine, pancréatine, maltine.**

L'adjonction d'éléments neutralisants ramène l'acidité stomacale à son taux normal. En plus, l'addition de certains éléments neutres (carbonate de chaux, sous-nitrate de bismuth) permet un revêtement de la muqueuse, **VERITABLE PANSEMENT GASTRIQUE.**

Posologie. — Prendre un cachet avant les repas de midi et du soir. Au besoin, prendre un deuxième cachet après un repas abondant et plus lourd qu'à l'habitude.

Indications — Dyspepsies, Gastrite aiguë ou chronique, Hyperchlorhydrie, Hypochlorhydrie, Dilatation d'estomac, Ptose gastrique, Aéro-phagie.

Présentation. — Boîte de 20 cachets.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél.: Gobelins 36-96.)

GATRAN

Composition. — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le Savon Cadique et le Baume Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

Indications. — Pityriasis simplex, Eczéma séborrhéique, Séborrhée, Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné, Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

Mode d'emploi. — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de *Baume*, le matin, lavage au *Savon*.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif, contre toutes les affections séborrhéiques.

Présentation. — *Baume* : flacon de 90 cc.

Savon : flacon de 500 cc.

Prix de vente :

Le flacon de Baume GATRAN : 15 francs.

Le flacon de Savon GATRAN : 25 francs.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue A. Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien
entièrement assimilable.**

Présentation. — 3 formes: Ampoules injectables de 1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique général de l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anémie, Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme, Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consolidation des fractures.

Mode d'emploi. — 1 ampoule injectable par jour; 1 à 3 comprimés par jour; 1 à 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix :

Ampoules : 16 francs. — *Comprimés* : 14 francs. —
Granulé : 15 francs.

GAUROL INTRAVEINEUX

Présentation. — Ampoules de 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.
N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

Indications thérapeutiques.

En Médecine :

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Epanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptomatique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigrissement).

En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.
Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

Mode d'emploi. — Injecter 10 cc. en cas d'urgence.

Prix : 30 francs la boîte de 6 ampoules.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUQ
COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 09-71.)

GELIDERM

Toutes les affections de l'épiderme.

Composition :

Acide salicylique	} aa 1 gr.
Résorcine	
Chloral	
Acide phénique	

Excipient liquide spécial pour 100 grammes.

Forme : *Liquide.*

Indications. — Usage externe ; Eczéma, Impétigo, Herpès, Pityriasis, Affections parasitaires, Piqûres d'insectes, etc...

Mode d'emploi :

3 applications par 24 heures avec un tampon de gaze.

Enregistré au laboratoire national de contrôle sous le n° 1311-1.

Laboratoire GELIA

CHAMPDENIERS — Deux-Sèvres.

(Tél. : n° 28.)

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation dénuée de toute action irritante ou toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi. — Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Prix de vente du flacon de 200 g. : 8 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

GÉLOK

Tablettes.

Pansement gastrique complet (absorbant, protecteur, neutralisant) :

Formule :

Gélose.....	0,10
Grénétine	0,10
Magnésie hydratée	0,25
Kaolin purifié colloïdal.....	0,25

— Excipient menthé, Q. S. p. 1 tablette de 3 grammes équivalant à une cuillerée à café de poudre.

Tablettes Gélok belladonnées même formule + V gouttes de teinture de belladone par tablette.

Présentation. — En étuis de poche de 11 tablettes ;
4 étuis de gélok simple ;
1 étui de gélok belladonné ;
par boîte : 15 francs.

C'est le parfait

**traitement ambulatoire
des hyperchlorhydriques**

Laboratoire LEURQUIN

50-52, rue Pierre - Legrand — LILLE (Nord).

GÉLOTANIN CHOAY

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie :

- 1° Pour *nourrissons* et *jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.
- 2° Pour *adultes* : Cachets dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Boîte de 20 paquets. Boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique 12 gr. 75

Chlorure ammonique 5 gr.

Ac. phosphorique officinal.... 1 gr. 35

Cinq grammes représentant comme coefficient d'acidité en $\frac{N}{10}$ 150 cc.

Indications. — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH). Colibacillose, Asthénie.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 60.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.
(Tél. : Gobelins 23-90.)

GÉNALYPTOL

Inhalation.

Composition. — Baume du Pérou (4,5 p. 100) *parfaitement solubilisé*, Teinture d'Eucalyptus et de Benjoin, Essence de Thym, Serpolet, Citron, Niaouli, Géranium, Menthol à *faible dose*, Eau de Laurier-Cerise, Elixir Parégorique, Teinture d'Aconit.

Caractéristiques et Forme pharmaceutique. — Solubilisation parfaite de ses constituants, en une préparation liquide, stable, homogène, instantanément miscible à l'eau.

Propriétés. — Action calmante, décongestive, antiseptique, *non irritante*.

Indications. — Affections des voies respiratoires et du rhino-pharynx, Sinusites, Rhinites, Ethmoïdites, Angines, Laryngites, Trachéites, Pharyngites, Prophylaxie antigrippale.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un inhalateur rempli d'eau bouillante.

Présentation et Prix : 16 francs le flacon pour 20 inhalations environ.

Laboratoires du GÉNALYPTOL

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 61-96.)

GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux, Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.
Granules au 1/2 mgr. Ampoules à 2 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 18 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNÉCARMINE

Association de Phényléthylmalonylurée. Eséridine. Salicylate. Formine. Charbon.

Formule. — 1 cuiller à café de granulé contient : Phényléthylmalonylurée 0 gr. 02, Salicylate Eséridine 0 gr. 001, Charbon animal 0 gr. 50, Charbon végétal 1 gr., Formine 0 gr. 30.

Présentation. — Cachets, Granulé fondant de goût agréable.

Indications. — Entéro-colites, atonie gastro-intestinale, constipation chronique par atonie, troubles digestifs sympathicotoniques et leurs conséquences.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café ou cachets par jour avant les repas.

Prix : Boîte modèle courant : 16 fr. (Durée moyenne : 6 jours.) — Flacon Cure : 40 francs.

Laboratoire R. THIRODE

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,

33, Grande-Rue — BESANÇON

(Tél. : 0-37.)

GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

Salicylate de Gènesérine.

Formes. — Granules et dragées de 1/2 mgr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 mgr.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

Le flacon ou la boîte. Prix au public : 18 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueur des tuberculeux.

Formes. — *Gouttes* : XX gouttes = 1 milligr.
Granules au 1/2 milligr. *Ampoules* à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte.
18 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

Formes. — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 et à 10 centigrammes.

Indications :

La douleur : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies, Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation

Mode d'emploi. — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

Comprimés : 2 à 4 par jour. — *Ampoules* : 1 à 2 par jour.

Prix : La boîte de 7 ampoules de 4 cgr., 25 francs.

Le flacon de 15 comprimés de 2 cgr., 25 francs.

La boîte de 12 ampoules de 10 cgr. pour cure de démorphinisation, 90 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à un traitement de 7 à 10 jours, à dose journalière maximum.

Laboratoire des Produits Amido

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications.

ÉTATS PARKINSONIENS, Paralyse agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.

Granules au 1/2 mgr.

Ampoules dosées à 3 mgr. et à 1 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine à 3 mgr. suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 22 francs.

La boîte d'ampoules : 30 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTHÉNIQUES

Ampoules, Granules. Gouttes.

Caodylate de Géostrychnine et de Génésérine

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémiés.

Formes. — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

Ampoules. — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 20 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges. — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

Formes. — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr.
Granules à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 16 francs.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉRANINE

(Vermicide universel)

Composition. — Diméthylcyclooctodiéniol, essence de *Melaleuca viridiflora*.

Action thérapeutique. — Agit sur tous les parasites intestinaux (*tænia*, oxyures, tricocéphales, *ascaris*, protozoaires, etc.).

Avantages. — Médicament non toxique, sans aucun danger, n'incommodant pas le malade.

Présentation. — Capsules gélatineuses : 16 par boîte.

Mode d'emploi :

Contre le tænia : deux fois 8 capsules à 1/2 heure d'intervalle.

Contre les oxyures : 2 capsules à chaque repas pendant 4 jours. Recommencer huit jours plus tard.

Prix : 15 francs.

E. BOULLÉ, Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-Interne des Hôpitaux,

Lauréat de la Faculté de Paris.

19, rue de la Porte-Trivaux — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 15-70.)

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux.
Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la Coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Gripes pulmonaires, etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Non toxique. Sans action nuisible sur le tube digestif, ce qui en facilite l'emploi même chez les nourrissons.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (XLVI gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures : jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes.

Aucune contre-indication.

Prix : 11 francs.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

GLANDEX PHOSCALCIQUE

Forme. — Granulé.

Formule. — Ergostérine irradiée, Parathyroïdine, Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

Indications. — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 20 francs.

Autres GLANDEX :

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Glandex Orchitique, Thyro-Ovarien.

Ovarien, Pluriglandulaire M. et F.,

Thyroïdien, Entéroglandex.

Laboratoires M. A. ROUX

58, rue de Maubeuge — PARIS.

(Tél. : Trudaine 54-69.)

GLANDIMBINE LAFRAN

Indications. — Impuissance génitale précoce ou sénile. Dépression morale ou physique.

Composition. — Yohimbine, 0,005 ; Cérébrine, 0,10 ; Orchitine, 0,15 pour un comprimé dragéifié.

Posologie. — (Pour adultes seulement). Un comprimé le matin, un à midi, un le soir au repas et un au coucher, si nécessaire. Avaler avec un peu d'eau ou autre liquide.

Littérature et échantillons aux docteurs seulement.

Prix : 30 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 36-78.)

GLANDOCALCYL

Récalcifiant. — Réminéralisateur.

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, diphosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré-tuberculose.

Formes. — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*, 14 fr. ; *Granulé*, 16 fr.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

GLÉFINA

Puissant reconstituant général de **saveur agréable**.

Parfaitement toléré et assimilé *en toutes saisons*.

Composition. — A base d'extrait d'huile de foie de morue, d'extrait de malt et d'hypophosphites associés.

Propriétés. — Reconstituant énergique et d'action durable, remplace l'huile de foie de morue dans toutes ses indications.

Est parfaitement digéré, toléré et assimilé l'été comme l'hiver.

Indications. — Toutes déficiences légères ou profondes, anémies, lymphatisme, tuberculose et pré-tuberculose, convalescences post-opératoires, post-gravidiques, etc...

Posologie :

Enfants : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.
 6 à 10 — : 2 à 3 — à dessert —
 11 à 15 — : 2 — à soupe —

Adultes : 3 — — —

Gléfina est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 689-4.

Prix du flacon : 19 fr. 90.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLÉFINA,

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

GLÉSOL

Médication Antistaphylococcique

Complexe colloïdal organo-métallique.

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Étain colloïdal, Levurine extractive, Soufre colloïdal, Ferments lactiques.

En flacon de 50 capsules.

Action thérapeutique. — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré ; la *levurine extractive* agit comme anti-infectieux polyvalent et augmente notablement la leucocytose ; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain ; les *ferments lactiques* s'opposent aux fermentations putrides.

Indications. — Furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, acné, folliculites, orgelets, sycosis, et toutes les affections dues aux staphylocoques.

Doses :

Adultes : 4 à 20 capsules par jour, et plus, si nécessaire.

Enfants : Doses proportionnelles selon l'âge.

Prix : 25 francs pour 3 à 12 jours de traitement.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

GLOBEXINE

Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable. Jamais d'anaphylaxie.

Propriétés thérapeutiques. — Régénération globulaire intensive.

Indications. — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toute nature. Convalescences.

Forme. — Ampoules buvables 10 cc.

Dose moyenne :

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour. — *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 17 francs.
Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien
21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29).

GLOBALOFER « ROCHE »

Composition. — Chaque comprimé contient :

ℓ-Tryptophane	2 mg. 50
Monochlorhydrate de ℓ-histidine.....	5 mg. 00
Globine	16 mg. 00
Globine ferrique	66 mg. 00
Globine cuprique	3 mg. 30
Globine manganique	6 mg. 60
Excipient : Q. S. pour un comprimé de 15 centigr.	

Action. — Thérapeutique équilibrée et totale de l'anémie, représente une *véritable révolution hématologique*, car, pour la première fois, l'hématopoïèse est, grâce à lui, placée sur son véritable terrain : celui du métabolisme (travaux des prof. Fontès et Thivolle).

Indications thérapeutiques. — Toutes les anémies par spoliation sanguine, par hémolyse, par carence martiale. Anémie du paludisme, des infections, des parasitoses intestinales. Anémie du nourrisson, du donneur de sang, etc. *Toutes les indications du fer* (chlorose, puberté, grossesse, allaitement, diarrhées chroniques, etc.). *Toutes les indications de l'acidaminothérapie* (inappétence, maigreur, déficiences organiques, ulcères gastro-duodénaux, etc.).

Aucune contre-indication.

Avantages. — Les comprimés de Globinofer « Roche » sont inaltérables, sans aucune odeur et sans aucune saveur ; ils sont toujours admirablement supportés par le tube digestif et ils permettent, sans aucun inconvénient, un traitement intensif et prolongé.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 comprimés par jour dans du lait.

Enfants : 2 comprimés 2 fois par jour dans de l'eau.

Adultes : 2 comprimés ingérés tels quels au moment des 3 repas.

Comprimés. — Flacon de 60.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-80.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

GLOBULES FUMOUCHE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 25 par globe.

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 10 par globe.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Prix : 19 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente :
de 1 à 3 semaines.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

GLOBULES RÉBAUD

Composition.

Éphédrine chlorhydrate.....	0 gr. 15
Arrhénal.....	0 gr. 03
Iodure de caféine bromuré.....	7 gr. 20
Extrait sec polygala.....	0 gr. 12
— — lobélia.....	0 gr. 03
— — crataegus.....	0 gr. 12
— — mou d'opium.....	0 gr. 03
— — belladone.....	0 gr. 03
pour 30 globules.	

Même composition pour la liqueur Rébaud, destinée aux malades ne pouvant avaler les pilules.

Doses. — Deux globules ou XL gouttes, trois fois par jour : avant les repas de midi ou du soir et deux heures après le dîner.

Indications. — Les **Globules Rébaud** suppriment peu à peu les crises d'asthme, l'emphysème, les dyspnées, bronchites chroniques.

Pharmacie ARDOIN

33, boulevard Dubouchage — NICE (A.-M.).

GLOBULES ROMON

Médication rationnelle de l'impuissance.

Deux formes. — Globules glutinisés et ampoules injectables.

Composition. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'yohimbine et au phosphure de zinc pur.

Indications. — Asthénie, Sénilité précoce, Dépression physique et intellectuelle, Impuissance.

Doses :

Globules : 4 à 6 par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Le flacon de 40 globules : 25 francs.

La boîte de 10 ampoules : 40 francs.

Laboratoires ROMON

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

GLOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

Posologie. — Gouttes : *Jeunes enfants* :

X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

Enfants : XX à XXX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour.

Adultes : XL à LX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : *Enfants* : 3 à 6 dragées par jour.

Adultes : 6 à 12 dragées par jour.

Durée moyenne des unités de vente :

4 à 6 jours.

Prix : 13 francs.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

GLOXINES

Protéinothérapie spécifique des cancers.

Méthode du D^r Rubens-Duval.

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du D^r Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique au taux de 10-21.

Propriétés. — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer, dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Elles améliorent l'état général des malades et exercent à la longue une action locale sur les cellules cancéreuses qu'elles ramènent vers une évolution normale.

Indications. — Les Gloxines préparent et complètent les interventions chirurgicales et les traitements radiothérapiques, dont elles diminuent les risques de récurrence et de métastase.

Elles ne sont à employer seules que lorsque tout traitement local est contre-indiqué.

Posologie. — En moyenne 2 ampoules par jour, à 12 heures d'intervalle. Boire 1/2 heure avant le repas, le contenu d'une ampoule dilué dans un peu d'eau.

Dans les cas à évolution rapide ou comme traitement pré-opératoire, il peut être donné, sans inconvénient, 3 et même 4 ampoules par 24 heures.

Durée du traitement. — Il doit être prolongé sans interruption tant que la guérison ne peut être considérée comme acquise. La continuité du traitement et sa longue durée sont les conditions nécessaires de son efficacité.

Choix des Gloxines. — Employer les GLOXINES extraites d'une tumeur de même variété que celle qu'il s'agit de traiter (voir liste ci-contre).

Pour le traitement des métastases, utiliser les GLOXINES se rapportant au type primitif de la tumeur.

Dans tous les cas où les GLOXINES spécifiques ne peuvent être utilisées, employer les GLOXINES POLYVALENTES (Voir ci-dessous).

LES GLOXINES POLYVALENTES

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines extraites de tumeurs de types très variés, diluées à parties égales en solution physiologique au taux de 10-21.

Indications. — Elles sont à employer lorsqu'on ne sait quelles GLOXINES spécifiques prescrire. L'expérience montre que les malades bénéficient de l'extrait qui leur convient et n'éprouvent aucun effet des autres extraits.

Posologie et durée du traitement. — Identiques à celles des GLOXINES. Elles peuvent être également employées en traitement continu et longtemps prolongé.

LISTE DES GLOXINES

O. C. P. Dépositaire général.

- N° 1. *Épithéliomas épidermoïdes* (bouche, langue, lèvres et orifices naturels).
- N° 2. *Estomac* (cancers épithéliaux).
- N° 3. *Gros intestin, rectum* (épithélioma cylindrique)
- N° 4. *Ovaire* (épithélioma wolffien).
- N° 5. *Ovaire* (épithélioma germinatif).
- N° 6. *Peau* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés).
- N° 7. *Peau* (épithélioma basocellulaire).
- N° 8. *Prostate* (adénomes et épithéliomas).
- N° 9. *Sein* (épithélioma type ordinaire).
- N° 10. *Thyroïde* (épithélioma).
- N° 11. *Utérus-col* (épithéliomas à cellules cylindriques et basocellulaires).
- N° 12. *Utérus-col* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes).
- N° 13. *Utérus-corps* (épithéliomas à cellules cylindriques).
- N° 14. *Chondrosarcome*.
- N° 15. *Vessie* (épithélioma).
- N° 16. *Vésicule biliaire* (épithélioma).
- N° 17. *Rein* (épithélioma à cellules claires).
- N° 18. *Lymphocytome*.
- N° 19. *Sarcomes* (à petites cellules et à cellules polymorphes).
- N° 20. *Testicule* (séminome).
 - A. *Leiomyome malin*.
 - B. *Parotide* (tumeur mixte).
 - D. *Ovaires* (séminome).
 - E. *Ovaire* (sarcome provenant des cellules à lumière).
 - G. *Fibrosarcome*.
 - H. *Maladie de Hodgkin*.
 - K. *Sein* (sarcome).
 - L. *Sein* (épithélioma à grosses cellules).
 - M. *Sein* (épithélioma à cellules cylindriques).
 - N. *Testicule* (épithélioma wolffien).
 - O. *Nævome achromique*.
 - P. *Nævome mélanique*.

LES GLOXINES ET LES GLOXINES POLYVALENTES

sont présentées sous deux conditionnements :

Boîte de 20 ampoules buvables d'un centicube... 24 fr.
Boîte de 60 ampoules buvables d'un centicube... 65 —

Laboratoires des GLOXINES

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Odéon 93-94.)

GLUCAMONIX

Composition. — Gluconate d'ammonium
(C⁶ H¹¹ O⁷) NH⁴.

Indications. — Acidification des urines et du sang.
Infection urinaire, cicatrisation des lésions rénales.
Cystites incrustées, Affections apyrétiques des
bronches, Dyspnées, Pneumonies après la crise,
Gastrites accompagnant les maladies bronchi-
ques, Névralgies, myalgies, sciatiques. Tétanies
rebelles.

Présentation :

Comprimés à 0 gr. 40 : boîte de 50 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules (injectables
intramusculaires ou intraveineuses et buvables).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour. — 2 injec-
tions par semaine.

Laboratoire du GLUCAMONIX

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOCHAUX

Composition :

Gluconate de chaux pur	20 gr.
Inosito phosphate de chaux et Magnésie.	1 —
Formiate de chaux, Hypophosphite de chaux et Magnésie	1 —
Excipient sucré et aromatisé pour	100 —

Formes. — *Granulé et cachets.*

Indications. — Calcifiant organique puissant, indiqué
dans tous les cas de déminéralisation et de dénutrition.

Grossesse et allaitement.

Croissance et ossification.

Phosphaturie et carie dentaire.

Fractures, Asthénie et Convalescence.

Doses : *Enfants :* 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 cuillerées à soupe ou 2 à 3 cachets par jour.

Prix :

Granulé : 15 francs ; cachets : la boîte de 24 : 15 francs.

Durée du flacon : 8 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des
Médicaments sous le n° 1284-1.

E. DUFOUR, Pharmacien.

AMPLEPUIIS (Rhône) — Tél. : 55.

GLUCOCITHINE

Composition.		Présentation
Gluconate de calcium.....	10 grammes	Granulés simples.
Lécithine d'œufs.....	2 —	
Pour 100 grammes granulés.		
Gluconate de calcium.....	10 grammes	Granulés Vitamine D.
Lécithine d'œufs.....	2 —	
Vitamine D.....	80.000 U. I.	
Pour 100 grammes granulés.		
Gluconate de calcium.....	0,10	Comprimés simples.
Lécithine d'œufs.....	0,04	
Pour 1 comprimé.		
Gluconate de calcium.....	0,10	Comprimés Vitamine D.
Lécithine d'œufs.....	0,04	
Vitamine D.....	320 U. I.	
Pour 1 comprimé.		

Indications. — Asthénie, anorexie, surmenage, épuisement nerveux, impuissance fonctionnelle, sénilité, rachitisme, états pré-tuberculeux, tuberculose, phosphaturie, diabète, etc.

Posologie. *Granulés :* Adultes : 2 cuillerées à café pendant le repas.
Enfants : 1 cuillerée à café pendant le repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café délayée dans du lait tiède.

Comprimés : { Adultes : 4 à 6 par jour.
 { Enfants : 2 à 3 par jour.

Laboratoire de la GLUCOCITHINE.

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCONYL

Composition. — Gluconate de calcium ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7$)² Ca.

Indications — Toutes les indications du calcium soluble découlant de ses propriétés récalcifiantes, anti-hémorragique, diurétique, déchloration, antiphlogistique, équilibrante du système vago-sympathique.

Présentation :

Solution à 10 % concentration :

1^o Ampoule de 5 cc. : boîte de 10 ampoules.

2^o — 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

3^o — 10 cc. : boîte de 10 ampoules.

Solution à 20 % concentration :

1^o Ampoule de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

2^o — 10 cc. : — 6 ampoules.

1^o Cachets simples : boîte de 18 cachets.

2^o — à la vitamine D : boîte de 18 cachets.

1^o Granulés simples : boîte de 125 grammes.

2^o — à la vitamine D : boîte de 125 grammes.

3^o — ergostérinés irradiés : boîte de 125 grammes.

Posologie :

Ampoules : 5 à 10 cc. par jour (intramusculaire ou intraveineux).

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Cachets : 1 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1/2 doses.

Laboratoire du GLUCONYL

L. CHAUVIN, Pharmacien 3 rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOSALYL

Puissant traitement d'attaque du Rhumatisme Articulaire Aigu.

Composition. — Chaque ampoule de 10 cc. contient : *Salicylate de Soude* 1 gramme, *Glucose Anhydre* 1 gramme, *Thiosinamine* 0 gr. 04.

Indications. — 1° *Rhumatisme Articulaire Aigu* et à forme extra-articulaire. Manifestations cardiaques et oculaires rhumatismales. 2° *Maladies nerveuses*. Encéphalite Léthargique, Poliomyélite, Sclérose en plaques ; 3° *Syndromes mentaux fébriles*.

Posologie. — Injections strictement intraveineuses. Aiguille de 7/10 courte. 1 à 4 ampoules par jour pendant 4 à 5 jours.

Important. — Toujours associer à la médication salicylée intraveineuse, la médication salicylée « per os », soit sous forme *Entérosalicyl* (Salicylate de Soude pur en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin), soit sous forme *Sulfosalyl* (Polysalicylates, Soufre et Calcium, associés à l'Opothérapie à dose minime).

Prix. Boîte de 6 ampoules de 10 cc : 25 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1001-17.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale (Sarein)

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37).

GLUCOSIUM

Composition. — Gluconate de magnésium ($C^6 H^{11} O_7$)²Mg.

Indications. — Sédatif du système nerveux. Antispasmodique (spasmes des voies digestives et biliaires). Désensibilisant. Laxatif doux sans accoutumance. Infection intestinale. Douleurs angineuses. Varices. Prophylaxie des proliférations cellulaires.

Présentation :

Cachets de 1 gr. : la boîte de 20 cachets.

Ampoules 5 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Posologie :

1 à 2 cachets par jour pendant les repas.

2 à 3 injections par semaine.

Pour les ampoules, l'association du Gluconate de Calcium avec le Gluconate de Magnésium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUCOSIUM

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOXYL NACHER

Antidiabétique Nouveau.

Composition : Le Glucoxyl est une association médicamenteuse synergique — active par voie buccale — à base 1^o : de Tasi (Asclep.) — Plante (sud-améric.) dont l'alkaloïde Morrhénine (Arata) a une action remarquable sur le système nerveux et provoque par inter action glandulaire une sécrétion accrue des cellules endocrines. De plus, par ses vitamines B2 et B3, aide puissamment au métabolisme des glucides ; — 2^o des éléments chimiques : Formiate de Quinine, Codéine — qui concourent à ramener le sang à son pH normal. Enfin, Arséniate de Na (dose minime) qui favorise l'élimination pulmonaire en CO₂ — et Carbonate de Lithine qui accroît l'excrétion urinaire des acides accumulés dans l'organisme.

Résultats. — Disparition des céto-acidoses. Ramène l'équilibre acide-base du sang, soutient sa réserve alcaline. Régulateur glycémique. Supprime la glycosurie, augmente la tolérance hydrocarbonée, propriétés toniques, reprise de l'activité physique et intellectuelle.

Indications. — Diabète bénin ou grave dans toutes ses orientations cliniques. Soins pré et post-opératoires, grossesses diabétiques, diabète infantile. S'associe à la médication insuliniennne, traitement facile à suivre, résultats contrôlables, aucune contre-indication, sans intolérance.

Mode d'emploi. — 2 cachets par jour, un avant les repas midi et soir.

La boîte cure de 20 jours : 32 francs.

La demi-boîte : 18 francs.

Littérature et échantillon sur demande.

Préparé par : **NACHER, pharmacien licenciés ès sciences.**

Pharmacien diplômé Rép. Arg.

71, Bd. Carnot — TOULOUSE.

GLUQUINIX

Composition. — Gluconate de quinine (C⁹ H¹¹ O⁷)² quinine.

Indications. — Toutes les indications de la quinine avec action renforcée et tolérance parfaite. Paludisme, pneumonie, bronchite, coqueluche, grippe, fièvre récurrente. Rhumatisme aigu, névralgies, pyémie, infection puerpérale. Fièvre typhoïde, dysenterie amibienne, Asthme nerveux, pemphigus, dermatite exfoliatrice. Fièvre des tuberculeux. Infections pulmonaires post-opératoires.

Présentation :

Comprimés à 0,25 : boîte de 20 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

— 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Suppositoires à 0,10. *Bébé* : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,20. *Enfant* : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,50. *Adulte* : boîte de 10 suppositoires.

Posologie :

La posologie sera calculée en tenant compte de la correspondance suivante :

50 centigrammes de gluconate de quinine correspondent à 37 centigrammes de chlorhydrate de quinine représentant 30 centigrammes de quinine base.

N. B. — a. Les injections de GLUQUINIX ne sclérosent pas les veines.

b. L'association avec le gluconate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUQUINIX

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUTISALYL

Comprimés glutinisés de 1 gr. de salicylate de soude.

Avantages. — Facilité de posologie, plus de dégoût à l'absorption, plus de troubles gastriques, la désintégration du comprimé se faisant dans l'intestin.

Mode d'emploi. — Les comprimés doivent être avalés sans être croqués.

Prendre dans la journée une cuillerée à café de bi-carbonate de soude.

Indications. — Celles du salicylate de soude.

Prix :

50 comp. donc 50 grammes de produit actif : 19 fr. 80.

GLUTISALYL INFANTILE (Comprimés glutinisés de 0 gr. 50 de salicylate de soude).

GLUTIPOLYSALYL (Comprimés glutinisés d'un gram. de salicylate de soude, potasse et chaux).

J. BARAIGE, Docteur en Médecine

Pharmacien de 1^{re} Classe.

24, rue Paul-Bert. — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 21-22.)

GLUTI-SANTAL

Essence de Santal Mysore, de provenance directe, associée à la Belladone.
(En capsules glutinisées.)

Formule :

Essence de Santal pure	0,20
Belladone (extrait hydro-alcoolique de feuilles)	0,002
Par capsule.	

Indications. — Toutes urétrites ; Néphrites suppurées ; Mal de Bright ; Cystites, Métrites.

Avantages. — Pas de gastralgie ; sédation des spasmes ; pas d'éruptions.

Cette association synergique Belladone-Santal constitue un progrès considérable dans la thérapeutique symptomatique de la blennorrhagie dont elle raccourcit notablement la période d'écoulement.

Posologie. — 3 ou 4 capsules, trois fois par jour, de préférence un quart d'heure avant les repas.

Prix. — La boîte de 50 capsules : 16 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

GLYCARSOL

Régénérateur de l'organisme, fortifie, tonifie, stimule.

Composition. — Glycéro-Phosphate de Soude, de Manganèse, de Fer ; Triiodure d'arsenic ; Organes frais (moelle rouge osseuse, rate, thymus, muqueuse intestinale). Tolérance absolue, assimilation parfaite. Sa préparation demande environ deux mois.

Indications. — Anémies, Lymphatisme, Convalescence, Inappétence, Adénopathie, Tuberculose, Paludisme, etc.

Posologie. — Commencer par 1 goutte matin et soir pour atteindre de :

	6 mois à 18	18 mois à 3	3 ans à 6	6 ans à 10	10 ans à 16	16 ans à 20	20 ans à 30	30 ans à 40	40 ans et plus
<i>Enfants :</i>	18	—	3	—	6	—	10	—	16
	3	ans	6	ans	10	ans	16	ans	20
	6	—	10	—	16	—	20	—	30
	8	—	11	—	13	—	15	—	18
	11	—	16	—	20	—	25	—	30
<i>Adultes :</i>									

Dans un peu de lait, d'eau sucrée ou non.

Continuer la dose maximum pendant 7 jours et diminuer de 11 gouttes par jour (1 le matin, 1 le soir) pour descendre à 1 goutte le matin, 1 le soir. Cesser 15 jours et recommencer.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Le flacon : 12 fr. 50.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,125 centigr. par cuiller-mesure. Ampoules injectables dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

Doses et mode d'emploi. — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Prix :

Comprimés : 14 francs. — *Granulé* : 13 fr. 50.
Ampoules : 15 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.
(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

GLYCOBYL

Composition. — Extrait biliaire. — Extrait de muqueuse intestinale (Entérokinase). — Evonymine. — Extrait total d'artichaut. — Hexaméthylène-tétramine. — Charbon activé.

Propriétés. — Stimule et régularise le fonctionnement du foie. — Stimule la sécrétion biliaire. — Fluidifie la bile. — Antiseptique des voies biliaires et de l'intestin. — Laxatif.

Indications. — Congestions hépatiques. — Insuffisance hépatique. — Lithiase biliaire. — Cholecystites. — Dyspepsies intestinales. — Constipation.

Posologie :

Adultes : Dragées, 2 à 4 par jour.

Enfants : Granulés, 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix, le flacon : 14 francs.

Chaque flacon correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65.)

R. C. : Seine 221.745.

GLYCOCARPINE

Éléments actifs. — Nitrate de pilocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'hamamélis et cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

A. — Médication vaso-dilatatrice.

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques.

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes*: 2 pilules ou XX gouttes, au début des trois repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Échantillons sur demande :

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B. 36-32.)

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action thérapeutique. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Prix : 25 fr. pour 6 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

GLYCO-M.

Composition. — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution de Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria. Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

Propriétés particulières. — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant, et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

Indications. — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

Gencives spongieuses et maladies buccales. — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang, et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

Se vend dans toutes les Pharmacies :

En flacons de 100 grammes : 5 francs, modèle de poche.
En flacons de 200 grammes : 10 fr, modèle stilli-goutte.
En flacons de 500 grammes : 15 francs, demi-litre.
En bocaux de 3 litres : 70 francs, modèle familial.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 333-2.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges Miquel, Pharmacien de 1^{re} Classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 16-85.)

CLINCO-THYMOLIS

1955-1956

Bataille de la Santé
Thymol
L'Environnement

1956-1957
Bataille de la Santé
Thymol

1957-1958
Bataille de la Santé
Thymol

1958-1959
Bataille de la Santé
Thymol

1959-1960
Bataille de la Santé
Thymol

1960-1961
Bataille de la Santé
Thymol

1961-1962
Bataille de la Santé
Thymol

GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN C^o.

Traitement des affections de toutes les muqueuses.

Composition :

Borate de Soude.....	2 040
Thymol.....	0 037
Menthol.....	0 037
Benzoate de Soude.....	2 040
Bicarbonate de Soude.....	2 040
Cajeputol.....	0 075
Salicylate de Soude.....	0 090
Huile de Pin.....	0 037
Huile de Bouleau.....	0 030
Glycérine, Colorant, alcool, eau distillée	93 574
	<hr/> 100 000

Avantages. — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

Action thérapeutique. — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

Indications. — *Voies digestives* : Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

Cavité buccale : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

Pharynx et gorge : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

Voies nasales : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

Yeux : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

Maladies de la peau : Erysipèle, Furunculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

Rectum et région anale : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

Gynécologie et Obstétrique : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

Plaies de toute nature.

Mode d'emploi. — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 cc.	6 francs.
250 cc.	12 —
500 cc.	20 —
Modèle Hôpital (3 litres)	90 —

Remise spéciale au Corps médical.

Établissements WEBER

A. GUILLAUME, Pharmacien,

5 bis, rue des Haudriettes — PARIS (III^e).

GMET**(Extraits Gmet.)**

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert, qui permet d'obtenir une *extraction complète sans altérer la plante.*

Correspondent tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Se prescrivent tous : en moyenne de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Le Diurétique Gmet est prescrit par cuillerées à soupe.

Voir également :

Boldo Gmet.	Kola.
Composé Gmet.	Piscidia.
Cratægus Gmet.	Quinquina Gmet.
Frêne.	Sauge.
Fucus Gmet.	Ulmaire.
Gui Gmet.	Valériane Gmet.
Hamamélis Gmet.	Viburnum.
Hydrastis Gmet.	Diurétique Gmet.
Jugland Gmet.	Extrait Hamyd.

Littérature sur chaque produit et Échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.)

Peuvent être prescrits aux Ass^{ces} Sociales, ils sont enregistrés au Laboratoire National de Contrôle sous les n^{os} 1259-1 à 1259-21.

GOMENOL

Nom et Marques déposés.

Essence de *Melaleuca viridiflora* sélectionnée.

GOMENOLÉO et Produits au GOMENOL

Propriétés. — Innocuité absolue, haut pouvoir antiseptique, rapidement diffusible, grand calmant, désodorisant, vivificateur des tissus et action modificatrice, hémostatique, toni-cardiaque.

Action thérapeutique et usages. — A l'intérieur, convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires (bronchites, tuberculose, etc.) et des voies urinaires (cystites, urétrites, etc.). En injections intramusculaires indolores (aiguilles fines). Imprégnation gomenolée dans toutes infections locales ou généralisées (septicémie, etc.). Immunisation préventive.

A l'extérieur, en inhalations et pulvérisations : coryzas, laryngites, bronchites, etc.

Pansements chirurgicaux : brûlures, plaies septiques, ulcères.

Multiples indications, nombreuses formes correspondant aux diverses applications :

Rhino-pharynx. — Gomenol-Rhino, Gomenoléo-Nasal (simple ou éphédriné), Vaseline Gomenolée, Inhalations.

Gorge. — Gomenol-Pâtes, Gomenol-Sirop, Gomenoléo 10 p. 100 en injections trachéales.

Bronches, poumons. — Gomenol-Capsules, Gomenoléo en injections intrapleurales (10 et 20 p. 100), intrabronchiques (20 p. 100) et intramusculaires (20 p. 100).

Intestin. — Gomenol soluble, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en lavements profonds, Gomenol-Rectal, Gomenol-Glutinules.

Rein, vessie. — Gomenol-Glutinules, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en instillations.

Plaies, brûlures. — Gomenol-Onguent, Gomenoléo 20 p. 100 et 33 p. 100 en pansements, Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble) pour lavages et pansements humides.

Gynécologie. — Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble), Gomenovules, Gomenoléo (pansements), Gomenol pur (attouchements), Gomenol-Savon.

Grande chirurgie. — Gomenol pur ou Gomenol-Rubéo (champ opératoire), Gomenoléo (Imprégnation gomenolée).

Les Produits sont inaltérables.

Présentations populaires :

Gomenoléo, petit flacon.

Gomenoléo, boîte de 3 ampoules 5 cc.

Gomenoléo-Nasal, tube canule.

Vaseline Gomenolée Prevet, tube canule.

Laboratoire du GOMENOL

François PREVET, docteur en Pharmacie

48, rue des Petites-Écuries — PARIS (X^e). (Tél. : Provence 34-31.)

GONACRINE

Chlorure de 3-6 di-amino-10
méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Méningites, Méli-
técoccies. Erythème noueux.

Présentations : boîtes de 10 ampoules à 2 % : 25 fr.
— 3 — 2 % : 10 fr.
— 6 — 0,5 % : 10 fr.

Posologie et mode d'emploi. — Lavages de l'urètre : solu-
tions extemporanées de 1/8.000 à 1/1000. Injections
intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à
2 p. 100.

Pastilles de Gonacrine (boîtes de 40 pastilles), dosées à
0 g. 003 par pastille, destinées au traitement des sto-
matites infectieuses ou médicamenteuses, gingivites,
amygdalites. Prévention des infections à porte d'entrée
bucco-pharyngée. Désinfection post-opératoire.

Prix de la boîte de 40 pastilles : 5 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par
les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock-vaccin polymicrobien renfermant :

Corps microbiens + Lysat microbien + *Anatoxine*.

Indications. — *Toutes les infections génito-uri-
naires de l'homme et de la femme.*

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les
3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

**Ovules au Gonagone pour pansements vagi-
naux (Modèle spécial pour enfants).**

Prix : 4 ampoules : 20 francs ; 6 ovules : 20 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : de 12 à 16 jours.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

GONO-VACLYDUN

Composition. — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Urétrites, Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

Posologie. — En injections sous-cutanées, 3/4 de centicube le 1^{er} jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centicube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 centicube.

GONARTHRI-VACLYDUN

Lysat de gonocoques.

Lysat-vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

GOSIERINE DALLOZ

Formule p. 100 :

Cocaïne	0,05
Menthol	0,40
Borate de soude	4,00

Forme. — Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

La boîte : 6 fr. 25.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de La Chapelle — PARIS.

GOSSYPIOL MAURIN

Régulateur menstruel sédatif des règles douloureuses.

Complexe spécialisé des douleurs « ovo-utérines », le Gossypiol donne un triple effet : antinévralgique, anesthésique, antispasmodique qu'aucun analgésique général ne peut réaliser.

Gossypium-Piscida \bar{a} 20 mgr., Cimicifuga, Gelsémium, Virbunum \bar{a} 10 mgr., Aconit 23 mgr., Belladone 2 mgr., Digitale 8 mgr., Ch. quinine 10 mgr., Ch. morphine 1 mgr. 3, Ch. cocaïne 1 mgr. 1.

Seize dragées en 4 jours pendant 3 menstrues à 24 jours d'intervalle ordonnent la périodicité (2 matin et soir).

En deux jours au moment présumé des règles déterminent l'écoulement cataménial et calment toutes douleurs (4 le matin et 4 le soir).

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY

19, rue Brunel — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Galvani 51-31.)

GOTIRA

Crème neutre avec glycérine et odeur naturelle de plantes qui entrent dans sa composition.

Soluble dans l'eau, pénètre très rapidement dans l'épiderme.

Ne graisse pas, ne tache pas, et sur la figure fait disparaître toutes impuretés de la peau. Supporte merveilleusement la poudre et les fards.

Indications. — A conseiller partout où il y a inflammation et irritation de la peau.

Prix de vente au public :

Pots : 10 francs et 6 francs.

Tubes : 5 francs et 2 fr. 50.

Échantillon sur demande.

Laboratoire RICHOU

39, rue Taitbout — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 46-12.)

GOUDROLINE

Composition. — Ce produit est extrait du goudron de houille.

Propriétés. — Agent réducteur doué de propriétés kératoplastiques, il ramollit la couche cornée épaisse et diminue la formation des squames qui entravent la vitalité des cellules de Malpighi et la circulation lymphatique.

Il est fortement astringent, et son action décongestionnante s'exerce tant superficiellement que par pénétration.

Il possède la propriété de faire disparaître rapidement des éruptions prurigineuses tenaces et de modérer le prurit d'une façon durable en agissant sur les terminaisons nerveuses.

Indications. — La Goudroline peut être employée dans tous les états desquamatifs de la peau, et notamment dans toutes affections prurigineuses de l'adulte (eczémas non suintants, parakératose psoriasiforme de Brocq, eczématides, eczémas séborrhéiques.

Posologie. — La Goudroline peut être utilisée pure ou incorporée à la poimade à l'oxyde de zinc.

Prix. — Le bidon de 125 gr. : 6 francs.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

GOUTTES ANTI-ASTHMATIKES

Du docteur HALLAY.

Composition :

Benzoate de soude.....	1,50
Caféine	1
Iodure de potassium	3
Trinitrine sol. 1/1000	2
Teinture de belladone	1
Teinture Adonis Vernalis	5
Eau Laurier-Cerise.....	10
Teinture Ethérée-Valériane	2
Glycérine.....	Q. S. P. 30 cc.

Propriétés. — Anti-asthmatic, eupnéique, antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, emphysème, bronchites aiguës et chroniques, retentissement cardiaque des affections pulmonaires chroniques.

Présentation et prix. — Un flacon de 30 cc. : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi. — X à XX gouttes matin et soir dans une tisane de coquelicot sucrée.

Laboratoire J.-A. FÉLIX

36, rue Eugène-Carrière — PARIS.

(Tél. : Marcadet 30-25.)

GOUTTES ANTISPASMODIQUES ADOL

Composition. — Alcaloïdes totaux de la Belladone, de la jusquiame, de la *salsepareille rouge*, Bromure d'ammonium, Gardénal.

Action thérapeutique. — Synergie médicamenteuse à faibles doses, sous forme liquide. Spécialement aérophagie, vomissements incoercibles, etc., etc.

Sans contre-indication.

Indications. — Le spasme sous toutes ses modalités.

Mode d'emploi. — XXV à XXX gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée, de préférence avant les repas ou 2 heures après.

Prix : 18 fr. 50 le flacon.
Pour 20 jours de traitement.

Laboratoires ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.

78, cours de la Liberté — LYON.

Tél. : Moncey 13-37.

GOUTTES ARSÉNOSTHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique, à doses progressives, avec le Méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :

Un milligramme de Sulfate de strychnine.

Cinq milligrammes de Méthylarsinate de soude.

Deux centigr. d'extrait de Quina.

Deux centigr. d'extrait de Kola stabilisée.

Indications. — Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie, adynamie.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas.

Éviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.

Laboratoire DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

GOUTTES BRONCHOPHILES ANDRÉ

Composition :

Codéine	0 cgr. 50
Bromoforme	3 cgr. 10
Chloroforme	2 cgr.
Gaïacol.....	2 cgr. 60
Eucalyptol	1 cgr.
Terpinol	5 cgr. 20

Pour une capsule.

Indications. — Toutes affections pulmonaires, toux, bronchites aiguës et chroniques, emphyseme, asthme, gripes.

Posologie. — 2 à 6 capsules par jour.

Prix : 11 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments 556-6.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

GOUTTES DE SERU

Extrait total et concentré des galbules de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles et des troubles de la ménopause.

Dose moyenne. — XXX gouttes avant chacun des deux principaux repas.

Durée moyenne du flacon : 12 jours.

Prix au public : 10 francs.

LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS.

(Tél. : Littré 13-37.)

GOUTTES ERYL

Traitement *per os* des affections de la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique.

Composition. — Synergie phytothérapique complète (Euphorbe, Coca, Rubus fruticosus, Aconit Napel, Belladone, Roses de Provins), à base d'Erysimum (Herbe aux Chantres).

Action thérapeutique. — Analgésique, décongestive, Antispasmodique et tonifiante (action élective sur les cordes vocales).

Indications. — Toux quinteuses, rebelles, coqueluchoides. Laryngites, trachéites, grippe, coqueluche, bronchites.

Mode d'emploi :

Adultes : XXXV à LX gouttes ; 5 à 6 fois par jour.

Enfants : V à XV gouttes ; 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix : 16 francs.

Durée du traitement : 10 à 30 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

GOUTTES GEHA

Formules :

Bromoforme pur.	} Soluté.. 2	Alcoolature d'aconit (racines).	2
Glycérine		du .. 6	Teinture de Drosera..... 2
Alcool à 90°.		Codex.. 12	Teinture de Grindelia..... 2

Avantages. — L'association du « Soluté officinal de Bromoforme » (Codex 1908) à l'alcoolature de racines d'Aconit sauvage et aux teintures de Drosera et de Grindelia constitue une Synergie puissante pratiquement dépourvue d'eau, parfaitement homogène, indéfiniment stable, éliminant toute crainte de voir le bromoforme se précipiter en globules à la longue. A tout instant, la teneur en bromoforme de chaque goutte est rigoureusement identique.

Absolument sans sucre, les Gouttes Geha peuvent être prescrites aux diabétiques.

Indications. — Toux quinteuses, spasmodiques et réflexes, Toux laryngées, Asthme idiopathique, Dyspnée d'origine bronchique, Catarrhe pulmonaire, Toux émétisante. Coqueluche.

En traitement combiné avec le Sirop du Dr Canac pour la guérison rapide de la Coqueluche.

Présentation. — Flacon de 24 cc. accompagné d'un compte-gouttes : 14 fr. 75 au public.

Mode d'emploi et doses. — Dans un peu d'eau sucrée ou de tisane.

Enfants : 3 mois à 1 an : V à X gouttes trois fois par jour ; 1 à 5 ans : X à XV gouttes trois fois par jour ; 15 à 20 ans : XXV à XL gouttes trois fois par jour.

Adultes : XL à LX gouttes trois à quatre fois par jour dans un peu d'eau.

Laboratoire Médical « GEHA »

à PORT-DE-BOUC, près de Marseille (B.-du-R.). (Tél. 30.)

GOUTTES LECONTE

Composition. — Orthoformiate d'éthyle, Codéine, Teintures de Grindélia, Polygala, Aconit, Drosera, Belladone, Bryone.

Indications. — Toux spasmodiques, Grippe, Trachéite, Coqueluche.

Posologie :

Adultes : LX gouttes 5 à 6 fois par jour.

16 à 20 ans : XLV à L gouttes 5 fois par jour.

12 à 16 — : XXV à XL — 4 —

6 à 12 — : XV à XXV — 4 —

2 à 5 — : X à XII — 3 —

Échantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

GOUTTES LINOBER

Indications. — Toux nerveuse, Trachéite, Pharyngite, Laryngite, Asthme, Coqueluche, Toux quinteuse des vieillards.

Formule :

β-dichloroéthane ...	0 gr. 02
Propanone.	} aa q. s. pour L gouttes.
Teinture de grindelia	
Teinture de drosera.	
Essence de menthe.	q. s. pour aromatiser.

Posologie :

Administrer 3 fois par 24 heures : à chaque fois :

<i>Enfants</i> :	de 1 an à 2 ans,	IV gouttes.
	de 2 ans à 3 ans,	VI gouttes.
	de 3 ans à 4 ans,	VIII gouttes.
	de 4 ans à 7 ans,	XV gouttes.
	de 7 ans à 14 ans,	XX gouttes.
	Au-dessus de 14 ans,	XXX gouttes.
	<i>Adultes,</i>	L gouttes.

Il s'agit de doses moyennes qui peuvent être augmentées ou même doublées sans aucun inconvénient, les gouttes Linober ne contenant aucune substance toxique.

Mode d'emploi. — Les Gouttes Linober doivent être prises de préférence en dehors des repas.

On peut les absorber directement sur 1 ou 2 morceaux de sucre, ou mieux, diluées dans un peu de liquide, sucré ou non (eau, infusions, etc...).

Prix : 12 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

GOUTTES MAGALO

Composition. — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 superactivé par un sel de manganèse.

Mode d'action. — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue ; de goût agréable, bien supporté par l'estomac ; la plus économique de toutes les préparations similaires.

Indications. — Affections du foie et de l'estomac, **asthénies**, verrues, cancer.

Prix : 15 francs.

Durée : 25 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 34-68.)

GOUTTES MALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée, dans un solvant hydroglycériné.

Avantages. — Calmant certain et rapide de toutes les toux. Véritable spécifique de la Coqueluche. Non toxique, même pour les nourrissons. Goût agréable.

Indications. — Coqueluche, toutes les toux.

Posologie :

Doses minima :

Nourrissons : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures.

De 6 mois à 1 an : III gouttes toutes les 2 heures.

Enfants : de 1 à 2 ans : VI gouttes toutes les 2 heures.

— 2 à 4 ans : IX — — —

— 4 à 6 ans : XII — — —

— 6 à 10 ans : XV — — —

Adultes : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Dans les *bronchites*, *toux nocturnes*, donner une potion expectorante dans la journée et le soir une seule dose massive de Gouttes Malone (XL à LXXX gouttes, chez les adultes, XV à XL gouttes chez les enfants suivant les résultats obtenus).

Prix : 15 francs.

Laboratoires du MALONE

D'HELIOT — DINARD — (Ille-et-Vilaine).

GOUTTES M. I. A.

Médication des débilités et des intoxicqués.

Formule :

Chlorure de Calcium	10
Acide Arsénieux.....	0,20
Bi-iodure de Mercure.....	0,50
Iodure de Potassium	10

Excipient : Q. S. pour 100.

Propriétés thérapeutiques. — Modificatrices et accélératrices de la Nutrition, les *Gouttes M. I. A.* réalisent une véritable Cure de désintoxication humorale et réveillent les forces de défense de l'organisme. Elles excitent l'ostéogène et combattent les troubles de croissance, lésions, etc...

Indications. — Débilité, Scrofule, Lymphatisme, Adénopathie, Diathèse hépato-arthritique, Maladies infectieuses, Troubles de croissance, Anémie.

Posologie. — La grande activité du produit exige que l'on se conforme aux doses prescrites sans les dépasser.

Adultes : XV à L gouttes en 3 ou 4 fois.

Enfants : (De 1 à 3 ans) II à VI gouttes 2 fois par jour.

Enfants : (De 3 à 7 ans) II à X gouttes 2 fois par jour.

Prix : Le flacon : 16 francs.

Laboratoire AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris.
4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

GOUTTES MOLINAL

Solution stable au 1/5^e de Phényléthylmalonylurée.

Indications thérapeutiques. — Toutes insomnies, troubles nerveux de toute nature, neurasthénie, hoquet, nausées nerveuses, crises épileptiques.

Posologie.

II gouttes : 1 centigramme de Phényléthylmalonylurée ;

X gouttes : 5 centigramme de Phényléthylmalonylurée ;

XX gouttes : 10 centigrammes de Phényléthylmalonylurée.

A prendre dans un peu d'eau ou dans une infusion calmante.

Avantages. — Absorption facile, assimilation rapide, dosage rigoureux du médicament.

Les **gouttes « Molinal »** peuvent être prescrites en potion ou en sirop associées à d'autres médicaments tels que Bromures, Chloral, Valériane, Passiflore, etc...

Prix au public. Le flacon de 10 cc. avec son compte-gouttes soigneusement calibré : 10 francs.

Laboratoires SAUBA

Montreuil — PARIS.

Tél. : Avron 15-79.

GOUTTES NICAN

(Sans sucre.)

Composition. — *Bromoforme* et *Codéine* purs, *Aconit*, *Belladone*, *Drosera*, *Grindélia*, *Benzoate de Soude*, *Eau de Laurier-cerise*.

(IV Gouttes = 1 goutte de Bromoforme *stabilisé*)

Caractéristiques. — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné *à tous les âges*, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — *Toux spasmodique et quinteuse en général ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, Toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.*

Mode d'emploi. — A absorber *loin des repas* dans une tasse de liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes

L'emploi, avec *une tasse de lait tiède sucré*, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

Doses moyennes par jour en 4 fois: { Adultes : CCXL gouttes.
Enfants : XII gouttes par année d'âge.

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, jugulation souvent en quelques heures.

Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

Doses initiales: { Adultes : CXX gouttes.
Enfants : VIII gouttes par année d'âge.

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Prix : 16 francs.

Aux doses d'adultes, un flacon a une durée de 8 jours environ.

Voir **COMPRIMÉS NICAN** à base de Chlorhydrate d'Ethylmorphine (Dionine N: D.) 0.01 et benzoate de soude.

Laboratoires CANTIN, à PALAISEAU (S.-et-O.).

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

1 milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal.

2 cgr. d'extrait de quina ;

2 cgr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Éviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

Gouttes PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin.)

Composition. — Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés. — Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

Indications. — A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi. — On donne 2 à 3 fois par jour : aux *nourrissons* I à V gouttes ; aux *enfants*, V à X gouttes, et aux *adultes*, X à XXX gouttes dans un peu d'eau ou tisane.

Prix du flacon : 12 francs.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général : Laboratoires LOBRU
26, rue Vauquelin — Paris (V^e). (Tél. : Gobelins 28-33.)

GOUTTES SAP

Antispasmodique.
Spécifique de la coqueluche.
Bronchites chroniques.

Composition :

Bromoforme, Créosote de hêtre, teint. d'aconit, belladone, jusquiame, digitale, drosera, grindélia, eucalyptus, thym, lobélie, québracho.

Avantages :

L'emploi des gouttes SAP est absolument inoffensif, même chez les tout petits, et la présentation par gouttes permet un dosage rigoureux en rendant facile l'usage de ce médicament suivant l'âge de l'enfant.

Mode d'action :

- 1° Action antispasmodique et anticatarrhale énergique, amenant immédiatement la diminution, puis, en quelques jours, la cessation complète des quintes et des vomissements ;
- 2° Pouvoir antiseptique et bactéricide puissant entravant la pullulation du Coccobacille de Bordet et Gengou, et prévenant le développement des associations microbiennes secondaires.

Indications thérapeutiques :

Coqueluche, toux coqueluchoïdes et spasmodiques rebelles. Adénopathie trachéo-bronchique infantile.

Crises dyspnéiques et asthmatiformes, coryza, hoquet.

Doses et mode d'emploi :

Donner toutes les 2 heures, dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée :

Enfants :

Au-dessous de un an	2 gouttes.
De 1 à 2 ans.....	3 —
De 2 à 3 ans.....	4 —

Au-dessus, une goutte en plus par année d'âge.

Adultes : XX gouttes 5 fois par jour.

Prix. Le flacon : 14 francs.

Paul AUGIER, Pharmacien,

Ex-interne des hôpitaux de Paris,
 2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 09-04.)

GOUTTES TRINA

Solution titrée de citrate *trisodique pur officinal*.

Les GOUTTES TRINA offrent au médecin une solution de citrate *trisodique* titrée et *stable*.

Sa forme liquide et sa concentration permettent un emploi facile et en même temps rigoureusement précis, particulièrement chez les nourrissons.

X gouttes correspondent à 0 gr. 20
C — = 5 cc. correspondent à 2 gr.

Action digestive. — Contre les vomissements des nourrissons, V à X gouttes 4 fois par jour avant le biberon ou la tétée.

Action anticoagulante. — Phlébites, thrombo-artérites, pleurésies, etc...

XXX à LX gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Action antiacide. — Dans les dyspepsies.

Selon indications médicales.

Flacon avec compte-gouttes spécial : 15 francs.

Prescription autorisée aux Assurés sociaux. N° 108-4 du
Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Préparateur : Robert GRAY, Pharmacien
MONTMIRAIL (Marne).

GOUTTOLYSINE

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Rhumatisme articulaire et Goutte (accès ou maladie constitutionnelle).

Composition. — A base d'Extraits de plantes obtenus en faisant passer de l'alcool bouillant sur des Plantes FRAICHES particulièrement actives dans ces maladies (Voir formule).

NE CONTIENT AUCUN PRODUIT CHIMIQUE, donc innocuité absolue sur l'Estomac, le Foie et les Reins. Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Liqueur très agréable à absorber. flac. 210 gr. : 16 fr. 80.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Laboratoire ALPHA
MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) à 0,025,

Belladone (extrait), 0,01.

Bile 0,02, Erepsine 0,01, Entérokinase 0,01.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications,

Prix, le flacon de 30 grains : 5 francs.

Laboratoire H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

GRAINS D'ÉVIAN

Laxatif entéro-hépatique doux.

Indications. — Constipation chronique, Stase incipiens, Accidents stercorémiques, Hépatisme.

Composition. — *Extraits biliaires et intestinaux, Podophylline, Purgène, Belladone, Rhamnus frangula, Rhamnus purshiana.*

Propriétés thérapeutiques. — Activent les fonctions hépatique et pancréatique, accroissent la biligenèse provoquent une hypersécrétion intense de toutes les glandes intestinales.

Ni coliques, ni irritation, ni accoutumance.

Dose et mode d'emploi. — Un grain au début du souper ou au coucher.

Prix, la boîte : 6 fr. 80.

Littérature et Échantillons.

Laboratoires J. PERROCHON

TOURS.

LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse.

Procédé E. FOUARD, docteur ès sciences.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2° Suppression de la réaction du choc.

Communications : Académie des sciences, 7 février 1927,

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
As	Paludisme, Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc. Anorexie, Rachitisme.	Ampoules de 2 cc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	19.80
Argent simple et double	Infections générales Angines locales. Septicémie, furunculose, fièvre puerpérale, grippe, sinusites, mastoidites, etc.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses. Ampoules argent doubles de 5 cc.	22.00 19.80
Cuivre	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cc. voie buccale.	19.80
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses.	22.00
Mercure	Syphilis.	id.	19.80
Iode	Hypertension, rhumatismes. syphilis, artério-sclérose.	En ampoules de 2 cc. pour infections, en solution pour voie buccale.	19.80 15.40
Soufre	Sciatique, acné, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.	27.50
Or simple et double	Tuberculose, infections générales, locales. Rhumatismes.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses.	27.50
Osmium	Cancer.	Ampoules de 2 cc. injections	27.50
Magné- sium	Cancer.	intraveineuses, intramusculaires,	19.80
Uranium	Cancer.	voie buccale.	27.50

Littérature et Échantillons sur demande:

Laboratoires FOUARD

61, rue G.-Lauriau — MONTREUIL (Seine).

F. GAUTIER, pharmacien.

(Tél. : Avron 01-42.)

GRANOXYL

Reconstituant bio-énergétique polyvalent.

Composition. — Tanin, Glycéro de manganèse et de chaux, Phosphore végétal, Arséniate de Strychnine.

Indications. — Troubles de croissance. Fatigue de l'adolescence. Décalcification. Anémie. Convalescence.

Deux Présentations :

Adultes : *Granoxyl Elixir*, 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Enfants : *Granoxyl Granulé*, 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 18 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

GRANSTIMUL

Composition. — Association d'Arséniate de Soude, Glycérophosphate de Chaux, Chlorure de Magnésium, Bichlorhydrate de Quinine avec des stimulants végétaux : maté, anis, kola, cannelle et noix vomique.

Propriétés thérapeutiques. — Réveille immédiatement l'activité cérébrale et physique. Tonique idéal d'action rapide et de goût agréable.

Indications. — Anémie, surmenage intellectuel ou physique, déficience organique à la suite des maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café après chacun des deux principaux repas pur ou dilué dans de l'eau ou du vin blanc.

Enfants : ajouter 6 parties d'eau à une cuillerée à café de Granstimul et donner une cuillerée à café du mélange par jour, à la fin d'un repas.

Prix : le flacon : 13 fr. 50.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

ÉTABLISSEMENTS FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Prov. 21-55 et 21-58.)

GRANUCHOL

Granulé soluble, agréable au goût.

Formule. — Sulfate de Magnésie, 250 gr.
Hyposulfite de Soude, 35 gr. ; Bromure de Potassium, 50 gr. ; Orthosiphon Stamineus, 5 gr. ; sucre parfumé au citron : Q. S. p. 1 000.

Cholagogue complet (cholécystokinétique et cholérétique, *désensibilisant, calmant total*, sans affinité végétative spéciale.

Indication. — Hépatisme sous ses formes, dans toutes ses complications.

Prix : 18 francs.

Laboratoires LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

GRANULÉ CABASSON

Reconstituant biologique rationnel.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte aux organismes jeunes les principaux éléments constitutifs du squelette, du muscle et du milieu sanguin sous la forme la plus assimilable et la plus agréable à croquer. Complète cette action minéralisatrice par des éléments stomachiques qui excitent l'appétit et favorisent l'assimilation.

Indications :

- 1° Croissance.
- 2° Maladies osseuses.
- 3° Grossesse et allaitement.
- 4° Surmenage physique et intellectuel ; convalescences.
- 5° Anorexie, et lymphatisme.

Composition. — Aucun élément toxique. *Aucune contre-indication.* (Magnésium, Calcium, Sodium, Potassium, Manganèse, Fer, Phosphore, Traces d'Iode).

Posologie. — Granulé à croquer.

Adultes : 2 cuillerées à café avant ou après chacun des 2 principaux repas.

Enfants et vieillards : 1 cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien
183, rue de Rome — MARSEILLE.

GRANULÉ EDGÈS

Laxatif-désensibilisant.

Composition. — Hydrate de magnésie, lactose, citrate de soude, hyposulfite de magnésium.

Forme. — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

Propriétés. — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Stimule doucement les fonctions intestinales et biliaires.

Avantages. — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

Indications. — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Manifestations anaphylactiques, troubles gastro-hépatiques.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 13 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en pharmacie, Licencié ès Sciences,
59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

GRANULÉ SALICYLÉ DAUSSE

Teneur :

Salicylate de soude..... 0 gr. 60

Bicarbonate de soude..... 0 gr. 20

Par cuillerée à café.

Propriétés et indications thérapeutiques. —

Rhumatisme articulaire, aigu, franc, fébrile, seule affection où le salicylate ait une action médicamenteuse certaine.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour ou davantage sur indication du médecin.

Le Salicylate de soude s'éliminant rapidement, il y a intérêt à administrer le Granulé Salicylé par doses fractionnées, prises toutes les 3 heures, de manière à maintenir l'organisme en état d'imprégnation salicylée continue.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

GRANULES CHANTEAUD

(Anciennement Granules dosimétriques.)

Composition :

Granules au milligramme, centigramme, etc., de toute la gamme des produits chimiques, alcaloïdes et glucosides les plus fréquemment employés en thérapeutique.

Présentation :

Flacons de 50 Granules ou boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 Granules.

Doses et mode d'emploi :

A définir et à indiquer par le médecin suivant chaque cas particulier.

Prix de vente, boîte de 200 granules : 12 francs (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien
3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).
(Tél. : Clignancourt 02-28.)

GRANULÉS DE BOURGET

Présentation. — En boîte métal.

Principes actifs. — Sulfate de soude, Phosphate de soude, Bicarbonate de soude, Citrate de soude.

Indications. — Dyspepsie, Aérophagie, Insuffisance hépatique, Constipation, Météorisme et flatulences, Douleurs, Spasmes, Hyperacidité, Vomissements, Affections du foie.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café pour un demi-verre d'eau le matin à jeun ou après les repas, ou au moment des douleurs.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

GRANULES DES VOSGES

Composition. — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dioninum.

Indications. — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

Posologie. — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Prix : 9 fr. 90.

Laboratoire G. BERNHARD.

11, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 07-86.)

GRANULOCHRYSINE LUMIÈRE

Granulothérapie Chimio-active

La Granulochrysine est une suspension d'aurothioéthane-sulfonate de calcium dans le sérum physiologique.

La solubilité de ce sel est fort réduite, et il a ce caractère particulier qu'injecté par voie intraveineuse il réalise tout ensemble une *granulothérapie indifférente* comme celle qu'on réalise par exemple avec le carbone, et une *granulothérapie chimio-active* spécifique du médicament aurique injecté.

C'est, somme toute, une association de la chimio-thérapie aurique et de la thérapeutique par corps étrangers introduits dans le torrent circulatoire.

Présenté en ampoules de 5 cmc. contenant chacune 10 centigrs d'aurothioéthane sulfonate de calcium, dont 1,5 milligr. sont dissous et 98,5 milligr. sont en suspension sous forme de grains.

Le diamètre moyen de ces grains est d'environ 1/750^e de millimètre.

Action complexe. — Solubilité dans le sérum sanguin = 0,02 pour mille.

La Granulochrysine Lumière, dont l'innocuité est assurée, établit la Granulothérapie Chimio-Active par opposition à la Granulothérapie indifférente existant jusqu'à ce jour.

La Granulochrysine Lumière trouve ses indications dans tous les *syndromes infectieux*.

Injectons intraveineuses (une ampoule de 5 cmc.) par séries d'importance variable, mais pouvant atteindre, voire dépasser, 50 injections.

Se vend en boîtes de 10 ampoules.

On obtient des résultats optima par des injections quotidiennes.

Innocuité immédiate, pas de dangers secondaires qui pourraient résulter d'un blocage histologique prolongé.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

GRAVIDOSTYL

Sérum de jument gravide.

Indications. — Vomissements de la grossesse. Enfants prématurés. Déficiences hormonales.

Forme. — Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. pour un traitement de 3 à 6 jours.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour en ingestion ou en lavement.

Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

Prix : 25 francs la boîte.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

GRAVURAL

Composition — Urotropine, tartrate de pipérazine, formiate, salicylate et benzoate de lithine.

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — 1^o Affections du foie, lithiase, constipation, tous troubles de la nutrition, arthritisme.

2^o Toutes affections du rein, de la vessie, de l'urètre ; cystites, pyélonéphrites, lithiase. Goutte, obésité, rhumatismes, artériosclérose.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour dans 1 à 2 verres d'eau, 1/2 heure avant ou 1/2 heure après les repas.

L. DURAND, Pharmacie de l'Institut
28, rue de Seine — PARIS (VI^e).

GRIPPALGINE

Cachets antigrippe.

A base de phénacétine, pyramidon, caféine, codéine (0 ctg. 5 par cachet) et QUINIMAX (sel de quinine spécialisé, doué d'une grande activité à faible dose et parfaitement atoxique).

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, antinévralgique, décongestif.

Indications. — Prophylaxie et traitement de la **GRIPPE** sous toutes ses formes. États fébriles. Névralgies.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets dès les premières manifestations grippales et 1 cachet soir et matin jusqu'à disparition des symptômes. Ne pas dépasser 4 cachets par 24 heures. Faire absorber les cachets avec une boisson chaude, de préférence alcoolisée.

Présentation. — La b. de 6 cachets à 0 gr. 40 : 7 fr.
La boîte de 12 cachets à 0 gr. 40 : 13 fr.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

GRIPPO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur L. DUCHON

Pour administration par voie buccale
(Non injectable).

Composition. — Le Grippo-Vaclydun est un Lysat-vaccin polymicrobien. Hormis l'absence du bacille diphtérique, sa formule est la même que celle du *Broncho-Vaclydun*.

Indications. — Le Grippo-Vaclydun est destiné au traitement des infections trachéobronchiques communes et en particulier de la grippe saisonnière, en dehors de leurs complications.

Posologie. — Le Grippo-Vaclydun doit être utilisé exclusivement par voie buccale.

En principe, quel que soit l'âge, la dose est d'une à deux ampoules par jour. Verser le contenu dans un demi-verre d'eau sucrée ou aromatisée au gré du malade.

Cette solution ainsi préparée sera utilisée au plus tard dans la demi-journée.

L'administration se fera :

Chez les *enfants* : en trois fois, une demi-heure avant les repas.

Chez l'*adulte* : en totalité, de préférence à jeun ou une demi-heure avant les repas. Au besoin prendre 2 ampoules par jour

Présentation. — Le Grippo-Vaclydun est présenté en boîtes de 10 ampoules de 2 cc. de vaccin à ingérer.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e). (Tél. : Carnot 78-11.)

GUARAPHOS

Fortifiant. Reconstituant. Apéritif.

Composition. — 1 comprimé contient : Cuarana ext., Inositolhexaphosphates de chaux et de magnésie, Glycérophosphates de chaux et de magnésie, Théobroma cacao sucré.

Propriétés. — Régénérateur des tissus musculaires, nerveux et osseux. Tonique général physique et intellectuel, non toxique.

Indications. — Tous les cas de dépression, de surmenage et de fatigue physiques et intellectuels, Anémies, anorexie, lymphatisme, grippe, convalescences, pré tuberculose, croissance, grossesse et allaitement.

Avantages. — Action tonifiante (sans contre-indications) du Guarana associée à l'action reconstituante des phosphates sous forme assimilable. Action synergique, puissante et rapide. Toxicité nulle.

Forme. — Comprimés chocolatisés agréables au goût.

Posologie. — *Dose moyenne* : Croquer 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas. Boire ensuite un peu d'eau ou de vin.

Prix : La boîte de 40 comprimés : 16 francs.

Laboratoire LOBRU

Louis BRUN, pharmacien.

26, rue Vauquelin — PARIS (V°).

(Tél. : Gob. 28-33.)

GUBLINE

Formule classique de tout médecin contre l'hyperacidité gastrique avec rétention biliaire et constipation.

Bismuth, Magnésie, Phosphate, Charbon suractivé.

Particularités. — Poudre 6 fois tamisée. Pureté chimique. *Sans goût, ni odeur d'officine.* Absence de carbonate et kaolin. *Sature l'excès d'acidité* sans produire d'alcalinisation déminéralisante.

Chimisme. — En présence d'acides divers de l'estomac, se transforme en $MgCl^2 \cdot 6H^2O$ (chlorure de magnésium à l'état naissant), en CO^2 , chlorure de calcium, acétates de magnésium et de calcium.

Doses. — 1/2 à 1 cuillerée à café avec un peu d'eau à la fin des deux repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1296/3.

Laboratoire LOISEAU

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

(Lab. 16-15).

GUÉTHURAL

Forme. — Ampoules, Granulé, Tablettes.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées. Catarrhes, Grippe, etc.

Mode d'emploi :

Ampoules (Solution aqueuse) : Cas aigus : 1 ampoule tous les jours ; Cas chroniques : 3 à 4 ampoules par semaine.

Granulé : 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas. **Tablettes** : 6 à 8 tablettes par jour.

Prix : Ampoules : 15 francs.

Granulé : 16 fr. 50. Tablettes : 12 francs.

Laboratoires PÉPIN ET LÉBOUCQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

GUI GMET

Liquide sans alcool ni éther.

Composition. — Extrait *total* du *Viscum album* sous forme liquide ; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

Indications. — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Eclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, 1 ou 2 fois par jour, entre les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

GUIGOZ (Lait en Poudre)

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse) est livré sous trois formes : Lait complet ; Lait demi-écrémé ; Lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, conserve indiscutablement toutes ses vitamines et dispense de l'adjonction de jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons.* — Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes: Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : { Babeurre GUIGOZ. Lait dextrosé-malté GUIGOZ.
Raviz (lait irradié). Lait déchloruré GUIGOZ.

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77).

GUIMELINDE

(Gouttes hypotensives.)

Composition. — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamélis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

Propriétés. — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

Indications. — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

Laboratoire de la GUIMELINDE

A. VERGER, Pharmacien
ANCENIS (Loire-Inférieure).

GUILOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 10 francs.
Échantillons et vente en gros :

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON

D^r A. IMBERT, Pharmacien.
(Tél. : Burdeau 28-96.)

GYNARSOL

Poudre antiseptique spécialement créée pour l'hygiène intime de la femme et le traitement des affections génitales.

Composition :

Stovarsol	0 gr. 01
Nitrate de Potasse.....	0 gr. 01
Chlorate de Potasse	0 gr. 10
Chloramine T.....	0 gr. 05
Bicarbonate de Soude Q. S.	7 grs.

Indications. — Hygiène journalière de la femme.
Leucorrhée, Vaginite, Métrite, Salpingite.

Mode d'emploi. — Pour injections vaginales, un sachet par litre d'eau.

Pour lavages externes un sachet pour 2 litres d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 francs.

Laboratoire du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

GYNÉCO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur **DUCHON**

Composition. — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

Posologie. — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.
Prix : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS
(Tél. : Carnot 78-11.)

GYNERGÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée ($C^{38} H^{35} N^5 O^5$), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle. Produit pur, exactement dosable.

Formes. — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine pour injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1000. — Comprimés dosés à 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Propriétés thérapeutiques. — Le Gynergène est le plus puissant des hémostatiques utérins et le sédatif du sympathique. Effets constants.

Indications. — Toutes hémorragies utérines (atonie utérine, cancer et fibrome). — Les sympathicotomies, migraines, Basedow, tachycardies, atonie gastrique.

Posologie. — 1/4 de cc. à 1 amp. par jour. XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés, 2 fois par jour.

Prix :

Ampoules de 1 cc., la boîte de 6 : 15 francs.
Solution : 18 francs. — Comprimés : 15 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII°).

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la *Ménopause* naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de l'aménorrhée, de la sclérose utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la *Puberté* chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extrait ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 10 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 10 à 12 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.

Effet rapide. Tolérance parfaite.

Prix : 22 francs.

Echantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

GYNÆSTRYL

Thérapeutique hormonale de la femme.

Voie intramusculaire : A l'état de benzoate de di-hydro-folliculine 1/10 de mgr. par ampoule de 1 cc.

Voie buccale : A l'état de di-hydro-folliculine :

1° Solution hydro-alcoolique :

a. En flacon de 10 cc., contenant 1/10 de mgr. d'hormone par centimètre cube (50 gouttes).

b. En flacon de 20 cc. contenant 1/10 de mgr. d'hormone par centimètre cube (50 gouttes).

2° Comprimés dosés à 1/40 de mgr. d'hormone :

a. Boîte de 40 comprimés.

b. Boîte de 80 comprimés.

Par voie buccale, le *Gynæstryl* doit être administré en 3 ou 4 prises, soit au moment, soit loin des repas.

Prix au public :

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.....	20 fr.
Flacon ou boîte de comprimés (petit modèle).....	20 —
Flacon ou boîte de comprimés (grand modèle).....	35 —
Voir <i>Benzo-Gynæstryl</i> et <i>Benzo-Gynæstryl 5</i> .	

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

GYNO-GOUTTES ISCOVESCO

Définition :

Solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la **totalité des hormones** spécifiques de l'ovaire.

1 cc. correspond à 10 gr. d'ovaire frais.

Posologie :

XXX gouttes par jour (selon les indications du médecin) en deux prises dans un peu d'eau et quelques minutes avant les repas.
20 jours par mois.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 07-90.)

GYNOMÉTINE

Comprimés.

Composition. — Polyoxyméthylène et Perborate de soude, Alun, dans mélange alcalin effervescent.

Posologie. — 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour injections vaginales.

Indications. — Antiseptique gynécologique, Métrites, Leucorrhées, etc.

Prix : 15 francs la boîte de 30 comprimés.

Laboratoire RICHER Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

GYNOPLIX

Composition. — *Stovarsol* (nom déposé) et hydrates de carbone.

Forme. — *Pansement vaginal sec* (comprimés friables renfermant chacun 0 gr. 25 de stovarsol).

Propriétés. — Modificateur du milieu, empêche la prolifération parasitaire, rétablit l'état normal des muqueuses.

Réussit dans les cas où les antiseptiques (hypochlorite, etc.) plus ou moins irritants ont échoué, en favorisant la production d'acide lactique.

Indications. — *Pertes blanches de toutes origines*, entre autres : Leucorrhée due à des troubles généraux ; Leucorrhée due à des irritations ou infections ; Leucorrhée de la grossesse, et, électivement, vaginites à trichomonas.

Mode d'emploi. — Chaque jour, après toilette de la région et injection d'eau bouillie tiède, sans antiseptique, introduire profondément dans le vagin — de préférence le soir au coucher — un ou deux comprimés de *Gynoplax*.

Utiliser deux comprimés au début, puis un seul dès qu'une amélioration est constatée.

Prix de vente au public :

La boîte de 20 comprimés 14 francs.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

« **THERAPLIX** »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

HALIFLÉTOL

Composition. — Huile de foie de flétan pure, titrée, extra-riche.

Avantages. — La plus forte teneur naturelle en vitamines A et D.

100 fois plus active que l'huile de foie de morue. Digestibilité parfaite. Goût agréable.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (rachitisme, croissance, anémie, toutes déficiences).

Posologie. { *Bébés* : I goutte 2 fois par jour.
Enfants de 3 à 14 ans : III gouttes avant chaque repas.
Adultes : IV ou V gouttes avant chaque repas.

A prendre dans un quartier d'orange, un peu de bière, ou autrement.

Présentation et prix :

13 fr. 50 le flacon de 6 cc. (durée minimum : 15 jours).

Laboratoires du D^r NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — Paris (2^e).

HALOALCION

Halo. — **Calcion**

Halogène chlore. — Ion calcium

Halocalcion

Granulé dont les éléments chlore et calcium introduits dans la préparation sous forme ionisable réagissent extemporanément dès leur absorption pour donner un chlorure de calcium pur, d'action triple de celle du chlorure de calcium *sel*.

Indications. — Toutes celles du chlorure de calcium : tuberculose, grossesse, allaitement, albuminurie, diurèse, hémostase, accidents sériques.

Présentation. — Granulé fondant au contact de la muqueuse buccale contenant *par cuillerée à café 30 cg. de chlorure de calcium à l'état naissant* correspondant à *1 gr. de chlorure de calcium sel*.

Posologie :

Adultes : 4 à 5 cuillerées à café par jour (recalcifiant et anti-albuminurique).

6 à 8 cuillerées à café par jour (Hémostatique et déchlorurant).

Enfants au-dessous de douze ans : demi-dosés.

L'Halocalcion se croque comme un bonbon et ne doit pas être, au préalable, dissous dans l'eau.

Prix : 18 francs le flacon pour 8 jours de traitement.

Laboratoires du Docteur PINARD

90, boulevard Saint-Denis. — COURBEVOIE-PARIS

(Tél. : Défense 02-69.)

HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de
l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuill. à soupe : 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix : 18 francs.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 08-00.)

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis virginica*.

Indications. — Maladies du système vasculaire.

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause.

Artério-sclérose.

Rhumatisme chronique.

1° Gouttes concentrées. — De XXX à LX gouttes par 24 heures. Dans certains cas d'hémorroïdes enflammées C et même jusqu'à CL gouttes *pro die*, ce qui procure un soulagement immédiat ; revenir à la dose d'entretien de LX gouttes par jour.

Prix : 12 fr. 75.

2° Élixir (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

HAMAMELIS GMET

Composition. — Extrait total et sans alcool de l'Hamamelis Virginica. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Vaso-constricteur, décongestif d'autant plus puissant que la préparation est sans alcool. Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés. Bien préférable aux extraits alcoolisés (teintures, élixirs, etc...).

Indications. — Tous les troubles congestifs ou veineux.

Posologie. — 1 cuillère à café dans un peu d'eau froide (fibromes et hémorragies jusqu'à 6 ou 8 cuillères à café *pro die*).

Prix : Le *flacon* pour 1 mois : 16 francs.
Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamelis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 francs. — Le flacon : 11 francs.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS.
(Tél. : 31-63.)

HAMHYDRIL

Gouttes.

Traitement intégral des affections du système veineux.
Régulateur de la circulation du sang.

Composition :

Teinture de Cupressus	1 gr. 50
Teinture d'anémone	1 gr.
Teinture de marron d'Inde	2 grs
Extrait fluide d'Hamamélis.....	4 —
Extrait fluide Viburnum.....	1 gr.
Extrait fluide Seneçon.....	1 —

Indications :

Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Œdèmes post-phlébiques, Ulcères variqueux, Ménopause, Puberté, Dysménorrhées, etc.

Mode d'emploi. — XX à L gouttes au moment des repas.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Laboratoires de Thérapeutique Générale
« SEDROB »

P. BORDES, Pharmacien,
35, rue Périssé — TOULOUSE (Haute-Garonne).
(Tél. : 258-21.)

HARLÉDINE

Capsules Glutinisées.

Formule :

Boldine	un demi-milligr.
Extrait de bile	0,03
Huile de Haarlem vraie	0,18

Propriétés. — Antiseptique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue.

Indications. — Lithiase biliaire, ictères, cholécystites, coliques hépatiques, coliques néphrétiques, entérites muco-membraneuses, Constipation, Goutte et rhumatisme chronique.

Doses. — Affections aiguës : 2 à 4 comprimés par jour.

Affections chroniques : 1 à 3 capsules par jour (à prendre au moment des repas).

La boîte de 40 capsules : 16 francs.

Laboratoire L. COUVERT
11, rue de Mogador — PARIS (IX°).

HÉBÉOL

Produit français.

Composition. — Emulsion colloïdale à base d'huile de paraffine (49 p. 100) et Agar-Agar (51 p. 100).

Propriétés. — L'action de la paraffine colloïdale se produit dans la profondeur du bol fécal et le ramollit, se mêle au mucus intestinal en augmentant sa viscosité et son action.

Rétablit la fonction intestinale. Sans irritation, sans suintement. Ne contient ni sucre, ni alcool, ni phénol-phtaléine, ni gomme.

Indications. — Constipation par spasme ou atonie, constipation post-opératoire. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Auto-intoxications. Appendicite chronique. Hémorroïdes. Femmes enceintes. Recommandé aux vieillards et aux enfants.

Prix. Flacon 210 cc. : 12 fr. 50 ; de 90 cc. : 7 francs.

Posologie. — *Adultes* : Début de cure : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour ; dose d'entretien : 1 cuillerée à soupe. *Enfants* : début de cure : 2 à 3 cuillerées à dessert. Dose d'entretien : 1 cuillerée à dessert. Dans de l'eau, de préférence au repas avant le dessert.

M. REINHOLD, Pharmacien,
20, rue de Rivoli — PARIS (IV°).
Tél. : Arch. 61-62.

HECTARGYRE

(Sel mercuriel de l'Hectine.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie :

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours. *Ampoule B* : tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Prix : Pilules, Gouttes, Ampoules A : 14 fr. 30.
Ampoules B : 16 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès Sciences, Pharmacien de 1^{re} classe.

12, rue du Chemin-Vert,

VILLENEUVE-LA-GARENNE près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

HECTINE

(Benzo-sulfone-paraminophényl-arsinate de soude.)

Spécifique de la Syphilis et succédané du cacodylate de soude.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie, Asthénie, Etats dépressifs, Eczéma des nourrissons.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie :

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours. *Ampoule B* : tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. — *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Prix : Pilules, Gouttes, Ampoules A : 14 fr. 30. Ampoules B : 16 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

HÉDÉRYL

Composition. — Pommade au lierre grim-pant.

Propriétés. — Fibrolysant, décongestif, analgésique.

Indications. — Cellulite, arthralgies, ar-thrites, névralgies.

Posologie et mode d'emploi. — En fric-tions et massages, puis onctions sur la région douloureuse. Recouvrir ensuite d'une feuille d'ouate.

Prix : 15 francs le tube de 55 grammes, pour une durée moyenne de 12 jours de traitement.

Laboratoire LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 13-37.

HÉDOPEPTOL

Composition. — Citrate monosodique, hexaméthylène tétramine, charbon animal.

Propriétés. — Antiseptique gastro-intestinal, urinaire et biliaire.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, dyspepsie, aérophagie, entérite, diarrhée, colibacillose, appendicite chronique, insuffisance hépatique, cholécystite et angiocholécystite, infections des voies urinaires, auto-intoxication et ses conséquences.

Présentation et prix. — Granulé homogène fondant.
La boîte de 80 grammes : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café une demi-heure après les deux repas, midi et soir, avec un peu d'eau.

L'Hédopeptol existe également sous forme de pastilles.

Laboratoires SAUNIER

35, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

Tél. : Jasmin 29-56.

HÉDUSOL

Tonique. Reconstituant.

Elixir au vin de Muscat, d'un goût agréable.
Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments
sous le n° 957-1.

Composition :

Phosphate de soude	1 gr.
Méthylarsinate de soude	10 cgr.
Extrait fluide de Kola.....	2 gr. 5
Extrait fluide de Quinquina.....	1 gr. 25
Teinture de Gentiane	VI gouttes.
Teinture Noix Vomique	XII —
Teinture de Cannelle	VI —
Teinture de Vanille	XII —
Vin de Muscat	Q. S. p. 100 gr.

Indications. — Surmenage. Faiblesse générale. Anémie. Asthénie. Neurasthénie. Troubles de Nutrition et de Menstruation. Affections des Bronches. Convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe midi et soir.

De 12 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir.

De 8 à 12 ans : 1 cuillerée à café midi et soir.

Le flacon : 16 francs.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien, 47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

HÉGANOL

Composition. — Combinaison d'iode, gaïacol, héléline, menthol, codéine, aconit, belladone, lactophosphate de chaux.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, tarit les sécrétions bronchiques et pulmonaires, antispasmodique calmant de la toux, reminéralisant, recalcifiant, stimule la phagocytose.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires, bronchites aiguës et chroniques, trachéites aiguës et chroniques, tuberculose.

Présentation. — Sirop agréable, de conservation indéfinie, sans influence néfaste sur l'estomac.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillère à soupe au milieu de chacun des trois repas dans un peu d'eau tiède de préférence.

Enfants au-dessous de 15 ans : une cuillère à café à chaque repas.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 650-9.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

HÉLÉNINE DE KORAB

Composition :

Héléline cristallisée	0,01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005

La codéine augmente l'action de l'héléline et la prolonge (Renon).

Indications. — Toutes les toux qu'elle calme, toutes les expectorations qu'elle tarit, congestion du larynx qu'elle décongestionne.

Grippe, bronchite, asthme, coqueluche, toux spasmodiques.

N. B. — Pour les cas de bacillose, il est recommandé d'employer la formule créosotée :

Héléline cristallisée	0 gr. 01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005
Créosote de Hêtre	0,02

Présentation et prix. — 12 francs la boîte de 50 globules.

Posologie. — 6 à 8 globules par 24 heures.

Sirop à l'Héléline de Korab. Action curative et puissante dans la coqueluche.

5 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire R. BOUYSSOU

CHAMBOIS (Orne).

HELGUEROL

Traitement Phytothérapique des troubles de la Circulation et de la Nutrition.

Forme : Élixir.

Composition. — Synergie phytothérapique hypotensive à base de : Ail et Oignon, Romarin, Raifort, Cannelle, Safran, Badiane, Capillaire.

Indications. — *Troubles de la circulation*, Hypertension, Artério-sclérose, Insuffisance cardiaque, Etats congestifs, Varices et Ulcères variqueux, Œdèmes, Hémorroïdes, Règles (formation et ménopause), Aménorrhée, Dysménorrhée.

Troubles hépatiques et vésiculaires, Ictères, Auto-intoxications, Dermatoses, Migraines, Constipation, Obésité.

Maladies des reins et de la vessie : Anuries, Dysuries, Pyuries.

Arthritisme : Rhumatismes, Goutte, etc.

Troubles des voies respiratoires : Emphysème, Asthme, Bronchites chroniques.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun 20 jours par mois. Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Prix du flacon (pour 20 jours de traitement) : 21 francs.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS.

(Tél. : Odéon 56-67.)

HÉMAGÈNE TAILLEUR

Règle les règles et supprime la douleur.

Forme. — Dragées.

Composition. — Méthylnonylcétone et principes vaso-dilatateurs.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée, régulateur du flux sanguin.

Indications et posologie :

1° **DYSMENORRHEE** : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; 1/2 heure après : 2 autres. Maximum : 8.

2° **AMENORRHEE et MENOPAUSE** : 4 à 6 dragées par jour.

3° **COLIQUES POST PARTUM** : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 drag

Grand flacon de 30 dragées : 16 fr. 50

Laboratoire SEVENET

10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mar. 25-23).

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsenicale
phosphorée-strychnique.

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Propriétés thérapeutiques. — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux.

Prix : 15 francs.

Laboratoire CHATELUT

65, rue Louis-Blanc
PARIS (X^e)

HEMA-RHEO

Gouttes

(Maladies et troubles de la circulation veineuse)

Composition :

Extrait stabilisé d'Hamamelis.....	30 gr.
Extrait stabilisé de Marron d'Inde.....	15 gr. 74
Alcoolature d'anémone.....	78 gr. 74
Teinture de noix vomique	78 gr. 74
Eau distillée, Glycérine, Alcool.....	Q. S. P. 1 000 gr.

Mode d'action. — Grâce à l'Hamamelis et à l'anémone, elles favorisent la menstruation et en calment les douleurs. Par l'extrait de Marron d'Inde, rendent aux veines leur souplesse et leur calibre normal. Par l'extrait de noix vomique, tonifient les parois vasculaires.

Véritable synergie médicamenteuse augmentant la valeur thérapeutique de chacun des composants et faisant de ce produit le remède idéal dans le traitement des troubles veineux circulatoires.

Indication. — *Toutes affections des veines* : Varices, Hémorroïdes, Phlébites.

Troubles circulatoires : Apparition des règles, règles douloureuses, règles retardées ou supprimées, âge critique, démangeaisons, engelures, rougeurs.

Mode d'emploi. — X à XX gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour, 20 jours par mois, suivant l'avis du médecin.

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES de L'EVOLAX, Pharmacien GUÉRAUD,
27, avenue Victor-Hugo — VALENCE (Drôme) — Tél. 8-07.

HÉMATOÉTHYROÏDINE CARRION

Composition. — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure, ou desséché.

Formes. — Liquide. Comprimés dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

Indications. — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse. Insomnie, Hémophilie, Troubles de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

Insomnies : un comprimé au repas du soir.

Présentation et prix. — Le flacon de 120 cc. : 30 francs. L'étui de 24 comprimés : 18 francs.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,
Adénites chroniques.

La boîte de 36 cachets :
15 francs, prix public.

Le tube de granulés :
15 francs, prix public.

Produits STÉNÉ

14, rue des Guillemites
PARIS (IV^e).

HÉMÉDONINE

Solution d'Hématoporphyrine pure selon la formule de Nencki.

Indications. — États de dépression et de fatigue, Vagotonie, États anxieux, Migraines, Stimulant général d'une innocuité absolue.

Présentations. — Deux formes :

Ampoules de 1 cc. et 2 cc. contenant 0 gr. 002 mgr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Gouttes : flacon de 20 cc. contenant 0 gr. 005 milligr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Emploi. — Ampoules, en injections intramusculaires profondes uniquement.

Se vend en boîte de 10 ampoules 1 cc. : 25 fr.

10 ampoules 2 cc. : 40 fr.

1 flacon gouttes : 50 fr.

Laboratoire GIREL

F. JALOT, Pharmacien,

19, rue Godot-de-Mauroy. — PARIS.

HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P^r E. Maragliano.

Composition. — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano

Alcool	25 p. 100
Glycérine	14 —
Eau aromatique	10 —
	51 —

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofule. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — Simple : adultes : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas). Enfants : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas).

Triple : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 22 francs.

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON.

D^r A. IMBERT, Pharmacien.

(Tél. : Burdeau 28-96.)

HÉMOCALCINE

Composition. — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine ; sans arsénicaux intolérés, sans vitamines périssables.

Propriétés thérapeutiques. — Donne un pH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

Indications. — Anémie, Asthénie, Puberté, Dénutrition, Dépressions nerveuses et toxiques.

Formes et mode d'emploi. — 30 petits cachets friables, instantanément dissociés.

Un cachet par jour de 8 à 15 ans avant le repas.

2 à 3 cachets par jour pour les adultes avant le repas.

En cas de contre-indication, formuler : HÉMO-CALCINE sans strychnine.

Prix : 15 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

Laboratoire FERCOCQ, Licencié ès sciences
LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 03-97).

HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine
et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactisante.

Indications thérapeutiques. — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

Mode d'emploi. — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 25 francs.

Boîte de 3 ampoules. Prix : 15 francs.

Dépôt général :

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

(Tél. : Invalides 39-19.)

HÉMO-CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroît la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toutes origines. Convalescences, Chlorose, Surmenage, Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 21 francs.

Hémo-Cyto-Sérum infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

HÉMODROME

(Phytothérapie intégrale.)

Forme. — Liquide à prendre par gouttes.

Composition. — Anémone, Cupressus, Marron d'Inde, Berberis, Thlaspi, Thuya, Souci.

Propriétés thérapeutiques. — Action supérieure à l'hamamélis et similaires. Ne contient aucun produit chimique. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits pris en pilules ou en comprimés.

Indications. — Toutes affections du système veineux : varices, ménopause, règles irrégulières.

Posologie. — XV à XX gouttes 3 à 4 fois par jour dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élysées 17-46.)

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution.

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Pilules. Prix : 15 francs.

Solution. Prix : 15 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

HÉMOFLUIDOL

(Dragées)

Fluidifie le sang.

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 05

Citrate de soude 0 gr. 15

Artériosclérose

Hypertension

Troubles circulatoires

Deux dragées matin et soir avant le repas.

Durée du flacon : 15 jours.

Prix : 20 francs.

Laboratoire LÉONARDON

Docteur en Pharmacie, ANGERS.

Dépositaire général : O. C. P. Paris.

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique, recommandé dans les affections hémorragiques et l'hémophilie.

Mode d'emploi. — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour, prises par la bouche, dans un peu d'eau sucrée ou en lavement.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 63-40.)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :

- 1° Une hémoglobine physiologique, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma non altérées.

Action :

- 1° Apport d'hémoglobine (fer globulaire).
- 2° Stimulation des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmiques.

Indications. — Anémies, Chlorose, Déchéances organiques, Tuberculose, Convalescences, Grossesses, Suites de couches.

Posologie. — Une cuillerée à potage à la fin des deux principaux repas. Doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

Prix : 17 fr. 50.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie,

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉMOLUOL

Phytothérapie toni-veineuse.

Liquide. Comprimés.

Composition. — *Éléments activés par synergie* ; Thlaspi (Capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamelis, Quinquina, Viburnum prunifolium, Anémone pulsatille, Marron d'Inde.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un *liquide* et en *comprimés*.

Décongestif, tonique, veineux, stimulant des vaso-moteurs centraux, analgésique et sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

Indications. — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhées, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. — Varices, hémorroïdes, Phlébites, etc.

Liquide. — Prendre 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Comprimés. — Avaler deux comprimés au début de chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Le liquide et les comprimés ont la même valeur thérapeutique, les mêmes indications et peuvent être employés indifféremment.

Le flacon ou la boîte de 50 comprimés.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de l'HÉMOLUOL

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

HÉMOPANBILINE

Forme. — Comprimés et Solution.

Définition. — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de mécomptes.

Composition. — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Cholagogues) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

Indications. — Médication hépatique des *Anémies, Chlorose, Convalescence, Etats de déchéance, Ictère hémolytique*.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public :

19 francs le flacon d'*Hémopanbiline* liquide.
17 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

Laboratoire du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

HÉMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base d'Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique.)

Forme pharmaceutique et composition. — Boîte de 3 flacons-ampoules de formule :

Solution de pectine fraîche et stabilisée à 2 p. 100	10
Chlorhydrophosphate de calcium	0,50
Solution titrée de genêt.....	0,20

(Pour 1 ampoule.) — Boîte de 3 ampoules.

Avantages. — Produit très actif, s'employant par voie *buccale* ; pas de contre-indication, pas de toxicité, même pour le très jeune enfant, *pas d'accidents sérieux, pas désagréable à absorber.*

Indications thérapeutiques. — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant et après* toute intervention sanglante.

Mode d'emploi. — 3 (*enfants*) à 6 (*adolescents et adultes*) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

Prescription. — 1 boîte-ampoules Hémopectal Falvy.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux.

(Pour adultes.)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Fer colloïdal	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Hémo-Phagosthyl Infantile : Ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans : 14 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

HÉMOPHILINE PLANCHE

Elixir et Dragées.

Composition. — Elixir, à base de piscidia, hamamélis, viburnum, persil, seneçon, salsepareille spéciale.

Dragées, mêmes plantes fraîches stabilisées sous forme d'extraits obtenus dans le vide.

Tous deux contiennent en plus le catalyseur général de la femme (détecté par analyse vibratoire), ce qui en augmente l'activité et en décuple l'efficacité.

Notre formule ne contient que des plantes qui sont en harmonie vibratoire attractive avec l'organe sur lequel elles agissent d'une façon toujours bienfaisante d'après nos expérimentations.

Indications. — Formation de la jeune fille, de la femme mal réglée, malaises précédant ou accompagnant les époques, régulateur du flux menstruel trop ou pas assez abondant dont il calme les douleurs : aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, troubles généraux de la ménopause.

Modes d'emploi. — *Elixir* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau, 4 à 5 jours avant l'époque présumée des règles.

Dragées : 12 à 16 par jour, pendant la durée des règles.

Prix : 15 francs.

Laboratoire PLANCHE
Membre de l'Académie de Médecine.
P. SAUVAGE, successeur
2, rue Volney — Paris (II^e).

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques qu'elle qu'en soit l'origine.
Constitution. — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydasique est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

Indications. — Toutes anémies :

- 1^o Toxiques d'origine exogène ou endogène ;
- 2^o Infectieuses (convalescences, tuberculose) ;
- 3^o Par spoliation sanguine (hémorragies) ;
- 4^o Par cachexie néo-plasique.

L'Hémoplasme Lumière fait du sang, stimule toutes fonctions organiques, lutte contre les infections et contre les intoxications.

Procédé le plus efficace de cure de tous états cachectiques. Stimule les défenses anti-toxique, anti-toxinique, anti-microbienne par suractivation hémopoïétique.

Doses courantes. — L'Hémoplasme Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés..... de 2 à 6 cuil. à café par jour.

Cachets..... de 4 à 6 par jour.

Dragées..... de 6 à 10 —

Chez les enfants, employer de préférence la forme en granulés : une à 4 cuillérées à café par jour.

Ampoules. — Pour l'administration par voie intramusculaire :

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine ;

Prix : ampoule : 9 francs. — Granulés : 17 francs.

Cachets : 20 francs. — Dragées : 13 francs.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

HÉMOPYLORE

Opothérapie Antianémique.
Reconstituant globulaire.

Composition. — Extrait mixte résultant de la combinaison des méthodes de Whipple et de Castle préparé scientifiquement avec des organes frais non réfrigérés ni frigorifiés.

Références scientifiques. — La valeur thérapeutique de l'Hémopylore a été établie par des observations cliniques prises dans les Services de MM. les professeurs Loeper de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, Carrière de l'Hôpital Saint-Sauveur à Lille, Mauriac de l'Hôpital Saint-André et Cruchet de l'Hôpital-Hospice des Enfants à Bordeaux. Ces observations sont relatées dans la thèse inaugurale de M. le Dr B. Mouras.

Les résultats constatés sont les suivants : augmentation rapide des globules rouges ; augmentation parallèle du taux de l'hémoglobine et du poids ; suppression de l'anorexie ; sentiment d'euphorie. Ni accoutumance, ni *hépto-résistance*. Sans contre-indications.

La saveur agréable de l'Hémopylore le fait accepter des malades les plus délicats et en permet l'administration, pur, sans véhicule.

Indications. — Toutes anémies graves, essentielles, cryptogénétiques de Biemer de l'*Enfant* et de l'*Adulte*. Toutes convalescences : suite de grandes diathèses ou post-opératoires. Asthénies, Dépressions, Anorexie.

Présentation. — Ampoules (buvables non injectables) :

Boîte de 10 ampoules de 5 cc. 40 fr.

Coffret de 30 ampoules de 5 cc. 100 fr.

Posologie. — Contre les anémies graves :

a. Traitement d'attaque : 4 à 6 ampoules 5 cc. par jour en 2 ou 3 fois.

b. Traitement d'entretien 2 à 4 ampoules 2 cc. par jour en 2 fois.

c. Durée du traitement 20 à 60 jours à contrôler par examens hématimétriques.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. 25 fr.

Coffret de 30 ampoules de 2 cc. 50 fr.

Contre les anémies moyennes et légères :

a. *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 5 cc. par jour ; 2 à 4 ampoules de 2 cc. par jour.

b. *Enfants* : de 2 à 3 ampoules de 2 cc. par jour suivant l'âge.

Mode d'administration. — L'*Hémopylore* se prend à n'importe quel moment de la journée, de préférence au commencement des repas, soit pur, soit dans un quart de verre d'eau.

Laboratoires du GAMBÉOL

J. GAUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe.

42, rue Émile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 17-67.)

HÉMORROÏDINE GOUTTES

Composition. — Hamamelis, hydrastis, intrait de marron d'Inde.

Propriétés. — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

Indications — L' « Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

Mode d'emploi. — XV gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE POMMADE

Composition. — Adrénaline, paraforme, intrait de marrons d'Inde.

Propriétés. — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

Indications. — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

Mode d'emploi. — Faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Prix : 10 francs.

Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

Composition. — Adrénaline-paraforme-intrait de marron d'Inde stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

Indications. — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

Mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 francs.

**Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.**

HÉMOSAMINE

(Utéramine)

Composition. — Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc., pour l'usage interne.

Propriétés. — *Hémostatique, cardio-tonique et utéromotrice.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications. — *Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.

Médecine interne. Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi. — On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne XX à XXX gouttes, trois fois par jour. Pour l'usage externe : En tampons ou pansements imbibés de solution pure ou diluée au 1/5 avec de l'eau stérilisée ou bouillie.

Prix. — En solution : 14 fr. — En ampoules : 15 fr.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général : **Laboratoires LOBRU**,
26, rue Vauquelin — PARIS (V°). (Tél. : Gobelins 28-33.

HÉMOSTATIQUE COUDERT

Composition. — Tubes scellés de 20 cc. contenant 0 gr. 10 d'émulsine en solution stabilisée.

Propriétés. — Puissant hémostatique, coagulant, tonique, sans toxicité, sans action sur la tension artérielle et la viscosité sanguine.

Indications. — Hémorragies de l'appareil digestif, des affections gynécologiques (fibrome, cancer, métrite), des affections urinaires (rein, vessie, prostate), tuberculeuses, lithiasiques ou néoplasiques. Hémoptysies.

Accidents hémorragiques dus à l'hyporésistance globulaire (anémie, affections du foie, purpuras hémorragiques).

Préventif et curatif de toutes les réactions sériques d'origines pathologiques, alimentaires ou médicamenteuses (hémorragie intestinale de la fièvre typhoïde, paludisme, réactions sériques, idiosyncrasies médicamenteuses ou alimentaires, urticaire). Spécifique de l'hémophilie, Hémogénie, hémorragies dues à des altérations de la crase sanguine (période de ménopause, règles abondantes, épistaxis rebelles).

Doit être employé dans toute opération chirurgicale susceptible d'entraîner une grosse perte sanguine (ablation des amygdales, végétations adénoïdes), en obstétrique et en stomatologie, prostatectomie (avulsion dentaire).

Posologie :

Curatif : 1 à 8 ampoules par jour suivant la gravité des cas.

Préventif : 1 ampoule la veille, 1 ou 2 ampoules 1 ou 2 heures avant l'opération.

Pour les hémophiles, faire suivre un traitement de 2 ampoules par jour avant l'opération et vérifier les résultats obtenus en faisant un examen du sang (temps de saignement et de coagulation).

Le produit doit être pris dans un liquide froid, pur, ou aromatisé avec du jus d'orange ou de citron.

Présentation et prix :

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. : 20 francs.

Boîtes de 6 ampoules de 20 cc. : 35 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 20 cc. : 60 francs.

Laboratoires COUDERT

13, rue Antoine-Vollon — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 59-72.)

HÉMOSTATIQUE GOY

Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté	4
Chlorure de calcium pur	8
Acide citrique	0 50
Sirop d'orties grièche	20
Excipient	67 50

Indications. — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Avantage. — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Prix : 15 francs.

Durée : 10 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 34-68.)

HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique et des Avitaminoses D.

Composition. Vitamine D cristallisée (dosée à 40 millions d'unités standard internationales au gramme), Hémoglobine, sels de chaux, de fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HEMOSTERINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Innocuité absolue.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguin ; recalcaifiant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

Indications. Rachitisme infantile, ostéomalacie, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculose).

Trois formes : Granulés. — Ampoules buvables de 5 cc. (boîtes de 8, 16, 32 ampoules). — Sirop.

Posologie et mode d'emploi. — *Enfants :* Au-dessous d'un an : une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour ou une ampoule sans alcool. Pour le sirop même doses que le granulé.

Adultes : Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas ou deux ampoules.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

HÉMOSTRA « ROCHE »

Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes.

Composition :

Solution isotonique, neutre et stérilisée de Tryptophane et d'Histidine en ampoules de 5 cc. (0 gr. 10 tryptophane et 0 gr. 20 histidine), en ampoules de 2,5 cc. (0 gr. 05 tryptophane et 0 gr. 10 histidine) et en ampoules de 1 cc. (0 gr. 02 tryptophane et 0 gr. 04 histidine). Boîtes de 6.

Propriétés :

Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement et d'une façon considérable les processus de l'hématopoïèse.

Avantages :

Ne provoque pas de dégoût chez le malade ; évite l'action destructive de la flore intestinale et permet de poursuivre le traitement aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Une ampoule de 5 cc. équivaut, par ses effets, à plusieurs centaines de grammes de foie de veau.

Indications :

Toutes les anémies graves : biermériennes, leucémiques, néoplasiques, etc. Tous les états de déficience organique : Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, même chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices. Ulcères, Angine de poitrine, Asthme des foins, etc.

Modes d'emploi et doses :

Voie intramusculaire ou sous-cutanée :

Une ampoule de 5 cc. ou de 2,5 cc. suivant les cas, tous les jours. Injection rigoureusement indolore. Aucune toxicité ; pas de contre-indication. On peut, dès le début, vérifier l'activité de cette préparation par une numération globulaire.

Voie intradermique : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours pendant 21 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-13.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 91-10.)

HEMOSTYL

Sérum frais hémopoïétique de cheval.

Action. — 1° Hémopoïétique spécifique (prof. Carnot, Acad. des Sciences, 1906) ;

2° Hémostatique ;

3° Hyperleucocytaire général et local.

Formes pharmaceutiques :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. pour 6 jours de traitement.

2° Boîte de 10 flac.-ampoules de 6 cc. pour 6 jours de traitement

3° Flacon de sirop de 300 grs pour 8 jours de traitement.

Prix : 20 francs.

4° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc. pour 3 semaines de traitement.

5° Coffret de 30 flacons-ampoules de 6 cc. pour 3 semaines de traitement.

Prix : 55 francs.

Indications et Posologie. — Toutes les Anémies quelle qu'en soit la nature. Convalescences. Tuberculose. Paludisme, suites opératoires et obstétricales. 1 à 2 flacons-ampoules par jour en ingestion ou lavement ou 2-3 cuillerées à potage de sirop.

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie.

Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc...)

Plaies saignantes. Cas graves ; inject. de 30 cc. de sérum.

Autres cas : injection ou mieux lavement de 3 flacons-ampoules.

Application locale.

Enfants : demi-doses.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS

(Tél. ; Littré 68-22, 23 et 24.)

HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

Indications. — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

Posologie. — *Adultes.* — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

Enfants : 1 cuillerée par repas.

Prix : 15 francs.

Forme Elixir : 17 francs.

<i>Elixir.</i>		<i>Granulés.</i>	
Arrhéнал.....	0,07	Hémoglobine cristallisée..	5 gr.
Acide nucléinique	2,—	Glycérophosphate de	
		chaux	5,00
Hémoglobine	5,—	Poudre orchitique.....	0,50
Glycérophosphate de chaux.	5,—	Thyroidine poudre.....	0,20
Suc orchitique	2,—	Méthylarsinate disodique.	0,20
Fluorure de sodium	0,01	Fluorure de sodium.....	0,10
Alcool à 90°.....	20,—	Pour.....	100 gr.
Suc thyroïdien	2,—		
Glycérine	10,—		
Excipient aromatique. Q. S.			
pour.....	100 gr.		

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X°).

HÉMOVÉINE

Comprimés.

Composition. — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus. 2° Poudres d'organe à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

Action. — Pharmacodynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de stase veineuse.

Indications. — Maladies veineuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Disménorrhée, Métorrhagie, Troubles de la Ménopause, Troubles de la circulation générale.

Mode d'emploi. — 6 dragées par jour à raison de 2 avant chacun des trois repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires BRICHARD et fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

HÉMYPNAL

CIBA

Analgesique pelvien SUPPOSITOIRES.

Trichloro-butyl-alcool. Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone. Diallylmalonylurée, Ethylmorphine.

Analgesique très peu toxique, utilisable pour toutes les douleurs de la région pelvienne :

Obstétrique. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine).

Gynécologie. — Dilatations, curetages, pansements douloureux, crises dysménorrhéiques.

Urologie. — Explorations sur le rein, la prostate, l'urètre, la vessie, béniqués, etc.

Chirurgie. — Remplace la morphine après les interventions.

Doses : 1 à 4 suppositoires par 24 heures.

Boîte de 3 suppositoires.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

HÉPACRINE

Du Dr Debat.

Extrait désalbuminé et délipidé de foie.

Deux formes : buvable et injectable.

Indications. — Les anémies graves, les hémorragies, les anémies post-opératoires, les anémies des paludéens, les insuffisances hépatiques.

La forme injectable est appliquée, de préférence, dans les cas d'intolérance gastrique et d'hépatorésistance ou ceux très graves, exigeant une action immédiate.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 amp. buvables ou 1 à 2 injectables par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules de 3 cc. par jour, ou une ampoule injectable.

Présentation :

Boîte de 6 amp. de 12 cc. (1 amp. = 100 gr. d'organe)	21 fr.
Boîte de 18 amp. de 12 cc	56 fr.
— 12 — de 3 cc. (1 amp. = 25 gr. d'organe)	14 fr.
— 10 — injectables de 2 cc (1 amp. = 10 gr. d'organe; activité de 300 gr. de foie peros)	28 fr.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

HÉPADRAINASE

Médicament réalisant un drainage puissant des voies biliaires.

Composition :

- I. Sulfate de Magnésie pur anhydre.
- II. Peptones d'œuf, de viande, de poissons.
- III. Cholate de Soude.

Indications. — Toutes affections atoniques des voies biliaires et en particulier :

Cholécystite, Cholécystatonie, Congestion hépatique, Insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau 1 à 3 cuillerées à café d'Hépadrainase.

Enfants : à partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

HÉPAFLORINE

(Dragées vertes hépato-néphrotropes.)

Priorité. — La barbiflore (*orthosiphon stamineus*) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, *Cynara scolymus* e extrait total hépatique.

Propriétés. — Diurétique hépatotonique, décholestérinissant, antilithiasique et protéolytique assurant une normalisation progressive des métabolismes déviés et une parfaite épuration de l'organisme.

Indications. — Toutes affections hépatiques ou hépatorénales et les syndromes associés. Cirrhoses, Œdèmes et Ascite, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie en excès, Athérome, Hypertension, Lithiases, Arthritisme, Suites d'infections aiguës, Maladies coloniciales, etc.

Posologie. — 3 à 9 dragées aux repas, en moyenne 6 par jour.

Étui de 60 dragées : 15 francs.

Bibliographie et Echantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique. »

HÉPAFLUOL

Composition. — Peptone préparée par Witte, sulfate de soude et de magnésie, poudre de réglisse.

Propriétés. — Cholagogue, eupeptique, laxatif, stomachique, désensibilisation.

Indications. — Insuffisances hépatiques, constipation, dermatoses, eczémas, urticaire, asthme, hypertension, gastralgies.

Forme. — Poudre.

Doses. — Comme Cholagogue : une à trois cuillérées à café le matin à jeun.

Comme Désensibilisateur : une demi-cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Prix : 16 francs. Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 0-55.)

HÉPAGLYCÉROL CARRION

Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple).

Composition. — Extrait concentré de foie frais additionné de son volume de glycérine.

Forme. — Ampoules de 10 cc. correspondant chacune à 125 grammes de foie frais.

Indications. — Anémie pernicieuse.

Posologie et mode d'emploi. — Par *voie buccale* seulement. 1 à 3 ampoules par jour diluées au gré du malade, dans une boisson quelconque ou dans un aliment en purée.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules de 10 cc. : 60 francs.

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 35 francs.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉPAGYL

Composition. — Extrait de *Foie frais* stabilisé en ampoules buvables de 10 cc. Chaque ampoule correspond à 100 gr. de Foie cru.

Indications :

1^o Anémies graves. Anémies secondaires consécutives au Paludisme, à la Tuberculose et aux maladies infectieuses.

2^o Insuffisances hépatiques.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 10 cc.
Pour un traitement de 3 à 6 jours.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 ampoules par jour.

Enfants : 1 ampoule par jour.

A prendre exclusivement par *voie buccale* dans un peu d'eau froide, avant les repas.

Prix : 20 francs la boîte.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 24.)

HÉPALOMEL VÉDÉ

Affections hépatiques.

- 1° *Comprimés verts* stimulants des fonctions biliaires (Extrait mou *total* d'artichaut, extrait d'iris versicolor, extrait de combrétum, extrait de boldo).
 2° *Comprimés jaunes* complémentaires, antiseptie et action crypto-toxique.
 (Palmitate de soude, bile de bœuf dépigmentée et desséchée, calomel.)

Les 12 premiers jours : 3 comprimés verts par jour.

Les 6 derniers jours : 2 comprimés jaunes par jour.

Prix de la boîte : 22 fr. pour un traitement de 18 jours.

Admis aux assurances sociales.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 97-46 et 97-47.)

HÉPAMINE MAUCHANT

Ampoules buvables et sirop.

Composition. — Extrait de foie frais associé au tryptophane et à l'histidine, sous forme d'ampoules buvables et de sirop.

Mode d'action. — L'HÉPAMINE MAUCHANT réunit dans une même préparation l'action hémopoïétique de l'extrait de foie à l'action régénératrice des hématies de l'histidine et du tryptophane.

Avantages. — Procédé de fabrication absolument nouveau (congélation fractionnée à très basse température). Conservation intégrale des propriétés curatives.

Indications. — Anémie grave, anémie secondaire accompagnant diverses affections, insuffisance hépatique.

Posologie :

Adultes : ampoules 1 à 3 par jour Sirop. 2 à 6 cuillerées.

Enfants : ampoule 1 — — Sirop 1 à 3 cuil. à soupe.

Prix : { la boîte de 6 ampoules de 15 cc.
 20 francs { le flacon de sirop de 300 gr.

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie
 GENNEVILLIERS (Seine).

HÉPAMULT

Extrait du Foie.

Réalisation pratique des méthodes de Whipple et de Castle sous une forme nouvelle, solide (granulé dragéifié) qui permet un emploi facile et un prix de revient moindre.

20 grammes d'Hépamult équivalent très sensiblement quant à leur action antianémique à 500 gr. de foie frais. C'est donc la dose quotidienne d'un traitement très énergique, permettant cependant aux fonctions digestives des malades de s'accommoder simultanément de la ration alimentaire que le médecin peut, d'autre part, juger utile.

Doses. — 10 ou 20 gr. par jour (2 ou 4 cuillères-mesure incluse dans la boîte).

Emploi. — Au milieu ou à la fin d'un ou des repas. Ne pas mâcher (amertume). Avaler soit avec une gorgée de liquide, soit mélangé à un peu de potage, purée, confiture, etc...

Prix : 20 francs la boîte pour 5 à 10 jours.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

HÉPANÈME CARRION

Médication des anémies en général.

Composition. — Association d'extrait concentré de foie, de protoxalate de fer et de phosphate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés : 20 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉPANOVA

Extrait sec hydrosoluble désalbuminé de foie de veau et de rate.

Traitement des diverses anémies.

Troubles de croissance, Rachitisme, Neurasthénie, Convalescence, Suites d'opérations et de gripes.

10 ampoules buvables de 5 cc. Prix : 35 fr.

Chaque ampoule correspond à :

50 grammes de Foie de Veau.

0 gr. 30 de Rate fraîche.

Mode d'emploi. — Une ampoule avant chaque repas à prendre dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

HÉPAPHOS

Reconstituant général.

Composition et forme. — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

Indications thérapeutiques. — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

Aucune contre-indication.

Prix : 20 francs (traitement d'une semaine).

Si Anémies graves, prescrire HÉPATROL.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73 et 74.)

HÉPARÉGULINE

Régulateur des fonctions hépatiques, stimule le foie, draine la bile.

Composition. — Sulfate de magnésie desséché, citrate trisodique, peptones polyvalentes purifiées, extrait d'artichaut désalbuminé, extrait de boldo. Sucre aromatisé.

Forme Pharmaceutique. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Cholérétique. — Stimule la cellule hépatique, active la sécrétion biliaire, réveille les fonctions glycogénique, antitoxique, uropoïétique du foie.
Cholagogue. — Provoque l'excrétion biliaire, draine les voies intestinales.

Indications thérapeutiques. — Affections hépato-biliaires. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, insuffisance hépatique, cholémie, lithiase biliaire, cholécystites médicales, ictères.

Affections intestinales. — Nausées, constipation, entéro-colite.

Troubles généraux. — Céphalées, migraines, vertiges, urticaire, maladies des pays chauds.

Mode d'emploi. — Le matin à jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau tiède.

Dose curative (10 à 15 jours) : 2 à 4 cuillerées à café.

Dose d'entretien (2 à 3 mois) : 1 à 2 cuillerées à café pendant 3 à 4 jours, puis repos 2 à 3 jours, ensuite reprendre la cure.

Enfants (au-dessus de 3 ans) : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

P. BASTIEN, Pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine). — (Téléphone : Tremblay 09-78, 09-79.)

HÉPARTICHAUT

Composition :

Extrait sec d'artichaut	0 gr. 05
Poudre de foie.....	0 gr. 10
Bile	0 gr. 05

Pour une dragée.

Propriétés :

Action directe de l'artichaut, action opothérapique de la poudre de foie, action de remplacement de la bile.

Indications :

Ictère, cholémie familiale, lithiase biliaire, coliques hépatiques, insuffisance hépatique et ses conséquences constipation d'origine hépatique.

Présentation. — Dragées.

Prix. — 16 francs la boîte de 50 dragées.

Posologie :

De 2 à 6 dragées par jour avant les repas.

Laboratoire R. COUDERT

Ex-interne des Hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine.
19, avenue Payret-Dortail.

LE PLESSIS-ROBINSON (Seine).

HÉPASEL

Rééducateur de l'intestin, aucune accoutumance.

Forme. — Poudre dans un tube, goût agréable.

Composition. — Sulfate de Na, 5 gr., Bicarbonate de Na 3 gr., Phosphate de Na 2 gr., Citrate de Na 1 gr., Extraits d'artichaut, de muqueuse intestinale, excipient q. s. pour un tube.

Indications. — Constipation; insuffisance hépatique; lithiase biliaire; toutes infections intestinales; dyspepsie; migraines; rhumatismes; obésité; dermatoses: acné, eczéma; anaphylaxies, etc.

Posologie. — Tous les 2 jours le matin à jeun, le contenu d'un tube à dissoudre dans un demi-verre d'eau tiède sucrée ou non.

Prix : 15 francs.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

HÉPATHÉMO DESCHIENS

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple.

Technique de Minot et Murphy.

Indications. — Syndromes anémiques, Anémies pernicieuses
Asthénies.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables,
Sirop.

Présentation. — *Ampoules*: 1 ampoule de 10 cc. correspond à 125 gr. de foie de veau frais.

Prix. — Boîte de 6 ampoules : 30 fr. Coffret de 18 ampoules : 85 fr.

Sirop: 1 cuillerée à soupe correspond à 24 gr. de foie de veau frais.

Prix du flacon de sirop de 275 cc. 28 fr.

En raison de sa concentration élevée l'HÉPATHÉMO DESCHIENS constitue une médication relativement peu onéreuse.

Posologie. — *Adultes*: Anémies graves : 3 ampoules par jour.

Anémies moyennes : 1 à 2 ampoules par jour ou 2 à 4 cuillerées à soupe de Sirop. Anémies légères : 1 ampoule par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe de Sirop.

Enfants: demi-dose, Sirop de préférence.

Mode d'emploi. — Les ampoules ou le sirop seront absorbés dans un liquide non alcoolique tiède, de préférence à la fin des deux principaux repas.

Laboratoires DESCHIENS

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉPATICALCION GRÉMY

Composition. — Chlorure de calcium associé à l'extrait de foie de veau frais, assurant ainsi la production de fibrinogène nécessaire à la coagulation sanguine et la compensation des troubles d'origine vasculaire de la crase sanguine.

Deux préparations en une seule.

Indications. — Prophylaxie opératoire. Hémostase pré- et post-opératoire. Hémorragies capillaires, soit post-opératoires, soit médicales, relevant d'un vice de coagulation. Tonification de l'organisme après le choc opératoire. Diurétique. Recalcifiant.

Forme et posologie. — Gouttes.

Enfants jusqu'à 2 ans. V gouttes.

— — 9 ans XXV —

Au-dessus de 9 ans et adultes. L —

3 fois par jour.

Prix : le flacon, 16 francs.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

HÉPATIC EFA du Dr Lecacheux

Ampoules buvables et cachets combinés.

SYNERGIE VÉGÉTALE ATOXIQUE

Utilisant les propriétés pharmacodynamiques remarquables d'un élément thérapeutique nouveau :

LA CHÉLIDOINE

Action cholérétique intense, triple de celle de l'artichaut.

Action cholécysto-sédative élective par abaissement du tonus vésiculaire.

(Cf. Prof. Loeper, A. Lemaire, H. Dany: « La méthode stalagmométrique dans l'étude de certains cholérétiques ». — *Progrès médical*, n° 34, 1932.)

Composition. — Extraits spéciaux de plantes fraîches stabilisées : Eclair (ou CHELIDOINE) — Fenouil. — Artichaut (EFA):

Propriétés. — Active directement la sécrétion hépatique. — Apaise électivement le spasme vésiculaire. — Facilite, par ces deux actions conjuguées, le drainage médical de la vésicule — Sédatif profond et régulateur physiologique atoxique.

Indications. — Stase, Rétention, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique constitutionnelle ou acquise et toutes ses manifestations secondaires, spécialement : Migraines, Eczéma.

Formes pharmaceutiques.

Boîte de 12 ampoules buvables et 12 cachets 35 fr.

Boîte d'essai 6 ampoules buvables et 6 cachets 19 fr. 50

Granulé soluble aromatisé (extraits EFA associés aux sels de soude) 19 fr. 50

Posologie. — 1 cachet au réveil avec 1/2 verre d'eau (Vichy Grande-Grille de préférence).

Un quart d'heure après, prendre le contenu d'une ampoule dans un peu d'eau.

Granulé.

Adultes. — Une à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun

Enfants à partir de 4 ans, 1/2 à 1 cuillerée à café;

TOLÉRANCE ABSOLUE

Laboratoire Hépatie Efa du Dr LECACHEUX

Docteur en médecine — Licencié ès sciences

R. BERTHELOT — Pharmacien

16, 18, rue du Château — CARENTAN (Manche).

HÉPATICOL

Granulés fondants.

Composition :

Extrait mou de romarin	1 gr.
— de sauge	0 gr. 50
— de mélisse	0 gr. 50
— de boldo	1 gr.
— de combretum	1 gr.
— de Podophylum	0 gr. 05
Sulfate de Magnésie	28 gr.
Salicylate de soude	1 gr. 50
Urotropine	0 gr. 70
Peptone de fibrine	1 gr. 00
— de gélatine	1 gr.
— de viande	1 gr.
Sucre aromatisé	q. s. pr. 100 gr.

Indications. — Excitation de la cellule hépatique. Drainage médical des voies biliaires. Antisepsie hépatique rénale et intestinale. Anaphylactique.

Posologie. — 2 cuillerées à café (ou 10 gr.) le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède. 1 cuillerée à café pour les enfants à partir de 5 ans.

Prix : 18 francs.

Laboratoires Olivéol et Hépaticol ÉTIEVANT

ED. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe,

TASSIN LA-DEMI-LUNE (Rhône).

(Tél. : 38.)

HÉPATISMINE

Suppléance et stimulation de toutes les fonctions du foie par synergie physiologique.

Composition. — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005, évonimine, 0,005 ; podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinisés dragéifiés.

Cholagogue, excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

Indications. — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique, glycosurie, pléthore abdominale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

Prix : 15 francs le flacon de 40 comprimés.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e)

(Tél. : Trinité 04-49.)

HÉPATOCARNINE LEFRANCO

(Synergie Hépatocarnée.)

Composition. — Association de la méthode de Whipple et de la Zomothérapie. (Extrait de foie de veau frais et suc musculaire de bœuf cru, à haute concentration).

Action synergique des principes musculaires et hépatiques.

Propriétés. — Antianémique par le foie de veau frais, reconstituant général par le suc musculaire cru.

Indications. — Toutes les anémies, pernicieuses, primitives ou secondaires, médicales ou chirurgicales, anémie infantile, lymphadénie, anémie rachitique, anémie des tuberculeux, toutes déficiences permanentes ou transitoires de l'organisme.

Présentation :

Coffret de 20 ampoules buvables de 10 cc.

Boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

Posologie. — 2 à 3 ampoules par jour avant les repas.

a. Traitement d'attaque : 3 ampoules par jour pendant 15 jours.

b. Traitement d'intensité moyenne : 2 ampoules par jour pendant 10 jours. A renouveler après 10 jours d'interruption.

c. Traitement d'entretien : 3 fois par semaine pendant 1 mois, 2 ampoules par jour.

Remarque. — L'*Hépatocarnine* peut être employée chez le nourrisson en le mélangeant au lait du biberon (au-dessous de 40°), à la dose de 1 à 2 ampoules.

Prix :

35 francs la boîte de 10 ampoules.

59 francs le coffret de 20 ampoules.

Laboratoires CARNINE LEFRANCO

ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

HÉPATOCYNOL

Composition :

Peptone de viande.....	3 gr.
Peptone de poisson.....	2 gr. 50
Peptone de gélatine.....	1 gr.
Peptone de lait.....	0 gr. 50
Sulfate de magnésie desséché.....	24 gr.
Hyposulfite de soude.....	3 gr. 50
Extrait de boldo stabilisé.....	1 gr. 50
Extrait cynara stabilisé.....	1 gr. 50
Sucre glace aromatisé.....	Q. S. p. 100 gr. granulé.

Indications. — Accidents sériques, arthritisme, asthme, cholécystites chroniques, cirrhose, congestion du foie, constipation, diabète d'origine hépatique, dyspepsies réflexes, eczéma, fatigue générale, ictère catarrhal, intoxications, lithiase biliaire, maladies des pays chauds, migraines, nausées, obésité, œdème de Quincke, paludisme, prurit, troubles digestifs, urticaires.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède. Après absorption, se coucher sur le côté droit et rester dans cette position pendant 8 à 12 minutes.

Présentation et prix. — Granulé soluble : 1 flacon de 100 gr. : 18 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1115-1.

Laboratoires J. ESCOUBET.

62, boulevard St-Germain — PARIS (V°).

HÉPATODIAGNOSE

Composition. — Galactose chimiquement pur.

Propriétés et indications :

Ce produit est utilisé pour l'exploration fonctionnelle du foie par la galactosurie provoquée (méthode de Bauer mise au point par divers auteurs français).

Posologie. — Technique du procédé et de l'analyse sur demande.

Prix :

La dose de 40 grammes : 20 francs.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

HÉPATODIASE

Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénum, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

Posologie :

Avaler sans croquer deux comprimés après chaque repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

HÉPATOFORMINE

Intoxications Gastro-Intestinales, hépatiques et biliaires.

Présentation. — Granulé fondant sucré, aromatisé. Comprimé dragéifié, non sucré.

Composition. — Charbon animal décyanuré, Charbon végétal suractivé, Benzonaphtol traces, Hexaméthylène-tétramine.

Propriétés. — Stimulant énergique de l'activité hépatique et rénale. Antiseptique puissant des voies biliaires, urinaires et intestinales. Pouvoir adsorbant et absorbant, l'un et l'autre considérables réalisant le pansement Gastro-Intestinal.

Active le foie (Cholérétique), Draine la bile (Cholagogue), Augmente la Diurèse (Diurétique).

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, fermentations gastro-intestinales, Aérophagie, Aérocolie, Dilatation d'estomac, Pyélonéphrite des femmes enceintes, Obésité, Ptoses abdominales, Flatulences, Appendicite chronique, Cholécystite, Colibacillose, Dermatoses, Entérites, Auto-intoxications, Empoisonnements, Urticaire, Dyspepsies, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc...

Posologie. — 1 à 3 cuill. après les repas ; 1 à 3 drag. après les repas. A croquer ou à avaler dans une infusion chaude. — *Enfants*: 1/2 dose.

Durée du traitement 1 flacon : 15 à 20 jours.

Laboratoires Alphonse CHARMAISON

Médailles d'Or et de Bronze.

26, av. de Royat — Chamalières-lès-CLERMONT-FERRAND. Tél. 7:

HÉPATOGENINE

Composition. — Extraits d'artichaut, boldo, bourdaine, noyer.

Présentation. — Pilules.

Indications thérapeutiques. — Traitement des affections hépato-biliaires et des constipations, Migraines, Dermatoses, Troubles digestifs d'origine hépatique, Ictères.

Mode d'emploi. — 3 à 6 pilules par jour.

Laboratoires BOIVERT

MONTGUYON (Charente-Inférieure).

HÉPATOglobine

Composition. — Extrait spécial de foie frais hypophysé.

Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais endolysé au sérum de cheval, renforcé par l'addition de :

Hémoglobine	0,30
Extrait d'hypophyse totale	0,05

Forme. — Ampoules buvables de goût agréable.

Indications. — Anémies, Tuberculose, Surmenage, Convalescences.

Doses. — Une à deux ampoules par jour.

Prix : 19 francs la boîte de six ampoules.

Durée de la boîte : 3 à 6 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1003-8.

Laboratoires CH. VERGELOT

6, rue de Navarin. — PARIS.

(Tél. : Trudaine 10-88.)

HÉPATOMAGNÉSION

Toutes affections biliaires, hépatiques et digestives.

Peptone sèche de viande..	4,00	Extrait mou de Boldo.....	0,10
— — de gélatine..	2,00	— — de camomille..	0,10
— — de witte....	3,00	— — de condurango	0,10
Sulfate de magnésie	20,00	— — de maté.....	0,10
Hyposulfite de magnésium.	7,00	— — de noyer.....	0,10

Pour 100 gr.

Indications. — Maladies du foie et des voies biliaires. Congestion hépatique et de la vésicule, lithiase biliaire, ictère, cholécystite chronique, troubles divers d'origine hépatobiliaire, inappétence, nausées, constipation, urticaire, prurit, certaines dermatoses.

Forme. — *Granulé* et *Comprimés dragéifiés*.

La composition des comprimés d'Hépatomagnésion est semblable à celle de l'Hépatomagnésion « Granulé ». La dose de 4 comprimés correspond exactement à une cuillerée à café de granulé.

Posologie. — *Granulé.* — *Adultes* : le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau légèrement chaude ; 1 à 2 cuillerées à café suivant les indications du médecin.

Enfants : Un quart à une cuillerée à café selon l'âge.

Comprimés. — De 2 à 8 dragées par jour selon les indications du médecin, le matin à jeun, ou une heure avant les repas, de préférence avec un demi-verre d'eau.

Prix : 17 francs, taxe comprise.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion.

A. Chatain, Dr en ph^{ie}, Ex-Int. en ph^{ie} des Hôp. de Lyon,
Diplômé de Bactériologie.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Corneille — LYON.
(Tél. : Lalande 41-81.)

HÉPATO-MANGANOL

Composition :

Extrait de noyer	0,10
Extrait de boldo	0,01
Extrait biliaire.....	0,025
Bioxyde de manganèse.....	0,05

Propriétés. — Régularise la fonction glycogénique par l'extrait de noyer. Stimule la cellule hépatique et l'excrétion biliaire par le boldo et l'extrait biliaire. Favorise le métabolisme des hydrates de carbone par le bioxyde de manganèse.

Indications. — Insuffisance hépatique, Ictère, Lithiase, Obésité, Glycosurie hépatique, Hépatisme tropical, Hépatomégalie des gros mangeurs et des buveurs. Constipation par insuffisance biliaire, etc. Régénérateur de la cellule hépatique chez les pré tuberculeux.

Présentation. — Tube de 75 pilules : 13 francs.

Posologie. — 4 à 12 pilules par jour aux repas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 351-2.

Laboratoires L. LEGRAND

11, place Louis-XII — BLOIS (Loir-et-Cher).

HÉPATONIA

Présentation. — En tubes scellés de 10 cc. pour adultes.

En tubes scellés de 2 cc. pour enfants.

Principes actifs. — Extrait de foie de veau, Extrait de rate de veau fraîche, Extrait muqueuse gastrique de porc, extrait de glandes surrénales fraîches, Autolysat épuré de levure de bière, Nucléinate de soude.

Indications. — Anémies de toutes origines (Méthode de Wipple) ; Dyspepsies à régime carencé (féculents, pâtes), Neurasthénie, Asthénies de toute origine et particulièrement dans la convalescence des fièvres graves (typhoïde, typhus, rhumatisme articulaire aigu, dysphétrie, grippe).

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 tubes de 10 cc. par jour, au début des repas, dans un peu de vin de liqueur, dans le potage, ou suivant les indications du médecin traitant.

Enfants : 1 à 3 tubes de 2 cc. suivant l'âge dans le potage.
Se fait également sous forme de Granulés.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

HÉPATOPLASMINÉ

Ampoules buvables reconstituantes.

Méthode de **Whipple et Castle**.

Composition. — Extrait de foie de veau. Antre pylorique. Sérum hémopoïétique.

Formes. — *Adultes* : ampoules buvables de 10 cc. ;
Enfants : ampoules buvables de 3 cc.

Indications. — Anémie sous toutes ses formes ; Déficiences globulaires ; Hémorragies ; Lymphatisme ; Convalescences ; Suites opératoires, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour, dans un peu d'eau un quart d'heure avant les repas. *Enfants* : 5 à 10 ans : 1 à 2 ampoules par jour ; au-dessous : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Laboratoire OPOTHERAPIQUE R. FRAYSSE
rue de Neuilly — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Nanterre 12-88).

HÉPATOSODINE

Médication alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'héxaméthylène tétramine. Syndrome hépato-entéro-rénal.

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes, Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiasse biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

Doses. — *Avant une opération* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les 10 jours qui précèdent l'intervention.

Troubles gastriques : Une cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède à jeun le matin, et le soir à 18 heures.

Troubles hépatiques : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.

Constipation : 1 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Prix : Le flacon : 15 francs.

La boîte triple dose : 35 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et REMY réunis
ASNIÈRES (Seine).** — (Tél. : Grésillons 37-34.)

HEPATOXANE

Nouvelle thérapeutique hépato-biliaire complète.

Composition. — Curcuma Xanthorriza, Hyposulfite de Mg., Citrate de Na, Opothérapie associée.

Forme. — Granulé soluble aromatisé.

Propriétés. — Cholérétique et Cholagogue *très puissant à action douce*. Antiseptique des voies biliaires, Décholestérinant, Anti spasmodique, Désensibilisant, Saturant.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Cholécystites et angiocholites, Lithiasse biliaire, Coliques hépatiques, Ictères, Maladies coloniales, Congestion du foie, Anaphylaxies (Urticaires, prurigo, œdèmes de Quincke, migraines, eczéma), Gastrites secondaires, Constipation.

Posologie. — *Crises aiguës* : 1 cuillerée à café dans un demi-verre d'eau toutes les trois heures pendant les 24 premières heures.

Troubles hépato-biliaires : 1 cuillerée à café le matin à jeun.

Anaphylaxies : 1 cuillerée à café vingt minutes avant les deux principaux repas.

Enfants : 1/2 dose au-dessus de 6 ans.

Prix : 17 fr. 50. Traitement de quinze jours.

**Laboratoires d'ACTITHÉRAPIE
Blaise FROSSARD, Pharmacien,
81-83, rue de Lille — ROUBAIX**

HÉPATOZYL CALDO

Traitement opothérapique
des Fonctions hépatiques.

Composition. — Boldine cristallisée, Hépatine, Extrait Combretum, Fiel de bœuf, Rhamnus purshiana, Rhamnus frangula.

Indications. — Constipation, Entérocolite, Coliques hépatiques, Cirrhose et Précirrhose, Ictère, Affections d'origine coloniale.

Forme. — Pilules à enrobage de gluten.

Dose :

4 à 8 par jour aux principaux repas.

Prix : 14 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

HÉPATROL BUvable

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple.

Sans contre-indication. *Adultes et enfants,*

Indications. — Toutes anémies, asthénies, insuffisances hépatiques.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables.

Présentation. — Ampoules de 10 cc. = 125 gr. de foie de veau frais.

Boîtes de 6 ampoules : 45 francs.

Coffret de 18 ampoules : 120 francs.

Ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 62 gr. 50 de foie de veau frais.

Boîte de 8 ampoules : 30 francs.

Ampoules de 2 cc. — 1 ampoule = 25 gr. de foie de veau frais.

Boîte de 12 ampoules : 25 francs.

(En raison de son activité incomparable l'HÉPATROL est le meilleur marché de tous les extraits de foie).

Posologie. — *Anémies graves* : Ampoules de 10 cc. associées ou non à l'HÉPATROL injectable.

Anémies moyennes : Ampoules de 5 cc.

Anémies légères de l'adulte, insuffisances hépatiques, toutes anémies de l'enfance : Ampoules de 2 cc.

Mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour à prendre dans un liquide quelconque au début des repas.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau frais entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais.

Indications. — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

Mode d'emploi. — Par voie intramusculaire, injecter chaque jour 1 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer l'HÉPATROL buvable.

En raison de la purification très poussée de l'Hépatrol injectable, ces doses peuvent être très largement dépassées sans crainte d'intolérance.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. — Activité égale à celle de 250 gr. de foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 90 francs.

Boîte de 6 ampoules : 45 francs.

Ampoules de 1 cc. — Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 50 francs.

Boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Voir communications :

Société Médicale Hôpitaux, 19 mai 1930 (Aubertin).

Presse Médicale, 20 septembre 1930 (Achard).

Société Dermatologique, janvier 1931 (Pinard).

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPAVITA

Complexe d'Extraits organothérapiques suractivés par synergie et préparés à partir de glandes fraîches.

Indications. — Anémies graves, post-opératoires, post-hémorragiques, pré-tuberculose, Débilité générale, convalescence, chlorose, surmenage, amaigrissement, neurasthénie, troubles de la formation, suites de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses, Insuffisance hépatique, Faiblesse.

Action. — Enrichissement du sang en globules rouges et augmentation du taux de l'hémoglobine, rôle antianémique, antihémorragique, antitoxinique.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. avant les deux repas dans un demi-verre d'eau pure ou gazeuse, de vin, ou avec une cuillerée de potage ou jus de citron. *Enfants* : 1 ampoule de 5 cc.

2 Présentations. — Ampoules buvables de 10 cc. et 5 cc.

Prix de vente : 19 francs — Grand coffret de 24 amp. : 60 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 889-12.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

HÉPAX

Médication synergique des affections du foie et des voies biliaires. Agent antiarthritique de désintoxication et de diurèse.

Formule

Extrait d'artichaut.....	2 gr. 50	Peptone de viande purifiée	2 gr.
— d'orthosiphon...	1 gr. 50	— de gélatine.....	1 gr.
— d'adonis vernalis	0 gr. 25	— de poisson.....	1 gr.
— de salsepareille..	1 gr.	— d'œuf.....	0 gr. 50
Soufre précipité.....	1 gr.	— de lait.....	0 gr. 50
		Sulfate de magnésie sec.	16 gr.

Sucre Q. S. P. 100 gr.

Particularités. — Renforcement de l'action des peptones et du sulfate de magnésie classiques par des composants végétaux très efficaces.

Artichaut. — Puissant éliminateur urétique et régulateur du cholestérol.

Orthosiphon. — Diurétique très actif.

Soufre. — Renforce l'action antiarthritique des deux composants précédents.

Salsepareille, Adonis, agissent comme des éléments antitoxiques et diurétiques. Artichaut, orthosiphon, salsepareille, adonis et soufre forment une synergie très efficace dans les affections vésiculaires, hépatiques, hépato-rénales, arthritiques, dans les intoxications. Ils augmentent considérablement l'action des peptones et du sulfate de magnésie.

Forme granulée : 1 à 2 cuillerées à café le matin.

Forme liquide : XX gouttes trois fois par jour avant les repas dans de l'eau sucrée.

LABORATOIRE P.TAVERNIER, Docteur en pharmacie
32, rue de l'Ouest — PARIS.

HEPBI

Hépatrol-Bismuth.

Composition. — La première réalisation de l'association bismuth + extrait de foie en solution aqueuse.

1 ampoule 2 cc. = BI 4 centigr. + 30 gr. foie de veau frais.

Propriétés. — Pas d'asthénie bismuthique ni de phénomènes d'intolérance, pas de réaction locale ni d'accumulation, résorption immédiate. Action rapide, évite toute complication rénale. Donne une grande souplesse au traitement, possibilité d'augmenter la fréquence des piqûres et de rapprocher les séries.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Formes. — Ampoules de 2 cc.
(Boîtes de 12 : 40 fr.)

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

HÉPENTÉRYL

Spécifique rationnel des Affections hépatiques et intestinales.

Composition. — Boldine, pilocarpine, podophylline, extrait de belladone, calomel, ipéca, bioxyde de manganèse, hyposulfite magnésie, hypophyse, polypeptones, ext. bile de bœuf.

Présentation. — *Dragées* glutinisées de 0 gr. 40.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 par jour pendant les repas.

Enfants à partir de 6 ans : 2 par jour.

Prix de vente public : 20 francs.

Laboratoires BOUCLY

Grande Place — LOUVROIL (Nord).

HERGENOL

Indications. — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

Forme. — Produit volatil, usage externe.

Emploi. — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses. — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

Adultes : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 francs.

Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 0-55.)

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisypilitique, Cholagogue, Antiseptique externe.

Constitution. — Mercure phénol-disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

Propriétés. — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxité permet à chaque injection intramusculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

Indications et doses.

1^o *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée : injections intra-musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr. Prix : 16 francs.

b) Par voie stomacale : de 20 à 30 centigr. par jour d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE en dragées.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE. Prix : 8 francs.

2^o *Antisepsie.*

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

b) Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages urétraux ou vésicaux, solutions 1 p. 100 et 1 p. 200.

Cystites. Lavages vésicaux, solution à 7 p. 1 000.

Formuler. — Selon le cas :

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE. — *Comprimés* : 11 francs. *Savon*, boîte de 1 pain : 8 francs ; 3 pains : 24 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

HESPÉRIDAUSSÉ

A base d'alcoolature de fleur d'oranger, dépourvu de tout composé barbiturique, opacifié ou bromuré.

Activité réelle jointe à une atoxicité absolue.

Réveil agréable sans somnolence ni torpeur consécutives. Pas de troubles digestifs. Pas d'accumulation.

Indications. — Insomnie nerveuse, agitation cérébrale des surmenés intellectuels. Insomnie des enfants,

Posologie et mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, pur ou dans une tasse d'infusion aromatique, avant le coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

HEXORCÈNE

Hexylrésorcine.

Antiseptique urinaire polyvalent, particulièrement actif contre le colibacille.

Indications. — Infections aiguës et chroniques de l'appareil urinaire : pyélites, pyélonéphrites gravidiques, cystites, urétrites, prostatites, infections secondaires de la tuberculose des voies urinaires.

Présentations :

Prix de vente :

Boîtes de 100 capsules..... 50 fr.

— 30 capsules..... 20 —

Posologie et mode d'emploi. — Deux capsules dosées à 0 g. 15, trois fois par jour.

Augmenter progressivement la dose jusqu'à 4 capsules par prise, soit 12 au total.

Poursuivre le traitement au moins 15 jours après l'obtention de la première culture stérile d'urine.

Les capsules doivent être prises à la fin d'un repas.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diatése urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS

Prix : (50 globules) 16 francs.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

(Tél. : Gobelins 00-70.)

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.

Provenant du cheval vigoureux et reposé.

Supérieur au suc musculaire des bovidés :

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Toenia.

Assimilation parfaite.

Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales.

Tout état d'affaiblissement et de consommation.

Maladies de l'estomac et des intestins.

Le flacon : 28 francs. Durée moyenne 12 jours.

Le demi-flacon : 17 francs. Durée moyenne 6 jours.

Laboratoire GIVAUDAN

56, rue Paul Cazeneuve — LYON.

(Tél. : Parmentier 05-21.)

HIRUDINASE

Le premier produit spécialisé à base d'*extrait de sangsues*.

Indications. — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Acrocyanose, Œdèmes trophiques, Artérites aiguës et chroniques, Troubles de la Ménopause, Troubles de la menstruation, Infections, Septicémies.

Formule :

Extrait de sangsues (procédé spécial), Iode-citrate de soude, Extrait d'hypophyse, Hamamélis-Hydrastis-Marron d'Inde, Cupressus.

Présentation. — Dragées (10 à 15 jours de traitement par boîte).

Mode d'emploi. — *a.* 1 dragée au milieu des 3 principaux repas (Affections vasculaires).

b. 2 dragées au milieu des 2 principaux repas (Aménorrhées).

c. 4 à 6 dragées par jour (Infections).

Prix : 18 francs.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 52-12.)

HISTACLARTYL

**La première Histamine indolore
sans anesthésique.**

Indications. — Toutes les indications de l'histamine : Rhumatismes, Myalgies, Algies post-traumatiques, Névralgies, Anaphylaxie, Affections cutanées, Zona. Préviens les accidents du collapsus post-opératoire.

Contre-indication — Rhumatismes infectieux aigus.

Composition. — Bichlorhydrate d'histamine 1/2 mgr. pour 1 cc. Excipient sans anesthésique, Q. S.

Mode d'emploi. — Injections intradermiques ; Injections profondes (solution pure ou diluée dans 10 cc. à 20 cc. de sérum physiologique).

Posologie. — De 1/4 à 1 mgr., soit 1/2 à 2 ampoules.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. avec 1 aiguille Clartyl p. intradermique : 25 francs.

Accessoires. — Trousse CLARTYL comprenant 1 seringue spéciale p. intraderm. et 3 aiguilles inoxydables : 20 francs.

POMMADE HISTACLARTYL

Dosée à 2 p. 100 bichlorhydrate d'histamine.

Indications. — Rhumatismes, Myalgies, Lumbagos, Névralgies, Sciatiques, Algies post-traumatiques, Anaphylaxie, Affections cutanées.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau et au savon la région à traiter, la passer ensuite à l'alcool ou à l'éther, appliquer la pommade en couche mince en la faisant absorber par un léger massage. Pour obtenir une action plus violente, frictionner au gant de crin avant l'application.

Présentation. — Pot de 10 grammes : 22 francs.

N. B. — La pommade Histaclartyl peut être employée seule ou pour compléter le traitement par la solution d'Histaclartyl en injections intradermiques ou profondes (entre les séances de traitement ou entre deux séries de traitement).

Laboratoires CLARTYL, Bapaume, Pharmacien
85, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE.
Tél. : Maillot 10-06.

HISTA

« HISTAMINE BEYTOUT »

Les plus récents progrès dans la thérapeutique de la douleur.

Efficacité constante.

Composition et caractéristiques. — Ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 0005 de bichlorhydrate d'histamine, en solution stable, inaltérable. **Pour injections intradermiques**, indolores sans adjonction d'anesthésique.

Propriétés. — Action analgésique considérable et **constante** dans toutes les douleurs aiguës : arthralgies, myalgies, névralgies, quelles qu'en soient l'origine, l'intensité et l'ancienneté. Rhumatismes chroniques, musculaires et articulaires, lumbagos, torticols, névralgies, sciatique, intercostale, faciale, cellulites, plexalgies, zona, urticaire. Désensibilisant dans les phénomènes allergiques.

Contre-indications. — Rhumatismes infectieux *aigus* et poussées évolutives des rhumatismes infectieux chroniques.

Résultats. — En 3 à 5 jours, sédation des phénomènes douloureux, de la contracture et de l'impotence fonctionnelle.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cc. par jour en *injections intradermiques loco dolenti*.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules : 18 francs.

LABORATOIRES G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (Xe) — (Tél. : Nord 76-85.)

HISTALGINE

Histamine en solution isotonique à pH = 7 stabilisée, pour injections intradermiques indolores. Toxicité nulle.

Employable également en Ionisation et en Scarifications.

Composition. — Chaque ampoule de 1 cc. contient : 0 gr. 0005 de Bichlorhydrate d'Histamine en solution glucosée.

Propriétés Thérapeutiques. — Action double : analgésique, sédation très rapide de la douleur ; — curative, augmentation considérable de la circulation sanguine. — Néof ormation et Vaso-dilatation capillaire. — Métabolisme cellulaire exalté.

Indications. — 1° Rhumatismes chroniques, d'origine glandulaire ou traumatique — Arthroses.

Rhumatismes chroniques, d'origine infectieuse. — Rhumatismes articulaires aigus.

2° Algies, — Myalgies, — Névralgies.

3° Traumatismes, Luxations, Foulures, Entorses, etc.

4° Maladies de Sensibilisation : Asthme, Migraines, etc.

5° Maladies Neurovasculaires : Artérites, Pelade, Ulcères variqueux.

6° Douleurs dentaires.

Posologie. — Consulter la littérature qui accompagne chaque boîte. Utiliser une seringue de 1 cc. de préférence divisée au 1/20°.

Aiguille courte de 4/10°.

Piqûres intradermiques — 1/2 à 1 goutte aux points douloureux. Chaque piqûre fait apparaître la Triade réactionnelle de Lewis.

1/2 à 1 ampoule par jour, pendant 3 à 10 jours.

Ionisation. — 1 ampoule pour 10 gr. d'eau distillée.

Prix : 25 fr. la boîte de 10 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1001/18.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale (Sarein)
14, Avenue Perrichont — PARIS (XVI°) (Tél. Jasmin 00-37).

HISTAMYL

Composition. — Bi-chlorhydrate d'Histamine pur, dérivé de l'Histidine par décarboxylation, incorporé à un excipient pénétrant, au taux de 0,50 cgr. p. 100, ou en solution injectable indolore sans anesthésique à 1/2 mmgr. pour 1 cc.

Indications. — Algies rhumatismales musculaires soit chroniques, soit aiguës (arthrites sèches, séquelles des états chroniques infectieux, nodosité des doigts et orteils ; myalgies, torticolis, lumbagos). Névralgies (faciales ou intercostales), sciatiques, plexites cervico-brachiales. Algies post-traumatiques (fractures, entorses).

Formes. — Baume ou ampoules (de 1 cc.).

Posologie. — *Baume* : 1 application quotidienne, au coucher, en couche épaisse, léger massage à recouvrir de coton cardé ou flanelle. *Ampoules* : en une séance 10 à 20 injections intradermiques de 1/2 goutte, *loco dolenti* distantes de 1 à 3 centimètres. Réaction locale habituelle : rougeur, démangeaison, petites boules d'œdème (réaction de Lewis) qui disparaissent en 1/2 heure environ.

Faire 3 à 10 applications.

Prix : Le tube de Baume : 18 francs ; la boîte de 6 ampoules : 16 francs (remboursables par les Assurances sociales).

Littérature échantillons :

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

Tél. : Archives 83-52.

HISTOGÉNOL

(Médication Arsenio-phosphorée organique.)

Puissant reconstituant général.

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc..

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe d'Elixir ou une mesure de granulé au milieu de chaque repas, ou 2 comprimés matin et soir, ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Prix :

Elixir..... 16 fr. 50. Comprimés.. 12 fr. 50.

Granulé... 16 fr. 50. Concentré... 12 fr. 50.

Ampoules.. 16 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine

Docteur ès sciences. Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

HISTOGERMA

Reconstituant physiologique. Stimulant de la nutrition.

Composition. — Comprimés dragéifiés à base de lécithine, quinine, nucléinate de soude, extraits opothérapiques (Hypophysaire, parathyroïdien, etc.).

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, accélère les échanges nutritifs, augmente le poids du corps et le nombre des hématies.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, dépression nerveuse, surmenage physique ou intellectuel, convalescence pénible, prébacillose, bacillose, grossesse, lactation, affections du cerveau et de la moelle.

Posologie :

10 à 15 ans..... 2 à 3 comprimés par jour.

Adultes..... 3 à 6 comprimés par jour.

Tube de 60 comprimés : 16 francs.

Laboratoires ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

HOLOS

Opothérapie osseuse.

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse. Allaitement, Convalescence, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une promptre reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Prix : 10 francs.

Littérature — Échantillons.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Elysées 40-26).

HOLOSPLENINE

Extrait de rate injectable
Délipoidé et désalbuminé.

Indications. — Anémies, Amaigrissements, Tuberculose, Eczémas chroniques, Erythodermie arsénobenzolique, Pemphigus, Lichen ruber acuminosus, Pityriasis rubra de Hebra, Prurigo simplex, Urticaires récidivantes, Miliaire, Eczéma rebelle, Prurit anal, vulvaire, périnéal, Lichen plan, Psoriasis.

Forme et composition :

Boîte de 6 ampoules de 1 cc. chaque cc. = 30 grs de rate fraîche. Prix : 30 francs.

— 6 — de 1 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 22 francs.

Tube de 6 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 20 francs.

Conduite du traitement. — Série de 12 à 15 injections de 1 cc. sous-cutanées ou intramusculaires comme suit : 1 injection les 1^{er} et 2^e jours, pas d'injection les 3^e et 4^e jours, ensuite injection tous les 2 jours. L'injection est indolore. Pour les eczémas, ne pas hésiter à injecter les doses fortes : 2 à 3 cc. (c'est-à-dire 30 à 45 gr. de rate) ainsi que dans les dermatoses rebelles.

Laboratoires de l'ENDOPANCRIINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes : troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 15 francs. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 9 fr. 50.

Laboratoire de L'ENDOPANCRIINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

HOPOGAMYL

Composition :

Amylase.....	0,03
Pepsine	0,005
Peroxyde Magnésium.....	0,07
Carbonate Magnésie	0,07
Bioxyde Manganèse	0,15

Pour une tablette aromatisée légèrement à la menthe

Indications. — *Affections gastro-intestinales, Chlorose*
Mauvaises digestions, aigreurs, fermentations intestinales, entérites, diarrhées rebelles, auto-intoxications.

Présentation. — Tablettes aromatisées *légèrement* à l'essence de menthe.

Posologie. — Sucrer lentement 6 à 8 tablettes par jour, après les repas ou à distance des repas suivant avis du médecin.

Échantillon médical sur demande.

Laboratoire de l'HOPOGAMYL

52, place de l'Hôtel-de-Ville — BEAUVAIS (Oise).

HOPOGAN-BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégageant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

Propriétés. — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

Formes. — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

Prix : la boîte de 30 cachets : 15 francs.

HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

Prix : le flacon de 40 pilules : 12 francs.

HOPOGAN PRISE-BÉBÉ contre les diarrhées vertes des nourrissons (1 à 3 paquets par jour).

Prix : la boîte de 20 paquets : 10 francs.

Laboratoire des PEROXYDES MÉDICINAUX

12-18, rue Lamartine — PARIS.

(Tél. : Trudaine 09-64.

HORDÉNOL

A base d'Hordénine Beytout.

Indications. — Médication héroïque des diarrhées de toutes origines, toutes natures et toutes intensités.

Résultats : Jugule toutes diarrhées aiguës en 48 heures. Aucune contre-indication.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Les ampoules peuvent également être administrées par voie buccale, quand les injections sont impossibles.

Composition :

Sulfate d'hordénine	0,125
Vanadate de soude	0,002
Triméthylxanthine.....	0,002
Eau distillée.....	Q. S. P. 2 cc.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

HORMANTOXONE

Composition. — Extrait contenant intégralement et sous forme stable le principe antitoxique du foie, purifié, concentré et titré biologiquement.

Formes. — Globoïdes pour adultes. Granulés pour enfants. Suppositoires pour jeunes enfants et anorexiques.

Propriétés. — *Supplée* la fonction antitoxique du foie quand elle est déficiente ; la *stimule* quand elle est perturbée.

Indications :

I. *Insuffisance de la fonction antitoxique* du foie, cirrhoses, ictères, hépatisme, lithiase biliaire.

II. *Auto et hétéro-intoxications* : (urémie, intoxications alimentaires et microbiennes, toxicomanies, éthylisme, intoxications médicamenteuses, urobilinémie). Toxémie gravidique, vomissements incoercibles de la grossesse, pré éclampsie.

III. *Toxi-infections* (adjuvant des sérothérapies spécifiques). Psychoses infectieuses, soins pré et post-opératoires. Cholécystites et péricholécystites.

IV. *Anaphylaxies. Intolérances alimentaires* : Asthme, urticaire, migraines, accidents sériques, strophulus et fièvre des foins.

V. *Dermatoses* : Eczémas, prurits, érythèmes, œdème de Quincke.

VI. *Oliguries.*

VII. *Indications diverses* : (Diabète, albuminurie, rhumatismes chroniques).

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau avant chaque repas :

Cas aigus : 2 à 3 globoïdes.

Cas moyens : 1 à 2 globoïdes.

Cure d'entretien : 1 globoïde.

Jeunes enfants ne pouvant pas absorber les globoïdes : 1 cuillerée à café de granulés avalée avec un peu d'eau avant chaque repas ou bien un suppositoire le soir.

Anorexiques : 1 ou 2 suppositoires.

Prix :

Le flacon de 36 globoïdes (8 jours) : 20 francs.

La boîte de granulés (8 jours) : 20 francs.

La boîte de suppositoires (8 jours) : 16 francs.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

HORMIADYNE

Composition par dragée :

Silicate de Soude pur	0,10
Extrait stabilisé de Gui	0,05
De Muguet	0,015
Extrait sec de Cascara	0,015
Bile desséchée	0,035
Thyroidine	0,0025
Poudre de poumon	0,02
Poudre de surrénales	0,0125

Forme. — Dragées à noyau mou.

Indications. — Médication hypotensive polyvalente, Artério-sclérose, Hypertension, Troubles cardio-vasculaires et toutes complications.

Doses. — 2 à 6 dragées par jour.

Prix : 16 francs la boîte de 50 dragées.

Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1082-4.

A. MIRONNEAU, Pharmacien
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
 (Tél. : 18.)

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cœco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-1 et 586-2.

Prix : 12 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ
 17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
 (Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline.

Traitement des États Tuberculeux.

Propriétés thérapeutiques. — Le chlorhydrate de choline est une hormone qui agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés antitoxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, Anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques, Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide et durable.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée tous les deux jours
Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 cgr. de chlorhydrate de choline.

Prix : 24 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32 Télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

HORMOCRINOL « F » et « M »

Une conception nouvelle dans la thérapeutique antiobèse.

L'Hormocrinol, en dehors de ses effets sur l'oxydation des graisses et des mucines, réalise la plus efficace cure de diurèse agissant favorablement sur les troubles du métabolisme de l'eau.

Extraits glandulaires totaux obtenus par dessiccation dans le vide à basse température des organes frais.

Posologie. — Prescrire HORMOCRINOL « F » chez la femme, et HORMOCRINOL « M » chez l'homme.

6 à 8 comprimés par jour à prendre en deux ou trois fois.

Prix au public : 25 francs.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY

19, rue Brunel — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Galvani 51-31.)

HORMODAUSSÉ

(Hormonothérapie totale.)

Composition. — Hormones de jeune taureau, de génisse et de jeune bovidé en pleine croissance, associées à un extrait hépatique (méthode de Whipple), à l'hémoglobine et aux diverses albumines globulaires.

Propriétés thérapeutiques. — Il apporte aux organismes affaiblis tous les produits endocriniens qui circulent dans les vaisseaux des animaux jeunes et vigoureux, ainsi que les stimulants de l'hémopoïèse et les matériaux de la régénération des hématies.

Indications. — Toutes les déchéances organiques et les déficits endocriniens, les convalescences, les anémies et les retards de croissance.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour, 30 minutes avant les repas, dans un peu d'eau.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour, dans un peu d'eau.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

HORMOFLAVÉINE

Composition :

Hormone spécifique du corps jaune, physiologiquement titrée.

Indications thérapeutiques et posologie :

Aménorrhée, hypoménorrhée (1 injection quotidienne, de préférence du 14^e au 21^e jour de la période intermenstruelle) ; **ménorragies, métrorragies** (1 ou 2 injections tous les jours dans la semaine précédant les règles, ou au cours même de l'hémorragie) ; **stérilité d'origine hormonale** (1 injection quotidienne du 14^e au 28^e jour de la période intermenstruelle). L'Hormoflavéine est spécialement indiquée à partir du 14^e jour après les règles (1 injection quotidienne) chez les femmes qui ont déjà fait un ou plusieurs avortements, pour leur permettre de mener à bien une nouvelle grossesse.

Présentation et mode d'emploi :

Deux titrages (solution huileuse) : Hormoflavéine A (boîtes de 6 ampoules titrées à 100 unités par ampoule) ; Hormoflavéine B (boîtes de 1 ampoule titrée à 600 unités). Injection sous-cutanée profonde, ou intramusculaire).

Prix : Boîte de 6 ampoules A : 50 fr. ; boîte de 1 ampoule B : 50 fr.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

HORMOLÉOL

Opothérapie entéro-hépatique.

Composition. — Extraits biliaires dépigmentés et décholestérinés. Hormones intestinales, Agar-Agar.

Propriétés thérapeutiques. — L'action synergique des éléments composants de l'HORMOLÉOL réalise une médication opothérapique assurant le maximum de résultat :

1° Intestins : Dans toutes les Constipations où il y a déficience du rythme moteur de l'intestin (insuffisance motrice) et déficience de l'activité glandulaire (insuffisance sécrétoire). Dans les entérites d'origine diverses (muco-membraneuse, paludéenne, etc.).

2° Foie : Par les extraits biliaires qui entrent dans sa composition, l'HORMOLÉOL est employé utilement dans le traitement des affections de l'appareil biliaire (arrêt, insuffisance ou perversion de la bile).

Avantageusement recommandé dans :

Lithiase biliaire, Insuffisance biliaire, Ictère, Cholémie familiale.

Avantages. — Laxatif doux, non irritant, ne provoquant ni colique ni accoutumance. Sans contre-indication.

Posologie. — A prendre de préférence avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 3 dragées par jour.

Enfants : de 6 à 15 ans : 1/2 à 1 dragée par jour.

(Admis aux Assurances sociales.)

Laboratoire de l'HORMOLÉOL

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOLUTÉINE VOGUEIN

Chaque comprimé contient 0,05 d'Hormone folliculaire, titrée à 5 U. I., et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Cet ensemble provoque le stimulus qui déclenche le flux menstruel, supprime les douleurs des règles et les rend plus régulières et plus faciles.

Indications. — On l'emploiera dans tous les cas d'hypo-ovarie, où il sera nécessaire de provoquer l'arrivée du flux menstruel et dans les malaises généraux résultant d'un flux peu abondant, dans l'aménorrhée, la chlorose.

C'est le spécifique et l'insuffisance ovarienne dans la puberté.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, pendant la semaine devant précéder le flux menstruel.

Prix : Le flacon 15 fr.

Laboratoires VOGUEIN

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

(Tél. : Danton 83-24.)

HORMONE GONADOTROPE

Du docteur Roussel.

Indications. — Chez l'*Enfant* (à partir de 9 ans): Insuffisance du développement génital; Retard de la puberté; Cryptorchidie.

Chez l'*homme*: Stérilité, impuissance.

Chez la *femme*: Aménorrhée, stérilité.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules dosées à 40 Unités-Evans, accompagnées de 6 ampoules de Solvant pour une solution extemporanée.

Prix: 50 francs, la boîte.

Posologie. — Chez l'*enfant* de 9 à 12 ans: 12 injections à raison d'une tous les 2 jours.

A partir de 12 ans et chez l'*adulte*: une injection par jour pendant 18 jours.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél.: Littré 68-22, 23, 24.)

HORMOVARINE BYLA

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, aménorrhées, hypoménorrhées, dysménorrhées, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause, ovariectomie, stérilité, obésité, etc.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les jours, en injection lente, intra-musculaire, ou XV à LXXX gouttes, ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'Hormovarine doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours dans la période qui précède immédiatement la date présumée des règles.

N. B. — Les ampoules d'Hormovarine sont toujours préparées en partant de l'hormone ovarienne intégrale, tandis que nous avons adopté la folliculine cristallisée comme base de nos 3 autres préparations. (Voir aussi Benzoate de di-hydro-Folliculine Byla, amp. à 1.000, 10.000 et 50.000 unités).

Prix:

Ampoules: 50 francs. — Comprimés: 18 francs. — Ovules: 25 francs. —
Gouttes: 18 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS. (Tél.: Danton 08-11.)

HORMOVITOL

Puissant tonique et reconstituant cellulaire.

Élixir de goût très agréable à base d'extraits androïques totaux, d'extraits cérébro-médullaires et de nucléines.

Indications. — Asthénie, Amaigrissement, Troubles nerveux. Dépression intellectuelle. Neurasthénie. Convalescence médicale ou chirurgicale. Troubles glandulaires. Surmenage. Phosphaturie.

Doses :

Adultes : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : de 5 à 10 ans, 1 cuillerée à café ; de 10 à 15 ans, 1 cuillerée à dessert.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc. — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

HORMUCLASES

Opothérapie du Docteur Roussel.

Toute leur préparation est effectuée en moins de 4 heures.

La dessiccation est obtenue en 40 minutes, à 0°, par des procédés brevetés.

Les organes frais et les poudres sont constamment maintenus, au cours de la fabrication, à température basse et à l'abri de l'air.

La mise en cachets est opérée mécaniquement, sous gaz inerte (azote).

Les cachets sont livrés dans des tubes de verre, scellés après obtention d'un vide parfait.

Cachets :

Formes simples :

Hypophyse totale	0,05
Mamelle	0,10
Orchitine	0,10
Ovaire	0,10
Surrénale	0,10
Thymus	0,10
Thyroïde	0,025
Thyroïde	0,002

Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.

Boîte de 36 cachets : 20 francs.

Extraits injectables :

Formes simples. — Ampoules de 2 cc. dont le titre en principe actif correspond en organe frais à :

Cœur, 2 gr. ; Corps jaune, 2 gr. ; Cortico-surrénale, 0,50 ; Hypophyse totale, 1 gr. ; Antéhypophyse, 0,50 ; Mamelle, 1 gr. ; Orchitine, 2 gr. ; Ovaire, 2 gr. ; Pancréas, 5 gr. ; Parathyroïde, 0,10 ; Rein, 2 gr. ; Surrénale, 0,50 ; Thymus, 1 gr. ; Thyroïde, 0,50 ; Am-

poules de rate de 2 cc. correspondant à 10 gr. d'organe frais ; Ampoules de rate de 5 cc. correspondant à 25 gr. d'organe frais.
Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.
Boîte d'ampoules d'extraits injectables.

Prix : 20 francs.

Complexes d'Hormuclases. — Pour toutes prescriptions comportant des dosages particuliers ou des combinaisons d'organes différents des formes standard, s'adresser à

Laboratoires Thérapeutiques
A. MILLET et GUILLAUMIN
4, rue Richer — PARIS.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
Tél. : Littré 58-43.

HUILE CAMPHRÉE MANGANÉSÉE

« MÉTÈRE »

Indications :

Toutes les indications de l'huile camphrée.
Anti-infectieux puissant contre septicémies, gripes, encéphalites, poliomyélites, Furunculose, Lymphangites, Phlegmons. Toutes les maladies infectieuses, Adjuvant précieux des sérothérapies spécifiques. Médicament leucogène.

Composition :

Huile camphrée au 1/10^e contenant 0,15 mgr. de Manganèse colloïdal par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. Dans les cas bénins faire une injection tous les jours ou tous les 2 jours. Dans les cas graves on peut faire une piqûre toutes les 3 heures pendant 3 jours consécutifs.

Laboratoire MÉTÈRE
24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure.

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

Le flacon	15 gr.	Prix :	2 fr.
—	30 gr.	—	2 fr. 50.
—	45 gr.	—	3 fr.
—	60 gr.	—	3 fr. 50.
—	250 gr.	—	10 fr. 75.

Laboratoire GIVAUDAN

56, rue Paul Cazaneuve — LYON.

(Tél. : Parmentier 05-21.)

HUILE DE FOIE DE MORUE

**Médicinale Suractivée
Rhône-Poulenc.**

2 000 unités internationales Vitamine A,
500 unités internationales Vitamine D,
par centimètre cube.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Arrêt du développement statural et pondéral.

Lymphatisme, adénopathies, convalescences.

Présentation : Flacons de 125 cm³. Prix de vente : 15 fr.

Posologie (par 24 heures) :

Première année : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

Enfants : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

Adolescents et adultes : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

HUILE D'HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly, trois siècles d'existence. Emploie le nom de Haarlem sans préfixe ni suffixe qui décèlent la contrefaçon.

Produit de la Société de la véritable Huile de Haarlem.

8, Achterstraat Haarlem (Hollande).

Présentation et prix :

1° *Gouttes* : le flacon de 10 cc. : 2 fr. 75.

2° *Capsules* : la boîte de 36 capsules : 4 fr. 95 ;
la boîte de 108 capsules : 14 fr.

Indications. — Usage interne : insuffisances hépatique et biliaire, ictères, coliques hépatiques, coliques néphrétiques, cystites, pyélonéphrites, rhumatismes chroniques, goutte, sciatique, névralgies, vers intestinaux.

Usage externe : Alopécies, brûlures, plaies, piqûres d'insectes, contusions, engelures, crevasses, furoncles.

Posologie et mode d'emploi :

Usage interne : X gouttes ou une capsule
3 fois par jour.

Usage externe : en applications légères.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle sous les n^{os} 650-4 (*gouttes*) et 650-5 (*capsules*).

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS
(Tél. : Provence 49-77.)

HUILE IODÉE FINIKOFF

CALCIUM INTRAVEINEUX FINIKOFF

Méthode du D^r A. FINIKOFF

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

Indications. — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, séreuses et cutanées.

Contre-indications. — Tuberculose pulmonaire, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

Forme. — *Huile iodée* à préparer extemporanément : une ampoule d'huile spéciale, une ampoule d'iode en solution au 1/10 en injections intramusculaires.

Chlorure de calcium pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine injectable ou *per os* chez tous les autres malades.

Doses et mode d'emploi. — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

Prix de la boîte de	6 ampoules huile.	} 25 fr.
— —	6 — iode.	
— —	12 — calcium.	25 fr.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

HUILORHINE

Composition :

Camphre, eucalyptol, résorcine, essences aromatiques et antiseptiques (essence de menthe, etc.); véhicule : huile d'olive neutralisée et stérilisée sans éphédrine.

Propriétés :

Antiseptique et tonique des voies respiratoires supérieures.

Indications :

Toutes affections du rhino-pharynx, coryza, rhinites, sinusites, végétations adénoïdes, désinfectant pré et post-opératoire, prophylaxie des maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi :

Instillations nasales : V à VI gouttes dans chaque narine matin et soir. Pulvérisations matin et soir.

Prix : 11 francs le flacon de 35 cc.

Laboratoires Yves CHABROL

29, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 25-85.)

HUPNOSAL ADRIAN

Composition. — Diéthylbarbiturate acide de sodium.

Propriétés. — Hypnotique. Anti-nervin. Modificateur du système sympathique. Sédatif nervin.

Indications. — Insomnie. Troubles nerveux de toute nature.

Avantages. — Tolérance absolue. Sédatif sans opium ni morphine.

Présentation :

a. *Dragées* dosées à 25 cgr.

b. *Elixir* dosé à 25 cgr. par cuillerée à soupe.

c. *Cachets* dosés à 25 cgr.

d. *Ampoules* dosées à 20 cgr.

Posologie :

Dragées : 1 à 2 le soir.

Elixir : 1 à 2 cuillerées à soupe le soir.

Cachets ou *Ampoules* : 1 à 2 le soir.

Prix : *Dragées* : 15 francs la boîte ; *Elixir* : 18 francs le flacon ; *Cachets* : 15 francs la boîte ; *Ampoules* : 15 fr. la boîte.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anciennement **ADRIAN** et Cie.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

Composition. — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Fluorure de sodium, Essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 fr. 50.

Traitement unité : 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

HYDRARGYRE-BOULARD

En ampoules buvables.

Indications. — Accidents spécifiques de tous ordres (primaires, secondaires et tertiaires), parasites intestinaux, grandes infections (septicémies), colibacillose. Médication de choix pour les localisations spécifiques oculaires ou autres et les attaques mixtes.

Composition. — Chaque ampoule contient : 1° De l'Hydrargyre sous forme de complexe organo-métallique ; 2° Des levures vivantes, dans leur milieu isotonique.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour suivant la gravité des signes cliniques.

Sous cette forme, l'Hydrargyre est *parfaitement supporté* jusqu'à la dose de 6 ampoules par jour. La métabolisation est déjà faite en grande partie par les levures. L'assimilation est extrêmement rapide ; il y a intérêt à agir par doses fréquentes et répétées, mais de préférence à jeun. Verser le contenu de l'ampoule dans un liquide quelconque, de préférence sucré et tiède (eau, vin, bière, tisane).

Prix : 16 francs la boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5.

Voir aussi les autres complexes organo-métalliques :

Or-Boulard, Iodure-Boulard, Argent-Boulard, Magnésium-Boulard, l'alternance quotidienne de deux complexes Boulard étant souvent recommandable.

Laboratoire CERBELAUD Docteur en Pharmacie,

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 16-66.)

HYDRASTINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 mmgr. d'Hydrastine.

Alcaloïde principal de l'*Hydrastis canadensis*, exempt de Berbérine.

Propriétés. — Détermine la contraction du muscle utérin. Vaso-constrictrice et hypertensive. Accroît le tonus gastrique et intestinal. Sympathicolytique.

Indications :

a. **Essentielles** : Toutes les métrorragies ; ménorragies par congestion utérine primitive (Siredey). Kystes de l'ovaire, métrites hémorragiques. Hémorragies de la ménopause.

Aucune contre-indication.

b. **Secondaires** : Epistaxis. Hémorragies hémorroïdaires. Hémoptysies. Dyspepsies atoniques.

Présentation. — Granules à 2 mmgr.

Posologie et mode d'emploi. — 6 à 15 granules par jour en 2 ou 3 fois avant les repas, pendant 8 à 10 jours avant la date présumée des règles, ou dès le début de l'hémorragie. Ces doses peuvent être largement dépassées.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

HYDRASTIS GMET

Composition. — Extrait total liquide et sans alcool de l'*Hydrastis canadensis*.

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, laxatif (par son action sur le foie).

Indications. — Hémorragies, Fibromes, Métrorragies, Congestions pelviennes, Hémorroïdes, Constipation.

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

La moins onéreuse des préparations d'hydrastis.

Le flacon de 135 cc. : 22 francs.

Laboratoire GMET

27, rue du Faubourg-Montmartre

PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux As. Soc.).

HYDRATE DE MAGNÉSIE ADRIAN

Composition :

Hydrate de magnésie pur légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique, laxatif.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie, constipation.

Présentation. — Comprimés dosés à 25 cg.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas, renouveler après le repas si nécessaire.

Prix : 12 francs le flacon.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Ant. ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81-82.)

HYDRORRHÉOL

Composition. — Poudre de Dower, Québracho, Extraits organiques.

Propriétés. — Antispasmodique, antiasthmatique, exalte l'action antitoxique du foie, rétablit l'équilibre humoral.

Indications. — Asthme hépatiqué, Asthme nasal, Hydrorrhée, Rhinite, Rhume des foins.

Posologie. — En cas de crise : 1 cachet d'heure en heure, 4 cachets en moyenne.

En saison et en périodes de crises : 2 cachets par jour pendant 8 jours avec une infusion légère de boldo ou de thé.

Présentation et prix. — Cachets : la boîte 12 fr. 75.

Laboratoire Laryngologique

R. CORDIER

Docteur en Pharmacie,
222, faubourg Saint-Martin,
PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 34-71)

HYDROXYDASE

Antitoxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

Composition. — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

Mode d'action. — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

Indications. — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

Mode d'emploi. — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée, aussitôt débouchée.

Caissettes de 20 petites bouteilles — de 10 petites bouteilles

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. ;

Source Marie-Christine du Breuil-sur-Couze déclarée d'intérêt public par décret du 2 septembre 1934.

Compagnie de l'HYDROXYDASE

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. (Tél. : Pigalle 83-15 et 83-16.)

HYGIÉNYL DU D^r GAULIER

Composition :

Perborate de soude	25 gr.
Borate de soude.....	75 gr.
Essence de lavande	10 gouttes.
Essence de bergamote	1 goutte.
Essence de romarin.....	1 —
Pour 100 grammes.	

Indications. — Toutes les indications de l'oxygène naissant : petite chirurgie, lavage des plaies, antiseptie vaginale et utérine ; soins de la gorge et otites ; en hygiène et art dentaire, hémostase et raffermissement des gencives.

Utilisé en poudre, il amène rapidement la désinfection et la cicatrisation des plaies.

Présentation et prix. — 12 francs la boîte de 200 gr. de poudre.

Posologie. — Tenir compte du fait que une cuillerée à soupe dans 1 litre d'eau donne 1 litre d'eau oxygénée à 3 volumes.

Laboratoires GAULIER

38, rue Saint-Ferdinand — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 49-55.)

HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Deux formes. — **Élixir Hymel** (Hydrargyre et Miel), comportant un excipient spécial à base de miel, qui lui procure un goût très agréable et une tolérance parfaite pour l'estomac.

Suppositoires Hymel, préparés entièrement à froid, au mercure vif : 2 dosages :
Adultes.

Enfants et Nourrissons. (Calibre très réduit.)

Voir : **Élixir Hymel**,
Suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

Hyoscyamine Houdé. — Alcaloïde pur cristallisé extrait de l'*Hyoscyamus niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique et anticonvulsivante, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique, où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante dans le parkinsonisme et la vagotonie. Arrête les tremblements séniles, le hoquet épidémique. Traitement de la chorée infantile, de l'épilepsie, des troubles de la démarche, etc...

Produit absolument inoffensif si l'on respecte la posologie, détaillée dans le conditionnement des flacons.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 granules *pro die* les prendre avant les repas. Pas d'accumulation. S'arrêter en cas de *vision brouillée*.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.
(Tél. : Nord 40-58.)

HYOSTINAL

Composition. — Extrait végétal en gouttes pour le traitement des séquelles de l'encéphalite et du parkinsonisme.

Propriétés. — Constitue à la fois un traitement général anti-infectieux et symptomatique. Tonifie les muscles, ceux des membres surtout, influence la respiration en la régularisant et atténue la salivation. A la suite du traitement, la rigidité musculaire diminue, l'insomnie et la sialorrhée disparaissent progressivement.

Posologie. — *Matin* : de XII à XV gouttes du flacon n° 1.

Après-midi : de XII à XV gouttes du flacon n° 2.

Ensuite augmenter d'une goutte par jour de chaque flacon sans jamais dépasser 50 gouttes de chaque flacon. Dans les cas très graves où la rigidité musculaire, le tremblement et la salivation persistent, on devra employer l'*Hyostinal* type fort.

La boîte de 2 flacons, type normal ou type fort : 54 francs.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des Hôp. et des Grandes C^l^{es} de Ch. de fer.

HYPALÈNE

Comprimés et Suppositoires.

Composition. — Combinaison de l'acide Cyclopentenyl allylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

Action. — Analgésique, Sédatif, Hypnogène, Antispasmodique.

Indications. — Traitement de l'insomnie douloureuse, algies diverses, angoisse pré-opératoire, douleurs post-opératoires, Mal de mer.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Suppositoires de grosseur moyenne permettant leur usage aux adolescents et aux adultes et enveloppés dans une enveloppe de matière plastique hermétique.

Posologie des Comprimés (dosés à 0,10 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, une heure ou deux après le repas.

Algies diverses : 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse, Nervosisme : 1 à 2 comprimés par 24 heures ou quelques minutes avant les interventions chirurgicales, les examens médicaux douloureux, les soins dentaires.

Dose maximum par 24 heures : 6 comprimés.

Posologie des Suppositoires (dosés à 0,20 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 suppositoires en se couchant.

Algies diverses : 1 à 2 suppositoires dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse pré-opératoire : 1 ou 2 suppositoires la veille de l'intervention, 1 suppositoire une heure avant l'intervention.

Etats anxieux : 1 suppositoire par 24 heures.

Dose maximum par 24 heures : 4 suppositoires.

Adolescents : administrer la moitié des doses pour adultes (Comprimés et Suppositoires).

Posologie spéciale pour le mal de mer :

a. *Suppositoires* (traitement le plus pratique).

1° Mettre un suppositoire la veille de l'embarquement et un autre lorsqu'on est installé sur le bateau ;

2° Mettre un autre suppositoire chaque jour pendant 3 ou 4 jours si l'on ressent des vertiges ou des nausées.

b. *Comprimés.* — Prendre 1 comprimé d'Hypalène la veille de l'embarquement, et un 2° dès l'installation sur le bateau. Ensuite, chaque jour, 1 à 2 comprimés jusqu'à ce que toute menace de nausée soit écartée.

Prix :

<i>Comprimés.</i> Le flacon.....	13 fr.
<i>Suppositoires.</i> La boîte.....	13 fr.
<i>Hypalène</i> Mal de Mer. La boîte.....	20 fr.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Dépôt : 127 bd St-Michel — PARIS (V°).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPERSAN

Médication hypotensive et diurétique.

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, Cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — 30 à 50 gouttes, 3 fois par jour.
90 à 100 — le soir au coucher.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

HYPER-SÉRUM NAC

Sérum sulfaté chloruré sodique, légèrement hypertonique, avec adjonction de traces de glycoollate de cuivre.

Injections hypodermiques absolument indolores de 2 cc., 5 cc. ou 10 cc.

Indications. — 1° *Athrepsie, anémie des nourrissons* et tous les états qui y conduisent : vomissements, mauvais régime, diarrhée, dénutrition dans les maladies infectieuses, etc...

2° *Asthénie des adultes* : asthénie des hépatiques, asthénie des surmenés, asthénie à la suite des maladies infectieuses, asthénie des cancéreux, etc...

Posologie. — *Nourrissons* : 2 ampoules de 2 cc. ; 2 ampoules de 5 cc. par jour comme traitement d'attaque dans l'athrepsie, les vomissements répétés, la gastro-entérite aiguë.

1 ampoule de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour pendant 15 jours dans les anémies et les gastro-entérites chroniques du nourrisson.

Adultes : 1 injection quotidienne de 10 cc. pendant 12 à 15 jours ; arrêter 6 jours et reprendre.

Présentation :

Boîte de 10 ampoules de	2 cc	13 fr.
— 10 —	5 cc	17 —
— 10 —	10 cc	20 —

Laboratoires du D^r RENAUD

E. RENAUD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

2, place de la Duchesse-Anne — NANTES.

HYPOCHOLATE

des professeurs **G. CARRIÈRE** et **E. GÉRARD**.
Traitement de l'Hypertension artérielle.

Composition. — En ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 02 de CHOLALATE de SOUDE, chimiquement pur pour 1 cc. En suppositoires à 0 gr. 10. Il est employé avec succès égal en petits lavements dans la capsule rectale de 5 ou 10 cc. à la poire ou à la main, en utilisant le contenu d'une ampoule de 5 cc.

Indications. — Hypertension intermittente, Hypertension par pléthore, Hypertension intermédiaire entre pléthore et sclérose.

Posologie. — Injecter le contenu d'une ampoule profondément sous la peau, tous les jours au début. Puis, lorsqu'un abaissement suffisant a été obtenu, injecter seulement deux fois par semaine et même une seule fois le contenu d'une ampoule, ce qui parfois suffit pour maintenir l'abaissement de tension obtenu. Puis, au bout d'un temps variable, cesser le traitement, pour le reprendre plus tard s'il y a lieu.

Prix au public : la boîte de 10 ampoules : 30 francs.
 La boîte de 10 suppositoires à 0 gr. 10 : 30 francs.

Produits STÉNE

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

HYPOGUISTYL

Synthèse des Médications hypotensives.

Propriétés thérapeutiques :

Vertiges, hypertension, artério-sclérose.

Formule :

Benzoate de lithine, Poudre de foie, Silicate de soude, Théobromine, Extrait de gui du poirier, Nitrite de soude, Scammonée pulvérisée, poudre de scille, pancréas pulv.

Posologie :

2 comprimés avant les trois repas.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-13.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS

(Tél. : Diderot 04-71.)

HYPOPHÉDRINE

Éphédrine végétale française corrigée.

Composition :

Ephédrine végétale	0 gr. 03
Hypophyse totale	0 gr. 03
Ext. de Lobélie	0 gr. 01

Par dragée.

Indications. — **Bronchites emphyséma-teuses, Asthme, Rhume des foin.**
Tous états dyspnéiques.

Avantages. — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

Posologie. — 3 à 4 dragées par 24 heures.

L'étui de 25 dragées : 20 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e)
(Tél. : Littré 54-07.)

HYPOSTRONTIUM TORAUDE

Hyposulfite de strontium pur en solution à 20 p. 100
répartie en ampoules de 3 cc.

Intramusculaires.

(Et éventuellement buvables ou intraveineuses.)

Indications. — Dermatoses récidivantes, Intolérances
Intoxications, Anaphylaxies, Lithiases, Ictères, Etats
spasmodiques, Inflammations des muqueuses, Mani-
festations arthritiques.

Avantages. — *Hyposulfène intramusculaire* bien sup-
porté. Très actif (16,2 p. 100 de S neutre, 44 p. 100 de
strontium). Forme commode pour nourrissons et
enfants. (Buvable.) Action antispasmodique que n'a
pas l'hyposulfite de soude. Aucune toxicité.

Dose. — Le contenu d'une ampoule 2 à 4 fois par semaine
en injection intramusculaire (Intraveineuse : 2 à 3 par
semaine. Buvable : une par jour au déjeuner).

Prix : La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L. G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

HYPOSULFÈNE

"Soufre soluble." — "Aliment soufré."

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'Hyposulfite de Na chimiquement pur, stabilisé.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas. (Voir *Hypostrontium*).

Indications. — Dermatoses récidivantes : Eczéma, Strophulus, Prurigo, Prurits, Urticaires, etc. Intolérances alimentaires, Ictère, Acné, Séborrhée, etc. Indications du soufre. Insuffisance hépatique.

Action. — Très grande activité réductrice et sulfurante due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.
La boîte de 60 pilules glutinisées : 15 francs.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.
Pour les intramusculaires, voir *HYPOSTRONTIUM*.
La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Odéon 73-92.)

HYPOTAN

COMPRIMÉS

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive, (Bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromo-choline) associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

Propriétés. — Synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. L'**Hypotan** améliore la circulation périphérique et réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre la musculature lisse.

Indications. — Hypertension, spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'**Acécoline**; hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue, tolérance parfaite.

Prix : 18 francs.

AMPOULES INJECTABLES

Une ampoule de 1 cc. correspond à 2 cgr. de bromure de méthylacétylcholine (synonyme bromure d'acétyl - β - méthylcholine).

Propriétés. — 1° Hypotenseur 200 fois plus puissant à doses égales que l'**Acécoline**.

2° Artério-dilatateur d'effet très prolongé.

3° Excito-sécréteur et excito-moteur de l'appareil digestif.

Effets accessoires. — 1° Chez certains sujets : chute tensionnelle et bouffée vaso-motrice importantes. Abondance des sueurs et des sécrétions digestives. 2° Chez les asthmatiques, effet broncho-constricteur. L'atropine (1/4 ou 1/2 milligramme) inhibe l'action de l'**Hypotan**.

Indications. — Hypertensions rebelles et paroxystiques. Médicament d'urgence dans les coliques de plomb, l'état de mal épileptique, l'éclampsie, les troubles de la ponction lombaire, l'iléus paralytique, les tachycardies paroxystiques.

Contre-indications. — Asthme et ses équivalents.

Posologie. — Dose normale : 2 cgr. par voie sous-cutanée. Tâter la susceptibilité du sujet avec une 1/2 ampoule.

Prix : 20 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr. Chevrematte-90 — Paris.

HYPOTENSEUR VALE

Composition. — Silicate de magnésie, *cratægus oxyacantha*, borotartrate de potasse.

Présentation. — Granulé chocolaté.

Indications. — Artériosclérose, hypertension, vertiges, carence siliceuse et magnésienne.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillère à café matin et soir (au lever et au coucher).

Prix. — 15 francs la boîte de 120 grammes pour un traitement de 15 jours.

Laboratoire F. GUILBERT

Place d'Armes — HESDIN (Pas-de-Calais).

HYPOTENSOL

Spécifique de l'Hypertension essentielle.

L'HYPOTENSOL condense sous la forme la plus réduite et la plus active, les meilleurs agents hypotenseurs qui administrés isolément n'ont qu'une action restreinte et de peu de durée.

Composition. — *Benzoate de Benzyl*, antispasmodique par son action sur les muscles lisses, *Gui*, agissant sur les muscles striés des artères et sur le système vasomoteur, *Ail* antiseptique et vaso-dilatateur, *Scille* diurétique et tonicardiaque éprouvé.

Indications. — L'HYPOTENSOL spécifique de l'Hypertension essentielle ou solitaire, qu'on observe si souvent chez les sujets atteignant ou dépassant la quarantaine, est conseillé également avec succès constants dans les hypertensions diathésiques, affections artérielles ou veineuses sans crainte d'incompatibilité avec les agents médicamenteux nécessités par la diathèse, comme les médications mercurielles ou iodurées.

Posologie. — Dose initiale : X gouttes deux fois par jour dans un peu d'eau matin et soir, augmenter jusqu'à XL gouttes par jour sans dépasser cette dose, concurremment avec tous médicaments et régimes que comporte la diathèse.

Durée du flacon, à XX gouttes par jour ; environ 20 jours.

Prix : 10 francs.

Laboratoire des LICES

38, rue des Lices — ANGERS (M.-et-L.). (Tél. : 32-30.)

HYPO-THIORINE

Hyposulfite de soude pur.

Deux formes :

1° *Comprimés* glutinisés et dragéifiés, dosés à 0 gr. 50 d'hyposulfite Na desséché.

2° *Ampoules* de 10 cc. à 20 % (injection intraveineuse).

Indications :

Médication anti-choc. — Phénomènes anaphylactiques de toutes natures. Intolérance arsenicale, bismuthique ou aurique. Erythrodermies toxiques et médicamenteuses.

Médication antirhumatismale. — Rhumatismes chroniques, déformants et ankylosants.

Arthropathies gonococciques, Erythème noueux.

Médication dermatologique. — Dermatoses séborrhéiques, Séborrhées, Acné-Furoncles, Anthrax, Eczémas, Psoriasis, Prurits divers.

Médication hépato-intestinale. — Insuffisance hépatique. Ictère. Constipation.

Médication respiratoire. — Dans tous les cas où le soufre est indiqué l'hypo-thiorine réalisera sans dangers et sans fatigue pour l'organisme l'apport de soufre nécessaire.

Dose et mode d'emploi :

1° *Comprimés* : avaler sans croquer 2 à 6 comprimés par jour aux repas.

2° *Ampoules* : cas graves — 1 injection intraveineuse chaque jour ou à jour passé, dans l'intervalle 2 à 6 comprimés par jour.

50 Comp. : 13 fr. 50 — 10 Amp. : 27 fr. 50 — 5 Amp. 15 fr. — 1 Amp. : 4 fr.

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Ph¹⁰, 39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

I. A. M.

Iodo-méthyl-Arsinate de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Composé organique, réalisant sous une forme optimale l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopolétique, lymphagogue.

L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux* 1928).

Indications. — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Asthénies, Etats de dépression, Asthme, Convalescences.

Posologie. — *Gouttes* « I. A. M. » (*adultes*), XV à XX gouttes matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (*enfants*), 1 cuillerée matin et soir.

Littérature et échantillons

Docteur LAVOUÉ — RENNES.

ICORASE

Vaso-constricteur et fluidifiant du sang.

Forme. — Gouttes. Durée moyenne 15 jours.

Prix: 19 francs.

Composition. — Capselle, Hamamélis, Piscidia, Marron d'Inde, Citrate de soude.

Indication. — Varices, hémorroïdes, Congestion des organes génitaux internes de la femme. Action quasi-spécifique, dans ce dernier cas, contre l'élément douleur.

Doses. — X à XXV gouttes, trois fois par jour, dans un liquide quelconque.

Prescription. — Icorase : un flacon.

En dépôt chez tous les droguistes.

Préparé par THERINEX

R. CONDY, Pharmacien

6, rue de Dunkerque — PARIS

Enregistré au L. N. C. — Admis aux A. S.

IDONIL

Complexe organique (bioton) extrait du poisson frais,
ne renfermant ni huile, ni graisse, ni protéines.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (lécithines, alcools supérieurs).

Toutes celles des nucléines pures de la totalité du poisson,
Soit : anémies (syphilitique, paludéenne, post-opératoire),
neurasthénie, déficiences organiques, fatigue et sur-
menage physique et intellectuel, lymphatisme, enfants
débiles, arriérés, retardés, rachitiques, etc...

Action. — Intégralement assimilable, si l'intestin n'est pas colmaté. Aucune contre-indication.

Doses moyennes :

Comprimés : 3 à 4 aux repas, au début, puis 4 par jour.

Croquettes chocolatées (enfants) : 1 à 2, au goûter, avec du pain.

Granulé (enfants) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Présentation :

Comprimés, en boîte aluminium (40), une semaine : 20 francs.

Croquettes chocolatées, boîte carton (15), une quinzaine : 17 francs.

Granulé, en boîte carton, une semaine : 11 francs.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

IFRANOL

Composition. — Quinine, arsenic, strychnine, manganèse et toni-cardiaques.

Propriétés. — *Spécifique des pyrexies* par la quinine ; *reconstituant, stimulant et tonique* par la strychnine, l'arsenic et le manganèse ; *anti-infectieux, cardio-tonique.*

Indications. — Maladies infectieuses (**grippe** et angines grippales en particulier), convalescences, états de dépression, etc.

Formes. — *Dragées :* 0 gr. 10 de quinine par dragée.

Granulé : une grande cuillerée-mesure équivaut à 6 petites cuillerées-mesures ou à une dragée.

Ampoules injectables.

Posologie et mode d'emploi :

Grippe aiguë. — *Adultes :* six dragées ou deux ampoules par jour.

Enfants : deux petites cuillerées-mesures par année d'âge.

Convalescence. — *Adultes :* trois dragées par jour, pendant une dizaine de jours au moins.

Enfants : une petite cuillerée-mesure par année d'âge.

Prophylaxie. — Une dragée par jour.

Prix de vente au public :

Le flacon granulé : 22 francs.

Le flacon de 30 dragées : 17 francs.

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

IMIDO « ROCHE »

Composition. — Solution injectable de bichlorhydrate d'Histamine dosée à 1 milligramme par cc.

Propriétés. — Détermine une sécrétion abondante du suc gastrique permettant la réalisation pratique de l'épreuve de l'Histamine; détermine également réactions locales et générales, ainsi qu'une action rapide sur les douleurs.

Indications. — Particulièrement utile pour poser le diagnostic des ulcères et des cancers gastriques.

Utilisé également dans toutes les applications thérapeutiques de l'Histamine: arthrites rhumatismales, dyspnées asthmatiformes, rhume des foins, etc.

Posologie. — Une seule ampoule en injection sous-cutanée (épreuve de l'Histamine). 1/4 à 1/2 ampoule en inj. intradermique ou scarifications.

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-15.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Archives 91-10.)

IMINASTHME

Médication abortive de la crise d'asthme.

Un seul comprimé d'IMINASTHME pris dès l'apparition des signes avant-coureurs de la crise d'asthme, la fait avorter presque à coup sûr sans danger pour le malade.

Composition :

Agaricine	0,005
Théophylline	0,10
Papavérine	0,02
Caféine	0,10

Thérapeutique. — Grâce à la double association Agaricine-Théophylline et Caféine-Papavérine, l'IMINASTHME a une toxicité beaucoup moindre que celle de ses composants, ce qui permet de le laisser aux mains du malade. Il agit rationnellement sur l'équilibre vago-sympathique.

En aucun cas, l'IMINASTHME ne peut être nuisible, ou contrecarrer un traitement général, car :

- 1° Il ne produit aucun effet secondaire ;
- 2° Il ménage la circulation (pas de vaso-constricteurs directs) ;
- 3° Il ne provoque pas d'accoutumance (absence de barbituriques et d'analgésiques).

Posologie. — Dès les premiers symptômes faisant craindre à l'asthmatique une crise (toux, expectoration rare et gluante, etc.), prendre un comprimé d'IMINASTHME avec un peu d'eau.

Si le malade prévoit une crise nocturne, il doit prendre un comprimé, le soir en se couchant, et deux comprimés si les crises se déclarent habituellement à la fin de la nuit.

La boîte de 10 comprimés : 12 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER

ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

IMUMNICORPS MARY LAURENT**Immunothérapie
physico-chimique**

(Complexe Carbono-Iodo-Magnésien.)

Traitement des maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, par voie buccale.

Indications :

Grippes, Angines, Pneumonies, Otites, Rhumatismes, Septicémies, etc., assurent la fixation et la collection du pus : Furunculose, Anthrax.

Dose d'attaque :

50 gouttes 2 fois par jour.

Dose d'entretien :

30 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau. Dépourvus de toute toxicité, pas de contre-indication.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

IMMUNIDERM GRÉMY

Pommade Vaccin.

Pommade vaccinnante réalisant l'association du bouillon vaccin concentré et du Bactériophage.

Bouillon vaccin concentré	9,09
Bactériophage staphylo	2,70
Lanoline, vaseline aa.....	9,09
Sulf. double d'oxyquinoléine de potasse	0,015

Pour un tube de 30 grammes.

Indications :

Furonculose, Anthrax, Sycosis, Prurit, Ulcères variqueux, Plaies et brûlures infectées et toutes Dermatoses.

Posologie :

Appliquer sur la partie infectée une couche de pommade, qu'il sera utile de protéger par une feuille imperméable fixée au moyen de leucoplaste.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires G. GRÉMY
14, rue de Clichy — PARIS.

IMMUNIZOLS

Vaccins

I. Ampoules

Boîtes de 5 ampoules

— de 2 —
— de 1 —

- 10. Furonculose, Ostéomyélite.
- 11. Entérite, Appendicite.
- 13. Asthme, Asthme des foin.
- 15. Eczéma, Psoriasis.
- 16. Bronchites chroniques.
- 17. Rhumatismes.
- 18. Urétrites.
- 19. Acné.
- 22. Typhoïde.

II. Bouillon-Vaccins pour pansements.

- 10. Furonculose et toutes staphylococcies.
- 24. Streptococcies.
- 25. Pneumococcies.
- 26. Colibacilloles.
- 31. Abscess chauds.
- 35. Ulcères variqueux.
- 36. Brûlures infectées.
- 41. Métrites.
- 50. Otites, Rhino-Pharyngites.

Prix : 20 francs.

III. Hibévé-Bouillon-Vaccin.

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir un demi-litre de bouillon-vaccin normal.

Prix : 50 francs.

IV. Comprimés.

Avec pilules adjuvantes de bile.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 10. Furonculose - Ostéomyélite. | 22. Typhoïde. |
| 11. Entérite-Appendicite. | 31. Abscess, plaies infectées. |
| 13. Asthme, Asthme des foin. | 40. Cystites, Pyélonéphrites. |
| 15. Eczéma, Psoriasis. | 41. Métrites. |
| 18. Urétrites. | 70. Pyorrhée alvéolo-dentaire. |

Prix : 20 francs.

14, rue de Clichy

GRÉMY

Microbiens

Injectables.

de 2 cc. : 25 francs.

de 1 — : 8 —

de 2 — : 6 —

23. Grippe.

24. Streptococcies, infections puerpérales.

31. Absès chauds, plaies suppurées.

34. Gangrène.

40. Cystites, Pyélonéphrites.

41. Métrites, Salpingites.

50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.

70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Immuniphages (bactériophages).

N° 10. Toutes staphylococcies.

N° 11. Affections intestinales.

N° 26. Colibacilloses.

N° 31. Infections pyogènes.

Prix : 25 francs.

Ovules à l'Immunizol n° 41

pour pansements gynécologiques.

Prix : 20 francs.

V. Collyre.

(à l'Immunizol Bouillon vaccin).

En pipettes compte-gouttes. Prix : 25 francs.

VI. Immuniperos.

(Vaccins liquides pour vaccination buccale simple ou associée au bactériophage.)

10. Furunculose.

11. Infections intestinales.

15. Dermatoses.

22. Fièvre typhoïde.

Prix : 30 francs et 25 francs.

VII. Immuniderm.

Pommade à l'Antivirus et au Bactériophage

Prix : 12 fr. 50.

— PARIS (IX°).

R. C. Seine 229.088 B.

IMMUNOVACCINS du Dr R. LAUTIER

Vaccins microbiens à puissance antigénique maximum.

Avantages. — Atoxiques, hyperactifs, injectables et ingérables, à concentration microbienne très faible permettant d'éviter toute phase négative ou réaction vaccinale.

Immunovaccin antirhumatismal injectable.

Bacille d'Achalme + entérocoques.

5 séries (I, II, III, IV, V) à doses croissantes et 1 dose d'entretien à 50 millions.

Débuter par la série II pour le rhumatisme articulaire aigu et la chorée.

Débuter par la série I pour le rhumatisme viscéral, subaigu ou chronique.

Indications. — Toutes les formes cliniques de l'infection rhumatismale : Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, myoarticulaire chronique, endocardites, myocardite, péricardite, pleurésie rhumatismale, sciaticques, névrites, névralgies rhumatismales, chorée, thyroïdites, arthritisme, dermatoses streptococciques des arthritiques.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin antirhumatismal pour usage oculistique injectable.

Bacille d'Achalme + entérocoques.

3 séries (I, II, III) à doses croissantes : iritis rhumatismale, choréïdites et uvéïtes rhumatismales.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin antirhumatismal à ingérer.

Bacille d'Achalme + entérocoques.

Ampoules de 5 cc. : une ampoule par jour, 20 jours par mois.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique ne pouvant être traité par la forme injectable de l'Immunovaccin antirhumatismal, Manifestations douloureuses, gastro-intestinales, hépatiques, rénales des arthritiques, hypertension, insuffisance cardiaque, syndrome angineux, liés à l'arthritisme.

Prix de la boîte : 30 francs.

Immunovaccin Bronchopulmonaire ingérable et injectable.

Pneumocoques, Pneumobacilles de Friedländer, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Staphylocoques.

Ampoules de 5 cc. boire 1 ou 2 ampoules par jour.

Injecter 1/4 de cc. chez l'enfant.

Injecter 1/2 cc. chez l'adulte.

Injection tous les jours ou tous les 2 jours en augmentant la dose de 1/4 de cc. à chaque injection.

Doses maxima moyennes : 2 cc.

Utilisation mixte buccale et sous-cutanée en cas d'urgence.

Indications. — Prophylaxie et traitement : Rhumes Coryza, Trachéite, Trachéo-bronchite, Bronchites Pneumonie, Broncho-pneumonie, Congestions pulmonaires actives, Grippe et ses complications, Bronchite chronique, Emphysème, Asthme.

Prix de la boîte : 15 francs.

Immunovaccin antipyorrhélique Siva.

Pneumocoques, Pneumobacilles de Friedländer, Streptocoques, Micrococcus catarrhalis, Staphylocoques

Indications. — Prophylaxie et traitement : Gingivites, Stomatites, Stomatorrhagies, Pyorrhée alvéolo-dentaire.

1^o *Forme non injectable* (Dentifrice).

Immunise les gencives par simple contact.

Prix de la boîte : 15 francs.

2^o *Forme injectable.* Ampoules de 1 cc.

La boîte de 5 ampoules : 20 francs.

Ferments immunolactiques.

500 millions de Ferments lactiques par cc.

Ampoules de 5 cc. Bactériothérapie lactique active (1 ou 2 ampoules par jour) des fermentations putrides intestinales, colibacillose, diarrhées infantiles et dermatoses

Prix de la boîte : 15 francs.

Laboratoire des IMMUNOVACCINS

8, avenue des Sources — NICE.

IMPÉTIGOL

Présentation. — Pommade en tube. Poids brut : 60 gr. environ.

Composition. — I complexe minéral : Iode-Cuivre associé à I complexe phytothérapique : Calendula — Hypericum — Thymus.

Composition en grammes p. 100 :

Protoiodure de cuivre.....	5 gr.
Huile de millepertuis	12 gr.
Teinture mère de souci	4 gr.
Huile essentielle de thym.....	4 gr.
Lanoline.....	40 gr.
Vaseline.....	35 gr.

Indications :

Dermatologie :

Impétigo, Intertrigos, Dermatoses croûteuses et squameuses, Dermatoses à forme circinée, à forme nummulaire, Eczéma rétro-auriculaire. Sporotrichoses, Tricophytoses, Folliculites staphylococciques, Acné pustuleuse, Ecthyma, Suppurations récentes ou anciennes, Ulcères, variqueux non eczématisés, Plaies infectées rebelles.

Gynécologie. — Ulcérations du col de la métrite cervicale.

Mode d'emploi. — En applications, ou en frictions suivies d'applications.

Prix au public : Le tube : 10 francs.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 1501-2.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoires J. A. FFRET : NÉOBIOL-IMPÉTIGOL

Vanves, près PARIS

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-Interne des Hôpitaux

Correspondance et Bureaux : 181, av. Victor-Hugo, CLAMART (Seine).

Tél. : Michelet 04-71.

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Association d'extraits opothérapiques et végétaux.

Composition.

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune simple associés aux sucres glandulaires de : Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les troubles de la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 16 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).
(Tél. : Dorian 47-00.)

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

Composition. — Principes actifs d'Hamamélis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale, Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonique vasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 13 francs.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.)

INDOBERBÉRINE

Comprimés :

Médication polyvalente phyto-opothérapique destinée au traitement chez les individus des 2 sexes des troubles de la circulation veineuse.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Extrait de glandes génésiques	0,01
Extrait d'ovaires	0,004
Surrénine.....	0,004
Hypophysine.....	0,0025
Extrait sec de marron d'Inde	0,05
Extrait sec de Berbéris.....	0,045
Extrait sec de Viburnum	0,03
Extrait sec de Cupressus	0,02
Extrait sec d'Hamamelis	0,03

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Cellulite, Troubles de la Ménopause et de la Puberté, Œdème post-phlébitique.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour pris 1 heure avant les principaux repas.

3 semaines de traitement : 1 semaine de repos.

Interrompre de préférence pendant la période menstruelle.

Prix au public : 15 francs.

Laboratoire TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS. (Tél. : Ségur 08-13.)

INFANGYL CARLIER

Composition :

Thiocol, antipyrine, tolu.....	āā	0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier-cerise	āā	0 gr. 04
Teinture de Drosera		0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.		

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

Propriétés. — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

Posologie. — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Prix : 12 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-2.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

INFRA-ROUGES

- 1° Plaies et ulcérations atones, infections cutanées et sous-cutanées.
- 2° Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires).
- 3° Rhumatismes chroniques, arthralgies et myalgies.
- 4° Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérites, séquelles douloureuses post-opératoires, affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux.
- 5° Névralgies et névrites.

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

INHALANTYL

Définition. — *Inhalantyl* se présente sous forme de comprimés prompts à se désagréger, à base d'essences balsamiques extraites de zestes de fruits. Il ne contient ni alcool, ni menthol.

Originalités. — Sa nouveauté et sa raison d'être sont de deux ordres :

1° Nous avons fait appel à un groupe d'essences puissamment antiseptiques, utilisées pour la première fois d'une façon systématique pour la désinfection des voies aériennes supérieures, nous voulons dire les *essences de zestes d'agrumes*, dont les travaux poursuivis dans divers laboratoires de la Faculté de pharmacie de Lyon et des thèses soutenues depuis lors ont montré l'action remarquable contre les microbes habituels des voies aériennes supérieures : méningocoque, streptocoque, staphylocoque, Læffler, etc. Des stations expérimentales italiennes, installées pour la plupart en Calabre, ont apporté mêmes résultats probants (notre laboratoire avait déjà mis ces essences sur le plan supérieur qu'elles méritent en les utilisant pour l'huile balsamique qu'il a dénommée *Balsamorhinol* et qui a fait ses preuves).

2° Pour garder les essences pures dans les comprimés, nous utilisons un excipient-support *inerte* dont les mailles ou trabécules maintiennent les essences prisonnières à l'état de fines gouttelettes. Le comprimé jeté dans l'eau chaude se dissocie immédiatement : les essences subtiles sont libérées et happées par les voies respiratoires avec la vapeur d'eau ; le support devenu inutile se dépose au fond du bol. Ainsi sont maintenues en captivité, sans altération, des particules aussi subtiles et évanescentes que celles des essences pour être libérées au moment opportun.

Action. — Les essences balsamiques utilisées agissent de manière élective contre les agents microbiens des fosses nasales, du rhino-pharynx, du larynx, de la trachée et des bronches. Elles se dégagent d'emblée (et continûment durant cinq à six minutes), gagnent avec la vapeur d'eau chaude l'ensemble des cavités aériennes et de leurs annexes (sinus, trompe d'Eustache) jusqu'aux alvéoles pulmonaires, décongestionnant et aseptisant toutes les muqueuses de l'arbre respiratoire.

Indications. — *Toutes les affections inflammatoires, banales ou grippales*, parties du nez et du rhino-pharynx et tombant sur la gorge ou les bronches ; toutes celles aussi qui touchent d'emblée le larynx et les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire *coryzas, sinusites, rhino-pharyngites, pharyngites, angines, — laryngites, enrrouement, aphonie, toux, — trachéites, bronchites, affections grippales avec ou sans complications.*

Mode d'emploi. — Trois inhalations par jour en moyenne (matin, midi et soir), de cinq minutes chacune, préparées en faisant dissoudre dans un bol d'eau bouillante, ou dans un inhalateur, 1 à 2 comprimés. Respirer les vapeurs alternativement par le nez et par la bouche.

Nota. — Le dépôt qui, après inhalation, reste au fond du bol est sans valeur. Il est constitué par l'excipient qui servait de support aux essences balsamiques.

Prix : boîte de deux tubes de comprimés, 13 francs.

Laboratoire FIDES, R. VOUZELLAUD, docteur en pharmacie,
14, rue de la Comète — PARIS (VII^e). — Tél. : Invalides 64-13.

INHALATION-GARGARISME

« VOCALDOP »

Composition. — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une *inhalation* et un *gargarisme*.
 1 cuillerée à café de + H²O chaude = Respiration nasale
 Poudre et gargarisme
Vocaldop. Bain buccal.

L'Inhalation-Gargarisme *Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs thyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (*Thèse de Doctorat 1924.*)

Prix : 8 fr. 95.

LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).
 (Tél. : Nord 34-71.)

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Présentation. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-Indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante ; deux à trois inhalations par jour.

Prix : 12 francs.

LANCOSME, 71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
 (Tél. : Élysées 17-46.)

INHALO BOL

Cornet pour inhalations

(en papier parcheminé).

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 6 francs.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALOPHÉDRINE

Pour inhalation.

Composition :

Ephédrine	0,10
Menthol.....	0,20
Goménol.....	1,00
Essence de pin sylvestre.....	1,00
Essence de Thym	1,00
Eucalyptol	1,00
Teinture d'Eucalyptus	20,00
Teinture de benjoin	20,00
Eau de laurier-cerise	5,00
Elhanol à 90°	Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Asthme, Bronchite, coryza, grippe, laryngite, Toux spasmodique, Sinusite.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations 2 à 3 fois par jour.

Prix. Le flacon : 14 francs.

R. DUNESME, Pharmacien,

4 et 6, Rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

Tél. : NOR. 68-53.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles (pin, niaouli, eucalyptus).

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 6 fr. 50.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol

■ 32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, docteur en pharmacie.

INHALO-THIORINE

Hydrogène sulfuré naissant.

Forme. — Comprimés pour inhalations (hydrogène sulfuré à l'état naissant, essence de Niaouli et Terpinol).

Propriétés. — L'INHALO-THIORINE permet de réaliser à domicile la cure sulfureuse externe par inhalation d'Hydrogène sulfuré à l'état naissant.

Dans les affections des voies respiratoires, c'est le complément de la cure interne de Sulfo-Thiorine.

Indications. — Rhinites, Sinusites, Pharyngites, Trachéites, Enrouements, Laryngites chroniques, Catarrhes, Bronchites.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante pour inhalation de 4 à 5 minutes.
2 à 3 inhalations par jour.

30 comprimés. Prix : 13 fr. 75.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 820-04.)

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : 9 fr. 75 et 12 francs.

Laboratoires G. WARIN

4, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

INHALYPTOL

(Inhalation sans alcool).

Eucalyptol rectifié	42	grammes.
Essence de pin naturelle	31	—
Terpènes de Menthe	10	—
Pinènes.....	4	—
Benjoin de Siam.....	12	—
Cédrènes, Anéthol, Menthol, Acétate linalyle, Sesquiterpènes. Q. S. P.	100	—

Indications. — Toutes affections respiratoires, Antisepsie pulmonaire, Désinfectant, Fluidifiant, Expectorant.

Ne contient ni alcool, ni éphédrine, aucune intolérance, action progressive, Inhalations, Evaporations, Fumigations.

Posologie. — V à X gouttes dans un bol d'eau chaude 3 à 4 fois par jour.

Prix : 12 francs le flacon stillgoutte, traitement environ 1 mois.

Laboratoire de l'INHALYPTOL

4, rue Raymond-Poincaré — NANCY.

INNERCLEAN

Composition. — Algue de Java, Thé de santé, Herbes aromatiques en plantes coupées menues.

Indications ou Propriétés. — Espèces laxatives aromatiques pour le traitement spécial de la constipation.

Posologie et mode d'emploi. — Un tiers de cuillerée à café. Augmenter graduellement cette dose si nécessaire.

Pour le prendre, la meilleure façon est de le déposer sur la langue et de l'avaler à l'aide d'un peu d'eau fraîche.

Pour les Enfants et les Bébés, commencer par une très petite quantité en tenant compte de leur âge.

Prix en France : 15 francs.

Dépôt général pour la France :

« EVANS DRUG STORE »

J. M. RIOARDOU, Docteur en Pharmacie
46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

INOCRININES

Extraits non glycerinés de glandes fraîches en ampoules buvables non injectables.

Toute la gamme endocrinienne.

Formules simples :

1 Thyroïdine	0 gr. 025	5 Hypophysine tot..	0 gr. 10
2 Ovarine	0 gr. 10	6 Surrénine	0 gr. 10
3 Orchitine.....	0 gr. 10	7 Thymusine	0 gr. 50
4 Hypophysine ant...	0 gr. 10		

Formules associées :

8 Thyroïdine	0 gr. 025	13 Thyroïdine.....	0 gr. 025
Hypophysine ant..	0 gr. 10	Hypophysine ant...	0 gr. 10
9 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine	0 gr. 10	14 Thyroïdine.....	0 gr. 025
10 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Hypophysine ant...	0 gr. 10
Orchitine.....	0 gr. 10	Ovarine	0 gr. 10
11 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Surrénine	0 gr. 10
Surrénine	0 gr. 10	15 Thyroïdine.....	0 gr. 025
12 Thyroïdine	0 gr. 025	Hypophysine ant ..	0 gr. 10
Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine	0 gr. 10	Surrénine	0 gr. 10

Formuler : ampoules buvables d'Inocrinines, formule n° 00, 1 boîte.

Doses et mode d'emploi. — Selon l'avis du médecin.

La boîte de 10 ampoules : 25 francs

Laboratoires des INOCRININES

4, route du Médoc — BORDEAUX-BOUSCAT (Gironde).

INOGYL

Complexé d'extrait placentaire et d'extrait androïque désalbuminé et délipidé.

Indications. — Tous les troubles liés à une insuffisance ovarienne partielle ou totale : Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménopause, Castration.

Action. — Réapparition et régularisation des règles, diminution de la douleur, sédation des troubles ménopausiques secondaires.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, selon l'intensité des troubles ou 5 à 10 dragées en plusieurs prises. A prendre à jeun ou très loin des repas.

Présentation. — La boîte de 10 ampoules buvables de 5 cc. : 18 francs.

L'étui de 40 dragées : 12 frs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées):

INOLAXINE

Granulé mucilagineux végétal, naturel, pur, sans adjonction d'aucun produit laxatif chimique.

Propriétés. — L'*Inolaxine* absorbe 40 fois son volume d'eau. Elle augmente le bol intestinal et lui donne une consistance moelleuse. Elle favorise les mouvements péristaltiques et facilite l'acheminement des matières fécales. Elle agit mécaniquement et ne détermine pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, atonie intestinale.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas. Mettre à sec sur la langue, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

Présentation. — En boîte petit modèle à 12 francs. Boîte grand modèle (contenance quadruple), 39 francs.

Échantillons:

Laboratoires du Dr DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS.

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées):

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar désodorisé.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines. abcès. Soins de la gorge et du nez. Gynécologie. Ulcérations du col. Pansements des plaies.

Mode d'emploi.

Lavages : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Badigeonnages : pur ou au demi.

Inhalations.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

Prix : le flacon, 16 fr. 50.

SPÉCIALITÉS INOLÈNE

Inolène simple : Soins des muqueuses et des plaies. (Voir ci-dessus.)

Inolène vaseline (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

Inolène thymolé : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau).

Inolène ovules : Gynécologie.

Inolène pommade et Inolène poudre : Dermatologie. Prurits. Plaies.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien.

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

INORÉNOL

Extrait désalbuminé et délipidé de rein.

Indications. — Albuminurie, Urémie, Uricémie, Arthritisme, Néphrites aiguës ou chroniques, Rhumatismes.

Résultats. — Augmentation de la diurèse et de l'élimination des chlorures, de l'acide urique et de l'urée ; abaissement de la concentration de l'albumine urinaire.

Posologie. — 1 à 2 ampoules buvables et injectables par jour, ou 2 à 6 dragées à jeun ou loin des repas, pendant des cures de 12 jours, alternées avec des périodes de repos de 10 jours.

Présentation :

La boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. : 28 francs.

La boîte de 10 ampoules injectables de 2 cc. : 25 fr.

L'étui de 40 dragées : 14 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INOSEPTA

Pommade à base de bouillon-vaccin de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques.

Traitement des pyodermites, furoncles, acné, impétigo, toutes lésions cutanées infectées.

Le tube : 14 francs.

Le 1/2 tube : 8 francs.

FILTRAT INOSEPTA

Présentation en ampoules du même bouillon filtré, pour pansements locaux.

La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 22 francs.

INOSEPTA AURICULAIRE

Filtrat des mêmes cultures, obtenu en partant de souches prélevées exclusivement sur des infections auriculaires.

Furunculose du conduit auditif, otite, mastoïdite, etc.

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 18 francs.

INOSEPTA OPHTALMIQUE

Pommade à base de filtrat de cultures de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques, bacilles de Morax, pneumocoques de Fraenkel.

Traitement des blépharites, conjonctivites, orgelets, dacryocystites, toutes les infections oculaires.

Le tube avec embout : 10 francs.

INOSEPTA PUERPÉRAL

Filtrat de cultures de streptocoque puerpéral pour traitement préventif et curatif des fièvres puerpérales. En tamponnement ou injections vaginales.

La boîte de 6 ampoules de 20 cc. : 35 francs.

INSÉVA

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Échantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INOTYOL

Pommade adoucissante, réductrice et cicatrisante. Traitement de toutes les affections cutanées ou irritations de la peau : eczémas, ulcères, prurits, érythèmes, rougeurs des nouveau-nés.

POUDRE INOTYOL

Toilette des bébés, préventions des rougeurs.

Présentation :

Pommade INOTYOL : le 1/2 tube : 5 fr. 50.

— — — Le tube : 9 fr. 50.

— — — Le quadruple tube :
25 francs.

Poudre INOTYOL. La boîte poudreuse :
5 fr. 50.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INSTITUT PASTEUR

SÉRUMS :

Antidiphtérique, antitétanique, antistreptococcique, antiméningococcique, antidysentérique, anticharbonneux, antipneumococcique, antipesteux, antigangreneux.

Sérums desséchés :

Antidiphtérique, antitétanique.

Sérums purifiés et concentrés :

Antidiphtérique, antitétanique.

Sérums antivenimeux :

E. vipères d'Europe ; A. N. serpents africains ; A. O. serpents Afrique occidentale et équatoriale ; C. serpents Inde et Egypte.

VACCINS :

Antidiphtérique, antitétanique, antipesteux, anticholérique, antityphoïdique et antipara (T. A. B.), antigonococcique, antistaphylococcique (furonculose), antistaphylococcique (ostéomyélite), antipyogène, antipneumonique, antiméningococcique, B. C. G., B. C. G. = S. C.

Extrait d'antigène tuberculeux méthylique. Tuberculine.

Les sérums et vaccins ne sont délivrés qu'aux Droguistes et aux Pharmaciens.

C'est à ces derniers que doivent s'adresser exclusivement les Médecins et le Public.

Institut PASTEUR

22, rue Dutot — PARIS.

INSULANOL

Pommade à l'Insulyl.

Mode d'action. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;
2° Prurits de toute nature ;
3° Hémorroïdes ;
4° Brûlures.

Mode d'emploi. — En onctions sur les parties malades.

Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Prix : 15 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Voir **POUDRE ET POMMADE**

D'INSULINE PHYLOZE

Laboratoire

de l'Endopancrine

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

INSULINE BUCCALE FORNET

Principe actif :

Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Présentation :

Concentration III (Pilules rouges : 4 unités par pilule).

Concentration I (Pilules vertes : 1 unité par pilule).

Posologie :

3 pilules 3 fois par jour, strictement une 1/2 heure avant les repas.

Indications :

Tous les cas justiciables de l'Insuline (cas graves exceptés). (Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoercibles, acétoniques, cardiopathies, etc.)

L'Insuline Fornet est utilisée sous ses deux formes (pilules et pommade) dans tous les hôpitaux de Paris.

Observations :

Avoir toujours recours à la concentration forte au début du traitement.

Prix : 49 francs et 25 francs.

Vente et Échantillonnage :

Laboratoire de MICROBIOLOGIE

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

INSULINE CHOAY

Nature. — Hormone hypoglycémiante extraite des flots endocriniens du pancréas.

Indications:

Diabète grave. Complications du diabète même léger.

Acidose diabétique ou non diabétique.

Cures d'engraissement.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires, sous-cutanées, parfois intraveineuses (coma).

Posologie. — Très variable suivant l'indication.

Cas d'un diabète moyen : 20 à 40 unités par jour, en deux fois, avant les repas.

Formes pharmaceutiques :

Solution faible : amp. de 1 cc = 10 unités intern.

Solution normale : amp. de 1 cc = 20 unités intern.

— flac. de 5 cc = 100 unités intern.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°).

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.

INSULINE « LEO »

Décret n° 65 du 8 juillet 1931.

Indications. — Diabète, cures d'engraissement.

Forme. — Ampoules de 5 cc. contenant 100 u. i.

(1 cc. — 20 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 200 u. i.

(1 cc. — 40 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 400 u. i.

(1 cc. — 80 u. i.)

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, suivant l'indication du médecin.

L'Insuline « Léo » ne contient aucun antiseptique, sa stérilité est absolue, les injections en sont indolores, son activité est constante grâce à sa teneur régulière en u. i., et elle conserve toute son efficacité pendant deux ans.

Seront mises en vente prochainement :

Boîtes d'ampoules de faible concentration
et

INSULINE RETARD « LÉO »

Insuline à effet retardé.

LA SERINGUE SPÉCIALE « LÉO »

grâce à ses deux graduations permet de mesurer la dose exacte d'insuline directement en unités.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
Dépositaire et Pharmacien Garant pour la
France

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

INSULINE « NOVO »

Décret d'autorisation n° 75 du 4 août 1933.

Indications. — Diabète, Cures d'engraissement.

Forme. — Ampoules de 5 cc. contenant 100 U. I. (soit 20 U. I. pour 1 cc.). Prix : 15 fr.

Ampoules de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 28 fr.

Ampoules de 5 cc. contenant 400 U. I. (soit 80 U. I. pour 1 cc.). Prix : 55 fr.

Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :

10 flacons, chacun de 100 U. I. Prix : 70 fr.

10 flacons, chacun de 200 U. I. Prix : 135 fr.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

L'Insuline NOVO est recommandée pour sa grande pureté et son action constante. Elle ne provoque ni irritations, ni intoxications; elle est de plus d'une conservation parfaite, sans adjonction d'aucun antiseptique.

Laboratoires du Docteur H. MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

INSULYL

Insuline française.

Produit de la sécrétion interne du pancréas.

Action. — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — 1° Diabète et ses complications; 2° Athrepsie des nourrissons; 3° Acidose; 4° Cure d'engraissement.

Formes. — 1° Boîte de 10 ampoules de 1 cc. environ, chacune renfermant 20 unités; 2° Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 unités par ampoule; 3° Tube de 5 cc., chaque centicube contenant 20 unités; 4° Tube de 5 cc., chaque centicube contenant 40 unités.

Doses. — En moyenne une ampoule en injection intramusculaire avant chaque repas.

Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Prix :

La boîte d'ampoules à 200 unités.....	28 francs.
Le tube de 5 cc. (20 unités par cc.).....	15 —
— (40 unités par cc.).....	28 —

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

INTESTARSOL

Réalise une antiseptie parfaite.

Composition :

Acide Oxyacétylaminophényl arsinique	0,50
Charbon animal spécial	10
Charbon de peuplier	10
Magnésie anglaise	5

Excipient aromatisé... Q. S. P. 100 grammes.

Indications. — Diarrhées, colites et entéro-colites, gastro-entérites, entérites tuberculeuses, fermentations, flatulences, toutes intoxications et colibacilloses.

Posologie. — 2 à 6 cuillères à café par jour suivant le cas, délayées dans un peu d'eau et de préférence assez loin des repas.

Présentation et Prix. — 16 francs la boîte de 120 grammes de granulé fondant.

Admis par les Assurances sociales.

Laboratoires H. CALAS

162, rue de l'Hay — GENTILLY (Seine).

(Tél. : Alésia 19-02.)

INTESTO

(Granulés)

Présentation. — En tube métal.

Principes actifs. — Charbon végétal pulvérisé, Kaolin, Sous-nitrate de bismuth, Bicarbonate de soude.

Indications. — Entérites, Colites, Stases intestinales et tous états toxi-infectieux d'origine intestinale, Diarrhées des adultes et des nourrissons, Fermentations intestinales, Météorisme ou ballonnement et gaz.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à potage une demi-heure avant les repas ou le matin à jeun.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.

Peut être croqué ou délayé dans l'eau.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

INTRAIT DE DIGITALE DAUSSE

Préparation de Digitale conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche. (Stabilisation par le procédé Perrot et Goris.)

Toni-cardiaque à zone maniable très étendue.

Formes. — Solution d'Intrait de Digitale à prendre par gouttes; correspondant comme posologie à la solution officinale de digitaline à 1 p. 1 000.

Ampoules d'Intrait pour injections hypodermiques ou intraveineuses. Chaque ampoule contient 2 cc. de solution et chaque centimètre cube correspond à 25 milligrammes d'Intrait de Digitale.

Granules d'Intrait de Digitale à 0 gr. 01, colorés en rose.

Posologie. — *Dose d'entretien cardio-tonique:* Granules à 1 centg. : 1 ou 2 par jour. — Solution d'Intrait : V à VII gouttes par jour en moyenne. Pendant une quinzaine.

Doses sédatives: Granules à 1 centg. : 3 à 5 par jour. — Solution d'Intrait : XV à XX gouttes par jour, pendant 3 à 4 jours avec intervalle de 10 à 12 jours.

Ampoules: 1/2 ou 1 ampoule.

Dose antiasystolique:

Solution d'Intrait : L à LV gouttes par jour en une seule dose.

Ampoules: 2 ampoules en une seule fois par voie hypodermique.

Une ampoule par voie intraveineuse.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE GUI DAUSSE

Préparation hypotensive conservant intacts tous les principes actifs de la plante fraîche (stabilisation par le procédé Perrot-Goris).

Vaso dilatateur artériel et veineux.

Forme. — Solution d'intrait de Gui dosée à 0,10 d'intrait par cuillerée à café. Pilules dosées à 0 gr. 10 par pilule.

Indications. — Hypertension artérielle, artériosclérose, artérites oblitérantes.

Posologie. — Solution d'intrait : 2 à 3 cuillerées à café par jour, au maximum 5 cuillerées à café dans les 24 heures.

Pilules : trois à cinq par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *Varices*, *Phlébites*.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — *Usage interne* : *Solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*. V gouttes matin et soir.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*.) Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — *SOLUTION D'INTRAIT* : *Dose d'entretien cardio-tonique* : V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antisystolique. — XX à XXX gouttes en une fois.

AMPOULES D'INTRAIT. — Exclusivement par *voie intramusculaire* : 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

**Antispasmodique
sédatif du système nerveux.**

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Valériane* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE PASSIFLORE COMPOSÉ

Préparation d'intrait de Passiflore associé à l'intrait de Valériane, à l'Aubépine et au Gelsemium Dausse titré physiologiquement.

Propriétés. — Calmant de l'excitation cérébrale. Antispasmodique, Modérateur de l'éréthisme cardiaque, Sédatif nervin.

Indications. — Affections spasmodiques ; palpitations cardiaques réflexes ; états anxieux ; insomnie d'origine nerveuse.

Posologie et mode d'emploi. — Régulateur du système nerveux, 1 à 2 cuillerées à café avant chacun des 2 principaux repas.

Calmant des insomnies nerveuses :

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE SAUGE DAUSSE

Préparation de Sauge conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche.

Formes. — Solution d'Intrait de Sauge.

Posologie. — Comme tonique des voies digestives, une cuillerée à café après chacun des deux principaux repas.

Comme anhydrotique : une cuillerée à café le soir au coucher pour débiter ; augmenter si nécessaire, les jours suivants, jusqu'à trois ou quatre cuillerées à café ; maintenir la dose pendant deux ou trois jours, mais cesser ensuite afin d'éviter l'accoutumance.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRA-REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicylique injectable par voie intraveineuse.

Indications. — Toutes les indications de la médication salicylée : Rhumatisme articulaire aigu, particulièrement les formes graves ou à localisations viscérales, Névralgies et leurs séquelles, Sclérose en plaques, Parkinsonisme.

Avantages. — Action rapide et sûre. Aucune réaction soit locale, soit générale. Aucun des inconvénients du salicylate de soude par voie buccale (troubles gastriques, acidose) ou par voie intraveineuse (sclérose, etc...).

Aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. ; 22 francs.

Prix spéciaux pour propharmaciens, cabinets médicaux, Hôpitaux et Cliniques.

Échantillons sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER

RETHEL (Ardennes).

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 cgr. d'iode par cc.

■ Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes, sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme.

— **Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires.**

— **Rachitisme. — Goitre. — Fibrome. —**

Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 16 fr.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue de la Fraternité — St-MANDÉ (Seine).

(Tél. : Daumesnil 10-38.)

IODAMELIS LOGEAI

Formule :

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'iodo-iodure de potassium (forme la plus active de l'iode thérapeutique) et d'hamamélidine (extrait glycéринé total d'hamamelis, sans alcool).

La combinaison de ce tannoglucoside et du lugol donne naissance à un iodotanin complexe dont le dédoublement lent et progressif permet l'utilisation totale de l'iode ingéré.

Propriétés :

Modificateur circulatoire total. — Par son hamamélidine, chez les hypertendus veineux, cyanotiques, variqueux ;

Par son iodo-iodure de potassium, chez les artérioscléreux, uricémiques, hypervisqueux ;

Décongestionnant, vaso-dilatateur et hypotenseur, diminuant la viscosité sanguine et améliorant la circulation périphérique et en retour.

Modificateur de la nutrition générale. — Par accélération des combustions cellulaires, exagération des réactions phagocytaires, stimulation du tissu lymphoïde, augmentation de la diurèse.

Indications :

Maladies de la circulation artério-veineuse : Artériosclérose, hypertension, pléthore des hypervisqueux, cyanose, jambes en poteau, varices, hémorroïdes, etc..

Maladies de la nutrition : Lymphatisme, scrofule, adénopathies, obésité, maladie de Basedow, rhumatisme chronique, goutte chronique, asthme, emphysème, bronchite chronique, etc...

Maladies gynécologiques : Troubles de la puberté et de la ménopause, métrites chroniques, etc...

Posologie :

L gouttes	{	0,03 Iode.
d'Iodamelis =		0,20 Iodure de Potassium.
		0,20 Hamamelidine.

Doses :

De XX à L gouttes par jour aux deux principaux repas, dans un peu d'eau (Vichy, de préférence).

Tolérance parfaite, pas d'iodisme.

Prix : Un flacon (1 mois de traitement) : 18 francs.

IODAMÉLIS comprimés : Comprimés glutinisés et enrobés, contenant chacun 10 centigrammes d'iodotanin de l'IODAMELIS. 2 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires Jacques LOGEAI

71, av. de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

(Voir OPO-IODAMELIS).

IODAMOL MICHEL

Composition :

Combinaison d'iode et de glucose titrée de telle façon que V gouttes représentent 1 cgr. d'iode métallique chimiquement pur entièrement combiné au glucose. XX gouttes correspondent à 1 gr. d'alcalin.

Indications :

Tuberculose infantile, lymphatisme, végétations adénoïdes, poussées ganglionnaires, adénopathies trachéo-bronchiques, sclérose artérielle ou veineuse, maladies du cœur et des vaisseaux, arythmies, néphrites chroniques, varices, syphilis acquise ou héréditaire, mycoses cutanées.

Présentation et prix :

Le flacon : 12 francs.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : X à XL gouttes par jour.

Enfants : V à XV gouttes par jour.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 38-31.)

IODARGOL

Formes. — Flacons de 45 cc., ampoules, suppositoires.

Composition. — Suspension huileuse d'Iode colloïdal électrochimique, différant de l'Iodéol par sa concentration en iode (12 gr. 50 p. 100) et par la grosseur de ses micelles.

Propriétés. — Antiseptique sans toxicité ni causticité, il n'exerce aucune action traumatisante sur les tissus. Grâce à son extrême diffusibilité, il pénètre rapidement dans les cryptes des muqueuses et les anfractuosités des plaies. Il ne coagule pas les albumines. Ne tache pas la peau.

Indications. — *Flacons* de 45 cc. : Dans les pansements des plaies de toute nature, les brûlures, etc., en pansements vaginaux, en badigeonnages dans les orchio-épididymites, en instillations dans les otites, otorrhées, rhinites, antiseptie des voies génitales, au moment de l'accouchement.

Ampoules : Ne doivent pas être utilisées en injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Y recourir dans :

Urétrites : traitement abortif et curatif, par injections intra-urétrales à l'aide de notre seringue spécialement construite, dite « Seringue DELTA », y associer l'IODÉOPIRINE : 6 comprimés par jour.

Cystites, folliculites.

Métrites : en instillations intra-utérines.

Pyélites : en lavages du bassin.

Suppositoires : Chaque suppositoire contient 0,20 d'Iodargol.

Dans les blennorragies compliquées de prostatites, dans la prostatite idiopathique : 1 suppositoire le soir pendant une dizaine de jours. Donner en outre comme antiseptique urinaire :

6 comprimés par jour d'IODÉOPIRINE.

Présentation :

Flacon de 45 cc. Prix : 15 francs.

Boîtes de 6 ampoules. Prix : 12 francs.

Boîtes de 10 suppositoires. Prix : 12 francs.

Seringue Delta. Prix : 7 francs.

Échantillons et littérature sur demande :

Laboratoire E. VIEL, 37, avenue de l'Opéra.

Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.

Usine à RENNES, 11 et 12, boulevard de Chézy.

Tél. : 20-61.

**IODARSENIC GUIRAUD
OU
GOUTTES PAIDOPHILES**

du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme, Rachitisme, Scrofuleuse, Emphyseme, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans Il à X gouttes par jour.

— 2 ans à 8 ans IV à XX —

— 8 ans à 15 ans IV à XXX —

Adultes : X à XL

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 35 gr.

Prix : 14 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Marcadet 37-98.)

IODARSINE JICEM

Toutes les indications de l'Iode et des Iodures sans leurs inconvénients.
Puissant stimulant glandulaire et cellulaire.

Régénérateur des organes de défense et du système lymphatique.

Saveur agréable, Tolérance parfaite, Assimilation complète, Effets constants.

Une seule forme : élixir. Prix : 15 fr.

Composition. — Combinaison stable d'Iode organique assimilable + extrait spécial dont l'action synergique en augmente les effets.

Une cuillerée à café contient 0,04 d'iode pur et 0,50 d'extrait spécial phosphaté.

Indications. — Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Rachitisme, Adénite, Goitre, Rhumatisme, Goutte, Obésité, Grippe et maladies infectieuses, Troubles de la formation et de la ménopause, Artériosclérose, Sénilité, etc...

Posologie :

Adultes: 1 cuillerée à café matin et soir.

Enfants: 1 cuillerée à café le matin, pure, dans de l'eau ou du lait.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées par le médecin, suivant les cas et les résultats à obtenir.

Laboratoires ICCEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 14-89.)

IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode directement assimilable par voie digestive sans dommage pour l'estomac.

Formule. — Iode 3 — INa, IK, BrNa, chimiquement purs, à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

Champ d'action. — 1° *Affections cardio-vasculaires, aortites, douleurs angineuses, hypertension chronique, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.*

2° *Goitre exophtalmique, arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, obésité, maladies de la ménopause, etc.*

3° *Lymphatisme, adénopathies, scrofule, etc.*

4° *Bronchites chroniques, asthme, emphyseme, etc.*

5° *Maladies spécifiques, héréditaires et acquises, infections, mycoses, etc.*

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre-indication commune à toutes les préparations iodées : l'œdème du poumon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la *goutte*, de l'*obésité*, du *rhumatisme chronique*. Dans le *lymphatisme*, les affections chroniques des voies respiratoires, dans les vieilles affections syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est *antisclérosante, antiseptique et résolutive*.

Dose. — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge.

Prix : 18 fr. le flacon.

Produits SANOVA

Lab. TACHOT, 103, rue St-Lazare — PARIS (IX^e). (Tél. : Tr. 04-49.)

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 p. 100 d'iode soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Propriétés thérapeutiques. — Dérivées de la nature de ses composants ; iode et antiseptiques (Formol de l'Héxaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzolés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie). Adénopathies, Paludisme, Spirillose, Puissant tonique du cœur.

Prép. pharm. Posologie. — Ampoules : A. 2 cc., B. 5 cc., C., 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives.

Tuberculose (doses faibles) : 2 à 5 cc.

Rhumatismes chroniques (doses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. pro die

Gouttes : XXX à C par jour (enfants : XX à L).

Prix : Ampoules A. 2 cc. 18 francs — Ampoules B. 5 cc. 24 francs.

— — C. 10 cc. 36 francs — Gouttes, le flacon, 16 francs.

Iodaseptine salicylée.

Dans les rhumatismes aigus ou subaigus en injections intraveineuses ou intramusculaires joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Tolérance parfaite. Supplée le traitement salicylé à haute dose qui ne peut être continué longtemps.

Ampoules de 5 cc. et de 10 cc. — Solution gouttes.

Doses. — Une ampoule matin et soir en injection intraveineuse, ou intramusculaire.

En ingestion : 50 à 100 gouttes par 24 heures en deux fois.

Prix : Ampoules 5 cc. 26 francs.

— Ampoules 10 cc. Boite de 4 et 10 ampoules. 16 et 38 francs

— Solution, le flacon. 18 francs.

Laboratoire CORTIAL. — 7, rue de l'Armoricaine — PARIS.

(Téléph. : Suffren 53-70 et 53-71.)

IODASSIUM

Composition. — Solution iodo-iodurée répondant à la formule du Lugol, d'une stabilité parfaite, édulcorée, anisée et préparée avec de l'iode et de l'iodure de potassium de tout premier choix. Pas d'inconvénients d'iodisme.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les indications de l'iode et de l'iodure de potassium : bronchite chronique et emphysème pulmonaire ; tuberculose osseuse, ganglionnaire ; syphilis à toutes les périodes ; artério-sclérose ; vertiges ; insuffisance thyroïdienne, maladie de Basedow ; obésité ; troubles circulatoires de la ménopause ; asthme ; ulcères variqueux ; maladies mycosiques : sporotrichose, actinomycose, trichophyties cutanées, kérion ; lymphogranulome suppuré ; angines de toutes natures (badigeonnages et *per os*).

Posologie. — Une cuiller à café de cette solution contient 5 cgr. d'iode métalloïde et 10 cgr. d'iodure de potassium.

Adultes :

Dose faible : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Dose moyenne : 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Dose forte : 6 à 12 cuillerées à café par 24 heures.

Enfants :

De X à L gouttes matin et soir, c'est-à-dire de X gouttes à une demi-cuillerée à café matin et soir, et plus suivant tolérance.

Mode d'emploi. — A prendre dans n'importe quel liquide, mais de préférence dans du lait sucré, immédiatement avant les repas.

Laboratoire L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Odéon 73-92.)

IODAUBÉPINE

Établi sur des bases scientifiques contrôlées par une longue expérimentation chimique, l'**Iodaubépine** constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats les plus heureux dans les maladies dues à l'altération des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Crataegus et de l'iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices, l'**Iodaubépine** en même temps qu'il active les échanges de notre économie, en facilite l'élimination des toxines. Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose, l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les diverses affections glandulaires.

Doses (sauf avis spécial du Médecin).

Adultes : XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

Enfants : V à X gouttes 3 fois par jour.

(Durée du traitement de l'unité : 15 à 18 jours.)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Arch. 63-27.

Détail dans toutes les pharmacies.

IODE COLLOÏDAL ROZE

Composition et présentation. — Dragées dosées à 3 cgr. d'iode colloïdal Rozé.

Avantages. — Equivaut thérapeutiquement à 30 cgr. d'iodure alcalin, sans en avoir les inconvénients.

Indications. — Scrofule, adénites, adénopathies générales, rachitisme, goitre, goutte, rhumatisme chronique, artériosclérose, arthritisme, obésité, hypertension, asthme, emphysème pulmonaire, bronchites, sclérose du tympan, maladies du fond de l'œil, début de cataracte entérites, fièvre typhoïde, amygdalites, angines, diphtérie, grippe, etc., etc

Posologie. — 6 à 10 dragées par 24 heures.

Prix : 14 francs.

Trois autres formes :

1° Pommade à l'Iode Colloïdal Rozé à 10 % : 12 fr 50

2° Ovules à l'Iode Colloïdal Rozé ou Colloviodes, renfermant 2 gr. d'Iode Colloïdal par ovule : 18 francs.

3° Ophthalmiade, pommade au 1/10^e : 12 francs. (Collyre gras).

Laboratoire de Biologie Appliquée

GASTON ROZE

Docteur en Pharmacie

2, allées de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise)..

IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 16 fr. 60.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 16 fr. 60.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 13 fr. 60.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour 16 fr. 60

Laboratoire **MONTAGU**

49, boulevard de Port-Royal — PARIS.

(Tél. : Gobelins 23-90.)

IODÉOL

Ampoules, Capsules, Iodéol externe, Ovules.

Composition. — Iode colloïdal électro-chimique. (Brevets E. Viel), en suspension huileuse à 10 p. 100 stabilisée par un camphène.

Propriétés. — Toutes les indications de la médication iodée, absolument sans-iodisme (s'élimine non sous forme d'iodure, mais sous la forme d'un complexe organique iodé). Non congestif. Agit même comme décongestif dans les affections de l'appareil respiratoire.

Rapidement diffusible, l'IODÉOL est leucopoiétique, bactéricide, antitoxique.

Indications. — **Ampoules.** Injections intramusculaires dans toutes les infections : les tuberculoses, les mycoses, les rhumatismes aigus et chroniques, la fièvre puerpérale.

Doses. — De 1 à 2 ampoules par 24 heures. (Demander la notice spéciale).

Capsules. — Bronchite catarrhale, emphysème, asthme essentiel, hypertension des artérioscléreux, arthrite rhumatismale.

Doses. — De 4 à 6 capsules par 24 heures ; par 2 avant les repas.

IODÉOL EXTERNE. — Adénopathies, bronchites, érysipèle, furoncle au début, en badigeonnage 2 fois par jour.

Ovules. — Métrites, vaginites, ulcérations génitales. (Voir à *Ovules à l'Iodéol.*)

Présentation.

Ampoules : Boîtes de 8 ampoules de 2 cc... Prix 15 francs.

Capsules : Etui de 60 capsules..... Prix 12 francs.

Iodéol externe flacon de 15 grs..... Prix 5 francs.

Echantillons et Littérature sur demande.

E, VIEL 37, avenue de l'Opéra. — Tél. Opéra 66-55 et 67-17.
Usine à Rennes, 11 et 12, boulevard de Chézy. — Tél. 20-61.

IODÉOPIRINE

Formes. — Comprimés, Pommade.

Composition. — L'*Iodéopirine* est l'acide Acétyl-Iodo-Salicylique obtenu par la combinaison de l'iode atoxique électrochimique, avec l'acide salicylique acétylé (Brevets E. Viel). Chaque comprimé est dosé à 0,05 de produit actif.

Propriétés. — L'*Iodéopirine* possède, avec l'activité bien connue de l'ion salicylique, les propriétés bactéricides et antitoxiques de l'iode colloïdal électrochimique (*Iodéol*). La combinaison exalte d'une manière intense les propriétés de chacun des constituants. Antirhumatismal, antithermique, analgésique et anti-infectieux général, l'*Iodéopirine* agit en provoquant la formation de crypto-toxines immunigènes. Grâce à sa grande diffusibilité, son action est extrêmement rapide, sa toxicité est nulle, et cette rapidité d'action rend inutile l'usage des injections hypodermiques ou intraveineuses.

L'*Iodéopirine* s'élimine par les urines, sous la forme d'acide iodosalicylurique; de ce fait, elle agit électivement sur les germes des voies urinaires, colibacille et gonocoque en particulier.

Indications, Posologie.

- 1° Dans la *Colibacillose* aiguë, septicémie colibacillaire, la colibacillurie, pyélonéphrites, cystites, 6 à 12 comprimés par 24 heures ;
- 2° Dans les *infections aiguës*: Grippe, Rhumatismes articulaire aigu et infectieux, Pneumonie, Typhoïdes. Dans la septicémie puerpérale, combiner au traitement par les ovules à l'*Iodéol*, 6 à 12 comprimés par 24 heures ;
- 3° Dans les *rhumatismes chroniques*, sciatique, chorée, 4 à 6 comprimés par jour ;
- 4° Dans l'*Hypertension* artérielle, les polyscléroses, 2 à 3 comprimés par jour, pendant 10 jours consécutifs, repos pendant les 10 jours suivants et reprendre ;
- 5° Dans l'*angine de poitrine*, action sédative rapide sur la douleur et l'angoisse, 1 à 2 comprimés d'heure en heure, au moment ou en prévision des accès ;
- 6° Dans la blennorragie et ses complications, associé au traitement local par l'*Iodargol* (voir *Iodargol*), 6 comprimés par 24 heures.

Pommade au 1/25° absolument inodore, effets rapides sur la douleur et le gonflement articulaire. En applications locales.

Présentation.

Comprimés, tube de 20 : 15 fr.

Pommade : 15 fr.

Echantillons et littérature sur demande.

E. VIEL

37, avenue de l'Opéra. — PARIS.

(Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes, 11 et 12 boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

IODE TULASNE

Iode assimilable en pilules

Nouvelle préparation stable et inaltérable contenant une forte proportion d'iode actif libéré seulement dans l'intestin et permettant un traitement iodé intensif et prolongé sans le moindre symptôme d'intolérance ni la moindre fatigue.

Formule. — Chaque pilule contient 2 cgr. 1/2 d'iode métalloïdique entièrement assimilable.

Avantages. — Les pilules d'Iode Tulasne glutinisées ne sont dissoutes que dans l'intestin, d'où protection de l'estomac et efficacité supérieure. Elles n'ont ni goût ni arrière-goût.

Elles sont facilement transportables. Le traitement iodé qui demande en général à être assez prolongé est donc grandement facilité. Jamais d'iodisme. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes celles de l'iode et des iodures : ARTERIO-SCLEROSE, HYPERTENSION, EMPHYSEME, LYMPHATISME, GOUTTE, RHUMATISME, OBESITE, BASEDOW.

N. B. — L'Iode Tulasne s'est montré particulièrement actif dans l'*Obésité*. Traitement facilité par la forme pilulaire.

Doses moyennes. — De 2 à 6 pilules par jour, au début des repas. Pour les enfants 1/2 doses.

Prix. Le tube : 14 francs.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS.

IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Principales indications: adénopathies, oreillons, goîtres, impétigos, trichophyties, furoncles, traumatismes.

Prix : 14 fr. 50.

Iodex au Salicylate de Méthyle

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes, lumbagos, pleurites, points de côté, névrites, entorses.

Prix : 14 fr. 50.

Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Prix : 12 fr. 50.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solution aqueuse (43 p. 100 d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1° Ampoules de 5 cc. (18 fr.) et de 10 cc. (34 fr.); 1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° Flacons (34 fr.) (voie enterale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° Iodhéma M (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique (16 et 32 francs) ;
- 2° Iodhéma B (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (22 et 39 francs).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODIFORMINE

Composition. — Solution titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène-tétramine (42 p. 100 d'iode).

Indications. — Antiseptique général des infections chroniques et parasitaires. Toutes les indications de l'iode. Rhumatismes. Sciatiques. Adénopathies. Paludisme. Spirochétose.

Préparations pharmaceutiques. Posologie. — Ampoules de 5 cc. (Boîte de 10 amp.). Ampoules de 10 cc. (Boîte de 10 amp.). Gouttes.

Ampoules : Par voie intramusculaire ou intraveineuse. 1 injection tous les jours ou tous les 2 jours.

Gouttes : De 50 à 100 gouttes par jour en 2 fois.

Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée intensive indolore.

Composition. — Iodure de formine benzo-sodique : 20 cgs. par ampoule de 3 cc.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures. *IODINJECTOL salicylé* (Iodinjectol + 20 cgs. de salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous rhumatismes. Sciatiques.

Posologie des trois formes :

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

IODINJECTOL gouttes : LX à C. gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 22 francs. Gouttes : 16 francs.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

ODOCAÏNE

Traitement des douleurs de toutes natures par les injections anesthésiantes locales.

Composition. — Chlorhydrate d'éthocaïne (novocaïne) 0,05 cgr., Caféine, 0,05, Iodure de sodium, 0,10, Sérum physiologique, 10cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, névralgies, sciatique, lumbago, douleurs musculaires, cellulite, etc.

Technique. — Injecter tous les deux jours une ou deux ampoules au point maximum de la douleur repéré par la palpation.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 22 francs.

VINCENT, Pharmacien

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

IODOCALCIUM

La forme moderne du Sirop iodotannique.

2 formes : Sirop, Gouttes.

Composition. — Une cuill. à café d'Iodocalcium Sirop ou XX gouttes Iodocalcium Gouttes renferment :

Gluconate de calcium..... 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Iode en combinaison organique 0 gr. 01

Indications. — Toutes celles de l'iode et du calcium. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc...

Posologie :

Enfants au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café de sirop. ou X à XX gouttes de la forme gouttes, 2 fois par jour,

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert de sirop ou XX à XL gouttes 2 fois par jour, au début des deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Les gouttes doivent être prises dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — Paris (XIV^e).

IODOCARDINE

Affections des systèmes circulatoires et pulmonaires, Artériosclérose, troubles endocriniens, etc.

Posologie. — XX à LX gouttes par jour.

Formule. — Peptone iodée, Hamamelis virginica, Glycérine, Eau distillée.

Laboratoires AUCLAIRE

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 66-15.)

IODOCITRANE

Nouveau Corps iodé original en association avec le citrate de soude. Tolérance parfaite du tube digestif, aucun accident d'iodisme. Protection contre toute oxydation du produit depuis la préparation jusqu'à la désintégration dans l'intestin.

Indications thérapeutiques. — Hypertension artérielle, artériosclérose, hyperviscosité sanguine, troubles artériels et veineux, varices, hémorroïdes, congestions de la ménopause, rhumatismes, obésité. Maladies de l'appareil respiratoire : sclérose pulmonaire, emphyseme.

Formes. — Pilules glutinisées correspondant à VIII gouttes de teinture d'iode et contenant 0 gr. 10 de citrate de soude.

Posologie. — Dose moyenne : 2 pilules à avaler au début des repas, 2 à 3 fois par jour.

La boîte de 80 pilules : 15 francs (traitement de 20 jours):

La triple boîte de 240 pilules : 39 francs.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN — Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

IDO-CITROL

Thérapeutique moderne d'activité certaine dans toutes congestions et intoxications.

Composition. — Association nouvelle d'iode organique, de citrate monosodique (obtenu en partant du jus de citron frais) et d'extrait d'Hamamelis (de la plante fraîche stabilisée).

Indications. — Troubles circulatoires, hypertension, vertiges, congestions veineuses, scléroses, rhumatisme chronique, obésité, pléthore et toutes intoxications. Permet un traitement très prolongé, aucune contre-indication.

Présentation. — Forme liquide et forme comprimés.

Liquide. — Une demi à une cuillerée à café par jour, au repas de midi seulement dans un demi-verre d'eau sucrée. 0 gr. 20 d'iode ; 1 gr. Citr. de Na ; 0 gr. 10 Extrait hamamelis par cuillerée à café.

Comprimés. — 4 à 6 par jour, en deux fois, aux repas de midi et du soir. 0 gr. 02 d'iode ; 0 gr. 10 Citr. de Na ; 0 gr. 025 Extrait hamamelis par comprimé.

Prix de vente, liquide ou comprimés : 18 francs.

Le liquide ou les comprimés permettent un traitement de 20 jours.

Laboratoire CODY

BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze).

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

Propriétés. — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Indications. — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

Posologie. — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUcq

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

IODOLIPINE

Traitement de fond de l'hypertension artérielle.

Forme. — Capsules d'huile iodée composée.

Composition :

Iode pur combiné à l'huile	0,09
Diméthylxanthine	0,10
Extrait de gui	0,05
Extrait de bardane	0,05

Pour une capsule.

Indications. — Présclérose, Aortite, Artérites, Artériosclérose, Traitement préventif des scléroses viscérales : Myocardite chronique, Angine de poitrine, Sclérose rénale, Sclérose cérébrale.

Dose. — 1 capsule 2 à 3 fois par jour au moment des repas, pendant 10 jours par mois.

Le flacon : 18 francs.

Émile MONAL
Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

IODO-MAGNÉSIUM

du Dr J.-P. CLARY

Composition. — MgI^2 chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau, avec de l'extrait de feuilles fraîches de cassis.

Action. — Réunit les avantages de l'iode et du magnésium.

De l'Iode, l'agent le plus favorable de la circulation, antiscléreux, antirhumatismal, utile dans les cures d'amaigrissement et dans les dysthyroïdies de beaucoup de goîtres.

Du Magnésium, dont l'importance thérapeutique égale celle du phosphore et du calcium. Il est le composant essentiel de la chlorophylle et de toutes les vitamines. Il joue un rôle de premier plan dans les troubles trophiques de l'enfance, dans l'équilibre nerveux de l'organisme, dans la sécrétion des sels biliaires, dans les congestions prostatiques et utérines, dans la disparition des papillomes, etc.

Son action inhibitrice de la sécrétion surrénale, opposée à celle du potassium, explique l'action hypotensive extraordinaire du MgI^2 .

L'IODO-MAGNÉSIUM enfin ne produit qu'un minimum d'iodisme.

Posologie. — 20 à 30 gouttes, suivant avis du médecin, dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas, dix jours consécutifs tous les mois.

20 gouttes renferment 0^{gr},30 de MgI^2 .

Le flacon contient 450 gouttes.

Le flacon : 18 francs.

Laboratoire J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS (XVI^e).

IODOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe de l'Iode et d'une Albumine d'origine strictement végétale.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphysème, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes et endocriniennes.

Posologie. — Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois avant les repas.

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-3.

IODOMAÏSINE

Pommade.

Iodomaisine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières. — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

Indications. — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi. — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'Iodomaisine pommade est présentée en tube. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National N° 218-4.

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone trypsique.

Gouttes : XXX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — X à C gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition, artério sclérose, obésité, polysarcie, dégénérescence graisseuse, intoxications chroniques, asthme, emphysème, rhumatisme, arthritisme, goutte, tertiarisme.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.
(Tél. : Odéon 08-55, et 38-75.)

IODONESYL

(Gouttes)

Complexe organo-iodo-magnésien.

Formule. — 10 p. 100 Iode métalloïdique dynamisé par la présence de réducteurs hydrocarbonés et du magnésium.

Action. — L'iode sous cette forme élective, administrée à dose élevée sans iodisme, stimule l'activité du tissu lymphoïde, réalise l'atténuation directe *in vivo* des toxines microbiennes.

Son action est alors analogue à celle d'un vaccin d'une valence strictement adéquate. Résultats cliniques surprenants.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, en particulier *infections aiguës*, Grippe, Angines, Pneumonie, Phlegmon de la gorge, Rhumatismes, Dermatoses.

Posologie. — Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à 2 heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée.

Prix : 20 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 13-38.)

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphyseme, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)
(Tél. : Grésillons 05-21.)

IODOPAN (GOUTTES)

(Procédé Slivo)

Admis dans les Hôpitaux de Paris

Composition. — Nouvelle combinaison de l'iode avec une peptone spéciale.

L'iode n'est libéré que dans l'intestin, d'où impossibilité absolue de troubles gastriques et d'iodisme.

Indications. — Toutes les indications de l'iode et des iodures.

Doses. — XX gouttes agissent comme 1 gr. d'iodure alcalin.

Enfants : V à XV gouttes par 24 heures après les repas.

Adultes : XX à LX gouttes et plus après les repas.

Prix : 15 francs pour 1 mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien.

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

IODORGANINE MERCIER

Enregistrée au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous le n° 1051-4-1 et n° 1052-4-2. Admises par les Assurances Sociales.

1° IODORGANINE formule courante n° 1.

Composition. — Thyroïdine, hypophysine, surrénine, orchitine, ovarine

Indications. — Obésités.

Présentation. — En tube aluminium de 46 comprimés.

Traitement. — 6 boîtes. La boîte pour 11 jours de traitement : 16 fr. 80

Dose moyenne. — 4 comprimés par jour : 2 au début des principaux repas, avalés avec un peu d'eau.

2° IODORGANINE formule spéciale complémentaire n° 2.

Composition. — Hypophyse, surrénale, orchitine, ovarine, bile (né contient pas de thyroïdine).

Indications. — Réservée aux obèses hypophysaires et aux cardiaques.

Présentation. — En tube aluminium de 46 comprimés.

Traitement. — 6 boîtes, la boîte pour 11 jours de traitement : 25 francs.

Dose moyenne. — 4, 6 et 8 comprimés par jour, avalés dans un peu d'eau, aux deux principaux repas.

TRAITEMENT MIXTE. — Les deux formules peuvent être prises simultanément.

Dose journalière. — 2 comprimés de la formule n° 1 ;
4 comprimés de la formule n° 2.

Laboratoires R. MERCIER

41, route de Turin — NICE (A.-M.). (Tél. : 859-85.)

IODOSULFÈNE

Iodosulfothérapie à haute dose.

Composition :

21,4 p. 100 d'Iode.

22,4 p. 100 de Soufre.

38,6 p. 100 de Strontium.

Indications. — *Rhumatismes* : Scléroses viscérales, articulaires, artérielles. Tous états douloureux d'origine musculaire ou nerveuse. Hypertension.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. en injections *intramusculaires*, indolores, bien tolérées.

Posologie. — 2 à 3 ampoules par semaine.

Laboratoires Pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne, 22 — PARIS (V°).

iodo-THYROÏDINE CATILLON

Forme. — Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications. — Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses. — 1 à 2 contre Myxœdème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Le flacon de 45 comprimés : 12 fr. 50

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III^e).

IODURASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur..... 0 gr. 50

Levurine extractive 0 gr. 10

Par flacons de 36 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Prix : 30 francs pour 6 à 30 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

IODURE-BOULARD

En ampoules buvables.

Saveur agréable, sans arrière-goût.

Indications. — Lymphatisme, états et accidents spécifiques de tous ordres (primaires, secondaires ou tertiaires), rhumatismes chroniques, actinomycose, maladie de Basedow, arthritisme, myocardite, hypertension, artério-sclérose, troubles circulatoires.

Composition. — Chaque ampoule contient :

1^o De l'iodure de potassium sous forme de complexe organo-métallique ;

2^o Des levures vivantes, dans leur milieu isotonique iodé ;

Prix : 16 francs la boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5.

Voir aussi les autres complexes organo-métalliques :

Or-Boulard, Argent-Boulard, Magnésium-Boulard, Hydrargyre-Boulard, l'alternance quotidienne de deux complexes Boulard étant souvent recommandable.

Laboratoire CERBELAUD

Docteur en Pharmacie

Ancien interne des hôpitaux de Paris,
82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 16-66.)

IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

Antiseptique énergique dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humorales, de l'iode à l'état naissant.

Infections gastro-intestinales (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie). Traitement iodé.

Formule. — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

Dose. — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

Usages externes. — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

Pansement Lumière : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte et poudre) et *Tulle gras* Lumière constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

Formuler. — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'Amidon Lumière.

Prix : *Pâtes, Pilules* : 8 francs. — *Poudre* : 11 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

IODURES PACHAUT **chimiquement purs**

Tubes dosés d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Prix : à 0,25 : 12 fr. 50. — à 0, 50 : 17 fr. 50
à 1 gr. et 2 gr. : 25 francs.
à 3 gr. : 37 fr. 50.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.
(Tél. : Laborde 16-72.)

IOGLOTT

Comprimés violets et blancs dégageant 3 mgr. d'Iode Naissant, par couple de comprimés.

Indications. — Angines, Asepsie pré et post-opératoire, Prophylaxie des maladies épidémiques.

Mode d'emploi. — Mettre dans la bouche, 4 à 5 fois par jour et le soir au coucher, un comprimé violet et un comprimé blanc et laisser fondre lentement.

La boîte pour 15 jours de traitement : 9 fr. 50.

Adresse télégr. : Gaipharmcy, Alger.

Échantillons et littérature.

CHARLES ROCHE, , **Pharmacien**

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon,

Ex-pharmacien major de l'armée,

Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

Dépôt général : Office Commercial
Pharmaceutique, Paris.

IOGUINE DELBA

Médication hypotensive.

Composition. — Combinaison de iode avec la peptone et l'extrait de Gui stabilisé d'Aubépine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de l'Hypertension et de l'Artériosclérose chez tous les sujets et à tous les stades de la maladie.

Tolérance parfaite et sans mauvais goût.
Pas d'Iodisme.

Posologie. — XX gouttes avant les repas, avec de l'eau.

Prix : 15 francs le flacon pour un traitement d'un mois.

Laboratoire DELBARY
SAINT-ASTIER (Dordogne).

IONISALT

du docteur Moity;

Comprimés dosés à 0,50 de sels anhydres.

Association saline pharmacodynamiquement titrée des 4 ions principaux de l'organisme en respectant le rapport :

$$\frac{\text{Na}}{\text{Ca}} = \frac{\text{K}}{\text{Mg}}$$

Indications. — Cholagogue. Laxatif. Purgatif dépuratif. Obésité. Désintoxication (rhumatisme goutte). Digestif. Diurétique. Désinfectant intestinal.

Doses : 5 à 2 comprimés par jour selon les indications. Suivre les prescriptions du médecin.

Prix imposé :

130 comprimés 14 fr.

Peut-être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire J.-O. MOITY

docteur en médecine et en pharmacie

Ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau, NEUILLY-SUR-SEINE.

IONYL

Médication bio-énergétique complète.

Composition. — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutique et indications :

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. — Innocuité absolue.

Posologie. — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54)

IRÉNINE GONNON

Composition. — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Irénine proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

Indications. — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

Posologie. — 1, 2 ou 3 cachets par jour. Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.
(Pour 8 jours de traitement environ).

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

IRRASTÉRINE

Vitamine D. cristallisée.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolatés.

Composition. — Vitamine D. cristallisée, en solution dans l'huile d'olive, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'*Irrastérine* peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Indications. — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Pré-tuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — *Solution huileuse* (0 milligr. 5 de vitamine D cristallisée par cc.) Jusqu'à un an : X gouttes ; de 1 à 10 ans : XX gouttes ; *adolescents, adultes* : XXX gouttes.

Chocolatés (1 chocolat = 0 milligr. 1 de vitamine D cristallisée) : 1 à 3 par jour.

Prix :

Solution : 15 francs. — *Chocolatés* : 18 francs.

Les Établissements Byla

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

ISOGEV

Antiseptique des muqueuses de la bouche et du pharynx.

Forme. — Comprimés solubles.

Composition. — Stovarsol, Cuivre colloïdal, Borate de soude.

Indications. — Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Maux de gorge, Pharyngites, et Angines.

Mode d'emploi. — 1 comprimé par verre d'eau bouillie chaude en bains de bouche ou gargarismes : 4 à 5 fois par jour.

Prix :

Grand modèle..... 15 fr.

Petit modèle 8 fr.

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 32-88.)

ISONAL

N-Méthyl-Ethyl-Phényl-Malonylurée.

La plus récente formule de barbiturique sans aucune toxicité. Convient à tous les nerveux, n'entrave en rien la capacité de travail.

Indications. — Dépression nerveuse. Etats anxieux. Angoisse et palpitations. Insomnie. Surmenage. Nervosisme. Névroses et troubles convulsifs.

Présentations :

Tube de 20 comprimés titrés à	0,10
Tube de 30 comprimés titrés à	0,05
Tube de 60 comprimés titrés à	0,01

Prix au public : 7 fr. 50, le tube.

Boîte de 6 ampoules titrées à 0 gr. 10 (voie intramusculaire).

Prix : 18 francs.

Posologie. — Dans les cas d'éréthisme nerveux : administrer 10 à 20 cgr. par jour, en 8 ou 10 prises.

Chez les enfants : 2 cgr. par année d'âge, en doses réfractées.

Chez les nourrissons, la dose quotidienne correspond à 0 gr. 01 par semestre d'âge.

Dans les troubles convulsifs des adultes et l'épilepsie, le traitement d'attaque nécessite des doses importantes variant de 0 gr. 30 à 0 gr. 80 par jour. Pour le traitement d'entretien, on pourra les réduire en les répartissant en plusieurs prises.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

ISO-SELS

Comprimés solubles.

Médication alcalino-sodique renforcée par les chlorures de magnésium et d'ammonium.

Propriétés. — Stimulent les sécrétions du foie. Corrigent les dyspepsies hypo et hypersthéniques. Combattent les fermentations entérocoliques. Assurent l'équilibre acide-base des humeurs.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire, Gastrite chronique, Fermentation intestinale, Colibacillose, Migraines, Asthénie, Dermatoses d'origine digestive.

Posologie. — Adultes : 1 à 3 comprimés par jour dans un verre d'eau sucrée ou non, ou dans tout autre liquide, à jeun ou aux repas.

Enfants et Nourrissons : 1/2 à 1 comprimé par jour dans un peu d'eau sucrée ou dans le biberon.

Durée de la cure : 15 à 20 jours consécutifs.

La boîte de 30 comprimés : 12 francs.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien,

Ex-interne des hôpitaux de Paris,

8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e).

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

Action.

L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38 nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyperacide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.
Adultes : 1 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.
Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : 13 francs.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue La Fayette — PARIS (IX^e).

ISPA GHUL TROUETTE-PERRET

Phytothérapie gastro-intestinale.

Mucilage (semences ou granulé) du *Plantago decumbens*.

Traitement idéal de la constipation.

Avantages. — L'Ispaghul « Trouette-Perret » est un produit naturel d'une innocuité absolue et d'une tolérance parfaite. Son mode d'action est exclusivement mécanique.

L'Ispaghul « Trouette-Perret » réédue l'intestin et facilite son travail biologique normal. C'est un lubrifiant.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, Digestions lentes et difficiles, Gastro-Entérites, Insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — L'Ispaghul se prend sous la forme de fines semences ou de granulé dont l'absorption est très facilement acceptée. On le prend dans de l'eau ou dans un breuvage quelconque.

Doses :

Adultes : Une cuillerée à soupe à chacun des principaux repas, midi et soir.

Enfants : Une cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge à chacun des deux principaux repas.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillon sur demande aux :

Laboratoires CONDOU et LEFORT

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

IXIUM

Composition. — Solution isotonique de Thorium X (exempte de radiothorium et de corps radioactifs à vie longue).

Propriétés. — Antirhumatismales et action sur les organes hématopoïétiques : — stimulante à doses faibles, — destructrice à très fortes doses.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. en verre spécial.

Indications et Mode d'emploi. — *Spondylose, rhumatismes chroniques, névrites, iritis, psoriasis* (particulièrement psoriasis arthropathique) : 8 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 50 à 150 ou 180 microgrammes.

Anémie : 8 à 10 injections hebdomadaires, dosées à 25, 50, puis 75 microgr.

Leucémies, maladie de Hodgkin, polyglobulies : 5 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 100 à 350 microgr. en principe.

Observations. — N'employer l'*Ixium* qu'en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses.

Les séries peuvent être renouvelées après un repos de 2 mois ; surveiller la formule sanguine en cas de séries répétées ou de doses fortes.

Prix de vente au public :

L'ampoule dosée pour l'utilisation le mercredi : 40 francs.

La série de 8 ampoules : 300 francs.

N.-B. — L'*Ixium*, préparé toutes les semaines, est expédié le mardi ; les dosages sont prévus normalement pour utilisation, en France, le mercredi.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

JABOSULFÈNE

JABOrandi + hypoSULFite

« Le désensibilisant de choix ». Modifie le « terrain » et régularise le vague.

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'hyposulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuilles de Jaborandi stabilisée.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas. (Voir *Hypostrontium*.)

Indications. — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes, Asthme, Migraine, Rhume des foins. Toutes insuffisances hépatiques.

Action. — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 60 pilules glutinisées : 16 francs.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

pour les intramusculaires, voir *HYPOSTRONTIUM*.

La boîte de 10 ampoules : 27 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, r. de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Tél. : Odéon 73-92.)

J. B. 5 BELLAS

Traitement des tumeurs malignes.
Organothérapie Bellas.

Présentation :

<i>Comprimés</i> (boîtes de 50 comprimés)	65 fr.
<i>Suppositoires</i> (boîtes de 12 suppositoires) . . .	30 fr.
<i>Pommade</i> (tubes de 100 grs.)	30 fr.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique et Extrait de rate.

Indications :

- 1° *Traitement préventif* : Toutes affections aiguës ou chroniques (ulcères internes, fibromes, métrites, prostatites, ulcérations persistantes de la peau), susceptibles de devenir cancéreuses.
- 2° *Traitement adjuvant de la Chirurgie, Curiethérapie et Radiothérapie* : Traitement préparatoire des cas qui en raison de l'état général ou local ne se prêtent pas immédiatement à une intervention chirurgicale ; traitement post-opératoire pour éviter les risques de récidives et métastases : traitement des cas réfractaires, ou devenus réfractaires, aux rayons ; augmentation de la tolérance des malades aux rayons.
- 3° *Traitement des cas inopérables* : Arrêt de la croissance de la masse tumorale et des ganglions ; relèvement remarquable de l'état général et moral.

Posologie. — La posologie des comprimés et des suppositoires et les conditions auxquelles ils sont indiqués variant selon chaque catégorie de cas et l'application de la pommade nécessitant une certaine technique (très simple), MM. les médecins sont priés de demander aux **Laboratoires Abadie-Tanzi** une notice détaillée sur le mode de traitement.

Pour permettre de garder le secret du diagnostic, aucune littérature ou indication n'accompagne les produits.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd. n° 167-16.

Dépositaires pour la France et les colonies :

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, place-Intérieure Saint-Michel — TOULOUSE.
(Tél. : 213-06).

JÉCOBIASE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule.	Adulte.	Infantile.
Sulfate de soude cristallisé	1 gr.	0,50
Citrate trisodique.....	0,25	0,125
Bicarbonate de soude bicristallisé .	0,05	0,025
Chlorure de magnésium anhydre...	0,50	0,25
Excipient spécial	qsp. 8 cc.	qs p. 8 cc.

Indications. — Toutes les manifestations de l'insuffisance hépatique (migraines, nausées, vertiges, etc.). Les infections biliaires (ictères, lithiase biliaire, cholécystites).

Les congestions du foie.

Les asthénies dont la cause est liée à des toxi-infections d'ordre digestif.

La constipation sous toutes ses formes.

Posologie. — Une ampoule le matin à jeun dans un verre d'eau. Après une semaine de repos, reprendre une nouvelle série de 10 ou 20 ampoules suivant le cas.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 19 fr. 50.

Laboratoires de la JÉCOBIASE
Dr R. PIONNEAU, Pharmacien
 VAYRES (Gironde).

JÉCOBOLDINE

(Gouttes de saveur agréable.)

Stimulant des fonctions hépatiques et apaisement des phénomènes douloureux résultant de l'irritation des voies biliaires et de la glande hépatique.

Formule :

Teinture de Belladone	20
— de Boldo.....	30
— d'Ipéca.....	30
— d'Artichaut	20

Pour 100 cc.

Posologie. — V à XXX gouttes par 24 heures dans un peu d'eau au début des repas, en 2 ou 3 fois.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE
 25 bis, quai de la Bibliothèque — LYON.

JÉCOL

L'auxillaire physiologique du foie.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 223-2 et 223-10.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, Colibacillose, etc.

A. Formule.

Combretum (Extrait spécialisé de Kinkélibah)	3 centigr.
Boldo (Extrait aqueux)	2 1/2 centigr.
Evonymine (Codex).....	1 centigr.

Pour 1 cachet ou XX gouttes.

B. Forme.

1^o **Cachets** minuscules, faciles à avaler, forme la plus simple pour administration aux adultes.

2^o **Gouttes.** Posologie encore plus souple que le cachet, plus agréable aux enfants et aux adultes qui n'aiment pas avaler de cachet.

C. Posologie.

1 ou 2 cachets ou XX à LX gouttes à la fin de chaque principal repas.

Enfants : prescrire 1 goutte par année d'âge, dose à répéter 2 à 4 fois par jour.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

D. Boîte de 30 cachets	17 fr.
Flacon compte-gouttes.....	17 —

Laboratoire JÉCOL
COURBEVOIE (Seine).

JECOLAXINE

Cachets.

Traitement de la constipation en particulier d'origine hépatique.

Formule :

Poudre de Belladone.....	0,01
— Bourdaine	0,10
— Cascara	0,10
— Agar-Agar	0,10
Bile desséchée et purifiée....	0,01

Pour 1 cachet.

Posologie. — 1 à 2 cachets au repas du soir provoqueront une selle le lendemain matin.

Interrompre un jour sur deux.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE

25 bis, quai de la Bibliothèque — LYON.

JÉCOPEPTOL

Indications. — Toutes affections gastro-hépatiques. Calme immédiatement. Effet durable par usage régulier.

Composition. — Association de 2 formules : l'une *gastrique* : poudre magnésio-bismuthée, avec adjonction de silice absorbante. L'autre *hépatique* : cholagogue et désinfectante des voies biliaires.

Forme. — Poudre d'une extrême finesse, sans toxique, d'un goût excellent, d'un prix modique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de poudre dans un verre d'eau après les principaux repas.

Prix de la boîte

pour un traitement d'une semaine : 15 fr. 80.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharmacien

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 75-75.)

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 1248-1.

JECOSEDYL

(Gouttes de saveur agréable.)

Sédatif de tous phénomènes douloureux du foie et des voies biliaires.

Formule :

Teinture de Belladone	10
— de Boldo	40
— de Jusquiame	10
— de Combretum	40

Pour 100 cc.

Posologie. — *Type* : V à X gouttes dans un peu d'eau par 24 heures, prises en 2 ou 3 fois au début des repas.

Cas aigus : jusqu'à XXX gouttes par 24 heures.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. COUTURE

25 bis, quai de la Bibliothèque — LYON.

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue et d'extrait de malt, sous forme de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue, 30 p. 100 ; Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ; Essences aromatiques, Q. S.

Indications. — Le Jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue enrichie des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou dans une infusion.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

P. BASTIEN, pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

JOSICOL

Est une préparation nouvelle à base d'iode dissous dans de l'*Acide Silicique colloïdal stable*, véritablement assimilable et suractivé en combinaison phosphorique. Cette préparation diffère très nettement des autres préparations à base d'iode et d'acide silicique employées jusqu'à ce jour en thérapeutique. L'acide silicique de ces derniers présentant l'inconvénient de précipiter par coagulation perd ainsi tout son pouvoir d'assimilation.

Forme :

Goutte : XXIV gouttes correspondent à 0 gr. 01, acide silicique colloïdal ; 0 gr. 076, d'iode.

Indications. — Artériosclérose et toutes ses suites, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles, Vertiges, Angoisses, Fatigues, Troubles de la ménopause, Troubles cardiaques, etc...

Posologie. — V à VIII gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau après les repas pendant 6 semaines, repos de 15 jours et reprendre.
Pas de contre-indications ni d'intolérance.

Prix :

Flacon normal 20 cc.....	18 fr.
Flacon cure 50 cc.....	36 fr.

Laboratoires André LUCIEN

19, rue du Bac — PARIS.

(Tél. : Littré 55-03.)

JUGLAND GMET

Extrait total, sans alcool ni sucre, des feuilles de noyer. Sous forme liquide, plus actif que les pilules.

Propriétés :

Toni-dépuratif, anti - diabétique, reminéralisant
(Fixateur des phosphates de chaux).

Indications :

Anémie, lymphatisme, adénopathies, rachitisme, ostéomalacie, acné juvénile.

Diabète et ses complications. Tuberculose.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour. Enfants : demi-dose.
Dans le diabète : dose doublée.

Prix du flacon de 135 cc. : 18 francs.

Laboratoire GMET

A. LOROT, Pharmacien

27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Prix : 16 francs la boîte de 150 pilules. Conservation indéfinie en lieu sec.

L. N. C. n° 257-1.

Produits Euthérapiques

Camille CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon

12, rue des Écoles — CHAMBÉRY (Savoie).

(Tél. : 0-23.)

JUGLANREGINE ANDRÉ

Iodotannique phosphaté à base de feuilles de noyer, fraîches et sèches.

Indications. — Lymphatisme, tuberculose, reminéralisation, anorexie, états asthéniques, convalescence, hypothyroïdie, diabète.

Présentation. — Élixir très agréable au goût.

Dose. — 2 à 3 cuillerées (à bouche ou café, suivant âge) par jour.

Prix en France : le grand flacon : 17 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments : 556-1.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

JURANOL

Huile sulfurée naturelle du Jura.

Huile d'origine animale fossile, très riche en soufre, extraite d'une roche du massif montagneux du Jura.

Réparateur puissant des tissus, décongestif, calmant, antiseptique léger, antiprurigineux, ni irritant, ni toxique. Ne tachant pas.

POMMADE à 10 p. 100.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcères, Dermatoses (acné, eczéma, impétigo, etc...), Engelures, Crevasses, Coups de soleil, Périphlébites, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — Pansements, onctions, massages.

Présentation. — Tube de 30 gr. : 9 francs.

LIQUIDE à 10 p. 100.

Indications. — Chirurgie (plaies infectées, fractures ouvertes, ostéomyélites, abcès, phlegmons, lymphangites), Urologie (cystites, urétrites), Gynécologie, Dermatologie, Séborrhée, Rhinites.

Mode d'emploi. — Compresses, injections dans les drains ou trajets fistuleux, instillations, tampons vaginaux, pulvérisations.

Présentation. — Flacon de 60 gr. : 14 francs.

COLLODION à 10 p. 100.

Indications. — Traitement abortif des pyodermes, piqûres d'insectes, petites plaies, gerçures.

Mode d'emploi. — Badigeonnages.

Présentation. — Flacon de 8 cc. : 8 francs.

OVULES

Indications. — Leucorrhées, vaginites, métrites, congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 1 ovule le soir au coucher.

Présentation. — Boîtes de 6 ovules : 17 fr. 50.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI^e).

(Tél. : Ségur 02-79.)

JUS DE RAISIN QUOTIDIEN

Composition :

Pur jus de raisin frais, sans alcool, ayant conservé la *saveur délicate* et le *fruité* du raisin frais. Préparé avec les meilleurs raisins de l'Anjou, pasteurisé à température modérée, renferme intégralement toutes les vitamines, albumines, corps azotés. Maintenu dans le vide dans sa bouteille, ce qui évite toute oxydation. Ni antiseptique, ni acide sulfureux.

Indications :

Auto-intoxication, Arthritisme, Maladies de l'estomac, du foie, de l'intestin, des reins, Boisson de table pour estomacs délicats. Evite la phlébite dans les opérations et accouchements.

Mode d'emploi :

Pur ou mélangé d'eau à table, ou un verre à bordeaux avant chaque repas.

Prix : 10 francs la bouteille.

Henri CHARTIER — SAUMUR. — (Tél. : 416.)

JUS INTÉGRAL DE POMMES FRAICHES

« DALLERY »

Composition. — Sucre naturel, matières minérales, tanin, pectine, potasse, acide phosphorique, lévulose, vitamines.

Préparé par diffusion de fruits frais, coagulation des matières pectiques, à basse température.

Action thérapeutique. — Stimule le système digestif et hépato-rénal anti-diarrhéique, alcalinisant du sang.

Remplace la cure de pommes crues.

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 4 verres à bordeaux par jour, matin et soir ou pendant le repas, additionné d'eau.

Prix : 8 fr. 50 la bouteille.

Laboratoire de l'Industrie de la Pomme

DALLERY *

Spécialiste,

75, av. Victor-Hugo — FRENAY-S-SARTHE (Sarthe).
(Tél. : n° 7.)

KALMANGOR

Application nouvelle de la Yohimbine.

Composition. — Dragées à noyau mou contenant chacune :

Chlorh. de Yohimbine.....	0,02
Trinitrine à 1 p. 100.....	II gouttes.
Phényl-éthyl-malonylurée	0,015
Extrait de cratægus	0,01

Indications. — Activité immédiate dans les crises d'angine de poitrine grâce aux vasodilatateurs Yohimbine, Trinitrine et aux sédatifs.

Médication vagotonique générale.

Posologie. — 4 à 6 dragées par 24 heures à croquer au moment des crises.

Prix : Le flacon : 18 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

KALMIGRAINE

Élixir calmant concentré.
Spécifique de la douleur.

Composition. — 10 cc. contiennent :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,005
Caféine	0,06
Pyramidon	0,40
Liqueur	Q. S. pour 10 cc.

Propriétés. — Puissant calmant de la douleur, agréable à prendre, très actif, bien toléré par l'estomac, rapidement assimilé. Soulage en quelques minutes.

Indications. — Céphalée, Migraine, Odontalgie, Névralgie, Rhumatisme, Torticolis, Lumbago, Goutte, Sciatique, Dysménorrhée, Zona, Cystite, Fièvre, Grippe.

Posologie:

De 8 à 15 ans : une demi à une cuillerée à café.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, à prendre en cas de souffrance et renouveler au besoin 2 à 3 fois en 24 heures.

Présentation soignée en flacon de 120 cc. au prix de : 12 francs.

Laboratoires MEUNIER, Pharmacien
Lauréat 1^{er} prix de la Faculté de Montpellier,
MONTMARAULT (Allier).

KANEURON

Nouvelle forme créée en 1933.

États anxieux vago-sympathiques.

Présentation. — Gouttes.

Composition. — Paullinia, Cratægus, Passiflore, *Phényléthylmalonylurée*.

Indications. — Spasmes, Vertiges, Anxiétés, Angoisses, Insomnies
États Parkinsoniens, Émotivité, Syndrome solaire.

Désordres graves d'origine nerveuse.

Propriétés thérapeutiques. — Sous forme liquide la phényléthylmalonylurée, étant absorbée de suite, agit à doses moindres. Les extraits de Cratægus et de Passiflore renforcent son action. L'extrait de Paullinia combat l'action dépressive que peut occasionner la phényléthylmalonylurée.

Prescription. — Kaneuron : 1 flacon. Durée moyenne : 20 jours.

Posologie. — X à XXX gouttes 3 fois par jour.

X gouttes = 0,01 de phényléthylmalonylurée.

Maniable. — Sa présentation sous forme « gouttes » donnant toute latitude désirable sous le rapport de la dose, particulièrement appréciable chez le nourrisson, l'enfant, les anxieux.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien,

52, rue de Cambrai — LILLE.

Enregistré au Laboratoire national. — Admis aux Assurances sociales

KAOBROL

DEUX FORMULES

KAOBROL simple: Kaolin colloïdal. — Bromure de Sodium (40 à 45 cgr. par cuillerée à dessert). Carbonates de Chaux et de Magnésie.

KAOBROL belladonné : Kaobrol simple. — Poudre de Belladone titrée (IV gouttes de teinture par cuillerée à café).

Poudre homogène, adhésive et absorbante, très agréable au goût, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

Posologie. — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.

Prix : 12 fr. 50.

Littératures et échantillons
à Messieurs les Docteurs.

Laboratoire du KAOBROL

J. LAROZE, Pharmacien,

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).

(Tél. : Entrepôt 01-41.)

KAOLINASE

Les pansements gastriques parfaits, *les moins coûteux.*

Composition. — Silicate d'alumine naturel, stérilisé, finement porphyrisé, en poudre fine très adhésive : 10 grammes par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Ulcères et Ulcérations de l'estomac et du duodénum, Colites, Fermentations.

Posologie. — 1 à 2 paquets délayés dans un verre d'eau le matin à jeun.

Renouveler 1/2 ou 1 paquet dans la journée si nécessaire, au moment des douleurs.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 12 francs.

KAOLINASE BELLADONÉE

Composition. — Kaolinase simple, 10 gr. Teinture de belladone 10 gouttes, par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie grave, Gastropathies rebelles, Ulcères graves ou aggravés de spasmes, Spasmes gastro-intestinaux, Vomissements, Toux émétisante des tuberculeux.

Posologie. — Un paquet délayé dans un verre d'eau le matin à jeun. Renouveler dans la journée si nécessaire.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 14 francs.

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

KAVIASE

Pilules, Suppositoires, Ovules.

PILULES (2 formules).

1° *Pilules Kaviase.*

Ext. Kawa	0,10	} par pilule.
Uroformine	0,02	

6 à 8 par jour, 15 francs le flacon de 50 pilules.

2° *Pilules Kaviase au bleu de méthylène.*

Ext. Kawa.....	0,10
Bleu de méthylène.....	0,01

6 à 8 par jour, 16 francs le flacon de 50 pilules.

Indications. — *Le symptôme douleur dans la sphère génito-urinaire.* Cystites, Urétrites, Prostatites, Orchites, Métrites, Salpingites, Colibacilloses.

SUPPOSITOIRES

Toutes les algies ano-rectales et pelviennes.

Indications. — Congestion prostatique et utéro-ovarienne, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Prurit anal, Rectites, etc.

Composition :

Ext. Kawa	0,30
Ext. jusquiame.....	0,03
Stovaïne	0,005

15 francs la boîte de 10 suppositoires.

OVULES

Toutes les affections gynécologiques douloureuses : décongestif et sédatif.

Laboratoires de la KAVIASE

22, rue Lalande — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Suffren 71-02.)

KÉFIROGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation *domestique* du Kéfir.

Composition. — Ferments sélectionnés, fournis par des *cultures pures* des agents de la fermentation kéfirique. Préparation liquide glycinée.

Indications. — Le Kéfirogène permet la fabrication du Kéfir, lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — Chaque dose (une ampoule) est ajoutée à 250 cc. environ de lait bouilli, puis refroidi. Après un séjour de 24 heures, à 25 degrés, on a le Kéfir n° 1 et, au bout de 48 heures, le Kéfir n° 2 (le plus souvent utilisé). Une étuve spéciale facilite cet emploi du ferment (renseignements sur demande).

Présentation et prix. — La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

Laboratoires CARRION et LAGNEL

3, 5 et 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

KÉLÉDOL ET SUPPO-KÉLÉDOL

Composition :

Chlorhydrate de Morphine..... 1 centigramme.
Bromhydrate de Scopolamine ... 1/4 de milligramme.
Par ampoule de 1 cc., par suppositoire ou 2 comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Tous les emplois de la morphine sans les inconvénients : action hypnotique et sédative plus forte, pas d'effets toxiques sur la circulation et la respiration, beaucoup moins d'accoutumance.

Indications. — Douleur, Cancer, Sciatique, Anxiété, Agitation, Anesthésie pré-chirurgicale, Accouchement

Posologie. — Ampoules, suppositoires ou comprimés :
1 à 4 par 24 heures.

Présentation pharmaceutique et prix :

12 ampoules : 15 fr. — 6 ampoules : 8 fr.
10 suppos. Kélédol : 20 fr. — 5 suppos. Kélédol : 12 fr.
14 comprimés : 10 francs.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur,

Licencié ès Sciences.

114, rue Solférino — LILLE.

KÉNOL

Compensateur Intestinal.

Extrait duodénal total	0 gr. 045
— biliaire total purifié.....	0 gr. 045
— Gladiolus ceruleus	0 gr. 019
— Evony. atropur.:.....	0 gr. 019
Mag. de soufre purifié.....	0 gr. 035

Pour un comprimé-dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

Indications. — Constipation, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

Doses. — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

Provence 20-20 et 58-43.

KÉPHÉDRYL

A base d'Éphédrine naturelle.

Formule :

Éphédrine <i>naturelle</i>	1	p. 100
Eucalyptol	0,50	—
Camphre	0,30	—
Excipient.....	98,20	—
	100	p. 100

Indications :

Le Képhédryl est indiqué dans toutes les affections du nez :

Coryzas inflammatoires ou spasmodiques,
Catarrhe nasopharyngien, Rhume des
foies, Sinusites, Otites, Asthme.

**C'est un merveilleux traitement abortif
du rhume de cerveau.**

Posologie :

Quelques gouttes dans chaque narine 3 ou
4 fois par jour.

Présentation :

La capsule compte-gouttes forme bouchon
permettant ainsi l'emploi du Képhédryl
dans les meilleures conditions d'asepsie.

Prix : 13 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

C'est un remède efficace et économique.

Laboratoires du KÉPHÉDRYL

Guy ÉLIE-MANTOUT, Pharmacien,

Service d'échantillonnage :

4, rue Roussel — PARIS (XVII^e).

KERALAX

Mucilage d'origine végétale infermentescible
et inassimilable.

Formules :

1^o Keralax.

Mucilage.....	80 p. 100
Ext. Rhamnus Frangula	3 p. 100
Exc..... Q. S. pour.	100 gr.

2^o Keralax simple.

Mucilage.....	80 p. 100
Exc..... Q. S. pour.	100 gr.

Le Kéralax renferme le % de mucilage pur le plus élevé (80 p. 100), ce qui lui assure l'action mécanique la plus efficace.

Indications. — Traitement physiologique de la Constipation, Rééducation de l'intestin, Auto-Intoxications, Stimulant des mouvements péristaltiques.

Posologie. — Une ou deux cuillerées à café midi et soir ou le soir seulement, selon les besoins du traitement.

Pas de contre-indication.

Présentation et mode d'emploi.

Granulés de goût agréable et d'absorption facile. Placer le contenu de la cuiller sur la langue et l'avaler *sans mâcher* avec quelques gorgées de liquide.

Prix : 14 francs la grande boîte.

Ce prix correspond à un coût journalier très modique et le moins élevé de tous les mucilages.

Laboratoires du KERALAX

Guy ÉLIE-MANTOUT, Pharmacien,
1, rue Auber — PARIS (IX^e).

KERASALICYL

Pilules *kératinisées* suivant le procédé du Dr Henri Philippe, ne se dissolvant que dans l'intestin et permettant l'absorption des fortes doses de salicylate sans intolérance ni fatigue d'estomac.

Salicylate de soude chimiquement pur dosé à 0,50 cent.

Indications. — Rhumatisme articulaire, aigu, rhumatisme infectieux, rhumatisme chronique, goutte, sciatique, névralgies, coliques hépatiques, fièvres infectieuses, infections urinaires, état infectieux.

Posologie. — 8 à 20 pilules par jour, soit 4 à 10 grammes, à déterminer par le prescripteur.

Le flacon de 60 pilules : 16 francs.

Produits du Dr HENRI-PHILIPPE
36, quai Fulchiron — LYON.

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1° Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2° Adénoïdite aiguë de l'enfance : décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3° Accès de faux croup.
- 4° Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois II à III gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller IV à V gouttes. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 cc.

Prix : 15 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard Montparnasse — PARIS (XV°).
(Litré : 98-89.)

KIDOPHÉDRINE

Association Éphédrine-Adrénaline en solution huileuse.

Indications. — Rhinites et adénoïdites aiguës, Rhinites congestives, Sinusites aiguës fronto-maxillaires, Otites, Mastoidites, Rhinites spasmodiques, Rhume des foins, Trachéites, Coqueluche.

Mode d'emploi :

Oto-rhino-laryngologie : en instillations nasales, IV à V gouttes dans chaque narine, 5 à 6 fois par jour.

Rhume des foins, rhinites spasmodiques. — Instillations nasales 5 à 6 fois par jour et au moment où la crise s'annonce par un chatouillement du nez ou de la gorge.

Coqueluche. — Instillations fréquentes et répétées à raison de II gouttes dans chaque narine, toutes les 2 heures.

Flacon de 20 cc. : 15 francs.

Flacon de 10 cc. : 10 francs.

Laboratoire R. GALLIER

38, boulevard du Montparnasse — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 98-89.)

KINALDYNE

Élixir fortifiant

Indications. — Surmenage, Anémie, Paludisme, Convalescence, Inappétence, Neurasthénie.

Forme. — Élixir faiblement alcoolisé de goût très agréable.

Composition. — Tous les principes actifs des quinquinas.

Mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur 1/4 d'heure avant les repas.
(Le flacon pour 10 jours de traitement.)

Prix : 20 francs.

Laboratoires GAMEL

2, place de la Salamandre — NIMES.

KINÉCHOL

Composition. — Granulé soluble de goût agréable à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique. Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

Contre-Indications. — Cholécystites aiguës et dysenterie.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 17 fr. 50

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 2-75.)

KINECTINE

(Combinaison d'Hectine et d'Éphédrine.)

Spécifique de la Fièvre des Foins, de la grippe et du Coryza.

Indications. — Fièvre des foins, Coryza aigu, grippe, asthme, emphysème.

Forme. — Comprimés.

Posologie :

Adultes : 3 à 5 comprimés par jour.

Enfants : Moitié dose.

Prix : 8 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine

Docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an	2 à 4 cuill. à café par jour.		
1 à 5 ans	4 à 8	—	—
5 à 10 ans	5 à 10	—	—
Au-dessus de 10 ans	8 à 10	—	—

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRE REMEAUD

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.
(Téléphone : Molitor 04-59.)

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS

KODOS

Composition. — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'urotropine.

Propriétés thérapeutiques. — Elimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines.

Indications. — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Troubles urinaires, Asthme et Emphysème et surtout Cholémie.

Mode d'emploi. — Une pellette de poudre chaque matin à jeun au lever dans une eau très peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles) ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Prix : 9 fr. 85 et 18 fr. 75.

Laboratoire des **ABATILLES**

Route du Moulleau — ARCACHON.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, kolacatéchine, rouge de Kola.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et des maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

KOLA MONAVON

Présentation et composition :

Élixir (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).

Vin (21°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).

Granulée : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.

Pastilles : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

Indications. — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

Posologie :

Élixir : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

Vin : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

Granulée : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

Pastilles : 10 à 15 par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Élixir : 12 jours. — *Vin* : 8 jours. — *Granulée* : 8 jours. —

Pastilles : 4 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

KOLA-STHÉNYL

Élixir aux vins généreux de France et principes actifs en association très stable : *Noix fraîches de Kola*, coca, quinquina, noix vomique, Phosphate de Manganèse, arrhénal, associés à l'Acide orthophosphorique (1 partie); Phosphate acide de soude (2 parties selon les proportions de la formule de Joulie).

Propriétés-indications. — *Tonique musculaire, Tonique cardiaque, Tonique antigrippal, Reconstituant des Forces physiques et cérébrales*, remarquable par la *sûreté* et la *rapidité* de son action, dans : *Toutes les déficiences organiques, toutes les Convalescences* : médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Flacon de 155 cc. Prix : 20 francs.

Posologie. — D'un goût liquoreux très agréable, le **Kola-Sthényl** se prend pur ou dilué dans eau ou vin, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café, avant, pendant ou après les principaux repas.

Enfants : 1/2 dose.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 1244-11.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine.

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35)

KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola nature, *non caféinée* : amande traitée vivante sur place avant toute oxydation diastasique productrice de caféine (qui seule subsiste par contre dans les noix du commerce simplement séchées à l'air). Kolatine parfaitement inaltérée dans son complexe actif naturel solubilisé. *Pas d'additions médicamenteuses.*

Action toni-sédative rapide et puissante (stimulant régulateur fonctionnel avec *détente nerveuse*) sans aucune des contre-indications caféiques (excitation et dépression consécutive, troubles congestifs, palpitation, insomnie, etc...). Ni *accumulation*, ni *accoutumance*. Tolérance parfaite à tout âge (*nourrissons, vieillards*) ainsi que chez les *nerveux*, les *cardiaques*, les *hypertendus* et dans toutes les *faiblesses agitées*.

Indications. — Rétablissement du Tonus sans excitation : T. nerveux et activité cérébrale ; T. musculaire et activité physique ; T. cardiaque (*soutien régulier du cœur*) ; T. génésique et troubles par défaut (spermatorrhée, éjac. précoces, etc.). Activité digestive et anorexie ; Activité hématopoiétique (*anémie, chlorose*). Asthénies nerveuses, de la ménopause, etc. Gestation, suites de couches, allaitement. Diarrhées infantiles (effet *toni-astringent* spécial à la Kolatine). Rétablissement des *défenses naturelles* au cours ou à la convalescence des maladies infectieuses : GRIPPE, tuberculose, etc...

Chirurgie. — Traitement pré et post-opératoire.

Présentation, doses. — Poudre soluble en sachets. Boîte P. M., 10 sachets (12 fr.). Boîte G. M., 30 sachets (33 fr.).

Dissoudre dans les liquides chauds : déjeuners (lait, café, thé, cacao), Infusions, Bouillons, Eau sucrée, Grogs, etc...

Adultes et enfants : 1 à 3 sachets par jour, 2 *habituellement*.

Nourrissons : 1/4 à 1/3 de sachet à fractionner dans chaque tétée. Cure *ad libitum* sans nécessité d'interruption (*innocuité*).

Sté des Produits et Procédés CHALAS

75, rue Jacques Dulud

NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

KOUMYL

Concentrat de bacilles lactiques vivants en gouttes.

Le Koumyl est une suspension concentrée de ferments lactiques, stabilisée par un milieu qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

Avantages :

1° Maniement pratique.

Quelques gouttes versées au moyen du compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.

2° Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable auxensemencements accidentels.

3° Ne renferme pas d'acide lactique.

4° Pas de saveur désagréable.

5° Conservation pratiquement illimitée.

6° Traitement peu onéreux.

Indications :

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxication, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées.

Le Koumyl étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

Posologie :

Nourrissons : I à V gouttes trois fois par jour.

Enfants : X gouttes trois fois par jour.

Adultes : XV à XX gouttes trois fois par jour. Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

Prix : 17 fr.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

KYDALOSE

Poudre non toxique

Iode organique non caustique.

Salicylate de soude.

Priser 5 à 6 fois par jour.

Coryza aigu et chronique, Obstruction nasale et ses conséquences, Sinusites. Otites, Hypertrophie des cornets, Ozène.

N. B. — Par le salicylate de soude que contient la KYLADOSE, ce médicament convient aussi au coryza aigu et l'enraye si l'on s'en sert dès le début de la crise. Il est de plus en plus avéré que le coryza aigu n'est autre chose qu'une fluxion rhumatismale « a frigore », par conséquent justifiable du salicylate de soude employé localement. Son effet préventif n'est pas douteux.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Echantillons sur demande :

G. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B. 36-32.)

KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait bouilli revenu à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 14 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

LAB-LACTO-FERMENT- MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons.
Dans tous les cas de mauvaise digestion du lait.
Troubles gastro-intestinaux du régime lacté.
Toutes les fois que le malade a besoin d'absorber
une forte quantité de lait.

Doses. — *Pour adultes et enfants*: une cuiller-
mesure par verre de lait.

Nourrissons: une demi-cuiller-mesure par biberon
ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans
2 cuillerées d'eau. Quand l'effervescence est ter-
minée, ajouter le lait, froid, ou tiède.

Le liquide trop chaud détruirait le ferment.

Conservation : cinq années.

Flacon de 130 grammes. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

Tél. : Richelieu 35-10.

LACCODERMES

verniss souples, solubles à l'eau.

TRAITEMENT

des maladies de la peau.

« **A chaque dermatose son médicament** ».
Les Laccodermes, verniss souples, netachent pas, ne graissent pas, n'ont aucun des inconvénients des pommades et ne nécessitent aucun pansement.

ECZÉMAS : Laccoderme au goudron de houille.

DERMATOSES LÉGÈRES : Laccoderme à l'oxyde de zinc.

DERMATOSES INFECTÉES : Laccoderme à l'ichtyol.

DERMATOSES PRURIGINEUSES : Laccoderme à la stovaïne.

DERMATOSES SÈCHES : Laccoderme au soufre. — Laccoderme sulfocadique.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

Tél. : Montmartre 75-01.

LACHÉSINE

Extrait du venin
du *Trigonocephalus lachesis*.

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.).
S'abstenir pendant les règles.

Prix : 12 francs le tube de 40 comprimés.

Laboratoire RENAUD

2, rue Pierre-Demours — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 23-82.)

LACPININE

Forme. — Liquide blanc.

Composition. — Émulsion d'essence de pin naturelle.

Indications. — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

Mode d'emploi. — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacpinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	6 fr. 50
		—	150 gr. :	15 fr.
		—	750 gr. :	50 fr.
		—	1 000 gr. :	60 fr.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière
(Tél. : Lamartine 92-52.)

LAC-SER

Composition. — Lactosérum desséché.

Propriétés. — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques, Pansements (bactériothérapie).

Formes et posologie. — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 grammes de lactosérum liquide.

Dose : 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 grammes).

Prix : 16 fr. 60 (boîte de 30 paquets).

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Gobelins 23-90.)

LACTAGOL

Poudre.

Nature. — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phosphoprotéïdes, Phosphates organiques assimilables.

Mode d'emploi. — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

Propriétés thérapeutiques. — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

Indications. — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

Prix : La boîte entière : 16 fr. 50.

Pour un traitement de 10 à 20 jours.

(La demi-boîte : 9 fr. 75).

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-6.

LACTARIS

DÉSINFECTION INTENSIVE DE L'INTESTIN

Bactériothérapie polyvalente nouvelle
par précipité massif de cultures anaérobies facultatives.

ACIDOPHILES ET LACTIQUES STABILISÉES

Effet. — Hyperactif et toujours identique.

Présentation. — Ampoules de 6 cc. à sucer, pur, avec chalumaux stérilisés inclus dans la boîte.

Richesse microbienne. — Env. 5 milliards de bactéries acidophiles et lactiques en symbiose, par ampoule.

Indications. — Toutes diarrhées, entérites, hyper-intoxication intestinale. *Colibacillose*.

Dose moyenne. — *Adultes, enfants* : 2 ampoules par jour, 1/4 d'heure avant petit-déjeuner et repas du soir.

Nourrissons : 1 ampoule, mélangée au biberon.

Prix : 25 francs la boîte de 18 ampoules (cure de 9 jours).

Laboratoire CENTRAL

MASSON, Pharmacien,

129, rue de Turenne, Paris.

LACTIFÈRE CARRION

Composition :

Émulsion de *bacilles lactiques* sélectionnés, à 60 millions par cc., soit 300 millions par ampoule.

Forme :

Ampoules de 5 cc.

Indications :

Auto-intoxications intestinales, Entérites, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 ampoules par jour, *per os*, dans un peu d'eau sucrée, avant les repas.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Durée d'utilisation (date indiquée sur les boîtes) : 150 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Propriétés thérapeutiques. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.
Prix : 12 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

LACTOBYL

Composition :

Sels biliaires	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02
Charbon poreux.....	0,02
Ferments lactiques	0,05
Poudre de laminaria flexicaulis.....	0,05

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Rééducateur intestinal.

Indications. — Toutes les modalités de la constipation.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées.)

LACTOCALCINE

Comprimés.

Composition :

Ferments lactiques spéciaux..... 0,25
(Procédés Deperdussin)

Excipient..... Q. S. pour 1 comprimé.

Propriétés. — Thérapeutique lactique intensive sans déminéralisation : entérites aiguës ou chroniques, intoxications intestinales.

Particularités. — Conservation presque infinie. Désintégration et développement des ferments lactiques seulement dans l'intestin.

Doses :

Nourrissons : 1 à 2 comprimés par jour.

Enfants : 4 à 6 comprimés par jour.

Adultes : 8 à 10 comprimés par jour.

Prix : 14 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

(Tél. : Louvre 53-16.)

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérites (Adultes et nourrissons), Insuffisance biliaire.

Dose et mode d'emploi (*Comprimés et Granulés*) :

Adultes : 4 à 12 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour dans miel, confiture, avant les repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Laboratoires LOBICA,

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, deux lignes groupées.)

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif et cholagogue. Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin et du foie sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 2 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau.

Enfants : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 francs.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).
(Tél. : Ségur 55-12.)

LACTOMA LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT

Composition. — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

Indications et Posologie. — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

Enfants : demi-doses.

Avantages. — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable. (Jus de citron facultatif.)

Présentation et Prix :

Petit flacon 120 cc.....	8 fr.
Grand flacon 360 cc.	16 fr.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).
(Tél. : Nord 76-85.)

LACTOPROTÉIDE CARRION

Composition. — Lait homogénéisé pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Forme. — Ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Indications et Posologie. — Les indications sont, dans l'ensemble, celles de la Protéinothérapie :

Infections de nature diverse : générale (grippe, fièvre puerpérale, etc.) ou localisées (suppuration, pyodermites, etc.).

Une injection intramusculaire (jusqu'à 10 cc.) le plus tôt possible, la répéter après 2 à 5 jours.

Anémies : 5 à 10 cc. tous les 5 jours.

Affections oculaires : 5 cc. tous les 2 jours.

Intolérance des enfants au lait de vache : 5 à 10 cc. puis réinjecter par doses progressives : 1/2 cc. puis 2 cc. une heure après, enfin 5 à 10 cc. une heure plus tard.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de	2 cc. :	10 fr.
— de 6 — de	5 cc. :	15 fr.
— de 6 — de	10 cc. :	18 fr.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTOSEPTYL LEGRAND

Composition. — Acide lactique associé au charbon végétal chimiquement pur, au benzo-naphtol et à l'acide phosphorique.

Propriétés. — Assure la désinfection de l'intestin et empêche les fermentations. N'a pas la fragilité des ferments lactiques.

Indications. — Entérites chroniques et aiguës
Diarrhées. Dermatoses. Auto-Intoxication intestinale. Etats infectieux. Urticair.

Présentation. — Pilules enrobées d'une couche protectrice résistant au suc gastrique.

Le 1/2 tube de 80 pilules : 10 fr. 60.

Le tube de 150 pilules : 16 fr. 80.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour associées au régime.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 351-1.

Laboratoires L. LEGRAND

11, place Louis-XII — BLOIS (Loir-et-Cher).

LACTOSÉRUM CARRION-LAGNEL

Action thérapeutique. — Epuration organique dans les affections du rein, de l'appareil digestif et du système circulatoire. Restauration tissulaire au niveau des plaies.

Indications. — Néphrite, Urémie, Hypertension, Ictères et congestions hépatiques, Dyspepsies gastro-intestinales, Entérites, Colites, Cardiopathies, Artériosclérose, Pansement des plaies et brûlures.

Mode d'emploi. — En général, 200 cc. (soit le contenu d'un flacon) à jeun en deux ou trois fois. Des prises espacées peuvent être également prescrites. Il est loisible de sucrer ou d'aromatiser le Lactosérum.

Pour les pansements, imbiber les compresses ou les mèches, ou pratiquer des instillations.

Présentation et prix. — Le flacon 5 francs. — La boîte de 4 flacons : 20 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTO-SÉRUM LAVRIL

Désintoxication. Équilibre colloïdal. Diurèse.

Cure de désintoxication (5 à 10 jours) : Foie, Intestin, Rein, 1 flacon de 200 cc. pris à jeun en trois fois à 20 minutes d'intervalle.

Diète : Prescrire grande cure 120 cc. toutes les 2 heures. Opérés, Fiévreux, Grip., Typh., Scarl., Entér., Colib., Pyélo., Urémie.

Dermatose Alcalose : L.-S. L. Hyperacide pH : 4,5. Même posologie.

Enfants : Gastro-entérite, grande cure 7 biberons de 80 cc. L. S. L. pur
Troubles d'assimilation : mélanger 30 % de L.-S. L. au lait du biberon.

Petite cure, 5 flacons : 24 fr. 50. Grande cure, 1 litre : 15 francs.

Alcaliniser, sucrer, aromatiser à volonté (jus de fruit, café, rhum).

LACTOSMOSE

Pansement anaseptique.

Désinfection : bacille lactique en poudre.

Cicatrisation : Lacto-Sérum, isotonique.

Chirurgie. Urologie. Dermato. Néo. Orl.

Réunir poudre et sérum *ad. lib.* sans précaution ni dosage.

En général : Saupoudrer la plaie et mettre une compresse de sérum.

Boîte de pansement, 7 pansements 19 fr. 50

Boîte n° 2 (Grand Modèle pour plaies étendues), 6 pansements de 100 cc. 26 fr.

Poudre pour plaies légères et pansement sec..... 12 fr. 80

Toutes les indications du Dakin.

Plaie accident, profonde, suppurante, périnéale, atone, brûlure, cystite, Ulc. Esc. Néo. Gang. Diab. Absès, App. sup. Fistule, Ostéom. Sinusite, Ozène.

Gynécologie Obstétrique, Rectum.

Boîte de Bouillie lactique avec seringue..... 22 fr.

Boîte de Bouillie lactique sans seringue..... 20 fr.

Mélanger dans un verre proportionnellement poudre et liquide.

Appliquer cette bouillie directement ou sur mèche ou à la seringue sur le col apr. acc., sur les déch., ulcér., sutures, épis., champ opérat.

Mérite : la malade prép. bouillie, injecte av. seringue apr. coucher.

Ovule au Lactosmose comme d'usage.

GYNO-LACTOSMOSE

Injection vaginale acide pH : 4,5.

Bacille lactique en poudre. Glucose et acide lactique en solution,

1 mesure de poudre, 1 mesure de liquide pour 1 litre d'eau.

Injection lente de 1 litre sans pression. *Ne jamais employer pur.*

Toutes Leucorrhées. Aff. vaginales, Prurit, Vaginite sénile et puérile

Hygiène féminine : 1/2 mesure de chaque sorte, Injection de 1 litre.

Reconstitue l'état physiologique. Désinfecte. Tonifie la muqueuse.

LACTACID

Pommade acide pH : 4,5.

Restitue l'acidité de la peau. Assure la désinfection et la cicatrisation.

Toutes dermatoses et prurits.

Acide lactique, Bacille lactique, Lacto-sérum ZnO : 13 fr. 50.

Laboratoires LAVRIL PACY-SUR-EURE (Tél. : 10)

26, bd des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marc. 21-14.

LACTOSODINE

Composition et Propriétés thérapeutiques. — La *Lactosodine* renferme :

- 1° Des bacilles lactiques sélectionnés : *Bacillus Lacticus de Pasteur* ; *Bacille Bulgare*.
- 2° Des sels de chaux assimilables qui *neutralisent l'action déminéralisante* de l'acide lactique.
- 3° Du citrate de soude dont l'action eupeptique et le pouvoir antiémétisant ne sont plus à discuter.

Indications. — Toutes affections gastro-intestinales de l'adulte comme du nouveau-né. Dermatoses d'origine digestive.

Présentation. — *Comprimés* : La seule forme qui soit pratique — les bouillons, en effet, ne se conservent pas, — ont d'autre part une odeur et une saveur désagréables qui en rendent l'absorption souvent difficile aux adultes et impossible aux enfants.

Vitalité et conservation des B. L. : Pratiquement la même pendant 6 mois.

Ensemencer — à la température de 37° — avec 2 gr. 50 de *Lactosodine*, 20 cc. de bouillon de Touraillons, peptonisé et lactosé : Vous trouverez, à l'analyse, au 4^e jour :

- 1° Avec des comprimés de fabrication récente 5 gr. 65 d'acide lactique.
- 2° Avec des comprimés datant de 6 mois 5 gr. 55 d'acide lactique.

Posologie :

Nourrissons : 1 à 3 comprimés par jour, délayés dans un peu de lait bouilli et tiède.

Enfants : de 4 à 6 comprimés.

Adultes : de 6 à 10 comprimés délayés dans un peu d'eau sucrée.

La *Lactosodine* assure l'antisepsie du tube digestif, sans déminéralisation.

Prix : 17 francs.

Laboratoires de l'UROIODINE

17 bis, rue Juge (XV^e).

(Tél. : Suffren 08-02 et 41-22.)

LAITANCYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.
Deux formules :

1° *Laitancyl simple*, comprimés dragéifiés de laitances de harengs, très riches en phosphore, desséchées dans le vide et à froid, sans goût ni odeur.

Leur action est renforcée par de l'huile de germe de blé (vitamine E), de l'Huile de flétan (Vitamine D), de la Cérébrine, et de l'inositophosphate de chaux et de magnésie.

2° *Laitancyl méthylarsiné*, même formule additionnée d'arrhéнал (0,008) et de fenugrec désodorisé et déshuilé.

Propriétés. — Le *Laitancyl* est un reconstituant général de tout premier ordre, et un excellent aliment phosphoré.

Indications. — Anorexie, amaigrissement, surmenage physique et intellectuel, asthénie post-grippale, rachitisme, toutes adynamies et débilités.

Posologie :

Adultes : 4 à 5 comprimés par jour.

Enfants (à partir de 7 ans), 3 comprimés.

Prix : 20 francs.

Laboratoire du Laitancyl: R. PANIER
MALO-LES-BAINS (Nord).

LAIT CALCIQUE ZIZINE

Lait sec, partiellement écrémé et décaséiné.

Forme. — Poudre.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment de transition pour la reprise du régime lacté. Alimentation des nourrissons dyspeptiques et eczémateux.

Indications. — Chez les vomisseurs, les diarrhéiques, les dyspeptiques, les eczémateux, les nouveau-nés privés du sein et dans tous les cas d'intolérance lactée.

Mode d'emploi. — Pour préparer un biberon, ajouter à 100 cc. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5 p. 100, deux cuillerées à entremets arasées de lait calcique sec. Agiter pour dissoudre.

Pour une quantité supérieure, verser une cuillerée par 50 cc. d'eau supplémentaire.

Pour la préparation des décoctions farineuses, l'eau bouillie peut être remplacée par une quantité égale de décoction de riz ou d'orge, sucrée ou non, suivant les indications du médecin.

Les bouillies au LAIT CALCIQUE sont préparées avec 50 cc. de bouillie tiède pour une cuillerée à entremets de LAIT CALCIQUE ZIZINE.

Valeur calorique du lait ainsi reconstitué :
685 calories environ.

Prix : 8 francs.

Laboratoires du Dr. ZIZINE.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

LAIT DARDELET (MODIFIÉ)

pour Nourrissons.

Lait humanisé n° 1 (Système Backauss modernisé). Semblable par sa composition et sa structure au lait de femme. Ne contient ni eau surajoutée, ni antiseptique. Allaitement de tous les nourrissons et spécialement des intolérants au lait, des prématurés, etc...

Lait humanisé n° 2. Même préparation que le précédent, mais composition intermédiaire entre le n° 1 et le lait de vache. Tous mes produits sont homogénéisés et donnent un coagulum semblable à celui du lait de femme. Conservation sous le vide.

Babeurre Dardelet (Voir rubrique *Babeurre*).

Mode d'emploi. — Pour tous mes produits, faire tiédir au bain-marie et donner pur ; mêmes doses que le lait maternel.

Prix. — En bouteilles (départ usine) 1/4 de litre : 3 francs.

Caisses de 25 ou 50 bouteilles.

Notre situation au centre de la France et sur une grande ligne nous permet des envois immédiats en Province.

Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET, Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne) — (Tél. : 4.).

La Maison est à la disposition des Docteurs, désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

LAIT DÉCHLORURÉ GUIGOZ

(Concentré à 2 1/2 pour 1, stérilisé non sucré.)

L'extraction du chlorure de sodium est obtenue par dialyse. Ce lait, qui conserve la saveur agréable d'un bon lait naturel, est un précieux agent thérapeutique *diurétique* et *déchlorurant*.

Après reconstitution, sa teneur, exprimée en Cl Na, est réduite à 0 gr. 023 par 100 cc., soit au huitième du lait complet.

Indications. — Toutes rétentions chlorurées : Néphrites, Ascites, Hypertension avec insuffisance rénale, Hyperchlorhydrie, Albuminuries, Néphropathies gravidiques, Accélération de l'accouchement.

Mode d'emploi. — Doit être dilué dans une fois et demie son poids, soit pour une boîte de 500 grammes, dans 750 grammes d'eau bouillie. Les aromates, permis par le régime, peuvent lui être ajoutés. Ne jamais tolérer l'ingestion d'aucun aliment, quel qu'il soit, pendant la digestion du produit.

Voir :

Lait en poudre *Guigoz* ; Lait Dextrosé Malté *Guigoz* ; Babeurre *Guigoz* ; *Ravix* (Lait *Guigoz* irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT LACTOMA

Composition. — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

Indications et Posologie. — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

Enfants ; demi-doses.

Avantages. — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable, (Jus de citron facultatif.)

Présentation et Prix :

Petit flacon 120 cc.....	8 fr.
Grand flacon 360 cc.....	16 fr.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-acide, Sédatif gastrique, Laxatif.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, États bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique.

Posologie. — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

Laxatif. Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Anti-acide buccal. — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

Échantillons et Littérature sur demande à

O. C. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse), est livré sous 3 formes : Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, **conserve indiscutablement toutes ses vitamines** et dispense de l'adjonction du jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons* : Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes : Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Dose. — Une partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : **Babeurre GUIGOZ.**
Lait dextrosé-malté GUIGOZ.
Lait déchloruré GUIGOZ.
Ravix (lait irradié).

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Wag. 66-76 et 77.)

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

(Dextrosé-malté.)

Identique au Lait en poudre Guigoz, $\frac{1}{2}$ écrémé mais sans adjonction de saccharose, ce dernier étant remplacé par « Dextrose et Maltose ».

Indications. — *Pour nourrissons* : Intolérance au saccharose, Constipation, Fermentation intestinale, Eczéma.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 45 à 50 gr. d'eau.

Voir : **Lait en poudre GUIGOZ.**
Babeurre GUIGOZ.
Lait déchloruré GUIGOZ.
Ravix (lait irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).
 (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAIT GALLIA — CH. GERVAIS

Lait concentré sucré.

Préparé à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure), concentré dans le vide à basse température, conserve ses vitamines et ses éléments actifs. Valeur nutritive régulière, composition constante, très assimilable et digestible, c'est l'aliment type du nourrisson privé en partie ou en totalité de lait maternel.

Est également un reconstituant précieux pour enfants et adultes.

Présentation en boîtes serties, infraudables, de 200 et 400 grammes.

GALLIASEC CH. GERVAIS

Lait en poudre.

Deux présentations, sucré et non sucré, solubilité totale, digestibilité remarquable pour tous les cas d'intolérance lactée dans l'allaitement au sein ou l'allaitement artificiel (au lait concentré ou naturel).

Premiers jours de la vie, prématurés, débiles, nourrissons atteints de troubles digestifs ou intestinaux.

A noter que son emploi tend à se généraliser pour l'alimentation des nourrissons sains et normaux.

CARNET DE SANTÉ GALLIA

(Feuille de pesées GALLIA)

Pour nourrissons, permet l'établissement d'une documentation médicale précieuse pour le Médecin et la Maman.

BIBERON GALLIA

(Dosage précis des repas.)

Tarif spécial consenti au Corps médical. Pour échantillons gratuits. dosages, tous renseignements, s'adresser à :

CH. GERVAIS, S. A.

11, rue de Prony, PARIS (XVII^e) — (Tél. : Carnot 54-63.)

LAITS CARRION

Préparés, aussitôt après la traite, à la laiterie Carrion d'Avesnes-en-Bray (Normandie).

1° *Pour l'alimentation des nourrissons normaux :*

Lait alimentaire : homogénéisé et stérilisé.

Lait demi-dégraissé : homogénéisé et stérilisé.

Diluer ces deux laits avec de l'eau bouillie, jusqu'au huitième mois.

2° *Pour l'alimentation des prématurés et des sujets débiles :*

Lait humanisé, homogénéisé et stérilisé, de composition ramenée à celle du lait de femme.

A consommer sans addition d'eau.

3° *Pour l'alimentation des sujets atteints de troubles digestifs :*

Lait écrémé, centrifugé et stérilisé.

4° *Pour réaliser une suralimentation :*

Lait suralimentaire, enrichi de la quantité de crème prescrite par le médecin.

5° **Laits fermentés Carrion-Lagnel.** — *Kéfir* et *Yohourth* (livraison dans Paris).

Pour leur fabrication domestique, voir « Kéfirogène » et « Yohourthogène ».

Présentation et prix :

Lait alimentaire, demi-dégraissé ou humanisé : la bouteille de 200 grammes 1 fr. 75 ; la bouteille de 400 grammes 3 francs.

Lait écrémé : la bouteille de 400 grammes 2 fr. 50.

Kéfir : le flacon de 200 cc. 2 fr. 50.

Yohourth : le pot de 175 grammes 2 fr. 50 ; le pot de 140 grammes 1 fr. 50.

Laboratoires CARRION-LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e)

(Tél : Ségur 40-30.)

LANCERYL

Composition. — Formule de Lancereaux :

Digitale Standard	} aa 0,05
Scille	
Scammonée	

Avantages. — Composants stabilisés et titrés **physiologiquement**.
Complexe préparé à l'abri de toute humidité conservant une valeur thérapeutique constante.

Action. — Toni-cardiaque, diurétique albuminurique et azoturique, stimulant hépatique.

Indications. — Cardiopathies subaiguës et chroniques, œdèmes périphériques, rétention chlorurée et azotémique, cirrhoses, congestions du foie et toutes affections hépatiques.

Posologie. — 3 à 5 pilules par jour pendant 10 jours. Arrêter 5 jours et recommencer. Dose pouvant être modifiée au gré du médecin traitant, car LANCERYL est de prescription uniquement médicale.

LANCERYL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1009-1.

Prix : 18 francs.

Laboratoires E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS.

(Tél. : Turbigö 87-05.)

LANSOYL

Huile de paraffine chimiquement pure exempte de substances cancérogènes, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Forme gelée. — 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de sucres de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, inflammation, Entéro-colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes* : 2 cuillerées à café matin et soir.
Enfants : une cuillerée à café matin et soir. Augmenter ou diminuer légèrement suivant l'âge de l'enfant.

Prix :

Liquide G. M. (20 jours de traitement).....	20 fr.
— P. M. (10 — — —).....	12 fr.
Gelée (12 — — —).....	14 fr.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Galvani 84-41.)

LANTOL

Anti-infectieux omnivalent.

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium (Procédé Couturieux) ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose intense et durable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux hyperthermiques.

Enfants : Une à deux ampoules par jour en *injection* ou en *lavement* à conserver.

Prix : 30 francs pour 1 à 8 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

Tél. : Carnot 18-75.

LARGOCOL GEF

Dragées.

Composition. — Poudre de bourdaine fraîche, Benzonaphtol et sels biliaires.

Forme. — Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Assure une désinfection intestinale parfaite, excite la sécrétion biliaire ; régularise et renforce les mouvements péristaltiques.

Jamais de coliques.

Indications. — Constipation. Troubles hépatobiliaires, Dermatoses.

Posologie. — Dose normale : un comprimé au repas du soir.

Dose forte : un comprimé à midi et un le soir.

Prix : 12 francs la boîte de 50 comprimés.

Laboratoires GEF

Franck GEORGET, Pharmacien,
269, rue Judaïque — BORDEAUX.

Tél. : 870-26.

LARISTINE « ROCHE »

Traitement biochimique nouveau des ulcères gastro-duodénaux. (Travaux prof. Weiss, Aron; etc.)

Composition. — Solution isotonique, neutre et stérilisée à 4 p. 100 de chlorhydrate d'Histidine en ampoules de 5 cc. et de 1 cc. Boîtes de 6.

Propriétés. — Dès les premières injections, sédation des douleurs et de l'intolérance gastrique ; reprise remarquable de l'état général.

Posologie et modes d'emploi. — Une injection quotidienne intramusculaire parfaitement indolore d'une ampoule de 5 cc., ou intradermique d'une ampoule de 1 cc., pendant 3 semaines.

Aucune toxicité ; pas de contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-65.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

LAROSAN « ROCHE »

Caséine-Calcium.

Spécifique de la Diarrhée infantile.

Avantages. — Alcalinisation du milieu intestinal. Suppression du petit lait. Apport minimum de sucre. Taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons. (Diarrhées simple, lientérique, verte, infectieuse, cholériforme. Diarrhées de dentition et de sevrage. Athrepsie, etc.)

Diarrhées toxiques des enfants et des adultes. Etats dyspeptiques des adultes. Ulcère de l'estomac, etc.

Modes d'emploi et doses :

On prépare des mélanges : Eau bouillie, Lait, Larosan, contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas.

Boîte de 100 gr.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-20.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

LAROSCORBINE « ROCHE »

Composition. — Acide l-Ascorbique synthétique (Vitamine C cristallisée).

Propriétés. — Favorise tous les phénomènes d'oxydo-réduction au cours des divers processus biologiques. Aucune toxicité.

Indications. — Décalcification des os et des dents. Altération des vaisseaux, Hémorragies, Troubles de la nutrition au cours de la grossesse, Anémie et troubles de la croissance des nourrissons, Maladie d'Addison, etc...

Doses et modes d'emploi. — *Comprimés, Ampoules.*
1 comprimé = 0 gr. 05 acide-l-ascorbique = 1.000 U. I.
1 ampoule = 0 gr. 10 acide-l-ascorbique = 2.000 U. I.
2 à 3 comprimés par jour ou 1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées, intramusculaires ou même endoveineuses.

Tube de 20 comprimés. Boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-71 (*Comprimés*) et 504-72 (*Ampoules*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10).

LASAL

Spécifique des maladies des voies respiratoires et de leurs convalescences,

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et en même temps reconstituant par l'association d'un tonique (Glefina) (voir ce mot). Bonne saveur, ne provoque pas d'intolérance.

Composition. — Ortosulfogaiacolate de potassium, sirop de sève de pin, de goudron, de baume de tolu, associés à une partie de Glefina reconstituant (voir ce mot).

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires et particulièrement leurs convalescences, bronchite chronique, rougeole, coqueluche, tuberculose, grippe, etc...

Posologie:

Enfants : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— 6 à 10 ans : 2 à 3 — à dessert par jour.

— 11 à 15 ans : 2 — à soupe par jour.

Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

LASAL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 689-12.

Prix : du flacon. 19 fr. 90.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLEFINA,

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 10 francs. — Le demi-litre : 6 fr. 25.

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antisepsie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL N° 2, désinfectant, sans odeur, ni mercure. Savon Laurénol 4 francs. — Savon dentifrice : 6 francs

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 francs. — Le demi-litre : 4 francs.

Laboratoires BELIERES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

PASTILLES MIRATON CHATEL-GUYON. —

Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

Prix : la boîte 6 fr. 50

Pour un traitement de 20 à 30 jours.

GRAINS MIRATON CHATEL-GUYON. —

Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Prix : le flacon 7 fr. 50

Pour un traitement de 30 à 50 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-7 (grains)
n° 218-8 (pastilles).

Littérature et échantillons :

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines.

Citrate de soude, Eupeptiques, poudre agréable à prendre.

Mode d'emploi. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans lait ou eau bouillie.

Enfants : doubler ou tripler les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des fonctions digestives, antiseptique intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes enfants.

Indications. — Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infectieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomissements du nourrisson et de l'adulte, Constipation infantile.

Prix : le flacon 12 francs.

Pour un traitement de un mois environ.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-4.

LAXORANGE CONNAT

Forme : Liqueur.

Indications. — Spécifique de la constipation.

Formule :

Extrait fluide séné	2
Ext. Cascara sagrada	5
Ext. Rhamnus frangula	5
Saccharolés liquides d'oranges douces. 100 gr.	Q. S. P.

Posologie. — Un verre à liqueur après le repas de midi et du soir.

Enfants. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas. Préparation de goût très agréable.

Prix : 16 francs.

Laboratoires M. FOLLIET
RUMILLY (Haute-Savoie).

LÉCITHINE COLLOÏDALE

« Helpin »

Solution de 10 p. 100 de Lécithine colloïdale stabilisée et d'un pH de 7,3.

INDOLORE

INOFFENSIVE

La Lécithine colloïdale « Helpin » est résorbée rapidement par les cellules normales et surtout par les cellules pathologiques sans subir aucune décomposition. (*C. R. Soc. Biol.*, séance du 14 décembre 1935.)

Indications. — Tuberculose, sous toutes les formes, à tous ses degrés. Insuffisance et fatigue cardiaque, réactive l'action des tonicardiaques. Déficiences organiques : anémie, convalescence, asthénie, fatigue. Cures de désintoxications, toxicomanies. Troubles endocriniens, en particulier ceux de la puberté. Cures d'engraissement, seule ou associée à l'insuline.

Posologie. — Environ 20 injections sous-cutanées ou intramusculaires de 1 ou 2 ampoules de 1 cc. 5 par jour ou tous les deux jours. Même dose pour les enfants.

Présentation. — Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. 5 et modèle hôpital.

Produits SYNERGA

8, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 95-03.

LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle ; Chlorose, diabète, rachitisme ; Convalescences longues et pénibles.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

LENADRYL

(Huile rhinologique)

Composition. — Antiseptiques végétaux, camphre, eucalyptol, terpinéol, en solution huileuse spéciale adrénalino-éphédrinée (formes lévogyres).

Propriétés. — Synergie lénifiante, vaso-constrictive, décongestive et antispasmodique. Bactéricide, analgésique, cicatrisant. Ni caustique, ni toxique. Ne dessèche pas la muqueuse.

Indications. — Coryzas aigus et chroniques, rhumes des foins, sinusites, ozène, trachéites, laryngites ; inflammations et infections du rhino-pharynx, asthme.

Mode d'emploi. — Formes :

Flacon compte-gouttes spécial : X à XII gouttes matin et soir dans chaque narine, la tête penchée en arrière et du côté de la narine traitée.

Capsules nasales :

Adultes et auto-injections : 1 capsule dans chaque narine.

Enfants : une demi-capsule dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.

Prix : Le flacon compte-gouttes : 17 francs.

La boîte de capsules nasales : 12 francs.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

LÉNIBAR

Pansement du tube digestif à ^gd pouvoir couvrant.

Principes actifs. — Sulfate de baryte, Oxyde, Peroxyde de zinc et Charbon activé.

Indications. — Douleurs gastro-intestinales. Ulcères (traitement préventif et post-opératoire) — Hyperchlorhydrie — Spasmes — Colites — Diarrhées — Intoxications alimentaires.

Forme. — Granulé.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café chaque jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café chaque jour.

Le matin à jeun — 1/4 d'heure au moins avant les repas — ou au moment des douleurs.

Croquer ou avaler et boire 1/2 verre d'eau.

Prix : 12 fr. 50

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

— Tél. : 32. —

LENIENTOL

Composition. — Seule préparation présentant sous la *forme liquide* l'association médicamenteuse : phényléthylmalonylurée et *tartrate borico-potassique*. — Sans bromure.

Indications. — Epilepsie, Crises nerveuses, Insomnies, Angoisse, Spasmes divers, Chorée, Troubles névropathiques en général, etc.

Deux formes :

Lenientol adultes. — Prix : 20 francs.

Une cuillerée à soupe contient :

Phényléthylmalonylurée ...	0,05 cgr.	{ 1 flac. dure 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,50 cgr.	

Lenientol infantile. Prix : 15 francs.

Une cuillerée à café contient :

Phényléthylmalonylurée...	0,01 cgr.	{ 1 flac. dure 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,10 cgr.	

Laboratoire DEMOULIN

27, rue Brézin — PARIS (XIV^e). — (Tél. : Ségur 76-90.)
et O. C. P.

LENIFÉDRINE

Composition. — Huile antiseptique à l'Oléate d'Ephédrine. Solution *faible* à 0 gr. 50 p. 100 et solution *forte* à 1 gr. p. 100.

Indications. — Affections des voies respiratoires supérieures : Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Présentation. — Se vend :

- 1° En flacons compte-gouttes brevetés.
- 2° En flacons ordinaires pour pulvérisations.
- 3° En rhino-capsules pour auto-injections nasales.

Prix flacon compte-gouttes. 15 fr.

— ordinaire 14 —

Rhino-capsules 12 —

L. GAILLARD, Pharmacien,
26, rue Pétrelle — PARIS (IX^e).

LENIFORME .

Composition. — Huile à 2, à 5, et 10 p. 100 d'Essences végétales antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Forme et mode d'emploi. — Se vend en flacons pour instillations et pulvérisations.

Est également présenté à 2, à 5 et 10 p. 100 sous forme de **Rhino-Capsules** en gélatine pour auto-injections nasales.

Prix : Le flacon : 12 fr.

Rhino-Capsules : 10 fr.

L. E. V. A. — L. GAILLARD, Ph^{ien}.
26, rue Pétrelle — PARIS (IX^e).

LÉNIIOR BONNET

LÉNIIOR A L'OXYDE DE ZINC.

Composition. — Oxyde de zinc, Amidon, Lanoline, Vaseline. Ce produit est une pâte poreuse et non une pommade occlusive.

Indications. — Toutes démangeaisons, Rougeurs, Eczémas sous toutes ses formes. Crevasses et ulcère du sein. Herpes:

Emploi. — Étaler en couche mince, recouvrir d'une toile.

LÉNIIOR AU COALTAR.

Composition. — Coaltar lavé, oxyde de zinc, Lanoline, Vaseline. Propriétés décongestionnantes desséchantes et antiprurigineuses très puissantes.

Indications. — Eczémas vésiculeux, amorphes, papulo-vésiculeux, séborrhéiques. Eczéma des nourrissons.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir.

LÉNIIOR AU SULFATE DE CUIVRE.

Composition. — Vaseline, Sulfate de cuivre, Sulfate de zinc, Soufre précipité, Oxyde de zinc, Lanoline.

Indications. — Impétigo chronique et rebelle; Streptococcies cutanées; Pyodermites.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir, après avoir fait tomber les croûtes.

Prix : Tube géant : 7 fr. 50.

Laboratoires du STÉAROL

5, rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

LÉOTAMINE

Pommade à base d'Insuline « Leo » et de Vitamines A et D.

Indications. — Accélère la cicatrisation des plaies de guérison difficile chez les personnes anémiques, asthéniques, hémophiles et principalement chez les diabétiques.

Forme. — Tube de 15 et 30 grammes.

Mode d'emploi. — Application directe sur la plaie; couvrir la plaie d'un pansement aseptique.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX.

Dépositaire :

Pour la France : **Jean DEDIEU,**
pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

LEPTAB

Évacuant intestinal, spécifique du péristaltisme.

Comprimé à base de : résine pure de jalap, résine de scammonée, scille, badiane, sans action drastique.

Action. — Synergie médicamenteuse, évacue rapidement le contenu septique de l'intestin, assure la disparition du *Colmatage du grêle*.

Indications. — Toutes affections de l'appareil digestif, avec retard du transit, et leurs conséquences : constipation, ballonnement, aérophagie, migraines, névralgies, affections cutanées, acné, eczéma, urticaire, etc.

Présentation. — Deux modèles sous boîte aluminium : 10 francs (8 jours) ; 30 francs : (1 mois).

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

LEPTOL

Les 1^{ers} comprimés laxatifs français à base de **Leptandrine** (extrait du Rhizome de *Leptandra Virginica*, Amérique Nord).

Ne contient pas de Phénolphthaléine.

Laxatif doux mais actif. . { pas de coliques.
pas d'irritation.
aucune toxicité.

Aucune contre-indication : peut être donné en période de grossesse et d'allaitement.

1/2 à 2 comprimés le soir au dîner.

Augmenter ou diminuer la dose suivant effet.

Laboratoires du LEPTOL

333, rue Vaugirard, PARIS-XV^e. - Vau. 44-73.

LÉTHALGOL

Suppositoire analgésique et spasmolytique.

Composition. — Ether trichlorbutyl-salicylique (sédatif), Diméthyl-amino-phénazone (analgésique); Acéto-tartrate d'aluminium (antiphlogistique).

Avantages particuliers. — Plage posologique étendue; tolérance parfaite; restreint l'utilisation des narcotiques; s'emploie en pédiatrie.

Indications. — Toutes dystonies douloureuses segmentaires ou diffuses. Algies de tractus génital, péri-génital et gastro-intestinal. Accouchements laborieux. Algo-spasmes de la ménopause. Douleurs cataméniales. Coliques hépatiques et néphrétiques. Spasmes vésiculaires. Ulcus. Algies cancéreuses. Otalgies. Névralgies diverses, etc...

Posologie :

Adultes : 1 et jusqu'à 3 suppositoires consécutifs, à répéter une ou plusieurs fois si nécessaire.

Enfants : 1 à 3 par jour, suivant l'âge (au-dessus de deux ans seulement).

Boîtes de 6	10 fr.
— de 12	18 fr.

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.

Application. — Pansements utérins. — 2 formes :

1° — CRAYONS

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros.

Indications. — Métrites, Affections du colet du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N. B. — Utiliser pour l'application l'appareil « Porte-pansement » spécial.

2° — OVULES

Indications. — Tous les cas d'infection des voies génitales. Un ovule tous les jours.

Le crayon à 1 micro : 12 fr. ; à 3 micros 18 fr.

à 5 micros : 25 fr. ; à 10 micros : 35 fr.

La boîte de 5 ovules : 30 francs.

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

LEVULINYL

Composition — Levulinate de calcium $(C^5H^7O^3)^2 Ca$.

Indications. — *Toutes les indications du Gluconate de Calcium avec action renforcée.*

Récalcifiant intensif. Hémostatique. Œdèmes. Diarrhées aiguës et chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diabète. Affections graves du foie. Antichoc comme solvant des principaux sels métalliques (sels d'or arsenicaux, etc...), dont il empêche les accidents d'intoxication.

Présentation :

Cachets à 0,50 : boîte de 24 cachets.

Ampoules 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

(Solutions à 10 p. 100 et à 15 p. 100.)

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson bien sucrée).

Posologie. — 1 à 2 cachets par jour pendant les repas. — 2 à 4 injections par semaine.

Le Levulinate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du LEVULINYL

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — *Comprimés* de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Prix : 25 francs pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

Médicament de la nausée et des vomissements nauséux.

Forme. — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

Doses. — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

Mode d'emploi. — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Indications. — *Toutes les nausées*, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. *Nausées d'origine psychique* (émotions, dégoûts), *d'origine auriculaire* (vertiges), *d'origine digestive*, *pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

Contre-indications. — Aucune. Médicament atoxique.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires DUCLOY et Cie.
ARQUES (Pas-de-Calais).

LIMOL CHURCHILL

Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable, Recalcifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi — Adultes :

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 18 francs.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du Dr CHURCHILL
12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}). Tél. : Opéra 72-96.

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*.

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate basique de Magnésie susceptible de conservation.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées, ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 cc. ; flacon pour *enfants* de 50 cc.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue d'une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour adultes : 6 francs ; flacon pour enfants : 4 francs.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 704-1 et 704-2.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine).
(Tél. : Tremblay 04-48.)

LIPAUIROL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

Mode d'emploi. — Faire chaque semaine 2 injections intramusculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

Durée du traitement. — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

Présentation. — En boîtes de 3, de 6, ou de 12 ampoules de 1 ou 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

Prix de vente au public :

La boîte de 3 ampoules de 1 cc.....	19 fr.
La boîte de 3 ampoules de 2 cc.....	30 fr.
La boîte de 6 ampoules de 1 cc.....	34 fr.
La boîte de 6 ampoules de 2 cc.....	57 fr.
La boîte de 12 ampoules de 1 cc.....	63 fr.
La boîte de 12 ampoules de 2 cc.....	100 fr.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin, PARIS.

LIPIODOL LAFAY

Huile iodée à 40 p. 100
contenant 540 mgr. d'iode par cc.

Emplois en thérapeutique. — *Générale* : Toutes les indications de l'iode et des iodures sans iodisme.

Locale : Sciaticques, Lumbagos, Algies diverses, etc...

Emplois en radiologie. — Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier. Exploration du système nerveux, des voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des abcès, des fistules, etc.

Présentations. — Flacons de 20 cc. 22 fr. ; boîtes d'ampoules, 12 amp. de 1 cc., 23 fr. ; 8 amp. de 2 cc., 23 fr. ; 6 amp. de 3 cc., 25 fr. ; 4 amp. de 5 cc., 25 fr. ; 1 amp. de 10 cc., 11 fr. Flacons de capsules, 20 cgr. d'iode par capsule, 50 capsules, 20 fr. ; 25 capsules, 11 fr. Étuils de comprimés chocolatés, 4 cgr. d'iode par comprimé, 50 comprimés, 12 fr.

André GUERBET et Cie

22, rue de Landy — SAINT-OUEN (Seine).
(Tél. : Marcadet 36-56.)

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoïdes et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

Indications. — *États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Doses. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

La boîte de 12 amp. Prix : 22 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr. : Chevrematte-90 Paris.

LIPOCRINYL

Hormonothérapie ambo-sexuelle par les lipoides orchitiques d'animaux jeunes.

Composition. — Lipoides orchitiques totaux : 0 gr. 10, (correspondant à 0 gr. 80 de glande fraîche) pour une pilule.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre hormonal altéré par manque ou insuffisance de sécrétions endocriniennes. Activité s'exerçant indifféremment sur les deux sexes.

Indications. — *Chez l'homme : Hypertrophie de la prostate et ses troubles urinaires* (travaux du professeur Champy), Présénescence, Impuissance, Déclin génital. *Chez la femme : Troubles nerveux dépressifs liés à la ménopause et à la puberté.* *Chez les deux sexes : Neurasthénie d'origine sexuelle.*

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour réparties dans l'intervalle des principaux repas.

Prix : le flacon de 100 pilules : 30 francs.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

LIPOIODINE

Diiodobrassidate d'éthyle

CIBA

IODE ORGANIQUEMENT COMBINÉ.

La Lipiodine (41 p. cent d'iode) remplace avantageusement les iodures et iodiques à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indications. — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle, Angine de poitrine, Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goître, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — *Adultes :* 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants :* 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 6 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du Professeur Lemoine.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycètes. Possède les propriétés curatives, des vaccins les plus actifs.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale. Innocuité absolue.

La Liposeptine se présente également sous la forme de petites pilules, pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections. Dose moyenne : 4 petites pilules par jour.

Boîte de 5 ampoules.

Tube de 50 pilules.

Laboratoire de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSEPTOL

Composition. — Pâte anti-infectieuse, à base de Liposeptine du Professeur G. Lemoine, et de lipoides.

Indications. — Traitement très rapide des plaies atones, des brûlures et des ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Etendre la pâte sur un morceau de gaze de la dimension de la surface malade, recouvrir d'un morceau de gaze plus grand, maintenir le tout par une bande ou fixer simplement les bords par des languettes de Leucoplaste.

Laboratoire de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV°).

R. C. Seine 230-970-D.

Télégrammes : Liposeptine 21, Paris.

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSPLÉNINE DU D^r GROC

Opothérapie splénique spécifique (Soula).
Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Références scientifiques propres à la Liposplénine du D^r Groc :

Communications : Académie de médecine :
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Société de Biologie : 22 décembre 1928,
16 février 1929, 21 décembre 1929.

XX^e Congrès de médecine de Montpellier :
18 septembre 1929.

II^e Congrès du Paludisme : Alger, 19-21 mai
1930.

Société de Thérapeutique, Paris : 12 octobre
1930, 8 février 1933.

Société d'Hématologie, Paris : 3 février 1932.

Société de Pédiatrie, Paris : 18 juin 1935.

Société de médecine infantile de Bordeaux
et du Sud-Ouest : 20 octobre 1935.

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme*
(1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits*
Lipidiques d'organes (1928) ; D^r Radji,
Contribution au traitement des Anémies avec
splénomégalie (1929).

Composition. — 1^o Lipides insaponifiables
contenus dans la pulpe splénique, dont le
cholestérol, extraits par un procédé spé-
cialement établi par le P^r L.-C. Soula ;
2^o l'Insaponifiable X partiellement soluble.

Indications. — 1^o *Médication spécifique*
des :

- a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et la nature, sauf les anémies de Biermer).
- b. Amaigrissements graves et persistants.
- c. Anémies et déminéralisations en cours de grossesse ou après un accouchement pénible.
Points névralgiques dorsaux.
- d. Retards de croissance, débilité infantile, tous états rachitiques, lymphatisme, déminéralisations, troubles douloureux dentaires du nourrisson, eczéma du nourrisson.

Surmenage, Convalescence, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue générale, Inappétence, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 20 fr.), séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon ce rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.
(La boîte de huit ampoules : 22 francs.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs par cuillerée à café. *Enfants* : 2 cuillerées à café par jour ; *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas.* (Prix : 20 francs pour 12 jours de traitement.)

4° *Gouttes*, titrées à 5 p. 100 de principes actifs. Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à deux ans : XL gouttes, toujours en trois prises dans la journée. Au-dessus de deux ans, recourir au sirop. (Prix : 20 francs pour 15 à 20 jours de traitement.)

Laboratoire des LIPIDES

Jean OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

LIPOVITA (Granulé)

Vitamines liposolubles.

Formule :

Carotène (Vitamine A) : 4 000 unités internationales.
Ergostérol irradié (Vitamine D) : 40 000 unités internationales pour 100 grammes. Goût très agréable.

Indications. — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, Etats ganglionnaires.

Doses :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Adolescents et adultes : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire MAUCHANT

à GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grésillons 05-21.)

LIQUIDIX

Formule :

Sulfate de Cuivre	1 gr. 2174
Sulfate de Zinc.....	0 gr. 1492
Camphre.....	0 gr. 3141
Safran	0 gr. 1492
Alcool à 60°	19 gr. 1355

pour 100 gr.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 322-2.

Indications thérapeutiques. — Toutes dermatoses.

Mode d'emploi. — Simple application, pur ou étendu d'eau. Le mode d'emploi qui accompagne chaque flacon est très détaillé.

Livré en flacon de 250 cc.

Prix : 15 fr. 75.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure.
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France.)

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914
(*Paris Médical*, 25 avril 1914).

VICARIO, Nouvel emploi pour usage interne. (*Journal de Pharm. et de Chim.*, 16 février 1914).

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée).

GELÉE (consistante et sucrée).

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites, etc. Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

Prix : Gelée : 8 francs. — Liquide : 11 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

LITA

Cuniculi-sérum iodobenzométhylé.

Composition. — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'iodaseptine (2 parties).

Présentation. — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou exceptionnellement intraveineuse.

Mode d'emploi. Doses. — Deux injections par semaine par série de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration : continuer jusqu'à guérison. Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. Chez l'enfant, on commencera par 1 cc. pour la première injection, 2 cc. pour la seconde, 3 cc. pour la troisième.

Indications. — Chez l'adulte : Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculoses viscérales. Tuberculoses des séreuses. *Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents (hémoptysies ou autres).* Chez l'enfant : Prétuberculose, formes ganglio-pulmonaires du premier âge.

Prix : Boîte de : 6 ampoules : 70 francs.

4 ampoules : 50 francs. — 2 ampoules : 25 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71).

LIVARTIL

Le stimulant d'élection des parenchymes hépatique et pancréatique.

Composition :

Extrait *total* de feuilles *fraîches* d'*artichaut* de Macau (333 gr. de feuilles fraîches d'artichaut).

Combretum	0,02
Boldo.....	0,05
Adonis Vernalis	0,05
Jaborandi	0,02
Formiates de Calcium et de Magnésium	2,50
pour 100 grammes de Livartil.	

Propriétés :

L'Artichaut stimule les fonctions hépatique et pancréatique, augmente la diurèse, élimine la cholestérine et l'urée.

Boldo et Combretum : cholagogues et cholofluidifiants classiques.

Adonis : toni-cardiaque et diurétique direct et indirect.

Jaborandi stimule la musculature lisse du tube digestif par son action parasymphicotonique.

Formiates de Calcium et de Magnésium, diurétiques azoturiques, renforcent en outre le pouvoir diurétique propre de l'artichaut.

Avantages.

- 1° L'extrait **total** liquide de feuilles **fraîches** d'artichaut de **Macau** procure des succès thérapeutiques bien supérieurs à ceux qu'on obtient avec les « principes » partiels préparés à partir de la plante desséchée ou avec l'extrait sec.
- 2° Absolument atoxique.
- 3° Effet rapide, mais durable.

Indications. — A. Hépatiques.

- 1° Toutes **insuffisances hépatiques**, aiguës, sub-aiguës et chroniques, légères ou graves. Cholémie familiale. Ictères catarrhal et infectieux. Hépatites aiguës et chroniques. Congestion du foie. Gros foie douloureux des paludéens, des alcooliques, des gros mangeurs. Lithiase biliaire. Coliques hépatiques et vésiculaires. Cirrhoses. Surcharge et Dégénérescence graisseuse du foie (1). Cholécyctites, Angiocholites, Angiocholécystites, Séquelles des cholécystectomies. Atteinte hépatique au cours des maladies infectieuses, Foie grippal.

(1) Voir H. PÉRICAUD et LAPORTE : *L'Envahissement graisseux du foie.*

2° Toutes les **conséquences de l'insuffisance hépatique et pancréatique** : dyspepsie hépatique avec douleurs tardives. Constipation. Hémorroïdes. État saburral des voies digestives. Anorexie des hépatiques. Nausées. Somnolence post-prandiale. Urticaire. Migraines. Manifestations anaphylactiques d'intolérance digestive. Auto-intoxication. Intolérance aux arsénobenzènes et aux sels d'or. Dermatoses d'origine hépatique. Adjuvant dans le traitement du diabète. Prurit. Asthme hépatique.

B. Rénales :

Oliguries. Ascites. Insuffisance rénale. Rétention azotée. Azotémie d'alarme. Brightisme. Mouches volantes. Bourdonnements d'oreilles. Fourmillements des extrémités. Prurit. Crampes. Doigt mort. Céphalées des brightiques.

C. Sanguines et circulatoires :

Hypercholestérolémie. Athérome artériel. Hypertension et ses troubles subjectifs.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement d'attaque. — LXX gouttes 3 fois par jour, aux repas, dans le premier verre de boisson. (Penser à une exonération intestinale abondante possible due à l'augmentation de la cholérèse.)

Traitement d'entretien. — XXX à LXXX gouttes 2 à 3 fois par jour.

Enfants jusqu'à 5 ans : III à V gouttes par année d'âge 2 à 3 fois par jour.

Remarque. — Le **Livartil** étant dénué de toute toxicité, les doses ci-dessus peuvent être augmentées si besoin.

Prix :

18 francs pour un traitement moyen de 15 à 18 jours.

Laboratoires du LIVARTIL

Roger FOSSE, Docteur en Pharmacie,
86, rue du Pas-Saint-Georges,
BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 42-44, 809-58.)

Sur demande, les Laboratoires du **Livartil** adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

LOBÉLIANE LALEUF

Composition. — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

Propriétés et indications. — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques, névropathiques, névroses et insomnies.

Formes. — *Liquide et comprimés.*

(2 comprimés correspondant à 1 cuillerée à café de LOBÉLIANE liquide.)

Posologie et mode d'emploi :

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café — 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café — 2 ou 4 comprimés, après le repas du soir.

La LOBÉLIANE se prend avec un peu d'eau ou mieux avec une infusion de tilleul ou de verveine.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 15 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

LOBÉLINE

Composition. — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la lobelia inflata, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

Avantages. — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

Indications. — Asphyxie bleue des nouveau-nés, laryngite striduleuse, asthme, broncho-pneumonie, toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

Posologie et présentation. — Boîtes de 3 ampoules, dosées à 0 gr. 003 et à 0 gr. 01. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

Prix :

Dosage faible. La boîte de 3 amp. : 8 francs.

Dosage fort. La boîte de 3 amp. : 20 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

LOBÉLINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies
des centres respiratoires.

Composition. — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobeline chimiquement pur. (Conservation indéfinie.)

Indications. — Tous les états asphyxiques : En chirurgie (syncopes anesthésiques). — En obstétrique (asphyxie des nouveau-nés). — En médecine générale (troubles respiratoires à la suite de pneumonie, broncho-pneumonie, etc., empoisonnements, électrocution, submersion).

Posologie et mode d'emploi.

Chez l'adulte : en injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 gr. 010 par dose. On peut sans aucun danger répéter les injections toutes les 10 ou 15 minutes.

Doses maxima : 0 gr. 02 par dose. 0 gr. 10 par 24 heures.

En injection intraveineuse : 0 gr. 003 à 0 gr. 010 par dose. Cette injection doit être pratiquée très lentement. On peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0 gr. 010. Chez l'enfant : en injection sous-cutanée ou intramusculaire exclusivement :

Chez le nouveau-né et pendant les 4 premiers mois 0 gr. 003 par dose,

A partir de 4 mois 0 gr. 005 —

A partir de 1 an 0 gr. 010 —

Présentation. — Boîtes de 2-6 et 25 ampoules titrées exclusivement à 0 gr. 003 et 0 gr. 010.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — Paris (VIII^e).

(Tél. : Elysées 61-46.) — Adresse télégr. : Labomédical-Paris.

LOFODOL

Huile de Foie de Morue de Norvège.

Préparée, contrôlée et mise en flacons sur place, sous la garantie et le cachet du gouvernement Norvégien.

Dosage très élevé en vitamines A et D, nécessite des doses 3 fois moindres.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance, Avitaminoses, Adrénopathies, Dénutrition, Débilité, Bronchites, Convalescences, Etats anémiques, Grossesse, Prétuberculose, Tuberculose.

Posologie :

Enfants de 1 à 3 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café par jour.
Enfants de 3 à 14 ans : 1 à 1 1/2 cuillerée à café par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 10 francs.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

CONDOU et LEFORT, Pharmaciens

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

LOGAPHOS

Composition. — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

Dose. — XX gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Traitement : 15 jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

(Tél. : Parmentier 31-29.)

LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.
Émulsion stable et homogène, sans goût, sans arôme artificiel, *miscible à tous liquides* (lait, eau sucrée ou non, infusions, potages).

Composition :

Huile de paraffine *spécialement traitée*, la plus pure et de haute viscosité, Agar-agar, Phénolphthaléine chimiquement pure. Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Utile aux atoniques, femmes enceintes, nourrices. Absence totale d'inconvénients.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion. ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complet, de suintement par l'anus. Aucune accoutumancee

Dose et mode d'emploi :

Adultes : De 1 à 3 cuillerées à café, soit pur, soit dilué, le soir au coucher ; si nécessaire, répéter la dose le lendemain matin.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou dilué.

Deux modèles :

Pour les cas de constipation bénigne et pour les enfants, voir **Molagar**.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-2.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).
(Tél. : Longchamp 16-85; 16-86, 16-87.)

LOTION BLANCHE R. P.

De La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et sélénisés de La Roche-Posay associés aux oxydes de titane.

Propriétés et indications. — Calme, décongestionne, antiseptise et cicatrise ; lésions suintantes, en général ; eczémas, eczématides aigus ou infectés, intertrigo, prurits anogénitaux.

Mode d'emploi. — S'applique en couche mince par badigeon. Au renouvellement du pansement nettoyer à l'eau chaude additionnée de sels de bain R. P. de La Roche-Posay. (Deux à six sachets suivant la quantité.)

Dès l'assèchement panser avec le Cérat inaltérable R. P. et ensuite avec le Cold Cream naturel R. P. Poudrer ensuite largement avec la poudre dermique R. P.

Présentation et prix :

Lotion blanche R. P. de La Roche-Posay. Le flacon....	14 francs.
Sels de bain R. P. La boîte de 30 sachets.....	10 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	8 —
Cold Cream naturel R. P. Le tube	10 —
Poudre dermique R. P. La boîte	10 —

Laboratoires des PRODUITS DERMQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

LOTION PY

Au Soufre dissous associé.

Composition. — Soufre, Houblon, Hamamelis.

Propriétés. — Dissout les graisses et apporte au derme le soufre indispensable et *actif*.

Avantages. — Rigoureusement *inflammable* ; *non irritante, non toxique* ; odeur agréable.

Indications. — Tous les *états séborrhéiques* ; Alopecies ; toutes les formes d'*Acnés* : Comédons, Pityriasis ; Erythrasma ; antiseptique et parasiticide puissant.

Mode d'emploi. — Faire une application au coucher à l'aide d'un tampon de coton hydrophile.

Prescrire : LOTION PY : 1 flacon.

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoire PY

58, boulevard Richard-Wallace - PUTEAUX (Seine).

Tél. : Lon. 01-13.

LUBROKAL

Composition. — 0,60 de brome (ionisé) ; 0,04 de phényl-éthyl-barbiturate de sodium.

Indications. — Epilepsie essentielle et symptomatique, insomnie nerveuse (sous forme de cure médicamenteuse), états d'angoisse, neurasthénie, hystérie, chorée, terreurs nocturnes, à titre préventif contre la migraine et la migraine ophtalmique.

Mode d'action. — L'action simultanée sur les centres corticaux (brome) et les centres mésencéphaliques (acide barbiturique) permet, avec un dosage très réduit, de calmer le système nerveux presque tout entier.

Dosage. — Prendre toujours les comprimés dissous dans l'eau. Epilepsie bénigne : 1 à 2 comprimés ; cas moyens : 3 fois par jour 1 comprimé ; cas graves : jusqu'à 3 fois par jour 2 comprimés. Posologie pour les enfants à fixer suivant leur poids.

Présentation :

Tube de 20 comprimés : 15 fr. 50.

Laboratoires RECREAL

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES

Docteur en Pharmacie,
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LUDIN

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Formes. — *Granules, Gouttes, Sirop.*

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop
ou 3 granules
ou XX gouttes

} = 1 cgr. Hg. + 1 millgr. As.

Sans IODURE, sans Alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 8 à 12 granules par jour.

Adolescents : 4 à 8 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Gouttes :

Adultes : XX gouttes.

Adolescents : X à XV gouttes.

Enfants : V à X gouttes.

Nourrissons : I à II gouttes.

} 2 à 4 fois par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc...). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques. — Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc., etc...

Les gouttes ou le Sirop Ludin peuvent être prescrits sans inconvénient aux nourrissons en diluant soit dans de l'eau, soit dans du sirop de sucre ou même dans le lait des biberons.

Les granules sont sans sucre.

Prix : *Gouttes* : 20 fr. *Granules* : 18 fr. *Sirop* : 20 fr.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 302-1, 302-2, 302-5.

Laboratoires REY — DIJON — Tél. : 22-12.

LUGOCALCION

Novalis.

Sirop de Chlorure de Calcium suractivé. Délicieux au goût.

Composition :

Suspension pseudo-colloïdale de Chlorure de Calcium, incorporé par procédé spécial.

1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de Calcium	1 gr. 50
Adrénaline physiologique sol. 1/1000.....	DIX gouttes.
Teinture belladone	DEUX gouttes.

Seule préparation de goût réellement délicieux.

Indications et posologie :

a. Récalcifiant : Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Convalescence, etc.

Adultes : 1 cuillerée à soupe. *Enfants :* 1 cuillerée à café par jour.

b. Hémostatique : Hémoptysies, Gastrorragies, Epistaxis, Purpura, Menstruations abondantes, Préventif des Hémorragies post-opératoires, etc.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants :* 3 à 4 cuillerées à café par jour.

c. Antianaphylactique : Urticaire, Eruptions d'origine digestive, Prurits, Rhume des Foins, Eruptions post-sérothérapiques, Asthme.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café. *Enfants :* 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

d. Déchlorurant, résorbant : Albuminurie, Néphrite, Pneumonie, Accidents sériques, Convulsions des nouveau-nés, Ascite, Diarrhée des Tuberculeux, Pleurésie, Œdème malléolaire, Cellulite.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants :* 3 à 4 cuillerées à café
Nouveau-nés : 1/2 cuillerée à café par jour.

e. Neuro-sédatif : Etats spasmodiques, Ménopause, Basedowiens, Nervosisme, Surmenage.

Par petites doses de 1 cuillerée à café, à prendre 4 fois par jour.

f. Tense-régulateur artériel : Hyper et Hypotension, 2 à 4 cuillerées à café par jour.

g. Thérapeutique oculaire : Glaucome, rétinites, Choréïdites, spasmes oculaires, Décollements de la rétine, Cataracte, Hémorragies de la rétine, etc.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe. *Enfants :* 1 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre pur ou additionné de 2 fois son volume d'eau, avant les repas.

Prix : 21 francs.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

LUSOFORME

Formol saponiné, liquide et comprimés.
Antiseptique, bactéricide et désodorisant.

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Le Lusoforme est un savon liquide contenant 20 p. 100 de formol.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique, Hyperhydroses, Pansements d'urgence.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 3 fr. 50, 7 fr. et 12 fr. La boîte de 50 compr., 8 fr.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 10 fr., 9 fr. 50 et 9 fr. 25 le kilo.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél.: Opéra 43-79.)

LUTÉOVAR

Indications. — Règles douloureuses. Règles irrégulières. Ménopause.

Composition. — Contient 0 gr. 20 d'ovarine par dragée.

Posologie. — De 4 à 6 dragées par jour (au début des repas).

Propriétés. — Régularise l'activité ovarienne. Supprime la douleur. Normalise les règles.

En flacon de 60 dragées.

Échantillons gratuits :

Laboratoires FOULON

20, faubourg Poissonnière — PARIS (X^e).
(Tél. : Provence 29-48.)

LYMPHIODE

Iode entièrement fixé sur un support extrait des ganglions lymphatiques.

Histotropisme électif. — Tolérance parfaite. Activité exaltée. Absence d'iodisme.

Le **LYMPHIODE** peut être pris dans n'importe quel liquide après le repas : eau bicarbonatée sucrée, vin rouge, lait, etc...

Doses :

Adultes : X à L gouttes par jour en deux fois après chaque repas.

Enfants : V à XX gouttes par jour suivant l'âge.

Ces doses peuvent d'ailleurs être largement dépassées.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Affections du cœur et des vaisseaux, Hypertension, sclérose vasculaire, déficience circulatoire, etc... Affections oculaires relevant de la médication iodée : choroïdite, iritis, etc... Affections respiratoires : asthme, emphysème, bronchite chronique. Affections ganglionnaires : adénites, micro-polyadénopathie des enfants. Affections de la peau : eczéma, psoriasis, tuberculides. Mycoses.

États infectieux aigus.

Syphilis tertiaire.

Prix : 16 francs le flacon suffisant à un traitement de 1 à 2 mois selon les doses.

Laboratoires du D^r MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

LYNÉVOL

Pommade en tube.

Composition. — Acide orthoxybenzoïque, Métadioxybenzène, ox. de zinc, ac. boriq., Baume du Pérou, Essences et Lanoline.

Indications. — Erythème fessier, Crevasses du sein, Brûlures, Coups de soleil, Prurits, Impétigo, Herpès.

Avantages. — Ne tache pas, s'enlève facilement, est imperméable aux liquides, possède une odeur agréable, est toujours toléré par les épidermes les plus sensibles.
Prix au public : 6 fr. 50 et 10 francs.

**J. FABRE, Docteur en Pharmacie,
Licencié ès Sciences.**

112, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).
(Tél. : Roquette 73-42.)

LYNOLÉOL

Propriétés. — Bactéricide, Cytophyllactique, Désodorisant, Analgésique, Cicatrisant.

Pouvoir de diffusion très élevé. Nullement toxique.

Présentation.

Pommade	14 fr.
Emulsion	15 fr.
Ovules.....	18 fr.
Savon.....	8 fr.
Huile	15 fr.

Indications. — Le *Lynoléol* est employé sur toutes les surfaces cruentées infectées :

Plaies de toute nature, Fractures ouvertes.

Dans les pansements des affections suppurées, *Phlegmons, Ulcères des Jambes, Brûlures, Erysipèle, Gangrènes.*

En gynécologie (Emulsion et ovules).

Dans les avortements septiques, métrites, leucorrhées de toute origine.

En Stomatologie et en Oto-Rhino-Laryngologie, dans les *Stomatites ulcéreuses, angines, Muguet, Infections gingivales*, etc.

Toute demande de renseignement ou commande doit être faite à l'adresse ci-dessous :

Produits au LYNOLÉOL

F. MONGE, Pharmacien de 1^{re} classe.

OULLINS (Rhône).

(Tél. : Lyon, Franklin 49-12.)

LYXANTHINE ASTIER

Composition. — Établie suivant une formule entièrement inédite, la Lyxanthine Astier contient 33 p. 100 de principes actifs : bitartrate de lysidine, iodopropanol-sulfonate de sodium, gluconate de calcium.

Aucun toxique ni analgésique.

Propriétés. — Puissant anti-arthritique, dissolvant de l'acide urique huit fois plus actif que les solvant. habituels.

Indications. — Rhumatismes chroniques, goutte, convalescence de la maladie de Bouillaud, lithiases biliaires ou urinaires, névralgies et névrites d'origine rhumatismale, troubles hépatiques des arthritiques.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 2 cuillerées à café par jour
Comprimés : 2 à 4 par jour. Cures de 10 à 20 jours.
Prix : 18 francs.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

MAGBI

Du Docteur Roger WEBER

MAGnésie — BISMuth.

Puissant régulateur du tube digestif.

Formule :

Hydrate de Magnésie.....	30 gr.
Sous-Nitrate de Bismuth	10 —
Pour 100 grammes de poudre.	

Indications. — Dyspepsies douloureuses, hyperchlorhydrie, ulcère, flatulence, météorisme, constipation.

Posologie. — A la fin des 2 repas dans un peu d'eau : une cuillerée à café.

Ulcères. — Le Magbi se prend une demi-heure avant le principal repas, à la dose d'une grande cuillerée à café, délayé dans un demi-verre d'eau.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du MAGBI

Angelini, Pharmacien

61, rue de Seine — PARIS (VI^e).

(Tél. : Danton 92-73.)

Et chez tous les Commissionnaires et Droguistes.

Détail : Dans toutes les Pharmacies.

MAGBROMYL (Adultes)

Solution de Bromure de Sodium pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium et du CaCl_2 . Tonique et stabilisateur du Système nerveux. *MgCl² augmente l'activité thérapeutique des Bromures. Ca Cl² stabilise le système nerveux. Plus de torpeur, plus de dépression. Pas d'anaphrodisie.*

Indications. — Toutes celles des Bromures.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café pro die, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, de tisane, ou de lait sucrés.

Une cuillerée à café = 0 gr. 50 NaBr, 0 gr. 25 MgCl_2 , 0 gr. 10 CaCl_2 .

Sirop de Magbromyl (Médecine infantile) pour enfants jusqu'à 12 ans.

Doses. — 1 à 8 cuillerées à café pro die.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaBr, 0 gr. 10 MgCl_2 , 0 gr. 05 CaCl_2 .

Ces préparations, de goût vraiment agréable, masquent totalement la saveur désagréable des Bromures.

Traitement de 8 à 15 jours suivant les cas.

Prix : Adultes 16 fr. 75. Sirop pour enfants : 9 fr. 50.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)

MAGÉCARINE

Comprimés à base de magnésie, carbonate de chaux, bicarbonate de soude et divers extraits de plantes.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés au moment des troubles.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant.

Indications. — Aigreurs, Brûlures d'estomac ou hyperchlorhydrie.

Prix : 14 francs. (8 à 10 jours de traitement.)

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Galv. 86-17.)

MAGIODYL

Solution d'Iodure de Sodium chimiquement pur associé au Chlorure de Magnésium.

Seule préparation de goût vraiment agréable où la saveur insupportable des iodures est totalement masquée.

Avantages. — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

Indications. — *Hypertension*, artériosclérose, et toutes les indications des iodures.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède sucrés ou non.

Dose variable suivant avis du médecin traitant.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaI + 0 gr. 25 MgCl²

Traitement de 5 à 30 jours suivant les cas.

Prix : 17 fr. 75.

Laboratoire du MAGSALYL

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)

MAGNACALCINE

Granulé aux 3 glycérophosphates et au nucléinate de *manganèse* et de *magnésie*, Agent de récalcification, de reminéralisation, de rénovation du tissu osseux, tonique de la cellule nerveuse.

Principales Indications. — Toutes affections par carence calcique et magnésienne.

Neurasthénie, phosphaturie, *fractures*, Rachitisme, *lymphatisme*, grossesse, allaitement, *surmenage*, *débilité*, *troubles de croissance*, carie dentaire, tuberculose pulmonaire et osseuse.

Doses à croquer :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café (par jour aux repas ou en dehors).

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café (par jour aux repas ou en dehors).

Prix : 14 francs.

Laboratoire des Produits SANOVA

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

MAGNELAX

Composition. — Émulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

Indications. — **LAXATIF** ne contenant aucun drastique, CONSTIPATION, fermentations, acidités.

Posologie (Doses moyennes): que l'on peut augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour, au repas du soir de préférence.

Enfants : 1 cuillerée à dessert par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 16 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

MAGNÉSIE STORKE

Présentation. — Magnésie lourde de fabrication anglaise, ténue, inodore, insipide, se tenant en suspension parfaite dans l'eau et d'une absolue pureté. Saveur agréable. Parfaitement acceptée par tous les malades.

Indications. — Constipation, acidités gastriques, flatulences, lithiase biliaire, atonie vésiculaire anti-acide buccal, intoxications par acides corrosifs, arsenic, sels métalliques.

Posologie. — Prendre la magnésie dans un peu d'eau sucrée ou une infusion chaude.

Dose purgative : 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

Dose laxative : 1 cuillerée à café le soir au coucher.

Dose anti-acide : 1/4 de cuillerée à café à chacun des 2 repas.

Anti-acide buccal : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau pure et après brossage des dents se rincer la bouche avec ce mélange.

Contre les intoxications : après lavage de l'estomac 15 à 20 gr. dans 1/2 litre d'eau.

Prix : 13 francs (traitement de 20 jours).

LANCOSME,

71, avenue Victor-Emmanuel — PARIS.

Tél. : Élysées 17-46.

MAGNÉSIUM-BOULARD

En ampoules buvables.

Indications. — Rachitisme, dépression nerveuse, fatigue générale, état prébacillaire, convalescences, déficience d'assimilation, néoplasme, épilepsie.

Composition. — Chaque ampoule contient :

1° Du Magnésium sous forme de complexe organo-métallique ;

2° Des levures vivantes, dans leur milieu isotonique ;

Posologie. — 1 à 4 ampoules par jour.

La métabolisation est déjà faite en grande partie par les levures. L'assimilation est extrêmement rapide ; il y a intérêt à agir par doses fréquentes et répétées, mais de préférence à jeun.

Verser le contenu de l'ampoule dans un liquide quelconque, de préférence sucré et tiède (eau, vin, bière, tisane).

Prix : 19 francs la boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5.

Voir aussi les autres complexes organo-métalliques :

Or-Boulard, Iodure-Boulard, Argent-Boulard, Hydragyre-Boulard, l'alternance quotidienne de deux complexes Boulard étant souvent recommandable.

Laboratoire CERBELAUD

Docteur en Pharmacie,

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e).

(Tél. Suffren 16-66.)

MAGNÉSIUM HARDY

Deux formes :

Granulé-Bouillon & Sirop.

Composition. — *Granulé-bouillon* (remplace l'ancienne forme *Tablette-Bouillon*) : 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par demi-cuillerée à café.

Sirop : 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par cuillerée à soupe.

Originalité. — Agrément et facilité d'absorption tant du *Sirop* aromatisé à la Groseille, que du *Granulé-Bouillon* donnant avec une tasse d'eau chaude un consommé très savoureux.

Posologie. — Une demi-cuillerée à café de *Granulé-Bouillon* par jour ou une cuillerée à soupe de *Sirop* au début d'un des repas.

Indications. — Asthénie nerveuse. Prostatisme. Vieillesse prématurée. Stimulant biologique général. Verrues et toutes proliférations. Reminéralisation. Prurits, tremblements.

Présentation :

Granulé-Bouillon : flacon pour 16 jours de traitement.

Sirop : flacon pour 14 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°).

(Tél. : Gobelins 36-96.)

MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydro-oxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

Présentation. — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

Emploi. — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

Posologie. — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

Indications. — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement défectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

Prix : 20 francs.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

(Tél. : 57.)

TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER, L. Robinet. — Pour la France : communication à l'Académie de médecine par M. le professeur Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

TERRAINS MAGNÉSIENS ET CANCER, MM. Pierre Delbet et L. Robinet (nouvelle étude). Communication Académie de médecine (mars 1934).

SUICIDES, TUBERCULOSE SÉNILITÉ ET TERRAINS MAGNÉSIENS, communication à l'Académie de médecine (avril 1934).

MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la

MÉTHODE SOLACTIVE

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

Avantages. — Fusibilité parfaite, Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

Indications. — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires, etc...

Mode d'emploi. — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol véritable, dénommés Ovuies au Sulfichtyol.

Prix : 18 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*.
Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital.
Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 18 francs.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL

12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}). Tél. : 72-96.

MAGSALYL

Association Soufre-Salicylate de Soude.

Forme Solution : dosée par cuillerée à café à :

Salicylate de Soude pur 0,50

Hyposulfite de Magnésium 0,075

Plus Chlorure de Mg, Chlorure de Ca, Salicylate de K, pour établir une solution en équilibre physiologique avec les ions Na, Ca, K et Mg du plasma sanguin.

Propriétés. — Activité accrue surtout dans le traitement des affections cardiaques évolutives par l'action catalytique puissante du soufre vis-à-vis du salicylate, en milieu calcique.

Atoxique. Parfaite tolérance gastrique par l'hyposulfite de Mg, antichoc, antitoxique, cholagogue. Seule préparation de goût agréable et persistant grâce à un procédé spécial de fabrication.

Forme Comprimés glutinisés :

Composés des mêmes principes actifs, sans aucun excipient, ils se délitent et se dissolvent rapidement et complètement dans l'intestin.

A prescrire lorsqu'il y a impossibilité à employer la solution (intolérance absolue, malade en déplacement ou travaillant au dehors, etc...), la solution demeurant, à notre avis, la forme préférable.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatismes chroniques, sciatique, lumbago, hépatisme, états infectieux.

Mode d'emploi. — 4 à 20 cuillerées à café ou comprimés par 24 heures, à diluer 2 cuillerées à café dans un verre de liquide (tisane, lait, etc.).

Traitement. — De 3 à 15 jours suivant les cas.
Prix : 18 francs.

Laboratoire du MAGSALYL

8-10, rue Jeanne-Hachette

IVRY-SUR-SEINE.

(Tél. : Italie 16-91.)

MAIGRYLLINE

Composition :

Ext. fl. Rumex crispus.....	1 gr.
Ext. fl. Fucus vesiculolusus ..	1 gr. 50
Ext. fl. Bourdaine.....	0 gr. 50
Ext. Galium mollugo	1 gr.
Excipient aromatisé	Q. S. p. 5 cc.

Indications. — Traitement de l'obésité.

Présentation :

Boîte de 12 ampoules buvables.

Flacon d'Élixir Maigrylline.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule ou une cuillerée à café à chacun des 2 principaux repas.

Laboratoires HALLEANA

G. VIENNE, Pharmacien,

102, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 07-53.)

MAISLERIASE

Biochimiothérapie par dilatation gazeuse du **Dr H. MAISLER**.

Composition. — *Oxydant* : Peroxyde d'H. benzoïné et catalysé.

Spécifique : Argent en combinaison protidique en milieu hydroglycériné et fermenté.

Propriétés. — Dilatateur parfait, Décongestif, Hémostatique, Antiprurigineux, Indolore, Innocuité absolue, Application facile, Séances courtes.

Indications. — Toute forme de blennorragie aiguë ou chronique et ses complications, Abortives, Rectites gonococciques ou non, Hémorroïdes, Vaginites, Métrites, Vulvo-vaginites des petites filles, Leucorrhée, Prurit vulvo-vaginal et anal, Stérilité, Vaginite granuleuse.

Présentation et prix. — *Maisleriase* : une seringue Maisler et deux flacons (oxydant spécifique) : 60 francs.

Maisleriase F. : deux flacons (oxydant spécifique) : 40 francs.

Maisleriase P. M. : deux flacons (oxydant spécifique) : 25 francs.

Nota : Chaque boîte présente un traitement complet.

Mode d'emploi et posologie :

A. *Chez l'homme* : en injections urétrales, Blennorragies récentes (Abortives, aiguës), injection d'un cc. d'oxydant à canal ouvert, suivie d'une injection d'un cc. de spécifique que le malade garde 2 minutes environ. Traitement quotidien ou tous les deux jours.

Urétrites chroniques, toujours accompagnées d'infiltrations à 6 à 8 cm. du méat et à l'angle pénien, et de prostatite subaiguë dans les formes anciennes. Traiter à l'aide d'un instillateur n° 15, en gomme, à boule exploratrice. Traitement bi ou tri-hebdomadaire.

B. *Chez la femme* : Leucorrhée ; Injection vaginale d'une cuill. à café d'oxydant dilué dans un demi-verre d'eau bouillie froide, suivie 3 minutes après d'une injection d'une cuill. à café de spécifique dilué dans un demi-verre d'eau, à garder 3 minutes environ. Tous les deux jours.

Vulvo-Vaginites des petites filles : Injection vaginale de 3 cc. d'oxydant dilué au 1/3, suivie d'une injection de 3 cc. de spécifique dilué au 1/3. Arroser ensuite la vulve avec 1/2 cc. d'oxydant et de spécifique purs. Traitement tous les deux jours.

Pelvi-métrites, vaginites, vaginisme, stérilité, métrites gonococciques suraiguës : Inj. vag. de 3 cc. d'oxydant dilué dans 6 cc. d'eau 3 minutes après inj. de 3 cc. de spécifique dilué dans 6 cc. d'eau. Arroser ensuite la vulve avec solutions pures.

Rectites : Inj. successive de 9 cc. dilué au tiers.

Prurit anal et vulvo-vaginal : Arroser avec 1 cc. d'oxydant pur et de spécifique pur.

Métrites gonococciques subaiguës : Spéculum. Seringue de Pravaz de 10 cc. Injection de 9 cc. d'oxydant dilué au tiers, suivie 3 minutes après de 9 cc. de spécifique dilué au tiers. Application tous les deux jours.

Laboratoires de la MAISLERIASE

143, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Vaugirard 70-61.)

MAÏZENA

Présentation. — Poudre blanche, sans saveur, ni odeur, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau chaude et formant une crème onctueuse et, si la concentration est suffisante, une gelée en refroidissant.

Analyse :

Carbohydrates	87,60 %
Matières grasses.....	0,04 —
Matières azotées	0,72 —
Matières minérales	0,14 —
Humidité.....	11,50 —
	<hr/> 100 %

Indications. — Aliment léger, facilement assimilable convenant particulièrement aux enfants et aux sujets présentant des troubles digestifs.

Mode d'emploi. — Sous forme de bouillies, potages, entremets sucrés et aromatisés : 1° Délayer le *Maïzena* dans un liquide froid (lait, bouillon) pour que le mélange soit bien lisse ; 2° Verser ce mélange dans le reste du liquide en ébullition ; 3° Laisser bouillir quelques instants seulement.

Doses. — Variables suivant les mets à préparer. Pour les enfants, 1 cuillerée à soupe rase (10 grammes) pour une bouillie de 160 grammes.

Prix : 4 fr. 20 la boîte de 500 grammes.

2 fr. 35 la boîte de 250 grammes.

Société des PRODUITS DU MAIS

29, rue de Berri — PARIS. (Tél. : Elysées 72-06.)

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

Indications. — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable. Très grande assimilation.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi. — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 14 francs le flacon (usage 15 jours).

MOSER et Cie

8, chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

Tél. : Moncey 42-19.

MALT ETHEL

Malt d'orges touraillé et torréfié (succédané du café).

Le malt Ethel est composé uniquement d'orges germées (malt), touraillées et torréfiées.

Il contient tous les principes actifs et nutritifs de l'orge dans une forme facilement assimilable; il remplace le café dont il n'a pas la nocivité.

Le Malt Ethel est très riche en vitamines et enzymes (diastases).

Il convient particulièrement :

1^o A tous les débilites, anémies et aux gastro-hépatiques dont il stimule et régularise les fonctions digestives.

2^o A tous ceux auxquels l'usage du café est interdit : cardiaques, rénaux, excités, nerveux etc., car il constitue également un sédatif puissant du système nerveux.

Mode d'emploi.

Avoir soin de moudre en gros grains, infuser à l'eau chaude, remplacer progressivement le café par du malt Ethel, tant dans le café noir que dans le café au lait.

Le malt Ethel peut être consommé indéfiniment sans le moindre inconvénient.

Pour tous renseignements et échantillonnage, prière de s'adresser aux

USINES ETHEL S. A.

Malteries et Torréfaction de malt à SCHILTIGHEIM près Strasbourg (Bas-Rhin).

ou à l'Agent Général

Pierre RONCIN

132, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS (10^e).

Téléphone : Nord 32-13

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

MALT FRANÇAIS DEJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15 verre compris.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

MALTOGIL

(Malt pailleté Progil.)

Composition. — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé. Renferme la totalité de la diastase du malt, du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones et des vitamines.

Propriétés. — Aliment très concentré de goût agréable, de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents, Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-rénaux, Hépatiques.

Remplace avantageusement la bière pour nourrices.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Bouillies maltées : Après cuisson, retirer la bouillie du feu et la laisser reposer deux ou trois minutes. Ajouter une cuillerée à café de **Maltogil** par cuillerée à soupe de farine employée et remuer. Attendre un quart d'heure, puis porter rapidement à l'ébullition. La bouillie devient fluide et parfaitement digestive.

PROGIL, Sté An. au cap. de 50 000 000 de fr.
10, quai de Serin — **LYON** (IV^e).

Tél. : Burdeau 85-31.

Laboratoires à **RIS-ORANGIS** (S.-et-O.)

MALTOSAN

Bouillie maltosée en poudre.

Composition. — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H²O, 3 p. 100. Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : dyspepsies diverses. Désinfectant intestinal, exerce une action favorable dans le traitement de la constipation. Facilite le sevrage.

Doses. — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

Établissements WANDER

151 bis, route de Joinville — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MALTOSINE DÉJARDIN

Extrait de Malt sec, atomisé, obtenu absolument pur, et contenant la totalité des ferments du grain à l'état naturel.

Indications. — Troubles de la nutrition des nourrissons et enfants, Putréfactions, Colites, Déphosphatisation des anémiés, surmenés, convalescents et vieillards.

Posologie :

Nourrissons : 3 cuillerées à café par tasse.

Bouillies maltosées : 2 à 4 cuillerées à café par litre.

Enfants : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 8 francs.

Établissements DEJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).
Tél. : Auteuil 03-04.

MALT WANDER ou GLOMA GLOMA PUR

(Extrait de malt sec.)

Composition. — Matières azotées 5,87 p. 100 ; Hydrates de Carbone (maltose et dextrine), 89,19 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Eau, 3,40 p. 100 ; Acide phosphorique en pour cent des substances minérales, 9 p. 100. Diastases. Vitamines.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amylolique. Source de diastases et de vitamines B. Permet la préparation des bouillies maltosées. Le grand flacon : 15 fr. Le flacon : 10 fr.

Établissements WANDER
CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

PEPSO-GLOMA

Composition. — Pepsine, pancréatine glutinisée, extrait de malt diastasique.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Insuffisances digestives ; digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café. *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

P. BASTIEN, Pharmacien

CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MANACINE

(Produits à l'extrait de Manaca.)

Comprimés
(Us. interne).

Pommade
(Us. externe).

Composition :

KI.....	0,048	Extr. mou de Manaca	1 gr.
KBr	0,008	Huile de Chaulmoogra...	1,50
Extr. mou de Manaca	0,05	Ichtyol.....	1 gr.
— de Quinquina .	0,024	Camphre	0,40
— de Gentiane ...	0,008	Menthol	0,10
— de Marrube ...	0,004	Deutoxyde de Plomb....	0,10
— d'Agaric	0,02	Oxyde de Zinc.....	10,00
— de Passiflore....	0,004	Excipient.....	Q. S. P. 100 gr.
— de Centaurée ...	0,004		

pour un comprimé.

Indications. — Maladies de la Peau (Eczéma, Psoriasis, Acné, Urticaire, etc.), Ulcères variqueux, Troubles de la circulation (Varices, Phlébites, etc.), Artériosclérose, Arthritisme, Brûlures.

Posologie.

2 comprimés matin et soir avant | Un pansement (ou une application) matin et soir suivant le cas.

Prix. — Comprimés, 18 fr. — Pommade, 15 fr.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de la MANACINE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

MANCOBENE

Complexe opo-mangano-calcique associé à un catalyseur de premier plan, le *Carbonate de Cobalt*.

Composition. — Granulé dont 100 gr. contiennent

Carbonate de cobalt.....	0,02	Chlorure de magnésium..	1,50
Nucléinate de manganèse.	0,20	Hypophosphite de chaux..	0,50
Méthylarsinate de soude..	0,20	Hypophosphite de soude..	0,50
Phosphate tricalcique.....	1,50	Surrénale.....	0,50
Glycérophosphate de chaux	4,50	Thymus.....	0,50

Propriétés thérapeutiques. — La présence d'extraits de glandes endocrines et du catalyseur, le carbonate de cobalt, favorise le métabolisme d'un calcium dans l'organisme. Recalcifiant et reminéralisateur de tout premier ordre.

Indications. — Asthénie, Croissance, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Lymphatisme, Prétuberculose, Tuberculose, Fractures, Carie dentaire, Grossesse, Allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de 5 à 12 ans : 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoire TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS

MANDÉLIUM

Composition. — Ampoules buvables de 5 cc. contenant chacune 3 gr. 38 de *mandélate d'ammonium*.

Propriétés. — *Bactéricide et acidifiant*. « Tous les avantages du régime cétogène sans aucun de ses inconvénients ».

Indications. — Infections urinaires ; *spécifique de la colibacillurie* (Pyélites, cystites, pyélonéphrites gravidiques, etc...).

Posologie. — 4 ampoules par jour, une immédiatement après chaque repas.

Enfants : au-dessous de 6 mois : 2/3 d'ampoule ;
de 6 mois à 2 ans : de 2/3 d'ampoule à 1 ampoule ;
de 2 à 5 ans : de 1 à 2 ampoules ;
de 5 à 12 ans : de 2 à 3 ampoules ;
en quatre fois comme chez l'adulte.

La boîte de 12 ampoules buvables de 5 cc. : 25 francs.

N. B. — L'action du *Mandélium* est certaine à condition que, pendant le traitement, l'acidité urinaire soit suffisante.

Aussi est-il indispensable, dès que le malade commence à prendre du *Mandélium*, de mesurer deux ou trois fois par jour le pH urinaire au moyen de notre papier réactif ; si celui-ci reste jaune après avoir été trempé dans l'urine, l'acidité de cette dernière est suffisante (pH égal ou inférieur, à 5,3) ; s'il vire au gris ou au gris violacé, les urines sont insuffisamment acides.

Si notre papier réactif ne reste pas jaune après deux jours de traitement par le *Mandélium*, on doit adjoindre à ce dernier un acidifiant urinaire tel que l'acide phosphorique ou le chlorure d'ammonium. Lorsque l'acidité nécessaire est atteinte, diminuer progressivement l'acidifiant, jusqu'à sa suppression complète si possible.

Société générale d'Applications Thérapeutiques
" THERAPLIX "

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse
chimiquement pur.

Forme et Dose:

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques:

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérapeutiques:

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose. — 4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 12 francs.

Pharmacie SCHMIT

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

(Tél. : Richelieu 19-26.)

MANGANESIA

Solution permanganique arsenicale
Traitement du Diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Prix : 17 fr. 60

**Laboratoires des Produits DANNEC'H
BRUN et MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). (Tél. : Arch. 87-44.)

R. C. Seine 218.670.

MANGANO-PHOSPHAL

Gouttes sans aucun toxique.

Composition. — XX gouttes contiennent :

Ac. phosphorique offic. pur.....	0 gr. 35
Magnésium et polyglycéroph.....	0 gr. 60
Sels de manganèse.....	0 gr. 10
Gluconate de cuivre.....	1/4 milligr.
Phosphate de zinc.....	1/10 milligr.
en solution sans alcool et sans sucre.	

Indications. — Puissant reconstituant, *sans aucun toxique*, agissant très *rapidement* et donnant des résultats *durables*. Enfants, adultes, femmes enceintes ou qui nourrissent, diabétiques, vieillards même hypertendus.

Posologie :

Enfants : II gouttes par jour par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir, dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 15 francs. — Flacon gratuit sur demande :

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie.

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e). — Tél. : Littré 80-76.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Prix : 15 francs.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires LA BIOMARINE

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

MARRUBÈNE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

Propriétés. — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

Indications. — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

Mode d'emploi. — Le Marrubène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulés et d'élixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granulés, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'élixir.

Boîte de 36 cachets.

Tube de 45 dragées.

Élixir — Granulés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Intoxications, dysenteries (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

Entérite chronique : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n°s 103-3 et 4.

Prix : 14 francs, durée 2 à 4 jours.

COMTE, Pharmacien,

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

MARRUCOL

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

Indications. — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladie de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

Mode d'emploi. — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

La boîte de 30 cachets : 12 francs.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 86-76.)

MARUBOR

Sirop à base d'extrait hydroalcoolique stabilisé de Marrube Blanc.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant, toni-cardiaque.

Indications. — Congestion pulmonaire, Bronchites rebelles ou chroniques, Catarrhe, Asthme, Tuberculose.

Aucune contre-indication.

Posologie. — Agréable malgré sa haute teneur en Marrube (10 gr. d'extrait stabilisé par litre), ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 14 francs.

Littérature et Échantillons au

Laboratoires du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).
(Tél. : 1-59.)

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

Indications. — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition. — Vin : Muscat de Samos et Maté.
Prix : 20 francs.

Elixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 18 francs.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.

Prix : 12 francs.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice,
sur demande adressée au Dépôt général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 22-52.)

MÉNATOL

Enregistré au Laboratoire national de contrôle
des médicaments sous le n° 363-2.

Forme. — Dragées.

Composition. — Poudre d'ovaire, Marron d'Inde, Genêt, Rhamnus, Viburnum, Capsicum, Hydrastis, Hamamelis.

Propriétés pharmacodynamiques. — Vasoconstricteur utérin. Tonique et décongestif du réseau veineux. Opothérapie ovarienne.

Indications. — Troubles de la ménopause. — Règles douloureuses. — Régulateur des fonctions utéro-ovariennes.

Mode d'emploi. — Deux à six dragées par jour, au début des repas.

L'étui : 16 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). Tél. Lab. 62-30.

MENOSSEDINE

Composition. — Gossypium, Hamamelis, Poudre ovarienne, Pyramidon, Bromure de sodium.

Indications. — Sédatif utérin, Calme les phénomènes douloureux et malaises qui précèdent ou accompagnent les règles.

Formes. — Liquide et comprimés.

Posologie. — Au début des malaises, une cuillerée à soupe : une seconde cuillerée une demi-heure après si la première n'a pas suffi.

Trois comprimés dans un peu d'eau ; trois autres une demi-heure après si besoin.

Prix : Liquide et comprimés : 12 francs (3 ou 4 mois de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère).

MENSUOSEDYL

**Sédatif spécifique inoffensif
des Douleurs Menstruelles.**

Composition :

Un analgésique.....	Pyramidon.
Un diurétique.....	Théobromine.
Un antispasmodique.....	Extr. Valériane.
Un sédatif.....	Extr. Anémone.
Un tonique.....	Guaranine.

(Procédé spécial de conservation.)

Les *cachets* « Mensuosedyl » réalisent au mieux le traitement *symptomatique* des dysménorrhées.

Ils apportent une *sédation très rapide* à tous les phénomènes douloureux et diffus, *sans présenter de contre-indication*. Secondairement ils décongestionnent le rein, généralement hyperémié, et présentent une heureuse action tonicardiaque.

Sans opothérapie, donc sans influence directe sur la sécrétion ovarienne, ils sont un *adjuvant précieux à tout traitement* des dysménorrhées, quelle qu'en soit la cause, et constituent l'analgésique de choix des douleurs menstruelles et du post-partum, et des troubles nerveux de la vie génitale.

Posologie. — 1 cachet dès l'apparition des douleurs, 3 cachets par 24 heures.

(Aucune contre-indication.)

La boîte de 12 cachets : Prix : 13 francs.

La demi-boîte : Prix : 7 fr.

Paul AUGIER, pharmacien

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 09-04.)

MENTHE MITCHAM VÉDÉ

Feuilles de menthe pour infusions digestives d'une qualité exceptionnelle et d'un arôme sans égal. Cultures médicinales modèles au château de Brailly-Cornehotte (Somme). Plants Mitcham sélectionnés à teneur élevée en huiles essentielles.

Plantation, récolte, mondage, dessiccation dans locaux spécialement aménagés. Plants entourés de tous les soins nécessaires pour favoriser l'acclimatation et éviter la dégénérescence.

Boîte pour 50 tasses : 4 fr. 95.

Boîte pour 100 tasses : 9 fr. 50.

Échantillons gratuits au Corps médical.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 97-46 et 94-47.

MÉSOTHINE RHEMDA

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine).

Action. — 1^o La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2^o Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolytiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

Diathèse arthritique.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine. Affections vésico-rénales et biliaires.

Posologie. — 1 à 4 comprimés, le matin à jeun, de préférence suivant l'indication du médecin.

Tubes de 20 comprimés { Prix de vente au public.... 14 francs.
 { Prix médical 9 fr. 80.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. : Seine 255.068 B.

MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium
en ampoules.

Primesol. — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix de vente au public : 12 fr. — Prix médical : 9 fr. 80.

Eimesol. — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix de vente au public : 21 fr. — Prix médical : 14 fr.

Trimesol. — 2 micros par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine.) Traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Prix de vente au public : 68 fr. — Prix médical : 47 fr. 20.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERO.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000.

S. MOGAN, Pharmacien

51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068 B.

MÉSOTHORIUM THÉRAPLIX

Composition — Bromure de Mésothorium en solution isotonique.

Propriétés. — Action inhibitrice élective sur les cellules néoplasiques. Action anti-infectieuse et antirhumatismale. Action sclérolysante.

Présentations et prix :

A. Amp. de 1 cc. dosées à 1/4 de microgr. par cc.	17 fr. les 6.
B. — 1 cc. — 1 microgr. —	22 fr. les 3.
C. — 1 cc. — 2 — —	55 fr. les 6.
D. — 5 cc. — 2 — —	83 fr. les 2.

Indications et posologie :

Traitement palliatif des *néoplasies inopérables*. Ampoules C : 1 à 2 cc. tous les jours ou tous les 2 jours, série de 12 injections. On peut adjoindre des injections intratumorales au traitement général. Instillations (ampoules D) en cas de *tumeurs vésicales*.

Rhumatismes subaigus : ampoules B : 1 à 3 cc., ou C : 1 à 2 cc. tous les jours ou tous les 2 jours, série de 12 injections.

Adénites tuberculeuses : 1 à 2 injections intratumorales (amp. B) par sem.

Périviscérîtes : ampoules B : 1 par jour pendant 12 jours.

Artériosclérose : ampoules A : 1 à 3 cc. par jour pendant 12 jours.

Les injections doivent être intramusculaires, profondes ou intraveineuses

Les séries peuvent être renouvelées après un repos de 8 à 12 jours

THERAPLIX, 98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

MÉTACARBINE

Formine (recristallisée dans l'alcool)... 3 gr.

Charbon hyper-activé..... 15 gr.

Sucre aromatisé..... Q. S. p. 100 gr.

Propriétés. — Anti-infectieux interne, absorbant et puissant adsorbant.

Indications. — Infections biliaires, urinaires ou gastro-intestinales d'origine épidémique, parasitaire avec ou sans fermentation (entérites, entéro-colites muco-membraneuses, colites spasmodiques, colibacillooses, etc...).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin et après les 2 principaux repas. A croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Nota. — Le pouvoir adsorbant de ce charbon a été considérablement augmenté par une préparation spéciale. Il ne ressemble en rien aux autres charbons dont la force attractive envers les toxines et les poisons ne peut être comparée à celle du charbon hyperactivé.

Prix : 12 fr. 50 la boîte de 135 gr.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e). — Tél. : Gobelins 56-71.

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France

O. C. P., Paris, et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

MÉTACITRINE

Citrate trisodique 6 gr. 50

Phosphate de soude..... 7 gr. 50

Sulfate de soude..... 8 gr. 50

Lactose et sucre effervescent 100 gr.

Poudre granulée très effervescente.

Propriétés. — Favorise la digestion, active la sécrétion biliaire, fluidifie le sang, prévient la lithiase intestinale.

Son action (leïtonique) sur le muscle lui-même et (cholagogue) sur la sécrétion biliaire, détermine une réaction directe et indirecte sur les glandes annexes.

Indications. — Dyspepsies, gastropathies, crise hémoclasique, diathèse arthritique, stase veineuse.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun ou 1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas. Dans un grand verre d'eau tiède.

Nota. — Si le Phosphate Acide de Soude dissout les calculs phosphocarbonatés, le Sel de Magnésie agit moins en dissolvant les concrétions oxalo-phosphatées qu'en empêchant leur formation.

Prix : 15 fr. 50 le flacon de 150 gr.

Laboratoire du D^r E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e). — Gobelins 56-71.

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France.

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PELISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

MÉTACUPROL

(A base de sulfate de cuivre.)

Propriétés. — Efficacité certaine dans toutes les Staphylococcies et Streptococcies. Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique, ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Indications :

Gynécologie : Leucorrhées, Métrites, Démangeaisons, Hygiène intime.

Dermatologie : Furonculose, Anthrax, Impétigo, Eczémas, Brûlures, Affections suintantes, Boutons.

Formes :

Comprimés effervescents de 1 gr.

Ampoules de 5 cc. pour injections intra-veineuses au 1/200^e (utiliser des aiguilles fines).

Pommade en tube. Non grasse. Soluble dans l'eau.

Posologie :

Gynécologie : 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau (hygiène).

1 à 2 comprimés pour 1 litre d'eau (cas aigus).
Position couchée.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Pommade : Application matin et soir.

Ampoules :

Enfants : 1/2 ampoule de 5 cc. par jour.

Adultes : 1 ampoule de 5 cc. par jour, ou 2 ampoules de 5 cc. par jour (cas graves).

Tolérance parfaite. Aucune toxicité.

Prix : Ampoules, 25 francs. Pommade, 12 fr.
Comprimés, 12 francs.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Jasmin 54-52.)

MÉTAFORMINE

(GRANULÉ EFFERVESCENT)

Composition :

Rein (extrait total).....	3 gr.
Formine (anhydro-citrate).....	2 gr.
Pipérazine (tartrate).....	2 gr.
Lithine (citrate).....	2 gr.
Lactose et sucre effervescent. Q. S. pour.....	100 gr.

Propriétés. — Stimulant diastasique rénal, diurétique atoxique. Diallytique, anti-urique.

Indications. — Arthritisme, uricémie, goutte, gravelle, rhumatisme, migraine.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un grand verre d'eau. Le matin à jeun ou avant les repas, et le soir au coucher.

États aigus : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Prix : Grande boîte étanche : 135 gr. : 16 fr. 50.
10 jours de traitement.

Nota. — La première synergie des diastases rénales associées aux diurétiques chimiques.

Il existe aussi une forme *Métaformine comprimé*, renfermant uniquement 0 gr. 50 de formine purifiée par comprimé soluble dans l'eau. — Toutes indications des antiseptiques diffusibles.

LABORATOIRES du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (Ve). — Gobelins 56-71.

Approvisionnement pharmaceutique et Dépôts France :

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PÉLISSARD**

ALGER-CASABLANCA.

MÉTATITANE

Pommade introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures du 1^{er} degré, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Tourneux, Juster, etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus par un procédé tout particulier qui n'est pas encore publié. Ils sont *rigoureusement purs.*

Présentation : Grand tube. — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER

TOURS. (Tél. : 10-78 et 13-62.)

MÉTAUX COLLOÏDAUX ET DÉRIVÉS CINNAMIQUES

Procédés ANDRÉ LANCIEN

Académie des Sciences (1907-11-15-24-34)
Société Médicale des Hôpitaux de Paris (1911-1912)
Journées médicales de Bruxelles (Médaille d'or 1926)

DÉSIGNATION DES PRODUITS	COMPOSITION ET DOSE	MALADIES TRAITÉES
BANIKOL A L (B. 5a 3 cc.)	Iodure de tétra-méthyl-ammonium 3 inj. par semaine	Algies-Rhumatisme Asthme-Hypertension Intoxic. nicotin.
BANIKOL A L (B. 40 comp.)	Iodure de tétra-méthyl-ammonium en association nucléo-argentique 6 à 10 comp. par jour	Algies - Rhumatisme Asthme-Hypertension Intoxic. nicotin.
Bismuth A L (B. 4a 3 cc.)	Bismuth amiconique 3 inj. par sem. 10 inj. repos 10 jours	Syphilis
ÉTAIN A L (B. 4a 3 cc.)	Etain amiconique 3a par sem. 10 inj. repos 10 jours	Furonculose-Acné
ÉTAIN A L (B. 40 comp.)	Etain colloïdal 4 à 6 comprimés par jour jusqu'à guérison	Furonculose-Acné
GLANDACTINE A L (B. 40 comp.)	Total glandulaire activité U V et catalysé par Cu et Be. 6 à 8 comp. par jour	Déficiences organiques
Magnésium A L (B. 4a 3 cc.)	Magnésium amiconique	Néoplasme, Hépatites
Osmium A L (B. 4a 3 cc.)	Osmium amiconique Une inj. t. l. j. 10 inj. repos 20 jours	Sciatiques, Tabes, Sclérose en plaques
Or A L (B. 4a 3 cc.)	Or amiconique 3 inj. par sem. 15 inj. repos 10 jours	Angine de Ludwig Bacillose, Streptococies
PLUROLANA L (B. 4a 3 cc.)	Complexe colloïdal amiconique, Arsenic, Fer, Manganèse, Vanadium, 1 inj. tous jours 15 inj. Repos 30 jours	Anémies
RHODIUM A L (B. 4a 3 cc.)	Rhodium amiconique par 3 cc. ou 6 cc 2 fois par jour pendant l'infection	Typhoïdes, Gripes Pneumonies, Pleurésies, Septicémies streptococciques
Sélénium A L (B. 4a 3 cc.)	Sélénium amiconique 1 inj. t. les jours 20 inj. repos 1 mois	Néoplasmes
Sélénium Vanadium A L (B. 4a 3 cc.)	Complexe amiconique Sélénium - Vanadium	Néoplasmes

DÉSIGNATION DES PRODUITS	COMPOSITION ET DOSE	MALADIES TRAITÉES
TUNOL A L (B. 40 comp.)	Etain colloïdal, Soufre colloïdal, Levure de Bière, Lait irradié 4 à 6 comp p. j. jusqu'à guérison	Acné, Furonculose, Folliculite.
SOUFRE A L (B. 4a 3 cc.)	Soufre électrique amicronique 3a par sem. pend. 15 j. repos 10 jours	Rhumatismes et Insuffisance sulfurée
SOUFRE A L (B. 40 comp.)	Soufre colloïdal 4 à 5 comp. p. j. jusqu'à guérison	Rhumatismes et Insuffisance sulfurée
Soufre A L pommade	Onction quotidienne	Dermatose, Eczéma, Acné, Urticaire, Pityriasis
ZARIL (B. 14 cigarettes.)	Fibre médicamenteuse aux Huiles essentielles sans Eucalyptus ni toxiques 6 à 8 ctg par jour	Congestion des voies respiratoires et Asthme
ZIMBYL A L (B. 5a 3 cc.) (B. 20a 3 cc.)	Cin. Éthyl. Formine en sol. aq. 3a par semaine 10 inj. Repos 10 jours	Bacillose, Convalescences, Grippe Aff. gytn. et Urinaires
ZIMBYL A L (B. 40 comp.)	6 à 8 comp. par jour	Bacilloses, Convalescences, Anémies
ZIMBYL-BISMUTH A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Ethyl. Formine-Bismuth 3a par semaine 10 inj. Repos 10 jours	Syphilis
ZIMBYL - CUIVRE A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Éthyl. Formine-Cuivre 3a par semaine 15 inj. repos 10 jours	Tuberculose cutanée Anémies graves, Lèpre
ZIMBYL-OR. A L (B. 4a 3 cc.)	Cin. thyl. Formine-Or 3a par semaine, 15 inj. Repos 10 jours	Bacillose, Convalescences, Anémies
Zimbyl-Sélénium A L (B. 5a 3 cc.)	Cin. Ethyl. Formine-Sélénium-la ts. 1. j. 20 inj. repos 1 mois	Néoplasmes et Bouton d'Orient

N. B. — Des prix exceptionnels de bon marché sont faits à tous les hôpitaux, cliniques, œuvres de bienfaisance, pour les ampoules livrées en vrac et par quantité importante.

Tous les produits en ampoules sont à 20 francs } la boîte (public).
— — en comprimés sont à 15 francs }

LABORATOIRE DES PROCÉDÉS ANDRÉ LANCIEU

PARIS/FRANCE

Georges WEBER, 8, Rue des Capucines, PARIS

Maison Fondée en 1835

PAS DE SUCCURSALE — TÉLÉPHONE : OPÉRA 32-15

MÉTAVACCIN

Vaccin-pommade aux antivirüs.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscesses, Panaris, Pyodermites, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites. Tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze, et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles.

Présentation : Grand tube — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER

TOURS. (Tél. : 10-78 et 13-62.)

MÉTRITOLS

THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE

Comprimés gynécologiques effervescents, antiseptiques alcalins, astringents.

Composition. — Acide picrique, oxyquinoléine, oxycyanure de Hg., thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, alcalins, astringents, les MÉTRITOLS donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans 1 litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bock très bas.

Prix : 14 francs.

CRAYONS INTRA-UTÉRINS « MÉTRITOLS »

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine, Nucléinate d'argent, Chlorothymol, Parachlorométacrésol, Chloroxylénol.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Polyvalents, Cicatrisants, Décongestionnants.

Métrites chroniques endocervicales de toute origine.

Mode d'emploi. — Placer un crayon intra-utérin tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 16 francs.

OVULES « MÉTRITOLS »

Composition. — Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine — Parachlorométacrésol — Chloroxylénol — Sous-gallate de Bismuth, Oxyde de titane, Essences de cèdre et de Labiées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Désodorisants.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les 2 ou 3 jours.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LEES

Docteur Pierre ROLLAND, Directeur.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 22-01.)

MEXYL

Pâte dentifrice antispirillaire à l'arsénobenzol.

Propriétés. — L'oxycétylaminophénylarsinate de soude, composé arsenical organique de la série arsénique, par sa tenue en arsenic, son grand pouvoir de diffusibilité, est un agent antispirillaire puissant. Il présente l'avantage d'une grande stabilité et d'une très forte diffusibilité, propriétés qui en font l'agent thérapeutique de choix des spirochétoses buccales.

Indications. — Pyorrhée alvéolaire, gingivites, stomatites, noma, gangrène buccale, hygiène buccale préventive.

Mode d'emploi. — Brosser gencives et dents, faces externe et interne. Si les gencives ne supportent pas la brosse, masser avec doigt enduit de pâte.

Prix : le tube, 7 francs.

L. N. C. M. n° 574-1.

Laboratoires MEXYL

6, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 08-29 et 58-55.)

MICELLIODE

Iode colloïdal micellaire électro-positif.

Préparé à partir de foies frais.

Composition :

Iode métalloïdique libre 0 gr. 15

Glycogène extrait du foie frais .. 2 gr. 50

Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.

Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

Avantages. — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

Jamais d'Iodisme

Indications thérapeutiques. — Toutes les indications de l'Iode. Préparation de choix pour l'administration de l'iode aux Basedowiens.

Présentation :

1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).

2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

Posologie :

Gouttes : Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

Adultes : LX à C gouttes.

Adolescents : L à LXXX gouttes.

Enfants : XXX à L gouttes.

Nourrissons : XV à XX gouttes.

Ampoules :

Adultes : une ampoule de 2 cc.

Adolescents : 1 cc. 1/2.

Enfants : 1 cc.

Nourrissons : 1/2 cc.

Tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives représentant une série à renouveler selon besoin.

Prix :

Gouttes : Le flacon 18 fr.

Ampoules de 2 cc. : La boîte de 10 18 fr.

Échantillons sur demande :

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

MICRANYL GRÉMY

Formule :

Peptones spéciales.....	0,15
Extrait de corps thyroïde	0,005
Extrait hépatique.....	0,15

Pour 1 comprimé.

Indications. — Migraine : arthritique, thyroïdienne, menstruelle, de la ménopause, hépatique, de la constipation.

Contre-indications. — Céphalées : des méningites, des tumeurs cérébrales, des syphilitiques.

Mode d'emploi. — Une demi-heure ou une heure avant les repas, trois comprimés de **Micranyl Grémy**.

Surveiller la constipation ; faire prendre une alimentation légère, finement coupée : purées, légumes verts. Eviter tabac, alcool et tous excitants. Les sources thermales, agissant sur le foie, l'estomac ou l'intestin, sont indiquées, ainsi que l'exercice au grand air.

Prix : 18 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

MICRODERME

(Crème d'Alibour enlevable à l'eau.)

Crème-émulsion contenant 50 p. 100 du **Microderme-Solution** dilué au 1/20°.

Non irritant, Microbicide par le Zn et Cu ionisés. — Cytophyllactique et *isotonique* par le $MgCl^2$.

Formule pour 100 : SO^4Cu , 0,20 ; SO^4Zn , 0,10 ; Sérum magnésien, 50 ; Excipient, 50 gr.

Indications. — **Toutes les pyococcies cutanées.** Impétigo (après lavage au **Microderme-Solution** au 1/20), orgelets, anthrax, eczéma et dysidrose infectés, pemphigus épidémique des nouveau-nés, *dermites fessières des nourissons*.

Aucune contre-indication, peut être associé à une médication iodée.

Est supporté par tous les épidermes et toutes les muqueuses.

Le tube de 20 gr. : 6 francs ;

Le tube de 60 gr. : 13 francs.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII°).

(Tél. : Laborde 08-51.)

MICROLYSE

Nouvel antiseptique de synthèse
à pouvoir fortement bactéricide sur le

COLIBACILLE

et le

GONOCOQUE

Travaux du professeur Louis Gaucher.

(Communication à l'Académie de Médecine du
24 janvier 1933.)

Action. — Éclaircit rapidement les urines
et arrête la pyurie ; Calme la douleur.
Remonte l'état général. Pas de toxicité
ni d'action congestive.

Ses effets rapides sont dus à la synergie de
ses deux composés synthétiques α et β .
 α *Imprègne l'organisme et lui rend ses moyens
de défense.*

β *Se porte sur l'arbre urinaire qu'il calme et
assainit*

Indications :

Colibacilloses : Infections des voies intes-
tinales et biliaires : entérocolites, Cholé-
cystites, Lithiases.

Infections urinaires : En général : Pyélo-
néphrites, Cystites, Prostatites.

Parasites intestinaux : Vers, Amibes et autres
protozoaires, souvent générateurs de coli-
bacillose.

Gonococcies : Urétrites, Métrites, Salpingites.

Trois formes :

Comprimés : 3 par jour, un pendant ou après
chaque repas. Avaler sans croquer.

Poudre pour enfants.

Doses prêtes pour lavages vésicaux et vaginaux.

**Laboratoires de Physiologie
et de Thérapeutique.**

10, rue de Strasbourg Paris (X^e).

Tél : Nord 46-14.

MICROVAX du docteur ROUSSEL

Les Microvax du Dr Roussel comprennent 4 variétés :

1° Vaccins injectables : En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. Prix : 15 francs.

Microvax n° 1 : Antistaphylococcique ;

Microvax n° 2 : Antipyogène ;

Microvax n° 3 : Infections Génito-Urinaires.

Microvax n° 4 : Antigrippal, Antipneumococcique.

Microvax n° 5 : Infections Oto-Rhino-Laryngo.

Mode d'emploi :

Une série de 12 injections espacées de 2 ou 3 jours.

Commencer par 1/2 cc. et augmenter régulièrement de :

1/2 cc. chez l'adulte } jusqu'à 2 cc.

1/4 cc. chez l'enfant } jusqu'à 2 cc.

Repos de 15 jours entre 2 séries.

2° Bouillons-Vaccins : En boîtes de 5 ampoules de 10 cc. Prix : 15 francs.

Microvax n° 10 : Antistaphylococcique.

Microvax n° 11 : Antipyogène.

Microvax n° 12 : Infections Oto-Rhino-Laryngo.

Mode d'emploi :

Applications locales en pansements, badigeonnages, instillations.

3° Vaccins Ingérables : En boîtes de 10 ampoules de 5 cc. Prix : 15 francs.

Microvax n° 20 : Antistaphylococcique.

Microvax n° 21 : Anticolibacillaire.

Microvax n° 22 : Antipyogène.

Mode d'emploi :

Chez l'Adulte : 2 ampoules par jour loin des repas.

Chez l'Enfant : 1 ampoule par jour le matin à jeun.

Une série de 10 ampoules.

Repos de 5 jours entre 2 séries.

4° Bactériophages Ingérables : En boîtes de 10 ampoules de 2 cc. Prix : 15 francs.

Microvax n° 30 : Anticolibacillaire.

Microvax n° 31 : Antipyogène.

Microvax n° 32 : Antistaphylococcique.

Mode d'emploi :

Une ampoule à jeun dans 1/2 verre d'eau pendant 10 jours.

Peuvent être utilisées également par voie hypodermique et en applications locales sur les plaies et dans les foyers infectieux.

Pour la prescription médicale, il suffit d'indiquer Microvax et le numéro.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

MICTASOL

Décongestif pelvien.

Composition.

Comprimés. — *Noix de Malva purpurea* 0,25, Bromure de Camphre 0,02, Formine 0,05.

Suppositoires : *Malva purpurea* 0,50, Stovaïne 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25.

Ovules : *Malva purpurea* 1,50, Ichtyol 0,50, Ext. de Jusquiame 0,05, Glycérine solidifiée Q. S.

Propriétés thérapeutiques.

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques.

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites. Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Comprimés : 6 à 9 comprimés par jour, à prendre aux repas, avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Ovules : 1 le soir au coucher.

Laboratoires du MICTASOL

BARBE pharmacien

155, boul. Magenta — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 50-34.)

MICTASOL BLEU

Décongestif pelvien.

Composition :

Le MICTASOL BLEU se présente *uniquement* sous forme de comprimés ayant la même composition que les comprimés de MICTASOL ordinaire, mais dans lesquels l'héxaméthylène-tétramine a été remplacée par le bleu de méthylène (2 centigrammes par comprimé).

Particularités :

Le MICTASOL BLEU est particulièrement indiqué toutes les fois que l'élément congestif s'accompagnera de l'élément douleur, et chaque fois que l'on craindra chez un malade une intolérance à l'héxaméthylène-tétramine.

Indications thérapeutiques :

Toutes les indications du MICTASOL et en particulier les infections, congestions et inflammations du petit bassin s'accompagnant de douleurs.

Mode d'emploi :

Même posologie que le MICTASOL ordinaire, soit 6 à 9 comprimés par jour.

Laboratoires du MICTASOL

A. BARBE, Pharmacien

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-34.)

MICTOPHILE RICHER

Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.

Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

Composition :

Bleu de méthylène	0,02
Lactose	0,29
Extrait de belladone	0,003
— de mauve	0,05

Pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyélites, Pyélonéphrites, Blennorragies, Prostatites, Colibacillurie.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 15 francs.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie,

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,
PARIS. (Tél. : Provence 34-87.)

MICTOSEDÁ

Comprimés.

Sédatif-décongestif génito-urinaire.

Deux formes : Bleu et Simple.

Petits comprimés lenticulaires.

Composition. — *Mictoséda bleu* : Bromure de Camphre 0,02, Benzoate de Lithine 0,10, Hexaméthylène Trétramine 0,05, Bleu de Méthylène, 0,02, Extrait de Buchu 0,01, Extrait de Jusquiame 0,01, Bimalva qualité supérieure 0,30. *Mictoséda simple* : même formule, sauf remplacement du Bleu de Méthylène par extrait d'Hamamélis 0,05.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical, Prostatisme, Urétrites, Cystites, Néphrites, Bactiuries, Dysménorrhées, Métrites, Vaginites, Salpingites. Rétention, Troubles nerveux urinaires, Congestion du petit bassin chez l'homme et la femme.

Mode d'emploi. — 6 à 8 comprimés par 24 heures, aux repas, avec une gorgée d'eau.

Prix : 15 fr. l'étui de 50 comprimés.

(6 à 9 jours.)

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59.)

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide.)

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorragie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;
Enfants : par demi-cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoires B. C. L.

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique,
71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

MICTUALINE

Antiseptique, Sédatif, Décongestif.

1^o PILULES :

Collargol à 80 p. 100 argent pur	0,02
Urotropine recristallisée	0,10
Bleu de méthylène pur	0,01
Bromure de camphre.....	0,02
Extraits d'Uva-ursi et seneçon.....	Q. S. p. 1 pilule

Indications :

- 1^o *Maladies des voies urinaires* (métrites, cystites, pyélonéphrites, prostatites, hypertrophie de la prostate, etc.).
- 2^o *Maladies des voies génitales* des deux sexes.
- 3^o *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le tractus génito-urinaire (syndrome entéro-rénal, colibacillose, etc...).

Posologie. — 6 à 9 pilules par jour.

Prix : 18 francs

2^o SUPPOSITOIRES

Extrait Belladone	0,01
— Jusquiame	0,05
— Hamamélis	0,10
Bromure de camphre.....	0,10
Analésine	0,40

Toutes algies : 1 à 2 par jour. — Prix : 15 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Émile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

MINÉRALOGÈNE OU ARTÉRIOLEX

(Nouvelle dénomination.)

Spécifique de l'artériosclérose.

Silicate de soude titré, soluble, assimilable.

Poudre: 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Comprimés: 4 à 8.

Granulés: 1 à 2 cuillerées à café.

Dissoudre avant d'absorber.

Laboratoire VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON (Rhône).

(Tél. : Burdeau 28-07.)

MINERVOL

Pommade en tubé. Poudre.

Composition. — Acide benzoïque du toluol, 0 gr. 20 ; acide borique, 3 gr. ; Silicate de magnésie, 10 gr. ; Baume du Pérou, 1 gr. 50 ; Stéarate de zinc, 10 gr. ; acide orthoxybenzoïque, 0 gr. 30 ; Métadioxyphe-nol, 0 gr. 70 ; Lanoline et essence de verveine Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Erythème fessier, rougeurs, démangeaisons, crevasses du sein et des mains, engelures, gerçures, brûlures, coups de soleil, prurits, impétigo, intertrigo, et toutes dermatoses.

Propriétés. — Donne d'excellents résultats pour les cas indiqués, ne renferme aucun produit toxique, ne tache pas et s'enlève facilement.

(Publicité exclusivement médicale.)

Présentation :

Tube moyen : 6 fr. 50. Grand tube : 10 fr. 50.

Poudre : 6 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 888-2 et 888-13.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 2, rue Mélingue — PARIS (XIX^e).

MINUREX

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Pour 1 comprimé :

Extrait de Cécropia	}	aa	0,015
Extrait de Cynara feuilles fraîches.....			
Extrait de Teskra			
Diméthylxanthine.....			0,125
Phosphate de Soude Anhydre			0,10

Propriétés. — Diurétique direct, il diminue l'azotémie, régularise et stimule la systole ventriculaire.

Indications. — Syndrome cardio-rénal, azotémie légère chez certains porteurs d'ulcères jambiers, déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux, Dyspnée d'effort.

Mode d'emploi. — Prendre 3 fois 2 comprimés par jour. Demander les brochures des Docteurs P. et R. Bourggraft : *Ulcères Variqueux* et *Eczémas pré et post-ulcéreux*.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle.)

MIROXYL LAHAYE

Forme Sirop.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la Toux. Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Puissant modificateur de toutes les pneumopathies.

Propriétés actives. — A base de Cinnaméine du Baume du Pérou (*Miroxylon Pereira*) associé au Sulfogaiacolate de potasse et au Camphosulfonate de Soude.

Une cuillerée à bouche contient :

Extrait hydroalcoolique spécial de Baume du Pérou.....	0,075
Sulfogaiacolate de potasse	0,45
Camphosulfonate de soude	0,023
Iodhydrate de codéine.....	0,015
Sirop de Thym	3 gr. 65

Préparation agréable au goût. Pas de constipation grâce à l'adjonction d'un extrait de Rhamnus sans amertume.

Posologie. — *Affections aiguës* : 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, éloignées des repas.

Affections chroniques : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections des voies respiratoires et en particulier la grippe, pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite fétide, toux des tuberculeux.

Prix : 16 fr. 50 (taxe comprise).

Laboratoires P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie
32, rue de l'Ouest, PARIS. — (Tél. : Ségur 08-13.)

MIXIOD

Médication spécifique de l'Amibiase.

Acide 7 iodo-8 oxyquinoléine-5 sulfonique additionné de bicarbonate de Sodium qui facilite la dissolution de cet acide dans l'eau.

Présentations :

Mixiod poudre pour préparations extemporanées (Cachets-Solutions pour lavements).

Flacons de 15 g. Prix : 30 fr. ; de 30 g. : 55 fr.

Mixiod pilules, dosées à 0 g. 25.

Flacons de 20 pilules. Prix : 15 fr.

Indications. — Amibiase aiguë et amibiase subaiguë. — Destruction des Amibes et des kystes amibiens.

Mode d'emploi et posologie. — Traitements par voie buccale, par voie rectale (en lavements) et traitements mixtes.

Voie buccale : 1 g. 50 à 3 g. *pro die* pendant une semaine.

Voie rectale : Lavements à doses croissantes de 0 g. 25 à 1 g.

Société parisienne d'Expansion chimique

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

MOLAGAR

Emulsion parfaite et stable d'huile de paraffine et d'agar-agar (sans aucun médicament laxatif).

Le Molagar est une émulsion homogène, très fluide et très agréable au goût, contenant 50 p. 100 d'huile de paraffine *spécialement traitée*.

Propriétés : Le Molagar stimule doucement le fonctionnement de l'intestin en lubrifiant les parois et en humidifiant le contenu. Ne contient aucune substance aromatique ou laxative surajoutée. Ne provoque jamais ni nausées, ni coliques ; n'occasionne pas de suintement huileux par l'anus, comme c'est le cas pour l'huile de paraffine ordinaire ; aucune accoutumance.

Indications. — Convient surtout aux constipés dont l'intestin est délicat. Recommandé en cas de constipation spasmodique, en cas de colites, surtout chez les coloniaux à foie déficient. Le Molagar est parfaitement utile chez les femmes enceintes, les opérés, les hémorroïdaires, les diabétiques et les enfants, car il agit doucement.

Mode d'emploi. — *Doses pour adultes :* une à deux cuillerées à soupe de Molagar le soir en se couchant ; à répéter dans la matinée si nécessaire, une ou deux heures après le repas. *Doses pour enfants :* de 2 à 4 cuillerées à café prises telles quelles ou mélangées avec du lait ou de l'eau ou des aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Littérature et Echantillonnage médical sur demande.

Laboratoires SUBSTANTIA

M. GUEROULT, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès. — SURESNES

(Tél. Longchamp 16-85-16-86-16-87.)

MOLÈNE

Indications. — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse) ; adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative ; tuberculose pleurale ; tuberculoses cutanées diverses.

Contre-indication. — Néphrite avec albuminurie abondante.

Mode d'emploi. — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours ; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours ; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

Présentation. — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhydride Molybdique pur).

Prix de vente au public : 25 fr. la boîte de 12 ampoules

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

Dépôt : **Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**
54, Chaussée d'Antin, — PARIS.

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Éthyle : solution huileuse à 25 p. 100
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — Le Moréthyl est actif contre toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique, en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et produit, dans certains cas, la rétrocession des lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées. — Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — Une injection chaque jour, pendant 20 jours consécutifs, par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél.: Turbigo 63-40.)

MORISLAND

Granulé fondant.

Composition. — Ergostérine irradiée, Lipoides de Foie de Morue, Iode, Tanin. Distéaro-glycérophosphate de choline.

Indications. — Augmentation de poids ; Engorgements ganglionnaires.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 francs (durée 8 jours).

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).
(Tél. : 22.)

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arséniée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique, d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique ; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoïétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour ; de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Prix : 18 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). (Tél. : Roquette 14-12.)

MORRHUÉTINE JUNGKEN et MORRHUÉTINE JUNGKEN VITAMINÉE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (Nao, Cao, Manganèse), en tout 15 cgr par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

La Morrhuéline Jungken Vitaminée est le même produit avec en plus, toutes les Vitamines d'huile de foie de morue.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique Reconstituant.

Indications — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences, des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi — *Enfant* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

Prix : Solution : 16 francs. — Vitaminée : 18 francs

BRACQUEMOND et Cie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 05-54. (B.)

MORRHUOL CHAPOTEAUT

Composition. — Extrait concentré d'Huile de Foie de Morue, enrichi en Vitamines A, de croissance (11 000 U. I. par gr.) et en Vitamines D, antirachitiques (1 500 U. I. par gr.), par de l'huile de Flétan sélectionnée.

Pour compléter l'action propre du Morrhuol, 1 centigr. d'Hypophosphite de Chaux est incorporé à l'enveloppe gélatineuse de chaque capsule.

Indications. — Avitaminose, rachitisme, lymphatisme athrepsie, troubles de croissance, rhumes, bronchites chroniques, pré-tuberculose.

Présentation. — Capsules minces de gélatine très pure dosées à 0 gr. 10, se dissociant dans l'estomac.

Posologie :

Adultes : 4 à 8 capsules par jour au début des repas.

Enfants : 2 à 4 capsules par jour au début des repas.

Prix : 16 francs le tube de 80 capsules.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

VIAL et Cie, 8, rue Vivienne — PARIS

(Tél. : Gutenberg 27-03.)

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brome. — Extrait opothérapique de foie de morue. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glycériné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant antilymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses. — *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à café par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 12 francs.

E. VERGELOT, Pharmacien,

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 48-22.)

Enregistré au Laboratoire national des médicaments sous le n° 997-25.

MORUAN

Granulé.

Composition :

Extrait lipoïdique de foie de morue frais,
Extrait lipoïdique de foie de porc. Phosphate tricalcique, Iode, Tannin, Extrait liposoluble de *Laminoria flexicaulis*.

Indications :

Lymphatisme, Infections microbiennes, engorgements ganglionnaires, Dépuratif.

Posologie :

Une cuillerée à café du granulé sur la langue, puis avaler un peu d'eau, 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS.

MORUBIASÉ

Extrait hépatique total de morue irradié et sans corps gras.
Principes actifs. — Lipophosphatides, acide morrhuïque, vitamines.

Formes. — *Pilules et granulé.* Une pilule ou une cuiller à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

Avantages. — Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

Indications. — Celles de l'huile de foie de morue : Anémies, Lymphatisme, Rachitisme, Affections chroniques des voies respiratoires.

Posologie :

Adultes : 6 à 8 pilules par jour au début ou à la fin des repas.

Enfants : 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

Arrhéno-Morubiasé : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

Gaïaco-Morubiasé : Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de gaïacol par pilule.

Prix : 10 francs. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Laboratoires MEYNET-CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.
 (Tél. : Avron 35-04.)

MORUCALCOSE

(Granulé)

Forme. — Granulé reconstituant, de goût très agréable (Huile de foie de morue d'hiver et d'été sans odeur.)

Composition. — Extraits lipoïdiques de foie de veau et de foie de morue, thyrotoxine, surrénine, phosphate tricalcique et combinaison iodotannique.

Indications. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue dans toutes ses indications : Anémie, Croissance, Scrofule, Lymphatisme, Rachitisme, Bacillose, etc...

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments
 sous le n° 484.

MORUFINE

Médicament de choix.

Pour les croissances difficiles. Facteur puissant du développement de l'organisme carencé.

Composition. — Extrait de Foie de Morue obtenu par procédé spécial, très riche en vitamines, chaux, iode en combinaison tannique et antiscorbutique.

Pas de colorant artificiel, Jus de Cassis, Jus de Framboises (Fruits sélectionnés, Acide ascorbique).

Indications. — Troubles de la Nutrition, Lymphatisme, Pré-tuberculose, Anémie et Faiblesse générale, Bronchite chronique, Troubles du Métabolisme, Furunculose et éruption cutanée.

Présentation. — Forme sirop, flacon 300 cc.

Prix : 16 francs.

Posologie :

Adultes : 3 cuillerées à soupe avant ou après les repas.

Enfants de 2 à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 2 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1111-7.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

MOTHERSILL'S SEASICK REMEDY

Médication contre le mal de mer, des airs, du chemin de fer et de l'automobile. Préviend et arrête tous les maux de voyages.

Composition	Poudres	Rose	Brune
	Sucre de lait.....	33,0 %	0,0 %
	Cannelle	0,0 —	29,4 —
	Caféine	8,2 —	8,4 —
	Acide stéarique	18,0 —	17,4 —
	Trichlorbutyl-alcool tert	40,1 —	44,5 —

Posologie et mode d'emploi. — a. *Préventif* : prendre une capsule rose et une brune environ une heure avant de prendre le bateau, le train, l'auto ou l'avion. Ces doses doivent être prises 1 heure avant de manger ou 2 heures après. Les doses ultérieures seront prises à intervalles de 6 heures tant que la nausée continue.

Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne jamais prendre ce remède durant l'heure qui précède le repas ou durant les 2 heures qui suivent celui-ci.

b. Pour arrêter les vomissements, répéter la dose dès que le premier vomissement violent est terminé. Au cas où les vomissements sont continus, vider les capsules et en avaler le contenu comme une poudre en prenant quelques gorgées d'eau.

Présentation et prix : Boîte petit modèle, 3 doses : 16 fr. 50.

Boîte grand modèle, 8 doses : 33 fr. 10.

Laboratoire MOTHERSILL REMEDY COMPANY

A. GLANDIÈRES, Pharmacien, 5, rue de Provence — PARIS (IX^e).

Tél. Provence 53-67.

MUCICARBOS

Composition. — **Charbon animal chimiquement pur activé** (Carbos), *associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.*

Forme. — Granulé rond : **Mucicarbos simple** ; **Mucicarbos benzo-naphtolé.**

Indications. — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocrites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
 (Tél. : 30.)

MUCILAGE GOY

Composition :

Poudre de cæcum.....	2 grammes.
Polypode de chêne stabilisé.....	3 —
Mucilage pur.....	60 —
Pour 100 grammes.	

Propriétés. — Régulateur de l'intestin.

Indication. — Constipation sous toutes ses formes.

Présentation et prix :

Granulé. La boîte de 125 grammes de granulé : 13 francs, pour 12 à 13 jours de traitement.

Posologie et mode d'emploi :

1 ou 2 cuillerées à café à la fin du repas, midi et soir.

Placer le granulé dans la bouche, sans le mouiller, et avaler avec une gorgée d'eau.

Enfants : 1/2 dose.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (XIV^e).
 (Tél. : Archives 34-68.)

MUCILAXINE

Composition. — Huile de Paraffine de haute viscosité et neutre, associée par procédé spécial à un mucilage pur sans cellulose (*action purement mécanique*) sans aucune addition d'eau ni de produit laxatif. *Suppression du suin-tement.*

Forme. — Crème facile et agréable à prendre.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin. — Constipation, Colite, Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour (suivant l'âge) au début des repas.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

MUCINUM

(Comprimés de)

Composition :

Entérokinase	0 gr. 005
Érepsine.....	0 gr. 005
Pancréase.....	0 gr. 005
Bile	0 gr. 010
Atropa Belladona	0 gr. 005
Cassia acutifolia	0 gr. 075
Phénolphtaléine.....	0 gr. 075

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés, très friables, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 7 francs la boîte de 36 comprimés.

Laboratoire CHANTEREAU

(Produits Innothera)

26 bis, rue Dombasle — PARIS.

MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

Indications. — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

Doses et modes d'emploi. — Suivant les cas, 2, 3 ou 4 cuillerées à bouche : la présence d'un mucilage permettant de diminuer les doses habituellement données de carbonate de bismuth.

Prix au public : le flacon : 22 francs.

Le 1/2 flacon : 13 francs.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD O. * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses

Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigations.

Prix : 8 fr. 50.

Traitement unité : 10 à 12 jours

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 12-63.)

MUCYLLIUM

Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**. Désinfectées rationnellement sans détruire ni Vitamines ni Hormones indispensables. Elimination sûre de tous corps étrangers métalliques et organiques.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

Indications du Mucyllium. — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocôlon, et ce, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroïdes, fissures anales, appendicite chronique, cholécystites, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

Doses. — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, de purée ou de potage. Diarrhées et selles liquides, à dose légère ne dépassant pas une cuillerée à café par repas.

Prix : boîte de 250 grammes : 12 francs.

Prix : boîte de 500 grammes : 23 francs.

Prix : boîte de 1 kilogr..... : 45 francs.

Prix : boîte de 5 kilogr..... : 175 francs.

Prix : boîte de 10 kilos..... : 320 francs.

Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 914-1.
Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

Littérature et Échantillons médicaux sur demande :

Laboratoires BERNARD-GARCIN

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : n° 6.)

Eugène GRAS, pharmacien de 1^{re} classe,
Ex-interne des hôpitaux.

MULTIPLAST

Pansement adhésif cicatrisant.

Composition. — Le *Multiplast* est composé d'une compresse de coton et gaze imprégnée à la Pyoktanine, puissant antiseptique.

Cette compresse est montée sur un support adhésif permettant la fixation instantanée.

Indications. — Au foyer, à l'usine, en voyage, une boîte *Multiplast*, type « Sport » sera très utile pour les soins rapides et la protection des petites blessures, des enfants et des adultes.

Pour le cabinet de consultations, le Poste de Secours, l'Infirmier, un coffret contenant des bandes de largeurs 4, 6, 8 centimètres, permettent des centaines de pansements.

Prix au public : *Multiplast*, boîte sport, la boîte : 5 fr. 50.

Multiplast, coffret 1255, le coffret 55 francs.

Fabriqué à Paris par les laboratoires Herbel.

Dépôt général.

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

MUOLÉOL

Agent de drainage intestinal, d'une grande efficacité pour le traitement de la constipation, même chronique, avec ou sans complication d'entérite.

Rééducateur de l'intestin, pas d'accoutumance, ne contient pas de phénol-phtaléine.

Forme. — Poudre aromatisée à l'anis, facile à prendre.

Composition. — Ferments digestifs (papaïne, diastase, pancréatine, duodénine) ; Magnésium hydroxydé et hydrocarbonaté ; citrate trisodique, glycéro-phosphate de soude ; lactose.

Indication. — La constipation sous toutes ses formes.

Posologie. — Une à deux fois par jour, prendre après les repas une cuillerée à café de MUOLÉOL, délayé dans 1/4 ou un demi-verre d'eau ou d'infusion, que l'on peut sucrer à volonté ; boire aussitôt après un peu d'eau ou d'infusion. Si l'effet est insuffisant, on peut augmenter les doses sans inconvénient.

Peut se donner aux enfants au-dessus de 5 ans, en diminuant les doses.

Prix : 14 francs.

Durée moyenne de chaque boîte : 15 à 20 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques A. BLANC

BARCELONNE-DU-GERS (Gers). (Téléphone : 4.)

MURONES DU D^r ROBERT JACQUES

1^o **MURONE aérogène.** — Redressement fonctionnel du poulmon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

Indications. — S'adresse aux anémies, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

Composition. — Essences oxydées et essence phénol en proportion juste : ampoule n^o 1, et essence diffusible : ampoule n^o 2, contenues dans la même boîte.

Mode d'emploi. — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2^o **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

Composition. — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

Mode d'emploi. — Alternier les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 16 fr.

Fabrique par les laboratoires AUG. LUMIÈRE

Dépôt et vente :

Établissements SILBERT et RIPERT

30, rue Bénédit — MARSEILLE.

MUSCULOGÉNOL

Reconstituant, recalcoifiant.

Forme. — Elixir et cachets.

Composition. — L'elixir : *reconstituant* à base de méthylarsinate disodique, nucléinate de soude, glycéro-phosphate de soude, fluorure de sodium, muscat vanillé. Les cachets : *recalcoifiants* à base de nucléinate de manganèse, fluorure de calcium, de glycéro de chaux et de sel calco-magnésien de l'acide anhydroxyméthylène diphosphorique.

Indications. — Convalescence, Surmenage, Débilité, Lymphatisme, Scrofule, Anémie, Neurasthénie. *Tous états asthéniques et atoniques ou troubles du métabolisme calcique.*

Posologie :

Elixir. { *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour avant les repas.
 Enfants : 2 à 3 cuillerées à café de 4 à 10 ans. Au-dessus, par cuillerées à dessert.

Cachets. *Adultes* : 2 à 3 cachets par jour aux repas.

Prix : Elixir : 16 fr. 50 — Cachets : 18 fr.

Laboratoire du MUSCULOGÉNOL

117, rue Victor-Hugo — HOUPLINES (Nord) (Tél. 11.)

Médicament enreg. au L. N. C. M. sous le n^o 1480-1.

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes. Pian, Angine de Vincent, Lupus érythémateux.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 40 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 3 jours ou 2 ampoules tous les 5 jours.

Traitement de sécurité : Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

MUTHIODE

Solution d'Iodure double de Bismuth et de Sodium.

Indications. — Syphilis à tout âge et à toutes ses périodes. Le MUTHIODE peut être utilisé comme traitement d'attaque.

Hérédo-Syphilis.

Scléroses parenchymateuses et vasculaires.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires par semaine.

Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (Adultes).

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (Enfants).

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. 20 francs.

La boîte de 12 ampoules 1 cc. 16 francs.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

MUXAGOL

Régulateur du tube digestif. Seul mucilage garanti stérilisé au cours de sa préparation.

Composition. — Graines de *Plantago decubens* (Psyllium blond des Indes) produit le mucilage le plus abondant et dont la teinte claire permet, par triage à la main, d'éliminer totalement les impuretés qui sont généralement de couleur foncée.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin, Constipations, Colibacilloses, Entérocrites mucomembraneuses, Colite et dans toutes les affections d'origine intestinale.

Recommandé aux « entéro-névropathes », dyspeptiques, malades atteints d'hémorroïdes, de fissures, de ténisme ano-rectal, etc.

Action sédative dans les coliques néphrétiques, les cystites et dans toutes les inflammations des voies urinaires.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café à la fin de chaque repas. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café à la fin de chaque repas.

Un traitement régulier de 3 mois est généralement nécessaire, mais un emploi pendant des années de même qu'une augmentation des doses ci-dessus indiquées ne présentent aucun inconvénient, le MUXAGOL n'étant pas un laxatif, mais un régulateur de transit intestinal.

Prix : 15 fr. Permettant un traitement de 10 à 20 jours.

Laboratoire du MUXAGOL

8, rue Dr Jean-Sicard, MARSEILLE. — Tél. : Marengo 16-69.

MYCIDOL BADEL

Combinaison allylique et sulfurée de méthanal, essences aromatiques et sels de radium.

Externe. — Antiseptique général, chirurgie, gynécologie, obstétrique.

Dose. — 2 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix : 8 francs.

Interne. — Infections gastro-intestinales, non spécifiques, dysentériques, typhiques et grippales. Helminthiase.

Dose. — 50 à 100 gouttes par jour.

Prix : 10 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments
556-2, 556-3.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

Prix :

Buvable-Extrait : 20 francs le flacon de 250 gr.

Ampoule : 6 francs.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et Cie pharmacien

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

MYGDAL

Traitement organothérapique des troubles amygdaliens et pharyngiens.

Composition. — Extractif de tissus amygdaliens en solution hydroalcoolique, pour administration par voie buccale, selon la méthode des D^{rs} Cuvier et Carrère.

Indications. — Dans l'hypertrophie simple des amygdales. Dans les troubles persistant après leur ablation. Dans les amygdalites dues à des états diathésiques (rhumatismales, etc...). Dans certains troubles pharyngiens et laryngiens (enrouements, etc...).

Posologie :

Chez l'enfant : 1 goutte 2 à 3 fois par jour.

Chez l'adulte : 1 goutte 3 à 4 fois par jour.

Loin des repas.

Forme. — Gouttes pour administration par voie buccale ou en gargarismes.

Prix au public : 30 francs.

Préparé par **H. BOISSEL, Pharmacien.**

Préparation, Littérature, Echantillons :

Laboratoires H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaugue — BORDEAUX.

Dépôt général : France : O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Afrique du Nord :

Coopération Pharmaceutique Française,

37, rue de Lyon — ALGER.

MYOCHRYSINE

Aurothiomalate de Sodium, sel titrant 50 % d'or métal sous forme de solution aqueuse et de suspension huileuse pour injections intra-musculaires ou sous-cutanées. À utiliser dans les cas où les injections intraveineuses de CRISALBINE sont impossibles. Bien toléré localement.

Indications. — Tuberculose pulmonaire de l'adulte et T. P. infantile. T. ganglionnaires et cutanées. Tuberculides. Rhumatismes chroniques et infectieux.

Présentations. — Solution aqueuse (étiquettes bleues) et suspension huileuse (étiquettes jaunes). Dosages : 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Boîtes de 1 et 10 ampoules. (Prix suivant dosage et conditionnement.)

Tuberculose pulmonaire. — Débuter à 0,05 et ensuite 0,10, puis 0,20 et 0,30 par semaine.

Rhumatisme. — Débuter à 0,01 et ensuite 0,05 et 0,10 ou 0,20 par semaine (consulter la notice).

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94)

MYODEN

Élixir Antirhumatismal et Antigoutteux •
au Phosphohexaparadiazinammonium.

Composition. — Phosphohexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

Indications. — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

Enfants au-dessus de dix ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Durée du traitement : pour un flacon 8 jours. Traitement complet : 3 flacons.

Nota. — Le MYODEN peut être prescrit par le Corps médical pour les Assurances Sociales.

Médic^t enregistré au Lab. N^o 1 de Contrôle des Médic^{ts} n^o 726-1,

Prix : 20 francs.

Laboratoires E. DAUPEZ
37, rue des Lois — TOULOUSE (Hte-Gar.). (Tél. : 224-55.)

MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une *remarquable efficacité*.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile, d'autre part, en font le *mieux toléré* de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intramusculaire qui est *absolument indolore*.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 5 cg. (demi-dose), 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série. Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

Prix de vente :	{	11 fr. 50	l'ampoule de 5 cg. (demi-dose).
		17 fr. 50	— 1 cc. (6 cg. 41 or métal).
		23 francs	— 2 cc. (12 cg. 83, or métal).
		30 —	— 3 cc. (19 cg. 24, —

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. Opéra 54-58.)

MYOSTHÈNE

Tonique et reconstituant général. Synergie médicamenteuse de principes actifs classiquement éprouvés, stimulant de la nutrition, tonique musculaire et cardiaque, renfermant un extrait de kola stabilisée préparé selon un procédé spécial qui assure à la préparation toutes les vertus de la plante fraîche, etc... Préparation de goût agréable, de tolérance parfaite, agissant vite chaque fois qu'il s'agit de relever un état général déprimé.

Indications. — Asthénies, convalescences, anémies, surmenage, grippe, anorexies, amaigrissement, toutes les carences organiques.

Formes :

- 1° **Myosthène méthylarsiné, forme d'éllixir :** arsenic en combinaison organique (pas d'intolérance), kola fraîche stabilisée Dausse, phosphates alcalins, catalyseurs biologiques, en un véhicule de goût agréable ;
- 2° **Myosthène au fenugrec, forme granulée :** même formule que l'éllixir, mais sans arsenic et avec addition d'extrait de fenugrec désodorisé ;
- 3° **Myosthène à l'hémoglobine, forme granulée :** même formule que l'éllixir, mais sans arsenic et comportant de l'hémoglobine totale, des extraits d'organes hémopoïétiques et du suc musculaire sec.

Nota. — Ces deux dernières formes sont destinées aux malades qui tolèrent mal l'arsenic, même organique.

- 4° **Élixir Myosthène pour diabétiques :** préparation sans sucre.

Doses moyennes :

Deux ou trois cuillers à soupe par jour pour les adultes.

Deux ou trois cuillers à dessert pour les enfants au-dessus de 10 ans.

Myosthène étant inscrit au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, peut être remboursé aux Assurés Sociaux.

Laboratoires BARTIER

E. BARTIER, Docteur en Pharmacie

ARMENTIÈRES (Nord).

(Tél. : 254.)

MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

Indications. — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

Mode d'emploi. — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 14 francs.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 00-15.)

MYOVARSYL

Sulfarsénobenzol, voie intramusculaire ou sous-cutanée.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Hypotrophie des sujets en bas âge. Médication de choix des sujets à veines difficiles : femmes, enfants, nourrissons.

Présentation. — En boîtes unitaires : ampoule de 0,015 à 0,50.

Prix au public, suivant dose, de 2 fr. 50 à 14 fr. 50.

Solvant pour arsenicaux. — Rend indolore l'injection des arsénobenzènes. Aucun analgésique. Ampoules de 2 et de 5 cc.

L'ampoule de 2 cc. suffit pour dissoudre les doses s'échelonnant de 15 mgr. à 18 cgr. de sel. Au-dessus de cette dernière dose, utiliser 3 à 5 cc.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue A.-Thomas — PARIS (IX^e). T. : Prov. 20-20.

NAIODINE LOGEAI

Formule : 1° *Normale*, ou **A**, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium, stabilisé pour intramusculaires.

2° *Concentrée*, solution **B** aqueuse à 5 %. *Spéciale pour intraveineuses*

3° *Sulfoiodée* (voir *Thio-Naiodine*).

Formes :

A	{ 6 amp. de 10 cc. : 23 fr. net.
	{ 6 amp. de 20 cc. : 30 fr. net.
B	{ 6 amp. de 10 cc. : 27 fr. net.
	{ 6 amp. de 20 cc. : 35 fr. net.

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

Propriétés :

Solution A. — Sédatif type de l'élément douleur dans les algies rebelles, grâce à l'action neurotrope intense de NaI stabilisé (imprégnation nerveuse par l'*ion I* de la NAIODINE).

Véritable traitement spécifique de la sciatique, c'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, toxicomanies, néoplasmes, douleurs du tabes, etc.).

Solution B. — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des névrites et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE A ou B est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires.

Indications :

Solution A. — Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatique, Lumbagos, Zonas, Rhumatisme articulaire aigu, Rhumatisme déformant, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Asthme, Emphysème, Toxicomanies, etc.

Solution B. — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles. Epilepsie essentielle. Algies rebelles. Mycoses.

Posologie :

Solution A. — Traitement d'attaque à doses massives : 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires indolores lentes (*loco dolenti* si possible). Ni réactions, ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'iodisme, ni d'accumulation.

Solution B. — Injections strictement intraveineuses très lentes : 20 à 40 cc. par jour pendant 10 jours, 20 jours de repos entre chaque série d'injections. Non sclérosante.

Laboratoires Jacques LOGEAI

71, Av. de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX.

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

NASOBORE

Forme. — Comprimés effervescents instantanément solubles, pour Gargarismes et Inhalations.

Composition. — Associe la *Chloramine T* au baume du Pérou véritable et à des essences balsamiques naturelles, décongestionnantes, sédatives et bactéricides.

Indications. — Prophylaxie et traitement des affections du nez, de la gorge, de la trachée, du larynx et des bronches.

Mode d'emploi :

- 1° Gargarismes (3 à 4 par jour) : 1 comprimé effervescent dans 1/2 verre d'eau bouillie chaude ;
- 2° Inhalations (3 à 4 par jour) : 2 à 3 comprimés effervescents dans un bol ou un inhalateur d'eau bouillante. Respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes.

Prix : 16 francs.

Durée de traitement : 5 à 10 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

NASOPHÉDRINE BÉRAL

Pommade nasale (Huile gélifiée) à 3 p. 100 d'Éphédrine Béral.

Rigoureusement neutre. Exempte d'analgésique et d'oléate.

Effet intégral de l'éphédrine sans irritation et avec conservation de la perception de la respiration nasale.

Agit mieux que les instillations huileuses, dont elle évite les inconvénients.

Indications. — Coryza, Rhinite spasmodique, Asthme nasal, Obstructions nasales, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Gros comme un grain de chènevis dans chaque narine.

Prescrire : Nasophédrine Béral, un tube.

Prix : 10 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS

NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de **Digitaline Nativelle** et 2/3 d'**Ouabaïne Arnaud**.

Forme. — Solution au 1/1000.

Indications. — Myocardites avec troubles du rythme et dilatation des cavités ventriculaires, Arythmie complète avec troubles du tonus, Hypertension artérielle avec tendance à la Tachycardie.

Doses. — Suivant le degré de l'insuffisance, entre XV et L gouttes de *Natibaïne Nativelle* par jour, les cinq premiers jours de chaque dizaine ou de chaque quinzaine.

Prix : 16 fr. 40

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

NATIROSE

Dragées de Trinitrine.

Composition. — Chaque dragée renferme :

Trinitrine..... 0 gr. 00075

Chlorhydrate de Codé-

thylène..... 0 gr. 003

Sulfate neutre d'Atropine . 0 gr. 0001

Indications. — Angine de poitrine, Aortite, Artérite, Asthme cardiaque, Hypertension artérielle, Œdème aigu du poumon.

Doses. — 1 à 2 dragées au moment de l'accès sans dépasser 8 à 10 dragées par 24 heures. Croquer les dragées et les faire fondre rapidement dans la bouche avant d'avaler.

Prix : 16 fr. 40

LABORATOIRE NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e)

Tél. : Suffren 31-21 (trois lignes).

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition. — Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

Action. — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications. — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie chaude en injections vaginales.

Prix : 10 francs.

Laboratoires

du Dr Pierre ROLLAND

Dépôt : 127, bd St-Michel — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 22-01.)

NAVIDRINE

pour Mal de Mer et d'Avion.

Tablettes à sucer contenant chacune :

Adrénaline.....	1/4 mgr.
Br. d'Hyosciamine.....	15 centièm. de mgr.
Chl. d'Ephédrine Béral.	1 centigramme.

Mode d'emploi :

Deux tablettes à sucer avant le départ.

Ensuite une tablette toutes les 2-4 heures.

Prescrire : NAVIDRINE, une boîte.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

NÉALGYL BOTTU

Composition et présentation. — Comprimés constitués d'une association de deux groupements médicamenteux : un noyau antalgique à base d'une nouveauté : la chloralopyrine de Bottu et un groupement correctif des effets nocifs secondaires sur le cœur et le rein (caféine-hexaméthylène amine).

Les comprimés dragéifiés sont insolubles mais faciles à déglutir. Chacun représente 0,27 de chloralopyrine, 0,10 d'oxyéthylacétanilide, 0,01 de caféine et 0,07 d'hexaméthylène.

Indications et posologie. — Toutes les algies depuis les bénignes (courbatures, céphalées, odontalgies) jusqu'aux douleurs tenaces et rebelles (goutte, sciatique, mensturalgies). A ordonner spécialement chez les malades dont l'estomac ou le rein ne peuvent supporter les spécifiques anti-douleur courants.

Pour un effet immédiat et massif : 2 comprimés d'emblée suivis à 20 minutes de distance d'un troisième et, si besoin, d'un quatrième. Pour une action prolongée et soutenue : 6 à 8 comprimés par jour toutes les 2 heures, avant ou pendant les repas, mais jamais pendant le travail de la digestion.

Pour les algies vespérales et insomnies douloureuses, 2 comprimés d'emblée le soir dans un liquide très chaud.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e). (Tél. : Danton 13-20.)

NÉFITOL

Présentation. — En tube, dans une boîte à tiroir.

Composition. — Adrénaline, Benjoin, Cocaïne, etc..., dissous ou en suspension dans la vaseline neutre, fluide.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique par excellence des maladies des voies aériennes supérieures, en décongestionnant rapidement les muqueuses sans jamais les irriter.

Indications. — Coryza aigu ou chronique, rhume des foins, rhinites, pharyngites, etc...

Mode d'emploi. — En introduire gros comme un pois dans chaque narine, 3 ou 4 fois par jour (renifler doucement).

Laboratoires J. TIFFENEAU

Docteur en Pharmacie,

24, rue de Monttessuy — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 35-30.)

NÉOARSITE

(Liquueur de Fowler spéciale.)

Propriétés. — Les composés arsenicaux, tels que cacodylates, méthylarsinates, etc., ont été adoptés thérapeutiquement pour remplacer les sels arsenicaux anciens, arsénates, arsénites, mais leur efficacité n'est réelle qu'à des doses importantes, c'est-à-dire à des doses voisines de leur toxicité spécifique.

De tous les arsenicaux, seule la liqueur de Fowler a une valeur thérapeutique bien définie. Aussi le prof^r Roger a-t-il étudié pour ce médicament de toute efficacité les conditions optima de son absorption sous des formes nouvelles.

Formes :

- 1° *L'Ampoule isovisqueuse de Néoarsite*, grâce à sa viscosité qui est égale à la viscosité moyenne du Myoplasma sanguin, est résorbée presque instantanément et sans réaction.
- 2° *Les Perlules de Néoarsite*, solubles seulement dans l'intestin, suppriment les inconvénients de l'absorption gastrique. Chaque perle correspond à IV gouttes de Liqueur de Fowler et à 1 milligramme de quassine.

Posologie :

Ampoules : 1 par jour.

Perlules : 1 au repas du midi. 1 au repas du soir.

Prix : Ampoules, 22 fr. ; Perlules, 16 fr. 50.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

NÉOBIOL

Composition. — Soufre colloïdal et complexe hydrocarbure spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Formule enregistrée au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1501-1.

Indications. — Séborrhée et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

Mode d'emploi :

Au visage : En applications externes quotidiennes. En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

Au cuir chevelu : Ecarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : Flacon : 20 francs (250 cc. environ).

Demi-flacon : 12 fr. 50 (125 cc. environ).

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires JAUFFRET

NÉOBIOL-IMPÉTIGOL — VANVES, près PARIS.

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-interne des hôpitaux.

Correspondance et bureaux : 181, avenue Victor-Hugo

CLAMART (Seine). (Tél. : Michelet 04-71).

NÉO-CALCILINE

Reconstituant biologique, para-hépatopancréato-splénique.

Composition. — Os frais épiphysaire, Parathyroïde, Thymus, Surrénale, Diastase pancréatique, Poudre de Muqueuse intestinale, Extrait lipoïdique de Foie, Extrait lipoïdique de Rate.

Doses. — 2 comprimés, 2 mesures (granulé) avant chaque repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 69-13.)

NÉOCARDYL

Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.

Indications. — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

Présentations et posologie. — Néocardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 g. 05 de Bi-métal par cm³. Ampoules de 1 cm³ 5 contenant 0 g. 075 de Bi-métal (boîtes de 12 ampoules).

Série de 12 injections bihebdomadaires ; intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

Néocardyl infantile : Solution huileuse dosée à 0 g. 015 de Bi-métal par centimètre cube. Ampoules de 1 cm³. (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la Notice détaillée).

Prix de vente :

Néoc. *Adultes*. La boîte de 12 ampoules..... 25 fr.
Néoc. *Infantile*. La boîte de 10 ampoules 15 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-CHLORAL-NAU

Une nouveauté thérapeutique

Antiseptique puissant, ni caustique, ni irritant. Décongestif, astringent, analgésique, hémostatique.

Formule. — Thymol crist. 2 gr. — Hydrate de chloral, 100 gr. — Résorcine, 50 gr. — Novocaïnum, 2 gr. 50. — Adrénaline au 1 000^e, 25 gr. — Excipient aqueux spécial, 1 000 gr. — La nouveauté consiste en la **solubilisation** (sans intervention de sels sodiques ou autres) et la **stabilisation** du thymol cristallisé en **milieu rigoureusement aqueux**.

Indications :

1^o Affections du RHINO-PHARYNX : Angines, rhinites, amygdalites, etc.

2^o En STOMATOLOGIE : Interventions traumatisantes, abcès, pyorrhée alvéolaire, etc...

Posologie. — 1 à 2 cuill. à café dans un grand verre d'eau bouillie chaude, en bains de bouche, gargarismes, etc...

1 à 3 cuill. à soupe par litre d'eau en lavages de la gorge, irrigations nasales, etc...

Présentation. — En flacon de 2 grandeurs :

Durée moyenne des unités de vente : P. M. (4 à 5 jours) ;

G. M. : (12 à 15 jours).

P. M. à 8 francs ; G. M. à 16 francs.

Laboratoires THÉRABIOL

21, Grande-Rue — ARGENTEUIL (S.-et-O.). (Tél : 510.)

NÉO-CODION

Puissant sédatif de la toux.

A base de deux nouveaux dérivés :
le **Camphosulfonate de Codéine**
et le **Camphosulfonate de Dionine**.

Plus actifs — Moins toxiques
que la *Codéine* et la *Dionine*.

Composition. — *Camphosulfonates de Codéine* et de *Dionine* dissous, dans la proportion de 1 p. 100, dans un mélange de teintures de Droséra, Grindélia, Marrube blanc stabilisé.

Présentation. — Deux formes : *Gouttes* et *Dra-gées*.

Indications. — 1^o *Toux spasmodiques et réflexes* : Laryngites, Trachéites, Coqueluche.

2^o *Bronchites aiguës* : Grippe, Asthme.

3^o *Toux rebelles* : Bronchites chroniques, Bacilliose.

Doses. — *Enfants* : 2 gtes par année d'âge 2 à 3 fois par jour. *Adultes* : 30 gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 16 fr. pour un traitement de quinze jours.

Laboratoires E. BOUCHARA

47, rue de Bretagne — PARIS (3^e). Archives 94-65

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergiques dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïné pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans les maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Prix :

Pommade cocaïnée : 16 francs. — *Pommade non cocaïnée* : 15 francs. *Ovules* : 14 francs. *Suppositoires* : 14 francs. — *Pilules* : 14 francs.

Compte-Gouttes : 13 francs.

Laboratoires du Dr MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

NÉOCRINOL

NÉOCRINOL M

Composition. — Extrait de glande orchitique associé à extrait de surrénale, thyroïde, prostate, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL M existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez l'homme : troubles adipo-génitaux de l'adolescence, asthénie neuro-psychique et neuro-musculaire, impuissance et vieillissement de l'organisme.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 20 à 30 jours, complétée par cures de 10 ou 20 jours pendant 2 ou 3 mois.

NÉOCRINOL F

Composition. — Extrait d'ovaire associé à extrait de surrénale, thyroïde, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL F existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez la femme : troubles de la puberté, de la menstruation, de la ménopause. Frigidité, obésité, règles doul. ou anormales.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 10 à 20 jours, complétée par cures de 10 jours pendant 2 ou 3 mois. **Contre-indications:** Hémophilie, affections inflammatoires et néoplasiques des organes génitaux.

Présentation et prix : La boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 36 fr.

Laboratoire du NÉOCRINOL

117 ter, rue Ordener — PARIS (XVIII^e) (Tél. : Montmartre 23-54).

NÉO-DMÈGON

Vaccin curatif des complications de la gonococcie:

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* et de *synocoques* traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmègon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³. (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules imprimées rouge et bleu. Voie hypodermique, intramusculaire ou intraveineuse.

Prix de vente : la boîte de 6 amp. : 20 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-DMÊTYS

Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traités par le fluorure de sodium.

Indications. — Vaccinothérapie et vaccination préventive de la coqueluche.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³. (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (souches différentes). Une injection intramusculaire (de préférence) ou sous-cutanée, tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule dès la deuxième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Séries de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules imprimées rouge et bleu.

Le *Néo-Dmêtys* peut être utilisé pour l'intradermo-réaction (diagnostic).

Prix de vente : La boîte de 6 amp. : 20 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉOGLOBULINE

Médication tonique, antianémique, antirachitique.

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés à base d'histidine, de vitamines A et D, d'extraits opothérapiques, d'extrait d'avoine et de fenu-grec déshuilé.

Action thérapeutique. — Stimule l'appétit, favorise l'anabolisme, augmente le poids et la valeur globulaire, relève l'état général.

Indications. — Croissance, rachitisme, lymphatisme, anémie, asthénie, débilité, convalescence.

Posologie :

Enfants (à partir de 15 mois) et selon l'âge : 1 à 6 comprimés par jour.

Adultes : 6 à 10 comprimés.

Le flacon de 40 comprimés : 17 francs.

Laboratoire SYNOPS

84, rue du Faubourg-du-Temple — PARIS (XI^e).

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

Laxatif.

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

Posologie.

Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

Prix : 12 francs.

Laboratoires CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.)

R. C. 231917 B.

NÉOLYSE

Composé silico-magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur et antinéoplasique. Le meilleur traitement médical des affections cancéreuses.

Indications. — Prophylaxie et traitement des néoplasmes. Traitement préventif des récives et des métastases. Traitement des verrues et des lésions du type pré-cancéreux. Traitement des troubles asthéniques (fatigue, dépression, surmenage). Adénome prostatique.

Posologie. — Un cachet avant les 3 principaux repas, pendant 20 jours. Interrompre le traitement pendant 10 jours.

Boîte de 60 cachets : 20 francs.

Une ampoule par jour, voie hypodermique, intramusculaire ou interstitielle; séries de 16 injections, repos de 15 jours.

Boîte de 4 ampoules ordinaires : 10 francs.

Boîte de 4 ampoules radioactives : 20 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium pur	0,05 centigr.	
Glycéro-phosphate de sodium pur	0,10	—
Chlorure de magnésium pur ..	0,15	—
par cuillerée à café, soit 5 grammes.		

Propriétés thérapeutiques. — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Dépôt général :

CHASSAING, LE COQ ET Cie

(Anc. M^{on} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

Formes. — Gouttes, Granules, Ampoules injectables.

Indications thérapeutiques:

Traitement de fond des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

ASTHME - GRIPPE

RHUME DES FOINS

CORYZAS SPASMODIQUES

TOUX QUINTEUSES

COQUELUCHE

Accidents respiratoires et digestifs
post-anesthésiques au cours des
opérations.

Manifestations anaphylactiques.

URTICAIRE - ECZÉMA

Mode d'emploi:

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

Doses moyennes:

Gouttes : *Enfants* : III à X gouttes.

— *Adultes* : VIII à XV gouttes.

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

Granules : *Adultes* : 1 granule 3 à 4 fois par jour.

Ampoules : *Adultes* : Commencer toujours par 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée. **1 ou 2 ampoules par jour.**

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foin, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de **RHINO-FLUINE**.

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

Prix : Gouttes, Granules : 18 francs.

Ampoules : 22 francs.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 35-25.)

NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 100 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

NÉO-PHYSIO

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Toutes infections de moyenne intensité.

Indications. — Grippe, Angine, Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy ; l'injection est indolore. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 22 francs.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

Formes. — Boîtes Adultes : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes Enfants : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : 32.

BANDES NÉOPLASTEX EN FILÉS LASTEX assurent une contention uniforme, dosable, continue. Résistent aux lavages, repassages, à la stérilisation. Se conservent et demeurent élastiques.

EMPLOIS

- Pour toutes **contentions**, tous **soutiens** (varices, suites d'opérations, d'accouchements, d'accidents, réductions de ptoses, etc.).
- Pour tous **pansements** à tenir fixes, sans rigidité.

DEUX QUALITÉS

- **EXTRA-MINCE**, pour soutiens légers.

Se fait en largeurs 4, 6, 8, 10 cm. sur 2 m. 50 de long. et en larg. 15, 20, 25, 30 cm. sur 2 m., 2 m. 50, 3 m. de long.

- **RENFORCÉE** (ou n° 3400) pour fortes contentions. Se fait seulement en larg. 8 et 10 cm. sur 2 m. 50 de longeur.

Toutes les bandes **Néoplastex** sont munies pour leur fixation d'**attaches élastiques Néoplastex**.

NÉOPLASTEX

71, fg. Saint-Martin — PARIS (X^e). Tél.: Bot. 18-72.
Dépôts : Tous grossistes de Paris et de Province.

NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Composition :

Sulfogaiacolate de potasse	1,00
Benzoate de sodium.....	1,50
Extrait thébaïque.....	0,02
Dionine	0,02
Teinture de belladone.....	0,65
— de drosera.....	0,65
— de grindelia	0,65
Sirop de baume de tolu.....	15,00
Excipient aromatique... Q. s. p. 100 cc.	

Indications. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 13 francs.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie.

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien, PARIS.
(Tél.: Provence 34-87.)

NÉORAL

Médication biologique adjuvante et palliative des Néoplasies.

Composition. — Extractif inactivé de tissus néoformés pour administration par *voie buccale*, selon la méthode des D^{rs} Carrère et Cuvier.

Indications. — Comme adjuvant à la suite des interventions chirurgicales ou physiothérapiques. Médication d'appoint influant sur le terrain par rétablissement des métabolismes perturbés.

Comme palliatif dans les cas jugés incurables par les traitements classiques pour chercher à obtenir la diminution des saignements, de la douleur, le relèvement de l'état général et du moral, et, dans certains cas, la régression ou la stabilisation des masses tumorales.

Posologie et formes. — 1^o Voie buccale :

Gouttes : 1 goutte 3 fois par jour en dehors des repas. Prix : 60 francs.

Cachets : 1 cachet par jour à partir de la 1^{re} semaine, comme 4^e prise quotidienne. Prix : 60 francs.

2^o Pommade en *application locale*. Prix : 30 francs.

Préparé sous le contrôle des auteurs par **H. BOISSEL**, pharmacien.
Littérature, échantillons :

Laboratoires H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaige — BORDEAUX.

Dépôt général pour la France : O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS
pour l'Afrique du Nord :

Coopération Pharmaceutique Française,
37, rue de Lyon — ALGER.

NÉO-RHÉNIUM

du Docteur Louis FOURNIER

Principe actif. — Sel rhénio-sodique de préparation spéciale.

Indications thérapeutiques. — Traitement des néoplasmes, carcinomes, fibromes, cancers et de toutes tumeurs bénignes ou malignes.

Forme. — Ampoules de 10 cc.

Chaque ampoule contient 0 gr. 10 de perrhénate de soude chimiquement pur et indolore.

Boîte de 6 ampoules.

Posologie. — Injection quotidienne (intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée) de 10 cc. au minimum. Traitement à continuer pendant 16 à 24 jours.

Envoi de toute documentation sur demande.

Laboratoires du Néo-Rhénium

82, 84, rue de Belleville — PARIS (XX^e).

NÉO-RIODINE



Composition. — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

Formes. — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — *Action immédiate et intensive.* Aucune intolérance.

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension, Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée à résultats rapides est indiquée.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 18 fr.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

NÉOSALIODE

Huile Iodo-Salolée injectable Indolore.

Composition. — Chaque ampoule de 5 cc. contient :

Iode	0,10
Salol.....	1,00
Camphre.....	0,05

Huile d'olive purifiée à l'éther : Q. S.

Indications. — Toutes les affections rhumatismales chroniques.

Posologie. — Une ampoule tous les deux jours en injection intramusculaire profonde. Séries de 10 injections séparées par un repos d'un mois.

Prix :

La boîte de 5 ampoules : 25 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).

(Tél. : Alésia 23-48.)

NÉOSÉDYL

(Vincent)

Composition. — A base d'acétylsalicylate de calcium, salicylate neutre de calcium, Bromhydrate de Codéine, Diallylmalonylurée, Phénacétine.

Indications. — Toutes les algies, états infectieux (grippe, rhume, etc...) rhumatismes, sciatique, douleur d'origine génitale chez la femme.

Posologie. — Jusqu'à 4 ou 5 cachets par jour pour les adultes.

Avantages. — Formule complexe, dépourvue, du fait de l'absence de tout noyau benzénique, de toute toxicité pour les organes généralement sensibles aux analgésiques : cœur, foie, reins.

Présentation. — Tubes de 14 à 6 cachets.

Dépôts : Établissements BOYER, 12, r. Pavée, Paris, et toutes Drogueries.

Échantillons :

Pharmacie H. BOUISSET

18, boulevard de Strasbourg — ALBI (Tarn).

NÉO-SÉTI

Solution buvable de Soufre et d'Iode.

Propriétés thérapeutiques. — L'association de Soufre sous forme de Rhodanate de Potassium et d'Iode sous forme d'Iodure de Sodium, permet le traitement *per os* de toutes les manifestations du Rhumatisme chronique et de la Sclérose artérielle.

Indications. — Rhumatismes Chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle.

Mode d'emploi. — Prendre XXX gouttes, 2 fois par jour aux repas, dans un verre d'eau pure ou sucrée.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

NÉOSOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth.

Indications. — Le Néosolmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires de une ampoule de 1 cc. par semaine.

Présentation :

En boîtes de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (la solution contient 4 cg. de Bismuth métal par cc.).

Prix de vente au public :

25 francs la boîte de 12 ampoules 1 cc.

30 francs la boîte de 12 ampoules 2 cc.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand. — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

NÉOSPLÉNINE

Ampoules buvables.

Synergie d'extraits désalbuminés de rate, foie, muqueuse gastrique, reins.

Indications. — Toutes anémies, Dyspepsies, Déficiences organiques, Hémorragies, Anorexies.

Présentation. — Une ampoule buvable de 5 cc. correspond exactement à 62 gr. 50 d'*organes frais sélectionnés*.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule buvable le matin à jeun ou avant le repas du midi et du soir dans un demi-verre de liquide quelconque. (Gazeux de préférence.)

Avantages. — Cet extrait concentré, préparé avec des organes frais non congelés ou d'importation, privé de ses albumines et lipoides, peut être donné même aux malades à qui ces organes sont interdits : Goutteux, Brightiques, Azotémiques, Entéritiques.

10 ampoules buvables = 19 fr. 50.

8 à 10 jours de traitement.

Laboratoires Français de Gastro-Entérologie

3, place Jussieu — PARIS (V^e).

Tél. : Gobelins 56-71.

Dépôt général O. C. P. France et tous grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD

ALGER et CASABLANCA.

NÉOSULINE

**Hormonothérapie anticancéreuse
par voie buccale.**

Principe actif. — Insuline-Fornet (Cf. *Pommade-Fornet*) plus hormone régulatrice de la croissance, extraite de la moelle d'os longs d'animaux jeunes.

Indications. — Affections cancéreuses de toutes natures et de toutes localisations.

Posologie. — 3 pilules 3 fois par jour une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration presque instantanée de l'état général, disparition de l'anorexie, rétablissement des forces, soulagement des douleurs, ralentissement, arrêt du développement, et même décroissance de la tumeur.

Prix : 49 francs.

Vente et échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

11, Chaussée de la Muette — Paris (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 21-69.)

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes à base de Néodyme et de Thorium stable d'activité pratiquement illimitée.

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 16 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

NÉO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par le bismuth métalloïdique pur.

Médication spirillicide intramusculaire, dosée à environ 96 p. 100 de Bi élément en milieu aqueux isotonique. (Ampoules de 2 cc.).

Adopté par le Ministère de l'Hygiène, l'Assistance et tous les services publics.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 fr.

— 12 — : 36 —

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires pharmaceutiques.

L.-G. TORAUDE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris,
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

NÉOTROPE AGUETTANT

Plomb colloïdal électrique stable et non toxique, en ampoules injectables.

Le Plomb colloïdal dans le traitement des Cancers.

Nos recherches entreprises en 1934, avec le Professeur Duroux, nous ont fourni une documentation qui s'enrichit encore chaque jour (action du Néotrope seul ou associé au traitement par les rayons X).

Nous sommes à la disposition des médecins pour leur exposer l'état de la question et leur faciliter des expérimentations personnelles.

L'électro-colloïde de Plomb, que nous sommes seuls à savoir obtenir stable, n'est pas toxique et ne donne pas de choc.

Les injections sont suivies d'une hémopoïèse importante et l'action sur l'état général est constante (diminution et suppression des douleurs, amélioration du tonus et de l'appétit).

Dose. — 5 cc. par jour ou 10 cc. tous les deux jours, en injection intramusculaire ou mieux intraveineuse. Après 12 injections, cesser 6 à 7 jours et reprendre la cure.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.)

NÉOTROPHÈNE

Tablettes au Chlorure de Magnésium d'un goût agréable.

Composition. — 0 gr. 20 de Chlorure de Magnésium cristallisé par tablette. Excipient : Q. S.

Posologie. — 6 tablettes en moyenne par jour, après les repas de préférence. Action laxative à jeun.

Indications. — Dermatoses, Eczéma en particulier, Prurits, Acné, Reconstituant très efficace dans les asthénies nerveuses. Facilite le travail. Convalescence, Cholagogue, régularise les fonctions digestives. Laxatif, Prophylactique du cancer. Nourriture de la cellule.

Prix : la boîte de 44 tablettes, 12 fr. 50.

Laboratoire de Chimie appliquée de Nanterre

G. LEFRANC, Pharmacien

31, rue du Chemin-de-Fer — NANTERRE (Seine)
(Tél. : Malmaison 11-97.)

NÉPHOSOL

Composition :

Acide orthophosphorique	0,40
Glycéro de soude	0,18
Glycéro de magnésie	0,15

Par cuillère à café.

Indications :

Anémie, Dépression nerveuse, Artério-sclérose, Vertiges, Tuberculose, Névralgies rebelles, Dyspepsie, Migraines, Convalescence des maladies infectieuses, Neurasthénie, Hypertension, Rhumatisme chronique, Maladies de la peau, Surmenage physique et intellectuel.

Posologie :

A prendre par cuillère à café intimement mélangé à la boisson au cours des repas.

En vente dans toutes les pharmacies.

Laboratoire de Thérapeutique Générale SEDROB

P. BORDES, Pharmacien,

35, rue Périssé — TOULOUSE (Haute-Garonne).

(Tél. : 258-21.)

NÉPHRACTIVE

Théobromine française, très pure, dosée physiologiquement d'une activité certaine.

Formes. — Cachets dosés à 0,50 de théobromine, pure ou associée : Néphractive pure, caféinée, digitalique, lithinée, magnésienne, phosphatée, Scillitique.

Poly-Néphractive ou Néphractive polycomposée : Chaque cachet contient : Néphractive pure 0,15 ; Scille stabilisée, 0,08 ; Phosphate de soude, 0,10 ; Sulfate de spartéine 0,01.

Indications. — Diurétique employé avec succès dans : *Artériosclérose, Hypertension, Albuminurie, Œdèmes, Rhumatismes, Infections, Affections cardio-rénales, Hydropsie* et chaque fois qu'il faut déclancher la diurèse.

Doses. — 2 à 4 cachets à 0,50 ou 4 à 8 à 0,25 par jour, sauf avis contraire du médecin.

Prix : 15 à 18 francs la boîte.

Pour échantillons copieux, écrire : Fabrique Vendéenne de Produits Pharmaceutiques, 10, rue du Pont-aux-Chèvres, à Fontenay-le-Comte (Vendée).

Dépôt : Etablissements Darrasse Frères, 13, rue Pavée, à Paris, et leurs succursales : Rouen, Caen, Rennes, Tours, Moulins, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montauban, Narbonne.

NÉPHRALBINE

Cachets.

Adjuvant du régime lacté et lacto-végétaro-fruitarien.

Composition. — Lactate de Strontium, Gluconate de Calcium, Salsepareille Tampico, poudre de Reins, Diurétiques lénitifs végétaux.

Indications. — L'insuffisance rénale : Albuminuries, Néphrites, etc., Maladies infectieuses, Manifestations anaphylactiques, Arthritisme. Déminéralisation. Diabète rénal.

Posologie. — 3 à 6 cachets par jour pour les adultes. 1 à 3 pour les enfants, de préférence avec une tasse de lait.

La boîte de 30 cachets : 18 francs.

Laboratoire de la Nephralbine.

R. FAURE, Docteur en Pharmacie,
2, rue Carnot — MELUN (S.-et-M.) Tél. : 179.

NÉPHRYLAN

du Dr Lobry (Comprimés)
**ALBUMINURIE, OLIGURIE,
 COLIBACILLURIE**

et toutes affections des voies urinaires.

Composition. — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Poudre de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloïa, d'Uva ursi.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du Docteur LOBRY
 6, rue Parrot — PARIS (XII^e).

NEPTAL

Hydroxy-mercuri-propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

Indications:

Oligurie des affections cardio-rénales,
Edèmes, Anasarque, Ascites, Hydrothorax, Arthrites, Syphilis cardio-aortique.

Présentation: Boîte de 3 ampoules de 1 cm³. 5 (sol. à 9,2 p. 100). Boîte de 10 ampoules de 1 cm³. 5 (sol. à 3 p. 100).

Posologie et mode d'emploi. — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr. Traitement des syphilis vasculaires par la solution à 3 p. 100.

Le Neptal peut être injecté par voie intraveineuse (Neptal à 3 %) en cas de nécessité, ainsi que dans la cavité péritonéale (Neptal à 9 %) en cas d'ascite.

Prix de vente :

La boîte de 3 ampoules : 10 francs.

N. à 3 p. 100. La boîte de 10 ampoules : 10 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine est une farine de germe de blé dégraissé. Le germe de blé constitué par un sel de calcium et magnésium associé à un acide phospho-organique : l'acide phytinique, et par des sels de fer, calcium, manganèse, réalise un produit reconstituant et reminéralisant d'une activité considérable, rapide et constante.

Indications. — Décalcification, croissance et dentition chez les enfants, convalescence, surmenage, tuberculose, anémie, neurasthénie, allaitement.

Mode d'emploi. — Pour les *adultes* : 4 à 6 fortes cuillerées à café à prendre par jour en plusieurs fois dans un peu d'eau sucrée ; pour les *enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu de lait.

Prix : 9 francs.

Laboratoires HEUDEBERT Fils

Charles HEUDEBERT Fils, Pharmacien
4, rue Lamartine — NANTERRE (Seine).

NERVANTYL MILUC

Composition :

Extrait de Lotus alc.....	0,10
Teinture Aubépine 1/5.....	0,50
Extrait de Nénuphar aq.....	0,05
Extrait de Valériane Stab. alc.....	0,10
Ion Calcium.....	0,05

Excipient sans sucre : Q. S. pour une cuillerée à café ou un comprimé.

Propriétés. — Sédatif des palpitations et des troubles fonctionnels nerveux. — Antiaphrodisiaque et calmant.

Indications. — Toutes dystonies du sympathique, déséquilibre nerveux, émotivité, anxiété, neurasthénie, psychasthénie, mélancolie, palpitations, tachycardie et troubles fonctionnels cardio-vasculaires, éréthisme génital, insomnies.

Présentation et prix :

Solution sans sucre : 18 fr. — Comprimés : 14 fr.

Posologie. — Régulateur du système nerveux : 1 ou 2 cuillerées à café ou 1 ou 2 comprimés 1/4 d'heure avant chacun des 2 principaux repas, Contre l'insomnie nerveuse : 2 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés le soir au coucher.

Chaque cuillerée dans un 1/4 de verre d'eau, ou mieux dans une tisane (feuilles d'oranger). Demi-dose pour enfants.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien.

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e). Tél. : Odéon 02-53.

NÉRVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT
HÉPATOCITHINE

Ampoules buvables, Dragées, Sirop.

(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complétée et activée par sels organiques.

Composition et formes. — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

Hémoglobine et Extrait de Foie frais activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément. Tout mauvais goût supprimé.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable).

Enfants : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Prix : Taxe d'état comprise :

Sirop : 16 fr. — *Dragées* : 12 fr. — *Ampoules* : 14 fr.

Ampoules buvables : boîtes de 6 : 10 francs.

— — — de 12 : 20 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. Mont. 01-91.)

NESAL

Régulateur du Système nerveux.

Composition. — 1 mesure contient :

Tartrate Borico-Potassique	
Bromuré	0,80
Phényléthylmalonylurée.....	0,03
Extrait Hydroalcoolique Sta- bil. de Belladone.....	0,01

Propriétés. — Calmant, Sédatif, Hypnotique, Anti-épileptique.

Indications. — 1° Insomnie.

2° Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Troubles nerveux au moment des règles, du retour d'âge, de la puberté, Migraines, Céphalées, Chorée, Tremblements nerveux, Gastrites nerveuses, Hyperexcitabilité, États hypocondriaques, Névroses cardiaques, Pollakiurie, Incontinence nocturne d'urine, etc.

3° Épilepsie.

Avantages. — Produit synergique. Sédatif puissant, mais sans danger, d'une tolérance parfaite, sans accoutumance lors des cures de longue durée.

Forme. — Présentation nouvelle : Granulés à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau, additionnée d'un ou deux morceaux de sucre.

Posologie. — 1° Insomnie : 1 mesure avant le coucher. (Dans les cas rebelles, ajouter une mesure vers 18 heures.)

2° Névroses, 2 à 3 mesures par jour.

3° Épilepsie, 3 à 5 mesures par jour.

Prix du flacon (50 doses environ) : 18 fr. 75.

Produits PHARMA-SCIENTIA

26, r. Gay-Lussac; PARIS (V^e) — T.: Odéon 32-24

Concessionnaire **L. BRUN**, Pharmacien
26, rue Vauquelin, PARIS.

NESEPTOL BENQUÉ

Synergie médicamenteuse à base d'essence de pin maritime, huile de paraffine, éphédrine et menthol.

Propriétés. — Astringente, décongestionnante, antiseptique.

Avantages. — Emploi facilité par le bouchon dit Neillère à la fois verseur et obturateur ; il supprime l'emploi du compte-gouttes et de la cuiller.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foins, rhinite chronique, pharyngite, angine, amygdalite. Prophylaxie des affections rhinopharyngées.

Posologie. — Verser le contenu de la cupule de la cuiller dans chaque narine, 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 13 francs.

Laboratoire du Dr BENQUÉ et Fils
16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

NESTOGÈNE

Lait en poudre Nestlé.

Lait en poudre demi-gras et sucré (saccharose et maltose-dextrine) obtenu par le procédé du « brouillard ».

Composition :

Matière grasse	12	p. 100.
Matières protéiques	20	—
Lactose.....	30	—
Maltose-dextrine	15	—
Saccharose	15	—
Cendres.....	4,7	—
Eau	3,3	—

432 calories par 100 gr.

Riches en vitamines y compris vit. C., de conservation parfaite, de haute valeur alimentaire et de grande digestibilité.

Indications. — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants au lait, des prématurés et des dystrophiques.

Posologie. — (Voir dépliant joint à la boîte.)

Prix : La boîte de 250 gr. : 10 fr. 50. 500 gr. : 19 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (XVIII^e).

NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Association de paraaminobenzoates d'éthyle et de butyle sans aucune toxicité. Antiseptique, non irritant.

Propriétés. — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension), soit naturellement (muqueuse). Suppression rapide et inoffensive de toute douleur ou démangeaison, qui provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

Formes de présentation. — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Solution huileuse au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Suppositoires au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Ovules au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Pommade : Prix : 12 fr. 50.

Ovules, Solution, Suppositoires. Prix : 15 francs.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod. PARIS.

NESTROVIT

Composition. — Association des 4 vitamines indispensables A, B¹, C, D en proportions minutieusement étudiées et parfaitement équilibrées, permettant un dosage exact, un contrôle sûr, une administration agréable et ne présentant aucun danger même à hautes doses.

Indications thérapeutiques. — Hypo et Avitaminoses, états de dénutrition, d'inappétence, d'anorexie, déminéralisation provenant d'un régime trop uniforme ou insuffisant, rachitisme et lymphatisme, troubles de la digestion et de l'assimilation, diarrhée et constipation chroniques, grossesse, allaitement, convalescences, troubles de la croissance, cicatrisation insuffisante des plaies, retard de la formation du cal après les fractures.

Avantages. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue, se dose facilement et est très bien accepté par tous les estomacs, même les plus délicats. Son goût est délicieux, ce qui représente un grand avantage chez les enfants.

Posologie et mode d'emploi. — Pour nourrissons : 1 cuillerée à café par jour, pour enfants : 2, pour adultes : 3, à mélanger au lait du biberon ou à la bouillie, ou à prendre au moment des repas.

Enfants de plus de 4 ans et *adultes* : 2 tablettes par jour à croquer telles quelles ou à laisser fondre lentement dans la bouche.

NESTROVIT

Tablettes. Boîtes de 20 et 100.

Liquide. Flacon de 125 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-77 (*liquide*) et 504-78 (*tablettes*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

NEURALGIC CARON

Comp. — Liqueur végétale, agréable à prendre, provenant de la distillation de plantes aromatiques et vulnérables, contenant en solution une combinaison de camphre et de Diméthyléthylpyrazolone.

Un verre à liqueur contient .. 0 gr. 30

Une cuillerée à soupe contient. 0 gr. 22

de Camphorate de Pyramidon spécialement préparé au Laboratoire du Neuralgic Caron.

Propriétés. — Spécifique de la douleur, antithermique, action rapide et persistante, parfaitement toléré sans occasionner jamais d'urticaire ni de bourdonnements d'oreilles, plus actif que tous les médicaments généralement employés.

Indications. — Migraines rebelles, Névralgies, Douleurs périodiques, Grippe, Fièvre, toutes les algies.

Présentation et prix. — Le flacon de 150 cc. : 12 fr. Inscrit au Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 1214-1. — Remboursé par les Assur. Soc.

Posologie. — Une à 4 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires ERLA-LATOUR, Pharmacien,
Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

NEURÈNE

Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° *La solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° *Les comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Prix : 18 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62 boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86).

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Crataegus, Extrait de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Prix : 14 francs.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.

3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée inodore, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée (0 gr. 15 par comprimé ou cuillerée à café de solution).

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée ; 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuillerées à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher.

Les Enfants supportent bien la NEURINASE.

Solution. — Doses maxima : Enfants de 6 mois : 2 demi-cuillerées à café par 24 heures.

B. Indications. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délires toxiques, Erethisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatoses d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 15 francs. — Comprimés : 10 francs.

Laboratoire A. GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.

NEUROCALCIUM

Sirop antispasmodique de l'enfance.

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du gluconate de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodie, troubles de la dentition, convulsions, insomnies, cris, terreurs nocturnes, etc.

<i>Gluconate de calcium...</i>	<i>0 gr. 10</i>	} <i>par cuill.</i> <i>à café.</i>
<i>Chlorure de calcium...</i>	<i>0 gr. 10</i>	
<i>Bromure de calcium...</i>	<i>0 gr. 05</i>	

Posologie :

Nourrissons : 2 cuillerées à café par jour et jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après un an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France
19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

NEUROFERYL

Traitement de base des déséquilibres vago-sympathiques et des dépressions.

Composition. — Atropine, Esérine, Fer, Phényléthylmanolylurée, Manganèse, Boldo.

Propriétés thérapeutiques. — Action synergique sur les deux systèmes par l'administration simultanée de paralysants du vague et du sympathique. Action spécifique du fer sur les troubles de la nutrition et du système nerveux, liés ou non à des symptômes anémiques.

Principales indications. — Anxiété, Obsession, Mélancolie, Neurasthénie, Spasmes et angoisses, Neuro-anémie, Psycho-anémie, Troubles endocriniens, Symptômes nerveux post-opératoires, Syndromes solaires, Troubles digestifs d'origine nerveuse, Dépressions physiques et psychiques.

Posologie. — 2 à 6 comprimés dragéifiés par jour.

Le médicament le plus complet des états nerveux, à la fois sédatif, tonique et fortifiant.

Laboratoire Henri LUZUY
Docteur en Pharmacie.

29, rue Carnot — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

NEUROFLORINE

**Sédatif Nervin,
Antispasmodique, Cardiotonique.**

Présentation. — Solution et Comprimés.

Composition. — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Cratægus.

Avantages. — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux.
Il redonne la stabilité.

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins.
Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

Indications. — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

Posologie. — *Dose sédatrice* : 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

Dose hypnogène : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

Prix : 14 francs. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

NEUROGASTRINE

Sédatif nerveux, régulateur des fonctions gastro-hépatiques, antiseptique intestinal et urinaire.

Composition. — Granulé fondant contenant par cuillerée à café :

Charb. act.. 0,50 Phényléthylmalonylurée. 0,015

Urotropine . 0,15 Bromure de Potassium . 0,10

Cit. de soude. 0,10 Extrait de Valériane... 0,025

Ext. de boldo 0,05 Extrait de Jusquiame.. 0,01

Indications. — Pesanteurs gastriques, Aérophagie, Vertiges, Migraines, Insomnies, Angor réflexe, Spasme du pylore, Dyskynésies vésiculaires, Cholécystites, Ulcères gastro-duodénaux, Fermentations, Entérites, Pyélonéphrites, Dermatoses, Prurits.

Mode d'emploi :

Adultes : Une cuillerée à café avant les principaux repas.

Enfants : Demi-dose à partir de 10 ans.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires E. et G. GLOMAUD

12, bd Saint-Michel - PARIS (VI°). (Tél. : Dan. 92-66.)

NEURONAL Brothier

Indications. — Angoisse, Emotivité, Vertiges, Anxiété, Spasmes divers, Mal comitial sous ses diverses formes (crises paroxystiques, équivalent). Insomnies de natures variées. Perturbations du système neuro-sympathique.

Composition :

Ethyl-phényl-malonylurée.....	0,10
Belladone totale.....	0,01
Tartrate borico-sodique.....	0,40

Pour un comprimé *pouvant se diviser en quatre*.

Bien toléré. Accoutumance nulle. La facilité de division des comprimés (division cruciale) permet de traiter les grands et les petits nerveux, de fractionner les doses et de soigner les enfants.

Posologie. — Un quart de comprimé à 4 comprimés par jour. Pour les enfants 1/4 de comprimés à un comprimé pris par quart.

Prix : 18 francs la boîte de 30 comprimés (120 doses par quart).

Laboratoires Pierre BROTHIER
Docteur en pharmacie.

20, rue Henri-Martin — VANVES-PARIS
(Tél. : Michelet 10-30.)

NEUROPHORYL

Régulateur du Système Neuro-Végétatif
Sédatif Nervin.

Composition. — Passiflore, Salix Alba, Adonis, Cratægus, Ballote, Intrait de valériane, Jusquiame et Phényléthylmalonylurée solubilisée par procédé spécial.

Indications. — Tous états de nervosismes, dystonies neuro-végétatives telles que : anxiété, angoisse, émotivité, insomnies, éréthisme cardiaque, aérophagie. Tous états spasmodiques.

Présentation. — Elixir de goût agréable. Flacon de 90 cc. (durée 10 jours environ). Prix : 18 francs.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour dans une infusion chaude.

Laboratoire du NEUROPHORYL

187, rue de Créteil — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 12-97.)

NEUROPHOS

Forme. — Gouttes.

Composition :

Acide phosphorique.....	33
Glycérophosphate de magnésie.....	10
Extrait orchitique et de Glandes interstitielles.....	33
Sel de manganèse (agent catalyseur).	1,50
Extrait de Kola, Glycérine, Q. S. p. 100.	

Indications. — Asthénie, Dépression nerveuse, Dépression physique, fatigue, surmenage. Dyspepsie hyposthénique.

Doses. — XXV à LX gouttes (1 à 3 compte-gouttes plein) dans un verre d'eau au cours de chacun des 2 repas.

Laboratoire DAGONNOT

11 bis, place de l'Hôtel-de-Ville — CANNES
(Alpes-Maritimes).

NEUROPHYTOL

Médication *Phospho, Mangano* Calcique assimilable.
Tonique puissant du Système nerveux.

Composition. — Phytosphosphine, Nucléinate de manganèse, Poudre de kola, Poudre de Noix vomique.

Propriétés thérapeutiques. — Surmenage physique ou intellectuel, Dénutrition, Convalescences, Etats adynamiques, Neurasthénie, Anorexie, Phosphaturie, Asthénie, Dyspepsie atonique, Impuissance au travail, Constipation, Insomnie.

Présentation et prix. — Boîte de 20 cachets : 16 francs.

Posologie. — 1 cachet au début des principaux repas.

Avantages. — Assimilation très rapide, Augmentation du poids, Reprise de l'appétit, Reminéralisation certaine.

Laboratoires du NEUROPHYTOL

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Marcadet 61-96.)

NEUROPOL

Composition. — Glycérophosphates de Calcium, Fer et Magnésie associés au Nucléinate de Manganèse et à des extraits opothérapiques *nécessaires pour assurer la fixation des éléments minéraux et rétablir le jeu normal des fonctions endocriniennes.*

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, protecteur de la cellule nerveuse, Mor dance du tissu nerveux, lors des traitements hydrargyriques, bismuthiques et arsenicaux.

Présentation. — Comprimés solubles.

Deux formes :

Sexe masculin (testicule) — Sexe féminin (ovaire).

Indications. — Toutes les dépressions, déminéralisation, maladies nerveuses, impuissance, aménorrhée, rachitisme, prétuberculose, frigidité, tétanie.

Doses. — 3 à 9 comprimés par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS.

NEUROSINE PRUNIER

(*Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier.*)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant du Système nerveux et tonique général.

Mode de présentation. — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Prétuberculose, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROSOL DEBREYNE

Composition. — Extrait mou de Valériane stabilisée, Extrait de Belladone, Extrait de Jusquiame, Oxyde de Zinc et Camphre.

Formes. — Pilules de deux sortes, différentes par la dose des principes actifs : Belladone et Jusquiame.

Neurosol Debreyne A. = Toni-sédatif.

Neurosol Debreyne B. = Antispasmodique.

Indications :

A. Affections du Système nerveux. Fatigue générale à forme dépressive. Neurasthénie. Insomnies. Hypertension nerveuse.

B. Troubles nerveux graves. Hystérie. Chorée. Epilepsie.

Posologie :

Première semaine : 2 à 3 pilules par jour, une pilule une heure ou deux avant les repas.

Les semaines suivantes : 4 à 6 pilules par jour.

Le flacon : 12 fr. 65.

Littérature et échantillons sur demande.

Produits Debreyne de la Grande Trappe.

L. BAILLEUL

MORTAGNE (Orne).

NEUROSOLÈNE

(Comprimés enrobés)

Composition :

Pilules de Méglin.	{	Extrait de Jus-	
		quiame	0 gr. 017
		Extrait de Valé-	
		riane	0 gr. 017
		Oxyde de Zinc.	0 gr. 017
		Phényl-éthyl-malonylurée ..	0 gr. 017

Indications. — Sédatif du système vago-sympathique.

Posologie :

Avaler sans croquer.

États nerveux : 2 à 4 comprimés par jour.

Insomnie : 2 à 4 comprimés le soir au coucher.

Prix : 15 francs.

LABORATOIRES D'ANALYSES

BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

NEUROSTABYL

Régulateur parfait du système nerveux.

Exclusivement végétal.

Composition. — Comprimés dosés à 1 gr. de poudre de Chélidoine, Germandrée, Serpolet, Cratægus.

Avantages. — N'intoxique pas la cellule nerveuse. Pas de dépression secondaire. Tonifie et active la digestion.

Indications. — Neurasthénie, Insomnie, Céphalées, Vertiges, Dépression psychique et physique, Épilepsie, Hystérie, Troubles fonctionnels du cœur et d'origine nerveuse.

Posologie et mode d'emploi. — 2 comprimés aux 3 repas.

Les comprimés peuvent être délayés dans un peu d'eau sucrée ou non.

1 flacon = 120 comprimés = 1 mois de traitement environ.

Laboratoire E. GUILBERT

124, boulevard Demailly — AVION (P.-de-C.).
(Tél. : 24.)

NEUROSTHÉNOL

Reconstituant général, neurotonique. Résultats immédiats. Action durable.

Forme. — Gouttes.

Composition. — Extrait total de substance cérébrale, strychnine, acide orthophosphorique, glycérophosphates titrés de sodium, magnésium, calcium et manganèse.

Propriétés. — Tonique rationnel du système neuromusculaire. Modificateur actif des troubles de la nutrition et de l'élimination.

Indications. — Toutes les dépressions (physiques, nerveuses, mentales), surmenage, usure, sénilité, convalescences de maladies infectieuses.

Manifestations alcalosiques (phosphaturie, arthritisme). Auto-intoxication, scléroses.

Posologie. — *Adultes* : XV à XXX gouttes dans un grand verre de liquide, midi et soir, en mangeant.

Prix : 12 fr. 60.

Durée de traitement d'un flacon 12 à 15 jours.

Laboratoire Marcel RICHARD
AUBENAS (Ardèche). — Tél. : 2-79.

NEUROTENSYL

Troubles fonctionnels d'origine sympathico-endocrinienne.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chlorhydrate de papavérine, Extrait de gui, Sulfate de spartéine, Extrait de Cratægus, Anémone pulvérisée.

Indications. — Troubles sympathiques à la grossesse, à la ménopause, à la puberté, Angoisse, Bouffées congestives, Troubles cardio-vasculaires, Arythmie, Anxiété, Emotivité, Hyperexcitabilité, Tics et spasmes, vertiges.

Mode d'emploi. — Prendre, sans croquer, 2 à 3 comprimés avant les principaux repas.

Laboratoires J.-P. PETIT

72, boulevard Davout. — PARIS (XX^e).
(Tél. : Diderot 55-01.)

NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de ..	{	Thyroïde	0 gr. 0025
		Ovaire	0 gr. 10
		Ext. valériane stabilisée Dausse...	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives..	{	Hydrastis	0 gr. 10
		Gossypium	0 gr. 10
		Viburnum	0 gr. 10
		Hamamelis	0 gr. 30

Posologie. — 1^o Troubles par hypofonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2^o Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n^o 233-1.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

NEUTRACÉTYL

NEUTRACÉTYL CHOCOLATÉ

Composition :

1 comprimé ou 1 tablette chocolatée = 0 gr. 60 d'acétylsalicylate basique d'aluminium.

Action :

Anti-rhumatismal spécifique, analgésique, antipyrétique et antigrippal. Absolument insipide, ne provoque aucun trouble gastrique. Effet d'une durée supérieure à celui de l'acide acétylsalicylique.

Indications :

Maladies par refroidissement (catarrhes, grippe), états fébriles, rhumatismes, céphalées, névralgies dentaires, névrites, asthme ; particulièrement indiqué chez les malades à estomac sensible ou porteurs d'ulcus gastrique, lorsqu'il s'agit d'un hyperpeptique et chez les *enfants*. C'est surtout chez eux que le produit, sous sa forme chocolatée, est utile, car il est accepté avec la plus grande facilité. Chocolat de la meilleure qualité, aucun goût médicamenteux.

Posologie :

Adultes. A la fois : 1 à 3 comprimés ou tablettes chocolatées.

Par jour : 3 à 10 comprimés ou tablettes chocolatées.

<i>Enfants</i> : 1 an : 1/4 de tablette chocolatée	}	1 à 4 fois par jour.
5 ans : 1/2 — —		
12 ans : 3/4 — —		
au-dessus : 1 à 1 1/2 — —		

Présentation :

Neutracétyl : Étui de 12 comprimés : 8 francs.

Boîte de 40 comprimés : 17 francs.

Neutracétyl Chocolaté : Boîte de 12 tablettes : 12 fr.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien,

25, bd Latour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

NEUTROSES-VICHY

Composition. — Chaque comprimé contient :

Sels de Vichy véritable extrait des eaux de Vichy (Deuto-carbonates naturels).	0,008
Carbonate de calcium	0,27
Carbonate de bismuth	0,06
Carbonate de magnésium	0,114
Saccharose pure	0,55
Essence de menthe Mitcham	0,0001

Forme. — Comprimés de 1 gramme.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la fonction digestive par excellence.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'hyper et de l'hypo-Chlorhydrie.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 5 comprimés, croqués de préférence, 2 heures après chacun des repas, ou bien au moment où l'on sent un malaise.

Enfants : 2 à 3 comprimés.

Prix de vente au public : bte de 100 comprimés, 13 fr. 80.

Laboratoire Médico-Pharmacologique de Vichy

1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier).

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques. — Antithermiques — Fébrifuges.

Indications. — Grippe — Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques — Rhumatismes — Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : la boîte de 12 cachets, 9 fr. 50.

La boîte de 6 cachets, 5 francs.

Le cachet, 0 fr. 90.

Laboratoire CORNAUD et BROSSARD

1, rue des Cordouans — LA ROCHELLE.

(Tél. : 21-30.)

Échantillons sur demande des Docteurs.

NÉVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

Composition. — Teinture de Cratægus, Passiflore, Alcoolature de ballote.

Action. — L'action bien connue du Cratægus et de la Passiflore est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principale sur l'irritabilité neuro-végétative).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, Incontinence d'urine, etc.

Doses. — Action sédatif : 80 à 100 gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : 30 à 50 gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

NÉVROSOL

Remède-type de l'élément douleur.

Formule :

Pyramidon.....	0,30	Carb. de chaux.	0,12
Phénacétine....	0,20	Caféine	0,03
Chl. quinine....	0,10	Stovaïne.....	0,003

« Aucun hypnotique. »

Spécificité. — Ne provoquant jamais d'hyperchlorhydrie, de nausées, ni de crampes.

Névrosol, particulièrement indiqué chez les malades porteurs d'ulcus gastriques ou dont l'estomac est sensible.

Indications. — Algies, céphalées, migraines, névralgies, grippe, rhumatisme, goutte, lumbago, sciaticque. Douleurs menstruelles.

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour.
Prescription strictement médicale.
Boîte de 10 cachets : 8 fr. 50.

Laboratoires ROGERMA
LENS (Pas-de-Calais).

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

Forme. — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic, ni strychnine ; XX gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie, éléments de constitution et d'entretien des tissus nerveux.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Prix : 14 francs.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

NIGÉRINE VINCENT

Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes.

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

Prix : 15 francs.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

NISAMÉLINE

de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée « INTUS et EXTRA » — action physiologique, à l'intérieur sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale ; à l'extérieur sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 10 extrait de Guaco), 2 à 3 pilules à chacun des deux repas. Prix : 16 francs.

Sirop Nisaméline TROUETTE-PERRET (0 gr. 20 extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas. Prix au public : 20 francs.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline TROUETTE-PERRET. 1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc. Prix : 16 francs.

Pommade Nisaméline TROUETTE-PERRET. Prix : 10 francs.

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline TROUETTE-PERRET, Prix : 5 francs.

Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : **N I S A M É L I N E**
« **TROUETTE-PERRET** » pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 87-34.)

NITIUM

Bromure de radium suractivé enrichi
en rayonnement alpha.

Crayon. — Traitement des métrites chroniques et
hémorragiques (Curetage médical).

Ovules. — Vaginites, Ulcérations du col.

Pommades :

A : Dermatoses rebelles, ulcérations torpides, plaies
atonies, ulcères variqueux.

B : Ulcérations étendues et infectées, ulcères variqueux
rebelles.

O (porphyrisée, pour usage ophtalmologique) : Ulcères
rebelles de la cornée.

Bougie : Urétrites chroniques.

Gastro-Nitium (pansement gastrique).

Toutes les présentations contiennent 6 microgrammes
de bromure de radium.

Prix de vente au public :

Crayon, ovule, bougie, pommades, pansement gastrique :
25 francs.

Étui de 3 crayons, 3 ovules, 3 bougies : 70 francs.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

NITRARGOL

Amino-nitrate d'argent indolore pour usage externe.

Indications. — Urologie (lavages et instillations), Gynécologie, Affec-
tions oculaires, etc..., et toutes indications du Nitrate d'Argent. —
S'emploie aux mêmes concentrations.

Indolore. — Ne provoque pas de ténésme. — Puissant bactéricide. —
Non irritant.

Formes. — 1^o Solution aqueuse à 1 p. 100 en ampoule de 6 cc.

2^o En solution aqueuse à 1 p. 2 000, en flacon de 1 litre.

Posologie. — Usages externes : en instillations et lavages uréthro-
vésicaux, en badigeonnage, en dermatologie, etc...

Prix :

La boîte de 10 ampoules de 6 cc : 16 fr. 50.

La boîte de 5 ampoules de 6 cc : 8 fr. 80.

Le flacon de 1 litre de solution à 1 p. 2 000 : 16 fr. 50

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès Sciences, Pharmacien de 1^{re} classe.

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE,
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée.

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi. — Comprimés : 2 à 3 par jour. Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques, Grippe, etc.

Le tube de 10 comprimés : 4 francs.

La boîte de 70 comprimés : 22 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

NORMACOL

Mucilage Évacuant

puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Normacol et Charbon : Voir CARBOMUCIL.

Prix : 13 francs.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

NORMALAX

produit français

Mucilage Type.

Régulateur intestinal.

Non irritant, non toxique, non fermentescible.

Propriétés. — Déclenche le péristaltisme par action mécanique, augmente le bol intestinal.

Pas d'accoutumance. Tolérance parfaite pour les intestins les plus délicats.

Indications. — Tous les troubles de la fonction intestinale.

Constipation, Atonie intestinale.

Doses moyennes. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas. Avaler, sans mâcher, avec un peu de liquide.

Enfants : demi-doses.

Deux préparations. — Normalax simple : mucilage pur. — Normalax au Cascara : Mucilage pur + Cascara
2 p. 100.

Présentation. — Boîte de 200 gr. : 17 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 53-05.)

NORMATENSOL BOURET

Composition :

Tartrate borico-potassique	1 gramme.
Lactose.....	3 grammes.
Mélange sucro-édulcorant	Q. S.
Pour un paquet.	

Effets physiologiques. — Par le *Bore* agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le *Potassium* il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

Indications. — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

Avantages. — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

Mode d'emploi. — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Prix au public : 12 francs.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

NORMOGASTRYL

Tous dyspeptiques et aérophages.

Formule :

Bicarbonate de soude	0 gr. 60
Sulfate de soude sec	0 gr. 285
Phosphate de soude sec	0 gr. 195
Bromure de sodium desséché	0 gr. 25
Chlorure de magnésium	0 gr. 05
Acide citrique. Q. s. pour 1 comprimé effervescent de 2 gr.	

4 tubes de 10 comprimés de 2 gr. Prix : 16 francs.

Particularités. — Présence de bromure de Sodium sédatif de l'aérophagie et de l'état général.

En une solution agréable au goût, le dyspeptique trouve l'activation de ses digestions et la disparition de son aérophagie, s'il la prend avant le repas (dégagement de citrate de soude) ; une sédation de ses brûlures et malaises s'il la prend après, dans 1/2 verre d'eau.

Emploi. — 1 comprimé avant les repas (hyposthéniques, aérophages) ou après ceux-ci (hypersthéniques) dans 1/2 verre d'eau, matin, midi et soir.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperacidité, Hypoacidité Aérophagie, Hépatisme.

Laboratoires de la PELVIFORMINE

(Spécifique urinaire total.)

J. OLIVE

14, rue des Minimes — PARIS

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

NORMUCYL

(Granulé)

Rééducateur des fonctions physiologiques de l'intestin.

Composition. — Granulé uniquement à base de mucilage gommeux (80 p. 100).

Mode d'action. — Purement mécanique, due à son très grand pouvoir de gonflement (il absorbe 40 fois son volume d'eau). Protège et lubrifie la muqueuse. Agit doucement et progressivement. N'entraîne pas d'accoutumance.

Particularités. — Ne contient ni phénolphtaléine, ni poudres ou extraits d'écorces drastiques, ni agar-agar. Ni sucré, ni parfumé. Ni digestible, ni fermentescible, ni putrescible. (Plus même, il s'oppose à l'alcalinisation trop forte du contenu colique et par suite aux putréfactions).

Indications. — *Constipation. Fausses diarrhées.*

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour, de préférence au début des repas.

Prendre le granulé sec, sans mâcher, et l'avaler en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix : { La boîte renfermant 150 gr. de granulé : 15 francs.
 { La boîte renfermant 400 gr. de granulé : 35 francs.

Cette dernière boîte permet un traitement d'une durée moyenne de 30 à 40 jours.

Laboratoires CHATRON

45, rue Cambronne — PARIS (XV^e). (Tél. : Ségur 26-79.)

NOVACÉTINE PRUNIER

(Saccharure granulé à base de Sulfošalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

**Antiarthritique énergique
agréable à prendre.**

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Dépôtaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NOVALIBUT

(ex « HALIBUT »)

Association et concentrations naturelles des vitamines A et D.

Puissant antirachitique biologiquement contrôlé.

Deux formes. — Gouttes et pilules (vanillées et chocolatées).

Composition. — Huile naturelle, non irradiée, de foie du poisson *Hippoglossus Hippoglossus* L., présentant des teneurs considérables de vitamines A et D.

Concentrations. — 1 gramme d'huile contient :

50 000 U. I. vitamine A. ; 6 250 U. I. vitamine D.

Propriétés. — Puissant antirachitique par la vitamine D ; puissant anti-infectieux par la vitamine A.

Indications. — Rachitisme (traitement spécifique et prophylaxie), tous troubles de l'ossification (ostéomalacie, caries dentaires, etc.), tuberculose, pré-tuberculose, maladies infectieuses (traitement curatif et préventif déminéralisation dans la grossesse, etc...).

Posologie. — **Gouttes** : nourrissons : II à III gouttes par jour.

Enfants : IV à VI gouttes par jour (selon l'âge).

Adultes : VIII à X gouttes par jour.

Pilules. — **Enfants** (5 à 10 ans) : 2 à 3 pilules par jour.

Enfants (10-15 ans) : 3 à 4 pilules par jour.

Adultes : 5 à 6 pilules par jour.

Prix. — Gouttes et pilules : 19 fr. 90. Durée minima : 15 jours.

Enregistrés au Lab. Nat. de Contrôle sous les N^{os} 689-30 et 689-31.

Laboratoire DU GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolores.

Composition. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 cgr. ; Stovaine : 1 cgr. ; Eau distillée : 1 cc.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 15 francs.

Laboratoires **ANDRÉ GUILLAUMIN**

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

NOVARSÉNOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyrate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Présentations: Ampoules unitaires de 0 g. 15, 0 g. 30, 0 g. 45, 0 g. 60, 0 g. 75, 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 g. 15 à 0 g. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le **Novarsénobenzol Billon** est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NOVHEPAR

Indications. — Anémies, convalescences, Traitement auxiliaire de la tuberculose, Insuffisance hépatique.

Composition. — Extrait *total* de foie, y compris les albumines et les lipoïdes.

Forme.—*Ampoules buvables* : 3 présentations :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc..... 18 fr.

Boîte de 18 amp. de 10 cc..... 50 fr.

Anémies, convalescences : adultes.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc..... 16 fr.

Anémies, convalescences : enfants.

Insuffisance hépatique : adultes et enfants.

Posologie.

Une ampoule de 10 cc. par jour, dans un liquide, au goût du malade avant le repas.

Une ou deux ampoules de 3 cc. par jour.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharmacien

13, r. Beudant — PARIS (XVII^e). Tél. : Wag. 75-75,

NOVIGOL

Traitement mercuriel et ioduré.

Sous les trois formes :

Élixir :

	A bouche.	A entremets.	A café.
Par cuillerée.....			
Bi-iodure de Mercure.	0,006	0,004	0,002
Iodure de Potassium ..	0,15	0,10	0,05

Dans un véhicule liquideux et aromatique spécial.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à bouche par jour aux repas.

Enfants, jusqu'à 10 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

De 10 à 18 ans : 2 à 3 cuillerées à entremets par jour.

Suppositoires :

Adultes : Hg. vif. 0,04 par suppositoire.

Enfants : Hg. vif. 0,015 par suppositoire.

Posologie. — 1 suppositoire le soir au coucher pendant 15 jours.

Globules : Sulfophénate Hg. : trente milligrammes pour un globule.

Posologie :

Adultes : 4 à 6 globules par jour.

Enfants (Au-dessus de 10 ans) : 2 à 4 globules par jour.

Indications. — Cure d'imprégnation mercurielle entre les séries de piqûres. Traitement de consolidation et d'entretien :

Hérédo-Syphilis, Dermatoses, Artério-Sclérose.

Laboratoire du NOVIGOL

24, rue de Lesson — ROCHEFORT-SUR-MER (Charente-Inférieure).

(Tél. : 1-00.)

NOVISMUTH

Composition. — Sous-nitrate de bismuth pur, très léger, très couvrant, peu chargé en acide nitrique.

Propriétés. — Antiseptique, non irritant, adsorbant, sédatif, protecteur des muqueuses gastriques.

Indications. — Colites, Constipation, Dysenterie, Entérites, Helminthiase, Infections, Intoxications, Spasmes.

Posologie et mode d'emploi. — Le sous-nitrate de bismuth est laxatif à haute dose et constipant à petite dose.

Dans les Colites, on peut prescrire 15 à 20 grammes par jour pendant 20 jours, le matin au réveil (le maximum quotidien de 20 grammes ne devra pas être dépassé).

Dans certains cas, le produit peut être pris avec beaucoup d'avantage par doses fractionnées : au réveil, au coucher, une demi-heure avant les principaux repas.

Ce traitement sera obligatoirement surveillé par le médecin. En cas de selles blanches ou grisâtres, suspendre momentanément la médication.

Prix. L'étui de 200 grammes : 40 francs.

— — 100 — 21 —

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-29 ou 42-40.)

NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes,
avec addition de lupulin et de phosphates.
(Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises.

Le Novo-Brol est le *seul produit utilisant* les remarquables *vertus calmantes du lupulin* (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose. — Ecraser les tablettes de Novo-Brol dans une tasse d'eau bouillante, pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. Na Br chim. pur desséché 1 gr par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux* : 1/2 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppement spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Contenance : 30 tablettes. — Prix : 20 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, Boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Auteuil 11-86.)

NOVOCORTEX ISCOVESCO

Extrait de la partie corticale de la glande surrénale
en gouttes

Hormones antitoxiques et antiasthéniques.

Particulièrement indiqué dans : toutes les *maladies infectieuses*, toutes les *convalescences*, toutes les *asthénies*.

Indications particulières. — Préventif du choc chirurgical. Vomissements de la grossesse.
Aucune contre-indication.

Posologie générale. — XXX gouttes par jour en deux prises dans un peu d'eau quelques minutes avant les repas.

Posologie infantile. — De 2 à 6 ans, X à XX gouttes par jour : — au-dessus de 6 ans : dose normale.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS.
(Tél. : Wagram 07-90.)

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme nouvelle. — Afin d'assurer un dosage rigoureux, le granulé est remplacé par des comprimés se délayant facilement dans l'eau sucrée.

Composition. — Papaïne extractive ; Citrate de soude ; Benzonaphtol ; Ferments lactiques.

Dose :

Nourrissons : 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants 15 mois à 2 ans : 3 à 4 comprimés.

Et au-dessus, 5 par jour.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons ; éruptions cutanées. Intoxication alimentaire.

Prix : 12 francs la boîte.

Laboratoire DAGUIN
SAINT-MAUR (Seine).

NOVOLUG

Composition :

Arrhénal	0,002
Hydrargyrophénoldisulfonate de soude.	0,042
(Soit 1,5 centigramme Hg métal.)	
Sirop aromatisé à la groseille framboisée. Q. S.	
pour 1 cuillerée à soupe.	

Indications :

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Posologie :

<i>Adultes</i>	2 cuillerées à soupe	par jour.
3 à 6 ans	2 —	à café —
6 à 14 ans	3 —	à café —
14 à 20 ans	2 —	à dessert —

(A prendre aux principaux repas.)

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

Observation importante :

Goût très agréable. Étiquette discrète.

Prix : 19 francs.

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

NOVOSPASMYL

Antispasmodique. Sédatif nerveux.

Composition :

Extrait de belladone titré	0,002
Extrait de jusquiame titré	0,01
Phényléthylmalonylurée.....	0,01
Extrait de cratægus stabilisé ...	0,04
Bromhydrate de quinine	0,04
pour 1 comprimé dragéifié.	

Indications. — Tous les troubles fonctionnels reconnaissant une origine spasmodique ou nerveuse.

Posologie. — De 2 à 6 comprimés par jour, à prendre au début des repas, en 2 à 3 fois, avec un peu d'eau.

Avaler sans sucer ni croquer.

Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

NOVURIT

Diurétique mercuri-purique.

Suppositoires. — Ampoules de 1 et 2 cc.

Composition :

Sel de sodium de l'allylamidométhoxytriméthylcyclopentane-dicarboxonate hydroxy-mercurique à raison de : 0 gr. 10 pour 1 cc. + 0 gr. 05 de théophylline ; 0 gr. 50 pour un suppositoire.

Action :

Diurétique très énergique sans effet toxique aux doses indiquées.

Indications :

Sous ses deux formes :

Œdèmes d'origine cardio-rénale, ascites de toute origine, cirrhoses hépatiques, hydrothorax, péricardites séreuses, pleurésies, hydarthroses, œdème pulmonaire, œdèmes rénaux, etc.

Les suppositoires :

Sont particulièrement indiqués : au cas où les injections intraveineuses ou intramusculaires sont rendues impossibles (oblitération veineuse et nodules fessiers).

Dans les cas récents de troubles cardiaques, où une cure d'injections n'est pas encore indiquée.

Pour le maintien du régime hydrique au lieu de l'administration *per os* de théobromine ou de théophylline.

Pour l'amaigrissement dans les cas d'obésité hydrophile.

Et en général : dès que l'état du malade demande une thérapeutique active et cependant prudente.

Contre-indications :

Glomérulo-néphrites chroniques et aiguës, affections intestinales diarrhéiques, états fébriles, cachexie. S'il existe des lésions de la muqueuse rectale, ne pas employer les suppositoires.

Posologie :

Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par semaine, deux heures environ après évacuation intestinale spontanée ou par purgation douce. Les introduire profondément. Par ailleurs, mêmes remarques que pour le traitement par injections.

Ampoules : 1 à 2, au maximum 3 injections de 1 à 2 cc., intraveineuse ou intramusculaire, par semaine.

En cas de décompensation cardiaque, traitement digitalique préparatoire. En donnant les 2 jours qui précèdent l'injection, 6 gr. *pro die* de chlorure d'ammonium, on augmente la diurèse.

Présentation :

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc.....	au prix de 17 francs.
Boîtes de 5 ampoules de 2 cc.....	au prix de 25 —
Boîtes de 5 suppositoires.....	au prix de 25 —

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, boulevard Latour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

NUCIPHOS

Agent incomparable de la suractivité cellulaire avec phagocytose exaltée entraînant une réparation des tissus, modifiant le terrain d'évolution de toutes affections microbiennes.

Injection indolore pendant et après la piqûre.

Indications. — Asthénie, Cachexies de toutes origines, Neurasthénie, Surmenage, Amaigrissement, Prétuberculose, Gripes et Convalescences, Anémie, Suite d'interventions chirurgicales, Anémie sénile.

Doses. — Le traitement est de trois séries de 10 piqûres à raison d'une ampoule tous les deux jours avec repos de dix jours entre chaque série.

Prix : 25 francs.

Durée d'une série : 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 00-15.)

NUCLÉARSAN

(Élixir)

Tonique analeptique et puissant reconstituant, favorise le métabolisme organique.

Formule. — Arrhénal, Acide nucléinique, Formiate de soude, Acide Phosphorique, Glycéro de Soude et de Magnésie, Teintures de Kola et de Damiana dans excipient aromatisé.

Indications. — Prétuberculose, Asthénie, Cachexie, Dépression nerveuse, Chlorose, Convalescence, etc...

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée (Voir *Nucléatol*) avec le méthylarsinate de soude.

Granulé. Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesures, 5 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Prix : *Granulé* : 15 francs.

Comprimés : 16 fr. 50. — *Ampoules* : 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et de nucléinate de soude.

Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude et nucléinate de soude. — *Injectable* : glycérophosphate de soude pur et nucléinate de soude.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesure de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Prix : *Granulé* : 15 francs. — *Ampoules* : 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

NUCLÉIGÈNE

Granulé. — Ergostérine irradiée, Nucléinates Soude et Manganèse, Glycéro de chaux, Arrhéнал, Ext. de Kola et vanille ; 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 22 francs (Durée : 8 jours).

Prescrire : Nucléigène granulé.

Indications. — Inappétence.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris

MASSY (Seine-et-Oise).

(Tél. : 22.)

NUCLÉOCARDYL

Médication spécifique de l'angine de poitrine.
Toni-cardiaque et Hypotensive.

Composition. — NUCLEOSIDES VASO-MOTRICES, Chlorophylle spéciale, Extraits de coeur et d'aorte, Chlorure de calcium.

Propriétés thérapeutiques. — Action vaso-dilatatrice, toni-cardiaque, hypotensive, diurétique et eupnéïque.

Mode de présentation. — Ampoules injectables ; Gouttes ; Comprimés dragéifiés.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Asystolie compensée, Œdèmes circulatoires, etc. Maladies infectieuses, Pneumonies, Rhumatismes.

Posologie :

Traitement d'attaque : 1 ampoule par jour (injection intramusculaire) ou XL à LX gouttes.

Traitement d'entretien : 2 à 6 comprimés par jour ou XX à XL gouttes.

Prix : 20 francs le flacon de 42 comprimés.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX.

(Tél. : 91-609).

NUCLÉOPHORÈNE

Reconstituant, Accélérateur de la Nutrition.

Composition. — Nucléinate de soude, Phosphate disodique, Méthylarsinate Na, Maté, Kola, Essence spéciale.

Indications. — Neurasthénie, Lymphatisme, Bronchites chroniques, Convalescence de Grippe et de Maladies infectieuses.

Formes. — Elixir.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux, Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

Enfants : à partir de huit ans, une cuillerée à café.

Prix : 18 francs.

Laboratoire BIOSÉDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

NUJOL

Huile de paraffine.

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

CRÈME DE NUJOL

Émulsion.

Description. — La Crème de Nujol est une émulsion d'un blanc très pur et d'un goût agréable, à base de Nujol, dont elle possède les propriétés thérapeutiques. Ne contient pas de sucre ; convient aux diabétiques. Est recommandé pour les enfants et toute personne acceptant difficilement l'huile de paraffine pure.

Indications. — Traitement de la constipation.

Dépôt Général :

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NUPHOS

Puissant reconstituant de la cellule nerveuse et de l'état général.

Sirop sous 3 formes thérapeutiques :

A. *Adultes* : 1 cuillerée à soupe au repas de midi.

B. *Enfants et adolescents* : 1 cuillerée à café au repas de midi.

C. Sans strychnine. { *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.
 Enfants : 2 cuillerées à dessert par jour.
 Bébés : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Composition. — Phosphate de soude, Acide phosphorique, catalysés par un sel de manganèse, édulcorés de façon agréable ; strychninés à dose très active dans les formes A et B.

Indications thérapeutiques. — Anémies : Reconstituant. — Asthénies : Reminéralisant. — Anorexies : Réconfortant. — Aliment de la cellule cérébrale. — Hausse rapide du potentiel travail.

Prix : 20 francs.

Laboratoires de Pharmacodynamie

E. POINSIER

20, rue Beaubourg, 20 — PARIS (IV^e).

NUTROMALT

Sucre nutritif.

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H^2O 2 %.
Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Mode d'emploi. — Une demi-cuillerée à café par biberon (soit 5 grammes environ) pendant les 3 premières semaines, puis une cuillerée à café par biberon (soit 10 grammes environ).

Durée de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

OBSOR

(Dragées.)

Présentation. — En étui de 50 dragées.

Principes actifs. — Iodure d'amidon, Glandes thyroïdes desséchées, Extrait de fucus, Extrait de Bourdaine.

Indications. — Obésité, disparition de la graisse, augmentation des forces sans modification de régime.

Mode d'emploi. — Prendre 2 dragées au milieu des deux principaux repas.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes de la puberté à la ménopause.

Formule :

Chaque pilule correspond à 0 gr. 20 de corps jaune frais. Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

Pilules : 4 à 6 par jour.

Gouttes : XXX à L par jour dans un peu d'eau.

Ampoules : 1 injection intramusculaire tous les 2 jours pendant la période du traitement.

Indications :

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, bouffées de chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopause, acrocyanose et toutes les manifestations de l'insuffisance ovarienne.

Permet de réaliser, en association avec la **Follestrine Grémy** (Voir à ce nom) le cycle physiologique ovarien.

Prix : *Pilules-Gouttes* : 20 francs. — *Ampoules* : 25 francs.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

OCTENSANOL

Solution à 1 p. 10.000 d'alcool octylique primaire.

Indications. — Hypertension artérielle et ses conséquences.

Formes thérapeutiques. — Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

Boîte de 12 ampoules : 30 francs au public.
Perles glutinisées, Boîte de 42 : 18 francs au public.

Posologie. — 1 ampoule tous les deux jours (série de 12). 3 à 6 perles par jour.

Bibliographie. — Clerc, R. Paris, J. Stern, *P. M.*, 25 nov. 33 ; F. Pezzangora, *C. R. Soc. Biol.* 1935, 119, 1931 ; M. Loeper, Mougeot et Aubertot, *Presse méd.*, 1934, n° 42, 857.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

ODARSOL

Opiat dentifrice antispérochétosique, contenant 0 gr. 50 p. 100 de Sulfo-Tréparsénan, parfumé aux essences de menthe et de badiane.

Indications. — Préventif et curatif des infections buccales : Pyorrhée alvéolaire, polyarthrite alvéolo-dentaire, ulcérations buccales, amygdalites, angine de Vincent.

Peut être utilisé journellement pour l'hygiène dentaire.

Forme. — Tube de 35 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

CENOPHOS

*Acides hydroéthylène-phosphorique.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET
de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (*Voir fiche DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café de *Granulé* ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante, voir « *DOLOMA* ».

Prix : La boîte granulé Cenophos.	18 fr.
Le flacon gouttes	15 fr.
— élixir	20 fr.

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.
29, place Bossuet — DIJON.
(Tél. : 16-42.)

OÉRÉLIODE

Iode de l'Otorhinolaryngologiste.

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid.

Huile *violette*, neutre, indolore, non irritante.

Indications. — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

Le flacon de 50 cc. Prix : 12 francs.

— 30 — — 9 fr. 25.

Laboratoire BOUVOT
AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).
(Tél. : Auvers 49.)

ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré
associé à une solution de Folliculine
titrée physiologiquement.

Boîte de 15 tablettes.

1 tablette { Na Br..... 1 gramme.
contient : { Folliculine 100 unités internationales.

Mode d'emploi et doses. — 1 à 2 tablettes 2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre 1 ou 2 tablettes : on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il convient d'absorber le plus chaud possible.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles nerveux accompagnant une dysfonction ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout Ménopause

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-62.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

ŒSTROGLANDOL « ROCHE »

Hormone œstrogène titrée biologiquement

Une ampoule ou 1 comprimé ou 1 gramme d'onguent

= 1.000 unités internationales ;

= 1 dixième de milligramme Folliculine cristallisée.

Indications. — Tous les troubles dus à une insuffisance ovarienne. Troubles de la Puberté et de la Ménopause, Acné, Prurit vulvaire, Céphalée, Vertiges, Dysménorrhée, Aménorrhée, Hypoplasie génitale, Retard des règles, Ménopause précoce.

Doses et modes d'emploi :

Comprimés (flacon de 20) : 1 à 2 par jour.

Ampoules (boîte de 6) : 1 à 2 par jour, deux à trois fois par semaine.

Onguent (tube de 20 gr.) : en applications suivies d'un léger massage matin et soir.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les n°s 504-73 (*ampoules*), 504-74 (*comprimés*), 504-75 (*onguent*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

OKAMINE Simple

Formule N° 2 du Dr Dani Hervouet :

Glycocolle.....	2 gr. 50
Méthylglycocolle	1 gr. 50
Monométhyl N Leucine gauche.....	1 gr.
Solvant isotonique.....	Q. S. p. 100 cc.
Boîte de 10 ampoules de 2 cc. Prix : 45 francs.	

Mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

Indications. — Toutes tuberculoses courantes.
Toute déficience organique. Supprime les vomissements gravidiques.

OKAMINE Dragées

Glycocolle, 4 gr. ; Sarcosine, 0 gr. 40 ; Leucine, 0 gr. 40 pour un flacon de 40 dragées. Prix : 20 francs.

Mode d'emploi. — 2 à 4 avant le petit déjeuner.

Indications. — Prolongent et renforcent les ampoules. Toute affection broncho-pulmonaire.

Surtout enfants adénopathiques.

OKAMINE Cystéinée

Formule N° 3 du Dr Dani Hervouet.

Boîte de 20 ampoules pour 10 injections.

Prix : 70 francs.

10 ampoules N° 1 de 2 cc.

Okamine et solvant spécial.

10 ampoules N° 2 de 1 cc.

Cystéine et solvant spécial.

Le mélange des deux ampoules dans la seringue est isotonique.

Mode d'emploi. — 1 ampoule tous les deux jours en injection sous-cutanée.

Indications. — Tuberculoses graves ou rebelles pour traitement tenace.

Remboursables par les Assurances sociales.

Laboratoire Contrôle 8847 $\begin{matrix} \diagup 1 \\ \diagdown 2 \\ \diagdown 3 \end{matrix}$

P. BLOUIN, pharmacien,

50, rue de Turenne — PARIS. (Tél. : Arc. 93-14.)

Dépôt général : DARRASSE Frères,

13, rue Pavée — PARIS (IV^e). (Tél. : Tur. 84-40.)

OLBIA

Solution huileuse de Bismuth.

(Dicamphocarbonate de Bismuth.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes, spirilloses, spirochètoses.

Formes :

1^o Ampoules de 2 cc. pour injections intramusculaires indolores.

2^o Ampoules de 1 cc. pour injections intramusculaires indolores.

Posologie :

Adultes : Injecter dans la région fessière une ampoule de 2 cc. tous les 4 jours.

Enfants : Injecter dans la région fessière une ampoule de 1 cc. tous les 4 jours.

La boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 24 fr. 75.

— 10 — 1 cc. : 16 fr. 50.

— 6 — 2 cc. : 16 fr.

— 6 — 1 cc. : 11 fr.

Etablissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe.

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

OLCALAN

Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLCALAN SIMPLE,
OLCALAN SALICYLIQUE, OLCALAN
RÉSORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de
l'épiderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs
des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 francs.

Enreg. au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 840-78.

OLCANFRAL

Composition. — Deux formes :

A	B	
Capsicum. Formol. Essence d'Eucalyptus. Alcool camphré. Glycérine.	}	Même formule moins le Capsicum.

Propriétés :

- A. Antiseptique, antiprurigineux, cicatrisant.
 B. Désodorisant.

Indications :

- A. Traitement curatif et préventif des engelures ulcérées ou non.
 B. Hyperhydrose et bromhydrose plantaires.

Posologie et mode d'emploi. — Une application matin et soir. Sèche très rapidement.

Prix : 8 fr. 50 le flacon de 30 cc.

Laboratoires MARTIN

CLOYES (Eure-et-Loir). (Tél. : n° 30.)

OLEGEL

Association d'huiles essentielles rigoureusement pures, présentées en gelée transparente, grâce à un procédé spécial, sans adjonction d'aucun mucilage.

Formule :

Pélargonium odorantissimum.....	5
Rosmarinus officinalis	5
Cupressus sempervirens.....	2,5
Thymus vulgaris	2,50
Lavandula officinalis	10
Excipient neutre	75

Pour 100 de gelée.

Indications cutanées. — Brûlures, plaies septiques, plaies atones, ulcères variqueux, furoncles et toutes pyodermites.

Indications gynécologiques. — Métrites, salpingites, pertes et toutes affections gynécologiques.

A employer, soit pure, soit en dilution aqueuse, l'OLEGEL formant instantanément au contact de l'eau une solution opalescente stable.

Tube de 50 grammes.

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie et Calcoithérapie par injections de suspension huileuse.

L'**Oléochrysine Lumière** est une suspension dans l'huile d'auro-thiopropanol sulfonate de calcium, teneur en or 35 p. 100, taux calcique 4.52 p. 100.

L'**Oléochrysine Lumière** présente le considérable avantage, de n'exercer aucune agression brutale à l'égard du rein et autres émonctoires ou organe, le calcium accroît encore la tolérance.

Une injection intra-musculaire tous les 4 ou 5 jours réalise une imprégnation continue. Absorption lente, régulière, acquise totalement en un temps variant entre 96 et 120 heures.

L'absorption à doses filées se trouve ainsi réalisée, d'où une fixation organique de l'or plus élevée que lorsque le sel est brutalement absorbé.

Tuberculose sous ses diverses formes et, au premier chef, Tuberculose pulmonaire, sans nulle restriction imposée par les caractères évolutifs de l'affection.

Dans les Tuberculoses dites externes : cutanées, osseuses laryngées, ganglionnaires, articulaires, des résultats satisfaisants sont atteints par l'usage de l'**Oléochrysine Lumière**. Les localisations rénales sont elles-mêmes favorablement influencées par l'**Oléochrysine Lumière** qui doit alors être administrée avec précaution sous le contrôle d'une surveillance minutieuse.

Rhumatismes et, plus particulièrement, la grande polyarthrite chronique infectieuse. Non seulement un rhumatisme chronique infectieux traité par l'**Oléochrysine Lumière** cesse d'évoluer, mais encore des malades immobilisés depuis des années par des nouures articulaires extrêmement douloureuses ont récupéré intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Maladies infectieuses diverses: Lèpre, Syphilis.

Dermatoses: Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'**Oléochrysine Lumière** avec des résultats inégalés dans de telles affections par tout autre traitement chimique.

Affections du système nerveux: Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse (l'or franchit la barrière méningée), de plus l'**Oléochrysine Lumière** semble donner quelques résultats dans la sclérose multiloculaire considérée comme échappant aux ressources de la thérapeutique.

L'**Oléochrysine Lumière** est livrée en ampoules de 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Début 0 gr. 10, puis 0 gr. 20 et 0 gr. 30. 1 injection tous les 5 jours. Traitement de 10 à 40 injections.

Rhumatisme. — Mêmes directives, mais progression lente des doses. Récidiver 2, 3 ou 4 fois les dosages 0 gr. 10 et 0 gr. 20 ensuite 0 gr. 30.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

OLÉOCHRYSOS LUMIÈRE

(CH₂ S Au CHOH SO₃ Sr)

Suspension dans l'huile

d'Aurothiopropanol-sulfonate de strontium

Teneur or 47,9 % — Taux du strontium 10,6 %

L'Oléochrysos Lumière est un sel hydrosoluble, à hydrosolubilité restreinte (0,9%) de sel d'or et de strontium en combinaison sulfo-organique; cette combinaison est de celles qui permettent d'atteindre au plus haut index thérapeutique, par rapport au poids d'Or administré.

L'Oléochrysos Lumière est totalement absorbé, lentement et avec régularité; l'élimination sous de faibles concentrations n'est pas irritante pour les émonctoires, car jamais elle ne leur impose une quantité massive de déchets.

Tuberculose — sous ses diverses formes — succès particulièrement tangible à l'égard des poussées évolutives, mais les Tuberculoses chroniques avec lésions anciennes n'échappent pas à l'indication de l'Oléochrysos Lumière.

Rhumatismes. — et tout particulièrement la grande polyarthrite chronique infectieuse que l'Oléochrysos Lumière arrête dans son évolution et permet aux malades de récupérer intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Affections des yeux qui s'apparentent au Rhumatisme, telle l'irido cyclite.

Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'Oléochrysos Lumière.

La maladie de Nicolas-Favre est justiciable de l'Oléochrysos Lumière.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse. L'or franchit la barrière méningée.

L'Oléochrysos Lumière est livré en ampoules dont le dosage est indiqué en Or élément.

Les dosages sont 25 milligrammes, 50 milligrammes et 100 milligrammes d'Or-métal. Le but essentiel étant d'administrer de l'or, il est logique de fixer les doses en Or-métal.

Le rythme moyen des injections est bi-hebdomadaire ou hebdomadaire.

Mode d'emploi :

*Pour tâter les susceptibilités individuelles
et chez les sujets jeunes : débiter par 25 milligrammes d'Or.
Cette dose permet l'Or aux hypersensibles.*

	Début	Doses ultérieures	Rythme	Nombre d'injections
Tuberculose	50	100	Chaque	De dix
Lèpre	milligr.	milligr.	7 ou 10	à
Spirillose	d'Or	d'Or	jours	quarante

Après une série, cessation de 1 à 2 mois, puis reprise du traitement

Rhumatisme.....
Sclérose multiloculaire.....
Psoriasis.....
Lupus érythémateux.....
Syphilis.....

Mêmes directives générales, mais progression lente des doses; récidiver 2 ou 3 ou 4 et même 5 fois les dosages.

Alterner la thérapeutique par l'arsenic, le mercure, le bismuth, l'antimoine, avec des séries d'Oléochrysos Lumière, dont l'intérêt essentiel est dans la prévention des accidents nerveux et, le cas échéant, la cure de ceux-ci.

L'index toxique de l'Oléochrysos Lumière est inférieur à celui de l'Oléochrysinine et à celui de l'Allochrysinine, d'où possibilité d'user de doses plus élevées qu'avec l'un et l'autre de ces produits.

Pas de contre-indications formelles. Cependant il est préférable de s'abstenir chez les sujets présentant un trouble profond, des constantes hématiques, une albuminurie importante, une diarrhée persistante.

Laboratoires LUMIERE

45, rue Villon — LYON

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire. Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Nota. — Pour éviter toutes confusions, prescrire toujours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

Voir également : OLÉOSODINE.

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre	0,20
Hexaméthylène tétramine.....	0,25

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Traitement pour 10 jours. Prix : 12 francs.

Laboratoires pharmaceutiques
CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

OLÉO-MEL

« LE LAXATIF DE RÉGIME »

Formule. — Huile de Paraffine extra-neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée p. l'usage interne. } P. E.
Miel surfin sélectionné..... }

Indications. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la **Constipation et des Affections gastro-intestinales**, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

Préparation. — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable : il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des Enfants et des personnes délicates.

Prix : 10 fr. 50 et 17 fr. 85 (taxe comprise).

Durée moyenne : 8 et 15 jours de traitement.

Laboratoire DELFOUR

à POUILLON (Landes) — (Tél. : 9.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 246-1.

OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

Huile d'Éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine naturelle, à alcalinité atténuée sans analgésique, sans oléate.

La plus active et la moins irritante des huiles éphédrinées. Pour **pulvérisations** nasales contre rhinites, sinusites, rhume des foins, coryzas, surdités catarrhales, céphalées sinusiennes, etc... Utiliser de préférence l'éphédriseur BÉRAL. Pulvérisateur de poche, étui métal : 20 francs.

Prescrire : **OLÉOPHÉDRINE BÉRAL.**

Un flacon : 12 et 15 francs.

Laboratoires de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

OLÉOSODINE

Oléate de soude Paul Thibault.

Composition. — Capsules dosées à 0 gr. 30 d'oléate de soude anhydre, chimiquement pur.

Propriétés. — Produit parfaitement toléré par les estomacs digérant mal les corps gras, exaltation de la sécrétion biliaire, désagrégation et expulsion des calculs de cholestérine, sédation des phénomènes douloureux.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholestérinémie, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin 2 à 3 capsules le soir, dans un peu d'eau minérale tiède (Vichy, Vals, Châtel-Guyon).

Prix : 15 fr. pour 6 à 8 jours de traitement environ.

Établissements SOUDAN

48, rue l'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

(Voir également **OLÉOCIDASE**.)

OLÉOVULES

Ovules gynécologiques de formule entièrement originale.

Acide picrosalique : Nouveau succénadé de l'Acide Picrique dépourvu de ses inconvénients (ne colore pas les téguments, ne détermine, même à haute dose longtemps continuée, aucun accident toxique) (M. Marchand, *Thèse Paris*, 1935).

Rubacrine ou Rouge d'Acridine : puissant antiseptique, non irritant (S. Lurié, *Thèse Paris*, 1934).

Sulfostérol : Composé organique soufré remplaçant l'Ichtyol (inodore et ne tachant pas).

Avantages. — Efficacité. Propreté. *Fusion parfaite.*

Indications. — Infections de toute nature des voies génitales inférieures (Blennorrhagie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.), et principalement : Métrites, Cervicites, Ulcérations et érosions du col, Vaginites.

Posologie. — 2 à 3 ovules par semaine.

Littérature. — Thèses de G. Donet et de M. Marchand ; Communication à la Société de Gynécologie ; travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thiéry, Fuchs, Fayot, de Manet, etc.

Laboratoires SFÉAT

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 13-31.)

OLÉTHYLE-BENZYLE

L'Oléthyle-Benzyle, qui servit à faire en France les premières études cliniques sur le Benzoate de Benzyle et permit son introduction dans la thérapeutique, est une présentation de Benzoate de Benzyle pur.

Propriétés physiologiques. — Antispasmodique et Hypotenseur dépourvu de tout pouvoir narcotique ne produisant aucun effet nocif sur le cœur, les reins, l'appareil respiratoire et le système nerveux.

Indications :

- I. — Hypertension, Angine de Poitrine, Angio-Spasmes.
- II. — Tous les états spasmodiques de la musculature lisse ;
Spasmes bronchiques, asthme, coqueluche, hoquet persistant d'origine périphérique, péristaltisme exagéré de l'intestin (dysenterie, diarrhées, pylorospasme), coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, constipation spasmodique, spasmes de la vessie, dysménorrhées spasmodiques.

Présentation. — Gouttes et gélules.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes est une solution de Benzoate de Benzyle synthétique pur titré à 20 p. 100.

L'Oléthyle-Benzyle Gélules est la présentation de choix de ce produit permettant au malade d'avoir toujours sur lui en toutes circonstances son médicament dosé de façon précise (chaque gélule renferme 0,10 de Benzoate de Benzyle).

Posologie. — Oléthyle-Benzyle Gouttes, XX à XXX gouttes trois ou quatre fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau sucrée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Oléthyle-Benzyle Gélules 3 à 5 gélules par jour, espacées dans le courant de la journée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Prix :

Oléthyle-Benzyle gouttes : 13 francs.

Oléthyle-Benzyle gélules : 14 francs.

Laboratoire Central de Paris.

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

OLEVONE

Comprimés.

Association : Oléate-Évonymine.

Comprimés laxatifs glutinisés à base d'*Évonymine purifiée dissimulée en une combinaison savonneuse colloïdale.*

Propriétés. — Laxatif doux non irritant (exempt de phénolphthaléine), éducateur de la motricité intestinale.

Dose et mode d'emploi. — Au début du repas du soir : *prendre en une fois* la dose laxative, qui varie de 1 à 3 comprimés en général, selon les individus.

On commencera toujours par un comprimé.

Le tube de 40 comprimés. Prix : 14 francs.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — Paris (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

Dr A. GRIGAUT et A. BOUTROUX

Pharmaciens

Chefs de Laboratoire à la Faculté de médecine.

OLICAL

Composition. — Émulsion stable au Stéarate de Chaux, Huile d'Olive, Huile de Millepertuis, essences antiseptiques.

Indications. — Spécifique des Brûlures, Coups de Soleil, Dermites aiguës (cutanées et muqueuses), Eczéma suintant, Prurits vaginaux et vulvaires, Rougeurs du nourrisson.

Mode d'emploi. — Étaler sur une gaze, en recouvrir la plaie. Ajouter un peu de coton, recouvrir d'un taffetas imperméable. Renouveler toutes les six heures.

Prix :

Petit modèle : 8 fr. 50 ;

Grand modèle : 12 fr. 50.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

OLIPHÉDROL

Antisepsie des voies respiratoires, sans Menthol, sans Cocaïne.

Formule Ess. Vég. Ant. 4 + Camphre 1 + Ephédrine nat. 0,5 + Stovaine 0,1 + Huile *végétale* neutre purifiée.

Indications. — Coryza, Rhume des Foins, Rhinites, Sinusites, Pré-servation des maladies contagieuses : Grippe, Rougeole.

Propriétés. Avantages. — Vaso-constricteur, Sédatif, Antiseptique, Sans menthol. Ne contenant que des essences naturelles. Ne rancit pas. Non irritant, odeur agréable.

Présentation :

<i>Solution</i> {	Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes	15 fr.
	Flacon de 30 cc. avec pulvérisateur.....	25 —
<i>Capsules</i> , boîte de 24.....		15 —

Mode d'emploi. — Pulvérisations, Instillations (VI à VIII gouttes ou une capsule) dans chaque narine et plusieurs fois par jour.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Pour les personnes à muqueuses *très* sensibles et chez le nourrisson, employez l'**Oliphédrol B. B.** — Ephédrine 0,3 — adénaline 0,05 — chlorétone 0,5 — essences 2 — huile quantité suffisante p. 100.

Laboratoire de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval — PARIS (XI^e).

OLIRICYL

EX-OLIRICIN

Composition. — Chaque comprimé dragéifié contient :

Huile de Ricin saponifiée	0,025
Huile d'Olive saponifiée	0,025
Bile dépigmentée	0,03
Soufre pur	0,02
Belladone pulv.	0,015

Originalité. — Utilisation des sels de l'huile de ricin et de l'huile d'olive, actifs sous un faible volume, sans aucun des désagréments des huiles (*nausées, renvois, indigestions, etc.*...).

Posologie. — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir au moment du coucher.

Commencer par 2 comprimés le soir.

Augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Avaler sans mâcher.

Indications. — Toutes les formes de constipation. Stimulant hépatobiliaire sans réactions. Lithiase biliaire. Cholagogue.

Présentation. — Tube de 40 comprimés assurant 15 à 20 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e).
(Tél. : Gobelins 36-96.)

OLIVÉOL

Acide oléique β

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants), X à XL
gouttes suivant l'âge.

SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,
se retrouve dans la bile hypersécrétée,
dissout le calcul de cholestérine.

Prix : Globules-Gouttes : 13 fr. 50.

Prix : Pilules : 15 fr. 50.

Lab. **OLIVÉOL** et **HÉPATICOL ÉTIÉVANT**

Ed. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des Hôpitaux de Lyon

TASSIN-LADEMI-LUNE (Rhône).

(Téléphone : 38.)

ONCTION ANGELINI

Guérison de la Gale même infectée.

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.

L'Onction Angelini, à base de soufre et
huile de cade, est en usage dans les hôpi-
taux maritimes de Brest, Cherbourg,
Lorient, Rochefort, Toulon, Bizerte.

Prix au public : 10 francs.

Angelini, Pharmacien,

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous

les commissionnaires et droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

ONGUENT FREVAL

Composition. — 45 p. 100 de mercure ; 2 p. 100 d'extrait frais de Belladone et 10 p. 100 d'extrait frais de ciguë.

Propriétés thérapeutiques. — Antiphlogistique, Résolutif, Antiseptique, Calme immédiatement la douleur et localise l'infection.

Indications. — Tout état inflammatoire : Piqure infectée, Furoncle, Phlegmon, Panaris, Anthrax, Hémorroïdes, Phlébite, Orchite, Arthrite aiguë, Adénite.

Tumeurs blanches et autres tuberculoses ostéo-articulaires et ganglionnaires.

Tout traitement mercuriel par friction (très recommandé pour les enfants ou comme traitement discret chez les adultes).

Mode d'emploi. — Étendre l'onguent, le recouvrir d'un linge propre ou d'une gaze et faire tenir.

Dose journalière. — Chez l'adulte : gros comme une noisette en une ou deux fois.

Prix : le tube de 50 grammes environ, 18 fr. 50.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

ONOGO

(Pilules.)

Présentation. — En étui de 50 pilules.

Principes actifs. — Extrait de Piper methysticum, Extrait de Bucchu, Bi-Carbonate de soude, Salol.

Indications. — Affections des voies urinaires, Blennorrhagie, Métrites aiguës et chroniques.

Mode d'emploi. — 8 à 10 pilules par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OPHTAL

Composition :

Novocaïne	0,05
Sulfate d'Alumine	0,20
Sulfate de Zinc.....	0,15
Azotate de Potassium.....	0,05
Chlorure d'Ammonium	0,05
Sulfate de Cuivre.....	0,05
Laudanum.....	0,30
Alcoolat vulnérable.....	5,00
Eau distillée de rose	10,00
Eau distillée de sureau.....	10,00
Eau distillée. Q. S. pour.....	100,00

Indications. — Conjonctivites infectieuses ou traumatiques, blépharites, orgelets, chalazions. Prophylaxie des affections oculaires.

Mode d'emploi. — En bains tièdes de 2 ou 3 minutes au moyen d'une ceillère, matin et soir, dans les cas bénins.

Trois fois et plus par jour dans les cas aigus.

Prix : 10 francs le flacon de 125 cc.

Laboratoire de l'Ophtal

F. LAGARCE, Docteur en Pharmacie

13, place de la Nation — PARIS (XI^e).

(Tél. : Diderot 61-05.)

OPOBROL

Thérapeutique **Sympathico-Endocrinienne.**

Composition :

Bromisovalérylurée	0,05
Ovarine totale	0,10
pour un comprimé dragéifié.	

Action. — 1° *Sympathique puissante* : Sédatif nervin doux et fidèle à base d'acide valérianique dont les *propriétés antispasmodiques et calmantes* sont connues de tous les thérapeutes, en combinaison avec le Brome et aussi l'Urée, qui possède une *action élective sur certaines cellules nerveuses* (Thèse de Champion).

Aucune action nocive sur l'organisme. Tolérance gastro-intestinale parfaite. *Sans aucune accoutumance*. Peut être administré aussi bien aux enfants et aux vieillards qu'aux adultes.

2° *Endocrinienne totale* : Contient toutes les hormones ovariennes. *Action panglandulaire certaine*.

Indications. — *Chez les femmes : Adolescentes, Adultes, Ménopausiques.*

Adolescentes atteintes de Nervosité au moment de la puberté, ou de troubles ou équivalents épileptiformes. Toutes les affections avec participation nerveuse et endocrinienne : Nervosisme, Irrascibilité, Insomnies, Idées fixes, Troubles pithiatiques. Aménorrhée, Dysménorrhée, Insuffisance ovarienne, Règles douloureuses. Troubles vasculaires de la Ménopause : Bouffées de chaleur, Malaises, Hypertension de la Ménopause, etc.

Posologie :

1 à 2 comprimés avant les repas de midi et soir, dix à quinze jours par mois.

Présentation et prix. — La boîte de 40 comprimés, 18 francs (10 à 20 jours de traitement).

Enregistré au laboratoire national de Cont. des Méd. : n° 1536-1.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires C. LE FOLLET
NOZEROY (Jura) (Tél. : Nozeroy, 5).

OPOBYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-3.

Forme. — Dragées.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Chologogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques. Excitant physiologique du péristaltisme intestinal.

Indications. — Hépatites. — Ictères — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

L'étui : 13 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél.: Lab. 62-30.)

OPOCALCIUM DU D^r GUERSANT

Reminéralisation. Polyopothérapie.

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde (titrant 200 unités Collip au gr.), surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets (en tubes d'aluminium), comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et, d'une façon générale, la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 3 à 5 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre. Durée du traitement : minimum 10 jours.

Opocalcium arsénié (avec 1 cc. de méthylarsinate disodique). — Une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium gaïacolé (avec sulfo-gaïacolate de potasse). — Antisepsie pulmonaire et reminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium irradié. — (Voir plus loin.)

Opoferine (avec fer organique et extraits organiques). (Voir notice plus loin.)

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Prix. — *Cachets* : 16 francs. — *Comprimés* : 16 francs,

Granulé : 17 fr. 50. — *Poudre* : 17 fr. 50.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU D^r GUERSANT

Composition. — Vitamine D pure cristallisée titrant 40 millions d'unités internationales au gramme, associée au complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium. (L'extrait parathyroïdien titre 200 unités Collip au gramme).

Formes. — Cachets (présentés en tubes d'aluminium). Comprimés, Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — L'Opocalcium irradié assure une reminéralisation intégrale. Il fixe le calcium et le phosphore dans les tissus.

Indications. — Rachitisme, Croissance, Carence minérale, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : *Adultes* : 3.

Comprimés : *Adultes* : 6.

Granulé : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 cuillerée à café.

Durée du traitement : minimum 10 jours.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCÉRÈS

Hormones sexuelles associées au complexe mangano-ferrique et au phosphore embryonnaire.

Reconstituant biologique général.

Poudre d'orchitine	0 gr. 05
— Lobe antérieur de l'hypophyse.....	0 gr. 02
— Surrénale.....	0 gr. 01
— Oxalate de fer	0 gr. 04
— Chlorure de Manganèse.....	0 gr. 02
— Inositohexaphosphate de calcium et magnésium.. Q.S.	0 gr. 20
Excipient.... pour un comprimé de	0 gr. 20

Indications. — Développement tardif ; Surmenage ; Convalescence ; Dépression ; Neurasthénie ; Dénutrition ; Asthénie ; Anorexie ; Rachitisme ; Déminéralisation ; Déglobulisation.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 demi-comprimé au milieu des deux repas, écrasé dans la confiture)

Adolescents : 1 comprimé.

Adultes : 2 comprimés.

A avaler avec une gorgée d'eau ou à prendre délayé dans un peu d'eau sucrée ou boisson habituelle, suivant avis du médecin traitant.

Boîte de 40 comprimés : prix : 20 francs.

Laboratoire de l'AÉROCID — SCHMIT, pharmacien.

71, rue Sainte-Anne — PARIS (II^e). R. C. Seine n° 34-029.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 89-4.

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait total hépatique. Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

Forme pharmaceutique :

Comprimés dragéifiés glutinisés.

Indications thérapeutiques :

Affections hépato-biliaires. Hépatites, Cirrhoses, Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiasse biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholé cystites médicales, Ictères.

Affections gastro-intestinales. — Dyspepsies réflexes, Constipation par insuffisance de chasse biliaire, Entéro-Colite muco-membraneuse.

Maladies de la nutrition. — Diabète par hypohépatie. Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie. — Foie cardiaque. Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, Hémophilie, certaines Anémies.

Infections, Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Régulateur-Entretien.* — 2 comprimés par 24 heures, un comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).
(Tél. : 0-50.)

Echantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

Composition. — Extraits embryonnaires, albumoses et tous principes actifs de la régénération cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Agent spécifique de l'épidermisation.

Indications. — Plaies atones. Pertes de substance chirurgicales ou diathésiques, Engelures, Brûlures, Erythèmes, Crevasses du sein, Prurits, Dermatoses.

Mode d'emploi. — Application permanente en couche épaisse, renouvelée aussi souvent que possible.

Prix au public : 12 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

OPO-DINITRA

Sans ovaire. Sans thyroïde.

Dinitrophényl-lysidine, Lobe antérieur d'hypophyse, Extrait hépatique.

Le *Lobe antérieur d'hypophyse*, par ses hormones adipo-lytique, gonadotrope et thyroïdienne, est une médication synergique de la nitrophénazine.

L'*Extrait hépatique* réduit les intolérances idiosyncrasiques, facilite le travail du foie si souvent déficient chez les obèses dysendocriniens.

LASSITUDE MENSTRUELLE : 2 à 4 comprimés par jour, 3 jours avant et pendant les règles.

OBÉSITÉ DE LA MÉNOPAUSE, } 1 comp. par 10 kgs
OBÉSITÉS DYSENDOCRINIENNES } de poids corporel.

FRIGIDITÉ GÉNITALE : masculine ou féminine, 4 à 6 comprimés par jour.

Intolérances idiosyncrasiques au dinitrophénol.

Boîtes de 60 comprimés et de 300 comprimés.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

OPOFERRINE VITAMINÉE

Thérapeutique anti-anémique.

Composition. — Association des Peptonates de fer et de manganèse à l'extrait hépatique (méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

Action. — Agent de régénération sanguine : stimulant l'hématopoïèse.

Indications. — Anémies de toute nature (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), chlorose, altérations et affections sanguines, déficiences spléno-hépatiques, états post-opératoires, convalescence, surmenage, intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaire, etc...), amaigrissement.

Forme. — Granulé.

Doses journalières. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. Aucune action toxique.

Prix : 18 francs.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Ménilmontant : 62-81, 62-82.)

OPOGERMINE IRRADIÉE

**Reconstituant Intégral, Recalcifiant,
Anti-anémique tonique.**

Composition. — Association de la Germinine du Blé à l'extrait hépato-splénique désalbuminé, en présence d'ergostérol irradié. Granulé fondant, d'un goût exquis, sans odeur ni saveur médicamenteuse.

Indications. — Rachitisme, Croissance difficile, Carie dentaire, Fracture, Allaitement, Grossesse, Phosphaturie, Anémie, Convalescence, Surmenage, Usure, Bacillose.

Mode d'emploi :

Doses quotidiennes :

Nourrissons : 1 cuillerée à café ;

Enfants : 2 cuillerées à café,

Adultes : 3 cuillerées à café.

Laboratoire national de contrôle n° 1219-2.

Prix : 24 francs.

**Éts Pharmaceutiques M. et P. LEDENT
MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).**

(Tél. : 1-60.)

OPO-IODAMÉLIS LOGEAIS

Composition. — Iodotantin de l'Iodamélis associé à l'organothérapie masculine ou féminine et présenté sous forme de comprimés glutinisés et enrobés.

Propriétés. — Associe les effets stimulants de l'Iodamélis sur le métabolisme général à l'action compensatrice et régulatrice des extraits endocriniens et des hormones.

Deux formules :

Formule Masculine :

Iodotantin de l'Iodamélis	0,10
Orchitine	0,10
Ante-Hypophyse	0,005

Indications. — Asthénies, déficiences endocriniennes, troubles circulatoires et obésité de l'âge mûr, certaines dermatoses.

Doses : 2 à 6 dragées par jour.

Formule Féminine :

Iodotantin de l'Iodamélis	0,10
Ovaire.....	0,10
Ante-Hypophyse	0,005
Benzoate de dihydro-folliculine	40 U. I.

Indications. — Dysendocrinies de la jeune fille et de la femme, troubles de la ménopause et leurs conséquences.

Doses : 2 à 6 dragées par jour.

Laboratoires JACQUES LOGEAIS

71, avenue de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

OPOMYGDAL

Granulé.

OPOMYGDAL est généralement prescrit comme cure d'entretien, dont l'effet s'ajoute à celui du MYGDAL, lorsque l'administration de ce dernier n'est plus nécessaire et que le malade a besoin d'un stimulant biologique particulier.

OPOMYGDAL s'adresse tout spécialement aux *enfants lymphatiques*, porteurs de *petites adénopathies* et dont le *développement retardé* s'accompagne de troubles généraux d'ordres divers.

OPOMYGDAL se révèle ici comme un *régulateur de la croissance*.

OPOMYGDAL augmente, en outre, la *résistance* aux multiples *infections de la gorge*, en exaltant les réactions naturelles de défense, devenues insuffisantes du fait d'une *dystrophie amygdalienne*.

Posologie. — 1/2 à 1 cuillerée à café deux fois par jour, loin des repas.

Prix : 20 fr. (taxes comprises).

Préparé par H. BOISSEL

295 bis, rue de la Benaugue — BORDEAUX.
R. C. Bordeaux 16531 A.

Vente O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Dépôt pour l'Algérie : **Coopération Pharmaceutique Française**
37-39, rue de Lyon, ALGER

OPONUCLYL IRRADIÉ ou SIMPLE TROUETTE-PERRET

Catalyseur fixant le Phosphore et le Calcium.
Vitamine D.

Médication synergique organo-minérale.

Composition. — Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer, Algostérine irradiée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Croissance, Surmenage, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose.

Doses. — *Adultes* : 2 sphérules à chaque repas.
Enfants : 1 sphérule à chaque repas.
Prix au public : 16 francs.
Littérature et Échantillons :

Laboratoires TROUETTE-PERRET
61, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 87-34.)

OPOPHOS GRANULÉ

Composition. — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie ; Phosphate bicalcique, de magnésie, de manganèse ; Protoxalate de fer, Splénine, Thymusine, Parathyroïdine.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Dénutrition, Caries dentaires.

Forme. — 1^o Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique, l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bébés. — 2^o Cachets (pour adultes).

Doses. — 1^o *Bébés* : 1/4 de cuill. à café 2 fois par jour. — 2 à 5 ans : 1/2 cuill. à café 2 fois par jour. — 5 à 15 ans : 2 cuill. à café par jour. — 2^o *Adultes* : 2 cachets par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire DENISOT
19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

OPO-PLASMA

Composition. — Extraits de Foie, Rate, Pancréas, Rein, Surrénale, Glande mâle, Extrait de Malt et Peptone de muscle (Acides aminés totaux) en Plasma marin synthétique, hypertonique par les facteurs Ca, Mn, Mg, Cu.

Indications. — *Maladies chroniques*, déglobulisantes, déminéralisantes et consomptives : Anémies, Lymphatisme, Rachitisme, Avitaminose, Athrepsie des Nourrissons ; *Tuberculose* dans toutes ses manifestations, rhumatismes chroniques, Paludisme, Cachexies, Néoplasies, etc.

Maladies aiguës toxi-infectieuses ou septicémiques. Fièvres éruptives, broncho-pneumonies, diphtérie, états typhoïdes et puerpéraux, pyosepticémies chirurgicales, etc... Toutes convalescences.

Présentation. — *Ampoules buvables* (non injectables) de 20 cc

Prix : 45 francs la boîte de 10 ampoules.

— 25 francs — 5 —

(Par voie buccale.)

Adultes : 1 à 4 ampoules par jour dans un peu d'eau ordinaire ou gazeuse avant ou loin des repas. *Enfants* : 1 à 2 ampoules suivant l'âge.

(Par voie rectale.)

Mêmes doses étendues d'un volume égal d'eau bouillie tiède ou mieux incorporées dans un « goutte à goutte » de sérum physiologique ou glucosé.

L. BÉLIÈRES,

19, rue Drouot — PARIS.

OPOSÉROTHÉRAPIE VALTRY

CUROZÉMA

Dragées

Demi-flacon : 18 francs. Flacon : 30 francs.

Formule. — Sérums activés (désensibilisation), Opothérapie hépatorenale (libération des émonctoires) Synergie endocrinienne (brassage endocrinien).

Indications. — Eczéma, Psoriasis, Acné, Prurits, Otite externe, eczémateuse, Urticaire.

Posologie. — Pendant 10 jours, 9 dragées par jour, à raison de 3 au moins une heure avant chaque repas.

PÉDIOZÉMA

Granulés : 15 francs.

Formule. — Sérums activés (désensibilisation), Opothérapie hépatorenale (libération des émonctoires), Synergie endocrinienne (brassage endocrinien).

Indications. — Eczéma infantile, Erythème fessier.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour au moins une heure avant les repas.

ASMOCRINE

Dragées : 22 francs.

Formule. — Sérums activés (désensibilisation), Opothérapie spléno-pulmonaire. (Synergie endocrinienne).

Indications. — Asthme, Coryza, Rhume, des foins.

Posologie. — Pendant 10 jours, 7 dragées par jour au moins une heure avant les repas.

PÉDIASMA

Granulés : 15 francs.

Formule. — Sérums activés (désensibilisation). Opothérapie spléno-pulmonaire (Synergie endocrinienne.)

Indications. — Asthme infantile.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour au moins une heure avant les repas.

FLOCULYSINE

Granulés : 18 francs.

Formule. — Sérums activés (désensibilisation). Glandes à sécrétion externe (rétablissement de la fonction d'excrétion). Glandes à sécrétion interne (maintien de l'équilibre général).

Indications. — Goutte, Douleurs articulaires, Entérite chronique, Entérite sèche, Hémorroïdes, Obésité, Troubles menstruels et de la Ménopause, Migraines, Syndrome entéro-hépatique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe par jour au moins une heure avant le repas.

Préparé par J. MAHEU, docteur en médecine, docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe, membre de la Société de Pharmacie, externe des hôpitaux, lauréat de la Faculté de pharmacie de Paris.

Echantillon et littérature sur demande.

Laboratoire biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

OPOSSÉINE

Granulé endocrino-minéral vitaminé.

Reminéralisant

Hémopoiétique

Composition :

Glandes endocrines (extraits totaux) : **Thymus**, rate, Parathyroïde, moelle osseuse, foie, hypophyse.

Vitamine D, Solution huileuse. — Cristallisée et chimiquement pure. Inaltérable, d'action K (isolée de l'ergostérine irradiée au contact de laquelle elle s'altère).

Ions P, Ca, Mg, Mn, Na : **Hypophosphite** de Mg, **nucléinate** de Mn et de Na, phosphates et glycérophosphates.

Action :

Réalise intensément reminéralisation et hémopoièse.

Favorise la nutrition de la cellule nerveuse et osseuse.

Remédie aux spoliations phosphorées et aux carences calciques.

Régularise le métabolisme des ions et des stérols.

Assure l'équilibre minéral et acido-basique.

Supplée à toutes les déficiences organiques ou endocriniennes.

Forme et posologie :

Boîte cylindrique de 37/150, en métal imprimé rouge et noir sur fond gris clair.

Prix : 20 francs. (Pour 15 jours de traitement).

Renfermant 140 grammes = 40 cuillerées à café de granulé fondant, agréable au goût, à croquer.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Adolescents : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Deuxième enfance : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Première enfance : 1 cuillerée à café par jour.

Indications :

Prétuberculose et tuberculose. — Troubles de la croissance.

Convalescence, Surmenage, Rachitisme, Déminéralisation.

Fractures. — Grossesse. — Dentition. — Allaitement.

Toutes anémies de l'adulte et de l'enfant.

Dépansions nerveuses, Neurasthénie, Phosphaturies.

Littérature et échantillons à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale, 1 et 3, rue Soumet,
CASTELNAUDARY (Aude). (Tél. : 3-10.)

OPOSTYL

Auxothérapie Opocrinienne des Asthénies.

Composition. — Cortico-Surrénale + Arsenic organique, Moelle osseuse + Hypophosphites, Thymus + Magnésium et Rate + Fer.

Indications. — Réunit ainsi 4 associations en synergie du sel minéral et de la glande qui le fixe dans l'organisme.

1° Stimule puissamment le pouvoir anti-infectieux et l'hématopoïèse ; 2° rend possible la création de réserves consommables, même sur le terrain peu favorable d'un organisme déprimé ; 3° restaure le tonus nerveux.

Épuisement des réserves, convalescences, épuisement nerveux.

Formes. — Dragées, Liqueur.

Posologie et mode d'emploi :

Liqueur : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant le repas, de préférence dans un peu d'eau sucrée.

Dragées : 2 à 4 par jour à avaler avant les repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BAZIN

SUCS ORGANIQUES BAZIN

Extraits totaux glycerinés d'organes frais
(méthode de Brown-Séquard.)

Simple macération glycerinée suivie d'expression de l'organe frais, ces préparations constituent l'idéal opothérapique. Journallement et uniquement préparés avec des glandes fraîches, il n'entre dans leur fabrication aucun organe frigorifié d'origine américaine.

Opothérapie simple. — Suc ovarien, orchitique, thyroïdien, hépatique, pulmonaire, rénal, surrénal, hypophysaire, thymique, para-thyroïdien, pancréatique, cortico-surrénal, gastrique, intestinal, amygdalien, mammaire, placentaire, prostatique, splénique, médullaire, cérébrine, cardine, oculine, sérum de porc anticolibacillaire, etc.

Opothérapie associée. — Suc thyro-ovarien, thyro-orchitique, surréno-ovarien, surréno-orchitique, hypophyso-ovarien et orchitique, triglandulaire M. et F., pluriglandulaire M. F. et toutes formules que MM. les médecins voudront bien nous indiquer.

Mode d'emploi. — Deux à quatre cuillerées à café dans un peu d'eau pure ou d'eau minérale et suivant avis du médecin.

1 cuillère à café correspond à 1 gr. d'organe frais.

Présentation. — 1° En flacons de 90 cc. au prix de 11 francs les uniglandulaires et 12 francs les pluriglandulaires ;

2° En ampoules (boîte de 10 ampoules de 10 cc.) au prix de 16 francs.

Laboratoire, Spécial BAZIN

Autorisé par l'État après avis favorable de l'Académie de Médecine pour préparation des Extraits organiques.

H. GARRAUD, Pharmacien,

Ancien assistant de la Faculté, Lauréat, Médaille d'or.

9, cours Victor-Hugo — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 927-61.

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond à basse température et présentés en dragées (préparées à froid et permettant une conservation indéfinie) ou en ampoules de 1 et 3 cc.

Thyroïdine: (0 gr. 10 de corps thyroïde), Obésité, Myxœdème.

Ovigénine: (0 gr. 12 d'ovaires), Ménopause naturelle ou artificielle.

Gastrozymase: Comprimés effervescents de suc gastrique de porc, Dyspepsies, embarras gastrique.

Liqueur à la Thyroïdine: 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséchée, Myxœdème infantile.

Globépal: Poudre de foie frais.

Opostyl: Voir 1/2 page spéciale.

Triglandine:

Thyroïde.....	0 gr. 08	{ Asthénies endocriniennes féminines.
Hypophyse	0 gr. 05	
Ovaire	0 gr. 10	

Triglandol:

Thyroïde.....	0 gr. 08	{ Asthénies endocriniennes masculines.
Hypophyse	0 gr. 05	
Testicule.....	0 gr. 10	

Biliol, Séquardine, Hépatine, Surrénaline, Néphrine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE,
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyne, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipoïde correspondant (procédé breveté).

Posologie. — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° **Les « EXO » BYLA**, sucs totaux **inaltérables**, préparés par exolyse des organes frais (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

Posologie. — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° **Les GLANDULESBYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter **toute odeur**.
Conservation indéfinie.

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA.

Posologie. — (4 à 8 par jour).

4° **Les AMPOULES BYLA** : préparées à partir des **ORGANES FRAIS** ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES « ISO » BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire
et panglandulaire.*

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e)
(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO — Exolysés — Glandules — Ampoules.

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine 0.60	Infantilisme masculin. Dystrophie des adolescents.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine..... 0.20	Infantilisme féminin, troubles de la ménopause. Syndromes adipo-génitaux
3	Orchitine 0.60 Thyroidine... 0.025	Myxœdème. Infantilisme masculin.
3 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine... 0.10	Hypotension et asthénie de la ménopause.
4	Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Hypertension et Troubles de la méno- pause naturelle ou opératoire. Obésité-
4 bis	Ovarine..... 0.15 Orchitine... 0.30	Carence sexuelle féminine.
5	Surrénine.... 0.10 Hypophysine. 0.10	Myasthénies. Insuffisance surrénales Hypotension.
6	Surrénine.... 0.10 Thyroidine... 0.025	Retards de croissance. Etats thyroïdien avec hypotension. Fatigabilité.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroidine... 0.025	Infantilisme. Obésité. Sénilité précoce.
7 bis	Placentine... 0.25 Mamelline .. 0.25	Galactogue.
8	Surrénine.... 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Syndrome adipo-génital. Infantilisme.
8 bis	Ovarine..... 0.15 Surrénine.... 0.05 Hypophysine. 0.05	Troubles de la puberté et de la méno- pause. Syndromes adipo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Retards de la puberté. Troubles de la ménopause et de la puberté. Syndromes adipo-génitaux.
9 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine.... 0.05 Thyroidine.... 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Etats dépressifs avec hypotension.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine 0.60 Thyroidine.... 0.025	Développement tardif. Infantilisme. Syndromes adipo-génitaux.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroidine... 0.025 Surrénine.... 0.05 Orchitine 0.10	Infantilisme masculin. Syndromes adipo-génitaux. Sénilité précoce.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025 Surrénine.... 0.05 Ovarine..... 0.10	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la méno- pause. Obésité.

14	Splénine....	0.15	Reconstituant général dans toutes les anémies.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	S. H. P.		
15	Duodénase..	0.15	Excito-régulateur des diverses sécrétions commandant la digestion duodéno-hépatopancréatique — Troubles du carrefour sous-hépatique. Syndromes digestifs mal définis.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	D. F. P.		
16	Hépatine....	0.15	Puissant reconstituant général dans toutes les formes de l'anémie.
	Gastérase...	0.15	
	Splénine....	0.15	
	Surrénine...	0.05	
	F. E. R. S.		
Les dosages indiqués sont ceux des CACHETS OPO.			

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA : Masculins, Féminins, Infantiles,

Exécution de toute formule sur ordonnance médicale.

Échantillons et Littérature :

Les Établissements BYLA, 26, avenue de l'Observatoire, Paris
(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE CARRION

1° Comprimés dragéifiés et Cachets uniglandulaires. — Poudres d'organes renfermant, inaltérées chimiquement, les substances spécifiques contenues dans les organes frais. La forme « comprimés » de conservation plus aisée, est recommandée particulièrement.

Comprimés à 0 gr. 10 de corps jaune, Fiel, Hypophys totale, Hypophyse lobe antérieur Ovaire, Surrénale.

Comprimés à 0 gr. 20 de Myocarde, Gastrique, Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Pancréas Placenta, Prostate, Rate, Rein, Substance grise, Surrénale totale Surrénale cortex.

Comprimés à 0 gr. 50 de Foie, Glande Mammaire, Thymus.

Comprimés de Thyroïde à 0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Comprimés de Parathyroïde à 0 gr. 01.

Boîtes de 24 comprimés. Prix variant suivant les cas, de 10 à 20 francs. *Cachets à tous dosages et suivant toutes formules, sur ordonnance.*

Posologie. — En général, 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

2° Comprimés dragéifiés et Cachets pluriglandulaires.

T. O. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. O. S.	{	Thyroïde	0,02
		Ovaire	0,10			Ovaire	0,10
		Surrénale .	0,10			Surrénale	0,10
		Hypophyse	0,03				
T. A. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. S. H.	{	Thyroïde	0,02
		Orch. (A) .	0,10			Surrénale	0,20
		Surrénale..	0,10			Hypophyse	0,05
		Hypophyse	0,03				
T. O. H.	{	Thyroïde .	0,02	O. S. H.	{	Ovaire	0,15
		Ovaire	0,10			Surrénale	0,05
		Hypophyse	0,03			Hypophyse	0,05
S. H.	{	Surrénale .	0,20	T. O.	{	Thyroïde	0,03
		Hypophyse	0,05			Ovaire	0,20
T. A.	{	Thyroïde .	0,03	O. M.	{	Ovaire	0,20
		Orch. (A) ..	0,20			Mammaire (glande)	0,30

Posologie. — 2 à 3 comprimés ou cachets par jour ; la boîte de 24 20 francs. (T. A. : 15 francs.)

3° Extraits injectables uniglandulaires. — En ampoules de 2 cc. correspondant à 0,10 d'extrait d'organe (sauf Parathyroïde). Une injection par jour ou tous les 2 jours. La boîte de 6 ampoules : 15 francs.

Pluriglandulaires : en ampoules de 2 cc. répondant aux formules des comprimés. La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

4° Per-extraits injectables. — Voir plus loin « Per-Extraits » « Per-Hépatique », « Per-Ovarien », « Per-Surrénalien », « Per-Thymique »

5° Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse. — Voir plus loin : « Rétroputine ».

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

OPOTHÉRAPIE CHOAY

EXTRAITS TOTAUX CHOAY, poudres d'organes (Codex préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques équivalentes à celles des pulpes fraîches correspondantes)

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* et *Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

Posologie moyenne. — 4 à 6 par jour.

Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés

Cachets et comprimés : Hépatiques	25 et 50 cgr.
Hypophysaires	5 et 10 —
Mammaires	25 et 50 —
Orchitiques (ou Androïques)....	25 et 50 —
Ovariens	20 à 50 —
Pancréatiques	25 et 50 —
Spléniques	25 et 50 —
Surrénaux	10 et 20 —
Thymiques	25 et 50 —
Thyroïdiens ...	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

Boîtes de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. EXTRAITS INJECTABLES CHOAY : Solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 à 10 cc.

Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :

Ampoules hépatiques	1, 2 et 5 cc.,	1 tous les jours.
Ampoules hypophysaires (lobe antérieur)	1 et 2 cc	1 tous les 2 jours.
Ampoules hypophysaires (lobe postérieur)	Voir « Post-Hypophyse Choay ».	
Ampoules mammaires	1 et 2 cc ...	1 tous les 2 jours.
— orchitiques	1 et 2 cc ...	—
— ovariennes	1 et 2 cc ...	—
— spléniques	1, 2 et 5 cc ...	—
— surrénales	1/2 et 1 cc ...	—
— thymiques	1 et 2 cc ...	—
— thyroïdiennes	1/2 et 1 cc ...	—

Boîtes de 6 ampoules.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : *Synchrines Choay* (Voir ce mot)

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

OPOTHÉRAPIE du D^r FRAYSSE

(Associations)

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc. — Trait^t : 3 sem.

NEURODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : orchitine 0,20, substance grise 0,10.

Doses. — *Adultes* : 4 pastilles par jour.

Indications. — Épuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc. — Traitement : 25 jours.

PLACENTODOSE. — Granulés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc. — Traitement : 25 jours.

SPLÉNODOSE. — Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine. — Osséine.

Méthode de Whipple modifiée.

Deux formes : { 1^o Buvable. — Ampoules de 10 cc.
1 ampoule par jour.
2^o Granulés. — 4 cuillerées par jour.

Indications. — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Paludisme, etc. — Traitement : 25 jours.

Laboratoires du D^r FRAYSSE

21, r. de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88.

Notices et échantillons sur demande.

(Voir aussi *Folli-Lobine.*)

OPOTHÉRAPIE E. VERGELOT

AMPOLASES

Composition. — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate, foie, parathyroïde, préparés à froid sans modification du pH et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R, Ampolases F, Ampolases Para N, Ampolases de thymus.

Indications. — Troubles des fonctions génitales, Dépression, Déminéralisation, Anémie, Débilité, etc.

Présentation. — Ampoules buvables.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ou 2 ampoules par jour contenant 33 p. 100 de produit actif.

Durée du traitement. — 12 jours au moins par mois.
Prix : La boîte de 6 ampoules : 18 francs.

OPOLASES

Composition. — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par le froid et l'air sec.

Avantages. — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

Les poudres de glandes sont préparées par les Laboratoires de Organotechnie situés à proximité des abattoirs de la Villette où sont recueillies les glandes ; elles sont soumises à un simple courant d'air pour les dessécher, ce qui permet de conserver inaltérés leurs principes actifs et leur confère ainsi une activité remarquable.

Principaux produits. — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaire et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T », Surrénale totale « S », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P », Testicules-Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M », Hypophyse « H », G. Testiculaires.

Parathyroïde à 1/10 de mgr. Thyroïde à 1/10 de mgr (Ttt).

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 dragées par jour.
Prix : 16 et 18 francs la boîte de 24 dragées.

Enregistré au laboratoire national des médicaments sous les n°s 997-1 à 997-15.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 48-22.)

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

LES ENDOCRISINES

Extraits totaux d'organes frais. — Hormones

TOUTES LES GLANDES

Prescrire : ENDOCRISINES FOIE, etc...

Cachets dosés en extrait sec. Ampoules dosées en glande fraîche, soit environ cinq fois le poids d'extrait sec.

Exécution rapide de toutes les Prescriptions Médicales

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
FOIE	Insuf. hépatiques. Cirrhoses. Dermatoses.	24 cach. à 0,50 6 amp. à 1 gr.	15 5
Foie Buvable	Toutes les anémies : Méthode de Whipple pour thérapeutique infantile.	7 amp. b. de 10 cc. (150 gr. de foie frais) 12 amp. b. de 2 cc. (30 gr. de foie frais)	48 30
HYPOPHYSE	Hypotension myocardique des toxi-infections.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20	22 35
Glande totale	Syndrome adiposo-génital. Neurasthénie-Otosclérose.	30 compr. à 0,05 6 amp. de 2 cc. à 0,25	15 15
Lobe antérieur	Retards de la croissance — Obésité Insuffisances ovariennes et génitales Ectopie testiculaire.	24 cach. à 0 gr. 05 et 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,25 (environ 25 U. I.)	15 25 20
Lobe postérieur ou PHYSOCRISINE et PHYSOCRISINE 10	Diabète insipide — Céphalées Accouchements : Inertie utérine, hémorragies. Diabète insipide.	5 tubes de poudre à priser à 0,15 6 amp. de 1 cc. à 5 U. I. 3 amp. de 1 cc. à 5 U. I.	20 25 14
	Hémoptysies (Inj. intraveineuses).	3 amp. de 10 cc à 5 U. I.	25
OVAIRE	Troubles de la ménopause et de la puberté.	30 cach. à 0,05 24 cach. à 0,10 0,20 0,25, 0,30, 0,50.	12 à 35
Glande totale	Troubles psychiques. — Rhumatisme chron. — Obésité.	30 comp. à 0,10 6 amp. 2 cc à 0,50	15 15
Corps jaune	Troubles des fonctions génitales Ménorragies — Stérilité.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20 6 amp. de 2 cc. à 0,50	15
Folliculine		6 amp. de 1 cc. à 200 U. I. 6 amp. de 1 cc. à 500 U. I. 6 amp. de 1 cc. à 1000 U. I.	20 — —
(Benzoate de di-Hydro) et	Hypo-ovarie : Aménorrhées, Oligoménorrhées. Dysménorrhées — Ménopause et Castration.	6 amp. de 1 cc. à 2000 U. I. 4 amp. de 1 cc. à 5000 U. I. 2 amp. de 1 cc. à 10.000 U. I. 1 amp. de 1 cc. à 50.000 U. I.	22 25 — 40
FOLLIDI-MYL			
Lipides de l'ovaire ou MINOVARIMUM	Hyperovarie : Hémorragies, Puberté précoce.	40 pilules à 0,15	16

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
Corps Jaune Vit E ou VIT - E - LUTEINE	Stérilité — Avortements à répétition.	40 pilules à 0,12 de c. j. et 1 gr. d'huile de germe de blé	18
PARATHY-ROIDE	Tétanie — Spasmophilie — Ulcus gastrique. Décalcification — Otosclérose Parkinson.	48 cach. à 0,001 0,002 et 0,01 et 0,02 amp. inj. en prép.	14 à 27
RATE Totale	Paludisme. Anémie, Tuberculoses.	24 cach. à 0,50 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.	15 15
Extraits désalbuminés ou	Dermatoses rebelles et prurigineuses	5 amp. de 3 cc. à 15 gr.	20
SPLENO-CRISINES	Asthme — Tuberculoses.	" — — 30 gr. 60 gr.	30 45
15-30-60			
SURRENALE totale (1 milligr. d'adrénaline pour 1 gr. de glande fraîche)	Maladie d'Addison — Intoxications et Choc opératoire — Syndrome infectieux malin — Collapsus. Asthénies — Décalcification.	30 et 24 cach. à 0,10 et 0,25 30 comp. à 0 gr. 10 6 amp. de 2 cc. à 0,50	12 et 14 12 15
Cortico Surrénale (exempte d'adrénaline)	Adynamies — Hypotension — Tr. psychiques — Alopecies.	30 et 24 cach. 0,10, 0,20 et 0,25 6 amp. de 2 cc. à 0,50	15 à 18 15
Adrénaline (Organique)	Asthénies — Hypotension — Collapsus — Mort apparente — Asthme.	Flacon de 15 gr. à 1 p. 1 000 6 amp. de 1 cc. à 1 milligr.	8,50 8,50
TESTICULE	Infantilisme génital — Obésité. Troubles sexuels M. Neuras-thénie sexuelle. Hypertrophie de la prostate. Stérilité.	24 cach. à 0,10 60 comp. à 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,50	16 12 15
Extrait hitique dissimulé ou	Médication complémentaire chez la femme — Troubles psychiques fém. par carence sexuelle.	40 comp. à 0,33 6 amp. de 2 cc. à 1,50	18 18
ANTAGONYL	Troubles de la croissance et du dévelop. intellectuel — Ectopie testiculaire.	24 cach. à 0,50 amp. sur demande.	15
THYMUS		48 cach. à 1, 2, 5, 10, 20, 25 milligr. 30 cach. à 0,05, 0,10, 0,20. 24 cach. à 0,25, 0,50	12 à 20
THYROIDE	Myxoedème — Obésité — Rhum. chron. Infantilisme et retards de la puberté. Athrepsie infantile — Migraines.	50 ou 30 compr. à 5 milligr. et 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,025	12 15
2 p. 1 000 d'Iode libre			
AUTRES GLANDES	Hypertrophie amygdalienne.	sur demande 30 cach. à 0,05 30 cach. à 0,20 30 cach. à 0,10	14 12 12
Amygdale	Affections neurologiques.		
Bulbe			
Cerveau			
Cervelet			

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
Cœur	Myocardite — Tr. du rythme	24 cach. à 0,50	12
Corps ciliaire	Iritis	48 cach. à 0,02	14
piphyse	Troubles du langage — Per- versions sexuelles.	30 cach. à 0,02	—
Ganglion	Angines — Fièvre ganglion- naire infantile.	30 cach. à 0,20	12
lymphatique	Troubles nerveux, réflexes —		
Ggl. grand	Angines de poitrine.	30 cach. à 0,10	18
sympathique	Métrorragies — Fibromes	24 cach. à 0,50	15
Mamelle	Épuisement.	30 cach. à 0,20	14
Moelle épi- nière	Anémies — Chlorose —		
Moelle osseuse	Leucémies.	24 cach. à 0,50	14
Muqueuse gastrique	Gastro-entérites —		
Muqueuse intestinale	Hypoepsie.	30 cach. à 0,20	12
	Entérites.	30 cach. à 0,20	12
Os	Décalcification — Fractures	30 cach. à 0,20	12
Pancréas	Dyspepsies — Intolérance lactée.	24 cach. à 0,50	12
Placenta	Galactogène	30 cach. à 0,10	12
Poumon	Suppurations et infections pulmonaires.	24 cach. à 0,50	15
Prostate	Névrosthénique —		
	Prostatites.	24 cach. à 0,25	12
Rein	Néphrites aiguës — Urémies	24 cach. à 0,25	12
Rétine	Rétinites — Iritis —		
	Choroïdites.	30 cach. à 0,05	12
Utérus	Infantilisme-Utérus —	Amp. injectables sur demande.	
	Métrites — Endométrites.		
COMPLEXES ENDOCRINIENS			
PLURIGLANDU- LAIRES F.	Débilité — Troubles de la puberté.	24 cach.	16
PLURIGLANDU- LAIRES M.		60 comp.	16
		6 amp.	16
CRINO- STHENYL	Convalescences — Asthénies psychiques et physiques.	40 compr. 6 amp. Sirop	18 18 18
CRINO- MENSTRYL	Régulateur fonctions ovariennes.	40 comp. 2 amp. lob. ant. Hypo. 2 amp. folliculine à 5 000 U. I.	20 25
ASSOCIATIONS POLYGLANDULAIRES			
Cachets	O.T. — O.H. — O.S. —		
Bivalents	A.T. — A.H. — A.S.		18
Trivalents	T.H.S. — T.H.O. — T.P.F.		
	T.O.S. — H.O.S. — T.H.A.	24 cachets	
	T.A.S. — H.A.S.		20
Quadri- valents	E.I.P.F. — H.T.S.O. — H.T.S.A.		20
S. H. A.	Crises d'Asthme	6 amp.	15

LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

Tél. : Diderot 86-45 (5 lignes groupées).

OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO

(Lipoïdes H. I.).

Définition. — Opothérapie complète contenant toutes les hormones spécifiques et les principes actifs de la glande renforcés par les lipoïdes et débarrassée des principes nocifs et inactifs.

Nomenclature :

Extrait ovarien	Gynocrinol.
Extrait orchitique.....	Androocrinol.
Extrait de la glande surrénale débarrassé d'adrénaline	Adrénol Total.
Extrait de la partie corticale de la glande surrénale	Adrénol Cortex,
Extrait du corps jaune	Gynolutéol.
Extrait du cerveau	Cérébroocrinol.
Extrait du placenta	Placentocrinol.
Extrait du foie	Hépatocrinol.
Extrait de l'hypophyse	Hypophysol.
Extrait de la rate	Splénocrinol.
Extrait du cœur	Cardiocrinol.
Etc...	

Présentation. — Pilules dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique (tube de 60). Ampoules injectables en solution huileuse, neutre, indolore, dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique par ampoule (boîte de 12).

Mode d'emploi :

Per os : 9 pilules par jour, en trois prises de 3 pilules avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : une injection hypodermique quotidienne ou trihebdomadaire.

Opothérapie associée.

Ovaire-Hypophyse.....	Gynohypophysol.
Ovaire, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Gynopolycrinol.
Glande orchitique, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Andropolycrinol.
Ces deux derniers produits n'existent que sous la forme pilule.	

AUTRES PRÉPARATIONS

Yo-Androl, } Voir à Yo-Androl.
Yo-Gynine. }

OPOPÉDOL (granulé thyroïdien) à l'usage infantile.

GYNÔ-GOUTTES, solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la totalité des principes actifs de l'ovaire. (Voir à *Gyna-Gouttes*.)

NOVOCORTEX, extrait de la partie corticale de la glande surrénale en gouttes (Voir à *Novocortex*.)

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 07-90.)

OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

(Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

FOIE DE VEAU

Cachets de 0 gr. 50

Dose d'entretien : 1, 2, 3 cachets par jour.

Dose maxima : de 8 à 10 cachets par jour.

Indications. — Anémies graves et pernicieuses. Déchéances organiques. Convalescences. Troubles hépatiques.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 francs.

COMPLEXE F

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'ovaires.....	0,10
— d'hypophyses	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Arriération féminine. Retard des signes de la puberté. Syndromes adiposo-génitaux. Faiblesses générales. Surdité, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 francs.

COMPLEXE H

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— de testicules	0,10
— d'hypophyses	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Infantilisme masculin. Développement retardé. Syndromes adiposo-génitaux. Surdité. Boîte de 20 cachets : Public : 24 francs.

OVARINE COMPOSÉE

Cachets de 0,10

Poudre d'ovaires	0,075
— de testicules	0,025

Dose normale : 1 cachet matin et soir, 5 jours avant la date présumée des règles.

Indications. — Insuffisance ovarienne. Ménopause. Troubles menstruels. Règles insuffisantes. Aménorrhée. Dysménorrhées, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 20 francs.

OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

(Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.)

RATE

Cachets de 0,35 (Poudre de rate de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 1 cachet matin, midi et soir.

Indications. — Paludisme. Cachexie palustre. Hypertrophie de la rate. Toutes les anémies. Hémorragies utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 20 francs.

REINS

Cachets de 0,25 (Poudre de reins de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Accidents urémiques. Insuffisance de l'activité rénale. Néphrites aiguës, infectieuses et toxiques. Brightisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 20 francs.

TESTICULINE COMPOSÉE

Cachets de 0,20

Poudre de testicules 0,175

Poudre d'ovaires..... 0,025

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir ; 15 jours par mois.

Indications. — Insuffisance organique. Impuissance fonctionnelle. Débilité sénile. Asthénie musculaire et nerveuse. Infantilisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 20 francs.

MAMMAIRE

Cachets de 0,40 (mamelles de vaches).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Stimulante de la sécrétion lactée chez les nourrices insuffisantes. Régulatrice d'un fonctionnement utéro-ovarien excessif. Congestions utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 francs.

THYMUS

Cachets de 0,50 (Poudre de thymus de veau).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Maladies de Basedow. Goitre simple. Enfance débile. Troubles de la croissance et de la nutrition.

Boîte de 20 cachets. — Public : 24 francs.

Laboratoires LAURIAT

La Garenne-Colombes — SEINE.

(Tél.: Charlebourg 23-78.)

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

En **Sphérulines**, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous les extraits totaux préparés avec des glandes fraîches, par dessiccation à froid dans le vide profond.

1° Sphérulines monergiques.

Dosages (suivant les extraits) : 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Sphérulines thyroïdiennes : 0 gr. 001, 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10.

Sphérulines parathyroïdiennes : 0 gr. 001.

Posologie. — 1 à 6 par jour, sauf hépatiques et rénales : 1 à 16.

Prix : de 16 à 20 francs l'étui de 30 à 80 sphérulines, suivant extraits et dosages.

2° Sphérulines synergiques.

(Associations opothérapiques.)

Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Thyro-surrénales, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, Surréno-orchitiques, Surréno-hypophysaires, Entéro-pancréatiques, Thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-surréno-Thyroïdiennes, Hypophyso-surréno-ovariennes, Hypophyso-ovaro-thyroïdiennes, Hypophyso-thyro-surréno-ovariennes, Hypophyso-thyro-surréno-orchitiques.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

Prix : de 20 à 22 francs l'étui de 20 à 36 Sphérulines (suivant associations).

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Opothérapie fraîche, préparée de suite, au reçu de la prescription médicale, **avec des glandes fraîches pour être ingérées fraîches.**

Préparations datées. Tous dosages, organes et associations.

Prix : variables suivant les dosages, organes, associations et nombre de prises formulés.

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.
(Tél. : Molitor 08-47.)

OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques ;

Pour les *adultes* : le *cachet* et le *suppositoire* (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants* : le *suppositoire* (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0 gr. 50, 1 boîte.

Pancréas Pellissier, cachets à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0 gr. 25, 1 boîte, etc.

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 mgr., 1 boîte.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de surrénale, à 0 gr. 05, 1 boîte.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0 gr. 25, 1 boîte.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les *Comprimés de Silicate de soude Pellissier*, à 0 gr. 25.

Les *Ampoules de Silicate de soude Pellissier*, pour l'injection intraveineuse, pour le traitement de l'artériosclérose. Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

Laboratoires PELLISSIER

33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 14-59.)

Usine : 18, Grande-Rue — ASNIÈRES (Seine).

OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-ÉMULSION

Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1° L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar-phtaléinée).

Indications. — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.
Prix du flacon : 18 francs.

2° L'autre, émolliente : **Vacuoline-Émulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

Indications. — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.
Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoires DECHOSAL

39, rue de la Gare — BONDY (Seine).

OPOZONES LUMIÈRE

Préparation à base de glande fraîche.

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

Constitution. — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

Propriétés. — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues

1° Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale.

Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2° Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3° La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.

Doses courantes. — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

Formuler. — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

Prix : 20 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON

OPTALIDON

Forme et composition. — Comprimés dragéifiés renfermant : Isobutylallyl-malonylurée, 0 gr. 050; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125; Caféine, 0 gr. 025.

Propriétés. — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats. Laisse et restitue au malade toute faculté de s'occuper, de travailler ou de se distraire.

Indications. — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

Posologie. — Dose antinévralgique : commencer par 2 dragées prises à la fois et continuer, s'il y a lieu, par 1 dragée, de 1/2 heure en 1/2 heure. Au maximum 8 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, à partir de 5 ans.

Prix :

Tube de 10 : 6 fr. — Flacon de 25 : 12 fr. ; de 100 : 42 fr. ; de 250 : 96 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

OPTICURA BENGUÉ

Collyre en flacon compte-gouttes de conception spéciale. Les gouttes sont obtenues par la dilatation de l'air dans le flacon, sous l'influence de la chaleur de la main.

Composition :

Eau de rose	25 gr.
Eau distillée.....	75 gr.
Sulfate de zinc	0 gr. 45
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 30
Esérine	5 gr.

Avantages. — Le liquide ne peut s'altérer par le contact d'un compte-gouttes ou de l'atmosphère.

Indications. — Toutes les affections des yeux : conjonctivite, blépharite, larmoiement, fatigue oculaire produite par le travail à la lumière, par le soleil, par une poussière, par le vent.

Posologie. — Une goutte dans chaque œil, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 13 francs.

Laboratoire du Dr **BENGUÉ et Fils**,
16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

OPTIPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

Forme. — Occlusive ou perforée, en rouleaux de :
1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ;
5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de large.

Avantages. — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

Indications. — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)
Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :
104, faubourg Poissonnière (X^e).
(Tél. : Lamartine 92-52.)

OPTO SCOTT

Produits Ophtalmiques Scott :

Opto-Gouttes. — Opto-Tubes. — Opto-Bain. — Opto-Borine.

Notre but : 1° Constance absolue de nos préparations.

2° Asepsie rigoureuse.

3° Groupement de l'arsenal ophtalmologique en un seul mot : *Opto-Gouttes, Opto-Tubes, Opto-Bain, Opto-Borine.*

4° Présentation toute nouvelle correspondant à la perfection pour chacun de nos produits :

<i>Opto-Gouttes</i> : le flacon spécial.....	12 fr.
<i>Opto-Tubes</i> : le tube spécial à canule	7 —
<i>Opto-Bain</i> : l'œillère spéciale	18 —
<i>Opto-Borine</i> : le sachet antiseptique.....	10 —

Opto-Gouttes :

N° 1 Sulfate neutre d'Atropine	1	p. 100
N° 2 Nitrate de Pilocarpine.....	2	p. 100
N° 3 Argyrol	3	p. 100
N° 4 Sulfate de zinc	0,5	p. 100
N° 5 Sulfate de zinc	1	p. 100
Novocaïne	1	p. 100

Opto-Tubes :

N° 1 Oxyde jaune de Mercure	1	p. 100
N° 2 Ichtyol	2,5	p. 100
Oxyde de zinc	5	p. 100
N° 4 Cuprol	1	p. 100

Opto-Bain :

Sulfate de zinc	0,03
Sulfate de cuivre.....	0,007
Eau de laurier-cerise	3,3
Fluorescéine.....	0,002
Eau distillée de Melilot.....	Q. S. pour. 100 gr.

Opto-Borine :

Acide Borique	1 gr.
Borate de soude	1 gr.
Fluorescéine : Q. S.	
Essence de lavande : Q. S. par sachet.	

Produits enregistrés au L. N. C. M.

SCOTT et Fils, pharmaciens.

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 90-85.)

ORARGOL AMICROS

**Complexe colloïdal électrique
Or et Argent.**

Anti-Infectieux Général.

I. ORARGOL INJECTABLE (0,05 %). AMPOULES

Boîte de 6 amp. 5 cc. : 20 fr.

Tube de 1 amp. 10 cc. : 7 fr.

— 2 amp. 5 cc. : 7 fr.

**Septicémies, Grippe, Fièvres, Traite-
ment pré et post-opératoire.**

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection, seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

II. ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %).

Gouttes. — Flacon de 60 gr. : 20 francs.

**Grippes, Fièvres, Thérapeutique infan-
tile.**

Posologie. — XX à C gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire sans inconvénient.

Rhino-Orargol. — Fl. 20 gr. : 15 francs.
(Compte-gouttes et instillateur nasal.)

IV à V gouttes en instillations nasales.

X à XV gouttes en gargarismes.

III. ORARGOL-COLLYRE

Orargol-Collyre (solution isotonique 0,2 %).

Boîte de 4 ampoules 1 cc. 5 : 15 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal comme collyre.

Laboratoire des Produits AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

OR-BOULARD

En ampoules buvables.

Indications. — Grandes infections (septicémies), érysipèle, bacilliose et état prébacillaire, infections générales, anthrax, création d'une action de choc, anémie cérébrale, infections puerpérales, coli-bacilliose.

Composition. Chaque ampoule contient :

1° De l'or sous forme de complexe organo-métallique ;

2° Des levures vivantes dans leur milieu isotonique ;

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, de préférence le matin à jeun. La métabolisation est déjà faite en grande partie par les levures. L'assimilation est extrêmement rapide ; il y a intérêt à agir par doses fréquentes et répétées.

Verser le contenu de l'ampoule dans un liquide quelconque, de préférence sucré et tiède (eau, vin, bière, tisane).

Prix : 80 francs la boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5.

Voir aussi les autres complexes organo-métalliques :

Argent-Boulard, Iodure-Boulard, Magnésium-Boulard, Hydragyre-Boulard, l'alternance quotidienne de deux complexes Boulard étant souvent recommandable.

Laboratoire CERBELAUD

Docteur en Pharmacie,

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 16-66.)

ORCALCINE

(Granulé)

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Régénérateur complet du sang et recalcifiant intégral. Véritable régénérateur organique. Résultats cliniques remarquablement constants et durables.

Composition. — Extraits hépatiques et spléniques concentrés 33 fois.

+ Fer, Phosphore, Calcium.

+ Chlorophylle et Carotène.

+ Sels d'or à dose homéopathique.

Posologie :

Enfants : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Adultes : 2 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix : 16 fr. 50 (pour 15 jours de traitement).

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires de l'Orcalcine

9, rue de La Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

OREX

Médication orchitique chez la femme.

Formule dissimulée

Gouttes, Dragées, Ampoules.

Composition. — Extrait orchitique total standardisé. (Procédé Crinex.)

Gouttes : Solution alcoolique, 1 cc. (XL gouttes) = 2 gr. de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = V gouttes.

Ampoules injectables indolores, solution aqueuse isotonique. 1 cc. correspond à 2 gr. de glande fraîche.

Mode d'action. — Active la fonction ovarienne. Rétablit l'équilibre entre les sécrétions femelle et mâle de l'ovaire. Stimule l'activité du système nerveux et des échanges.

Supplée au manque d'imprégnation spermatique.

Indications. — Tous les troubles génitaux, généraux, nerveux, psychiques ou cutanés, d'origine endocrinienne, rebelles à l'opothérapie homologue (ovarienne). Troubles psycho-génitaux par carence sexuelle (célibat, veuvage, etc.). Paresse intellectuelle. Affaiblissement de la mémoire. Psychasthénie. Nervosisme. Insomnies rebelles. Acné juvénile, engelures, érythrocyanose, hyperhidrose, Prurit vulvaire (diabétique ou sénile). Obésité. Nymphomanie.

Posologie. — *Gouttes*, dose moyenne : XV à XL gouttes par jour, en 2 ou 3 fois, *loin des repas*, vingt jours par mois (3 à 8 dragées à croquer).

Ampoules : Injecter une ampoule tous les 1, 2 ou 3 jours suivant le cas.

Prix, gouttes ou dragées : 16 fr. (20 à 30 jours).

La boîte de 6 ampoules : 30 francs.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur-Lannelongue.

PARIS (XIV^e). (Tél. : Alésia 28-51.)

OREXYL

Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants, ranime l'appétit.

Composition. — Persulfates alcalins, métavanadate de soude, fluorure de sodium, tannate d'orexine, glycérophosphate de chaux.

Formes. — Granulé et comprimés.

Indications. — L'OrexyL est indiqué dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme : Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenages, physique ou intellectuel, Fractures, Convalescences.

Posologie. — *Enfants* : Une cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, quelques instants avant les deux principaux repas, ou un comprimé. *Adultes* : Une cuillerée à soupe de granulé, ou deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chaque repas.

Prix : Le flac., granulé : 18 fr., 15 j. de trait. p. enfants.
comprimés : 20 fr., 20 j. de trait. p. adultes.

Paul PHILIPPE

Docteur en Médecine — Pharmacien de 1^{re} classe.
5, rue Mazard — LYON (Rhône). — (Tél. : Franklin 34-02.)

ORGANESIUM

Médication stimulante — Tonique — Réparatrice — Association Opo-magnésienne.

Forme : Granulé de goût agréable.

Formule :

Lobe antérieur hypophyse.....	0, 15
Extrait de glandes orchitiques.....	1, 20
Extrait de glande interstitielle.....	0, 40
Inosito-hexaphosphate de magnésium et de calcium.....	3, 00
Nucléinate de magnésium.....	0, 125

Excipient. Q. s. pour 100 gr.

Prix : 19 fr. 50 la boîte.

Action et indications thérapeutiques.

- 1^o *Action stimulante sur l'état général.* — Anémies, convalescences, états dépressifs, surmenage physique.
- 2^o *Action tonique sur le système nerveux et neuro-musculaire.* — Troubles nerveux, asthénie, fatigue cérébrale et certains phénomènes séniles, tremblements, crampes, contractures.
- 3^o *Action reminéralisante et fixatrice du calcium.* — Croissance, rachitisme, convalescence des maladies infectieuses.

Doses :

Enfants. — 1 cuillerée à café.

Adultes. — 1 cuillerée à soupe avant les deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Mettre directement la cuillerée de granulé dans la bouche en une ou plusieurs reprises, avaler ensuite une gorgée d'eau.

Echantillon sur demande. — Grossistes dépositaires O. C. P. et C. N. P. F.

Laboratoires DOUETTEAU Frères

20, faubourg Saint-Honoré — PARIS

ORGANI-CALCION SIMPLE

30 Cachets de gluconate de Ca français dosés à 0 gr. 50
2 à 10 par jour.

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium
(saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique
les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique,
coagulant, Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale,
pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (œdème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire, rhume des foins, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodophilie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement
l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

Organi-Calcion injectable : 5 amp. de 5 cc. solution
10 p. 100 stable et 5 amp. de 10 cc.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 10 jours.

Laboratoire National de Contrôle 196-4 et 5.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX. (Tél. : 340-29.)

ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINÉ

Opothérapie stimulante.

Granulé de Calcium soluble et Phosphore organiques
associés à une synergie glandulaire et aux vitamines
A, B et D. Assimilable par voie gastrique. Association
médicamenteuse très active, répondant aux plus
récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

Indications. — Déficiences glandulaires, neurasthénie,
pré-carences (troubles entéritiques, asthénie, anémie).
Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la
croissance. Toutes déminéralisations, convalescence,
surmenage, débilité, Grossesse, allaitement, Tuberculose,
Rhumatisme chronique, Aérophagie.

Posologie. — *Nourrissons* : 1/2 cuillerée à café par jour;
enfants de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café ; de 5 à
10 ans : 3 cuillerées à café ; *adultes* : 3 cuillerées à
dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine
ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 20 francs. (Durée minimum 10 jours.)

Laboratoire National de Contrôle, 196-3.

Laboratoires du VIOPHAN

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX. (Tél. : 340-29.)

ORTHOCHOL

Granulé.

Médications de tous les États Hépatobiliaires.

Cholécystites avec ou sans Lithiase, gros foie, Congestion hépatique, nausées, troubles gastriques et d'origine hépatique.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour dans un verre d'eau chaude.

Formule. — Sulfate de magnésium, sel de seignette, Benzoate de lithine, masse effervescente.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Mon. 33-86.)

ORTHOCUMÈNE LAXATIF

Composition. — Association synergique et complémentaire de : *Curcuma Xanthorriza* R. (Temoe Lawaq) 0 gr. 12, Extrait mou *Orthosiphon Stamineus* 0 gr. 12, Evonymine brune 0 gr. 02, Agar-Agar 0 gr. 10, Ferment lactique 0 gr. 10, Pancréatine 0 gr. 03, Extrait jusquiame 0 gr. 005 pour un cachet.

Propriétés. — *Cholérétique, Cholestérolitique, Chologogue* puissant s'opposant aux spasmes vésiculaires, tonique très actif de la cellule hépatique stimulant de ses fonctions antitoxiques (Curcuma).

Action sur le syndrome HépatO-rénal et Entéro-rénal, sur Cholémie. — Cholestérinémie, Oligurie, Azotémie, Uricémie (Orthosiphon). Assure une digestion intestinale complète (drainage biliaire, pancréatine). Création d'un milieu favorable à l'ensemencement lactique opéré simultanément. Désinfection biliaire et intestinale. Suppression de la stase intestinale par dissociation du bol fécal (agar-agar) et réveil du péristaltisme (afflux biliaire, évonymine).

Destination.

- A. *Toutes constipations* : stases intestinales et leurs conséquences.
- B. *Toutes insuffisances hépatiques* : manifestations anaphylactiques et arthritiques. Affections hépatobiliaires (lithiase, angiocholite, cholécystite, ictère, etc.). Syndrome HépatO-rénal et Entéro-rénal, Cellulites.
- C. Infection intestinale, Entérites, Colibacillose (voir *Ortho-Fokène*), etc.

Nota. — Pour les cas à forme dysentérique, voir à *Orthocumène simple*.

Avantages. — Ni toxique, ni irritant.

Présentation et prix. — Étuis de 24 cachets. Prix : 12 francs. Durée normale : 12 à 24 jours.

Posologie. — 1 à 2 cachets le soir.

Références. — 1° Études par le Dr H. Leclercq, président de la Société de Thérapeutique, sur le *Curcuma Xanthorriza* R (Temoe Lawaq) dans la thérapeutique hépato-biliaire, le traitement des Cellulites, etc. (*Courrier Médical* du 30 juin 1935 et *Journal de Médecine et Chirurgie Pratiques* du 25 mars 1937) ;

2° Études du Dr F. Decaux, médecin consultant à Vittel sur l'*Orthosiphon Stamineus* (*Presse Médicale* du 21 mai 1936) ;

3° Études des Drs H. Leclercq et Van Der Elst sur l'*Orthosiphon* dans la médecine post-opératoire (*Presse Médicale* du 7 octobre 1936).

4° Communication par les Drs H. et L. Mercier et F. Decaux à la *Société de Thérapeutique* sur l'*Orthosiphon* (janvier 1936), etc.

Laboratoires P. BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS (XIX°).

(Tél. : Combat 11-02.)

ORTHOCUMÈNE SIMPLE

Composition. — Association synergique et complémentaire de :

<i>Curcuma Xanthorriza</i> R. (Temoe Lawaq)	0,12
Extrait mou <i>Orthosiphon Stamineus</i>	0,12
Extrait mou <i>Palicourea Densiflora</i>	0,015
Pancréatine	0,03
Ferment lactique	0,10
Agar-Agar	0,10

Pour un cachet.

Propriétés. — *Cholérétique, cholestérolytique, cholagogue* puissant s'opposant aux spasmes vésiculaires. Tonique très actif de la cellule hépatique, stimulant de ses fonctions antitoxiques (*Curcuma*).

Action sur le syndrome Hépato-rénal et Entéro-rénal, sur cholémie. Cholestérinémie, Oligurie, Azotémie, Uricémie (Orthosiphon).

Assure une digestion intestinale complète (drainage biliaire et pancréatique).

Création d'un milieu favorable à l'ensemencement lactique opéré simultanément.

Désinfection biliaire et intestinale.

Accentuation de la circulation sanguine de l'abdomen, d'où amélioration de la digestion, de l'absorption et de l'appétit par l'extrait de *Palicourea* qui, d'autre part, sans être ni toxique, ni hypnotique, supprime coliques et dysenteries rebelles et enfin tonifie la muqueuse intestinale.

Action émolliente de l'Agar-Agar.

Indications :

A. *Dysenterie, Dysenterie Amébienne, Coliques.*

B. *Toutes Insuffisances hépatiques.* Manifestations anaphylactiques et arthritiques.

Toutes affections hépato-biliaires (lithiase, angiocholites, cholécystite, ictère, etc...).

Syndrome hépato-rénal et entéro-rénal, cellulites.

C. Infection intestinale, Entérites, Colibacillose (voir *Ortho-Fokène*), etc.

Nota : Pour les cas de constipation, voir à *Orthocumène laxatif*.

Avantages. — Non toxique, Sédatif.

Présentation et prix : Euis de 24 cachets : 12 francs. Durée normale 12 jours.

Posologie. — Cas normal : 1 cachet midi et soir 1/4 d'heure avant le repas, en cas de dysenterie : 4 à 8 par jour.

Références :

1° Etudes par le Dr H. Leclercq, président de la Société de Thérapeutique sur le *Curcuma Xanthorriza* R. (Temoe Lawaq) dans la Thérapeutique hépato-biliaire, le traitement des Cellulites, etc... (*Courrier médical* du 30 juin 1935 et *Journal de Médecine et Chirurgie pratiques* du 25 mars 1937).

2° Etude du Dr F. Decaux, médecin consultant à Vittel sur l'*Orthosiphon Stamineus* (*Presse médicale* du 21 mai 1936).

3° Etudes des Docteurs H. Leclercq et Van Der Elst sur l'*Orthosiphon* dans la médecine post-opératoire (*Presse médicale* du 7 octobre 1936).

4° Communication par les Drs H. et L. Mercier et F. Decaux, à la Société de Thérapeutiques sur l'*Orthosiphon* (Janvier 1936), etc.

Laboratoires P. BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS (XIX^e). (Tél. : Combat 11-02.)

ORTHOCYNOL

Dragées.

Médication de *stimulation hépato-spléno-rénale* à base de *Cynara*, d'*Orthosyphon*, d'*acide ascorbique* (*Vitamine C*) et de *Quinquina*.

Propriétés. — Sollicite les sécrétions hépato-biliaires. Mobilise et élimine la cholestérine en surcharge. Active les sécrétions rénales (aqueuse, azotée, chlorurée). Combat la sclérose viscérale et l'arthritisme. Corrige les dyscrasies sanguines.

Indications. — Insuffisance hépatique (ictère, troubles digestifs, manifestations cutanées, troubles liés à l'imperméabilité rénale).

Foie colonial, Brightisme, oligurie, hépato-néphrites aiguës. Scléroses viscérales et vasculaires. Diathèse arthritique. Diathèse hémorragique. Trouve ses applications tant en médecine d'adulte qu'en chirurgie et en pédiatrie.

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, au cours des repas avec une tasse d'infusion chaude, 1/2 dose pour les enfants.

Cure : 10 à 20 jours par mois.

L'étui de 50 dragées : 20 francs.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e).

ORTHO-FOKÉNE

Cachets

Composition :

Association synergique et complémentaire de	
<i>Fokiénol</i> pur	0,15
Curcuma Xanthorriza	0,05
Ext. mou <i>Orthosiphon Stamineus</i>	0,20
Prêle pulv.	Q. S. pour 1 cachet.

Propriétés. — Bactéricide, Décongestif, Sédatif, Cicatrisant, Diurétique, Uropoiétique.

Indications générales. — Toutes infections et affections congestives et douloureuses de l'appareil urinaire. Syndrome hépato-rénal et entéro-rénal. Manifestations arthritiques.

Indications particulières. — Toutes *Urétrites*, *Cystites*, Prostatites, Congestion rénale, *Colibacillose*, Pyérites, Pyélonéphrites, Ténésme, Oligurie, Azotémie, Uricémie, Cholémie, Gravelle.

Avantages. — Non toxique. Parfaitement toléré. Pas de contre-indications.

Présentation et prix. — Etui de 24 cachets. Prix : 18 fr. 50. Durée moyenne 6 à 8 jours.

Posologie. — 3 à 6 cachets par jour, avant ou au début des repas.

Références. — Communication à l'Académie des Sciences (1931) par M. le professeur Sabatier, thèse du Dr Fambavien (1932) sur le Fokiénol.

Etude par le Dr F. Decaux, médecin consultant à Vittel sur l'*Orthosiphon Stamineus* (*Presse médicale* du 21 mai 1935).

Etude par le Dr H. Leclercq, président de la *Société de Thérapeutique*, et le Dr Van Der Elst sur l'*Orthosiphon Stamineus* dans la thérapeutique post-opératoire (*Presse médicale* du 7 octobre 1936).

Etudes par le Dr H. Leclercq sur le Curcuma Xanthorriza R. (*Courrier médical* du 30 juin 1935 et *Journal de Médecine et Chirurgie pratiques* du 25 mars 1937).

Communication à la *Société de Thérapeutiques* (janvier 1936) sur l'*Orthosiphon* par les Drs H. et L. Mercier et F. Decaux, etc.

Laboratoires BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Combat 11-02.)

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude	0 gr. 10

Pour 1 paquet; n° 30.

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 9 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharm. de 1^{re} classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.
15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36).

ORTHOGÉNOL

Traitement de Base des Maladies de l'Age mûr.

Formule de redressement biologique (1) du Docteur A. VERNIER

- Composition.** — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiol.)
- + Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).
- Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

Indications. — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique. Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique. Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

Présentation. — Deux formes : *Cachets* et *Élixir*.

Posologie. — L'ORTHOGÉNOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets ou cuillerées à soupe d'élixir par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec Anasarque, Hydropisie, Asystolie), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les *Débâcles libératrices* sous l'action conjuguée des *Dépurateurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (2).

- (1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazauric (*Thèse de Montpellier*, 1931).
- (2) Dermo-révuulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

Prix : 32 francs.

Laboratoires BELIÈRES
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ORTHOLAXINE

Présentation. — Dragées à noyau central glutinisé sous un revêtement se dissociant dans l'estomac.

Composition.

Revêtement externe soluble dans l'estomac.	{	Extrait de Cascara Sagrada privé d'amertume.....	0gr.035
		Extrait de bourdaine.....	0gr.050
		Poudre d'aloès.....	0gr.025
		Evonymine brune.....	0gr.015
		Extrait de belladone.....	0gr.005
Noyau central ne se dissociant que dans l'intestin.	{	Poudre de belladone.....	0gr.005
		Poudre de muqueuse d'intestin grêle.....	0gr.05
		Extrait inaltérable de fiel de bœuf.....	0gr.05
		Extrait pancréatique.....	0gr.03
		Ferments lactiques.....	0gr.05
		Essence d'anis.....	0gr.025

Action physiologique. — Laxatif doux ne provoquant aucun spasme ni colique, aucune irritation ni accoutumance.

Indications. — La *Constipation* chronique ou passagère, sous toutes ses formes, avec toutes ses conséquences habituelles : affections gastro-hépatiques, entérites, maladies de la nutrition, arthritisme, migraines, affections cutanées, hémorroïdes, syndrome entéro-rénal, etc...

Posologie. — Comme laxatif habituel, une ou deux dragées avant le dîner (une ou deux dragées supplémentaires dont les cas de constipation rebelle).

Laboratoires de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

Spécialités Phargène VIAL et C^{ie}

8, rue Vivienne — Paris (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

ORTHOPHORINE

Composition. — Granulé soluble, d'un goût agréable sans acidité brutale, pouvant se croquer pur.

Acide orthophosphorique	7 gr.
Phosphate disodique crist	14 gr.
Sucre	20 gr.
Lactose	Q. S. P. 100 gr.

Une cuillerée à café = VI gouttes PO⁴ H³ libre.

Indications. — Troubles de la nutrition, Lithiase phosphatique, Etats alcalosiques, Dermatoses, Dyspepsie, Céphalées, Prétuberculose, Phosphaturie, Déminéralisation, Oxalémie, Arthritisme, Anémie.

Tonique du système nerveux, Asthénie, Mélancolie, Surmenage physique et intellectuel.

Mode d'emploi. — Se prend au milieu des repas, pure ou dans un peu d'eau.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1/2 dose.

Prix : Traitement pour 7 jours, 15 francs.

Laboratoires A. LEBLOND

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

Tél. : Longchamp 07-36.)

ORTHOSEDAN

Comprimés.

Régulateur du Système Vago-Sympathique.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications. — Céphalées, Migraines, Anxiété, Angor, états dépressifs.

Composition. — Dionine, Théobromine, Extrait de Cratægus, Phénylméthyl malonylurée.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Moncey 33-86.)

OSMOLÉINE

Pommade stérilisée antiseptique pour pansement de la muqueuse des fosses nasales.

Composition. — Camphre, Benzoate de soude, Soufre précipité, Acide borique, Menthol, Essence de géranium rosat.

Propriétés. — Désinfection de l'auvent nasal, de la filière nasale jusqu'à sa partie postérieure.

Indications. — Toutes les affections subaiguës ou chroniques des fosses nasales : l'ozène avec sécrétion et croûtes fétides, les séquelles de sinusite maxillaire et frontale.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché pour vider les fosses nasales, aspirer doucement par l'une et par l'autre narine alternativement, le volume d'un pois de la pommade, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec olive nasale.

Prix : 8 francs.

L. N. C. 314-35.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS. (Tél. : Marcadet 14-14.)

OSMO-PEPTINE SANOVA

Comprimés destinés à donner une solution osmotique qui dialysera la muqueuse stomacale, la cellule hépatique et la vésicule biliaire.

Formule par comprimé :

Sulfate de Soude.....	0,14
Sulfate de Magnésie.....	0,14
Sesquiphosphate de Soude.....	0,04
Bromure de Sodium.....	0,05
Peptone.....	0,02
Bicarbonate de Soude.....	0,10

Champ d'action : Tous les troubles de l'estomac, du foie et de la vésicule.

Principales indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, fermentations, ballonnement, digestions pénibles, migraine, urticaire, surmenage alimentaire, neurasthénie dyspeptique, ulcères, gastropathies hépatiques et biliaires, constipation.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés à jeun dans un verre d'eau chaude. Petit déjeuner 1 heure après. Pendant 12 à 15 jours consécutifs chaque mois ou tous les 2 matins en alternant avec un comprimé d'Hépatisme le soir en dinant.

En cas de brûlures, de lourdeurs ou de malaises de l'estomac, on peut, dans la journée, croquer 3 ou 4 comprimés si on n'a pas d'eau chaude.

Prix : 12 francs le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT, 103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

OSMO-VACCINS BRÉANT COLIBACILLES

Vaccins par voie buccale, par pansements ou par instillations vésicales.

Composition. — 200 milliards de germes :

Colibacilles.....	150 milliards.
Entérocoques.....	30 —
Bacillus proteus.....	10 —
Staphylocoques.....	10 —
Endo et exotoxines en milieu osmotique.	10 cc.

Indications. — Infections intestinales (colites, entérocolites, etc.), Syndrome entéro-rénal, colibacillurie, soins pré et post-opératoire, etc...).

Posologie. — Une ampoule, le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau.

Boîte de 8 ampoules de 10 cc..... 36 fr.

Boîte cure de 18 ampoules de 10 cc..... 50 —

N. B. — Existents :

Les **Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques** (ampoules et ovules).

Les **Osmo-Vaccins Bréant Rhino** (ampoules).

Les **Osmo-Vaccins Bréant Staphylo** (ampoules).

LABORATOIRES D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy. — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

OSTÉOGÈNE

Phosphate calcique moléculaire véritablement assimilable à l'état *naissant* et très riche.

Une cuillerée à café arasée contient 1 gr. de Phosphate de Chaux actif.

Forme. — Crème agréable au goût, non acide.

Indications. — Convient à tous les âges et à toutes les affections osseuses.

Enfants : favorise la croissance et la dentition.

Adolescents : aide puissamment au travail intellectuel.

Adultes : tous les cas de déficience minérale : phtisie, allaitement, surmenage, etc..

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour aux repas.

Le pot de 350 gr. environ : 20 francs.

Laboratoires H. AMMANN, Pharmacien
BOULOGNE-BILLANCOURT, Impasse Adam, 3.
(Tél. : Molitor 01-90.)

OSTÉOGLANDULOL

Granulé — Comprimé
Opothérapie glandulaire.

Par l'emploi de glandes fraîches à sécrétion interne conservant toutes leurs propriétés par un procédé spécial de fabrication.

Traitement rationnel des insuffisances glandulaires et de la décalcification.

Indications. — Anémie, Rachitisme, Déminéralisation, Chlorose, Croissance tardive, Décalcification, Sénilité précoce, Neurasthénie, Hypochondrie, Troubles nerveux.

Granulé : Une cuillerée à café contient :

Poudre d'os 0,10 Moelle osseuse..... 0,02
Surrénale..... 0,01 Orchitine....0,10 Excipient saccharolé q. s.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à café matin, midi et soir, directement ou dans un 1/2 verre d'eau. *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, 2 ou 3 fois par jour suivant les indications du médecin.

Comprimés. — Même composition que le granulé.

Deux comprimés représentent 1 cuillerée à café.

Les comprimés peuvent être prescrits aux diabétiques.

Doses. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour, en 3 fois, matin, midi et soir. *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BERGER, 14, rue des Pyramides — PARIS.
Envoi gratuit d'un flacon d'Ostéoglandulol (granulé ou comprimé)
au choix du Docteur.

OSTÉOPEPTINE

Composition. — Poudre de moelle osseuse rouge. Pepsine extractive. Phosphate tricalcique.

En dragées chocolatées, facilement acceptées par les enfants.

Indications. — Dyspepsie et anorexie infantiles. Insuffisance de poids et de taille. Convalescence des maladies infantiles aiguës.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour avant les repas.

Prix : 18 francs la boîte de 30 comprimés.

LES LABORATOIRES DRAPIER

RETHEL (Ardennes).

OSTRÉIODE

Eau de mer, biologiquement suriodée; procédé Salles-D^r Loubatie.

Composition. — Eau de mer naturelle iodoactivée par un procédé respectant les lois de la nature et le cycle de l'iode dans les océans.

Présence de quantités d'iode importantes par rapport à la teneur en iode du milieu marin et sous ses diverses formes dont la forme thyroïdienne. Moyenne : 80 milligrammes par litre d'iode assimilable.

Indications. — Lymphatisme sous toutes ses formes. Croissances difficiles. Asthénie des convalescents. Inappétences. Dépressions. Anémies. Rachitisme. Dysthyroïdies. Toutes les cures marines à domicile.

Posologie. — *Adultes* : 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants : demi-dose.

Petits enfants : 2 cuillerées à dessert.

Au début des repas, pure ou dans un liquide tiède ou froid.

Prix : 20 francs le flacon d'un demi-litre.

OSTRÉIODE Injectable

Composition. — Eau de mer iodoactivée biologiquement par le procédé Salles-D^r Loubatie. Procédé permettant le maintien de la vie marine en milieu directement isotonique, au sérum sanguin ou légèrement hypertonique. Aucune adjonction d'eau distillée.

Teneur en iode : 40 milligr. par litre.

Indications. — Toutes les indications du traitement marin enrichi en iode vital. Effets extrêmement rapides dans carences minérales.

Prétuberculose, rachitisme, croissance, lymphatisme, suites opératoires, surmenage, anémies secondaires, infections, convalescences, paludisme, séquelles coloniales.

Mode d'emploi. — Série de 8 injections — une tous les deux jours. Voie sous-cutanée. Interrompre 10 jours et reprendre.

Présentation. — Boîte de 8 ampoules de 10 cc.

Prix : 30 francs.

Laboratoires de l'OSTRÉIODE

avenue Nelly-Deganne — ARCAÇON (Gironde).

Agent général de vente : S. I. T. S. A.

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

OTALGOLEX

(Ex-Otalgol-Spécifique des Otalgies)

Tube instillateur de soluté neutre glycérimé rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

Composition. — Sol. d'adrénaline, stovaine, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

Propriétés. — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

Mode d'emploi. — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 12 francs
pour 15 jours de traitement.

Dépôt général pour la France.

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

OTOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldi-butylaminopropanol, adrénaline, acide phénique cristallisé, glycérine neutre.

Propriétés. — Analgésique, vaso-constrictive, décongestive et antiseptique.

Indications. — Otites externes, otites moyennes, sèches ou suppurées, et toutes affections congestives, subaiguës ou chroniques de l'appareil auditif.

Présentation et prix. — Un flacon : 13 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 2 fois par jour, instiller après avoir fait tiédier au bain-marie quelques gouttes d'OTOLÉINE dans chaque oreille, et recouvrir d'un tampon d'ouate stérile.

Laboratoires de Thérapeutique

Oto-rhino-laryngologique.

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif cristallisé du *Strophantus gratus* isolé par le procédé particulier du Professeur Arnaud.

Désignée comme *Etalon International*.

Propriétés :

Cardio-tonique énergique.

Diurétique puissant.

Indications :

Insuffisances cardiaques aiguës ou progressives, principalement celles du ventricule gauche (aortiques et hypertendus) et des cœurs réguliers, — Myocardites.

Formes :

Actibaïne (Solution à 2/100).

Ampoules 1/4 mg. (1 cc.) p. inject. intrav.

Ampoules 1/2 mg (2 cc.) p. inject. intram.

Doses :

L'Ouabaïne Arnaud ne s'accumulant pas, le traitement peut être poursuivi aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Per os : Doses d'attaque : 16 à 24 mg. par 24 h.

Doses d'entretien : 10 à 16 mg. par 24 h.

Injections : 1/4 mg., c'est-à-dire 1 cc. d'une ampoule pour injections intra-veineuses, ou 1/2 mg., c'est-à-dire 2 cc. d'une ampoule pour injections intramusculaires par jour.

Prix :

Actibaïne (Solution à 2/100)... 18 fr. 45

Ampoules..... 16 fr. 40

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

OUABAÏNE-MIALHE

Soluté au centième d'Ouabaïne cristallisée.

Cent gouttes = vingt milligrammes.

Ralentit, renforce, régularise le cœur, provoque la Diurèse. Réduit les œdèmes. Insuffisance cardiaque, Dilatations aiguës des cavités droites, Cardiopathies valvulaires, Asthénie du Myocarde, Arythmie, Tachycardie, Médication spécifique du cœur droit.

Ouabaïne-Mialhe ne s'accumule pas ; le traitement peut donc être prolongé tout le temps nécessaire à l'amélioration du malade.

X à L gouttes par 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon 12 cmc. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e). Tél. : Rich. 35-10.

OUATAPLASME

du D^r Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet.

Instantané, aseptique émollient.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Absès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liqueur de Labarraque, Eau d'Alibour Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

Se trouve dans toutes les Pharmacies en enveloppe entière, demi et quart d'enveloppe.

Établissements SABATIER

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 06-40.)

OVA-CRINE

Dragées.

Composition :

Hormone ovarienne lipoïdique	
acéto-soluble	0,01
Ovarine	0,05
Hypophysine.....	0,01
Hépatine.....	0,05
Phényléthylmalonylurée	0,01

Pour 1 comprimé dragéifié.

Mode d'action. — Supprime l'hypo-activité ovarienne. Médication endocrinienne d'appoint.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne et des troubles qui l'accompagnent. Troubles de la puberté. Troubles de la menstruation. Aménorrhée. Dysménorrhée. Règles douloureuses. Ménopause naturelle ou artificielle. Stérilité. Obésité.

Posologie. — De 2 à 4 dragées par jour en 2 fois, loin des repas, pendant 10 à 20 jours par mois.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

17, rue Chomel — PARIS (VII^e).

OVAIRE ISCOVESCO

Gynocrinol : Tous les éléments naturels de l'opothérapie ovarienne.

Gyno-gouttes : solution hydro-alcoolique d'extrait total ovarien.

Gynolutéol : Extrait purifié de corps jaune.

Gynohypophysol : Association d'ovaire et d'antéro-hypophyse.

Gynopolycrinol : Ovaire, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse.

Yo-Gynine : Ovaire, Antéro-Hypophysine, Vitamine E, etc...

(Voir « OPOTHERAPIE ISCOVESCO »).

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 07-90.)

OVCALINE

Composition. — Formule pour 1 comprimé :

Glycérophosphate de Soude	0,025
Glycérophosphate de Magnésie	0,01
Nucléinate de Soude	0,015
Hémoglobine	0,05
Poudre d'Ovaire	0,10
Poudre de Thyroïdine	0,001

Propriétés. — Médication bio-énergétique complète. Action thérapeutique. Réparateur neuro-cellulaire, stimulant général, modificateur de la nutrition, régulateur de fonction ovarienne.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la castration. Retard et troubles de la puberté. Aménorrhées ou dysménorrhées. Toutes les indications de l'opothérapie ovarienne. Asthénie. Surmenage. Dépression nerveuse.

Posologie. — Avant les repas 2 à 5 comprimés par jour. Avaler sans croquer. (Suivre l'avis du médecin).

Pour régulariser les fonctions ovariennes, prendre l'Ovcaline tous les mois, dix jours avant l'époque des règles.

Prix : 26 francs.

Laboratoire « KALEFLUID »

G. LERICHE, Pharmacien.

66, boulevard Exelmans — PARIS (16°).

OVOBIOL

Bouillon Bromuré Lécithiné.

Puissant sédatif du Système Nerveux.

Reconstituant cellulaire.

L'Ovobiol apaise le système nerveux en état d'excitation morale ou physique et favorise le sommeil. Il fortifie par les phosphates assimilables et la lécithine qu'il renferme.

Effets rapides et prolongés sans inconvénient.

Les tablettes d'Ovobiol se dissolvent rapidement dans l'eau bouillante.

Absorber tel quel ou mélangé à l'alimentation habituelle (potage, légumes, etc...).

Dose normale, toujours utile : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour (selon l'avis du médecin).

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes suivant l'âge.

Laboratoire A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-MER.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

OVOMALTINE

Aliment naturel équilibré.

Source abondante de vitamines et de diastases.

Composition. — Extrait préparé sous vide à basse température, à partir du malt, du lait et du jaune d'œuf frais, aromatisé par une trace de cacao.

Forme. — Paillettes solubles.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne, complet, tonique, riche en diastases, sels minéraux et vitamines. Auxiliaire de la digestion. Galactagogue.

Indications. — Diète liquide. Etats fébriles, états post-opératoires, anémies, convalescences, grossesse, suralimentation. Affections de l'appareil digestif : abcès dentaires, phlegmons de la gorge, angines, ulcères, troubles gastro-intestinaux, carences frustes.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe à faire dissoudre dans une tasse de lait, eau, café, thé, ou toute autre boisson chaude. Ne pas faire cuire.

Société Anonyme des Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.

OVULES AU LACTOSMOSE

pH : 4,5

Décongestif pelvien.

Lactosérum, Bacille Lactique, Acide Lactique.
Reconstitue l'état physiologique et l'acidité vaginale.
N'irrite pas la muqueuse, ne tache pas le linge.

Si l'ovule se recouvre d'une croûte légère (cristallisation superficielle des sucres), passer l'ovule à l'eau froide pour qu'il reprenne sa souplesse.

OVULACYD LAVRIL

Arsenicales pH : 5.

Vaginites à Trichomonas, Oxyures, Pertes persistantes,
Vulvo-vaginites des petites filles, vaginites séniles.
Hydrates de carbone, acide acétyl, phénylarsénique 0 gr. 20.

Matin, midi et soir, mettre une Ovulacyd dans le vagin.
Humidifier légèrement l'Ovulacyd à l'eau froide, si besoin est.

GYNO-LACTOSMOSE

Injection vaginale acide. (Voir à Lactosmose.)

LABORATOIRE LAVRIL

PACY-SUR-EURE (Tél. : 10.)

et 26, rue des Batignolles — PARIS. (Tél. : Mar. 21-14.)

OVULES A L'IODÉOL

Composition. — Chaque ovule contient 0,80 d'Iode colloïdal électro-chimique (*Iodéol*) ; enfermés dans une enveloppe métallique sertie à la presse, ces ovules gardent un point de fusion absolument fixe, 36°,5, et peuvent se conserver indéfiniment.

Propriétés. — Les ovules à l'*Iodéol*, grâce à la diffusibilité de l'Iode colloïdal, calment presque instantanément la douleur, décongestionnent la muqueuse, modifient et tarissent les sécrétions et produisent une cicatrisation et une guérison rapide (voir à *Iodéol Viel*).

Les ovules à l'*Iodéol*, ni toxiques, ni caustiques, réalisent le pansement gynécologique idéal. L'*Iodéol* détruit tous les germes, ne coagule pas les albumines, respecte les tissus, et de ce fait pénètre par osmose dans la profondeur des tissus en conservant ses propriétés antiseptiques.

Indications, Posologie. — Les ovules à l'*Iodéol* trouvent leur indication dans les affections gynécologiques, particulièrement chez la femme enceinte :

1° Vaginites de toutes natures, ulcérations du col, métrites, annexites : Un ovule matin et soir ;

2° *Avant l'accouchement* : Un ovule chaque soir pendant six jours consécutifs, au cours des 3 dernières semaines de la grossesse.

L'*Iodéol* stérilise les voies génitales et en outre, grâce à son pouvoir antiscleureux, il assouplit les tissus fibreux et cicatriciels du col et du vagin, et les prépare à une dilatation et à une ampliacion régulières ;

3° *Après l'accouchement* : Prévention des complications infectieuses du post-partum, un ovule chaque soir ; donner en outre : *Iodéopirine* : 6 comprimés par 24 heures.

L'*Iodéopirine*, acide acétyl iodosalicylique, antiseptique général, agit comme un auto-vaccin, en transformant les toxines microbiennes, en cryptotoxines immunigènes ;

4° *Traitement curatif des infections puerpérales* : Un ovule à l'*Iodéol*, matin et soir ; 8 à 12 comprimés d'*Iodéopirine* par 24 heures.

Dans les cas graves utiliser, en outre, la diffusibilité extrême et la rapidité d'action de l'*Iodéol*, en injections intra musculaires.

Une ampoule de 1 cc. deux fois par jour.

Après Cabantous, Durœux et Quesnel, Foucault, Le Gac, Goldsmidt, Santner obtiennent avec l'*Iode Colloïdal* les meilleurs résultats, dans le traitement des états infectieux du post-partum : 86 p. 100.

Présentation. — Boîte de 6 ovules : Prix : 18 francs.

E. VIEL

37, Avenue de l'Opéra. — PARIS (Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes : 11 et 12, boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

OVULES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Abscès du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatations, etc.).

Posologie. — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

Prix : 15 francs la boîte de 6 ovules.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod-PARIS.

OVULES AU PARAIODE

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Paraïode*. Chaque ovule contient 1^{er},50 de Paraïode.

Indications. — Assèche rapidement vaginites, métrites et toutes leucorrhées. Est également indiqué dans les salpingites et salpingométrites.

Mode d'emploi. — Un ovule le soir suivi le lendemain matin d'une injection.

La boîte de 6 ovules. Prix : 18 francs.

Laboratoire du PARAIODE

DUMESNIL, Pharmacien

Docteur ès sciences physiques.

48, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 58-10.

Service médical. Tél. : Ségur 43-56.

OVULES CHAUMEL

à la Glycérine solidifiée.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol. Ovules Chaumel (borate de soude).

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichtyol.

Prix : 18 fr.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 applications.

Crayons CHAUMEL

Très appréciés pour leur fusion et la facilité avec laquelle le médecin les pose.

Prix : 16 francs.

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

OVULES HYSTAN

du Docteur L. Lafay

Traitement précis, rapide, de tous les exsudats vaginaux, microbiens ou non, même gonococciques. Aucune autre thérapeutique ne peut leur être comparée.

Douze ovules suffisent généralement pour une cure.

Composition :

Catalyseur molybdène.....	0,001
Catalyseur plomb.....	0,005
Acétate de plomb.....	0,15
Sulfate de zinc.....	0,08
Excipient	16

Mode d'emploi. — Chaque soir, après toilette, en se couchant, mettre un ovule.

Présentation. — Boîte de 6 ovules : 20 francs.
Modèle pour fillettes. Boîte de 8 crayons : 18 francs.

Laboratoire du Docteur L. LAFAY.

(LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens.)

54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence — PARIS.
(Tél. : Trinité 21-06.)

OVULES INSEVA

Traitement des affections gynécologiques par vaccinothérapie locale.

Les OVULES INSEVA sont à base de bouillon de cultures microbiennes de colibacilles, entérocoques, streptocoques, staphylocoques, bacilles d'Hoffmann, diplocoques de Neisser.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques, leucorrhées, métrites.

Action. — Supérieure à celle des antiseptiques. Modifie la nature de l'écoulement, le tarit rapidement.

Mode d'emploi. — Après une injection d'eau bouillie, introduire soir et matin si possible un ovule dans la cavité vaginale.

Présentation. — La boîte de 6 ovules : 16 francs.

INSEVA.

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Echantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).
Tél. : Lab 72-73 (4 lignes groupées).

OVULES OAPE

Présentation. — En boîte de 6 ovules sous cupules.

Principes actifs. — Ichtyol, Extrait d'Hamamélis, Baume de San Salvador.

Indications. — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, Salpingites, etc...

Mode d'emploi. — Applications locales. Laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

Laboratoire PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

Composition. — A base de terres radioactives et de Terpinéol: d'une radioactivité égale à une unité uranique.

Action. — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix de vente au public: 23 francs.

Prix médical: 16 fr. 10.

La teneur en produit radioactif de chaque fabrication de nos produits est dosée par le Service des Mesures de SFERC.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél.: Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068-B.

OVULES « ROCHE »

au Thigénol.

(Voir également page « Thigénol »)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules « Roche »* la sédation parfaite des douleurs, et, après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

Boîte de 6 ovules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-47.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél.: Arch. 91-10.)

OVULES SAPOREX

Fondants, Glycérinés, Saponiques.

Formule :

Essence Saporex	
— Lavande	0,45
— Thym	0,13
— Citronnelle	0,08
— Verveine	0,07
— Santal	0,07
Pâte de savon neutre	5
Glycérine solidifiée Q. S. p. faire une masse de 100 grammes.	

Décongestifs, cicatrisants, bactéricides, résolutifs, désodorisants, diminuant les exsudats vaginaux.

Indications. — Métrites, leucorrhées, vaginites, ulcérations, tumeurs abcès, prurit vaginal, etc...

Mode d'emploi. — Un ovule 2 fois par jour, le matin une injection de *Saporex* (voir rubrique *Saporex*).

Ce décapage permettra au médecin, s'il y a lieu, un examen net et rapide. Boîte de 6 ovules, prix : 18 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e).

(Tél. : Villeurbanne 93-88.)

OVULES SÉDO-HÉMOSTATIQUES

du Dr JOUVE

Les ovules Sédo-Hémostatiques à excipient gélatino-glycériné véhiculent comme principes actifs l'antipyrine et le chlorure de calcium, médicaments hémostatiques et sédatifs qui ont fait leurs preuves. Ils sont fusibles à la température du corps, ne tachent pas et n'irritent pas les muqueuses. Nullement toxiques, ils peuvent être renouvelés à volonté.

Composition. — Les doses pour un ovule sont les suivantes :

Gélatine officinale lavée et séchée	1 gr.
Glycérine officinale	10 gr.
Antipyrine	1 gr. 50
Chlorure de calcium	0 gr. 50
Eau distillée	2 gr.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le n° 1050-1.

Une triple action :

- a) **Analgésique.** — (Métrites, Vaginites, Règles douloureuses, etc.)
- b) **Hémostatique.** — (Métrorragies, Ulcérations, Règles prolongées, etc.)
- c) **Décongestive.** — (Ils s'associent heureusement à la Diathermie gynécologique.)

Les Ovules sédo-hémostatiques remplacent avantageusement les « tamponnements locaux » utilisant des préparations magistrales d'exécution plus ou moins délicate et d'action variable.

Une indication précieuse. — Pour éviter les douleurs menstruelles, utiliser les Ovules Sédo-Hémostatiques 3 ou 4 jours avant l'apparition des règles.

Mode d'emploi. — Introduire l'Ovule aussi profondément que possible, se garnir et rester étendue.

Prix de vente : 19 francs.

Laboratoire du Dr JOUVE,

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI^e) Tél. : Trocadéro 69-87.

OVULES STÉRIGYNE

Ovules secs spumescents à base d'Octylhydrocupréicine (0 gr. 01 par ovule).

Traitement nouveau, pratique et propre des leucorrhées, pouvant être prolongé sans inconvénients même à titre d'hygiène habituelle.

Les ovules secs Stérigyne décongestionnent et désodorisent. Ne coulent pas. Ne tachent pas. Inutile de se garnir.

Posologie. — Introduire le soir au coucher un ovule aussi profondément que possible.

Un ovule Stérigyne coûte environ trois fois moins qu'un ovule classique.

La boîte de 16 ovules: 19 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER
ORLÉANS. (Tél. : 31-10.)

OVULES-VACCINS « INAVA »

Ransement Gynécologique.

(*Vaccin Inava M,*
excipient au soufre organique assimilable.)
Antipolymicrobien (aérobies et anaérobies),
Efficace, Propre, Commode,
Aseptise les Voies génitales féminines.

Indications.

Métrites, Salpingites, Leucorrhées, Vaginites,
Préventif des Infections Puerpérales.

Mode d'emploi. — Introduire l'ovule profondément et se garnir. Ne procéder à la toilette ordinaire que 12 heures après.

Prix : 18 francs la boîte de 6 ovules.

E. GUIGNIER, pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 31-30.)

OXY-BUCCOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-37.

Forme. — Bain de bouche liquide.

Composition. — Sulfate neutre d'orthoxyquinoléine ; chloral.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique, cicatrisant, calmant.

Indications. — Soins post-opératoires dentaires et de toutes interventions dans la cavité buccale, aphtes, stomatites, gingivites, angines, hygiène buccale quotidienne.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

Pris du flacon : 8 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 62-30.

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goitre et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Posologie. — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e)
(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYFUGE

Cachets.

Composition :

Chenanthol	0 gr. 09
Thymol	0 gr. 45
Calomel chimiquement pur	0 gr. 45
Semen contra pulv.	2 gr. 70
Tanacétum pulv.	2 gr. 70

Pour 9 cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des parasites intestinaux : ascarides, ankylostomes, tricocéphales et tout particulièrement des *oxyures*.

Mode d'emploi. — (Adultes seulement). Pendant 3 jours consécutifs, faire prendre le matin à jeun avec une infusion 3 cachets, chacun de 1/2 heure en 1/2 heure. N'absorber aucun aliment jusqu'au repas de midi qui sera normal.

Présentation. — Tube aluminium renfermant 9 cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoire CASTEL

1, place Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien.

Ingénieur-chimiste, Licencié ès Sciences.

OXY-INJECTEUR DU Dr FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

Indications. — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphysème, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Broncho-pneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

Avantages de l'appareil. — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 150 francs.

Pharmacie du Dr FIALIP

23, av. de la Motte-Picquet — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 00-91.)

OXYLÉINE ADULTES

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications :

Troubles intestinaux : Diarrhées, côlites, fermentations, dysenteries, intoxications alimentaires, vers et tous autres parasites intestinaux, excepté le tænia.

Troubles des voies biliaires : Cholécystites.

Troubles des voies urinaires : Colibacillose et toutes infections (pyélites, gonococcie et ses complications).

Forme. — Comprimés. Flacons de 50.

Doses :

Au-dessus de 15 ans : 3 ou 4 comprimés à chaque repas (midi et soir).

De 8 à 15 ans : 2 ou 3 comprimés à chaque repas (midi et soir).

De 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas (midi et soir).

Ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix : 14 francs. *Durée* : 8 jours.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

— Tél. : 32. —

OXYLÉINE ENFANTS

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications :

Troubles intestinaux : diarrhées, colïtes, fermentations, dysenteries, intoxications alimentaires, vers et tous autres parasites intestinaux, excepté le tœnia.

Troubles des voies urinaires : colibacillose et toutes infections.

Forme. — Très petits comprimés solubles et de goût agréable.

Doses :

Jusqu'à 6 mois.....	1 comprimé	par jour
De 6 à 12 mois.....	2 comprimés	—
De 12 à 18 —.....	3 —	—
De 18 mois à 2 ans.....	2 —	matin et soir.
De 2 à 4 ans.....	2 à 4 comprimés	matin, midi et soir,
à prendre aux tétées ou aux repas.		

Mode d'emploi

Dans une cuillerée à soupe d'eau

<i>Dissoudre</i>		<i>Ajouter</i>
1 ou 2 comprimés.	1 morceau sucre	+ 1 cuillerée à soupe lait.
3 — 4 —	2 — —	+ 2 — —

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). — Tél. : 32.

OXYMENTHOL

(Tablettes et pâtes.)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaine, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*, 6 à 10 par jour à sucer ; *Enfants*, 3 à 6 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge. Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphyseme, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Autorisé par les Assurances sociales.

Prix au public : Tablettes 5 fr. 50 ; Pâtes, 5 fr. pour 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r PERRAUDIN, pharmacien.
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 29-29.)

OXYPLASTINE

Thérapeutique Chirurgicale post-opératoire.

Protection intégrale de la peau avoisinant toute plaie suppurante aiguë ou chronique.

Résistance absolue à l'attaque des sécrétions (pus et liquides organiques).

Forme. — Crème onctueuse aseptique, adhésive *ne séchant pas, ne s'écaillant pas* (s'enlève par simple essuyage à la compresse).

Indications. — Opérations abdominales avec drainages, *Anus artificiels*, Fistules biliaires, duodénales, pancréatiques, Fistules du grêle, *Pleurésies purulentes*, *Cystostomies*, Adénites et abcès froids fistulisés, Arthrotomies, *Ostéomyélites*, Mastoidites, Brûlures, Ulcères variqueux, *Escarres*.

Indications spéciales. — Améliore la cicatrice opératoire, *Esthétique des cicatrices*.

Présentation. — Tube G. M. : dit tube chirurgical : 170 gr. : 22 francs, tube médical : 85 gr. : 15 francs.

Laboratoires de l'OXYPLASTINE

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 61-96.)

OXYTHYOL

du Docteur P. Bourggraff.

Composition. — Ichtyol titré d'origine strictement naturelle gisements autrichiens. — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — Grâce à la teneur rendue constante de tous ses éléments composants, la pâte Oxythyol permet d'obtenir des résultats toujours identiques. Ses propriétés kératoplastiques et antiphlogistiques font de cette pâte un élément précieux de l'arsenal thérapeutique du dermatologiste et du praticien.

Indications. — Dermites variqueuses, eczémas secs et suintants.

Mode d'emploi. — Demander les brochures des docteurs P. et R. Bourggraff : « Ulcères variqueux » et « Eczémas pré et post-ulcéreux ».

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien

HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.).

OZOL

Traitement rationnel de la blennorragie.

Solution Hypertonique de goudron dans du sérum marin (usage externe).

Composition :

Résorcine	0,40	} pour 100 grammes.
Sel marin	0,70	
Goudron végétal pur	1	

Indications. — Blennorragie chez l'homme et chez la femme.

Avantages. — Propriété osmotique du milieu. Pénétration dans les espaces sous-muqueux, contact assuré avec les cellules infectées. Pas d'action coagulante.

Posologie. — *Chez l'homme* : 4 à 5 injections de 10 cc. par jour, à conserver 5 à 10 minutes. En cas d'intolérance de l'urètre, dédoubler les premières injections avec de l'eau bouillie.

Chez la femme : Tamponnements à l'Ozol pur et injections de 2 litres d'eau bouillie contenant 4 à 5 cuillerées à soupe d'Ozol. Lorsque la maladie s'étend à l'urètre : petites injections d'Ozol pur dans l'urètre. Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments, n° 572-2.

Forme. — Liquide.

Prix du flacon : 17 francs.

Laboratoire de l'OZOL

63, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOLASE

Antiseptique gynécologique.

Hygiène intime. Usage externe.

Composition :

Trioxyméthylène	0,008	} pour 1 comprimé.
Peroxyde de magnésium	0,030	
Sulfophénate de zinc	0,075	
Sulfate de zinc	0,075	
Sel marin	0,145	
Alun	1,172	

Indications. — Métrite, leucorrhée, vulvite, prurit, toilette intime et par action calmante sur le réseau nerveux utérin : insomnie, excitabilité, irritabilité.

Avantages. — Solubilité immédiate, odeur discrète et non persistante, innocuité absolue, usage quotidien sans inconvénient.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 25, parfumés au thym.

Posologie. — Pour la toilette intime : 1 comprimé par litre d'eau. Comme médicament : 2 comprimés par litre d'eau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 572-1.

Prix de la boîte (40 comprimés) : 12 francs.

(L'emploi de l'Ozolase entraîne une dépense de 0 fr. 30 par jour.)

Laboratoire de l'OZOL

63, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOTHINE

(Ozone-Térébenthine).

Composition. — Térébenthine rendue soluble et assimilable par procédé spécial. (Procédé F. Sauvage).

Formes pharmaceutiques

Ozothine interne :

I. *Ozothine injectable* en ampoules de 5 et 10 cc. pour injections intraveineuses, intramusculaires et intratrachéales.

II. *Gouttes ozothine* — prendre 10 gouttes, 2 fois par jour, dans de l'eau sucrée. Augmenter chaque fois d'une goutte jusqu'à 35 gouttes et redescendre à 10 gouttes.

Ozothine externe. — Pour inhalations, liniment.

Pour inhalations : 1/2 cuillerée à café dans un bol d'eau très chaude.

Propriétés thérapeutiques:

Ozothine interne :

I. *Ozothine injectable.* Laryngites aiguës ou chroniques, bronchites catarrhales, bronchites chroniques, bronchites tuberculeuses, broncho-pneumonies, **suppurations** broncho-pulmonaires et pulmonaires, abcès du poulmon, gangrène pulmonaire, tuberculose.

II. *Gouttes ozothine.* Rhumes, bronchites, asthme, emphysème, tuberculose pulmonaire ou intestinale.

Ozothine externe. — Inhalations pour nez, larynx, pharynx, sinus, frictions ou massages, affections arthro-rhumatismales, sciatique.

Prix :

Ozothine injectable : Boîte de 8 ampoules de 5 cc..... 20 fr.

Ozothine injectable : Boîte de 6 ampoules de 10 cc..... 20 fr.

Gouttes ozothine..... 18 fr.

Liniment et inhalations..... 19 fr.

Laboratoire OZOTHINE

23, rue Sébastien-Mercier — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaugirard 50-59.

J. POMPANON, Pharmacien-Directeur.

PADÉRYL

Composition. — Dragées de :

Bromhydrate de papavérine.....	0,03
Bromhydrate de codéine	0,02
Extrait de valériane stabilisée	0,10
— de jusquiame stabilisée	0,035

Propriétés et indications :

Calmant de la toux : toux pharyngolaryngée, toux rebelles et persistantes des affections pleuro-pulmonaires chroniques, toux coqueluchoïdes, toux réflexes au cours des insufflations du pneumothorax artificiel, toux incoercibles et émétisantes de certaines affections pulmonaires aiguës ou tuberculeuses.

Sédatif nerveux sans action hypnotique, troubles fonctionnels d'origine nerveuse et neurovégétative : *surmenage, troubles nerveux menstruels, insomnies* (qu'il jugule sans causer de troubles au réveil).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour et plus selon prescription médicale.

Laboratoires CLIN, COMAR ET Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

PAIN REDEUIL

PAINS FRAIS DE RÉGIME

Préparé par des procédés spéciaux de fabrication, diastasé, le **Pain Redeuil** fournit à l'organisme des aliments féculents après les avoir préalablement ramenés à une forme particulièrement apte à l'assimilation.

De digestion facile, il est parfaitement bien toléré par l'estomac et ne provoque pas de constipation.

De goût très agréable, comparable au pain de gruau du commerce, il ne rebute pas les malades soumis au régime, comme les biscottes, les biscuits, etc.

Il est particulièrement recommandé à tous ceux dont l'assimilation est déficiente :

Dyspeptiques ; Entéritiques ; Diabétiques ; Obèses ; Constipés ; Opérés.

Pains frais de 100 grammes. — Appétissant, de goût très agréable, reste frais plusieurs jours.

Pain de conserve. — Même composition que le pain frais, se conserve indéfiniment.

Biscottes friables. — Au ferment diastasique.

Biscottes de pain. — Même composition que le pain.

Pâtes, Farine, Chocolat. — Spécialement assimilables.

Déjeuner-entremets Redeuil. — *Sucré* : pour enfants, vieillards, convalescents ; *Non sucré*, pour diabétiques.

Produits de Régime REDEUIL

7, rue Couche — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gob. 53-74.)

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes.

Pain pour le régime de Vichy.

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuets et Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 p. 100). Spécial diabétique (régime normal, 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté, Biscottes, Longuets et Gressins sans sel.

Pain de villes d'eaux.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux), **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Évian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

2 et 4, chemin Feuillat — LYON.

PAMPRYL

Jus de raisin naturel

Blanc et rouge.

Composition. — Pur jus de raisin frais naturel, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), sans pasteurisation par filtration stérilisante. Donc jus de raisin intégral, sans concentration ni modification.

Indications. — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

Boisson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille (8 à 9 verres) : 10 fr. 50.

Bien spécifier la marque « Pampryl ».

Société du PAMPRYL

21, rue de Mâcon — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 37-88.)

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glycériné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. *Enfants* : Demi-dose.

Prix au public :

12 francs la boîte de 50 pilules de Panbiline.

20 francs le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoire du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

PANBIOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-36.

Forme. — Dragées.

Composition. — Acides aminés (Histidine, Tryptophane, Lysine), Extrait total de muqueuse et de muscle gastriques, Phosphore organique de l'embryon du blé, Manganèse organique, Fentugrec.

Propriétés pharmacodynamiques. — Anti-anémique, tonique, reconstituant. Fixateur des sels de chaux et de magnésium.

Indications. — Tous les états anémiques, toutes les asthénies, anorexies, déminéralisations, grossesse, allaitement, croissance, rachitisme, cachexie, troubles de la nutrition et du métabolisme, convalescences.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour.

L'étui : 17 francs (en France).

LABORATOIRES A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

PANCALCION

Chlorure de Calcium d'action rapide.

Composition. — Solution titrée de *chlorure de calcium* cristallisé, stable et pur. LXXX gouttes (1/2 cuillerée à café) = 1 gr. de Ca Cl^2 .

L'adjonction de traces d'halogènes et de P. qui sont les satellites habituels du CaCl^2 dans l'organisme, lui assure une orientation biologique qui explique sa rapidité d'action (ces corps fixent le calcium à la manière des catalyseurs).

Indications. — *Recalcifiant* : croissance, rachitisme, fractures, lymphatisme, tuberculose, grossesse, allaitement. *Anti-hémorragique* : Préventif et curatif de toutes les hémorragies. *Diurétique-déchlorurant* : pleurésie, ascite, œdème, néphrites, albuminuries. *Anti-anaphylactique* et *redressant humoral* : accidents du sérum, urticaire, asthme, spasmophilie, tétanie.

Doses. — Se souvenir que LXXX gouttes = 1 gr. de Ca Cl^2 .

Dose quotidienne pour *adultes*, à prendre dans un peu d'eau sucrée avant les repas : Récalcifiant : 1 gr. (2 fois XL gouttes).

Hémostatique : 2 à 4 gr. (4 fois XL gouttes ou 4 fois LXXX gouttes).

Diurétique déchlorurant ou anti-anaphylactique : 3 à 6 gr.

Enfants : V à XX gouttes par année d'âge suivant les cas.

Laboratoire LE BRUN

155, boulevard Magenta — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 50-34.)

PANCARBO

Deux formes : **Granulé fondant** — **Comprimé friable**.

Composition. — *Granulé* : à 25 p. 100 de charbon animal, végétal et charbon activé. P. E.

Une cuillerée à café contient :

Charbon polyvalent : 0 gr. 90 ; Formine : 0 gr. 10 ; Carbonate de chaux : 0 gr. 10 ; Bromure de Sodium : 0 gr. 10 ; Teinture de Belladone : II gouttes.

Comprimé : dosé à 0 gr. 45 de charbon animal, végétal, activé, mêmes autres composants, mais sans bromure.

Originalité. — Réalise la première association des trois charbons usités en thérapeutique : végétal, animal, végétal activé.

Par sa polyvalence, possède une activité supérieure dans tous les cas.

Posologie. — *Granulé* : 1 cuillerée à café ou 2 après chaque repas.

Croquer à sec ou avec un peu d'eau.

Comprimé : 2 à 3 comprimés après les repas, croqués à sec.

Indications. — Affections gastro-intestinales. Intoxications, fermentations intestinales.

Gastropathies douloureuses, digestions difficiles. Dyspepsies.

Présentation. — *Granulé fondant* : Boîte contenant environ 18 cuillerées à café pour 8 à 10 jours de traitement.

Comprimé friable : Boîte de 45 comprimés pour 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél. : Gobelins 36-96.)

PANCRÉAL KIRCHNER

Composition. — Le PANCREALUM KIRCHNER est le complexe d'extraits minutieusement dégraissés et purifiés de suc pancréato-kinique suractivé par des ferments biologiques auxquels revient une action thérapeutique aussi constante que parfaite.

Caractéristique :

- 1° Comprimés de 25 centigrammes renfermant 100 p. 100 d'ingrédient actif (Hydrolases diastatiques et Zymases pancréato-kinatiques) sans addition de sucre, cacao, lactose ou amidon (véhicules) ;
- 2° Procédé de purification perfectionné au plus haut degré, permettant d'obtenir un comprimé inaltérable et sans mauvaise odeur à laquelle le malade prenait le dégoût ;
- 3° Dosage et titrage exacts et une solubilité absolue dans le suc digestif alcalin ;
- 4° Pas de contre-indication.

Propriétés thérapeutiques et indications :

Pancréal Kirchner représente le stimulant éminemment précieux de la sécrétion interne et de la régurgitation duodénale (**Affaiblissement général, Régime de suralimentation, Vieillesse**).

Pancréal Kirchner réalise la **Zymatothérapie totale et parfaite du Diabète**.

Pancréal Kirchner facilite et parachève la digestion (**Dyspepsie, Gastrite, Intolérance de matières grasses**), équilibre l'acidité du suc gastrique (**Hyperchlorhydrie**) et évite la **Prédisposition à l'Ulcère**.

Pancréal Kirchner est le vrai antiseptique physiologique des intestins dans les multiples infections gastro-intestinales (**Gastro-entérite, Fermentations, Auto-intoxication, Urticaire**).

Pancréal Kirchner stimule les contractions péristaltiques et représente le remède étiologique de la **Constipation**.

Pancréal Kirchner supprime les troubles de la grossesse (**Vomissements**) en garantissant l'afflux normal de la sécrétion interne et en compensant l'assimilation maternelle.

Pancréal Kirchner active la sécrétion cellulaire du foie et règle l'élaboration de l'acide urique.

Nourrissons :

Pancréal Kirchner permet le traitement de l'intolérance au lait de vache des nourrissons.

Pancréal Kirchner constitue le régularisateur du fonctionnement du tube gastro-intestinal du nourrisson en réalisant la désintoxication intestinale (**Gastro-entérite**) d'une façon plus parfaite que peuvent le faire les agents chimiques.

Doses :

Adultes : 3-4 fois par jour, 2-4 comprimés.

Enfants : 2-3 fois par jour, 2-3 comprimés.

Nourrissons : 2-3 fois par jour, 1-2 comprimés.

Prix : 22 fr. 50 le flacon de 60 comprimés.

11 fr. 50 le flacon de 30 comprimés.

Littérature et échantillons :

Laboratoires du Docteur KIRCHNER

SARREGUEMINES-STRASBOURG

Service commercial : 24, rue de Verdun. STRASBOURG (Bas-Rhin).

PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

Caractéristiques. — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe, ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

Indications. — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

Chez le nourrisson. — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. *Grands enfants* ou *adultes* : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires DEFRESNE

19, rue Jacob — PARIS.

PANCRÉATOKINASE CARRION

Composition. — Poudre de pancréas et de muqueuse duodénale desséchés dans le vide.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indication. — Dyspepsies intestinales. Constipation.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à chaque repas.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés : 15 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 16 à 25 jours.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PANCRÉATOSE IDON

C17 H19 AzO ³ HCl.....	0,50	Pancréatine	25
Na Cl.....	30	Mg O.....	15
Carb. Ca.....	50	Na H CO ³	850
Lactose	30	Essence d'Anis	1

Poudre, cachets et granulé à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

Indications. — Maladies d'estomac, du foie et des intestins.

Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose, aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Posologie

Poudre : 1 cuillerée à café avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Cachets : 1 cachet avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Granulé : 1 cuillerée à soupe avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Prix : Poudre et cachets : 10 fr. au public (10 jours de traitement).

Granulé : 14 fr. au public (8 jours de traitement).

Laboratoire de la PANCRÉATOSE IDON

Jean BREVIÈRE (succ.)

Docteur en Pharmacie,

Ancien préparateur à la Faculté,

89, rue Saint-Georges — NANCY (M.-et-M.). (Tél. : 73-89.)

PANCRÉBILE

Composition :	Pancréas total (ext. spécial).....	0 gr. 10
	Bile dépigmentée, décholestérinée.	0 gr. 20
	Glandes del'intestin (ext. pulv.)...	0 gr. 05
	Oléate de soude.....	0 gr. 05
	Carbonate de chaux. Q. S. p...	1 dragée glutinisée.

Propriétés. — Stimulant et régulateur hépato-pancréatique. Chologogue, Anti-infectieux, Laxatif doux.

Indications. — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

Posologie. — 1 dragée avant ou après les repas. Avaler sans croquer.

Constipations : 3 à 4 dragées le soir au coucher.

Nota. — PANCRÉBILE n'est pas un laxatif irritant, mais un chologogue doux. Son action est augmentée par la présence du carbonate de chaux qui neutralise l'Acidité et dont le Calcium agit comme Auxo-ferment ou Zymosthénique.

PANCRÉBILE s'administre 1 heure avant les repas si on désire un effet excito-sécrétoire : 1 heure après, si on veut suppléer à la sécrétion pancréatique déficiente.

Commencer le traitement par une dragée à chaque repas. Augmenter suivant l'effet obtenu.

Prix : 15 fr. 50. (15 jours de traitement.)

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

3, place Jussieu — PARIS (V^e). — Gobelins 56-71.

Approvisionnement pharmaceutique

et Dépôts France : O. C. P. — PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD — ALGER-CASABLANCA.

PANCRÉPAR

Médication eupeptique.

Association en proportions définies d'extraits pancréatique et hépatique, de bile de bœuf, de boldine.

Propriétés thérapeutiques. — Médication eupeptique régularisant les fonctions hépato-biliaires et pancréatiques.

Indications. — Manifestations digestives dues à un trouble d'assimilation. Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Constipation d'origine hépatique, Anaphylaxie digestive.

Forme. — Dragées glutinisées.

Doses et mode d'emploi. — Au début de chacun des trois repas : 2 à 3 dragées.

Enfants à partir de trois ans : moitié de ces doses. Au-dessous de trois ans, s'abstenir sauf avis contraire du médecin.

Prix au public : 16 fr. 50

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits **SCIENTIA**

Dr. E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

PANCRÉPATINE LALEUF

Composition. — Extrait spécial de Pancréas activé par addition de Suc hépatique et analgésine.

Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications. — Opothérapie du Diabète par médication interne. Sous l'influence de la PANCRÉPATINE, on remarque :

1^o Abaissement de la Glycémie;

2^o Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;

3^o Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal ;

4^o Disparition des troubles secondaires, soif, polyurie, prurit, etc.

5^o Amélioration rapide de l'état général.

Formes. — Capsules glutinisées.

Posologie et mode d'emploi. — Les capsules de PANCRÉPATINE LALEUF doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Durée moyenne des unités de vente. — 12 à 18 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 capsules : 24 francs.

Laboratoires **LALEUF**

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PANCRINOL

Complexe d'extrait désalbuminé et délipidé de foie, rate, rein et surrénale.

Indications. — Toutes les anémies, anémies banales ou secondaires, en particulier celles s'accompagnant d'état asthénique. — Toutes les convalescences des maladies aiguës ou infectieuses. — Toutes les dépressions physiques ou nerveuses, le surmenage, etc.

Action. — Reprise de l'appétit, réapparition des forces, augmentation du nombre des globules rouges et du taux de l'hémoglobine, élévation du poids.

Posologie:

Adultes : 2 à 4 ampoules de 7 cc. par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe d'Elixir.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 3 cc. ou cuillerées à café de sirop ou d'Elixir par jour.

Présentation:

Adultes : Boîte de 10 ampoules de 7 cc. : 20 francs.

— 30 ampoules de 7 cc. : 52 francs.

Elixir, le flacon : 14 francs.

Enfants : Boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 14 francs.

Le flacon de sirop : 20 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

PANDRÉNALINE JULIEN

Gouttes. — Suppositoires.

Composition. — Extrait *total* désalbuminé et stabilisé de *glandes surrénales* contenant, en solution *exactement titrée et stable* :

— Un pour mille d'adrénaline *naturelle* extraite de la zone médullaire.

— Tous les *principes extractifs* antitoxiques contenus dans la zone corticale (Hormone, etc.).

Indications. — *Insuffisances surrénales* au cours des maladies infectieuses et toxiques, *asthénies* et *états neurasthéniques*, *hypotension*, *collapsus* et *choc*, *affections digestives*, *vomissements grippiques*, *hémorragies*, *intoxications aiguës*.

Posologie. — XV gouttes 2 fois par jour sur un morceau de sucre à sucer lentement.

3 suppositoires par jour. Chaque suppositoire contient X gouttes de Pandrénaline.

Prix : 18 francs. — Echant. gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie,
105, rue de Rennes, PARIS (VI^e). Tél. : Littré 80-76.

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.

Traitement du paludisme : **Panfébrine AB.**

Spécifique de toutes les pyrexies : **Panfébrine B.**

1° Panfébrine B (toutes fièvres).

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiénenterie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

Prix : le tube de 10 *cachets*, 10 francs.

2° Panfébrine AB (paludisme).

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsinique $As = O-CH^3 (OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quiniques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour ; de 7 à 8 ans, 1 cachet comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n^{os} 586-11 et 586-12

Prix : la boîte de 40 *cachets*, 25 francs.

Échantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

PANFLUINE

Du Docteur Moity.

Combinaison organique dissimulée d'iode, avec les tanno-glucosides de vaso-constricteurs et plastifiants veineux.

Indications. — Régulateur circulatoire, Affections phlébotiques et artérielles, Hémorroïdes, Varices, Hypertension, Troubles congestifs, Formation de la jeune fille et troubles de la quarantaine chez les deux sexes, Rhumatismes diathésiques et infectieux, Arthritisme, Hyperviscosité sanguine, Dépuratif.

Formule. — Teinture d'Iode, 2; — Hydrastis Canadensis, 4; — Sol. Intrait Marron d'Inde stabilisé, 2; — Extrait fl. Viburnum Prunifolium, 2; — Extrait fl. Hamamelis virginica, 8; — Extrait fl. Rhamnus frangula, 2; — T. Cupressus Sempervirens 2; — Teinture d'Iode combiné, 2 pour 100 cc.

Doses. — 3 à 5 comprimés par jour, 2 à 3 cuillerées à soupe, Selon les indications du médecin.

Prix : Flacon de 250 cc. : 15 francs. Boîte 40 comprimés : 15 francs.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire J.-O. MOITY

Docteur en Médecine, Docteur en pharmacie,
ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE.

PANGADUINE

Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

Composition. — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

Indications (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause. C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

Action. — La *Pangaduine* agit :

1° Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2° Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement, on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

Adultes : Pangaduine Élixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Prix : 18 francs.

Enfants : Pangaduine granulée. 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Prix : 10 francs.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44.)

PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — 15 Sachets de 10 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 francs.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.
(Tél. : Passy 68-14.)

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhée. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés* ou *Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Granulés : 16 fr. 50

Cachets : 12 francs.

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

PANGLANDINE

Description. — La *Panglandine* est une préparation opothérapique comprenant l'ensemble des glandes endocrines et dosée en raison de l'activité physiologique de chaque glande : hypophyse, thyroïde, surrénales, glandes génitales (ovaires, testicules et prostate), parathyroïdes, thymus, rate, moelle rouge, foie, pancréas, duodénum,

Action thérapeutique. — En raison des connexions fonctionnelles des endocrines et de leurs interdépendances, toute dysfonction glandulaire entraîne des perturbations générales du système sympathico-endocrinien, dont le traitement exige une médication « panglandinienne » à doses régulatrices ou légèrement stimulatrices. Cette posologie prudente et nuancée permet d'adapter le traitement adéquat à chaque cas sans fatiguer l'organisme, ni exciter les glandes dont le fonctionnement est normal.

Indications. — La *Panglandine* ne s'adresse pas aux lésions glandulaires graves (maladie d'Addison, maladie de Basedow), mais plutôt aux *petits états endocriniens*, petits insuffisants pluriglandulaires, dont le tableau clinique est souvent mal défini, parce que les signes en sont insuffisants ou imprécis.

La *Panglandine* est indiquée dans les *troubles de croissance physique, de développement du psychisme* ; dans certains troubles de la *nutrition, de la vie génitale*, dans les *dysfonctions ovariennes* chez la femme (aménorrhée, dysménorrhée, frigidité, stérilité), dans l'*impuissance* chez l'homme, dans la *sénilité précoce*.

La *Panglandine* est encore particulièrement indiquée dans les convalescences après maladies infectieuses, dans l'*asthénie*, le *surmenage scolaire*.

On pourra l'utiliser comme *adjuvant* chez les *tuberculeux* qui sont de grands déficients pluriglandulaires.

Formes pharmaceutiques. — La *Panglandine* est présentée sous deux formes distinctes :

1° **Capsules** (50 par flacon) qui se prescrivent à raison de 2 à 10 par jour, la dose moyenne suffisante étant en général de 3 à 6 capsules.

2° **Solution** glycinée plus pratique pour les enfants (flacon de 45 centimètres cubes) se prescrivant de X à XL gouttes à 2 ans ; XX à LX gouttes à 5 ans ; L à C gouttes à partir de 10 ans (XX gouttes correspondent à une capsule).

Prescrire : *Panglandine capsules* ou *Panglandine liquide*.

Prix : 25 francs ; durée du traitement : capsules 5 à 25 jours ; solution, 10 jours à 3 mois.

LABORATOIRES COUTURIEUX

18, avenue Hoche. — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

PANHÉMOL

Composition :

- A. Sirop :**
- | | |
|---|----------|
| Extrait hématique total..... | 20 cc. |
| Glycérophosphate de Sodium cristallisé..... | 0 gr. 10 |
| Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères. Q. S. P..... | 15 cc. |
- B. Comprimés :**
- | | |
|--|----------|
| Extrait hématique sec total..... | 2 cc. 5 |
| Glycérophosphate de soude cristallisé..... | 0 gr. 05 |
| Sucre vanillé. Q. S. P..... | 0 gr. 85 |

Indications. — Anémie, asthénie, surmenage, convalescences, tuberculose, rachitisme, croissance, déchéance organique, hémorragie, paludisme.

Présentation et prix. — 17 francs la boîte de 100 comprimés ou le flacon de 310 cc. (310).

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 à 6 comprimés avant chaque repas, midi et soir.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café de sirop ou 1 à 3 comprimés suivant l'âge, avant les repas, midi et soir.

Laboratoire R. BOUYSSOU
CHAMBOIS (Orne).

PANLUTÉINE VOGGIN

Association de 0,05 extrait total ovarien et de 0,005 extrait thyroïdien.

Indications. — Dans tous les cas où il y aura carence de l'organisme en extrait total ovarien. Elle réussit merveilleusement dans tous les cas de castration chirurgicale ou spontanée, troubles de la ménopause, obésité de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, 10 jours par mois. Le flacon : 15 francs. Traitement de 10 jours.

Laboratoires VOGGIN

2, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).
(Tél. : Danton 83-24.)

PAN-NEUROL

Stabilisateur et Régulateur du Système Nerveux.

Traitement biologique de toutes les Neurotonies.

Forme. — *Comprimés Dragéifiés.*

Composition. — Phényléthylmalonylurée. Polybromures. Belladonne. Passiflore. Phosphoglycérates.

Indications. — Etats anxieux et émotifs. Palpitations. Insomnies rebelles. Dépression nerveuse. Neurotonies cardio-vasculaires et gastro-intestinales.

Posologie. — 4 à 6 comprimés en 24 heures, de préférence au moment des repas.

Prix : 16 francs l'étui de 40 comprimés.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS.

(Tél. : Passy 68-14).

PANOSAN

Tonique général.

Reconstituant énergétique. Préparation agréable et suractivée.

Composition. — Elixir complexe à base de vins généreux contenant entre autres des hypophosphites, de la créosote, du gaiacol, des extraits hépatiques, pancréatiques et spléniques, de l'huile de foie de morue prédigérée, de l'extrait de malt, de la gentiane et de la noix vomique.

Indications. — Toutes les convalescences et en particulier celles des maladies pulmonaires. Anémies, Déficiences, Asthénie post-grippale.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 4 à 6 fois par jour, avant ou après les repas. *Enfants* : De 3 à 5 ans, 1 cuillerée à café. Au-dessus de 5 ans, jusqu'à 2 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

Laboratoires SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Docteur en Pharmacie

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp 16-85, 16-86, 16-87.

PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur sang boulonnais.

Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoré.

Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance Surmenage, Convalescences, Paludisme, Déchéances organiques.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

Posologie. — 2 ampoules par jour aux repas.

Aucune contre-indication.

Prix de vente au public : 18 francs.

Littérature et échantillons :

PHARMACIE BIOLOGIQUE

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV^e).

Adr. télégr. Ibacépède-Paris 102.

(Tél. : Ségur 11-40.)

Fournisseur des hôpitaux civils et militaires.

PANSMACOL

du Docteur Moity

Pansement colloïdal gastro-intestinal

Formule. — Kaolin colloïdal, 80 gr. — Silicate de calcium activé, 10 gr. — (5 gr. absorbent 268 cc. CO₂). Silicate de magnésium précipité, 10 gr.

Indications. — Toutes les gastrites — Toutes les colites — Toutes les inflammations de l'intestin — Ulcères — Hyperchlorhydrie — Désinfection gastro-intestinale — Aérophagie.

Aucune contre-indication.

Le PanSmacol est très agréablement aromatisé et édulcoré sans addition de sucre (pas d'amorce de digestion). Il peut être prescrit aux diabétiques.

En suspension dans un demi-verre d'eau, il présente la facilité d'absorption d'une crème vanillée.

Mode d'emploi. — *Traitement de base :* une grosse cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau, le matin à jeun.

Se coucher 5 minutes sur chaque côté.

Une deuxième cuillerée à soupe le soir, avant le dîner.

Traitement symptomatique : une cuillerée à soupe au moment des douleurs et à n'importe quel moment.

Prix, la boîte de 200 grammes : 15 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire J.-O. MOITY

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,

199, boulevard Bineau — NEUILLY-sur-SEINE.

PANSOLANÉE

Composition. — Extrait de belladone spécialement titré.

Indications. — Excellent médicament susceptible d'apaiser l'état nerveux des malades anxieux, quelle que soit l'origine de cette anxiété, elle est la médication apaisante par excellence en ce sens qu'elle apaise l'excitation nerveuse de ces malades en même temps qu'elle calme les douleurs qu'ils ressentent et leur rend confiance.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 injection sous-cutanée par jour.

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 par jour le matin ou le soir de préférence après une selle.

Boîte de 15 ampoules.

— de 8 ampoules.

— de 30 comprimés.

— de 16 suppositoires.

— de 8 suppositoires.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

PANSTOMASE

1° Ampoules buvables ; 2° Dragées à noyau mou.
Méthodes de Castle et de Whipple associées.

Composition. — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'antrum pylorique et de jéjunum de porc. Renferme donc à la fois tous les principes antianémiques et tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécrétine.

Indications. — Toutes les Anémies, Apepsies, Asthénies, Cirrhoses du foie, Cholécystites, Tuberculoses, Achylies, Dyspepsies, Gastrites chroniques, hypoacides, Entérococolites, Diarrhées.

Posologie. — Ampoules buvables : de 1 à 3. Dragées, de 2 à 6 par jour, aux repas, ou en dehors des repas.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Dragées : 16 francs.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

PANTAVOINE

CORBIÈRE

Principes excito-toniques de l'avoine employés pour la première fois en thérapeutique.

Composition. — Complexe lipido-protéique, huile essentielle aromatique, hormone, alcaloïdes de l'avoine.

Propriétés thérapeutiques. — Action excito-tonique sur le système neuro-musculaire.

Indications. — Asthénies de toute origine, Insomnie, Oligurie, Impuissance sexuelle, Diabète, Anémie et asthénie des coloniaux, Surmenage des intellectuels.

Posologie. — 6 comprimés par jour, 2 avant chaque repas.

Présentation. — Comprimés. Boîte de 60.

Prix : 14 francs.

Produit naturel, puissant, dénué de toute toxicité.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

- 0 gr. 01 de **Pantopon « Roche »**,
- = 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
- = 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
- = 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et modes d'emploi.

Voie buccale :

PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(Flacon de 20.)

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon « Roche ».)

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.

Voie Hypodermique :

PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon « Roche ».)

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules.

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-25 (poudre), 504-26 (sirop), 504-23 (comprimés), 504-22 (ampoules).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

PANVITA

Vitaminothérapie intégrale,

Composition. — Vitamines A, B¹, B², C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

Mode de présentation. — Comprimés, gouttes.

Indications. — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences vitaminiques, Diabète.

Deux formes : *Comprimés, Liquide* (chaque boîte contient : flacon n° 1 : vitamines Hydrosolubles ; flacon n° 2 : vitamines Liposolubles.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 comprimés ou XX gouttes de chaque solution par jour. *Enfants* : 4 comprimés ou XL gouttes. — *Adultes* : 6 comprimés ou LX gouttes.

Prix : Panvita comp. : 20 frs (flacon de 42 comp.).
Panvita liquide : 22 francs (2 flacons de 10 cc.).

Laboratoire A. DEFFARGE, Docteur en Ph¹⁰
188, cours de la Somme — BORDEAUX (Tél. : 91-609.)

PANXYLON LOGEAIS

GRANULÉ

Diglycérrophosphate de soude et de choline.....	4 gr.
Cinnaméine totale naturelle du Baume du Pérou	0 gr. 4
Extrait cérébral	1 gr. 2
Extrait moelle osseuse.....	1 gr. 2
Extrait moelle épinière	1 gr. 2
Extrait de rate	3 gr. 5
Sucre vanillé, Q. S. pour	100 gr.

Indications :

Amaigrissements, Asthénies (fixation phosphorée), Convalescences grippales ou post-infectieuses.

Modification des sécrétions bronchiques.

Traitement adjuvant du PANXYLON injectable.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à café trois fois par jour avant les trois principaux repas.

Prix au public : la boîte, 19 fr.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAIS
GOBERT, Pharmacien,

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

PANXYLON LOGEAIS

INJECTABLE

Auto-défense de l'organisme par immunisation indirecte contre les infections aiguës, subaiguës et chroniques.

Injectations sous-cutanées ou intramusculaires atoxiques indolores et alternées de :

1° Cinnaméine (amp. A) :

Cinnaméine totale du Miroxylon	
Pereirae.....	0 gr. 10
Oleum olivæ neutrum déshyd	5 cc.

2° Campholine (amp. B).

Camphorate de choline	0 gr. 02
Soluté physio. stab. saturé de camphire droit	5 cc.

Pharmacodynamie :

La Cinnaméine totale LOGEAIS est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et naturels.

Elle est donc plus active que le seul Cinnamate de Benzyle préparé synthétiquement.

La Cinnaméine a une action immunogène et leucocytaire intense (Brown Séquard).

La Campholine joint à son pouvoir cholestérinogène une intense action toni-cardiaque et sympathico-tonique ainsi qu'une augmentation considérable des globules rouges. L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse réalise l'auto-défense de l'organisme.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences médicales et chirurgicales, Etats infectieux des voies respiratoires, Fièvres éruptives, Gripes, Prétuberculose, Infections pulmonaires spécifiques ou non, Fistules, Adénites, Périviscérites.

Mode d'emploi. — Une ampoule chaque jour, en alternant les ampoules A et B. Dans les cas aigus, injecter simultanément les 2 ampoules A et B en en mélangeant le contenu dans la même seringue.

Avant injection, faire tiédir l'ampoule Cinnaméine.

PANXYLON GRANULÉ : entre les séries de PANXYLON injectable.

Forme et prix au public :

8 amp. 2 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B)....	18 fr.
8 amp. 5 cc. (4 amp. A, 4 amp. B).....	22 fr.
12 amp. 5 cc. (6 amp. A, 6 amp. B)....	29 —
PANXYLON GRANULÉ. La boîte.	19 —

Laboratoires

des Spécialités Scientifiques LOGEAIS

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 40-15 et 16.)

PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du *Carica Papaya*, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications. — Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Élixir « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 18 francs.

Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 francs.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés « TROUETTE-PERRET » à la *Papaïne*. Prix au public : 14 francs.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

A souvent réussi après échec de toute autre médication. Prix au public : 18 francs.

Bien formuler : *Elixir, Sirop, Cachets, Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste

PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

PAPAVÉRINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, avec effet électif sur les *muscles striés* de tout l'organisme. Dilatateur énergique des coronaires, hypotenseur. Stimulant respiratoire. Equilibrant du système végétatif.

Indications. — Angine de poitrine. Spasmes artériels en général. Migraine. Spasmes gastro-intestinaux (constipation, vomissements, hyperchlorhydrie). Dysménorrhée membraneuse. Asthme, coqueluche, toux quinteuses et émétisantes.

Présentation. — Granules titrés à 2 centigrammes de chlorhydrate de Papavérine rigoureusement pur (alcaloïde du *Papaver species*).

Posologie. — 5 à 15 granules par jour. Chez l'enfant (coqueluche) débiter par 1/4 de centigramme par année d'âge *pro die*, pour arriver progressivement à 1 centigramme et demi.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).

Tél. : Nord 40-58.

PAPAVÉRYL

Chlorhydrate de papavérine chimiquement pure.

Indications. — *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entéocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée, etc...

Présentation : Existe sous trois formes :

- 1^o Tube de 20 comprimés dosés à 4 cgr. par comprimé.
Prix : 20 francs.
- 2^o Boîte de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 4 cgr. par ampoule. Prix : 15 et 24 francs.
- 3^o Boîte de 6 suppositoires dosés à 4 cgr. par suppositoire.
Prix : 13 francs.

Posologie :

2 à 6 comprimés par jour et plus. Chez l'enfant 1/4 de comprimé par année d'âge.

Laboratoire ORRILLAR

J. LAVALLE

245, rue de Vaugirard — PARIS

(Tél. : Suffren 78-88).

PAQUETS ALCALS

Les Paquets Alcals s'adressent à l'appareil digestif (estomac, foie, intestin). Ils ont pour but de réaliser la médication alcalino-sodique sous une forme simple et pratique.

Il existe *trois spécialités* distinctes, différentes par leurs formules pour s'adapter aux *nourrissons*, aux *enfants*, aux *adultes*.

Ce sont les :

Paquets Alcals-Nourrissons.

Paquets Alcals-Enfants.

Paquets Alcals-Adultes.

PAQUETS ALCALS-NOURRISSONS

Formule :

Citrate de soude hydraté.....	0 gr. 40
Sulfate de soude hydraté.....	0 gr. 50

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Agit aussi bien à titre préventif qu'à titre curatif dans les embarras gastriques, l'insuffisance hépatique, les affections cutanées (éruptions, eczéma, prurigo, strophulus), inappétence, accidents de la dentition.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant le cas.

(Prix : 9 fr. 90.)

PAQUETS ALCALS-ENFANTS

Formule :

Carbonate acide de sodium	0 gr. 50
Phosphate mono-acide de sodium hydraté	1 gr.
Citrate de sodium hydraté.....	0 gr. 80
Sulfate de sodium officinal hydraté.....	1 gr.

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Dyspepsie, gastrite, insuffisance hépatique, enterite, intoxication alimentaire, constipation, hyperchlorhydrie et dermatoses telles que prurit, boutons, acné, urticaire, eczéma, prurigo.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant l'âge.

(Prix : 14 fr. 80.)

PAQUETS ALCALS-ADULTES

Formule. — Même composition que les « Paquets-Alcals-Enfants », mais les doses des composants sont différentes.

Indications. — Mêmes indications que les « Paquets Alcals-Enfants ».

Présentations. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative, exposant les modes d'emploi.

(Prix : 14 fr. 80.)

Notices et échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCAÇON — Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences,

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

PAQUETS VÉDÉ

Antigastralgiques du Docteur de Montmorot.

Hyperchlorhydrie et affections du tube digestif.

Réalisant une chimiothérapie saturante totale de l'acidité gastrique. Les résultats obtenus ne sont nullement comparables à ceux enregistrés avec une poudre de saturation quelconque, les produits entrant en composition étant d'une pureté chimique absolue.

Hydrate de magnésie extra blanc et pur, Bicarbonate de soude sursaturé raffiné n° 1, Carbonate de chaux « précipité extra léger », Lactose de Hollande, Essence d'anis de France.

2 à 4 paquets par 24 heures aux repas.

Admis aux Assurances sociales.

Boîte de 15 paquets : 11 fr. pour 8 jours.

Boîte de 30 paquets : 18 fr. 50 pour 18 jours.

Boîte de 90 paquets : 44 francs pour 45 jours.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).
(Tél. : Roquette 97-46 et 97-47.)

PARADOLINE

Elixir. Dragées. Cachets.

1° *Elixir* : Douleurs d'accouchement, Nausées de la Grossesse, Affections hépatiques et néphrétiques.

Posologie. — *Cas aigus* : 2 cuillerées à café tous les 1/4 d'heure jusqu'à effet (1 heure maximum).

Etats chroniques : Foie, Reins : 3 à 4 cuillerées à café par jour, dans 1/4 de verre d'eau fraîche, de préférence entre les repas.

Ce traitement de fonds nécessite 3 flacons.

Composition. — Piscidia, Boldo, Arénaria, Buchu, Romarin, Bicarbonate et Salicylate de Soude, Artichaut ;

2° *Dragées* : Affections pelviennes, génitales, urinaires, **Posologie**, *Etats aigus et chroniques*, mêmes doses et mode d'emploi que pour l'Elixir.

Composition. — Kawa-Kawa, Busserole, Maïs, Piscidia, Bicarbonate et Salicylate de Soude.

3° *Cachets* : Toutes affections rhumatismales aiguës et chroniques, quelles qu'en soient les origines. Prescrire : Cachets P. A. (abréviation de Paradoline Antirhumatismale).

Posologie. — *Cas aigus et chroniques*, mêmes doses et mode d'emploi que pour l'Elixir. Comme traitement causal, recommander un repos de 15 à 20 jours entre chaque boîte.

Composition. — 1 dragée Paradoline, Quinquina Hamamelis, Lithine, Rhodine, Pipérazine.

Prix :

Elixir et dragées	18 fr.
Cachets.....	25 —
Durée : 15 à 20 jours.	

PARADOLEX

(Paradoline externe.)

Liniment concentré en flacon stilligoutte.

S'emploie en **applications** concurremment avec la

Paradoline interne, dont il renforce considérablement l'action dans les douleurs **rhumatismales**, rénales, génito-urinaires.

Analgésique externe O. R. L.

Contenance : environ 20 applications. Prix : 18 fr.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise).

(Tél. : 22).

PARAFFINO-BANDE

Bande de tricot dont le fil « laineux » spécial, buvant la paraffine, est tissé en maille « cellular » soutenant, élastiquement, une couche continue de paraffine.

Réalise l'enveloppement de paraffine armée, d'application aisée, rapide et propre. Permet la cure hyperthermale paraffinée à domicile. Donne des résultats jusqu'ici inconnus, pour la sédation des douleurs, la résorption des Œdèmes, la rénovation des tissus assouplis.

Indications antiphlogistiques. — *Entorses.* Toutes arthrites (aiguës ou chroniques, goutteuses, rhumatismales, gonococciques, traumatiques, sèches ou aiguës). *Œdèmes* (par phlébite, varices, fractures ou séquelles d'infections).

Indications sédatives. — *Toutes névralgies ou algies, Douleurs thoraciques* (intercostales, vertébrales, pleurites). *Abdominales* (vésiculaires, utéro-annexielles, gastro-intestinales).

Indications kératoplastiques. — *Ulcères variqueux. Brûlures. Eczéma rebelle, etc.*

Prix modique : 16 francs la Paraffino bande de 0 m. 15 × 3 m. indéfiniment récupérable, ainsi que la paraffine, fusible à 62°, après immersion dans l'eau bouillante.

En dépôt chez les principaux grossistes.

MM. les pharmaciens peuvent commander directement à la **Fabrique Pontissus**, 34, rue de Besançon, PONTARLIER (Doubs).

Notice sur demande.

PARAIODE

Association du complexe NaIO_3 . 5NaI avec des sels stabilisateurs.

Propriétés. — Antiseptique incolore, dépourvu de toxicité. Agit en libérant de l'iode naissant, uniquement au niveau des foyers infectieux à l'exclusion des tissus sains. N'est jamais irritant et réussit rapidement et sûrement dans de très nombreux cas où les autres antiseptiques ont échoué (leucorrhées rebelles, cystites séniles, etc.).

Indications. — Chirurgie générale : Désinfection et désodorisation des plaies. Urologie : Urétrites, cystites, etc. Gynécologie : Vaginites, métrites, toutes leucorrhées. Voir aussi : **Ovules au Paraiode.**

Doses. — Le Paraiode est délivré sous forme de solution concentrée (à 10 p. 100). Il s'emploie à la dose de 1 à 5 cuillerées à dessert par litre d'eau.

Formuler un flacon de Paraiode. — Prix : 18 fr.

PARAIODE POUR GARGARISMES

Composition. — Poudre de saveur agréable renfermant Paraiode, salicylate de soude et une faible proportion de menthol.

Indications. — Très efficace dans toutes affections de la gorge et de la bouche, angines, pharyngites, stomatites, gingivites.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau.

Formuler une boîte de Paraiode pour gargarismes. — Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du PARAIODE

DUMESNIL, Pharmacien, Docteur en sciences physiques.

48, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vau. 58-10.) Service médical. (Tél. : Ség. 43-56.)

PARATOXINE du Prof. LEMOINE

Contre la Tuberculose (Lipoïdes biliaires).

Deux formes : 1° Paratoxine A, ampoules de 1 cc. et 2 cc. pour injections sous-cutanées ;

Pilules de 0 gr. 20 pour médication interne.

Paratoxine B, ampoule de 5 cc. pour injections intralaryngées ; Capsules pour médication interne.

Action thérapeutique et usages. — Préconisée aux diverses périodes de la tuberculose en injections sous-cutanées ou intralaryngées, modifie le terrain et constitue le traitement de choix de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi. Paratoxine A : En injection sous-cutanée de 1 cc. ou 2 cc. par jour et plus. En pilules de 2 à 6 pilules par jour comme adjuvant de la médication sous-cutanée.

Paratoxine B : En injection intralaryngée tous les 2 jours pour laryngite bacillaire. En capsules dans les cas de diarrhée bacillaire.

La Paratoxine présente le grand avantage d'être inoffensive. Les hautes doses sont en général inutiles. Chez les enfants au-dessous de 12 ans, les doses doivent être diminuées de moitié.

Les injections doivent se faire assez profondément sous la peau à la limite de la couche grasseuse et du muscle.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.

PARATYRONE

Composition. — La Paratyronne est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances parathyroïdiennes, tétanies, états spasmophiles, ulcères digestifs, syndromes spasmodiques douloureux, rhumatisme chronique, certains troubles psychiques, épilepsie, chorée, tics, cataracte, oto-spongieuse, otite scléreuse, ulcères variqueux, etc.

Présentation et posologie. — La PARATYRONE est présentée en flacons de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. Les flacons, destinés en principe aux injections, s'utilisent aussi par voie orale (XXXV-VL gouttes = 1 cc.). Ampoules (boîte de 12) à 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée. Suppositoires (boîte de 10), un par jour. Solution pour pulvérisations.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA, dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

Prix. Flacon : 40 francs. **Ampoules :** 55 francs. **Suppositoires :** 40 francs. **Solution pour pulvérisations :** 45 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél : Danton 08-11.)

PARAVEININE

Gouttes.

Composition. — Iodopeptine, Extraits fluides de Marron d'Inde, Hamamelis, Cupressus, Alcoolés de Piscidia et d'Anémone Pulsatille.

Indications. — Etats variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Varicocèles, Artério-sclérose, Accidents de la Puberté et de la Ménopause.

Posologie. — XXV gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau.

Prix : 14 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Phar^{ie}
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n^o 484.

PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

Description. — **Parlax** est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de roche, sa pureté est absolue.

Indications. — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. **Parlax** doit être prescrit : dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes, aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

Enfants : 1 cuillerée à café deux fois par jour.

Parlax doit être pris de préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe — MONTREUIL-s-BOIS (Seine).
(Tél. : DIDEROT 32-52.)

PAROLAGAR

(Marque déposée.)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar.

Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue).

Huile de paraffine.....	65 %
Agar-agar, eau distillée.....	35 %
	<hr/> 100 %

Traitement de choix de la constipation habituelle, doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar phtaléiné* (étiquette rouge).

Huile de paraffine.....	65,00 %
Phénolphtaléine	0,32 %
Agar-agar, eau distillée.....	34,68 %
	<hr/> 100,00 %

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuiller à potage. Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

Posologie.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir, pendant le repas, ou matin et soir, si nécessaire.

Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

Enfants : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

LABORATOIRES DU PAROLAGAR

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Propriétés thérapeutiques. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant*, mais *curatif*.

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an	X à XXX	gouttes.
— de 1 à 5 ans	XX à LX	—
— de 5 ans et au-dessus..	XX à C	—
Adultes	XXX à C	—

Prix : 12 francs.

THIRIET et Cie

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

(Tél. : 40-65.)

PARULCINE

Composition. — Pepsine injectable en solution neutre.

Présentation. — Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 10 de Pepsine.

Indications. — Ulcus gastro-duodéal.
Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires, à raison de 3 par semaine (commencer par 1/4 de cc., en augmentant de cette quantité, jusqu'à 2 cc.) série de 15 injections.

Prix : 15 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PARVULA

Semences Laxatives.

(*Plantago Ispaghula* Roxl.)

Propriétés. — Ces semences, produit végétal naturel, fournissent dans l'intestin un mucilage abondant qui provoque des contractions péristaltiques et réveille la tonicité de l'intestin par action réflexe. Dépourvues d'action offensive sur la muqueuse, elles la lubrifient simplement.

Indications. — Le rééducateur intestinal, traitement rationnel de la constipation, laxatif de choix de la grossesse, des entéritiques, des malades à hypersensibilité intestinale, etc...

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café le soir avec le potage, ou le matin avec le petit déjeuner. Peuvent être également prises pures ou incorporées à de la confiture, purée de légumes, etc.

Prix : 12 fr. 75.

Échantillon gratuit sur demande.

Laboratoire A. BRUNSCHWIK

Pharmacien de 1^{re} classe

3 bis, rue Vallier — LEVALLOIS-PERRET.

(Tél. : Pereire 40-46.)

PASSICARBONE

Charbon animal purifié. Charbon végétal.

Charbon végétal activé.

Extraits sédatifs végétaux (*Passiflorine*).

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer des charbons d'origine variée. C'est à cette formule que répond le *Passicarbone*.

D'autre part, les affections gastro-intestinales s'accompagnent souvent de réactions spasmodiques, de troubles neuro-végétatifs ou de troubles psychiques. L'addition aux charbons des sédatifs végétaux qui ont fait le succès de la *Passiflorine Réaumur* font du *Passicarbone* un remède complet dans tous ces cas.

Composition. — Le *Passicarbone* est un granulé fondant dont 5 grammes (soit pratiquement deux cuillerées à café) contiennent 2 grammes, soit 40 p. 100 de charbons sélectionnés et actifs, et la valeur d'une cuillerée à café de *Passiflorine*.

Usages :

Aérophagie et formes diverses des dyspepsies flatulentes.

Dyspepsies nerveuses.

Gastrites diverses. — Gastrites infectieuses, gastrites post-anesthésiques, gastro-entérites, etc.

Ulcères.

Affections intestinales. — Colites ou typhocolites, Colibacillose, diarrhées diverses, entérites, grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, fermentations intestinales.

Affections hépatiques (Ictère, lithiase biliaire, etc.).

Intoxications.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas.

La boîte : 15 francs.

Le Passicarbone S (*Passicarbone simple*) est un granulé à base de charbons (50 p. 100) sans addition de sédatifs végétaux. Il s'emploie aux mêmes doses.

G. REAUMOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie

115, rue de Paris — BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;
XX gouttes alcoolé de *Crataegus oxya-*
cantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin
que les auteurs américains ont comparé
au bromure, et par le *Crataegus* dont l'ac-
tion tonicardiaque et équilibrante du sys-
tème nerveux est bien connue (Huchard,
Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du
cœur d'origine nerveuse (palpitations,
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la
vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équilib-
rant du système nerveux : une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : une à trois
cuillerées à café le soir.

Prix : 15 francs.

G. RÉAUBOURG, docteur en pharmacie,
115, rue de Paris
BOULOGNE-SUR-SEINE.

PASTICAÏNE

Composition. — Comprimés antiseptiques et anesthésiques à base de jaune d'acridine et de chlorhydrate de laroocaïne.

Avantages. — Le jaune d'acridine est à la fois plus actif et moins toxique que les autres colorants antiseptiques habituellement employés.

Le chlorhydrate de laroocaïne, supérieur à la cocaïne comme anesthésique local, est moins toxique ; il n'irrite pas les tissus et n'a pas d'action secondaire. Le chlorhydrate de laroocaïne ne figure pas au tableau B.

Indications. — Traitement préventif et curatif de toutes les affections du pharynx (angines, amygdalites, laryngites) et de la bouche (stomatites).

Posologie. — 8 à 10 pastilles par jour, sauf indications spéciales du médecin traitant.

Prix : 10 francs, la boîte de 30 pastilles, pour un traitement de 4 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

Tél. : Archives 34-68.

PASTILLES HOUDÉ

au Chlorhydrate de cocaïne.

Pastilles dosées à 1 milligramme de Chlorhydrate de cocaïne.

Indications. — Stomatites, *angines, pharyngites aiguës*. Calmant des gastralgies, des vomissements. Excellent sédatif des *toux nerveuses* et des hoquets. Calmant des irritations laryngées. Véritable *gargarisme sec*.

Doses. — 6 à 12 pastilles par jour, suivant l'âge.

Formes diverses. — Cocaïne simple ; Cocaïne et chlorate de potasse ; Cocaïne et borate de soude ; Cocaïne et menthol ; Cocaïne, borate et chlorate ; Cocaïne, borate et menthol.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

(Tél. : Nord 40-58.)

PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille correspond à la formule suivante :

Composition :

Chlorhydrate de cocaïne	0,0002
Stovaine	0,0003
Menthol	0,005
Borate de soude.....	0,02
Chlorate de potasse.....	0,06
Sucre et gomme Q. S. pour une pastille de 1 gr. env.	

Mode d'action. — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

Indications. — Affections de la gorge (angines, amygdalites, laryngites, stomatites, etc...). — Désinfection de la bouche (fumeurs, haleine fétide, etc...). — Hygiène de la voix (chanteurs, professeurs, conférenciers, etc...).

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Prix : 5 francs.

Durée : 7 à 8 jours.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis, PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 34-68.)

PÂTE À L'EAU ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.

Pâte à l'eau stable, poreuse, aseptique, porphyrisée. Ne renferme ni vaseline, ni corps gras, souvent mal tolérés, facile à enlever.

Deux formes :

Aloplastine simple.

Indications. — Eczémas suintants, dermatites irritables.

Aloplastine Ichthyolée à 5 p. 100.

Indications. — Acné, Eczéma, Séborrhée, Furunculose, eczématides, parakératose, Ulcère variqueux, Lupus érythémateux, Prurit, Prurigo, Psoriasis enflammé.

**Laboratoires Biologiques de
L'ÎLE-DE-FRANCE**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

PÂTE À L'EAU R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et séléniés naturels
de La Roche-Posay.

Indications. — Lésions suintantes peu étendues, eczémas irritables, eczémas infantiles. Pâte décongestionnante, agit comme pansement humide.

Mode d'emploi. — S'applique à la spatule, en couche légère sous enveloppement de préférence au renouvellement laver à l'eau chaude additionnée de quelques sachets de sels de bains R. P. (Deux à six suivant la quantité). Dès l'assèchement panser au cérat R. P. et ultérieurement au Cold Cream naturel R. P.

Poudrer toujours légèrement avec la » Poudre Dermique R. P. ».

Présentation et prix :

Pâte à l'eau R. P. de La Roche-Posay. Le grand pot.....	14 fr.
Sels de bains R. P. La boîte de 30 sachets	10 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	8 —
Cold Cream naturel R. P. Le tube	10 —
Poudre dermique R. P. La boîte	10 —

Laboratoires des PRODUITS DERMIQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

PÂTE DENTAIRE « INAVA » IMMUNISANTE

Pâte gingivale bleue au Pyodarsénol.

Sans colorant soluble.

(Vaccin gingival Inava B associé au Sulfarsénol).

Antipyorrhéique. — Antispirillaire.

Pour prévenir :

*La suppuration des gencives, la carie dentaire
et le déchaussement des dents.*

Et toutes Gingivites, Stomatites et Pyorrhée.

En tubes d'étain pur :

Tube ord. 6 fr. 75 — Tube g. mod. 8 fr. 50.

E. GUIGNIER, pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

PÂTE GINGIVALE A L'ACÉTYLARSAN

Préparation où se trouvent associés l'ACÉTYLARSAN, spirillicide bien connu et le ricinoléate de sodium, savon bactéricide, antitoxinique et générateur d'anti-virus.

Indications. — Traitement préventif des infections fuso-spirillaires, des gingivites et des stomatites aiguës ou chroniques. Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Prévention de la carie dentaire.

Mode d'emploi. — Dans les cas de lésions pyorrhéiques étendues ou importantes, appliquer la pâte sur les gencives pendant 15 minutes 1 fois par jour, après brossage préalable à l'aide d'une brosse dure.

Dans les cas légers ou à titre prophylactique, employer la pâte gingivale comme une pâte ordinaire, suivant les règles habituelles.

Présentation. — En tube d'étain.

Prix de vente, le tube : 8 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PÂTE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.
(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : Chlorhydrate d'amyléine et chlorate de potasse). Même saveur plaisante.

Prix au public : 6 francs.

Laboratoires LEGENDRE et Cie.

Section D.-S. — Houilles (S.-et-O.).

Dépôts généraux pour la vente en gros,

France, Colonies et Protectorats :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,
à Bruxelles-Maritime.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 1045-

PATE PECTORALE ROBIN

Composition :

Pâte d'un goût agréable, à base de Chlorhydrate d'Ethylmorphine (Méthylcodéine, non stupéfiant).

Indications :

Toux, pharyngites, laryngites.

Posologie :

Doses quotidiennes. *Adultes* : Une vingtaine de bonbons. Moitié pour les enfants.

Prix : 6 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.
(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes.)

Deux formes : Ampoules et Pilules

Composition. — Salicyl-arséni-oxybenzénol-magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

Mode d'emploi. — 1° Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de 1 centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2° Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

Prix : Ampoules, 20 francs ; Pilules, 15 francs.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).
(Tél. : Dorian 47-00.)

PAVÉRINOL LALEUF

Composition. — Chaque capsule contient très exactement :

Papavérine Chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

Propriétés et indications. — Puissant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire.

Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

Formes. — Capsules glutinisées.

Posologie et mode d'emploi. — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 à 12 capsules par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 capsules : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium.)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium, 0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — Ampoules de Pavéron dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

Dose : 1 ampoule à la fois.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. —

Dose : 1 à 2 dragées à la fois.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

PAVONOL

Alcaloïdes totaux de la Jusquiame associés à la Morphine et au Camphre.

Composition. — Morphine (Chlorhydrate) 0 gr. 01, Codéine (Phosphate) 0 gr. 01, Extrait hydro-alcoolique de Jusquiame 0 gr. 02, Sulfo-camphonate de sodium 0 gr. 10, Sérum physiologique camphré Q. S. pour une ampoule de 2 cc.

Propriétés. — Sédatif du système nerveux, Toni-cardiaque, Neutralisation des phénomènes douloureux en toutes circonstances.

Forme et posologie. — Une à deux ampoules de 2 cc. par 24 heures en injections hypodermiques.

Ce médicament s'emploie également par voie buccale ou en petit lavement à garder, par voie anale.

Boîte de 8 ampoules de 2 cc. Prix : 20 francs.

Laboratoire CASTEL

1, Place de la Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien,

Ingénieur-chimiste, licencié ès sciences.

PAXÈNE

Trois synergies phytothérapiques.

Sédatif Nervin : Valériane et Cypripedium.

Antispasmodique : Chaton de saule et Passiflore

Cardiotonique : Cereus grand. et Aubépine.

Indications : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

Doses. — *Insomnies nerveuses* : 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

Nervosisme en général : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

Provence 20-20 et 58-43.

PAXYL**Ampoules buvables de 5 cc.**

Synergie Phytothérapique non toxique de haute valeur dans toutes les dystonies du Sympathique.

Formule. — 1 ampoule buvable de 5 cc. contient les principes actifs stabilisés de :

Philantus Ninuri	1,25	Ballota Suaveolens	0,50
Salix Alba	2,50	Piscidia Erythrina.....	0,25
Passiflora Incarnata.....	1	Gelsemium Sempervirens...	0,25
Cratægus Oxyacantha	1	Hyoscyamus Niger.....	0,10
Boldoa Fragrans	1	Glycyrrizza Glabra	4
Guarana Paulinis	0,10		

Propriétés. — Sédatif nervin et antispasmodique de premier ordre, abaissant la tension artérielle et régularisant le tonus sympathique.

Indications. — Tous états névropathiques, Tachycardie, palpitations, angoisse, Dyspnées, douleurs précordiales, Hypertension, mal de mer, gastrite nerveuse, etc.

Posologie. — Troubles Vagosympathiques : 1 ampoule dans un peu d'eau ou dans une infusion 1/4 d'heure avant les deux principaux repas.

Insomnies : Une troisième ampoule le soir en se couchant.

Prix : La boîte de 24 ampoules buvables de 5 cc : 36 francs.

Laboratoires AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris.

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

PECTINE OBERLIN

Une cuillerée à soupe contient :

Benzoate de soude	0 gr. 50
Eau de laurier-cerise	0 gr. 20
Sulfogaiacolate de potasse	0 gr. 50
Sirop de morphine	5 gr.
Sirop de punch..... Q. S. P.	20 gr.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires.

1 cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par 24 heures.

Prix : 11 francs.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

PECTORAL COULLOUX

Pour les enfants.

Composition. — Teinture de belladone, Alcoolature d'aconit, Teinture de drosera, NaBr, Benzoate de soude, Ext. d'ipéca, Analgésine, Thiocolum, Sirop de Codéine, Sirop de Coquelicots, Sirop de Tolu.

Action et indications. — Le Pectoral Coulloux calme les toux les plus rebelles, modère les sécrétions ; régularise les fonctions essentielles de l'économie et facilite la guérison de toutes les maladies des voies respiratoires.

Le Pectoral Coulloux est expectorant, sédatif et antispasmodique en même temps.

Doses et mode d'emploi. — Dans les 24 heures :

1° De 1 à trois ans : 2 à 4 cuillerées à café ;

2° De 3 à 5 ans : 4 à 6 cuillerées à café ;

3° De 5 à 8 ans : 3 à 6 cuillerées à dessert ;

4° De 8 à 10 ans : 3 à 4 cuillerées à soupe.

A donner loin des repas. Pour six jours ou deux jours de traitement suivant l'âge.

Laboratoires COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

PÉLARGON DE NESTLÉ

(Lait de Marriott)

Lait entier acidifié en poudre, non sucré, préparé par Nestlé pour l'alimentation infantile normale ou diététique. Antidyspeptique, anti-anémique.

Composition :

Matière grasse	26,0 p. 100
Matières protéiques	25,2 —
Lactose	36,2 —
Substances minérales (dont cendres 5,5 p. 100)	6,3 —
Acide lactique	3,3 —
Eau	3,0 —
Acidité totale exprimée en acide lactique	4,2 —

492 calories par 100 gr.

Haute valeur nutritive sous faible volume, extrême digestibilité, composition constante, excellente conservation.

Indications. — Alimentation des prématurés, dystrophiques, dyspeptiques, vomisseurs, de certains diarrhéiques, des eczémateux, des coquelucheux, pneumoniques, cysto-pyélitiques. Alimentation de certains nourrissons sains intolérants à tout lait normal.

Posologie. — (Voir dépliant joint à la boîte).

Prix : La boîte, de 225 gr : 12 fr. ; de 500 gr : 20 fr.

Société NESTLÉ.

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

PELVIFORMINE

Spécifique urinaire total, Prostatisme. Décongestif, antiseptique sédatif des voies urinaires : Reins, vessie, prostate, Urèthre.

Formule :

Kawa-kawa poudre....	0 gr. 05	Extrait de piscidia	0 gr. 01
Théobromine	0 gr. 05	Poudre de Gelsémium ..	0 gr. 02
Phénacétine	0 gr. 05	Citrate d'hexaméthylène tétramine	0 gr. 05
Caféine.....	0 gr. 025	Benzoate de soude	0 gr. 10
Lupulin	0 gr. 05	Bleu de méthylène....	0 gr. 02
Bromure de camphre .	0 gr. 05		
Extrait de jaborandi....	0 gr. 01		

Pour 1 comprimé.

Présentation. — 50 comprimés : 15 francs la boîte.

Particularités. — Action diurétique, décongestive, essentiellement sédativ par ses composants (piscidia, gelsémium, bromure de camphre, lupulin), antiseptique (urotropine, benzoate de soude, bleu de méthylène), non déprimante (caféine).

Emploi. — Doses faibles : 4 comprimés par jour aux repas. Doses fortes 8 à 10 comprimés.

Laboratoires du NORMOGASTRYL

(Spécifique gastrique total.)

J. OLIVE

14, rue des Minimes — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PELVINAL (Suppositoires)

Toutes algies pelviennes.

Composition :

Onguent napolitain.....	0,05
Extrait thébaïque	0,02
— de belladone	0,01
— de jusquiame.....	0,01

pour un suppositoire.

Triple action rapide, *loco dolenti*. Sédativ
décongestive, antiseptique.

Indications :

Métrites, Salpingites, Congestion utéro-ovarienne, Cellulites diffuses, Règles douloureuses, Suites de couches, Prostatites, Cystites, Urétrites postérieures, ténésme, etc...

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoire FOSSET

MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).

(Tél. : 11.)

PELVURYL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chlorure de Magnésium, Méthylène-citrate d'Urotropine, Camphre monobromé, Acétate de Potasse, Benzoate de Soude, Buchu, Uva Ursi, Mauve.

Propriétés. — Antisepsie des voies hépato-biliaires, du rein et de la vessie. Décongestionnant du petit bassin.

Indications. — Syndrome entéro-rénal, Cholécystites, Lithiase biliaire, Congestion du Foie, Pyélonéphrites, Cystite, Urétrites, Prostatites, Hémorroïdes, Colibacillurie, Congestions Utéro-Ovariennes.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 6 à 10 comprimés par jour.

Prix : 18 francs (le flacon de 60 comprimés).

Enregistré au Lab. national de Cont. des Médicaments N° 950-2.

Laboratoire du « QUINA BLOT »

38, boulevard de Strasbourg — TOULOUSE.

(Tél. : 210-16.)

PENGHAWAR DES ILES

(Hémostatique Végétal.)

Composition. — Penghawar Djambi finement trié à la main.

Propriétés. — Hémostatique très sûr ; sans contre-indications, sans danger ; à effet très rapide.

Indications. — Hémorragies dentaires et nasales, Hémostase après applications de sangsues. Toutes coupures superficielles persistant à saigner.

Mode d'emploi. — Pratiquer une légère compression à l'aide de petits tampons sur les points hémorragiques.

Echantillons sur demande.

Prix { Boîte grand modèle : 5 francs.
au public { Sachet d'urgence : 2 francs.

D. RINGEADÉ, pharmacien.

FOSSEBOUDEAU-BLAYE (Gironde).

PENGHAWAR VICARIO

Hémostatique végétal, stérilisé, constitué par les poils jaunâtres et soyeux de certaines fougères arborescentes croissant à Java, Sumatra, Bornéo, dans la Haute-Asie, en Cochinchine et au Tonkin. Après triage, ces fibres sont stérilisées à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi. — En petits tampons qu'on applique sur les points hémorragiques.

Indications thérapeutiques. — Dans les Epistaxis spontanées ou à répétitions (en remplacement de l'amadou, de l'antipyrine ou du perchlorure de fer). Dans les Plaies opératoires des fosses nasales, pour éviter une perte de sang inutile et dégager ensuite le champ opératoire. Comme préventif d'une Epistaxis secondaire après l'emploi de l'Adrénaline. Hémorragies dentaires.

Prix : l'étui : 8 francs. La boîte de poche : 2 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

PÉPIODON HENRY

Composition. — Combinaison de l'iode, avec les produits de la dégradation moléculaire des protéiques poussée jusqu'aux acides aminés, par la trypsine et l'érepsine.

Chaque cc. contient 50 mgr. d'iode pur, à l'état combiné. Le Pépiodon est la combinaison idéale de l'iode parce que :

1° C'est un produit dérivant d'une hydrolyse tryptique et érepsique poussant la dégradation des peptones jusqu'à sa phase ultime, *acides aminés*. De ce fait, le *Pépiodon* est plus assimilable que les peptones iodées.

2° C'est un produit où l'iode a un dosage toujours constant de 50 mgr. par cc.

3° Le *Pépiodon* n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite donc pas la muqueuse stomacale.

Doses. — *Adultes* : 40 à 60 gouttes par jour aux repas. Ces doses peuvent être augmentées ; certains médecins prescrivent 100 à 200 gouttes par jour sans la moindre intolérance.

Enfants : 5 à 10 gouttes et plus suivant âge.

Flacon de 45 gr. : 16 francs, pour 15 jours.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE,

PÉPIONE

Gouttes.

Formule. — Iode pur, Peptone, Essence citron, Eau distillée.

Présentation. — En flacon compte-gouttes.

Indications thérapeutiques. — Contre le lymphatisme, scrofule, asthme, emphyseme, goitre, obésité, artériosclérose, affections du cœur et des vaisseaux, goutte, rhumatismes.

Mode d'emploi :

Adultes : XX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : V à X gouttes 2 fois par jour, suivant âge.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo : 40-83.)

PEPSINACID

(Granulé)

La médication chlorhydro-pepsique, présentée sous une forme stable, d'un goût agréable, de conservation parfaite et d'activité contrôlée par digestion artificielle.

Composition. — 1 cuiller à café (3 gr. de granulé) renferme : V gouttes HCl dilué, 0,25 de pepsine.

Indications. — Troubles gastriques liés à l'Hypochlorhydrie, Pesanteurs, Anorexie, Troubles sympathiques post-prandiaux.

Troubles intestinaux : diarrhée par insuffisance gastrique, colites.

Traitement complémentaire dans les anémies graves. Dénutrition. Anachlorhydrie des néoplasiques.

Mode d'emploi. — 1 cuiller à café de granulé dissous dans la boisson habituelle, tout au début et pendant les repas.

Le flacon : 14 francs.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 12-35.)

PEPSIPAINÉ

Composition. — Association des trois ferments digestifs : pepsine, papaïne, maltine, concentrés sur sucre en milieu légèrement citrique.

Indications. — La PEPSIPAINÉ s'emploie dans tous les troubles digestifs des adultes et des enfants. Dyspepsie, gastro-entérite et entérite aiguë de l'enfance.

Posologie. — 1 cuillère à café ou à dessert au début des repas.

Présentation. — Granulé fondant, de goût très agréable.

Prix : 15 francs.

Laboratoire du D^r FONTÉNEAU
B.-F. DELAUNAY, Pharmacien,
JOUÉ-LÈS-TOURS (Indre-et-Loire).

PEPSOBYL

Médication rationnelle de la constipation et de la dyshépatie.

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Pepsine	0,10	Extrait de Combretum...	0,015
Boldo	0,025	Extrait de Rhamnus Pur-	
Bile	0,05	shiana	0,015
Extrait d'artichaut.....	0,025	Poudre de Belladone	0,004

Avantages. — Association synergique de produits d'une valeur thérapeutique universellement reconnue avec le plus puissant des cholagogues : le Calomel.

Mode d'emploi :

Si prédominance des troubles hépatiques : 2 à 4 dragées le matin à jeun.

Si prédominance des troubles gastro-intestinaux : 1 à 2 dragées aux 2 principaux repas.

Enfants au-dessus de 13 ans : 1/2 dose.

Indications générales. — Toutes les insuffisances glandulaires digestives d'origine hépatique et leurs conséquences physiologiques (auto-intoxication, constipation, lithiase, hypertension, artério-sclérose, troubles nerveux et psychiques, angor biliaire, etc.).

Prix : 15 francs.

Échantillons sur simple demande.

Laboratoire de CHIMIO-OPOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo — PARIS (11^e).

PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson
Extraits d'Œuf et de Lait
Farine de blé dans l'enrobage.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

Enfants ; Moitié de ces doses.

Prix au public ; dragées : 16 fr. 25 ; granulés : 16 fr. 50

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales.*

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholestites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 16 fr. 25 ; granulés : 16 fr. 50

Pour 10 jours de traitement.

Autorisé par les *Assurances Sociales.*

Laboratoire des produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTARGYL AGUETTANT

Sirop peptoné à teneur élevée

d'Argent colloïdal

Anti-infectieux, Antitoxique, Antithermique,
très actif,

à grande facilité d'emploi.

Aucun des inconvénients des sels d'Argent.

Indications. — Etats infectieux buccopharyngés et du tube digestif. Etats septicémiques. Gripes, amygdalite, sinusite, bronchite, congestion pulmonaire, colites, gastro-entérites, dysenteries, fièvre typhoïde, phlébites, dyscrasies sanguines. Staphylococcies : furonculose, anthrax, acné.

La pénétration parfaite de l'argent colloïdal étend son action à tout l'organisme.

Dose. — *Préventive* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Curative : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Une demi-heure avant les repas, avec un peu d'eau.

Particulièrement indiqué pour les enfants, ils en sont friands ; on leur donne 1/2 dose.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

PEPTODIASE

Stimulant gastrique.

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association de :

Chlorure de calcium.

— magnésium.

— sodium.

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

PEPTO-FER JAILLET

Composition. — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

Avantages. — Le fer dans le PEPTO-FER du Dr Jaillet est animalisé par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine est rapidement augmenté, sans aucune fatigue ni pour l'estomac, ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle anti-anaphylactique.

Le PEPTO-FER du Dr Jaillet n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

Indications. — Anémies.

Forme pharmaceutique. — Elixir.

Doses. — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café après les repas dans un peu d'eau.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 14 fr. 50 au public.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS.

PEPTOGIL

Peptones gastriques et pancréatiques.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antianaphylactique polyvalente, spécifique des anaphylaxies d'origine digestive.

Indications. — Urticaires, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin, et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

Conditions d'emploi. — 3 fois par jour, 1 heure avant les repas, croquer 1 à 2 dragées. *Adultes* : 2 dragées.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1 dragée.

Prix de la boîte de 56 dragées : 16 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.

VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1^{re} classe

PEPTO-KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable à base de Glycérophosphates et de Kola.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, Stimulant pour les sportifs, etc.

Prix : 19 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTO-MAGNÉSIE VASSAL

Composition. — *Granulé de Peptones Polyvalentes* (de viande, d'œuf, de lait, de gélatine, de poissons, de céréales) et de *Sulfate de Magnésie pur sec*, goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant Hépatobiliaire, puissant Cholagogue qui agit efficacement *sur le foie et les voies biliaires*, puissant antianaphylactique polyvalent.

Indications et posologie. — Cholécystite, congestion du foie, Ictère, Entéro-Colites mucomembraneuses, Lithiase, constipation, asthme, urticaire, Eczémas, Vertiges et migraine.

1 à 3 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau chaude, le matin à jeun.

Prix de la boîte : 15 francs.

Echantillons sur demande :

Aux Laboratoires Léon DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

PEPTOMALTONE DEJARDIN

Préparée dans le vide, à basse température, donc sans destruction des vitamines.

Trois préparations :

- A. *Etiquette verte* : sans œufs ni cacao.
- B. *Etiquette bleue* : sans œufs, mais aromatisée au cacao.
- C. *Etiquette violette* : sans œufs, mais avec arôme café.

Indications. — Pour combattre toutes les déficiences de la nutrition, remédier aux déphosphatisations.

Posologie. — De 2 à 4 cuillerées à café par tasse, mais après refroidissement, à bonne température, du liquide choisi comme excipient, eau, lait, café ; préalablement bouilli.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 250 grammes environ.

Établissements DEJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 03-04.)

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE de viande totale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés. — Granulé.

Dose. — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou une cuillerée à café de granulé.

Prix : Comprimés : Le tube, 14 francs.

— Granulé : La boîte, 15 francs.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone et de fer.
Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur
d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants*
1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstitution des hématies.

Indications. — Tous les états anémiques
et chlorotiques.

Prix : *Gouttes* : 14 francs.

Elixir : 19 francs. — *Vin* : 22 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTONE VASSAL

Viande de bœuf digérée.

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf.

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé. Agréable au goût.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Prix : 22 fr. 50

Laboratoires Léon DANJOU

LILLE.

PEPTOPANCREASI SERONO

Se recommande dans tous les cas de troubles digestifs.

Renfermant la totalité des ferments gastriques et pancréatiques, la **Peptopancreasi Serono** représente une thérapeutique très complète, basée sur les recherches scientifiques les plus modernes. On emploie la **Peptopancreasi Serono** dans toutes les dyspepsies gastro-intestinales, ainsi que pour corriger les insuffisances et l'atonie de l'estomac. Se prend à la dose d'une cuillerée à café dans un peu d'eau avant chaque repas.

Le flacon : 21 francs.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 56-71.

Fournisseur des hôpitaux et des grandes compagnies de chemins de fer.

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique	15 cgr.
— entéro-pancréatique ..	15 —
— hépatique	15 —
— biliaire	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

PEPTOZYM

Composition :

Extrait de pancréas	0 gr. 10
Extrait de bile	0 gr. 05
Boldine	0 gr. 00075
Extrait de muqueuse gastrique..	0 gr. 15
Poudre de noix vomique	0 gr. 025

En deux enrobages concentriques, le premier contenant les deux derniers composants et soluble dans l'estomac, le deuxième soluble dans l'intestin et contenant les trois premiers composants.

Indications. — Toutes dyspepsies par insuffisances sécrétoires et par insuffisance de la motricité, stimulant de la sécrétion et de la motilité gastro-intestinale, dysfonctionnements gastriques à tendance hypo.

Présentation et prix. — 15 francs la boîte de 45 dragées.

Posologie. — 2 ou 3 dragées au début des deux principaux repas.

Laboratoire R. BOUYSSOU
CHAMBOIS (Orne).

PERANDRONE

Propionate de testostérone.

CIBA

Hormone orchitique de synthèse.

Propionate de testostérone préparé synthétiquement selon le procédé original de Ruzicka. Représente, à l'heure actuelle, la substance possédant l'activité hormonale la plus élevée, telle qu'elle est révélée par la méthode des tests : test-coq (croissance de la crête du chapon) ; test-rat (augmentation du poids de la vésicule séminale).

Indications. — Le prostatisme avec troubles urinaires associés. Les affections chroniques par déficience endocrine : syndrome adiposogénital, puberté retardée, certains états d'asthénie et de psychasthénie liés à une carence testiculaire.

Ampoules :

(Une ampoule de 1 cc. = 5 milligrammes d'hormone, soit environ 250 unités internationales).

Doses. — Une ampoule, en injection sous-cutanée ou intramusculaire, une à deux fois par semaine pour un traitement moyen. Celui-ci peut être, si besoin est, intensifié et les injections peuvent se renouveler tous les trois jours, ou même tous les deux jours.

Boîte de 4 ampoules.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON (Tél. : Moncey 43-26)

PÉRASUROL

Éliminateur des déchets uriques.

Composition :

Salicylate de lithine.....	2	grammes.
Phénylcinchoninate de soude	2	—
Tartrate de diméthylpipérazine.....	3	—
Anhydrométhyl. citr. d'urotropine ..	3	—
Phosphate de soude.....	4	—
Excipient effervescent aromatisé pour 100 gr.		

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — Rhumatismes, goutte, lithiase rénale, arthritisme, coliques néphrétiques, gravelle.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 8 à 10 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôles sous le n° 1081-2.

G. BAETZ, pharmacien
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21).

PERCAÏNE

Chlorhydrate de la diéthyléthylène-diamide
de l'acide α -butyloxycinchoninique

CIBA

ANESTHÉSIQUE LOCAL.

Action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface. Médicalement, son action analgésique est précieuse dans le traitement des états douloureux les plus divers.

Anesthésie par infiltration. — Solution de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

Anesthésie rachidienne. — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1.500 (JONES), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (QUARELLA).

Anesthésie des muqueuses, du nez, de la gorge, de l'urètre, de la vessie. — Solutions de 1/1.000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

Présentation :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés.

Ampoules de divers titres et contenances pour infiltration et rachi (demander Notice).

PERCAÏNAL CIBA

**Onguent analgésique et antiprurigineux,
à base de Percaïne.**

Calme la douleur et la démangeaison dans toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau et des muqueuses. Assure le repos et le sommeil. Favorise la guérison des lésions.

Indications principales. — Eczéma, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Prescrire : Un tube Percaïnal.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERCALCINE

Composition. — Association d'arrhénal, de divers sels de chaux (en particulier du silicate), de fenugrec et de girofle.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant intensif; Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatisation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures.

Grossesse et allaitement.

Mode d'emploi :

Apprendre 20 jours par mois.

Adultes : 3 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

Prix : 16 francs. La boîte de 30 cachets.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX°).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

PERCALCIUM

Composition. — a. *Solution de Chlorure de Calcium*, stabilisée et dosée de façon à ce que 1 goutte = 0,02 cgt de sel.

b. *Solution de Chlorure de Manganèse*, jouant le rôle de catalyseur et rendant le *Percalcium* beaucoup plus actif que les préparations similaires.

c. *Excipient spécial* masquant la saveur particulièrement désagréable du Chlorure de Calcium.

Propriétés thérapeutiques. — a. *Anti-Hémorragique*: Action curative dans les maladies hémorragiques, les hémorragies viscérales : épistaxis-hémoptysies, métrorragies, etc., action préventive des hémorragies post-opératoires.

b. *Recalcifiant* : 1° la *Tuberculose* et les *Etats prétuberculeux*, dans toutes leurs formes, dans toutes leurs phases évolutives ; 2° les *Troubles du Métabolisme calcique*: Rachitisme, Grossesse, Tétanie, Décalcification osseuse, Caries dentaires.

c. *Régulateur du Métabolisme de l'eau*: Résorption des épanchements séreux d'origine rénale, hépatique, pleurale.

d. *Anti-choc*: États colloïdoclasiques : choc hémoclasique ; rhinorrhée ; asthme, rhume des foins ; urticaire, accidents sériques.

Posologie. — Chez l'enfant : V à XX gouttes par année d'âge jusqu'à 8 ans ; au-dessus de 8 ans et chez l'adulte, de XX à CC gouttes.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Percalcium : A. JOURDIN

6, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI°).

PER-EXTRAITS CARRION

Extraits opothérapiques injectables préparés selon une technique spéciale.

Composition. — Solutions désalbuminées correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. (Corps jaune, Cortex. Foie, Ganglions lymphatiques, Hypophyse antérieure, Hypophyse totale, Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocarde, Orchitique, Ovaire, Pancréas, Placenta, Prostate, Rein, Rate, Substance grise, Surrénale, Thymus, Thyroïde, Utérus). Pour le Per-Parathyroïde, une ampoule de 1 cc. correspond à 0,05 d'organe.

Voir dans ce dictionnaire : *Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Surrénalien, Per-Thymique.*

Forme. — Ampoules de 2 cc. (sauf Parathyroïde de 1 cc., Perhépatique et Perthymique de 2 et 5 cc.).

Indications. — Troubles endocriniens.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire, tous les jours, ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERGLANDÈNE HÉPATIQUE

Extrait de Foie injectable, délipoïdé, désalbuminé.

Indications. — Anémies, cirrhoses, ictères, dyspepsie, insuffisances hépatiques au cours des maladies aiguës et chroniques, en particulier de l'intoxication éthylique. Toutes manifestations anaphylactiques, cutanées, respiratoires, nerveuses, etc. Dépression mélancolique et nombreuses manifestations convulsives.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais. Prix : 34 fr.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.
Prix : 32 fr.

Conduite du traitement. — Une injection par jour ou tous les deux jours de 1 cc.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
Tél. : Ségur 26-87.

PERGLANDÈNE ORCHITIQUE

Extrait d'Organe injectable, délipoïdé, désalbuminé.

Indications. — *Chez la femme*: troubles de la ménopause et de la puberté, anxiété génitale, troubles liés à la continence, aménorrhée rebelle. *Chez l'homme*: infantilisme, impuissance, sénilité précoce. *Dans les deux sexes*: obésité, engelures, acrocyanose.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais. Prix : 20 fr.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais. Prix : 18 fr.

Conduite du traitement. — Une injection tous les deux jours de 1 cc. ou suivant prescription médicale.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
Tél. : Ségur 26-87.

PERGLANDÈNE OVARIEN

Extrait d'Ovaire injectable, délipoïdé, désalbuminé.

Indications. — Insuffisances ovariennes, troubles de la puberté, de la ménopause naturelle ou opératoire, aménorrhée ou dysménorrhée.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais. Prix : 37 fr.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais. Prix : 35 francs.

Conduite du traitement. — Une injection par jour, ou tous les deux jours, de 1 cc. en série de 20 ou de 10 injections en dehors de la période menstruelle.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
Tél. : Ségur 26-87. □

PER-HÉPATIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de foie désalbuminé, correspondant à 1 gramme ou 2,5 gr. d'organe frais par ampoule.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Insuffisance hépatique au cours des maladies aiguës et chroniques (tuberculose notamment). Intolérance à certaines médications (chryso et arsénothérapie), Cirrheses.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 à 12 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRICOLS DU D^r LEGROS

Présentation. — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde, d'élasticité parfaite.

Avantages. — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

Composition. — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol.

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques.

Prix : Boîte de 6 : 18 francs.

Boîte de 20 : 40 francs.

Inscrit aux Ass. Sociales.

Laboratoires G. LESOURD

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

PÉRISTALTINE

CIBA

Laxatif-eccoprotique.

Glucoside pur du *Rhamnus purshiana* agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

Indications. — Constipation chronique : formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

Comprimés — Cachets — Ampoules.

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 cachets ou comprimés, 1 à 3 ampoules. — *Enfants* : Quart ou demi-dose de l'adulte suivant l'âge. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de 20 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Prix : 14 francs.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PERMYASE

Composition. — Suc désalbuminé et stérilisé de larves de *Lucilia sericata*.

Formes :

PERMYASE LIQUIDE : Ampoules de 5 cc., et de 2 cc., de suc de larves dilué dans du sérum physiologique, résorciné à 1/1 000.

PERMYASE GÉLIFIÉE : Tube de 50 gr. de gelée à base de suc de larves, résorcinée à 1/500.

Indications. — Toutes les suppurations ouvertes, aiguës ou chroniques

Chirurgie : Pansements post-opératoires dans la chirurgie septique.

Anthrax, furoncles, panaris, abcès divers.

Médecine : Ulcères variqueux, eczéma suintant, brûlures s'accompagnant de sphacèle.

Oto-rhino-laryngologie : Ozène, otites, pansements post-opératoires.

Mode d'emploi. — Applications locales en méchages ou pansements, à renouveler selon les cas deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux ou trois jours jusqu'à nettoyage et bourgeonnement de la plaie.

Prix de la boîte de 5 ampoules de 5 cc. : 25 francs.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 20 francs.

Prix du tube : 20 francs.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

PER-OVARIEN CARRION

Composition :

Extrait spécial d'ovaire total, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule.

Forme : Ampoules de 2 cc.

Indications.

Insuffisances ovariennes, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhées.

Posologie et mode d'emploi :

1 ampoule en injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 ou 12 ampoules.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 à 12 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

Constitution. — Préparation stable à base de Persulfates alcalins purs, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

Propriétés. — Active le métabolisme général, elle crée le besoin de s'alimenter, elle réalise véritablement l'oxygénothérapie interne, par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs.

La **Persodine Lumière** est un apéritif par action secondaire, son mode d'action est profond, il stimule les besoins organiques et ne crée pas seulement l'envie de réplétion gastrique.

Les aliments ingérés avec faim sous l'influence de la **Persodine Lumière**, sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde. Particulièrement précieux chez les tuberculeux.

Indications : Anorexie, Hypo-nutrition.

(Tuberculose, Chloro-Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Neurasthénie, Convalescence, etc.).

Éviter l'usage de la **PERSODINE LUMIÈRE** chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

Doses courantes. — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

Formuler. — Flacon de comprimés de **PERSODINE LUMIÈRE**.

Prix : 9 francs.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

PER-SURRÉNALIEN CARRION

Composition. — Extrait spécial de surrénale totale, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule, et renfermant 1 mgr. d'Adrénaline (1/2 milligramme par cc.).

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Indications. — Insuffisances surrénales aiguës des maladies infectieuses, syndrome secondaire de la diphtérie maligne. Insuffisances surrénales chroniques, maladie d'Addison, asthénie, hypotension artérielle.

Posologie et mode d'emploi. — 1/2 à 1 ampoule à la fois en injection sous-cutanée. Commencer éventuellement avec moins encore, pour tâter la susceptibilité du malade.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PER-THYMIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de thymus, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. et à 2 gr. 50 d'organe par ampoule de 5 cc.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Ectopies testiculaires. Troubles de croissance et de nutrition du jeune enfant. (Insuffisance de la première dentition.) Syndrome adiposo-génital, Infantilisme, Certaines Dysménorrhées ou Aménorrhées.

Posologie et mode d'emploi. — 1 injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 à 9 injections.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 25 francs.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 40 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 à 12 jours.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires.

Inhalations — Gargarismes.

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient :

Baume du Pérou.....	0 03	Borate de soude.....	0 60
Essences aromatiques.....	0 025	Bicarbonate de soude.....	0 30

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza, grippe.

Posologie et mode d'emploi. — 1^o *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2^o *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur ; vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Prix : 14 fr. 50 (8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-1 ;

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

PÉRUSOL

Savon au Baume du Pérou et Benjoin.

Indications. — Toilette quotidienne, Soins hygiéniques de la Peau et des Muqueuses.

Dermatoses superficielles (Rougeurs, acné, boutons, gerçures, dartres).

Lavage des régions avant et après application de pommade, crèmes, corps gras.

Savon de choix pour la Toilette des Enfants.

Formes :

Savon de toilette :

Le pain 5 fr.

Savon pour barbe :

Le bâton 5 fr.

Savon liquide : Chirurgie, gynécologie.

Le flacon 16 fr.

Le bidon 30 fr.

Les Laboratoires du PÉRUSOL

31, rue Gambetta — LA ROCHELLE.

PERVOSINE

Composition. — Extr. stabilisé de marron d'Inde, de gui, de séneçon, Bourse à Pasteur, Bourdaine Passiflore, Cratægus, Anémone, NaBr.

Sans alcool.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Tous les troubles de la circulation du sang aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Doses. — XV à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, trois fois par jour avant chaque repas.

Prix du flacon, réglementé : 15 francs.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1081-3.

G. BAETZ, Pharmacien,
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21.)

PHAGOLYSINE

Liquide rigoureusement titré. Endotine, Arséniate de Potasse, Fer assimilable.

Médication tonique type de toutes les convalescences et de tous les états de déficience organique.

Composition. — Par cuillerée à café:
1/2 milligramme d'endotine,
1/4 de milligramme d'arsenic.
5 milligrammes de fer assimilable.

Indications. — Puissant reconstituant, Préventif, Curatif des affections pulmonaires, prétuberculose, anémies, asthénies, infection des voies respiratoires, convalescences des chroniques et surmenés, croissance, localisations bacillaires, rachitisme.

Indication majeure. — Prévention de la bacillose pulmonaire et tonique général.

Contre-Indications. — Période menstruelle, température élevée, formes congestives, hémoptysies, formes trop avancées des affections pulmonaires.

Pendant la crise. — Eviter les Acidités et les Crudités.

Doses maxima prophylactiques et toniques. —

Enfants: 10 ans. Par cuillerée à café (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Jeunes gens: 16 ans. Par cuillerée à dessert (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Adultes: Par cuillerée à soupe (dans un peu d'eau immédiatement avant les deux repas).

Ces doses peuvent varier selon les indications du médecin traitant.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 365-I.

Prix de vente au public : 23 francs.

Laboratoires de la PHAGOLYSINE

14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-27.)

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoiétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie pur	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours.

Se vend en boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Phagosthyl Infantile pour enfants de 8 à 15 ans.

Ampoules de 2 cc. : 14 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(*Pour adultes.*)

(Exempt de strychnine.)

Formule :

Cacodylate de manganèse	2 centigr.
— de soude	10 —
— de magnésie	8 —
— de calcium	10 —
Eau distillée	5 cc.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 francs.

Phagosthyl Mangané Infantile : ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans.

Prix : 14 francs.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, r. de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e). (Tél. : Ség. 55-12.)

PHAGURYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 363-5.

Forme. — Dragées.

Composition. — Santalol β , Essence de
Cèdre, Térébenthine, Salicylate de Phé-
nyle, Lupulin, Formine.

Propriétés pharmacodynamiques. —
Antiseptique des voies urinaires, Décon-
gestif, Diurétique.

Indications. — Blennorragie, Rétrécis-
sements, Urétrites, Cystites, Prostatites.

Mode d'emploi. — Six, huit à douze dragées
par 24 heures.

L'étui : 15 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

PHARYNGASEPTYL

Composition. — Résorcine, Méthylpyrocatechine,
Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque,
Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyter-
pènes purifiés.

Forme. — Poudre.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Sinusites,
Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe
tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites,
Angines diverses.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans
un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en
gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhala-
tions, vaporisations, lavages et bain nasal.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

PHARYNGOLÉINE

Composition. — Adrénaline, benzoate de soude, bromure de sodium, analgésine, alcool de menthe, glycérine neutre, eau de laurier cerise.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestive.

Indications. — Toutes affections inflammatoires et microbiennes de la bouche et du carrefour aéro-digestif, stomatites, gingivites, aphtes, muguet, pharyngites, laryngites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau en bains de bouche ou gargarismes, ou en pulvérisations avec un pulvérisateur type Lucas-Championnière.

Pure en badigeonnages.

Présentation et prix. — Un flacon : 16 francs.

**Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique.**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

PHARYNXOL

(Rhinopharynxoil)

Capsules nasales d'huile balsamique

Composition. — Huile végétale diffusible, neutralisée, d'arôme agréable, à base de santalol et de camphre.

Tolérance absolue : aucun élément caustique, irritant ou toxique.

Action. — Lubrifie, décongestionne et déterge, sans les irriter, les muqueuses du nez et de la gorge : grâce à son pouvoir de diffusion, cette huile se répand dans toutes les voies aériennes supérieures ; elle exerce une action particulièrement élective sur les cordes vocales.

Indications. — Coryza, aigu ou chronique. — Maladies du nez, de la gorge, du larynx, de la trachée. — Affections grippales des voies respiratoires supérieures. Protection contre les multiples maladies infectieuses à début rhino-pharyngé et en particulier contre celles du premier âge (Rougeole, scarlatine, etc...). Spécifique rationnel contre l'enrouement.

Mode d'emploi. — Couper préalablement le col de la capsule à sa partie supérieure ; par une légère pression, en verser le contenu dans chaque narine, en prenant soin de renverser la tête en arrière.

Prix : 12 francs.

Formule. — Chaque capsule d'environ 0 gr. 50 contient :

Santalol.....	0 gr. 0036
Camphre.....	0 gr. 0030
Huile végétale aromatisée.....	0 gr. 4934

Laboratoire de Pharmacologie Générale

VIAL, et C^{ie}, 8, rue Vivienne. — PARIS

(Tél. : Gut. 27-03.)

PHÉNA

(Phénaseptyl V. de Christmas.)

Composition. — Phénate de soude, Ac. salicylique, Ac. benzoïque, Menthol, Formol, Ess. aromatiques, dans véhicule spécial glyciné sodique.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1591-I.

Propriétés. — Puissant Antiseptique, Bactéricide, Analgésique Cicatrisant, Décongestif, Phagocytaire.

Indications. — Dans tous les cas exigeant un puissant antiseptique en Oto-rhino-laryngologie, Stomatologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynécologie, Hygiène, etc.

Préventif des maladies d'origine microbienne.

Présentation et mode d'emploi. — PHENA (liquide) : Hygiène, bains de bouche, lotions : X à XX gouttes dans un verre d'eau tiède. Gargarismes, pansements, lavages après extractions dentaires, etc. : 1 cuill. à soupe par litre d'eau bouillie. Injections vaginales : 1 à 2 cuill. à soupe par litre d'eau.

PHENA (ovules) : En pansement gynécologique.

Prix. — PHENA : flacon P. M., 10 fr. ; flacon G. M., 15 fr.

PHENA : boîte de 10 ovules, 18 fr.

Littérature et échantillons aux
Laboratoires « PHENA »

Boîte postale N° 5 — LIMOGES (Haute-Vienne).

PHILENTÉROL

Vaccin polyvalent buvable.

Composition. — Association d'une émulsion de colibacilles avec des filtrats : colibacillaire, entérococcique, staphylococcique.

Emploi préventif.

Vaccination pré-opératoire. — Prévient et évite les complications et accidents consécutifs aux interventions chirurgicales, en particulier les phlébites post-opératoires.

Huit jours avant l'intervention, prescrire une ampoule par jour pendant les six premiers, et deux par jour pendant les deux derniers.

Emploi curatif.

Propriétés thérapeutiques. — Action antimicrobienne directe et immédiate sur l'agent causal de l'infection. Rétablissement de l'équilibre humoral intestinal et des fonctions hépato-rénales et gastriques, antisepsie des voies génito-urinaires.

Indications. — Affections gastro-intestinales : gastro-entérites, colites, diarrhées, grippe intestinale, syndrome entéro-rénal, appendicites, fièvres typhoïdes. Vaccination post-opératoire. Une ampoule par jour pendant dix jours. Reprendre la cure si nécessaire après un repos de huit à dix jours.

La boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Boîtes de 50 pour MM. les Chirurgiens, les cliniques et hôpitaux

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS. — (Tél.: Auteuil 24-52, 53 et 54.)

PHILODERME YLDRA

Pommade au précipité blanc et au Salol.
Décongestive, Réductrice et Cicatrisante.

Indications. — Streptococcies et Staphylococcies cutanées, Eczémas rebelles, Psoriasis, Dartres, Brûlures, Engelures, Érythèmes, Prurits et Plaies de toute nature.

Contre-indication. — Applications simultanées de produits iodés.

Avantages. — Ni caustique, ni irritant.

Mode d'emploi. — Étendre à l'aide d'une spatule sur une compresse de gaze hydrophile. — En application matin et soir.

Présentation. — En tube de 50 grammes.
Prix : 10 francs.

Laboratoire du Docteur E. ARDELY

20, rue Antoinette — PARIS (XVIII^e).

O. C. P. et C. N. P. F.

(Tél. : Montmartre 02-98.)

PHILOGASTRINE

(Comprimés.)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylorique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

Composition p. 100 :

Lactobiose	90
Citrate de soude	2
Bicarbonate de soude	8

Emploi. — 2 comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

Indications. — Toutes dyspepsies.

Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc... Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

Prix : 10 francs.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 13-38.)

PHLEBOS

Forme. — Dragées et Gouttes.

Composition. — 2 dragées ou XV gouttes correspondent à : Intrait de marron d'Inde Dausse : 0,006. Extrait de Berberis : 0,20. Extrait de Ficaire : 0,20. Extrait de Seneçon : 0,20. Extrait d'anémone : 0,10. Extrait de noix vomique : 0,02.

Actions thérapeutiques. — Vasoconstricteur périphérique énergique, sédatif puissant, régulateur, emménagogue, décongestif, hémostatique et tonique vasculaire.

Indications. — Spécifique des hémorroïdes, varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorragies viscérales et utérines, hémoptysie, Dysménorrhée, Aménorrhée.

Posologie. — XV gouttes ou 2 dragées avant les deux principaux repas.

Prix : 15 francs (dragées et gouttes).

Voir *Suppoalogs*, spécifique des règles douloureuses.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

(Tél. : Moncey 14-35).

PHLÉBOSINE CARRION

Association de produits opothérapiques et d'extraits végétaux.

Composition :

Phlébosine M. : Thyroïde, Orchitique, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Phlébosine F. : Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Hypotonie vasculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour au repas. Bien spécifier M. ou F.

Présentation et prix. — Le flacon de 24 comprimés : 20 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 à 12 jours.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PHLÉBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

Avantages. — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

Indications. — Troubles circulatoires, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, etc.

Forme. — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

Dose. — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

R. C. Seine 440-107.

(Tél. : Roquette 86-84.)

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1122-6.

PHLOXIODE

Composition et propriétés thérapeutiques. — Solution huileuse à base :

1° *D'iode spécial*, correspondant à quelques milligrammes par cc.

2° *Xylol* (0,02 par cc.) qui provoque une leucopénie légère, aboutit à un rajeunissement leucocytaire, au réveil des réactions d'activité, entretenus et exaltés par l'iode à dose homéopathique.

3° *Camphre* (0,10 par cc.) qui agit comme toni-cardiaque et avec :

4° L'Eugénol (0,03 par cc.) comme anti-thermique et antiseptique.

Indications. — S'adresse à tous les états infectieux. Médication d'allure spécifique dans les infections grippales, typhiques, *pneumococciques*, (broncho-pneumonies, pneumonies).

Condition du succès. — La mise en train immédiate du traitement : *frapper vite et fort*.

Posologie. — *Cas légers, moyens* : 1 ampoule par injection. *Cas grave désespérés* : 2 ampoules par injection. Tous les jours, au besoin matin et soir jusqu'à la chute de la température. Dans les cas graves et rebelles, quel que soit l'âge et quelle que soit l'infection, ne pas hésiter à employer d'emblée la dose de 2 ampoules.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs pour un traitement de 5 à 10 jours.

Laboratoires G. GAZARD

94, rue Michelet — ALGER — Tél. : 81-56.

PHONODIOSE

Composition. — Le phonodiose est un composé d'iode et d'un naphène sélectionné, dosé à 1 gr. d'iode pour 1.000. Le phonodiose est délivré en ampoules de 5 cc.

Propriétés. — Cette nouvelle combinaison permet d'utiliser les propriétés bactéricides de l'iode sans avoir à redouter la corrosivité qui jusqu'ici en rendait l'emploi malaisé. Aux effets thérapeutiques de l'iode s'ajoute l'action lénitive, adoucissante, protectrice du naphène. Aussi, obtiendra-t-on des résultats remarquables dans toutes les affections des tissus superficiels, dans le cas d'inflammation ou d'infection de la peau ou des muqueuses, que ce soit en oto-rhino-laryngologie, en gynécologie, en urologie, en dermatologie, en petite chirurgie, etc...

Posologie. — Le phonodiose s'applique sur toutes les parties faciles à atteindre à l'aide d'un tampon de coton ou, de préférence, à l'aide de l'atomiseur Latour.

Lorsque le traitement doit être appliqué sur des points difficilement accessibles, il est indispensable de se servir des appareils spéciaux, créés pour cet usage, dénommés les atomiseurs médicaux.

Les applications se font, alors, par des pulvérisations très fines sur les tissus malades, répétées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Oto-Rhino-Laryngologie : Sinusites, otites, coryzas, laryngites, angines...

Phtisiologie : Trachéites, bronchites, asthme...

Gynécologie : Endométrites, métrites cervicales, bartholinites...

Urologie : Urétrites et prostatites blennorragiques.

Dermatologie : Psoriasis, acnés, impétigo et toutes affections du derme.

Petite Chirurgie : Phlegmons, anthrax, furoncles, plaies vari-queuses, etc... et toutes plaies infectées.

LABORATOIRES F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe — MONTREUIL-s-BOIS(Seine). Tél. : Diderot 32-52.

PHOSBIOSE

Sel magnésien calcique de l'acide anhydro-méthylène diphosphorique.

Produit naturel retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient 20 p. 100 environ de phosphore, associé intimement aux ions magnésium et calcium en une molécule organique complexe, dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

Indications. — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie, Cancer, Convalescences longues et difficiles.

Présentation :

Granule : la 1/2 boîte, 10 francs ; la grande boîte, 18 francs.

Cachet : dosés à 0 gr. 50, la boîte de 24 cachets : 14 francs.

Comprimés : dosés à 0 gr. 25, la boîte de 50 comprimés : 14 francs.

Poudre pure : le flacon de 30 gr. : 25 francs.

Posologie. — *Poudre* (formules magistrales) : 0 gr. 50 à 2 gr. par jour ou 2 à 8 mesures de 0 gr. 25.

Comprimés { *Enfants* : 2 à 4 par jour.
 { *Adultes* : 4 à 8 par jour.

Cachets : 2 à 4 par jour.

Granulés { *Bébé* : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

 { *Enfants* : 2 Cuillerées à café par jour.

 { *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS.

PHOSCAMINE

**Granulé recalcifant hématogène,
Activateur de la nutrition.**

Principes actifs. — Glycérophosphates de chaux, magnésie, fer et manganèse. Méthylarsinate de soude, acides aminés provenant de l'hydrolyse des hématies.

Indications. — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Néoplasmes, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 05-21.)

PHOSMA

Puissant reconstituant général.

Composition :

Acide phosphorique	1 gr.
Chlorure de Magnésium pur	1,20
Teinture de noix vomique.....	0,05
Teinture de cannelle	0,50
Teinture d'écorce orange amère	1 gr.
Carbonate de Lithine	0,005

Pour 100 gr.

Indications thérapeutiques. — Anémie, Asthénie, Chlorose, Surmenage, Croissance, Convalescence, Inappétence, Stimulant du Système nerveux.

Avantages. — Bien toléré par les hépatiques et les tuberculeux. Saveur très agréable.

Présentation. — Forme Elixir, flacon de 310 cc., de 10 à 20 jours de traitement. Prix : 16 fr. 50.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant ou pendant les repas, pur ou coupé d'eau.

Enfants (à partir de 5 ans) 1 à 2 cuillerées à café avant ou pendant les repas, coupé d'eau.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoires PHOSMA

Marcel FREMONT, Docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux. — Pharmacien de première classe,
143, Cours de la Somme. — BORDEAUX.

PHOSOFORME

Principe actif. — Ethers éthylorthophosphoriques.

Bibliographie : Prof. Bing, Bâle. — Prof. Cavalié, Bordeaux. — Prof. Escat, Toulouse. — Prof. Gérard, Lille. — Prof. Laignel-Lavastine, Paris. — Mercadal y Peyri, Barcelone. — Prof. Rémond, Toulouse. — Prof. Spillmann, doyen Faculté Nancy, etc.

Indications. — *Correcteur des troubles de la nutrition.* — Dyspepsies. — Etats alcalosiques (dermatoses, asthme, etc.). — Déminéralisation (décalcification, carie dentaire, rachitisme, phosphaturie), azotémie, colibacillose, rhumatisme chronique.

Tonique général et nerveux. — Neurasthénies. — Convalescences. — Fatigues cérébrale et musculaire, grippe, anémie, anorexie, tuberculose.

Mode d'emploi. — *Solution et solution arsénée :* 2 cuillérées à soupe par jour, chaque dose diluée dans un grand verre de la boisson habituelle (eau, vin, etc.), *sucrée de préférence*, et absorbée au cours des repas.

Gouttes. — C gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix : 20 francs le flacon ; 10 fr. 50 le 1/2 flacon.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). Tél. : 32.

PHOSOL

(Forme Élixir et forme Granulé)

PHOSOL ÉLIXIR

Composition. — Acide phosphorique officinal, Glycérophosphate de soude, Teinture de noix vomique. Extrait de ratanhia, Phosphate bicalcique, Vin kola muscat, Excip.

Indications. — Suralimentation, convalescence, croissance et anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — Dans un grand verre d'eau ou de vin : 2 cuillérées à soupe par jour pour les adultes ; pour les enfants 2 cuillérées à café. A ne pas donner aux enfants au-dessous de 9 ans.

Prix : 15 francs.

PHOSOL GRANULÉ

Composition. — Sulfate manganèse, Acide phosphorique, Hypophosphite de chaux, Extrait quinquina, Extrait kola, Alc. oranges douces, Cacao, sucre vanillé.

Indications. — Suralimentation, convalescence, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 1 cuillérée à dessert à chaque repas. *Enfants :* 1 cuillérée à café à chaque repas.

Prix : 13 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Laboratoire QUINET

143, rue du Temple — PARIS. (Tél. : Archives 42-27.)

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour. S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Prix :

1 cc. : 17 fr. — 2 cc. : 20 fr. — 3 cc. : 22 fr. — supp. : 17 fr.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PHOSOVIGOL

Composition. — Éthers mono et diéthylphosphoriques directement assimilables, Acide orthophosphorique.

Forme. — Élixir.

Indications thérapeutiques. — Neurasthénies, Surmenage intellectuel, Anémies, tous les troubles de la cellule nerveuse, États dyspeptiques, Convalescences, États alcalosiques, Phosphaturie, Colibacillose, Rhumatisme chronique.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Prendre au moment des principaux repas une cuillerée à soupe de « Phosovigol » dans un grand verre d'eau ou de boisson sucrée.

Enfants : Dans les mêmes conditions, prendre une cuillerée à café.

Prix :

Petit modèle	12 fr. 50
Grand modèle	22 fr. »

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-8

PHOSPHAN CADUCIA

Acidifiant. Sthénique. Recalcifiant.

Première utilisation des acides organiques mono et diméthylphosphoriques.

Ensolution stable et contrôlée par une nouvelle technique de dosage. (*Bulletin de la Société Chimique*, t. XIX, 1898, page 883 ; *Journal de Pharmacie et de Chimie*, 8^e série, t. XX, 1934, pages 160 à 167.)

Formule :

Acide diméthylphosphorique.....	2,11 p. 100
Méthylphosphate acide de calcium.....	2,90 —
Phosphate diacide de calcium.....	0,49 —
	<hr/>
	5,50 p. 100

Forme. — Solution.

Avantages :

- Teneur la plus élevée en principe actif : concentration 5,50 p. 100, soit 0 gr. 75 d'acide organique libre par cuiller à soupe.
- Tolérance parfaite pour les muqueuses digestives.
- Utilisation de l'Ion calcium ne pouvant se fixer dans les tissus qu'en combinaison phosphorique.
- Action tonique immédiate.

Indications thérapeutiques :

- 1^o *Toutes les asthénies* : musculaires, nerveuses et psychiques.
- 2^o *Tous les états de déminéralisation* : phosphaturie, grossesse, pré-tuberculose et tuberculose.
- 3^o *Tous les états alcalosiques.*
- 4^o *Rhumatisme, dyspepsies, asthme, diabète.*
- 5^o *Coli-Bacillose et syndrome entéro-rénal.*

Posologie :

Une semaine de traitement alternée avec une semaine de repos.

Adultes : 2 cuillerées à dessert ou à soupe par jour. Chaque cuillerée consommée midi et soir, au cours du repas, dans un grand verre d'eau rougie ou sucrée.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 20 francs.

1 flacon pour 2 semaines de traitement.

Laboratoires CADUCIA

Y. Jund, pharmacien.

95, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 90-60.)

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarsénisée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 15 francs la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os
en particules infinitésimales
en suspension dans un liquide isotonique.

Doses quotidiennes

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage.

Enfants et Nourrissons : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 14 francs le flacon pour 10 jours de traitement.

PHOSPHATE DE CHAUX IRRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard
et « Vitamine D » cristallisée.

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées Potage. *Adolescents* : 2 cuillerées à dessert. *Enfant* : 2 cuillerées à café.

Prix : 19 fr. 50 le flacon pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

PHOSPHIGEM

Réalise sous forme de granulés fondants d'un goût très agréable, en combinaison stable et inaltérable, la formule de Joulie :

Acide orthophosphorique	50 gr.
Phosphate acide de soude.....	100 —
Granulés fondants, Q. S	1 000 —

Propriétés et indications. — Tonique général et nerveux, reminéralisateur, correcteur des troubles de la nutrition, le Phosphigem est indiqué dans :

Neurasthénie, Impuissance, Anémie, Anorexie, Convalescence, Déminéralisation, Etats Alcalosiques et leurs manifestations : Dermatoses, Rhumatisme chronique. Dyspepsies, Phosphaturie, Lithiase phosphaturique, Congestion hépatique.

Présentation. — Granulés d'un goût exquis, en boîte métal. Prix : 16 fr. 50. (150 gr. environ)

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe après les repas.

Enfants et vieillards : 1/2 dose.

Innocuité absolue, aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 1244-4.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Central 01-35.)

PHOSPHOBIOL

Forme. — Solution aromatisée au sirop de curaçao et de citron.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Chlorh. quinine	0,05
Hypoph. de Manganèse	0,05
Hypoph. de chaux.....	0,05
Citrate de fer	0,025
Sulf. de strychnine	0,001

Propriétés thérapeutiques. — Puissant reconstituant général, Accélérateur de la nutrition. Favorise l'augmentation de poids et provoque l'appétit.

Indications. — Toutes dépressions organiques : Croissance, Anémies, Surmenage, Neurasthénie, Convalescences, etc...

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau deux fois par jour avant les repas.

Prix : 16 francs. — Durée du traitement : 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. GUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalin.

Forme. — Granulé fondant soluble, de goût agréable.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire SERINDAT

4, rue Lecomte-de-Nouy — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 53-48.)

PHOSPHOCALCASE

du docteur Paul FERRIER

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

Propriétés thérapeutiques. — *Médication anti-ostéorragique et de Recalcification physiologique.*

Indications. — *Croissance, Troubles digestifs, Déficiences calciques, Tuberculose.*

Formes. — *Poudre* : 3 semaines de traitement environ. Une cuillerée à café après chacun des 3 repas pour un adulte.

Comprimés : 2 comprimés = 1 cuillerée à café de poudre, 1 à 3 après chaque repas.

Granulés : Médecine infantile et états de croissance, 1/4 à 1 cuillerée à café après chaque repas.

Laboratoire de la Phosphocalcase
J. JOUFFRAY, pharmacien.

BOURGOIN (Isère).

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; *enfants* 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SEGUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaiacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Prix : 16 fr. 50

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue. Reconstituant physiologique, de goût agréable.

Composition. — **Phospholéose A** : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

Phospholéose B : même composition, mais sans arsenic.

Indications. — Lymphatisme, prétuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

Présentation. — Une seule forme : liquide.

Posologie. — De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas. Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Phospholéose C : Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iodure.

Composition. — Une cuillerée à soupe de **Phospholéose C** contient : 0,01 cgr de Hg + 0,01 cgr. de As + 0,50 cgr. d'iodure + 0,10 cgr. de phosphate.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants* : par cuillerées à café.

Prix : **Phospholéose A et B** : 16 fr. **Phospholéose C** : 18 fr.

Laboratoires **DEMASLES**
VIENNE (Isère).

PHOSPHOMAGNÉSIUM

Composition. — Hypophosphite, glycérophosphate, carbonate, citrate de magnésium.

Mode d'emploi. — 3 comprimés par jour.

Indications thérapeutiques. — Le *Phosphomagnésium* protège et fortifie la cellule. Toutes les insuffisances physiologiques dues à la carence magnésienne.

Prix : 15 francs.

Laboratoire **SERINDAT**

4, rue Lecomte-de-Nouy — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 5 3-48.)

PHOSPHONEUROL

Un polyphosphate phosphorique
sans excipient ni alcaloïde.

Formule :

Acide phosphorique officinal	22,50
Phosphate de soude	45,00
Biphosphate de chaux	22,50
Glycérophosphate magnésie	10,00
	<hr/> 100 gr.

1° Par sa richesse en acide phosphorique et phosphate de sodium :

Phosphoneurol est donc indiqué :

a. Dans tous les cas de déperdition phosphatée.

Fatigue, surmenage, surtout avec insomnie.

Amaigrissement.

Convalescence de maladies infectieuses ou
d'actes opératoires, **Etats de dépression
nerveuse** (Neurasthénie, Psychasthénie,
etc.)

b. Dans l'arthritisme, les rhumatismes subai-
gus ou chroniques.

c. Dans toutes les dyspepsies.

d. Dans la **colibacillose**, comme adjuvant de
l'urotropine.

2° Par son phosphate de calcium :

a. Dans les **troubles de l'ossification** (crois-
sance, rachitisme).

b. Dans la cure de la tuberculose en général.

3° Par son phosphate de magnésium :

Dans la cure et la prophylaxie des tumeurs
malignes.

Présentation. — Une seule forme : **Gouttes.**

Posologie : { *Adultes* : XV à XXX gouttes.
 { *Adolescents* : X à XX gouttes.
 { *Enfants* : V à X gouttes.

A prendre à l'un des principaux repas (de
préférence à celui de midi), dans un verre
d'eau sucrée ou de boisson.

Prix : Le flacon (traitement pour un mois) 18 fr.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07).

PHOSPHONINE SOULIÉ

(Solution et Gouttes.)

Composition. — Acide Phosphorique. Biphosphate de Chaux mielleux. Phosphate de Soude.

Indications. — Tonique de la cellule nerveuse centrale et périphérique, régulateur du système sympathico-glandulaire.

Asthénies, Surmenages physique et intellectuel, Convalescences, Anorexies.

Posologie :

Adultes (Prescrire **Solution**) : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des 2 grands repas.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose suivant l'âge.

Nourrissons (Prescrire **Gouttes**) : 1 goutte par mois d'âge, 2 fois par jour dans un peu d'eau ou dans le lait des biberons.

Laboratoire COLONIAL

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Ségur 77-70.)

PHOSPHOPINAL JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour. { Contenance du
 enfants : 2 à 3 par jour. { flacon : 50 capsules.

Élixir : adultes : 2 cuil. à café par j. { Contenance du
 enfants : 1 cuil. à café par j. { flacon : 90 grammes.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour. { Contenance du
 enfants : 20 à 30 par jour. { flacon : 40 grammes.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 16 francs.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)
(Tél. : Marcadet 37-98.)

PHOSTYL PY

Composition. — Acide Phosphorique pur ; Méthylarsinate de Strychnine ; Manganèse.

Propriétés. — Augmente le nombre et enrichit les globules rouges par fixation de Fer. Donne le coup de fouet nécessaire à la remise en route et fixe cet effet par son action tonique et reminéralisante. L'acide phosphorique est l'antidyspeptique de choix chez de nombreux hypo et hyperchlorhydriques (Joulie).

Indications. — Toutes les anémies et les asthénies ; Dépression ; Surmenage intellectuel ; Convalescence (grippe) ; Anorexie ; Dénutrition des tuberculeux ; Hypoacidité urinaire.

Posologie :

Adultes	XXV	gouttes	midi	et	soir.
12 à 18 ans	XV	—	—	—	—
6 à 12 ans	VI	—	—	—	—

Dans le premier verre de boisson aux repas ; *goût agréable.*

Prescrire : PHOSTYL PY : 1 flacon.

Prix : 15 francs ; durée moyenne : 15 à 18 jours.

Laboratoire PY

58, bd Richard-Wallace — PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Lon. 01-13.)

PHYLLA

Chlorophylle pure solubilisée.

Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé et solubilisé, est actif et assimilable, contrairement à la chlorophylle des légumes verts, crus ou cuits.

Indications :

Anémies pernicieuses, anémies post-hémorragiques
Anémies néoplasiques : — (La chlorophylle relève le taux de l'hémoglobine et active les effets de l'opothérapie hépatique).

Anorexies des nourrissons. — Anorexies des tuberculeux — (La chlorophylle augmente l'appétit sans altérer la muqueuse gastrique).

Asthénies — Surmenage — Convalescences (tonique dépourvu de toute toxicité).

Hypotensions artérielles (idiopathique, permanente, symptomatique).

Acrocyanoses (adynamie circulatoire).

Adynamie des Cancéreux et des Tuberculeux.

Hypotrophies — Rachitisme — Carences solaires.
(La chlorophylle sensibilise l'organisme aux radiations (X. et U. V.) et à l'action des médicaments irradiés).

Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas,
15 jours par mois.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, Bd. de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique.

Composition. — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

Indications. — Troubles nerveux ressortissants à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique, tel que : vertiges, congestions postprandiales, migraines gastriques, palpitations de cœur d'origine digestive, tremblements, somnolence, bâillements, constipation d'origine sympathique, etc...

Posologie. — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

Présentation. — Boîte de 30 cachets. Prix de la boîte : 15 francs.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS

49, rue Maleret — BORDEAUX. — (Tél. : 843-22.)

PHYSIOSTHÉNINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Toutes infections graves.

Indications. — Grippe, Angine, Broncho-pneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 4 ampoules 20 cc.

Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 cc.

Prix : 40 francs.

Injectons intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

NÉO-PHYSIO

Toutes infections de moyenne intensité.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Prix : 22 francs.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : 32.

PHYTYNE

CIBA

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie,
TONIQUE, RECONSTITUANT, DYNAMOGÉNIQUE.

Phosphore organique végétal 22 p. 100.

Calcium 12 p. 100. Magnésium 1,50 p. 100.

Préparation phosphorée extraite des graines végétales
Le plus riche et le plus assimilable des médicaments
phosphorés.

Indications. — Neurasthénie, Névroses, Surmenage
sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie,
Anorexie, Convalescences, Troubles de la grossesse et
de la lactation, etc.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café
de granulé, 4 à 8 comprimés. *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose
de l'adulte.

Boîte de 20 cachets.

Flacon de 40 comprimés.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PHYTOCUPRINE

Composition. — Association de chloro-
phyllé, sulfate de cuivre et hexainosito-
phosphate de calcium et de magnésium.

Indications. — Thérapeutique anti-anémi-
que. Maladies du sang et toutes les com-
plications consécutives à l'hypoglobulie
et à l'homoglobulinémie. Maladies de la
nutrition.

Présentation. — Dragées, ampoules bu-
vables.

Posologie :

Dose moyenne : 6 dragées par 24 heures.

Cas graves : 9 dragées par jour, 3 avant
chaque repas.

Prix : 18 francs le tube.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).

Tél. : Jas. 54-52.

PHYTOGÉNOL GRANULÉ

Spécifique des maladies de la Nutrition.

Formule (par 100 gr. de granulé entièrement soluble). — Méthylarsinate disodique : 0 gr. 20 ; Nucléinate de Manganèse : 0 gr. 25 ; Végé-
phos (Hexa-inosito-phosphate de Calcium et de Magnésium) : 2 gr. 50 ;
Hémoglobine crist. : 5 gr. ; Lipoïdes spléniques : 0 gr. 80 ; Extrait de
glandes interstitielles : 1 gr. 25 ; Extrait mou de Kola : 2 gr. 50.

Indications thérapeutiques :

Toutes formes de fatigue : surmenage, asthénie nerveuse, dépression
physique et intellectuelle.

Usure organique : sénilité, ralentissement fonctionnel des glandes
vitales.

Troubles de croissance : rachitisme, chlorose, anémie.

Troubles de ménopause : psychoses génitales qui accompagnent la
période cataméniale. Prétuberculose, déminéralisation, fractures,
caries osseuse et dentaire. Grossesse. Convalescences post-hémor-
ragiques et infectieuses.

Doses journalières :

Adultes : 1 cuillerée à dessert, pur ou dissous dans de l'eau au début
des 3 repas. *Enfants (4 à 8 ans)* : 1/2 cuillerée à café.

Jeunes gens (8 à 16 ans) : 1 cuillerée à café aux mêmes heures.

Prix : 15 francs. — Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires F. MARIOTTE, 15, rue Pasteur — BOURG (Ain).

Dépôt : O. C. P., C. N. P. F. et toutes drogueries.

N. B. — Peut être prescrit pour les A. S. Enregistré au L. N. C. M.
sous le N° 1637-1.

PHYTOGYL

Granulé reminéralisateur.

Vitamine D cristallisée chimiquement pure, associée à la Germiné,
phosphore, chaux, magnésium, d'origine végétale et assimilables.

Indications. — Toutes décalcifications : anémies, convalescence,
surmenage, dépressions nerveuses, états ganglionnaires, pré-tuber-
culose. Stimulant de la nutrition.

Présentation. — Granulé fondant au premier contact avec la muqueuse
buccale, en flacon de 125 cc.

Une cuillerée à café contient 1/5 de mgr. de Vitamine D cristallisée et
10 cgr. de Germiné.

Doses journalières.

De la naissance à 1 an : jusqu'à 1 cuillerée à café.

De 1 à 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 2 à 3 cuillerées à café.

La cure peut être continuée pendant 2 ou 3 mois ; si elle a été inter-
rompue, elle peut ensuite être reprise sans aucun inconvénient.

Prix au public : Le flacon, 15 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

PHYTOJAVA

Composition. — Extrait de *Temoæ Lawaq* (*Curcuma xanthorrhiza*) associé à l'*Orthosiphon stamineus* (plantes originaires de Java).

Indications. — Le *Temoæ Lawaq*, cholérétique, augmente la sécrétion de la bile sans provoquer de spasmes ni de coliques.

L'*Orthosiphon* diurétique hépato-rénal favorise l'excrétion de l'urée et des chlorures.

(D^r Leclerc, *Presse médicale*, 9 nov. 1935; *Courrier médical*, 30 mai 1935; *J^{al} Méd. et Chir. pratiques* mars 1937.)

(D^r Decaux, *Presse médicale*, 22 mai 1935; *Communication Société thérapeutique*, janv. 1936.)

Ictères, Cholécystites, Congestion du foie, Cholestérinémie.

Formes. — Comprimés dragéifiés. Gouttes.

Posologie. — 1 à 2 comprimés avant chaque repas, X à XXX gouttes avant chaque repas.

Enfants : gouttes 1/2 dose.

Prix : 14 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PHYTO-KOLA

Toni-stimulant complet. Association de phosphore organique d'origine végétale Hexa-inosito phosphate de calcium et de magnésium *Suractivée* par les Noix fraîches de Kola.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Réminéralisateur, excitant puissant du métabolisme, Stimulant de l'activité cérébrale, donnant des résultats rapides et très constants, dans toutes les déficiences organiques, toutes les convalescences : médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Boîte de 60 comprimés en trois tubes : 20 francs.

Posologie. — Croquer 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-2.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (I^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

PHYTOLAX

Laxatif-cholagogue végétal.

Stimulant des fonctions hépatiques et intestinales.
A base d'extraits de végétaux, rigoureusement
exempt de phénolphtaléine et de laxatifs chimiques.

Composition. — Artichaut, Cascara, Podophylle,
Bourdaïne, Hydroxyde d'alumine colloïdal.

Avantages. — Evacuation rapide et totale sans
colique et sans irritation surajoutée.

Apport d'hydroxyde d'alumine colloïdal qui tapisse
la muqueuse sensible d'un véritable pansement
mucilagineux doux et protecteur.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par 24 heures pris
ad libitum.

Prix : 8 fr. 50.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

PHYTOSANG SARDA

Gouttes irradiées.

Composition :

Lachesis (dilution 1/30).....	0,002
Teinture d'adonis	0,015
Teinture d'hamamelis	0,40
Extrait de marron d'Inde.....	0,24
Viburnum.....	0,12
Convallaria.....	0,163
Teinture d'iode	0,01
Alcool à 95°	0,05

Indications. — Spécifique des troubles de la circulation : Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — X à XX gouttes avant les 2 principaux
repas ou suivant les indications du médecin.

Prix : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1318-2.

Laboratoires SARDA

119, rue de Sèze — LYON.

PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale : lipoides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et Vitamine A stabilisée.

Propriétés. — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

Indications. — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie, Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

Présentation. — En granulés aromatisés (150 grammes) et en dragées également aromatisées (50 dragées).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les n^{os} 82-7 et 82-8.

Posologie. — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers : *Nourrissons* : 1 cuiller à café de granulé.

Enfants : 2 cuillers à café de granulé ou 2 dragées.

Adolescents et adultes : 3 cuillers à café de granulé ou 3 dragées.

Prix : 18 francs.

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

(Tél. : Archives 83-52.)

PHYTOVEINOL

(Gouttes.)

Formule entièrement originale, exclusivement végétale, très bien supportée par les voies digestives.

Composition. — Ficaire (vaso-constricteur), Berbéris (veino-tonique), Millefeuille (astringent), Gossypium (décongestionnant).

Indications. — Insuffisance veineuse dans ses diverses manifestations, Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Etats congestifs de la ménopause.

Mode d'emploi :

XX à XXV gouttes au début des deux principaux repas. Traitement d'entretien : 20 jours par mois (soit un flacon).

Prix : 14 francs.

Suspendre cette médication au moment des règles.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 12-35.)

PHYTO-VITAMINES PLÉ

Solution non huileuse des vitamines A et D étalonnées à l'état *colloïdal* associées aux vitamines B, à la chlorophylle pure, soluble, d'action vitaminique semblable à la vitamine C, et aux acides aminés.

Propriétés. — Haute activité vitaminique en synergie. Aucune toxicité. Est miscible directement à l'eau. Saveur agréable.

Indications. — A titre prophylactique : chez les enfants en fin d'hiver et au printemps, régimes alimentaires, femmes enceintes et allaitantes, nourrissons ; à titre curatif : comme adjuvant au traitement, anti-infectieux, le lymphatisme, les anémies, états ganglionnaires chez les prématurés et les athrepsiques ou hypotrophiques, les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Présentation. — Liquide aqueux d'emploi aisé avec son « Compte-gouttes Doseur ». Une dose = XX gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-9.

Posologie : Avant les deux repas :

Nourrissons : 1 dose. *Enfants :* 2 doses. *Adolescents et Adultes :* 3 doses.

Prix : 16 fr. 50.

Littérature et échantillons aux
Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).

(Tél. : Archives 83-52.)

PICRICOL

Réparateur des tissus.

Antiseptique, Kératoplastique, Lénifiant.

Composition. — Acide Picrique (0 gr. 06 par c.), Sulfate de Zinc-Amidon.

En comprimés parfumés, très solubles (usage externe).

Indications. — Cicatrisation des plaies et muqueuses.

Plaies chirurgicales. — Lavages, pansements, 2 à 3 comprimés par litre.

Gynécologie. — Hygiène et traitement des affections vaginales, Vulvite, Infections gonococciques, Pertes blanches, Sécrétions fétides, Métrites du col avec ou sans ulcérations, Métrites en général, Salpingites, Ovarites.

Injections (4 à 5 comprimés pour 2 litres d'eau.)

Plaies accidentelles. — Coupures douloureuses et souillées, brûlures (2 à 4 comprimés par litre).

Gargarismes antiseptiques et cicatrisants.

Emploi. — Faire dissoudre les comprimés dans l'eau bouillie chaude, utiliser la solution atténuée.

Pas de réactions douloureuses. — Pas d'irritations.

Action sédative très réelle.

Remarque. — Le borax fait disparaître facilement les taches de Picricol,

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

PILULES COTER

Composition (pour pilule) :

Extrait d'Aconit et de Belladone... āā	0,005
Codéine pure, extrait de Polygala... āā	0,01
Terpine.....	0,10

Propriétés. — Calmantes, Expectorantes, modificatrices des sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux, Rhumes, Bronchites chroniques, Emphysème, Catarrhes, Laryngites, Dyspnée cardiaque, Gazés.

Posologie. — 6 pilules par jour, en dehors des repas.

Présentation et prix. — 7 francs la boîte de 30 pilules.

Laboratoires COTER

11, place Sainte-Eulalie — BORDEAUX.

PILULES DU Dr DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 20, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée et boldine.

Ne renfermant aucun drastique ni laxatif.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Durée moyenne : 25 jours.

Le flacon de 100 pilules : 15 francs.

— 50 — : 8 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PILULES du D^r MOUSTIER

Formule :

Digitale stabilisée.....	0 gr. 05
Scille stabilisée.....	0 gr. 05
Scammonée d'Alep.....	0 gr. 05
Gentiane pulvérisée.....	0 gr. 02

Pour une pilule

Dosage absolument rigoureux.

Indications :

Toutes les *affections cardiaques* pour lesquelles la digitale est recommandée : asystolie, accidents gravido-cardiaques, œdèmes dus à l'insuffisance cardiaque.

Toutes les contre-indications de la digitale.

Présentation :

Originale : sous forme de *grain de café* sucré, rendant son emploi commode et agréable, *inaltérable* de par sa fabrication ; enrobage dragéifié, de conservation indéfinie.

Posologie ; durée du traitement :

1 ou 2 pilules matin et soir, suivant les cas, **10 ou 15 jours par mois.**

Prix de vente au public :

18 francs le flacon de 50 pilules.

Laboratoires du D^r MOUSTIER,

P. REBOUD, Pharmacien

rue de Verdun

SAINT-VALLIER (Drôme).

(Téléphone : 10.)

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée, protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. PARIZOT) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Peut être prescrit aux assurances sociales.

Echantillon et littérature sur demande.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : 54-57.)

PILULES LEMARY

Ces pilules kératinisées suivant le procédé du Dr Henri Philippe constituent un traitement mercuriel discret très tolérable et efficace.

Indications. — Traitement d'entretien (malades éloignés des centres médicaux) très utile pour le praticien dans les affections douteuses ou réelles d'origine spécifique (cœur, yeux, système nerveux), pour les organismes usés supportant mal les traitements d'attaque.

Formule A. — Dupuytren du Codex. Bichlorure de mercure à 0,01 cgr. : 16 fr.

Formule B. — Ricord du Codex. Iodure mercurieux à 0 05 cgr. : 16 fr.

Formule C. — Bi-iodure Hg 0 005 mgr. et Ki à 0,25 cgr. (formule de Gibert) : 18 fr.

A et B : 2 à 4 pilules par jour.

C : 2 pilules par jour (avant chaque repas).

Le flacon porte une étiquette discrète.

Produits du Docteur Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULES MYOSOTIS

Molles

Composition :

Bichlorure de Hg	0,005
Poudre d'opium	0,005
Poudre fraîche de coca	0,15
Extrait de gentiane	0,04

Indications. — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le D^r Vernes.

Emploi :

- 1^{re} semaine : 1 pilule par jour au repas du midi.
 2^e semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.
 3^e semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.
 4^e et 5^e semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.
 6^e et 7^e semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.
 8^e et 9^e semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.

En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Prix : Flacon de 50 pilules, 9 francs.

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

PILULES PHILIPPE

Kératinisées.

Pilules Philippe

Enrobage spécial procédé du D^r H. Philippe.

Ki à 0,10, 0,20, 0,50	16 fr.
NaI à 0,10, 0,20, 0,50	16 —
Harlem (capsules kératinisées à 0,15)	13 —
Pancréatine	16 —
Kérasalicyl salicylate 0,50 (voir Kérasalicyl).	
Kérataspirine aspirine à 0,50	14 —

Pilules Lemary (étiquette discrète).

A. Dupuytren (Codex)	16 fr.
B. Ricord (Codex)	16 —
C. Bi-iodure Hg 0,005 KI 0,25 (formule de Gibert)	18 —

Andidote Malaria :

Quinine, extrait biliaire, méthylarsinate disodique, oxalate de fer	16 fr.
---	--------

Produits du D^r H. PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULE V.-E. DOUMER

Formule :

Chaque pilule contient 5 cgr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

Doses :

De 3 à 10 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL
ANNONAY (Ardèche) — France.

PINEOLEUM

Composition. — *Forme simple* : Eucalyptus, Pin Pumilionis, Cannelle, Camphre, Menthol, Huile de Paraffine pure.

Forme éphédrinée : même formule + éphédrine.

Propriétés. — Antiseptique spécifique des affections rhino-pharyngées.

Formes. — *Pulvérisateur* vendu garni de PINEOLEUM.

Applicateur avec compte-gouttes spécial. *Grand flacon* pour recharger le pulvérisateur ou l'applicateur.

Important. — Chacune de ces trois formes existe en deux formules :

Simple ou *éphédrinée*.

Prix :	{ Pulvérisateur garni. 21 fr. » }	Simple ou éphédriné.
	{ Applicateur 12 fr. » }	
	{ Grand flacon 17 fr. 50 }	

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

PIORÉFAGINE

Technique et formules de Ch. Hulin.

Traitement rationnel des Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites, Suppuration, Douleur, Congestions gingivales, Angines, Muguet.

Auto-traitement.

Onguent Pioréfagine (pâte). Le tube	12 fr.
Topique — (élixir). Le flacon ...	30 —
— — (élixir). 1/2 flacon....	16 —
Pastille — La boîte	6 —
Anaphylène (pilules). Le flacon	15 —

Traitement chirurgical.

Fibrogénine injectable. La boîte	40 fr.
— applicable. Le flacon	25 —
Kératoline (caustique). Le flacon	25 —
Ulosane (pâte sclérogène). Le tube	15 —

Laboratoire HYGIO-DONTIS

CROISSY-SUR-SEINE (Seine-et-Oise).

Toutes Pharmacies. — Dépôt général: O. C. P.

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH}_2 \\ \text{CH}_2\text{-CH}_2 \end{array} \text{NH}$, alcalin organique du groupe des Pyridines inscrit au Codex français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0 gr. 20 de PIPÉRAZINE pure par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique : réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseaux).

Prix 18 francs

Durée du traitement : une semaine.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

PLASMA DE QUINTON

Nom déposé en 1907.

Composition. — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite ; transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

Le Plasma de Quinton (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

Bibliographie. — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références *in* R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2^e éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références *in* JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

Indications :

Traitement prénatal. Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'arme plus puissante. On sait qu'il a été fondé (D^r ARNULPHI, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1^o de conduire à terme le produit conçu ; 2^o de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3^o d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

Entérites des adultes et des grands enfants. Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

Gastro-entérites des nourrissons. Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

Intolérance lactée, Athrepsie. L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsique s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

Maladies de la peau (Acné, Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées) ; *Maladies du Système nerveux* (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie) ; *Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.* Les succès sont habituels, impressionnants parfois de rapidité.

Régimes, doses d'injections. — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine par le *Plasma de Quinton*, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

Présentation. — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

Renseignements et littérature (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance ; envois de notices sur les applications et la posologie du *Plasma de Quinton* : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrière, Paris (Gare Montparnasse).

Commandes et ordres d'expéditions :

Produits Biologiques CARRION

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45 et 46.)

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123. 

PLASMARINE

Analeptique marin polyminéralisé.

Composition. — Calcium en combinaisons minérale et organique assimilables ; Phosphates et acide phosphorique calco-manganique ; Iode en solution marine ; Manganèse glycérophosphorique assimilable ; éléments en combinaison et solution dans le Plasma Marin naturel isotonique.

Action thérapeutique :

- 1° Réveil immédiat de l'appétit.
 - 2° Reminéralisation intégrale intensive.
 - 3° Action tonique et réparatrice.
 - 4° Action dépurative.
 - 5° Modification favorable du terrain.
- Energique, agréable, atoxique.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Grands enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Petits enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Soit au début, soit à la fin des repas.

Prix : 15 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires « LA BIOMARINE »

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-51.)

PLASMOSALIN

Indications. — Affections gynécologiques, Pertes blanches, annexites, Métrorragies, Hémorragies des fibromatoses utérines, Aménorrhées, Oligoménorrhées, Dysménorrhées.

Indications des Eaux chlorurées-sodiques, Bromo-iodurées.

Composition. — Association Synergique de la totalité des sels, extraits des Eaux-mères et des Eaux-vierges de Salies-du-Salat.

Posologie. — 3 cuillerées à café pour 2 litres d'eau bouillie en injection vaginale.

Le traitement est heureusement influencé par l'emploi des ovules *Plasmosalin*.

Échantillons et littérature sur demande à adresser au
Docteur FROMENT, directeur du :

Laboratoire des Eaux Mères SALIES-DU-SALAT — HAUTE-GARONNE

ou **P. BORDES**, pharmacien préparateur,
35, rue Périssé — TOULOUSE (Haute-Garonne).

PLASMOSTHÈNE

Médication sthénique totale des débilites, surmenés physiques et intellectuels.

Formule. — Gouttes :

Méthylarsinate de soude.....	3 gr. 25
Glycérophosphate de magnésium.....	3 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	3 gr. 50
Cacodylate de fer.....	0 gr. 30
Cacodylate de strychnine.....	0 gr. 075
Acide phosphorique.....	20 gr.
Gluconate de cuivre.....	0 gr. 50
Carbonate de zinc précipité.....	0 gr. 25
Sérum de Quinton }	
Glycérine }	à Q. S. p. 100 gr.

En flacon compte-gouttes de 45 cc. Prix : 15 francs.

Particularités. — Association synergique complète phosphorique, magnésienne, ferrique en milieu d'eau de mer, associée à la strychnine et au manganèse. Présence des diastases métalliques cuivre et zinc.
Adultes : XX gouttes 2 à 3 fois par jour. } Existe en ampoules.
Enfants : V gouttes 2 fois par jour. } 1 ampoule par jour.

Forme granulé : pour enfants une cuillerée à café 2 à 3 fois par jour.

Ampoules : Cacodylate de soude : 0 gr. 15 ; Glycérophosphate de soude : 0 gr. 15 ; Cacodylate de manganèse, Strychnine, Fer, pour 2 cc.

Indications. — Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

Laboratoires du NORMOGASTRYL

J. OLIVE — 14, rue des Minimes — Paris.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PLEXALGINE LALEUF

Composition. — Extraits spéciaux de : muscle strié, myocarde, pancréas, foie et rein, parathyroïde, phényléthylmalonylurée, extraits végétaux (datura, mandragore, jaborandi, lobélie).

Propriétés et indications. — Sédation et suppression des désordres causés par le déséquilibre vaso-sympathique. La **Plexalgine** agit non seulement sur les effets (algies et spasmes), mais aussi sur les causes (carences métaboliques, spasmophilie).

Spécialement indiquée dans : douleurs précordiales et solaires, aéro-phagie, palpitations, spasmes, angoisses, dysthyroïdie, troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 6 dragées par 24 heures de préférence en plusieurs prises.

Prix : 20 francs l'étui de 60 dragées (de 10 à 30 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

PLEXAMINE

Indications. — Sédatif des plexus sympathiques, Douleur des règles, Rhumes des foins, Ulcères gastro-duodénaux, Épigastralgies, Angine de poitrine, Syndrome de Raynaud, Hypertension artérielle.

Composition. — La Plexamine est une solution de chlorhydrate d'histidine à 4 p. 100, présentée en boîtes de 6 ampoules de un demi-centicube avec l'aiguille spéciale pour l'injection intradermique.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection intradermique du contenu d'une ampoule chaque jour.

Prix, la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Cure : 6, 12, 18 jours.

Aucune toxicité, Aucune contre-indication.

Laboratoire LAURENT-GÉRARD

40, rue de Bellechasse, 1 et 3, rue Las-Cases

PARIS. (Tél. : Littré 97-95).

PLURIBIASE

Indications. — Algies dyspeptiques, antiseptique intestinal.

Composition. — Comprimés à 2 noyaux. Le 1^{er} externe, pepsine T. 500 ; Ext. Belladone ; Ext. Jusquiame, Sucre.

Le 2^e interne, Boldo, Bile dépigmentée, Pancréatine (T. 200), Kinase, Erepsine, Ferments lactiques.

Doses. — 2 comprimés avant chaque repas

Prix : 16 francs.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 69-13.)

PLURION

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 ampoules par jour dans les *anémies graves*, 1 ampoule par jour dans les *anémies des convalescents, paludéens, syphilitiques, cancéreux*, 1 ampoule tous les 2 jours dans les cas plus bénins.

Prix : 30 francs pour 4 à 16 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

(Tél. : Carnot 18-75.)

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine) combiné à 0,08 d'iode combiné et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action :

régulatrice respiratoire, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ;

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle ;

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées. À prendre dilué dans de l'eau bien sucrée.

Dragées : 15 francs — Liquide : 14 fr. 75.

Durée moyenne du flacon : 7 jours.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

(Tél. : Pereire 14-08.)

PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Formule et technique du Docteur Victor-Simon.

Composition. — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olive et de chènevis camphrée, débarrassée de ses acides. Quatre concentrations n^{os} 1, 2, 3, 4.

Mode d'emploi et indications :

INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme. Emphysème.

INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Prétuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections prippales, bronchites chroniques, infections urinaires, (prostatites, etc.).

Prix : 30, 35 et 40 francs.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 56-67.)

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme :

Ampoules de 2 cc. Injections hypodermiques. Boîte bleue 18 fr.

Ampoules de 6 cc. Injections Intra-trachéales. Boîte rouge 24 fr.

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile neutre.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande au :

Laboratoire DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

Tél. : Gravelle 00-27.

POFENANE

Composition. — Bourgeons de Peuplier, fenugrec, hoang-nan.

Indications. — Débilité, Asthénie, Hypotrophie, Bronchite chronique, Asthme, Tuberculose, Diabète, Neurasthénie, Atonie digestive, Troubles de la croissance, Perte de poids, Déminéralisation, Perturbation du métabolisme, Lymphatisme, Anémie, Impuissance, Enurésie.

Remarque importante. — Dans les affections broncho-pulmonaires, l'action du POFENANE se traduit par une diminution de la purulence des sécrétions bronchiques, par une plus grande facilité de l'expectoration et par la cessation de la toux.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 6 à 8 dragées par jour.

Enfants de 10 à 15 ans : 3 dragées par jour, à prendre avant les repas.

Avaler sans sucer ni croquer, avec une gorgée d'eau.

Présentation et prix :

La boîte de 60 dragées : 15 francs.

L. N. C. 428-9.

Laboratoire du Dr VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 mgr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.
formes : sirop, comprimés, ampoules — Prix : 18 francs.

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoire des Produits du Dr CHURCHILL
12, rue Castiglione — PARIS (1^{er}) Tél. : Opéra 72-96.

POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

Forme et Posologie.

Sirop : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).

Poudre : 1 mesure = 1 gr. de polybromure.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

Indications. — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Sirop : 15 jours. — *Poudre* : 30 jours.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

POLYCALCION

Solution titrée agréablement aromatisée (gouttes et dragées).

XL gouttes ou une dragée correspondent à :	{	Chlorure de calcium.....	0 gr. 40
		Phosphate di-acide de calcium..	0 gr. 08
		Gluconate de calcium.....	0 gr. 04

C gouttes correspondent à 1 cuiller à café.

Propriétés thérapeutiques. — Antihémorragique, déchlorurant, neuro-sédatif, anti-infectieux, recalcifant, anti-anaphylactique.

Indications. — Hémorragies de toutes natures : épistaxis, hémoptysies, hématuries, métrorragies, purpura, hémophilie, hémorragies des maladies infectieuses. États spasmophiles. Tétanie, Cardiopathie, néphrites, œdèmes, épanchements séreux. Décalcification, tuberculose, ostéomalacie. Accidents anaphylactiques, sériques.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : XL à C gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée avant les repas ; ou 3 à 8 dragées par jour en trois fois.

Enfants : Il est préférable d'employer les gouttes de Polycalcion. X à XL gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Les doses peuvent être augmentées ou diminuées suivant l'avis du médecin.

Prix au public : le flacon de 100 gr. : 16 fr. 50

La boîte de 60 dragées : 16 francs.

Autorisé par les Assurances Sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.

POLYFERMENTS LALEUF

Composition. — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de Magnésium.

Propriétés et indications. — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Formes. — Granulé et tablettes.

Posologie et mode d'emploi. — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes : 16 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

POLYIODURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium.*)

Forme. — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

Indications. — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

POLYNA

Composition :

Sulfate de soude	0 gr. 30
Phosphate de soude	0 gr. 20
Bicarbonat de soude	0 gr. 15
Citrate de soude	0 gr. 05
Benzoate de soude	0 gr. 05
Tartrate de soude	0 gr. 10
Salicylate de soude.....	0 gr. 05
Hypophosphite de soude	0 gr. 05

Pour 1 cuillerée à café.

Indications. — Insuffisances hépatiques, dyspepsies, intoxications alimentaires, dermatoses, etc.

Propriétés. — Toutes celles de la solution de Bourget avec adjonction des cholagogues : benzoate et salicylate de soude.

Présentation. — Granulé soluble de saveur agréable.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café à jeun ou avant les repas dans un peu d'eau légèrement tiédie.

Laboratoires HALLÉANA

G. VENNE, Pharmacien,

102, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 07-53.)

POLYPEPTINE

Du Docteur Roger Weber

Comprimés hyperdigestifs friables.

Formule :

Pepsine	0,75
Pancréatine	0,25
Muqueuse gastrique	0,10
Muqueuse duodénale.....	0,10
Muqueuse intestinale	0,10
Bile intégrale.....	0,10
Carbonate de chaux : 0,20, pour 1 comprimé.	

Indications. — Dyspepsie, Insuffisance digestive.

Posologie. — 1 à 3 comprimés au milieu des repas, croquer sans goûter le ou les comprimés, et avaler à l'aide d'une gorgée d'eau.

Prix (la boîte de 40 comprimés) : 18 francs.

Laboratoire de la POLYPEPTINE

Angelini, Pharmacien

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

Et chez tous les Commissionnaires et Droguistes.

Détail : Dans toutes les Pharmacies.

POLYPEPTONAL

Composition. — Peptonates polyvalents de Magnésie. Digestats chlorhydropepsiques de Foie total et d'Albumines végétales.

Indications. — Nouvelle médication polyvalente, Antichoc, cholagogue et antianaphylactique, Troubles digestifs, Troubles anaphylactiques généraux, Insuffisances hépato-biliaires.

Posologie :

Comprimés: *Adultes* : 1 à 5 une 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1 comprimé une 1/2 heure avant les repas.

Granulé: *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à bouche.

Enfants : 1 cuillerée à café dissous ou non dans un peu d'eau une 1/2 heure avant les repas.

La simple dose (comprimés ou granulé). Prix : 16 fr.

La triple dose (comprimés ou granulé). Prix : 36 fr.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34.)

POLYTONYL

Médication sthénique totale des débilités, surmenés physiques et intellectuels.

Formule. — Gouttes :

Cacodylate de strychnine.....	0 gr. 075
Carbonate de zinc.....	0 gr. 25
Cacodylate de fer.....	0 gr. 30
Gluconate de cuivre.....	0 gr. 50
Glycérophosphate de magnésium.....	3 gr.
Méthylarsinate de soude.....	3 gr. 25
Glycérophosphate de manganèse.....	3 gr. 50
Acide phosphorique.....	20 gr.
Sérum de Quinon.....	} à Q. S. p. 100 gr.
Glycérine.....	

Particularités : Association synergique des catalyseurs métalliques indispensables à l'organisme, en quantités électivement dosées.

Présence des éléments toniques de premier ordre : fer, manganèse, phosphore, magnésium ; addition de strychnine comme réparateur des fonctions nerveuses.

Adultes : XX gouttes 2 à 3 fois par jour.

Enfants : V gouttes 2 fois par jour.

Ampoules : Cacodylate de soude 0 gr. 15, glycérophosphate de soude 0 gr. 15, strychnine, un milligramme, cacodylate de manganèse, fer pour 2 cc.

Granulé : pour enfants. Éléments minéraux avec addition d'extraits d'organes.

Indications : Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

LABORATOIRES P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie.
32, rue de l'Ouest — PARIS.

POLYVALINE

du Dr Bayle

Nature. — Extrait spléno-surrénal.

Indications. — Les maladies infectieuses : Grippe, Typhoïde, Paratyphoïdes. Pneumonie, Bronchopneumonie, Erysipèle, Fièvres éruptives, Oreillons, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

Emploi. — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

Doses. — *Adultes* : **POLYVALINE injectable A** (10 cc.

La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Enfants : 1 cc. par année d'âge de **POLYVALINE injectable B**. La boîte de 4 ampoules de 5 cc. : 24 fr.

Polyvaline buvable

La boîte de 6 ampoules : 24 francs.

2 par jour dans les maladies aiguës, les convalescences, les anémies avec asthénie.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne
PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 16-11.)

POMMADE AIPHÈME

Traitement Acide des Dermatoses Prurigineuses et subaiguës.

Composition. — Pommade genre Pâte de Lassar à acidité ionique élevée : $\text{pH} = 3,2$.

Action. — A. *Calmant*, quoique sans stupéfiant, de tous les symptômes douloureux des dermatoses, grâce à son acidité ionique libre (Principe de Darier).

B. *Kératoplastique* grâce à son excipient (Pâte de Lassar).

S'emploie contre... tous les Prurits qu'elle calme rapidement. Les Eczémas subaigus. Les Dermites professionnelles (eczémas des laveuses, des cimentiers, des chimistes), ou accidentelles (pigûres d'insectes, coups de soleil, urticaires). — Les Mycoses cutanées, les Dermatoses sèches, Pityriasis, Erythèmes, Eczématides, Lichen plan, Impétigos et, d'une façon générale, contre toutes les Dermatoses subaiguës qui ont tendance à diminuer l'acidité cutanée.

Le tube contenant 45 gr. de pommade net :
8 fr. 50

En conformité avec les principes thérapeutiques de la Pommade Aiphème, il existe un savon Aiphème à alcalinité atténuée qui peut être prescrit pour tous les cas où la pommade est employée et en particulier contre la Séborrhée grasse du visage et les Acnés.

Le savon Aiphème de 120 gr. net : 5 fr.

Echantillons et Littérature.

Envoi gracieux de savons.

Laboratoires Aiphème

54, rue d'Étretat — FÉCAMP (Seine-Infér.
(Tél. : 70.)

POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroïdes, Brûlures, Engelures, Gerçures, Crevasses du sein, Vaginisme, Vulvites, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Chancres, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Dermatoses, Lésions des muqueuses.

Conditions d'efficacité. — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion sous forme de pansement par exemple.

Posologie. — Aucune limite ni dans les doses, ni dans la durée du traitement. Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires P. BAUDE,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : LABOBOD PARIS.

POMMADE BEBIA

Composition :

Pommade à base de sous-nitrate de bismuth, oxyde de zinc, acide benzoïque, acide borique.

Propriétés :

Antiseptique, kératoplastique, anti-prurigineuse.

Indications :

Puériculture, rougeurs des nourrissons, crevasses, gerçures, engelures, toutes dermatoses irritées.

Présentation et prix :

La boîte : 6 francs. — La triple boîte : 14 francs.

AUTRES PRODUITS BEBIA

Poudre Bèbia, la boîte : 7 francs.

Boîte poudreuse : 4 fr. 50.

Savon Bèbia : 2 francs.

Suppositoires Bèbia, miel et glycérine contre la constipation.

La boîte de 15, pour bébés : 3 fr. 50

— — , pour enfants : 4 fr. 50

— de 16, pour adultes : 5 fr. 50

Laboratoire BEBIA

5, avenue E.-Boissier — NANTES.

POMMADE BERNAMONT GOUTTES BERNAMONT

A base de peroxyde de zinc, d'oxyde de zinc et d'amidon, la *Pommade Bernamont* constitue le traitement spécifique des ulcères variqueux et des plaies atones.

Indications. — Ulcères variqueux, brûlures, plaies, fistules, crevasses, eczémas, maladies de la peau.

Mode d'emploi. — Après un nettoyage soigneux à l'éther, de la plaie à traiter, appliquer une couche épaisse de *Pommade Bernamont* et recouvrir d'un pansement.

Les *Gouttes Bernamont* (hamamélis, marron d'Inde, noix vomique, viburnum) complètent le traitement local par la *Pommade* et favorisent toujours l'amélioration de tous les troubles de la circulation veineuse. On les utilise à la dose de XX gouttes dans 1/2 verre d'eau à chacun des principaux repas.

Littérature et Échantillons.

Laboratoires BERNAMONT

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS.

POMMADE-CRÈME LUDIN

Spécifique des affections de la peau et du cuir chevelu.

Composition. — Hg. + As. + B. du Pérou.
+ H. de Cade + Soufre + Acide Salicylique
+ Oxyde de Zinc.

Propriétés thérapeutiques. — Dermatophylactique, Antiseptique, Innocuité absolue.

Indications thérapeutiques. — Staphylococcies et Streptococcies cutanées, Psoriasis et Eczématides psoriasiformes, Dermatoses sèches et squameuses, Pelade, Plaies atones cicatrisant mal, Dermatoses exotiques d'origine microbienne ou ulcérées, Rougeurs, Affections prurigineuses de cause externe, etc., Erythèmes.

Mode d'emploi. — Par massage de quelques minutes, bien faire pénétrer la pommade dans la peau.

Prix : le tube : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-4.

Laboratoires REY — Dijon (Tél. : 22-12.)

POMMADE ET SUPPOSITOIRES INSÉVA

Traitement des affections ano-rectales par vaccinothérapie locale.

La pommade et les suppositoires **INSÉVA** sont à base de bouillon-vaccin de colibacilles et d'entérocoques, auxquels sont imputables, pour la plupart, les infections hémorroïdaires.

Indications. — Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, eczéma anal, ano-rectal ou péri-anal, tumeurs hémorroïdaires.

Action. — Guérison rapide des hémorroïdes et tuméfactions hémorroïdaires, sédation du ténésme.

Mode d'emploi. — Appliquer localement, ou introduire dans l'anus, au lever et au coucher, et après chaque selle.

Présentation :

Le tube : 14 francs.

Le 1/2 tube : 8 francs.

La boîte de 10 suppositoires : 14 francs.

INSÉVA

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Échantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

POMMADE FORNET

à l'Insuline Fornet

Cicatrisant parfait.

Principe actif :

L'Insuline FORNET véhiculée par un excipient spécial, à pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications :

Ulcères variqueux. Plaies de toute nature. Hémorroïdes.

Recommandations spéciales.

Cancers ulcérés de la peau : *Presse médicale*, du 21 octobre 1931.

Prurits : Hôpitaux de Paris.

Orgelets récidivants, Blépharites-Ulcères de la cornée : Service Ophtalmologie d'Ambroise Paré.

Radiodermites : Communications Gomès da Costa.

Brûlures : Service chirurgical. Hôpital de Lyon.

La Pommade FORNET est utilisée dans tous les hôpitaux de Paris.

Prix : 15 francs.

Renseignements et échantillonnage :

Laboratoire de MICROBIOLOGIE

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

POMMADES KLÉOS

Pâtes à l'eau.

Pommade Kléos Douce.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés. Brûlures, Gerçures, Coups de soleil.

Composition. — Baume du Pérou, Silicate de Magnésie hydratée, Oxyde de zinc, Dermarone, Oléate de zinc, Essences naturelles, excipient non gras.

Pommade Kléos Forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acné, intertrigo.

Composition. — Essences naturelles, Ichtyol, Baume du Pérou, Magistère de Soufre, Carbonate de Chaux, Stéarate de zinc, Oxyde de zinc, excipient non gras.

Forme. — Pommade non grasse renfermée en tube étain. Ces pommades, étudiées spécialement pour les enfants, sont tout indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Prix du tube : 5 fr. 50. Le double tube : 10 francs.

Littérature et échantillons.

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers — MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret).
Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous
les n^{os} 963-4 et 5.

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en découpant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sébum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *javus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 13 fr. ncs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.)

POMMADE LOGEAI

Composition :

Extrait total d'hamamélis.....	6	Cupressus.....	0,29
Sulfoichtylate de soude..	6	Genêt.....	0,29
Onguent populéum.....	69	Jusquiame.....	1,45
Lanoline anhydre.....	5,70	Teskra.....	1,45
Marron d'Inde.....	0,29	Pour 100 grammes.	

Propriétés :

ATOXIQUE : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGESIQUE Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTE : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUE : Action antiseptique de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prurits anal et vulvaire. Prostatites.

Mode d'emploi. — Après bain savonneux, onction matin et soir avec le doigt enduit d'une forte couche de pommade LOGEAI et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes). Une canule permet le traitement des hémorroïdes internes.

Prix : Le tube P. M. : 10 francs. — Le tube G. M. : 15 francs

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI
GOBERT, Pharmacien.

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique.)

Adrénaline	0,0066
Stovaine	1 gr.
Anesthésine	1 gr.
Extrait de Marron d'Inde frais	
stabilisé	2 gr. 50
Extrait d'Hamamélis	0 gr. 50
Pour 100 grammes de pommade.	

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

Prix : 13 francs.

Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).
(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

POMMADE NOËLLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés. Durée d'utilisation : une ou deux semaines suivant gravité.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif* : en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube 6 fr. 40.

Laboratoire de la NOËLLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POMMADE PARVY

Composition :

Eucalyptol, Gaïacol, Baume du Pérou, Vasolanoline.

Indications thérapeutiques :

Plaies de toutes sortes, écorchures, blessures, brûlures.

Laboratoires BOIVERT

MONTGUYON (Charente-Inférieure).

POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET

Pommades en tubes à canule dévissable et stérilisable, et à canule fixe, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuiivre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Fuménol, Zinc Ichtyol, Caloinel, Fondante ($KI + CaCl^2$), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Péroxyde de zinc, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Locaïne, Ethylhydrocupréine (Optochine). Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence de Niaouli (Goménol), Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet Rose, Colorant Composé, Esérine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adréaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu, Chibromercurobrome.

Radio Bleu (Radio Activé au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

Ampoules fondantes chloro-iodo-calciques (Bains d'yeux pour cataracte). **Œillères Chibret** à rebord caoutchouté.

Extrait corps ciliaire en amp. pour inj. et instil.

Solution composée en amp. de 1/2 cc. (pour inj. s.-conjonctivales).

Pommade pour le nez : Baume du Pérou, Adréaline.

(Voir à *Collyres* la suite des Produits Chibret.)

(Voir à *Chibromercurobrome*, le libellé spécial.)

LABORATOIRES CHIBRET,

5, r. Saint-Herem - CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). (Tél. : 3-36.)

POMMADES PROBIOS

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Pommade

Formule. — Antivirus et Bactériophages Staphylococciques, Streptococciques et Bacilles Pyocyaniques.

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Infections cutanées, Acné, Panaris, Furoncles, Anthrax, Abscess, Phlegmons, Pyodermites, Plaies infectées, Eczéma.

Mode d'emploi. — En applications locales.

POMMADE NASALE PROBIOS

Formule. — Antivirus-Bactériophages, Antistreptococciques, Antistaphylococciques, Friedlander, Proteus, Antivirus Bac. Pfeiffer, Antipneumococciques.

Présentation. — En tube à injection.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhino-pharyngites, Ozène, Grippe et certaines formes d'asthme, Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi. — Introduire le produit aussi loin que possible dans les fosses nasales, en aspirant fortement, 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e)
(Tél. : Turbigo 40-83.)

POMMADE VITAMORRHUINE

agréablement parfumée.

A base d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50, associé à la graisse de laine, l'huile d'olive, le stéarate de zinc, les essences de lavande et bergamote.

1 gramme de *Pommade Vitamorrhaine* contient :

4550 unités internationales Vitamines A naturelles.

975 unités internationales Vitamines D naturelles.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères variqueux, dermatoses chroniques, brûlures, engelures, toutes les irritations de la peau, etc.

PHARMACIE CENTRALE DE BELGIQUE S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

PORODERMAL

Composition. — Pâte poreuse, toujours tolérée, même par les dermatoses aiguës et suintantes.

Présentations. — PORODERMAL simple : eczémas aigus, pyodermites, érythèmes.

PORODERMAL au peroxyde de Zinc : antiseptique cicatrisant, plaies atones, brûlures.

PORODERMAL à l'Ichtyol : kératoplastique anti-prurigineux : eczémas érythématosquameux, lichens, prurigo.

Indications. — Les applications combinées du PORODERMAL au peroxyde de zinc et du PORODERMAL à l'ichtyol cicatrisent rapidement les plaies atones, les ulcères variqueux sans interrompre ni le travail, ni la marche.

Prix :

PORODERMAL simple : 12 francs.

Ichtyol : 15 francs.

Peroxyde de Zinc : 15 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire **SERRE**

place Pey-Berland — BORDEAUX. Tél. : 840-78.

POST-HYPOPHYSE CHOAY

Nature. — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :

Post-hypophyse n° 2. — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie. Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée). Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 4. — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc. titrées à 10 unités internationales.

Indications. — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour. Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 5. — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum.

Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Hémoptysies des tuberculeux : Injection intraveineuse à pousser *très lentement*.

Boîtes de 3 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

POTION ADOL

Composition. — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Spartéine, *Stovaine*, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

Action thérapeutique. — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

Avantages. — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

Indications. — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lumbago, sciaticques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

Mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à bouche par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 16 fr. 90.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, Cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

POUDRE BEAU CHLOROFORMÉE

(Ou Éther)

Deux formes : Poudre Beau Chloroformée et Poudre Beau Éther.

Formule :

Ext. gr. Chanvre Indien	0,125
Menthol naturel	0,10
Chloroformé (ou Éther)	0,50
Bic. de soude chim. pur	75
Sucre. Q. S. pour	100

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate des phénomènes douloureux gastriques. Antiacide, Antispasmodique.

Indications. — Hyperchlorhydries, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Ulcères, Vomissements incoercibles et tous les syndromes douloureux de l'estomac.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un 1/3 de verre d'eau après les principaux repas et au moment des douleurs.

Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Prix : 10 fr. 75. — Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

POUDRE CASSARINI

Médication Sédatrice du Système Nerveux

ÉPILEPSIES — HYSTÉRIE — NÉVROSES DIVERSES

(En Comprimés.)

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.

Spécifique héroïque des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 22 fr. 50 la boîte (un mois de traitement environ).

Posologie:

Adultes : 6 comprimés par jour, 2 immédiatement avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

Adolescents ; 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux immédiatement avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

Enfants de 6 à 10 ans : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un immédiatement avant le petit déjeuner un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

Enfants au-dessous de 5 ans : Demander renseignements.

Littérature sur demande.

R. COLUMEAU, Pharmacien spécialiste

Laboratoire COLUMEAU, 24, rue Flégier — MARSEILLE

Tél. : National 50-06.

POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande, entièrement soluble dans l'eau, Odeur agréable et discrète.

Indications. — Décongestionnante, Antiseptique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme ;

Hygiène des yeux (blépharites, etc :)

Traitement des plaies.

Mode d'emploi. — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Prix : La boîte de 20 sachets, 18 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente :
28 à 30 jours.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

POUDRE DANICA

Anisée, d'une finesse extrême, se délaye très facilement, très agréable dans l'eau gazeuse, calme la soif instantanément.

Composition. — Carbonate de Ca et Mg. Silicate de Mg.

Indications. — Toutes affections d'estomac, intestin et foie, Solarites, Régularise les garde-robes. Efficace contre hyperacidités et hypertension. Equilibre le pH sanguin. Stimule la fonction rénale. Fait passer dans le sang des chlorures de Ca et Mg et des silicates solubilisés. Reminéralise. Préviend le cancer. Supprime l'insomnie digestive.

Mode habituel d'emploi. — Toutes variantes possibles. Une 1/2 cuillerée à café avant les repas : une cuillerée à café au coucher et au réveil.

La boîte : 14 francs.

Durée : 3 à 4 semaines.

P. BLOUIN, Pharmacien

50, rue de Turenne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 93-14.)

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques.

Composition. — A base de nitre et de solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix).

Indications thérapeutiques et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 9 fr (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE — BAISIEUX (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones, cicatrisation rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de la plaie, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

Prix pour 20 pansements : 23 francs ; pour 10 pansements : 12 francs.

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 26-87.)

POUDRE « MASS » PLASTIQUE

La POUDRE MASS, nouveau composé oléique sulfureux, assouplit la peau et la tonifie, possède une action adoucissante, cicatrisante, décongestionnante et antithermique.

I. **indications chirurgicales.** — Escarres, garniture intérieure des appareils plâtrés et orthopédiques. Suites de fractures.

II. **Indications médicales :** Eczéma, Prurit, Zona, Acnés, Plaies suintantes non suppurées, Impétigo, Varices et Ulcères variqueux, Phlébites, Proliférations cornées, Arthrites (simples ou déformantes).

Adénopathies. Tuméfactions douloureuses.

Plaies phagedémiques et atones, rougeurs des bēbēs, crevasses du sein, brûlures solaires ou autres.

Mode d'emploi : s'emploie exclusivement à sec sous formes de cataplasmes maintenus à l'aide d'une bande, ou de coussins. (Voir ci-dessous).

Présentation :

Boîtes de POUDRE MASS, pour massages, pansements, petites applications. Prix : 13 francs.

Coussins de POUDRE MASS (voir indications ci-dessus) type standard:

Prix : 20 francs. 30 cm. × 11 cm. Sur demande spéciale du Chirurgien ou du Médecin adressée directement à nos laboratoires, nous établissons des coussins de toutes dimensions et de toutes formes.

Pour tous renseignements, s'adresser :

Laboratoire R. BEURTON

20, rue Joubert — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 48-62.)

POUDRE NOELLINE

Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

Indications.

Rougeurs des bēbēs, Intertrigo, Escarres.

Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Durée d'utilisation : plusieurs semaines.

Boîte spéciale permettant à la fois le tamisage et l'imprégnation d'une houpette.

Prix 6 fr. 40.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 19 fr. 20.

Laboratoire de la NOELLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger*. Magnésie calcinée. Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*
Le seul saturant gastrique neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation, Gastropathies douloureuses, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodénal. Entérites et infections intestinales, Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.
Pastilles : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.

Forme et posologie :

Paquets : (2 gr.) 2 à 5 p. jour et plus au moment des crises douloureuses.
Pastilles : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.
 Prix au public : *Poudre*, la boîte (40 paquets), 15 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 8 fr. *Pastilles* : La boîte, 7 fr. 50 ; la demi-boîte, 4 fr. 15-20 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits PATERSON G. et M. Armingeat.
 46, rue de Saintonge — PARIS (ARC. 15-10).

POUDRE ROCHER LAXATIVE

Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

Composition. — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

Posologie. — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Échantillon franco à Messieurs les Docteurs.

Prix : 5 fr. 50.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).
 (Tél. : Danton 98-45.)

POUDRE SATINE

Composition :

Stéarates	24 gr.
Acide borique	6 gr.
Silic. de Magnésie.....	4 gr.
Carbonate de chaux.....	6 gr.

Par boîte.

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés, irritations cutanées, eschares des malades alités, feux du rasoir. La boîte : 8 francs.

Laboratoires NOGUÈS
7, rue Galvani — PARIS.

PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétycholine.
Hypotenseur et antispasmodique.

Indications. — Accidents de l'hypertension en général. Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétinienes, auriculaires, etc.). Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

Présentations et Posologie. — Boîtes de 10 ampoules.

Solution A : Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cm³). Prix : 20 fr.

Solution B : Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cm³).

Prix : 35 fr.

Injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 g. 03 à 0 g. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0 g. 25 à 0 g. 50 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PRÉFAGYL

Gastriques fonctionnels. Petits hépatiques.

Aérophages.

Particularités. — Comprimés effervescents de 2 gr. permettant de réaliser immédiatement, en tous lieux, une Solution de Bourget bromurée citratée, avec addition de chlorure de magnésium.

Procédé spécial de conservation en tubes verre.

Indications. — Tous les gastriques fonctionnels, dyspeptiques, aérophages, hépatiques.

Emploi. — Dyspeptiques, hépatiques, nerveux : 1 comprimé effervescent le matin à jeun et avant chaque repas dans un demi-verre d'eau tiédie ou froide.

Hyperchlorhydrie : 1 comprimé au moment des douleurs ou des brûlures.

Formule :

Chlorure de magnésium	0,05
Bromure de sodium sec	0,25
Bicarbonate de soude sec	0,60
Sulfate de soude desséché	0,285
Phosphate de soude sec.....	0,195
Acide citrique.....	Q. S. p. 1 comprimé effervescent.

Boîtes de 3 tubes de 10 comprimés. Prix : 15 francs.

Laboratoires P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie

32, rue de l'Ouest — PARIS.

PRÉMALINE

(Rodénaorine)

Médication antipaludique totale.

Composition. — Association d'une partie de rodo-præquine et de 10 parties de quinacrine.

Présentation :

Comprimés dosés à :

Quinacrine	0 g. 10
Præquine (plasmochine).....	0 g. 005
Rhodoquine	0 g. 005

Indications. — Application des nouvelles méthodes de lutte contre le paludisme.

Posologie. — Pour 1 journée :

Adultes : 3 comprimés.

Enfants : de 1 à 5 ans : 1/2 comprimé.

Enfants : de 6 à 10 ans : 1 comprimé.

Vente autorisée seulement en France, aux Colonies françaises, en pays de protectorat français et sous mandat français.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PRESSYL

Composition :

Ampoules de 2 cc. contenant chacune :
 Camphramine 20 cgr.
 Pressédrine 5 cgr.
 Injection indolore, pas de réaction hypotensive secondaire.

Comprimés contenant chacun :

Camphramine 10 cgr.
 Pressédrine 2 cgr.
 Grande marge thérapeutique, tolérance générale parfaite.

Propriétés. — Hypertenseur par la Pressédrine (Excluant du sympathique). Tonicardiaque et analeptique respiratoire par la Camphramine.

C'est le médicament type des défaillances cardio-vasculaires et respiratoires aiguës et des hypotensions chroniques.

Indications :

Ampoules.

États de choc, syncopes cardiaques et respiratoires, Collapsus, États lipothymiques, Comas, États asphyxiques.

Traitement préventif de la syncope anesthésique et des accidents de la rachianesthésie et des anesthésies locales et régionales.

Traitement curatif du choc opératoire, du choc obstétrical.

Comprimés.

Hypotensions essentielles idiopathiques, Hypotensions symptomatiques des maladies infectieuses, Urticaires, Accidents sériques, Intolérances thérapeutiques, Hypervagotonies digestives.

Posologie :

Injection intraveineuse réservée aux situations graves commandant d'agir vite et énergiquement.

Injections sous-cutanées ou intramusculaires : leur effet dure de six à huit heures, elles peuvent être renouvelées toutes les deux à quatre heures.

Comprimés.

Chez l'adulte : 2 à 5 comprimés par jour.

La parfaite tolérance du PRESSYL autorise des doses nettement plus élevées.

Chez l'enfant, à partir de 6 ans, 1 à 3 comprimés par jour.

La boîte de 6 ampoules : 20 francs.

La boîte de 36 comprimés : 18 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. — Télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

- 1° Camphre et huiles essentielles aromatiques ;
- 2° Baume du Pérou, Acide cinnamique ;
- 3° Extrait opothérapique de peau animale.

Indications. — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.

Prix : 12 francs.

Laboratoires FISCH (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Lamartine 92-52.)

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En trois tubes de couleur différente :

- 1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33 p. 100) ;
- 2° Gelée au protargol à 2 p. 100 ;
- 3° Poudre de savon ;
- 4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (15 fr.), pour 8 à 10 applications.

Petit modèle (8 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND et LEROY,
Établissements MARREL, Successeurs.

74, rue de Jacobins — AMIENS (Somme).
(Tél. : 55-49.)

PRÉZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition :

Peptone de poisson, peptone de viande,
extrait sec de quinquina.

Mode d'action :

Prémunit l'organisme contre les accidents
de la sensibilisation (Théorie de Widal,
Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-
Radot).

Posologie :

Une à deux dragées une demi-heure avant
chaque repas.

Prix : 15 fr. (20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal - PARIS (XIII^e).
(Tél. : Glacière 24-48.)

PROBIOS

Thérapeutique mixte. Antivirus. Bactériophage.

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophages
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques.

Indications. — Infections pyogènes : Abcès, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

Mode d'emploi: Buvable, injections locales, pansements.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*)

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*)

PROBIOS ANTISTAPHYLOCOCCIQUE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

Indications. — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylocoques.

Mode d'emploi: Buvable, injections locales, pansements.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Présentation. — 5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophages.
5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus.

De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages, Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer, Pneumocoque.

Indications. — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi: Buvable, instillations nasales, Gargarisme.

Pommade (Voir à *Pommades PROBIOS*)

Comprimés (Voir à *Comprimés PROBIOS*)

PROBIOS ANTI B. COLI

Présentation :

Adultes :

4 ampoules incolores 5 cc. = Bactériophages.

4 ampoules jaunes 5 cc. = Antivirus.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores de 1 cc. = Bactériophages.

3 ampoules jaunes de 1 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, B. Par-Coli, Friedländer et Proteus.

Indications. — Toutes infections provoquées par B. Coli, Para-Coli, Friedländer et Proteus, notamment, Bactériuries, Cystites, Pyélites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

Mode d'emploi: Buvable, instillations vésicales ou dans le bassin.

PROBIOS INTESTINAL

Présentation :

Adultes :

5 ampoules incolores 2 cc. = Bactériophages.

5 ampoules jaunes 2 cc. = Antivirus.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores 1 cc. = Bactériophages.

3 ampoules jaunes 1 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedländer, Proteus, Staphylococciques, Streptococciques, Entéroccocciques, Pyocyaniques.

Indications. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons : Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières : Dysenterie bacillaire.

Mode d'emploi. — Buvable, instillations par voie rectale.

Comprimés (Voir *Comprimés Probios*).

PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE BUVABLE

Présentation. Traitement complet.

20 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant le Bactériophages.

20 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps bactériens.

Demi-traitement :

10 ampoules incolores de 5 cc. limpides, contenant les Bactériophages.

10 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps Bactériens.

Principes actifs. — Antivirus Corps Bactériens, Antigonococciques, Pseudo-Gonococciques, B. Coli, Entéro-cocciques, Streptococciques, Staphylococciques, Bactériophages Anti-entéroccocciques, Streptococciques, Staphylococciques, B. Coli.

Indications. — Urétrites aiguës et chroniques à Gonocoques. Injections urinaires.

Mode d'emploi. — Buvable, applications locales, pansements.

Vaccin *Probios Antigonorrhéique injectable* (Voir Vaccinothérapie *Probios*).

DENTIFRICE PROBIOS

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Antipyorrhéique, Prévient et guérit toutes les affections de la bouche, des gencives et des dents.

Mode d'emploi. — Habituel aux dentifrices.

PROBIOS CREAM

Antipyogène

Présentation. — En tube d'étain.

Indications thérapeutiques. — Contre boutons, dartres, crevasses, engelures, rougeurs de toute nature.

Mode d'emploi — En applications locales.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigô 40-83.)

PROCUTA

Topique au Thiodiméthoxyanthranol.

Propriétés thérapeutiques. — Topique actif, non odorant, non irritant. Agent de rénovation et de réfection épidermique.

Le Procuta exerce une action incontestable sur le psoriasis (Dr Brocq).

Indications. — Psoriasis. Pityriasis. Parakératoses psoriasiformes. Kératose pileuse. Dermatoses à formes squameuses.

Mode d'emploi. — Étendre le *Procuta* sur la région malade. Protéger par un pansement.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet. — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

PRODUITS LEMARY

Cartouches Lemary (boîte de 10) pour frictions à l'*Onguent Napolitain* 25 fr.

Suppos Lemary à l'Onguent Napolitain :
10 suppos *Adultes*, 0,04..... 22 fr.
12 suppos *Enfants*, 0,02..... 19 —
12 suppos *Nourrissons*, 0,01 17 —

Ampoules Lemary, à 3 dosages :
Cy-Hg 0,01 pour 1 cc. de solution stérilisée .. 15 fr.
Cy-Hh 0,01 pour 2 cc. de solution stérilisée... 15 —
Cy-Hh 0,01 pour 3 cc. de solution stérilisée... 15 —

Pilules Lemary (Voir Pilules Lemary).

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PRODYNASE

Médication Phosphorée, Calciqne, Magnésinée.

Composition. — Comprimés comprenant :

Méthylphosphate de Chaux	0 gr. 20
Méthylphosphate de Magnésie	0 gr. 05

Propriétés. — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

Indications. — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

Adultes : 2 comprimés au début des repas, midi et soir.

Prix : 20 francs.

Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10).

PROGASTER

Procédé Hély.

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Superoxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant sa décomposition instantanée en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissants. Chaque comprimé dégage 5 cgr. d'oxygène actif.

Propriétés. — Désinfectant remarquable du tube digestif. Amélioration surprenante de l'état général chez tous les chroniques. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant.

Indications. — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, convalescents. Tous les chroniques, tous les sédentaires.

Mode d'emploi. — Pas de contre-indication, pas d'accoutumance du nourrisson au vieillard.

Chez tous les chroniques : 2 comprimés le matin à jeun.

Dans les troubles digestifs : 2 à 6 comprimés et plus au moment de ces troubles.

Prix : 10 francs.

Dépôt chez tous les Grossistes.

9, rue de la Platière, LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

PROGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par l'Acridine.
Ampoules pour injections intraveineuses et comprimés.

PROGONE (Ampoules) :

Chlorhydrate du 2-7 diméthyl, 3-6 diéthanol amino-acridine en solution glucosée. Ampoules de 10 cc. (boîtes de 5 ampoules).

Indications :

Le Progone est un puissant agent anti-infectieux ; il permet l'acridinothérapie des septicémies, des infections urinaires et surtout de la blennorrhagie avec les meilleurs résultats et sans aucun incident thérapeutique. (Thèses de S. Lurié et de P. Porret, travaux de P. Barbellion, J. Fuchs, etc.).

Propriétés :

Le Progone ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents rénaux ou hépatiques, il ne sclérose pas les veines et ne colore pas les léguments.

Posologie :

Blennorrhagie aiguë : 4 à 5 injections intraveineuses par semaine pendant 2 à 3 semaines, ou de préférence une injection quotidienne pendant quinze jours.

Blennorrhagie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme. Complications. Infections urinaires diverses : 1 injection tous les deux jours par série de 15 injections.

Septicémies : un jour sur deux, 2 à 3 injections selon l'état du malade.

Compléter l'action des injections de Progone en prescrivant les jours intercalaires 4 à 8 comprimés de Progone.

Le Progone peut également être administré par voie rectale à raison d'une ampoule pour 1/2 verre d'eau tiède (un lavement le soir et au besoin un autre le matin.)

PROGONE (Comprimés) :

Les comprimés de Progone associent au dérivé d'acridine de la forme injectable :

La Kawaïne (seul balsamique utilisable à la période aiguë) ; l'Arbutine (calmant et antiseptique bien connu).

Indications :

La blennorrhagie masculine et féminine à toutes ses périodes : urétrites, cystites, prostatites, etc.

Les infections urinaires (pyélonéphrites, colibacillose, etc.).

Posologie :

Blennorrhagie aiguë : 4 à 8 comprimés par jour.

Blennorrhagie génito-urinaire chronique de l'homme et de la femme. Complications. Infections urinaires : 4 comprimés par jour.

BUCCO-PROGONE (Pastilles).

Traitement et prophylaxie des affections bucco-pharyngées.

Laboratoires SFÉAT :

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 13-31).

PROLAX

Granulé.

Simple et Composé.

Laxatif doux, Constipation sous toutes ses formes.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Le granulé doit être avalé sec en s'aidant d'une gorgée d'eau.

Composition. — Mucilage, Bourdaine, Casse, Sucre glacé.

Laboratoire AUCLAIRE

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 66-15.)

PROMÉTHINE

Cholagogue et Déoongestionnant physiologique.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Extrait fluide de Romarin Daussé, Excipient spécial.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiase biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère et tous troubles d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Durée moyenne : 10 jours.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires H. GOUIN

20, rue des Écoles — PARIS

(Tél. : Danton 81-53.)

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Bactériothérapie cutanée.

Indications :

Toutes plaies suppurées ou exposées à la suppuration. Furoncles, Brûlures : Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

Présentation. — Tubes étain de 30 grammes.

Prix : 10 francs.

Mode d'emploi. — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

Tél. : Balzac 22-94.

PROPIDON

(Bouillon stock-vaccin du Professeur Pierre Delbet.)

L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de B. pyocyaniques, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications :

Staphylococques fébriles, Anthrax, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Erysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination préopératoire.

Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule. A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à 3 ampoules. L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'ailleurs bien supportée.

Présentation. — Boîte de 3 ampoules de 4 cc. Prix : 20 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

Tél. : Balzac 22-94.

PROPIDON

Applications à la Bactériothérapie locale.

Propidon-Pansement :

Étui renfermant 1 ampoule de 5 cc.,
1 compresse, 1 coton, 1 imperméable.

Prix : 5 francs.

Propidon usage externe.

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. sans
pansement. Prix : 30 francs.

Indications. — Plaies cutanées de
toute nature, plaies chirurgicales,
angines, stomatites.

Propidon Stilligouttes :

Boîtes de 6 ampoules compte-gouttes.
Prix : 12 francs.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie
(Instillations, méchages).

Suppositoires au Propidon :

Boîtes de 10 suppositoires : Prix : 15 fr.

Indications. — Lésions de la région
anale, hémorroïdes, rectites.

Ovules au Propidon :

Boîtes de 6 ovules. Prix : 15 francs,
avec tampons stériles.

Indications. — Affections gynécologiques,
métrites, vaginites, pansements
post-opératoires.

Société Parisienne d'Expension chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines
du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac : 22-94.)

PROSTAL

Suppositoires Sédatifs.

Composition. — Extraits de Jusquiame, Ciguë, Ratanhia, Bromure de camphre, Prostatine, Hypophyse, Surrénine, Stovaine, Anesthésine, Menthol.

Propriétés. — Suppositoires analgésiques, décongestifs, opothérapiques.

Indications. — Troubles urinaires douloureux, Hypertrophie de la prostate, Hémorroïdes.

Dose. — 2 à 3 suppositoires par jour.

La boîte de 10 suppositoires : 16 francs.

Laboratoire MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).
(Tél. : Invalides 52-73.)

PROSTALYSE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Hypophysine 0 gr. 01, Surrénine 0 gr. 02, Prostatine 0 gr. 05, Orchitine 0 gr. 05, Extrait de Cupressus 0 gr. 02, Extrait d'œsculus 0 gr. 05.

Propriétés pharmacodynamiques. — Stimule et régénère les fonctions de la prostate par une association synergique d'extraits de glandes endocrines, décongestionne la prostate par des extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives.

Indications. — Prostatites aiguës et chroniques. Hypertrophie de la Prostate. Congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 dragées à chacun des deux principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 16 fr. 50 la boîte de 60 dragées pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

PROSTATIDAUSSE

(Chalones testiculaires prostatolytiques)

Nature du Médicament. — L'adénome prostatique provient de l'hypertrophie de l'utricule, résidu embryologique femelle inclus dans la prostate.

Cette formation reste atrophiée tant que le testicule fonctionne et exerce son action empêchante (effet de chalone); quand le déficit testiculaire survient, l'utricule se développe anormalement, écrase le canal de l'urètre et le prostatisme apparaît.

Le Prostatidausse est un extrait testiculaire de pouvoir chalonique très élevé. — Son activité est maintenue grâce à la dissolution de la chalone dans son milieu quasi naturel, c'est-à-dire le sérum de taureau. — Il est présenté sous forme d'ampoules de 5 cc. à utiliser par la voie buccale.

Indications thérapeutiques. — A titre préventif, le Prostatidausse sera pris par tous les sujets avoisinant la cinquantaine, surtout s'ils présentent un peu de dysurie et de la pollakiurie nocturne.

A titre curatif, il peut être utilisé à toutes les périodes de l'hypertrophie de la prostate, même dans les cas avancés; il fait parfois réapparaître la possibilité des mictions spontanées.

Posologie et Mode d'emploi. — (Ampoules buvables, à prendre le matin à jeun.)

A titre préventif, 6 à 12 ampoules par mois.

A titre curatif, 12 ampoules par mois à raison d'une ampoule par jour, pendant 12 jours consécutifs, ou une ampoule tous les deux jours pendant 24 jours, le matin à jeun demi-heure avant le petit déjeuner dans demi-verre d'eau sucrée. Le médicament ne provoque aucune réaction; il est bien toléré par l'estomac et ne comporte aucune contre-indication.

Laboratoire DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — Tél. : Turbigo 63-40.

PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

Composition. — Ion Hg + (très petite dose), extrait de solanées et de papavéracées, Hamamélis, Hormones prostatiques totales.

Indications thérapeutiques. — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques), Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Tenesmes, Contractions, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périnéales, Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non.

Mode d'emploi. — Le plus habituel, un le soir au coucher.

La grande boîte : 18 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 cgr. de fer et 5 mgr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 16 fr.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue de la Fraternité St-Mandé (Seine).
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

PROSTIGMINE « ROCHE »

Médicament synthétique destiné au traitement de la parésie intestinale post-opératoire.

Composition. — Ester diméthyl-carbamique du m-oxyphényl-triméthylammonium-méthylsulfate en solution de 0,5 p. 1.000 pour injections sous-cutanées ou intramusculaires. (Boîte de 6 ampoules de 1 cc.)

Propriétés. — Action rapide et sûre, sans aucun effet sur l'activité cardiaque et sur la pression sanguine.

Indications. — Atonie intestinale post-opératoire, post-partum, post-abortionum, spasmes de l'appareil uro-génital, etc.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Pour provoquer l'évacuation des gaz* : 1 ampoule de 1 cc. le lendemain de l'opération. 2° *Pour provoquer l'évacuation alvine* : 1 ampoule de 1 cc. suivie d'un lavement de 200 cc. environ d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-56.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

PROTENSÈNE LEJEUNE

Composition. — V gouttes contiennent :

Iode bisublimé	1 cgr.
Peptone de cœur	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt	1 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

Indications. — Hypertension, artériosclérose, affections cardio-vasculaires.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.

PROTÉODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injections hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

Propriétés. — Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la Protéodyne est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, puerpérales, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires. Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foins, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protéodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Prix : La boîte 4 ampoules Protéodyne, 20 francs.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalp, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

PROTÉO-MALTASE

Forme : Comprimés (tubes de 30 : 18 francs).

Composition : Papaine et Maltine pures, suractivées par procédé spécial, 0 gr. 25 par comprimé.

Indications thérapeutiques. — Complément indispensable de tout traitement des affections des voies digestives. Insuffisance de la digestion des aliments carnés et végétaux. Fermentations et putréfactions intestinales. Colites, Diarrhées, ballonnements dyspepsies hypo et hyperchlorhydriques, hépatites, troubles digestifs des tuberculeux, cholécystites, angiocholites, suites de gastrectomie, amaigrissement et asthénie des dyspeptiques ou par suite de grippe. Diarrhées et gastro-entérites des nourrissons.

Doses :

1 à 2 comprimés au cours de chaque repas.

Enfants : même dose.

Nourrissons : 1 comprimé délayé dans chaque bouillie ou biberon.

Laboratoire des Ferments végétaux suractivés

P. LECOEVRE, Docteur en pharmacie.

29, 31, quai Henri-IV et 1, rue Anglo — **DIEPPE**

Tél. : 22-81.

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocôlites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes :* deux dragées.

Enfants : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau.

Prix : la boîte de 50 dragées Protiodyne : 18 francs.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — **DIJON**. — (Tél. : 16-42.)

PROVAC'S

Vaccin polyvalent, injectable par voie sous-cutanée, constitué par les microbes anaérobies pathogènes de la flore bucco-pharyngo-dentaire.

Composition. — Spirochæta microdentium, Spirochæta macrodentium, Leptospira buccalis, Bac. fusiformis, Bac. ramosus, Staphylococcus parvulus, Micrococcus foetidus.

Indications :

Préventivement : avant toute opération effectuée dans la cavité buccale ou ses annexes.

Curativement : toutes les affections dues à la flore bucco-dentaire : angines, stomatites, abcès et phlegmons de l'amygdale, adénoïdites, sinusites, accidents de la dent de sagesse, arthrites dentaires aiguës et chroniques (pyorrée), alvéolites, suppurations chroniques broncho-pulmonaires, asthme.

Posologie et mode d'emploi :

Lieu d'injection : face postérieure du bras.

Mêmes doses pour les enfants et pour les adultes.

La grossesse n'est pas une contre-indication.

Cas aigus : 2 cc. d'emblée et 1 cc. matin et soir.

Cas subaigus : 0,5 cc. à 1 cc. par jour.

Cas chroniques : débiter par 0 cc. 1, augmenter lentement, espacer les injections (2-3 jours).

Précautions. — Les asthmatiques, les eczémateux, les malades atteints de suppurations fétides broncho-pulmonaires sont hypersensibles au Provac's ; il est indispensable de ne commencer leur traitement que par de très faibles doses 1/20^e ou 1/10^e de cc.

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc., prix au public : 24 francs. Boîte de 20 ampoules, prix pour dentistes et hôpitaux exclusivement : 52 francs.

Laboratoire Pharmaceutique DAUFRESNE

42, rue Thiers — LE HAVRE.

PROVEINASE MIDY

(Comprimés) Type de l'Endocrino-Phytothérapie veineuse.

Composition :

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus, Genêt, Marron d'Inde, Hamamélis et Viburnum.

2° Poudres *titrées* d'organes *frais*, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : **Thyroïde** 0,005, **Surrénale** 0,025, et **Hypophyse** 0,015.

Ces poudres sont mises en comprimés *dès fabrication*.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'Insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

États chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

États aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII°).

(Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

PROXYTOL

Association des Proxylases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).

Spécifique des affections gastro-intestinales.

Mode d'action. — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

Indications. — 1° Les dyspepsies ; 2° les entérites ; 3° l'insuffisance hépatique ; 4° les gastro-entérites des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés, pour un traitement de 6 à 8 jours.

Doses. — *Adultes* : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-doses.

Nourrissons : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

PRUNAGAR

Pruneaux, Agar-Agar, Cholagogues végétaux.

Le **PRUNAGAR** est sans danger ; son efficacité est souveraine pour le traitement de la constipation chronique ou accidentelle et de toutes ses conséquences (vertiges, migraines, énervements, pituites, glaires, états nauséux, dyspepsies, congestions, etc.), il devient un parfait régulateur de l'intestin.

Le **PRUNAGAR** n'irrite pas l'intestin en forçant sa muqueuse à sécréter ; il provoque des contractions douces, semblables à celles qu'on obtiendrait par un massage bien fait.

Le **PRUNAGAR** est en dragées, en forme de lentilles ; d'un emploi facile, en avaler sans croquer une ou deux dragées, avant ou pendant le repas du soir, suivant le résultat cherché. La selle arrive naturellement le matin, sans colique, ni douleur.

En boîte aluminium de 50 dragées. Prix : 12 francs.
L. N. G. 428-1.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 18-54.)

PRURILYSE

Spécifique du Prurit.

Composition :

Chloral, acide acétique, eau distillée double
d'Hamamélis, glycérine, eau de menthe.

Indications :

Prurit anal, vulvaire, sénile, etc. Urticaire,
Herpès, Prurigo, Piqures d'insectes et
toutes démangeaisons.

Mode d'emploi :

Lotionner les parties atteintes de Prurit,
une ou plusieurs fois par jour.

Produit non toxique, ne tache pas, ne graisse
pas.

Prix : 15 fr. le flacon.

— 7 fr. le flacon d'essai.

Laboratoire R. ROUSSEL

72, Grande Rue — FLERS (Orne).

PSORÉAL (Dragées)

Traitement interne du Psoriasis et de certaines dermatoses.

Composition. — Soufre. Hyposulfites de Na et Mg-Bi-Tartrate de K. — Résine de Gaïac. — Rhubarbe.

Propriétés. — Médication *anti-choc* et de *désensibilisation* par les Hypo-sulfites. *Elimination de S.* par la peau. Action concomitante du S. sur la cellule hépatique. Action stimulante des autres composants sur les glandes de défense : *Hépatobiliaires, Rénales, Sudoripares.*

Indications. — Traitement général du *Psoriasis* et de *toutes les dermatoses* pouvant provenir de la floculation ou de l'imprégnation de l'organisme par les toxines : *PSORIARIS, Eczémas, Herpès, Prurits, Urticaires...*

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 dragées au début des 3 repas.

Dose moyenne : 6 dragées par jour.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, suivant l'âge.

Durée habituelle du traitement : 1 mois.

Prix. Le flacon de 60 dragées : 18 francs.

Envoi franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON
DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORÈNE GOUTTES

Traitement interne du PSORIASIS

Gouttes Iodo-Arsenicales-Hydrargyriques-Méthylarsinées.

Un gramme = 2 milligrammes d'AsI³, 2 milligrammes de HgI², 1 centigramme de Méthylarsinate. (Ce dernier augmentant le pouvoir tonique et dépuratif de AsI³ et compensant le caractère parfois débilitant de Hg.)

Enregistré au L. N. O. M. et autorisé pour les Assurances Sociales.

Propriétés thérapeutiques. — Action curative de As-I-Hg, sur l'imprégnation de l'organisme par les toxines bacillaires d'origine suspecte ou provenant de maladies héréditaires ou acquises (Φ ou Σ souvent associées).

Indications. — *Traitement interne du PSORIASIS* (ou traitement d'entretien après piqures ou cures thermales). Affections héréditaires. Déchéance organique hérédo-spécifique. Lupus.

Mode d'emploi. — 1° *Enfants* : 1 à 11 gouttes par jour et par année d'âge, en deux ou trois fois (à partir de deux ou trois ans).
2° *Adultes* : X à XX ou même XXX gouttes 3 fois par jour, soit de XXX à LX ou CX gouttes par 24 heures. Dose habituelle : LX gouttes par jour. Toujours commencer par la dose minima : augmenter régulièrement et rester 15 jours à la dose maxima prescrite. Redescendre en 5 jours au point de départ. S'arrêter 10 jours et reprendre au besoin le traitement.

Prix du flacon : 18 francs. Envoi franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON
DINAN (Côtes-du Nord).

PSORÉON

Traitement local du Psoriasis seulement.

Composition. — Médication chrysophanique, Hydrargyrocadique en pommade, Produit enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments et admis pour les Assurances sociales.

Propriétés. — Spécifique du Psoriasis, Réducteur complet, antiprurigineux et Kératoplastique, Spécialité efficace, pratique, peu irritante.

Indications. — Uniquement le Psoriasis et les affections psoriasiformes.

Présentation. — Tube habituel : 20 francs ; tube très grand modèle (environ 3 fois 1/2), pour psoriasis généralisés, Ass. Soc., etc. : 50 fr. Boîtes de 1 kilo pour Hôpitaux seulement.

Envoi franco France et Colonies françaises.

Mode d'emploi. — En applications pendant la nuit, après sérieux nettoyage des plaques.

Laboratoire ÉON

DINAN (Côtes-du-Nord). (Tél. :137.)

PSORYL

Composition. — Dérivé anthranolique.

Indications. — Traitement externe :

- 1° *Dermatoses squameuses* ou sèches non irritables : Psoriasis, Parakeratoses, Eczémas squameux ou secs, non irritables, Eczématides, Lichens plans chroniques, Lichénifications secondaires.
- 2° *Dermatoses parasitaires* : Trichophyties, Epidermophyties, Erythrasma, Pityriasis, Eczémas mycosiques, Teignes, Tolveau.
- 3° *Dermatoses diverses* : Pelades.

Formes. Mode d'emploi :

- 1° Solution. S'emploie dans le Psoriasis du tronc et des membres (action rapide, procédé propre, sans odeur), les parakératoses, les pelades.

Un badigeonnage léger le soir.

- 2° Pommade. Une application le soir.

Prix : Psoryl solution ou Psoryl pommade : 16 francs.

Laboratoire R. SAVOIRE

Docteur en Pharmacie,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

VENDOME

(Téléph. 26.)

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Parakératoses psoriasiformes. Psoriasis avec ou sans arthropathies.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule au maximum, et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Séries de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire : Psothanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 25 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

PSYLLIUM LANGLEBERT

Composition :

Semences de Psyllium noir de Provence, sélectionnées et triées à la main, ne renfermant ni pierre ni débris végétaux.

Indication :

Par le mucilage qu'elles contiennent, les semences de Psyllium Langlebert augmentent le volume du contenu intestinal ; ramollissent les selles dures et agglutinent les selles liquides. Recommandé aussi bien dans la constipation que pour l'entérite.

Mode d'emploi :

Une à deux cuillères à soupe le soir dans le potage, ou pur, et après, absorption d'un demi-verre d'eau.

Prix de vente au public : 12 francs.

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

PULMOCARDINE

Simple.

Indications. — Affections dyspnéiques pulmonaires et cardio-pulmonaires : *Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Scléroses pulmonaires, Gazés de guerre.*

Composition. — *Dragées faciles à prendre.*
Iodure de Caféine. Grindélia. Lobélia. Quebracho.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Traitement pour 10 jours : 16 francs.

CONTRE TOUTE CRISE AIGÜE DE DYSPNÉE :

Prescrire Pulmocardine ÉPHÉDRINÉE

1 dragée toutes les 1/2 heures, jusqu'à effet.

Soulagement immédiat.

Littérature et échantillons :

**Laboratoires J. PERROCHON
TOURS**

PULMODION

1° Tube de 30 comprimés à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine).....	0,004
Extrait d'Aconit	0,003
Extrait de Belladone	0,003
Extrait de Marrube.....	0,10
Extrait de Drosera	0,01
Terpine.....	0,05

2° Sirop à base de Dionine, Sulfogalacolate de potasse, Bromoforme.

Indications. — Affections respiratoires. Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans *accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1° *Comprimés* : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2° *Sirop* : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Contenance du flacon de sirop : 220 grammes.

A prendre le plus loin possible des repas. Prix : 16 francs.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Marcadet 37-98.)

PULMODYNOL

Spécifique broncho-pulmonaire tonique et eupnéique.

Formule :

Chlorhydrate d'Ephé-		Codéine	0 gr. 015
drine	0 gr. 05	Alcoolature rac. d'aco-	
Sulfate de Spartéine...	0 gr. 075	nit.....	0 gr. 36
Chlorhydrate d'éthyl-		Teinture de Belladone.	0 gr. 36
morphine	0 gr. 015	Teinture de Drosera ..	0 gr. 72
Acide phosphorique ..	1 gr.	Teinture de Grindelia..	0 gr. 72
Sulfogalacolate de po-		Essence de Rhum.....	0 gr. 09
tasse	1 gr. 10	Sirop de sucre q. s. p...	100 gr.

Flacon de 210 gr. environ. Prix : 15 francs.

Particularités. — Contient éphédrine, spartéine et acide phosphorique associés aux sédatifs de la toux et aux antiseptiques pulmonaires. Goût très agréable. Tolérance absolue.

Emploi. — De 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. } Existe en ampoules
1 à 2 par jour.

Ampoules : Lécithine, Goménol, Eucalyptol, Cholestérine, Strychnine. Ampoules de 2 cc.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques. Bronchites, Emphyseme, Asthme, Catarrhe, Grippe, Laryngites.

Laboratoires du SEDARTHRYL

(Antirhumatismal.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS.

O. C. P. Toutes Drogueries et Pharmacies.

PULMOFLUIDE

Élixir glycéro-Alcoolique sucré de **Terpine** et **Terpinol** associés aux principes balsamiques du **Tolu**, **benjoin**, **eucalyptus**.

Fluidifiant et aseptisant les sécrétions bronchiques, dont l'expectoration est facilitée par l'**Ipéca**.

Les propriétés décongestives de l'**ipéca** s'ajoutent à celles de l'**Aconit**.

La **sédation** de la toux est obtenue par de faibles doses de **Belladone** et surtout par la **Codéine**, le plus sûr et le plus inoffensif des alcaloïdes de l'opium.

Indications. — Rhumes, Bronchites, grippe, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonie, Tuberculose pulmonaire et, en général, tous les cas où un **Dégagement broncho-pulmonaire** s'impose rapidement.

—— Le Pulmofluide fluidifie ! ——

Pas de contre-indications.

Doses. — 3 à 5 petits verres à liqueur par jour, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 12 francs le flacon de 180 cc.

PULMOFLUIDE ÉPHÉDRINE

Même formule que le précédent avec 1 centigramme de chlorhydrate d'**Ephédrine g.** par cuillerée à soupe.

—— Eupnéique incomparable. ——

Indications principales. — Asthme bronchique, Emphysème, Trachéo-bronchite, Bronchite chronique, Oppression, Tuberculose pulmonaire ouverte.

Contre-indications. — États hypertensifs, Myocardites, Néphrites.

Mode d'emploi. — Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe 4 à 5 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : 1 cuillerée à dessert 4 à 5 fois par jour.

Au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café 4 à 5 fois par jour.

Comme préventif et curatif de la crise d'asthme :

1 cuillerée au début de l'accès, puis de 2 heures en 2 heures, sans dépasser la dose quotidienne.

On pourra prévenir la crise en prenant 1 cuillerée 1 heure ou 2 heures avant son apparition habituelle.

Présentation. — En flacon de 180 cc. Prix : 14 francs.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 46.

Laboratoire LEURQUIN

50-52, rue Pierre-Legrand — LILLE.

(Tél. : 311-05.)

PULMOGROG

Seul sédatif de la toux ne produisant ni constipation, ni inappétence, ni dépression.

Aucune notice intérieure.

Pulmogrog adultes, sans stupéfiants.

Élixir agréable (Dionine, bromoforme, aconit, noix vomique et cannelle).

Prix : 12 francs.

Doses :

3 à 5 cuillerées à café de 5 à 10 ans.

3 à 5 — à dessert au-dessus et vieillards.

3 à 5 — à bouche pour les adultes.

Pulmogrog enfants, sans toxiques.

Sirop agréable aux bromures (Ca, Mg, AzH^4 , chloral drosera; belladone). Toux spasmodiques, coqueluche.

Doses :

Par demi-cuillerées à café jusqu'à 1 an.

3 à 5 cuillerées à café de 1 à 3 ans.

3 à 5 — à dessert de 3 à 5 ans.

Par cuillerées à soupe au-dessus.

Prix : 10 francs.

Laboratoire FERCOCQ, Licencié ès Sciences

LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 03-97).

PULMONAIRE ^{Dr} ^{Paul} BOURGOGNE

Le calmant de la Toux.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient :

Extrait d'Opium	0 gr. 01	Teinture Aconit	0 gr. 08
Codéine	0 gr. 01	Teinture de Grindelia.	0 gr. 05
Thiocolum	0 gr. 15	Teinture de Lebelie ..	0 gr. 05
Eau de Laurier-Cerise..	0 gr. 40	Sirop de Punch. Q.S.	20 gr.

Avantages. — Formule très active et très agréable : donne dans une tasse d'eau chaude un véritable grog au punch.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe par jour :

Une à 9 heures du matin, une à 3 heures après-midi, une à 9 heures du soir, dans une infusion de fleurs pectorales.

Au besoin une 4^e cuillerée au cours de la nuit.

Indications. — Bronchites chroniques, grippe, rhumes négligés, asthme.

Présentation. — Flacon contenant 12 cuillerées à soupe.

Comme complément pour les affections de la gorge : Collutoire et gargarisme concentré.

BORSALYL

Triple association de Borate, Benzoate et Salicylate de Soude.

Flacon de 45 cc.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél. : Gobelins 36-96.)

PULMORECTOL

(Ampoules).

(Suppositoires adultes et enfants).

Forme. — Ampoules et Suppositoires (Adultes et enfants).

Composition. — Héléline, Codéine et essences balsamiques pures.

Indications. — Bronchites, Pneumonies, Broncho-Pneumonies, Coqueluche, Tuberculose et abcès fistuleux.

Posologie. — Une ampoule de 2 cc. à mélanger dans une cuillerée à soupe de lait en lavement à garder, ou suppositoires.

Prix : (Ampoules : 19 francs.
(Suppositoires : 16 francs.

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, r. des Moines, Paris 17^e. (Tél. : Mar. 04-02.)

PULMOSEPTINE

Dragées.

Composition. — Eucalyptol, Phosphate de Galacol, Terpene, *Cinnamate de Soude*, Codéine, *Lactate de Chaux*.

Indications. — 1^o *Toutes affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures* : Rhino-pharyngites, Laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites aiguës, grippe à forme respiratoire, etc...

2^o *Etats chroniques* : Laryngites chroniques, catarrhe respiratoire des fumeurs, bronchites chroniques, etc.

3^o *Toux nerveuses de toute origine* : toux spasmodique, coqueluche et toux coqueluchoïde, accidents mineurs de l'asthme, etc.

Forme et posologie. — Un flacon de 50 dragées.

Adultes : 6 à 8 dragées par jour, dans les états aigus. 3 à 4 dragées par jour dans les états chroniques.

Enfants : demi-doses.

A prendre à n'importe quel moment de la journée (avant, pendant ou après les repas).

Prescrire par exemple : 3 dragées à avaler avant le repas du soir et 3 avec une infusion chaude avant dormir.

Aucune contre-indication. — Ne provoque pas de constipation. N'irrite pas l'estomac.

Prix : 14 fr. 80, taxe comprise.

Laboratoires des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Docteur en Pharmacie,
183, rue de Rome — MARSEILLE.

PULMOSÉRUM

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-7.

Forme. — Solution.

Solution codéinée de Galacol synthétique en milieu phosphorique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antiseptique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe, matin et soir, ou au milieu des repas, dans un peu d'eau.
Le flacon : 15 fr. (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 62-30.)

PULMOSITOIRES

Forme. — Suppositoires créosotés.

Formule :

Adultes : XXX gouttes créosote par suppositoire.

Enfants : X gouttes créosote par suppositoire.

Indications. — Bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, prévention des complications post-opératoires.

Prix : 15 francs.

Laboratoire Ch. SEGUIN

7, rue Sainte-Isaure — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Mon. 33-86.)

PULMO-THIORINE

Opothérapie pulmonaire. Extrait trachéo-broncho-pulmonaire. Hypo-sulfite de soude et de magnésie granulé.

Thérapeutique de fond de toutes les affections pulmonaires subaiguës et chroniques et de toutes les suppurations de l'arbre respiratoire et de ses annexes.

Indications. — Ozène, Sinusites. Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge, et des bronches. Adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites. Trachéo-bronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Gangrène pulmonaire. Catarrhes chroniques. Bronchites persistantes des gazés et des vieillards. Tuberculose pulmonaire (formes torpides et formes sécrétantes). Pneumonies et séquelles de pneumonies. Pleurésies séro-fibrineuses. Pleurésies purulentes de la grande cavité de l'interlobe ou du médiastin. Kystes hydatiques pulmonaires suppurés, fistulisés. Ostéo-arthropathies pneumiques.

La cuillerée à café 5 gr. de granulé renferme : 0,25 d'extrait pulmonaire, 0,20 d'hyposulfite de Na, et 0,05 d'hyposulfite de Mg.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café 3 fois par jour avant les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien,

39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

PULSAMONE

Antispasmodique végétal.

Composition. — Anémone pulsatille, Gui, Passiflore, Saule Blanc, Mélisse, Aubépine.

Forme. — Solution aromatique, de saveur agréable.

Propriétés. — Médication équilibrante du système nerveux central ; action complémentaire efficace dans les névroses liées à l'irritabilité du sympathique.

Avantages. — Composition strictement végétale, absence rigoureuse de stupéfiants et de barbituriques.

Indications. — Nervosisme, Insomnies, Anxiété, Aéro-phagie, Troubles cardiaques et menstruels d'origine nerveuse, et tous cas de déséquilibre vagosympathique.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 francs.

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol (*faible dose*), eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

INDICATIONS. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

MODE D'EMPLOI. — **Poudre** : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche. Contenance du flacon 100 grs.

Pastilles. — 8 à 10 par jour. Boîte de 40 pastilles.

Prix : Poudre : 14 fr. — Pastilles : 4 fr. 75.

Laboratoire JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Marcadet 37-98.)

PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH⁴).

Licence exclusive Sandoz.

Pulvita est employé en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Prix : 20 francs et boîte grand modèle contenant 7 boîtes ordinaires, au prix de 6 boîtes : 120 francs.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique ou à alcool, dit pulvérisateur « Pulvita » appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par **Pulvita** dans de bonnes conditions.

Prix : Elect. : 160 francs. — Alcool : 100 francs.

Pulvita est admis aux Assurances sociales.

Pour toute documentation écrire aux

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Auteuil 11-86.

PURARGOL

Composition. — Solution stérilisée et titrée d'Argent colloïdal chimiquement pur à 5 p. 100.

Présentation. — Ampoule compte-gouttes scellée, très pratique à l'emploi.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant dénué de toute causticité et toxicité. Action surtout catalytique s'opposant au développement des bactéries.

Indications. — Antisepsie préventive et curative dans les maladies infectieuses (grippe, scarlatine, etc.) ; en Rhino-Laryngologie (coryzas, sinusites, rhinites, angines, laryngites) ; en Otologie (otites, abcès, écoulements) ; en Oculistique (inflammations et infections oculaires, conjonctivites, blépharites, etc.).

Mode d'emploi. — *Rhinologie* : IV à V gouttes dans chaque narine, une ou plusieurs fois par jour.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade deux ou trois fois par jour.

Oculistique : introduire deux fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Obstétrique : introduire I ou II gouttes dans chacun des yeux du nouveau-né, sitôt sa première toilette faite.

Prix : 17 francs.

Durée de traitement : 15 à 25 jours.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).

PURGANOL DAGUIN



Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage. Laxatif préféré des nourrices.

Le flacon contient 20 pastilles soit 40 doses laxatives. Prix : 8 francs.

Échantillons sur demande aux

Établissements DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine). (Tél. : Gravelle 00-27.)

PURGAREX

Comprimés plats dragéifiés Inaltérables.

Toutes les Constipations.

Ne donne pas de coliques.

Composition :

Produit phyto-opothérapique formé par l'association de principes végétaux (Podophyllin, Boldo, Artichaut, Evonymine, Cascara, Agar-Agar, Jusquiame, Belladone), avec des extraits de glandes intestinales et biliaires.

Propriétés :

Laxatif doux et sûr. — Cholagogue. — Rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales.

Indications :

Toutes les *constipations*. — Toutes les Affections *Hépto-biliaires* et leurs conséquences. — *Artériosclérose* et Hypertension. — *Cholestérinémie*.

Doses et mode d'emploi :

Une ou deux dragées le soir au repas. Avaler sans croquer. Ne donne pas de coliques.

Autorisé par les Assurances Sociales.

S. G. R. Pr. Ph.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire du PURGAREX

Louis CAVALLIER, Pharmacien

Lauréat de l'École de Pharmacie

58, rue du Rempart — VALENCIENNES
(Nord).

PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.
Composition. — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pomade ni un pansement gélifié. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques, streptocoques, b. coli, entérocoques, b. pyocyaniques*).

Avantages. — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

Indications. — Abcès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Syco sis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

Prix : 15 francs.

Laboratoires des **AMPHO-VACCINS.**

A. D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

PYOCOLINE

Acidifiant, Antiseptique urinaire Diurétique.

Composition. — Chlorure d'Ammonium, Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine, Terpène.

Indications. — Colibacilloses, Cystites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Lithiases (oxaluriques et phosphaturiques), Cystites des prostatiques.

Forme. Mode d'emploi. — Comprimés glutinisés, 6 à 10 par jour au milieu des repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires **R. SAVOIRE**

Docteur en Pharmacie

Ancien interne des hôpitaux de Paris,
VENDOME (Loir-et-Cher).

(Tél. : 26.)

PYODOLYSINE

Dentifrice antipyorrhéique

Méthode de désensibilisation des muqueuses buccales et gingivales par l'hyposulfite de sodium.

Action topique et antiseptique (phénol camphré, iode, thymol).

Action hémostatique, tonique et astringente (acide gallotanique).

Formes : 1^o Pâte Gingivale en tube.

2^o Solution Topique.

Mode d'emploi. — 1^o. — A) Brossage biquotidien des dents et des gencives avec une brosse dure ou demi-dure recouverte d'un ruban de pâte.

B) Rinçage de la bouche avec un verre d'eau bouillie auquel on aura ajouté de 30 gouttes à une demi-cuillerée à café de Solution Topique.

2^o. — Attouchements des gencives 2 à 3 fois par semaine avec la Solution Topique pure.

Particularités. — Pâte dentifrice colloïdale. Grâce à un excipient spécial, la pâte PYODOLYSINE constitue un Gel maintenant ses principes actifs dans un état moléculaire parfaitement dispersé, ce qui leur assure un meilleur contact avec les muqueuses.

Indications — Pyorrhée alvéolaire, Stomatites, Gingivites, aphtes ; Gencives sanguinolentes, tuméfiées ou douloureuses ; Dents déchaussées. Employé comme Dentifrice courant, assure une parfaite hygiène dentaire.

Prix au public :

Pâte : 12 francs. — Topique : 20 francs.

Durée du tube de pâte : environ trois mois.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N^{os} 1569-2 et 1569-3.

Echantillons sur demande :

Laboratoires de la PYODOLYSINE

F. MARTIN, Pharmacien

2, rue des Trois-Mages - MARSEILLE. — Tél. Gar. 60-31.

PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Mélange de leucocytes et ferments sécrétés par les globules blancs en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey* (Leucocythérapie).

Propriétés thérapeutiques. — Médication préventive et curative de toutes les infections microbiennes non chroniques. Doit être injectée dès l'apparition des symptômes infectieux qu'elle fait, alors, souvent avorter.

Indications. — Grippe traînante ou compliquée. Septicémies. Etats puerpéraux. Infections pleuro-pulmonaires, Angines, Typhoïdes et Paratyphoïdes, Colibacillozes, Péritonites, Cholécystites, Pyélonéphrites, Suppurations, Méningites, Encéphalites.

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Voie intramusculaire ou, en cas d'urgence, voie intraveineuse.

Chez les Adultes : 2 à 3 ampoules par jour.

Chez les Enfants : Demi-dose.

La Pyoformine doit être employée précocement ; elle ne détermine aucune réaction, ni locale, ni générale.

Prix au public : La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Litté 58-43.)

PYOGÉNOL « INAVA »

(Gelée Dermatologique Antipyogène)
(Vaccination locale antipyogène polyvalente)

Excip. au soufre organique assimilable.

Les toxines neutralisées, les filtrats polymicrobiens et le Bactériophage donnent à ce produit un pouvoir immunisant considérable par la diffusion immédiate d'antigènes solubilisés.

Indications. — Furoncles, Orgelets, Anthrax. Toutes plaies infectées, Gerçures, Crevasses, Brûlures.

Mode d'emploi. — En massage au pourtour des foyers d'infection, ou à distance, deux fois par jour sur la peau saine. Imprégnation de compresses sur la lésion.

Prix : 15 francs le tubé G. M.

E. GUIGNIER, pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 31-30.)

PYOREX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-40.

Forme. — Pâte dentifrice.

Composition. — Arsolithol Bailly (sel de Lithium de l'acide acétylaminoparaoxyphénylarsinique). Lactate d'éthoxydiaminoacridine et Ricinoléate sodique insipide adsorbés par le kaolin colloïdal.

Propriétés pharmacodynamiques. — Pâte gingivale antispirillaire, antimicrobienne, antitoxinique polyvalente à pouvoir microbicide extrêmement élevé, parce que ses éléments ont leurs propriétés antiseptiques dirigées sur des groupes d'espèces pathogènes d'origine et de spécificité différentes. Modifie le milieu buccal et le rend impropre à la vie microbienne.

Indications. — Gingivites, stomatites, adjuvant au traitement chirurgical de la pyorrhée alvéolaire, préventif des associations fusospirillaires.

Mode d'emploi. — En massages gingivaux dans les gingivites, comme pâte dentifrice dans les caries et les affections dentaires et l'hygiène buccale biquotidienne.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 62-30.)

PYO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

Indications. — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adéno-phlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

Posologie. — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc. les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les 2 jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 25 francs.

PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — Imbibé de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11).

PYRALLIUM

« L'équilibrant cellulaire. »

Composition :

Une dragée de **Pyrallium** contient :

Extrait d'allium Sativum stabilisé correspondant à son poids de plante fraîche.....	0,10
Pyrophosphate diacide de calcium...	0,20

Ces deux éléments sont associés, par un procédé spécial, en *un complexe colloïdal* permettant, *pour la première fois en thérapeutique*, d'utiliser les propriétés bien connues de l'ail, même à doses élevées, sans aucune fétidité de l'haleine et sans brûlures d'estomac, inconvénients qui avaient empêché jusqu'à présent cette médication de prendre « la place de premier plan à laquelle elle a droit » (Leclerc).

Propriétés :

L'Ail : action antiseptique générale à électricité pulmonaire et intestinale.

Action tonique.

Action hypotensive, toni-cardiaque et vago-tonique. (Lœper, Leclerc, Lemaire, Thèses du Dr Pouillard, du Dr Guillon.)

Le Pyrophosphate diacide de calcium

$$\text{P}^2 \text{O}^7 \text{Ca H}^2.$$

Tonique puissant et modificateur des humeurs, vient renforcer l'action de l'ail en apportant à la cellule :

1^o *La fonction acide physiologique*, rétablissant l'équilibre acido-basique sans déminéraliser ;

- 2° *Le phosphore* dont l'action est bien connue ;
- 3° *Le calcium* à l'état *ionique*, dont on connaît depuis peu l'importance énorme dans les échanges cellulaires (Bigwood).

Indications :

Médication de base dans toutes les manifestations de l'Alcalose ; rétablit l'équilibre humoral et cellulaire, facilite les échanges, mobilise les déchets :

- a. L'Asthénie, physique et intellectuelle, quelle qu'en soit l'origine.
- b. Ralentissements de la nutrition : arthritisme, obésité, etc. Dépôts dans les tissus de phosphates alcalino-terreux insolubles en milieu hypoacide : artériosclérose, hypertension.
- c. Maladies de l'âge : vieillissement prématuré, déficiences cellulaires.
- d. *Les états de déminéralisation*, phosphaturie, grossesse, rachitisme, croissance difficile, tuberculose, etc.
- e. Le Syndrome entéro-rénal, la Colibacillose.

Posologie :

De 4 à 8 dragées par jour, avant ou au cours des repas, avaler sans croquer. Tolérance absolue.

Présentation :

Boîte de 50 dragées : Prix : 16 francs.

Laboratoires COUDERC

28-30, rue du Four — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 17-42.)

PYRÉLAINE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 04 de soufre organique *combiné non oxydé* doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive.

Contrairement aux formes habituelles du soufre *per os*, la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfurées*. Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, Cholécytite, Rhumatismes chroniques, Goutte, Dermopathies, Parasites intestinaux.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 01 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 4 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 12 francs.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT
MOUGNAUD et C^{ie}, pharmaciens

Étab. M. Levassor, 35, av. de Beauté — Le Parc-St-Maur (Seine).
(Tél. : Gravelle 00-37.)

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée) 60 cc, avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C, si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A. — 2 cc. antithermiques ; 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B. — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (XXV-L à répéter), chercher la dose-levier ; Dysménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espace*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L., 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

Gouttes ; (25 cc.) 18 fr. Ampoules $\left\{ \begin{array}{l} \text{A (2 cc. } \times 6) \\ \text{B (5 cc. } \times 6) \end{array} \right\}$ 16 fr.

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(Tél. : Gobelins 00-70.)

PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo- α - α -diamino-pyridine.)

Corps chimique nouveau, antiseptique génito-urinaire réellement actif, car il agit dans la profondeur des muqueuses et s'élimine en partie par les glandes des voies génito-urinaires.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Gonorrhées, Colibacilloses.

1° *Dragées par voie buccale.* Le flacon de 20 dragées
21 francs, 3 à 6 par jour.

2° *En ampoules pour voie intraveineuse.* Traitement d'attaque des affections génito-urinaires graves par la stimulation du système réticulo-endothélial. La boîte de 10 ampoules : 14 francs, 1 à 4 par 24 heures.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

PYROCUROL

Traitement des Brûlures.

Solution tannique composée, stérilisée, d'une efficacité remarquable par ses qualités antiseptiques et cicatrisantes. Le Pyrocurool possède également de puissantes propriétés anesthésiques dues à l'adjonction d'un produit de la série des éthers de l'acide paramino-benzoïque qui en font un excellent remède dans le traitement des brûlures.

Grâce à un nouveau procédé de tannage par pulvérisation, il réalise l'application la plus rationnelle et la plus efficace, permettant d'obtenir une guérison rapide en atténuant ou supprimant la douleur, et en favorisant la reconstitution des tissus sains.

Le *Pulvérisateur*, modèle déposé, s'adapte à tous les flacons et peut servir indéfiniment.

Mode d'emploi. — 2 à 3 pulvérisations par jour sur la surface brûlée, selon indication du médecin.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien
47, rue Nollet — PARIS (XVII°).

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

PYUROL

Composition. — C'est une combinaison de l'urotropine avec :

1^o Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;

2^o Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

Indications. — Action antiseptique sur l'appareil urinaire, action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse.

Forme et mode d'emploi. — Granulé soluble.

Adultes : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane. prises :

La première à jeun.

La seconde une heure avant le déjeuner,

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures

Enfants : ces doses sont diminuées de moitié.

Dose pour 7 jours. Prix : 15 francs.

Laboratoire A. LE BLOND

Pharmacien de 1^{re} classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 25 francs.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes* : 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants* : 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes* : 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants* : 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50

Les Établissements C. DAVID-RABOT

C. DAVID et ses Fils, pharmaciens

49, rue de Bitché — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 01-41.)

QUASSINOL

Gouttes

Anorexie, Surmenage, Anémie, Stimulant des fonctions digestives.

Formule : Teinture Quassia..... 40 grammes.

Teinture Colombo 20 —

Teinture Noix vomique 20 —

Excipient alcool-glycérine. Q. S.... 100 —

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 1610-1.

Présentation. — Flacon compte-gouttes de 24 cc. Prix au public : 15 francs.

Mode d'emploi : *Adultes* : XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin, avant chaque repas.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Durée du traitement, 15 jours environ.

Laboratoires du QUASSINOL

J. OLIVE, pharmacien de 1^{re} classe.

73, bd. Baille, et 109, rue de Lodi — MARSEILLE
(Tél. : Marengo 55-06).

R. C. Marseille 117-209.

Compte Chèques postaux : Marseille 43-564.

QUINA BOURCET

GRANULÉ

Composition. — Saccharure fondant exactement titré à 4 % d'extrait sec de Quinquina. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-1.

Mode d'emploi. — Granulé titré à 0 gr. 20 par cuillerée à café avant les repas pour les enfants ; granulé titré à 0 gr. 60 par cuillerée à soupe pour les adultes.

Indications. — Anémie, Tuberculose, Grippe, Convalescence, Neurasthénie, Paludisme, Maladies infectieuses. Anorexie.

QUINA BOURCET

SOLUTION

Composition. — Cette solution, exactement titrée à 4 % d'extrait sec de Quinquina. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-2.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe (0 gr. 60 d'extrait) avant les repas pour les adultes. Une cuillerée à café (0 gr. 20 d'extrait) avant les repas pour les enfants.

Indications. — Stimulant de la Digestion, recommandé dans l'Anémie, l'Anorexie, le Diabète, la Grippe, la Neurasthénie, les Convalescences et dans toutes les maladies aiguës, dans la Cachexie palustre et le Paludisme.

Laboratoire du QUINA BOURCET
7, avenue du Doyenné — LYON.
(Téléphone : F 25-35.)

QUINACRINE (ATÉBRINE)

Noms déposés.

Dichlorhydrate de la chloro 2-diéthylamino-pentylamino 5-méthoxy-7-acridine. — Vente limitée à la France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français. — Médication antipaludique essentiellement schizonticide, créant dans l'organisme un état réfractaire contre l'hématozoaire. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes les formes du paludisme. Traitements curatifs et préventifs.

Présentations. — Chocolatés de tannate de quinacrine (pour très jeunes enfants). Un chocolaté correspond à un comprimé.

Comprimés dosés à 0 g. 10 de Quinacrine. Tubes de 15 et 30 comprimés.

Ampoules de Quinacrine pour préparation extemporanée de solutions injectables. Boîtes de 12 ampoules à 0 g. 10 et boîtes de 5 ampoules à 0 g. 30 (avec même nombre d'ampoules bidistillées).

Dose habituelle.

Adultes et enfants de plus de 8 ans : 0 g. 30 par jour.

Enfants de 5 à 8 ans : 0 g. 20 par jour, jusqu'à 4 ans : 0 g. 10 par jour.

Durée du traitement : 5 jours au minimum, 8 jours au maximum.

Périodes de repos de 3 à 4 jours. A titre prophylactique : deux comprimés deux fois par semaine. Absorber les comprimés, sans les faire dissoudre, au moment des repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique « **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Balzac 22-94.)

QUINA PEPSINÉ BLOT

Gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 940-1.

Composition. — Extrait total dosé de quinquina succirubra, combiné à la pepsine. Obtenu *sans sucre ni alcool*.

Caractéristiques. — Agit à doses dix fois moindres que les teintures courantes. Pas de phénomènes d'intolérance.

Indications. — Faiblesse générale. Dénutrition. *Paludisme*. Maladies pneumococquiques. Tuberculoses. Nervosisme et maladie de Basedow. Constipation. Diabète.

Doses. — Comme stimulant de la nutrition : XV gouttes un quart d'heure avant chaque repas.

Dans la prophylaxie de la grippe : II gouttes (5 mgr. d'alcaloïdes) le matin.

Dans le traitement du paludisme : L à LX gouttes deux fois par jour.

Comme tonique du système nerveux et du cœur
X gouttes à chaque repas.

Le flacon : 16 francs.

Laboratoires du QUINA BLOT

38, boulevard de Strasbourg — TOULOUSE.

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval	0 gr. 30
Glycérophosphates composés	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné.....	0 mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 12 francs.

(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

Tél. : 31-63.

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique
avec fer et arsenic assimilable.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre). ..	0 gr. 60
Fer combiné.....	0 gr. 015
Arsenic combiné	0 mgr. 90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 14 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, grippez, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 16 francs.

Autorisé par les *Assurances Sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS
(Tél. : Trinité 29-29.)

QUINICARDINE

(Sulfate de quinidine pur).

Forme. — Comprimés à 0 gr. 20.

Indications. — Arythmie complète par fibrillation auriculaire, Arythmie extrasystolique, Tachycardie paroxystique de Bouveret, Auricular flutter, Eréthisme cardiaque (Basedow).

Doses. — Consulter la notice complète qui sera adressée sur demande.

Prix : 14 fr. 35.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).
Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

QUINIMAX

Alcaloïdes totaux suractivés du Quinquina.

Composition. — Sel complexe obtenu par combinaison des alcaloïdes totaux du quinquina (dans la proportion exacte où ils existent dans l'écorce du *Cinchona succirubra*) avec un dérivé phénolique activant.

Propriétés. — *Antithermique, antipaludique et reconstituant* agissant à faibles doses. Ne provoque aucun des inconvénients de la quinine, ni bourdonnements d'oreille, ni brûlures d'estomac, ni vertiges, ni inflammation locale.

Indications thérapeutiques. — *Paludisme, Asthénie et Cachexie palustre. Etats fébriles, gripes et toutes indications habituelles de la quinine.*

Formes :

Comprimés à 0 gr. 10.	La boîte de 20.	Prix au public.	10 fr. 50
	40.		19 fr.
Ampoules. de 1 cc à 0 gr. 10	La boîte de 10.	Prix au public.	17 fr.
— 2 cc à 0 gr. 20	— 10.		20 fr.
— 4 cc à 0 gr. 40	— 10.		25 fr.
Suppositoires Enfants 0 gr. 05	La boîte de 10.	Prix au public.	18 fr.
— Adultes 0 gr. 15	— 10.		22 fr.
Granulé chocolaté pour enfants			20 fr.

Posologie. — Même mode de prescription que la quinine, mais à doses 3 à 4 fois moindres.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

QUININE-CALCIUM-SANDOZ

Combinaison de Gluconate de quinine et de « Calcium-Sandoz ».

Indications. — Pneumopathies aiguës de l'adulte et de l'enfant, grippe, rhumatisme, pyrexies.

En obstétrique ocytotique. Fièvre puerpérale.

En chirurgie : prophylactique dans les affections post-opératoires des voies respiratoires.

Posologie. — Moyenne. *Adultes* (voie intramusculaire ou endoveineuse) : 1 ampoule de 10 cc, par jour.

Par voie veineuse, il convient de tâter la susceptibilité du malade avec de faibles doses avant de recourir à la posologie normale.

En obstétrique, comme ocytotique : 2 à 4 cc. à la fois. Si nécessaire, après une à deux heures injecter de nouveau 2 cc., une à deux fois, par la voie intramusculaire.

Enfants (voie intramusculaire) : jusqu'à 3 ans, 1 cc. par jour.

De 3 à 6 ans, 2 à 3 cc. par jour. Au-dessus de 6 ans, 5 cc. par jour.

Formes: — Ampoules pour injections intramusculaires et endoveineuses. Une ampoule de 10 cc. contient 0 gr. 60 de gluconate de quinine (corresp. à 0 gr. 37 de quinine basique anhydre) et une solution de « Calcium-Sandoz » à 10 p. 100.

Prix :

La boîte de 5 amp. de 10 cc. 30 fr. — La boîte de 10 amp. de 5 cc. 50 fr. — La boîte de 10 amp. de 10 cc. 32 fr.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

QUININE PELLETIER

Marque des Trois Cachets.

Composition et présentation. — La QUININE des TROIS CACHETS se présente sous forme de perles renfermant le sel de quinine en nature, légèrement comprimé sans addition de gomme, sucre, amidon ou poudres inertes.

Elles sont dosées à 10 egr. et se délivrent en tubes de 10, 20, 50, 100 capsules.

Indications. — Névralgies, fièvres intermittentes, paludisme, fièvres pernicieuses, fièvre typhoïde, affections hépatiques et spléniques des pays chauds, anémies.

Posologie. — Variable suivant les indications.

Prix : variable suivant les différents sels.

Le LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE fabrique des capsules aux sels de quinine suivants : Sulfate ; Bisulfate ; Chlorhydrate ; Valérianate ; Bromhydrate ; Bichlorhydrate ; Chlorhydrosulfate. Chaque perle porte imprimé en noir le nom de PELLETIER.

Laboratoire de Pharmacologie Gén^{le}, VIAL et Cie
8, rue Vivienne — PARIS
(Tél. : Gutenberg 27-03.)

QUININO-PHYTINE

■ Inosito-hexaphosphate de quinine.

CIBA

58 p. 100 de Quinine ; 9 p. 100 de Phosphore.

Phosphate organique de quinine, très soluble, d'une parfaite tolérance, unissant à l'action spécifique de la quinine l'action tonique et reconstituante du phosphore végétal.

Indications. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Tube de 20 comprimés.

Flacon de 50 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

QUINIO-STOVAR SOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-
1-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications :

Paludisme viscéral : hépatite, splénomégalie, anémie et cachexie palustres.

Traitement eutrophique complémentaire des divers traitements antimalariques. Quinacrine (Atébrine), Præquine (Plasmochine) — noms déposés. —

La Quinacrine et la Præquine ne sont vendues qu'en France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français.

Présentation : Tubes de 20 comprimés à 0 g. 25.
Prix : 15 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 4 comprimés par 24 heures (3 ou 4 séries de 10 jours, séparées par 5 jours de repos).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

QUINIUM ROY

Composition :

Granulé inaltérable, représentant le complexe intégral du Quinquina. Le Quinium Roy renferme tous les principes actifs (fébrifuges et toniques) d'écorces sélectionnées, principes obtenus par notre méthode spéciale, sous la forme reconnue la plus active. Aucune analogie avec les extraits de quinquinas ordinaires.

Indications :

Fièvre, Asthénies (post-grippales et autres), Paludisme, Convalescences, Anémie.

Doses :

Tonique et reconstituant : 1 cuillerée à café aux repas.

Fébrifuge : par cuillerée à soupe.

Le Quinium Roy se prend en nature ou dissous dans un liquide au choix.

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 05-46.)

QUINOBORE

Poudre Antiseptique, Astringente, Cicatrisante, Désodorisante, Décongestive.
Produit idéal pour l'hygiène intime de la femme.

Mode d'emploi. — Injection : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie.

Prix : 10 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 25 jours.
Non toxique, Usage externe. Non caustique.

Laboratoire du **PHOSOL**

L. QUINET, Pharmacien-Préparateur.

143, rue du Temple — PARIS.

(Tél. : Archives 42-27.)

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine. Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres. Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules : 6 et 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr., 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

Ampoules, boîtes de 6. Prix : 11 fr., 15 fr., 20 fr., 25 fr., 30 fr., 35 fr.

Boîte de 12. Prix : 17 fr. 50, 27 fr., 35 fr., 43 fr., 52 fr., 60 fr.

Cachets, boîte de 6. Prix : 8 fr., 14 fr.

Boîte de 12. Prix : 14 fr., 24 fr.

Comprimés, boîte de 10. Prix : 6 fr., 10 fr. 50, 14 fr., 19 fr.

Boîte de 20. Prix : 10 fr. 50, 17 fr., 24 fr., 32 fr.

Pilules. Prix : 13 fr.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Laboratoires H. LACROIX

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Nord 54-57.)

QUINOÏDINE DURIEZ

Dérivé du quinquina. Exempt des intolérances de la quinine, supérieur à elle dans les états chroniques. (Communications à l'Académie de médecine de Paris, etc..., littérature sur demande.)

0 gr. 10 principe actif par dragée.

Indications. — Grippe, paludisme et leurs séquelles : prévention et traitement. Névralgies grippales ou palustres.

Tonique général : convalescence des maladies infectieuses : diphtérie, pneumonie, typhoïde, etc.

Tonicardiaque : petites défaillances, nervosité ou irrégularité du cœur, avec ou sans lésion.

Posologie. — Comme tonique et préventif, contre les séquelles de grippe ou de paludisme ou en thérapeutique du cœur : selon l'âge et la sensibilité du sujet : 1 à 2 dragées par jour, au début des repas.

Comme fébrifuge et antinévralgique (états aigus) : 2 à 6 dragées par jour, à intervalles égaux, pendant une ou plusieurs semaines, à doses décroissantes.

Prix : le tube de 60 dragées : 13 francs.

Peut être prescrit aux assurés sociaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-1.

DURIEZ — 20, place des Vosges — PARIS.

QUINOLAX

Composition. — A base de Cinnamate de Quinine, Phénacétine, Aloïne, Podophyllin, Guaranine, Essence de Cannelle de Ceylan.

Forme : Comprimés.

Propriétés. — Anti-infectieux, anti-thermique, analgésique, laxatif stomachique et cholagogue, tonicaardiaque, diurétique et myosthénique, tonique général.

Indications. — *Infections :* Grippe, coryza, fièvres infectieuses (préventif et curatif) ; *Etats douloureux :* céphalées, névralgies, sciatique, lumbagos, rhumatismes, migraines. *Paludisme. Affections hépatiques.*

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : la boîte de 24 comprimés : 10 fr. 50 (4 à 8 jours).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Galvani 84-41.

QUINOSIPHON

Formule :

Acide phénylquinoléique Carbonique.	0,10
Extrait aqueux Orthosiphon stamineus.	0,016
Ether salicylique de l'Acétylparami-	
nophénol	0,10
Extrait total de boldo	0,035
Pour un comprimé dragéifié.	

Posologie. — 4 à 6 comprimés espacés dans la journée.

Indications. — Lithiases hépato-rénales, Favorise excrétion de l'urée et des chlorures, Analgésique des manifestations uricémiques et arthritiques.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du CYTOBIASE

A. MARTIN, 25-27, rue du Commandant-Rivière — COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 03-62.)

QUINQUINA GMET

Composition. — Extrait total obtenu directement et exclusivement à l'aide du *Quinquina succirubra*. Coloration et amertume parfaitement naturelles. Sans alcool.

Propriétés. — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

Indications. — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée. Athrepsie. Angines, Panaris, Furoncles, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET pouvant occasionner (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.) (Admis aux Assur. Soc.).

QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée
en tablettes glutinisées.

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

Calmant immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par l'ion salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications. — Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures de préférence loin des repas afin que l'action sédatrice soit plus rapide.

Cas chroniques : Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants : de 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 15 francs. Peut être prescrit aux A. S.

Laboratoire du QUINSAL

F. BOLLA, Docteur en pharmacie.

Licencié ès sciences.

GRAY (Haute-Saône) — (Téléphone : 126.)

Échantillon et littérature sur demande.

QUINTHÉRYL

Composition. — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

Applications. — *Traitement curatif de la coqueluche, correctif de toutes les toux quinteuses émétisantes, de l'asthme et de l'emphysème.* Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

Présentation :

1° Ampoules de 1 cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

Posologie. — Une injection *intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 14 francs.

— Série B : 17 francs.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie

Licencié ès sciences. Ancien Elève de l'Institut Pasteur.
Lauréat de l'Académie de Médecine.

1, rue Paul-Bert — ANGERS

(Tél. : 38-61.)

QUINTOLYSE FERET

Extrait de Cochenille (Acide carminique), produit non toxique, le Médicament de la Coqueluche.

Indications. — Coqueluche, Toux Nerveuses, Toux Quinteuses Emétisantes, Grippe, Rougeole, Asthme.

Propriétés thérapeutiques. — Réduit rapidement le nombre et l'intensité des quintes et enraye les vomissements.

Mode d'emploi. — A prendre en dehors des repas dans un peu d'eau sucrée.

Enfants : de 6 mois à 1 an, V à X gouttes 2 à 3 fois par jour.

De 1 an à 3 ans, XII à XV gouttes, 3 à 4 fois par jour.

De 3 ans à 6 ans, XX gouttes, 3 à 4 fois par jour.

De 6 mois à 12 ans, XXX gouttes 3 à 4 fois par jour.
Au-dessus de 12 ans et adultes : XL gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de la QUINTOLYSE

M. FERET, Pharmacien

4, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

Tél. : Trudaine 27-26.

QUINTOZONE

(Inhalant-RévuIsif)

Médication naturelle et externe des maladies de l'appareil respiratoire.

Formule. — Essences balsamiques ozonisées (Pin, Eucalyptus, Lavande, Serpolet... etc.), 13 + Benzoate de benzyle, 1 + Iodure d'éthyle, 0,5 + Acétate d'éthyle, 0,2 + Excipient, 85,3.

Indications et mode d'emploi :

Coqueluche, bronchite, broncho-pneumonie, badigeonnages et frictions sur le thorax.

Asthme, Rhume des foins, Coryza : Inhalations fréquentes sur un mouchoir.

Laryngites, trachéites, Angine : Compresse, Inhalations.
Assainissement des chambres des malades : Vaporisation, Evaporation.

Propriétés. — **Avantages.** — Odeur agréable, analgésique, antispasmodique, anticongestif.

Le QUINTOZONE agit par évaporation et endosmose.

Présentation. — Flacon stilligoutte pour usage externe.

Prix : 10 francs.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

18, rue Daval — PARIS (11^e).

QUINURYL

Cachets :

Acide quinique	0,25
Théobromine.....	0,10
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,25 par cachet.

Comprimés :

Acide quinique.....	0,125
Extrait aqueux sec d'Orthosiphon Sta- mineus	0,15
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,05 par comprimé

Indications :

Antiurétique, Spécifique de l'Azotémie, Adjuvant du régime hypoazoté.

L'Orthosiphon Stamineus est un diurétique hépato-rénal agissant sur l'élimination de l'urée et des chlorures.

(Comm. Soc. de Thérapeutique, janv. 1936.)

Symptômes de la petite Azotémie : vertiges, céphalées, éblouissements, bourdonnements d'oreilles.

Arthritisme, Oligurie.

Cachets (Quinuryl), Comprimés (Quinuryl-Ortho).

Mode d'emploi :

2 à 4 cachets ou 4 à 8 comprimés par jour.

La boîte : 16 fr. 50 (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

RADIO-BARYX

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Aliment opaque en poudre contenant 60 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur, aromatisé au cacao débarrassé et sucré.

Enregist. au labor. nat. de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-1.

Avantages. — Facile à diluer, Agréable au goût, met l'estomac en présence de produits familiers, ne provoque aucun spasme réflexe. Expulsion du bol fécal facilitée mécaniquement par l'addition d'une petite quantité d'agar-agar. Conservation parfaite.

Posologie :

Estomac 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 fois.

Région cœco-appendiculaire 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit 400 gr. dans 500 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans un grand bol et délayer peu à peu avec de l'eau chaude ou froide (ou du lait) en évitant les grumeaux jusqu'à obtention d'une crème liquide.

Présentation. — Boîte de 200 grammes : Prix : 12 francs.

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél. : n° 71).

R. C. Rambouillet 5-184. — Compte chèques postaux Paris 1857-27.

RADIOBAUME ADRIAN

A base de stovaine, baume du Pérou, gaïacol, extrait de noyer et naphtolate de soude.

Présentation. — Pommade en tube.

Indications thérapeutiques. — Préparation kérato-plastique et kératogénique. Protège, cicatrise, vitalise. A utiliser au cours des traitements par l'électricité, les rayons X, les rayons ultraviolets, l'héliothérapie. Traitement idéal des brûlures, coups de soleil, rougeurs, crevasses, irritations de la peau, etc...

Posologie. — A utiliser en onctions.

Le tube : { Grand modèle : 16 francs.
 { Petit modèle : 10 francs.

Société Française

de Produits Pharmaceutiques,

Anciennement **ADRIAN et Cie,**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RADIOGASTROL

Le médicament de choix des Gastropathies rebelles.

Composition. — Bismuth, Salicylate, Charbon activé polyvalent, Carbonate de chaux, Ergostérine irradiée, Phosbiose.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Intoxications, Fermentations, Ulcérations, Pyrosis, Entéro-colites, Asthénie.

Présentation :

Forme *poudre*. — Forme *comprimés*.

La grande boîte : 16 fr. — La 1/2 boîte : 10 fr.

Posologie :

Poudre : 1 cuillerée à café avant les repas et une autre après, si besoin.

Comprimés : 3 à 5 comprimés avant les repas et autant après, si besoin.

Laboratoires BOYER et Cie

12, rue Pavée — PARIS (IV^e).

RADIOMAGNÉSIUM

Comprimés de chlorure de magnésium (0,50) radioactivé par le bromure de mésothorium (1/50^e de microgramme) et possédant à la fois les propriétés décrites par le P^r Pierre Delbet, à l'Académie de Médecine (séance du 10 juillet 1928) et les propriétés radioactives du Bromure de Mésothorium, vitalisant cellulaire de premier ordre et excitant des produits auxquels il est associé.

Indications du Radiomagnésium

1^o Reconstituant dans tous les cas de fatigue et d'asthénie ; neurotonique puissant, dépression, convalescence, surmenage. — 2^o Infections intestinales, entérites, fermentations intestinales, constipations, insuffisance hépatique, toutes infections de voies biliaires. — 3^o Tremblements et prurits séniles ou autres, maladie de Parkinson, contractures, crampes. — 4^o Troubles nerveux, hypervagotonie. — 5^o Dermatoses autotoxiques, prurits, eczéma, acné, psoriasis. — 6^o Verrues et lésions de type précancéreux. — 7^o Prophylaxie du cancer et traitement adjuvant des néoplasmes.

Contre-Indication du Radiomagnésium. — Aucune.

Boîte de 48 comprimés : Prix de vente au public : 20 francs.

Boîte de 48 comprimés : Prix médical : 14 francs.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre les comprimés dans un verre d'eau. De 2 à 4 comprimés par jour. A prendre moitié avant le coucher et moitié au réveil.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél.: Wagram 58-89. R. C. Seine 255 068 B.

RADIO SALIL

Composition. — Bromure de Mésothorium, Salicylate de Glycol, Capsicine, Menthol.

Action. — Analgésique, révulsive, résolutive. Combat efficacement et rapidement l'élément douleur, la radioactivité produite par le Bromure de Mésothorium exaltant les propriétés thérapeutiques des autres éléments actifs.

Indications. — Toutes douleurs aiguës : rhumatismes, goutte, sciatique, lumbago, névralgies faciales et intercostales, foulures, etc... Comme révulsif, dans la congestion des voies respiratoires.

Présentation. — Crayon fondant, pour usage externe, d'un emploi pratique, ne tachant ni les mains ni le linge, et sans odeur désagréable.

Mode d'emploi. — Applications *locodolenti*, non suivies de frictions. Recouvrir légèrement de coton ou de flanelle. Avant chaque application, nettoyer la peau à l'alcool.

Laboratoires UROMIL

L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 04-00.

RADIOTÉTRANE GÉRARD

Composition. — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux Rayons X.

Avantage. — Stable, de composition constante, non toxique, goût agréable.

1° A. Forme dragées : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2° B. Forme colloïdale : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

3° C. Forme poudre : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz.

4° Formes ampoules : pour injection intraveineuse.

Indications. — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

1° A. Dragées : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14^e et la 16^e heure : 25 fr.

2° B. Forme colloïdale : mélanger le contenu des deux flacons immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 60 cc.) : 25 francs (dose unique).

3° C. Forme poudre : faire dissoudre dans un tiers de verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz : 20 francs (dose unique).

4° D. Forme colloïdale grand modèle, créée pour l'application de la méthode Sandström : 50 francs.

5° E. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 3 gr. pour application de la méthode de Sandström : 40 francs.

6° F. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 2 grammes pour application de la méthode de Sandström : 28 francs.

7° G. Forme intraveineuse : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bidistillée et injecter très lentement : 12 fr. 50.

Laboratoire du Dr LAURENT-GÉRARD

40, rue de Bellechasse — PARIS (VII^e).

(Tél. : Inv. 78-44).

RANGOL

Forme. — Comprimés.

Formule :

Gardénal, Tartrate borico-potassique, NaBr, Extraits de datura, jusquiame, gelsemium, cratægus, ballote, passiflore, valériane stabilisée, pancréas.

Indications :

Irritabilité du sympathique, angor, névroses, insomnies, spasmes.

Posologie :

2 à 8 comprimés par 24 heures par doses fractionnées.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-26.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine
PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

RAPHABIL

Association des principes actifs du suc de *Raphanus sativus niger* fixés sur un charbon activé et d'acide déhydrocholique.

Propriétés. — Action cholérétique, cholécystokinétique. Drainage du cholécyste. Propriétés laxatives par excitation du péristaltisme intestinal.

Indications. — Insuffisance hépatique et foie torpide.
— Insuffisance biliaire. — Atonie et stase vésiculaires
— Troubles digestifs gastriques qui en dérivent : sensation de pesanteur gastrique, ballonnement, somnolence après les repas, difficile digestion des corps gras, migraines, etc. — *Constipation.* — Selles irrégulières.

Posologie et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 dragées 2 à 3 fois par jour, après les repas. Dans les cas de constipation opiniâtre, prendre le matin à jeun 2 dragées de Raphabil.

En général, le traitement de l'insuffisance hépatobiliaire doit être de très longue durée.

Prix. — Le tube de 40 dragées : 14 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII°).

RAPHARÈNE

Composition. — Extrait fluide glycéринé de *Raphanus sativus barbiens*, «procédés d'extraction du Docteur H. R. OLIVIER» : techniques permettant la conservation des principes actifs à l'état où ils se trouvent dans la plante fraîche.

Action thérapeutique. — Étudié sur l'homme, par tubage duodénal, le RAPHARÈNE excite la contraction vésiculaire, provoque l'apparition de bile B et décuple la sécrétion de la bile A hépatique. Il est, à la fois, cholagogue et cholérétique, à un degré qu'aucune autre substance ne peut dépasser. Il combat la constipation chronique essentielle en suppléant à l'insuffisance hépatique biliaire qui en est souvent la cause. Aucune accoutumance ni irritation secondaire sur l'intestin.

Indications :

Lithiase biliaire : Coliques hépatiques, cholécystites subaiguës et chroniques, calculs vésiculaires, hépatites d'accompagnement.

Stases biliaires : Des constipés, des appendicites chroniques, des dyspepsies, atonies vésiculaires, vésicules de stase.

Insuffisances hépatiques : Cirrhoses, ictères, petite insuffisance hépatique; hépatites scléro-congestives douloureuses des gros mangeurs et des coloniaux. Hépatites amibiennes et paludéennes, Hypertrophie hépatique des diabétiques. Insuffisance hépatique des diabètes traités par l'Insuline. Cholémie familiale. Convalescence des maladies infectieuses.

Angiocholites, aiguës et chroniques.

Mode d'emploi. — 1° *Médication stimulante cholagogue et cholérétique :*

Adultes : 1 cuillerée à entremets ou 2 pilules un quart d'heure avant les deux repas de midi et du soir, 10 jours par mois dans les états vésiculaires, les insuffisances hépatiques et la lithiase.

Enfants : 1 cuillerée à café ou 1 pilule par jour dans les mêmes conditions.

Deux formes :

RAPHARÈNE liquide : 30 francs.

RAPHARÈNE pilules : 18 francs.

Laboratoires JOURNET,

18 et 20, rue Vavin. — PARIS (VI)^e.

Danton 70-07.

RAVIX

Lait en poudre Guigoz irradié, 300 unités internationales de Vitamine D pour 100 gr. de poudre.

Soumis aux radiations ultra-violettes en couche extrêmement mince, il conserve, du fait de son conditionnement sous vide, son pouvoir antirachitique pendant plusieurs mois. (Délai d'utilisation mentionné sur la boîte.)

En raison de son activation par les U.V., il présente une légère odeur d'ozone, témoin de son irradiation, néanmoins il est bien accepté par les nourrissons.

Indications. — Rachitisme, prérachitisme, convalescence, débilité, leucorrhées banales.

Mode d'emploi. — 5 gr. de poudre pour 25 à 30 gr. d'eau tiède ou froide, jamais bouillante.

Posologie. — a. Préventive : 20 à 30 gr. de poudre par jour.

b. Curative : 50 à 80 gr. de poudre par jour, dose à ne pas dépasser, sauf pour les adultes.

Pour les bébés, compléter avec le lait habituel.

Le traitement curatif est de 6 à 8 semaines.

Voir :

Lait en poudre GUIGOZ.

Lait Déchloruré GUIGOZ.

Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.

Babeurre GUIGOZ.

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

RÉALPHÈNE

Composition. — Ether phosphorique du glucose (2 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé et d'élixir, et Acétylaminooxyphénylarsinate (5 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé ou d'élixir).

Indications. — Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques.

Présentation et prix. — Granulé, élixir : 20 francs.
Coffret de 3 flacons de granulé : 50 francs.

Posologie :

Adultes : Granulé et élixir : 2 à 4 mesures ou cuillerées par jour au début du repas.

Enfants : Granulé : 1 à 2 mesures au début du repas.
Une semaine de traitement sur deux.

Nourrissons : Granulé : 1 à 3 demi-mesures par jour.
4 jours de traitement sur 8.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Nature à base de Noix vomique, Arrhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Prix : 22 francs.

Laboratoire

du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest — PARIS.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECRESALE

Composition. — Orthophosphate monosodique.

Indications. — 1° Toutes les maladies infectieuses aiguës.

2° Faiblesse constitutionnelle ; anémie, rachitisme, scrofule, tuberculose, y comprise la tuberculose osseuse.

3° Etats d'épuisement général, physique ou psychique, par suite de surmenage, spécialement aussi chez les enfants en âge scolaire ; stimulation de la capacité de rendement physique et mental.

4° Stimulation énergétique de la guérison après interventions chirurgicales et gynécologiques.

Posologie. — Comprimés de Recresal : 3 fois par jour 1 à 3 comprimés 1/4 d'heure après le petit déjeuner et le déjeuner de midi.

Présentation :

Petite boîte : 30 comprimés : 8 francs.

Grande boîte : 60 comprimés : 15 francs.

Laboratoire RECRESALE

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES,

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

RECT'ACOLITOL

Pansement recto-sigmoïdien.

Composition. — Sous-gallate de Bismuth ; carbonate de Bismuth ; carbonate de Calcium ; Ferripyrine ; Extrait de Jusquiame ; Extrait de Cupressus ; Antipyrine ; Oxyquinoléine ; Mucilage végétal.

Présentation. — Granulé fondant permettant la préparation d'un lavement crémeux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement protecteur antiseptique, antiparasitaire, cicatrisant, sédatif. Traitement local par lavement des affections inflammatoires, infectieuses ou parasitaires des segments terminaux de l'intestin.

Indications. — Recto-sigmoïdites, Recto-Colites, Rectites, ano-rectites, hémorroïdes internes.

Posologie. — Affections ano-rectales : une cuillerée à potage mélangée à 5 cuillerées à potage d'eau chaude. Affections recto-sigmoïdiennes : 2 cuillerées à potage mélangées à 10 cuillerées à potage d'eau chaude. *Enfants* : quart ou demi-dose selon l'âge.

Prix : 18 francs.

LANCOSME 71, avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

RECTAGINE

(Suppositoires radifères.)

Composition. — Organate d'argent à 17 p. 100 d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

Indications. — 1° *Chez l'homme* : Agit sur les complications de la blennorragie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme* : Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes et des ovaires.

3° *Cas particuliers* : Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorroïdes internes et les oxyures.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 15 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 73-92.)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Æsculine adrénalinée et d'Orthocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdique parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 14 francs, complète.

Tube de rechange : 12 francs

Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoire de la Varilaxine.

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée, dans les suppositoires, de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose*, dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — *Enfants* : demi-dose.

Prix au public :

Frcs : 13,50 le pot de Rectopanbiline.

Frcs : 10 la boîte de suppositoires.

Laboratoire du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

RECTO PANSEMENT AMIBIASINE

Ampoule lavement de 125 cc.

Composition. — Le Recto Pansement Amibiasine est un composé gélateux Amibiasine à 5 % d'Agar Agar et 20 % d'Amibiasine normale.

Propriétés. — L'action désinfectante, calmante et cicatrisante de l'Amibiasine y est mise à profit. La gélose maintient l'Amibiasine en contact intime avec la muqueuse rectale congestionnée et ulcérée.

Calme le ténesme, les coliques intestinales.

Le Recto Pansement : *panse, désinfecte, cicatrise.*

Indications. — Rectolites diffuses ou localisées, hémorragiques ou purulentes. Entérocolite, colites légères ou graves, diarrhées profuses des tuberculeux, des cancéreux, des anémiés, des vieillards. Dysenteries aiguës et chroniques, parasitaires ou microbiennes. Dermatoses d'origine digestive. Eczéma, Colibacillose, etc. Diarrhées rebelles, ténesme. Rectites de toutes origines.

Mode d'emploi. — *a.* Faire prendre au malade un lavement évacuateur à l'eau bouillie salée à 7 gr. par litre. *b.* Deux heures après administrer le Recto Pansement comme un lavement après avoir eu soin de liquéfier le contenu de l'ampoule en la chauffant au bain-marie. Une ampoule de 125 cc. en lavement tous les 2 jours. Compléter le traitement local par 3 comprimés d'Amibiasine quotidiennement.

La boîte (une ampoule de 125 cc.) : 12 francs.

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e).

RECTOSEPTOL

Suppositoires anti-infectieux permettant de réaliser l'imprégnation créosotée suractivée.

Agissent sur toute la flore pathogène.

Composition : Ad. Enf.

Créosote pure..... 0 gr. 50 0 gr. 30

Sulfate double d'orthoxyquinoléine..... 0 gr. 02 0 gr. 012

Essences antiseptiques..... 0 gr. 04 0 gr. 024

Camphre..... 0 gr. 05 0 gr. 03

Indications. — *Toutes affections broncho-pulmonaires* et bacilloses ; prophylaxie des complications pulmonaires de la grippe et de la rougeole et des accidents pulmonaires post-opératoires.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

Pour les nourrissons, employer 1/2 supp. enfant.

La boîte de 8 suppositoires : *Enfants*, 15 fr. — *Adultes*, 18 fr.

Parfaite tolérance gastrique.

Aucune action irritante.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

RECTOSOL **Suppositoires** **Antihémorroïdaires.**

A base d'iodorésorcinosulfite de Bismuth avec excipient Rectoline.

Indications. — Hémorroïdes internes et leurs complications.

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires le matin une heure environ avant la selle, après l'application de la Rectoline, ou le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont congestionnées et douloureuses, par suite de la fatigue de la journée.

Durée moyenne de l'unité vente : 10 jours.
Prix : 14 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGERES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

REINICALCINE

Thérapeutique Mangano-calcique Opothérapique.

Forme. — Cachets.

Composition. — Fluorure de calcium, Hydrate de Magnésie, Lactate de Manganèse, Nucléinate de soude, Diastase pure, Poudre de Pancréas, Poudre de foie, Poudre de rein, Poudre de rate, Inositophosphate de chaux et Magnésie, Lactate de chaux, Phosphate tricalcique.

Posologie. — 1 cachet avant le petit déjeuner et le déjeuner de midi, suivant avis du Médecin traitant.

Indications. — Phosphaturie, Anémie, Amaigrissement, Surmenage, Prétuberculose, Lymphatisme, Rachitisme, Déficience organique, Dénutrition, Convalescence, Manque d'appétit, Carence.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments N° 403-11.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

RÉNOCARDINE

Le cardiotonique de la soixantaine.

Indications. — Cardiopathies décompensées, Insuffisance myocardique, Néphrites et Cirrhoses, (Edèmes et Ascites, Urémie et toutes insuffisances cardio-rénales.

Ni toxicité. — Ni accoutumance. — Ni accumulation.

La Renocardine est un cardio-tonique d'entretien et un diurétique rénal aussi actif que le théobromine, mais ne provoquant ni céphalée ni intoxication urique.

Composition. — Dragées d'extraits physiologiquement titrés, de plantes fraîches stabilisées :

Pyrole. Adonis vernalis. Fleur de genêt.

Doses. — Deux dragées au début des deux repas.
Traitement pour 8 jours : 16 francs.

Littérature et échantillons.

Laboratoires J. PERROCHON
TOURS.

RÉNOLINE

Cachets.

Bleu de Méthylène.....	0,01
Salicylate de Phénol	0,50
Buchu pulvérisé.....	0,07
Benzoate de lithine	0,20
Bicarbonate de soude.....	0,10
Benzoate de soude.....	0,10

Pour 1 cachet.

Indications. — Antisepsie vésico-rénale,
Diathèse urique et ses conséquences.

Doses. — 2 cachets par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires LECONTE

7, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 53-16.)

RENOXYL

Toutes insuffisances rénales.

Comprimés contenant l'extrait de salsepareille.

Propriétés thérapeutiques. — Provoque la diurèse, active l'élimination de l'urée, augmente l'excrétion de l'acide urique.

Indications. — Néphrites chroniques, azotémie, uricémie, albuminurie, migraines, céphalées, asthénie.

Présentation. — Boîte de 50 comprimés titrés à 5 cgr. de principe actif.

Prix : 14 francs.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour administrés en deux fois au moment des principaux repas.

Enfants : demi-dose.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
Tél. : Littré 58-43.

RÉSOCAÏNE

Spécifique du Coryza et des affections douloureuses du Nez et des Sinus.

(Sédation et décongestion immédiates.)

Forme. — Pommade nasale.

Composition. — Adrénaline physiologique ; Bismuth sous-gallate ; Essence de Niaouli ; Cocaïne ; Chlorhydrate d'amyléine ; Résorcine ; Menthol ; Essence de Thym ; Excipient stérilisé.

Indications. — Coryza, sinusites, obstructions nasales, rhume des Foins, ozène, surdité. Antisepsie du nez et de la gorge.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

Prix : 9 francs, le tube spécial pour injections nasales.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

RÉSYL

CIBA

Éther glycéro-gaïacolique

ANTISEPTIQUE PULMONAIRE, ANTICATARRHAL.

Non caustique, libérant du gaïacol à l'état naissant, c'est un puissant modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indications. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites, catarrhe bronchique et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

Comprimés : 2 à 6 par 24 heures.

Ampoules : Une tous les 2 jours.

Médecine infantile. — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

Petit flacon sirop.

Grand flacon sirop.

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 12 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

RÉTHRAGINE

(Bougies antiblennorragiques radifères.)

Médication bactéricide et radio-active des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme.

Présentation :

Bougies Réthragine « H » pour les hommes;

Bougies Réthragine « F » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros (2 micros pour les hommes seulement).

Prescrire : *hommes* : Bougies Réthragine « H » à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies Réthragine « F ».

Prix :

La bougie Réthragine H. (1 micro)	12 fr.
La boîte de 5 bougies Réthragine H. (1 micro)...	55 —
La bougie Réthragine H. (2 micros)	15 —
La boîte de 5 bougies Réthragine H. (2 micros) ..	70 —
La bougie Réthragine F. (1 micro)	12 —
La boîte de 5 bougies Réthragine F. (1 micro) ...	55 —

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

RÉTROPITUINE CARRION

Composition. — Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse, titré physiologiquement en unités internationales (*deux, cinq et dix* unités en ce qui concerne, respectivement, la Rétropituite n° 2, n° 5 et n° 10).

Formes :

Ampoules de 1 cc. (Rétropituite 2 et 10).

Ampoules de 10 cc. (Rétropituite 5).

Indications :

N° 2 : Inertie utérine au cours des accouchements.

N° 10 : Inertie utérine à la délivrance. Hémorragies post-partum. Métrites hémorragiques. Ménorragies. Prévention des hémorragies post-opératoires. Atonie de la musculature de l'estomac, de l'intestin et de l'appareil urinaire. Ulcère gastro-duodénal. Diabète insipide.

N° 5 : Hémoptysies des tuberculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 cc. (Rétropituite n° 2) ; de 0 cc. 5 à 1 cc. (Rétropituite n° 10). Injection intraveineuse lente (Rétropituite n° 5).

Présentation et prix :

La boîte de 1 ampoule n° 2 ou 10 : 5 fr.

— de 4 ampoules n° 2 ou 10 : 18 fr.

— de 6 — n° 2 ou 10 : 25 fr.

— de 3 — n° 5 : 15 fr.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-St-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

RÉVULSIF ADRIAN

Composition :

A base de terpènes retirés de diverses essences aromatiques et en particulier de l'essence de serpolet (ne contenant ni essence de moutarde, ni teinture de capsicum).

Présentation :

Révulsif médical et chirurgical.

Indications :

1° Révulsif médical :

- a. Affections des voies respiratoires : bronchites, trachéites, asthme, grippe, etc.
- b. Douleurs rhumatismales et névralgiques.

2° Révulsif chirurgical :

Préventif des complications pulmonaires par emploi systématique chez tous les opérés, avant et après l'intervention.

Posologie et mode d'emploi :

1° Révulsif médical :

En badigeonnage avec un pinceau sur le dos ou la poitrine du malade (voies respiratoires) ou sur la région douloureuse (douleurs rhumatismales ou névralgiques). Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

2° Révulsif chirurgical :

Badigeonnages le matin ou la veille de l'opération et quelque temps après l'opération en avant et en arrière de la cage thoracique. Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Prix :

Le flacon révulsif médical : 8 francs.

— révulsif chirurgical : 12 francs.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Anct. ADRIAN et Cie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RÉVULSIF FISCH

(Anclennement Procipha.)

Forme. — Liquide, incolore, aromatique.

Composition. — Mélange d'essences : Terpène, Pinène, Carvacrol, irrite légèrement l'épiderme, odeur très agréable.

Indications. — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques; Affections rhumatismales et névralgiques.

Mode d'emploi. — Badigeonner avec un pinceau la surface à révilser.

Pour bains de pieds, 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants : diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Prix : 9 fr. 50.

Laboratoires **FISCH** (S. A. R. L.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X^e).

(Tél. : Lamartine 92-52.)

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Essences naturelles. Terpènes, Alcool, (Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

Présentation. — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 5 fr. 50.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 6 fr. 50.

N° 3. *Pour adultes* : 8 francs.

Le **Révulsif Milko** détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne tache ni n'altère les téguments, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire **H. CLUZEL**

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or : Strasbourg 1927.

RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive;
- 2° Étant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins et se conserve indéfiniment ;
- 7° il n'entre dans sa composition ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

Indications thérapeutiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonie, Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques des voies respiratoires : Asthme, Emphysème, Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

Laboratoire BOUDIN

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 23-15.)

REXACARBINE

1 forme : granulé anisé sucré ; 2 formules.
Rexacarbine simple : Charbon animal purifié, Hexaméthylène-Tétramine chimiquement pure.

Rexacarbine naphtolée : Même association + 5 p. 100 benzonaphtol.

Indications. — Toutes affections et infections gastriques, intestinales, biliaires, urinaires et troubles digestifs d'origine hépato-biliaire (auto-intoxication intestinale).

Posologie :

1 à 3 cuillerées de granulé à la fin des repas croqué ou délayé dans un peu d'eau.

Contenance : 125 grammes (25 cuillerées à café).

Prix : 15 francs.

Laboratoires de la REXACARBINE
 LAVIT (Tarn-et-Garonne).

RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et composition. — Pommade en tubes. Composé organique à base de kératine. Excipient gras.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de l'épiderme. Cicatrisant. Calmant aseptique et non toxique.

Indications thérapeutiques. — Crevasse des seins, érythèmes des nouveau-nés, fissures anales, écorchures, brûlures, ulcères variqueux, plaies atones, toutes irritations et érosions cutanées.

Prix. — Le tube : 8 fr. 50.

Échantillons sur demande :

Pharmacie ROUSSEAU

71, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

Constitution. — Stock vaccin polyvalent, formé de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

Propriétés. — Seule la méthode vaccinothérapique, qui agit par voie humorale, est susceptible d'assurer la destruction des germes infectieux dans les localisations à distances (vessie, testicules, utérus, ovaires, rein, articulations, etc.), où il est impossible de les atteindre par des médications locales.

Elle est toujours parfaitement tolérée, même, par les malades les plus délicats.

La **Rhéantine Lumière** est un vaccin anti-gonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre.

Indications. — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидidymites, ophtalmites d'origine gonococcique, etc.

Dose courante. — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Formuler. — Boîte de **Rhéantine Lumière**. Prix : 18 francs.

VACCINS-AUTOGÈNES. — L'expérience a montré que l'efficacité de la **Rhéantine Lumière** est très étendue, mais qu'elle ne saurait s'appliquer à des infections associées à des espèces très éloignées des cultures représentées dans le stock vaccin.

Les **Laboratoires Lumière** préparent des vaccins autogènes et fournissent le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45 rue Villon — LYON.

RHÉSALGINE VICARIO

(Anciennement « RHÉSAL »)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.
Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi. — En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications. — Rhumatismes, Goutte, Névralgies.

Le flacon : 8 francs.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

RHINADORINE

Composition :

Poudre alcaline, antiseptique, non toxique, soluble dans l'eau.

Indications :

Hygiène du naso-pharynx, végétations adénoïdes, prophylaxie des affections contagieuses, antiseptie des cavités naturelles, toilette intime.

Posologie et mode d'emploi :

- 1° Une cuillère à café dans un verre d'eau bouillie tiède pour l'hygiène de la bouche et du nez.
- 2° Une cuillère à soupe par litre d'eau bouillie tiède pour les irrigations nasales et toilette intime.

Prix : La boîte : 8 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 650-8.

Laboratoires L. THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.
(Tél. : Prov. 49-77.)

RHINADROL

(Baume nasal.)

Forme pharmaceutique et composition. — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline huileuse et essences.

Propriétés. — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

Avantages. — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une homogénéité parfaite du baume.

Indications. — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

Présentation. — *En tube avec embout* pour faciliter l'introduction dans les narines. (Tube de 20 gr. environ.)

Prescription. — Un tube *Rhinadrol Falvy*.

Prix : 7 fr. 25.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

RHINAQUINTINE LESCÈNE

Anaquinine gouttes nasales.

Composition. — Aldéhydes, Thymoforme, Eucalyptol, Thymol, Ephédrine (à faible concentration). Huile neutralisée.

Forme. — *Flacon avec stilli-compte-gouttes stérilisable* à l'alcool comme un thermomètre, (breveté) sans caoutchouc et sans verre, permettant aux gouttes de pénétrer sans pression dans le nez et le cavum et sans blesser les sujets rebelles.

Indications. — Rhumes, Rhume des foins, Coryza des nouveau-nés (facilite les tétées). Rhinites, Sinusites, Ozène, Adénoïdites, Toux, Grippe, Coqueluche, Laryngites, Croup, Faux-croup.

Désinfection du Rhino-pharynx dans les maladies contagieuses. Prophylaxie des contagions. Désinfection du cavum avant et après ablation des végétations. Eclaircit la voix des chanteurs et des orateurs.

Mode d'action. — Sédatif puissant. Décongestionnant doux. Détersif non irritant. Nettoie les muqueuses, draine les sinus et le cavum. Empêche la stagnation du pus. Débouche le nez d'une façon douce et prolongée et facilite l'action des inhalations.

Evite la sécheresse des muqueuses (climats secs, chauffage central).

Indiquée en injections intratrachéales dans toux laryngées, asthme, croup, laryngites striduleuses.

Mode d'emploi. — *Affections aiguës* : 2 à 8 gouttes dans chaque narine 2 à 8 fois par jour. Injections intratrachéales : 2 à 4 cc. en une fois.

Affections chroniques : 2 à 3 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Laboratoire LESCÈNE

PARIS, 58, r. de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19). LIVAROT (Calvados).

RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

Composition. — Adrénaline au 1/100, Scruroforme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

Propriétés. — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui :

10 francs pour 8 à 10 jours de traitement.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

RHINEUPNYL

Un vaso-constricteur VOLATIL nouveau, sans équivalent dans l'arsenal thérapeutique actuel.

Composition. — Hydrate d'oxyde de benzoïle benzylé, acétone, essence de sauge, à doses équilibrées, dilués dans l'alcool.

Décongestif puissant et incomparable des muqueuses nasales, d'une toxicité nulle à la dose indiquée.

Supérieur à l'adrénaline, l'éphédrine, sans action secondaire, ni irritation.

Supprime la sensation de nez obstrué, d'oreilles bouchées, de gêne respiratoire, occasionnée par le coryza, la sinusite, le rhume de cerveau, le rhume des foins, l'asthme nasal, la congestion de la trompe d'Eustache, etc...

Mode d'emploi. — Approcher le flacon débouché d'une narine, faire 5 ou 6 inspirations profondes, en tenant l'autre narine bouchée. Recommencer sur l'autre narine.

Nombre d'inhalations par jour:

Cas légers, moyens : une, matin, midi et soir.

Cas graves : une toutes les heures, si nécessaire.

Le flacon (15 francs) représente un traitement d'au moins un mois.

Laboratoires G. GAIZARD

94, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 81-56.

RHINO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Le Rhino-Amphogel n'est pas une pommade. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une forte proportion (75 % de bouillon-vaccin rhino-pharyngien) (pneumocoques, pneumobacilles, entérocoques, streptocoques, micrococcus catarrhalis, coccobacilles de Pfeiffer, staphylocoques).

Indications. — Affections du nez, Rhino-prophylaxie de la grippe et du coryza.

Avantages. — La gelée non grasse ne fond pas au contact des muqueuses, elle est absorbée lentement d'une façon remarquable et assure ainsi la protection continue du rhino-pharynx. Sa présentation sous forme de gelée confère à ce produit des qualités d'ordre pratique (badigeonnages faciles à faire dans la journée) et d'ordre économique (le tube assure un long usage).

Mode d'emploi. Le Rhino-Amphogel s'applique en pansement nasal. Introduire le produit dans les narines à l'aide d'un porte-coton joint à la boîte. Par un mouvement circulaire en tapisser les muqueuses. Renouveler l'application 4 à 5 fois par jour.

Très grande activité. — Innocuité absolue.

Le tube de 25 grammes environ : 12 fr.

Laboratoires des AMPHO-VACCINS

[A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

21, Bd de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Trud. 72-34.

RHINO-ANTIPIOL

Crème immunisante pour le traitement préventif et curatif des affections du Rhino-pharynx et la prophylaxie des maladies contagieuses.

Composition. — Crème adhérente à base de fil-trats et autolysats immunisants associés à un complexe calmant, balsamique et décongestionnant.

Indications. — Coryza, Rhinites aiguës ou chroniques, Sinusites, amygdalites, Rhume des foins, Prophylaxie des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — Introduire un peu de crème dans les narines, 3 ou 4 fois par jour. Faire pénétrer par un léger massage en reniflant doucement. Le tube muni d'un embout pour l'introduction dans les narines : 9 francs.

Ce produit peut être prescrit pour les Assurances Sociales.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

88, avenue Walkanaer — NICE.

RHINO-BOROSTYROL

Composition : Huile au Borostyrol : 100 + Ephédrine basique 1 % + Larocaïne 0,50 %.

Formes. — Huile : flacons pour pulvérisation, rhino-capsules.

Propriétés. — Analgésique, antiseptique, cicatrisant et vaso-constricteur à effets durables, malgré que la teneur en éphédrine soit faible.

Avantages. — Jamais d'incidents ou accidents dus aux doses élevées d'Ephédrine.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhume des foins.

Posologie. — Les pulvérisations nasales 3 à 6 fois par jour donnent les meilleurs résultats; à défaut : Instillations de quelques gouttes dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour.

Prix : le flacon de 25 grammes : 12 francs (15 jours de traitement).

La boîte de 24 capsules : 13 francs (8 jours de traitement)

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL, Pharmacien,**

4, avenue Orban.

RHINO-COLLOÏDOL

A l'Éphédrine.

Pommade nasale antiseptique, décongestionnante, calmante et bactéricide.

Composition. — Chlorhydrate de phénylméthylaminopropanol naturel de l'Ephedra vulgaris, Menthol, Acide borique, excipient spécial émulsionnant.

Indications. — Affections nasales (coryza aigu, rhume des foins, sinusite, ozène et suppurations nasales).

Affections de la gorge (Angines, végétations, polypes, pharyngite).

Affections des bronches (asthme, toux, catarrhe).

Mode d'emploi. — Se moucher une narine après l'autre. Mettre ensuite de la pommade, gros comme un petit pois, à l'entrée de chaque fosse nasale. Masser légèrement et renifler doucement. Remettre de cette pommade plusieurs fois dans la journée en très petite quantité.

Laboratoires du VIOPHAN

81-83 rue de Lille — ROUBAIX (Nord).

RHINODROPS BÉRAL

Capsules nasales à l'huile d'Ephedra chlorétonée.

Propriétés. — *Balsamiques, Antiseptiques, Décongestifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

Indications. — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

Mode d'emploi. — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : *Rhinodrops Béral*, une boîte.

La boîte de 20 Rhinodrops : 10 francs.

Laboratoire de l'Éphédrine BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

Forme. — Ampoules (instillateur spécial dans les boîtes).

Indications thérapeutiques. — Action élective sur les terminaisons sensitives des nerfs trijumeau et pneumogastrique, au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

Rôle essentiel: Régulation de la sensibilité des troubles congestifs et sécrétoires.

1° En Rhinologie. — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

Congestions et Obstructions Nasales
(Vaso-motrices).

Rhino-Pharyngites

Rhinites Atrophiques — Ozène

Rhume des foins

et Rhino-Bronchites Asthmatiques

Céphalées Rhinogènes

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° En Ophtalmologie. — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensitives et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

Mode d'emploi:

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

Pour les yeux, il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

Pour le nez et la gorge, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Pathologie générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).
(Tél. : Auteuil 35-25.)

RHINO-GLOTTYL

Composition. — A base d'extraits huileux totaux d'Erysimum, Belladone, Euphorbia pilulifera, Ephedra, avec adjonction d'essence de Niaouli et d'Amyléine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique. Puissant décongestif. Antispasmodique.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, Maladies infectieuses (grippe, rougeole, scarlatine, etc.), Asthmes, Rhumes des foins, Insuffisances respiratoires. Toutes manifestations congestives des voies respiratoires supérieures.

Formes :

- 1° *Solution huileuse* (Instillations et pulvérisations nasales. Injections intratrachéales).
- 2° *Capsules nasales* (Couper l'extrémité effilée de la capsule et en vider le contenu dans les deux narines).

Durée moyenne des unités de vente :
10 jours.

Prix : 15 francs.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

RHINOL

A base de Menthoforme, éther, non irritant, dérivé du menthol et du formol.

1° **OUATE RHINOL.** — Véritable filtre nasal, spécifique du coryza, Céphalée, Rhume des foins. Indispensable en temps d'épidémie, et dans tous les cas de grippe, influenza, bronchite, enrrouement.

La boîte 3 fr. 50.

2° **POMMADE RHINOL.** — Vaseline au menthoforme, eucalyptol, essences volatiles. Mêmes indications.

Le tube avec canule : 6 fr. 75.

3° **COMPRIMÉS RHINOL.** — A base de menthoforme, borate de soude, baume du Pérou, essences de pin et d'eucalyptus.

Inhalations, gargarismes, pulvérisations, dans tous les cas de rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, maux de gorge, amygdalites, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites.

La boîte de 24 comprimés : 14 francs. — 1/2 boîte : 8 francs

Laboratoire du Docteur DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 13-03.)

RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisations dans le nez et la gorge.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycès. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

Mode d'emploi. — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en Capsulines auto-rhino-injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

En flacon ou en boîte de 20 Capsulines.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

RHINO-SPÉCIFIQUE FAVROT

A base d'Éphédrine végétale.

Solution pour pulvérisations nasales.

Composition. — *Ephédrine végétale, Atropine, Novocaïne, Lobéline* dans sérum physiologique.

Indications. — Remède abortif du Rhume de cerveau, *Rhume des foins*, troubles congestifs et hyperesthésiques de la muqueuse nasale, coryza anaphylactique, Hydrorrhée, Eternuements paroxystiques.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

RHINO-SULFORGAN

A base de soufre organique naturel, le « Rhino-Sulforgan » constitue l'antiseptique le plus puissant, sous une forme non irritante. Il peut être prescrit dans tous états infectieux du rhino-pharynx.

Avantages. — Dans le « Rhino-Sulforgan », le soufre est à l'état sulfonique stable, seule forme réellement assimilable par la cellule. Ne contient pas de menthol souvent mal supporté par les enfants, est également exempt de chlorhydrate d'éphédrine et d'argent colloïdal. Ni caustique, ni toxique, ni irritant. Pas de contre-indication ; pas d'accoutumance.

Indications :

- 1° Prophylaxie de la grippe et des maladies contagieuses par la voie respiratoire ;
- 2° Traitement préventif et curatif des affections oto-rhino-laryngologiques ;
- 3° Adjuvant de tout traitement sulfureux général.

Posologie :

- 1° En pulvérisations nasales, 2 à 6 fois par jour ;
- 2° En tampons d'ouate imbibés du produit, 2 à 6 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires SOUFFRICE,

16, rue de Gramont — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 66-12,

RHINO-VACCIN « INAVA »

(Gelée-Vaccin pour applications intranasales).

Moyen commode d'immunisation locale des premières voies respiratoires.

Le *Rhino-Vaccin* contient des corps microbiens et des produits de sécrétion et de lyse des divers agents des infections catharrales et des complications grippales, notamment les toxines streptococciques neutralisées. (*Vaccin inava A.*)

Indications. — Rhinites, Coryza, Sinusites, Grippe, et toutes complications auriculaires ou pharyngées.

Mode d'emploi. — En applications intranasales, répétées aussi souvent que possible, et en collutoires pharyngés ou amygdaliens.

Prix : 8 francs le tube à canule.

E. GUIGNIER, pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30).

RHINO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Vaccination locale.

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée détermine une immunité cellulaire locale.

Indications. — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le *Rhino-Vaclydun* n'est pas injectable.)

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 18 francs.

Nécessaire *Rhino-Vaclydun* contient 2 ampoules de lysat-vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 18 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin de rhizome de fraisier extrait à l'eau, évaporé dans le vide à 0°. Phosphates et glycérophosphates de chaux et de magnésie. Cardamome.

Formes. — Cachets pour *adultes*. Poudre pour *enfants*. Granulé pour *adultes et enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire. Etats tuberculeux et pré-tuberculeux. Anémies. Bronchites chroniques (diminution des sécrétions et de l'expectoration). Amélioration rapide des accidents diarrhéiques quelle qu'en soit l'origine. Néphrites albuminuriques.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 cachets ou 2 à 4 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées mesure de poudre ou 2 à 4 1/2 cuillerées à café de granulé par jour.

Laboratoire CHAPOTOT

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.)

R. C. 231 917 B.

RHOCYA

Rhodate de potassium pur.

(Solution titrée : 1 goutte = 1 centigramme.)

Le rhodate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, *sans contenir d'iode dans sa molécule* et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Indications. — *Rhumatismes chroniques.* — Puissant effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

Hypertension artérielle. — Abaissement des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérome artériel.

Emphysème. — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

Scléroses viscérales. — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie), ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

Oreillons. — Agit sur la localisation parotidienne et sur les localisations secondaires.

Avantages. — Aucune toxicité. Ni intolérance, ni accoutumance.

Pas d'iode, donc pas d'iodisme.

(Thèse Géraud, Paris 1936.)

Posologie. — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Remboursable par les Caisses d'Assurances Sociales

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de la Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

Invalides 43-60.

RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyrate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

Présentations :

Doses unitaires de : 0 g. 15 — 0 g. 30 — 0 g. 45 — 0 g. 60 — 0 g. 75 — 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Indications

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections graduées de 0 g. 15 à 0 g. 90.

Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle. Antispasmodique non toxique.

Indications :

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Hoquet, Coqueluche, Spasmes divers, Mal de mer. Vomissements du nourrisson.

Présentations :

Solution alcoolique à 25 % (flacon de 30 cm³).

Prix : 10 francs.

Capsules dosées à 0 g. 20 (étui de 50).

Prix : 7 francs.

Posologie :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de solution ou 2 capsules, à renouveler plusieurs fois par jour.

Enfants : IV gouttes de solution, par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODIACARBINE

Ex-pâte Specia granulée antidysentérique.

Indications. — Entéro-colites cryptogénétiques, colites diverses. Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

Présentations.

Boîte de 150 grammes de granulés. Prix : 27 fr. 50

Tubes de 20 comprimés. Prix : 13 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Amibiase : Cure de 20 jours : un jour sur deux 1 à 3 cuillerées à café de granulés (ou 1 à 3 comprimés) aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical (**Stovarsol**).

Colites : cures de 4 à 5 jours, 1 à 2 cuillerées à café aux 2 principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODOBORYL

Présentation. — Poudre blanche, très soluble dans l'eau à laquelle elle communique une belle couleur rose. Génératrice d'oxygène naissant.

Mode d'action. — Antiseptique, astringent, décongestionnant et sédatif.

Indications. — Infections des muqueuses : Gorge (angines, pharyngites, laryngites, amygdalites) ; Bouche (stomatites, gingivites, aphtes) ; Nez (coryza, ozène, rhinites) ; Prévention des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — En lavages ou en gargarismes : une cuillerée à café par verre d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie.

GENNEVILLIERS (Seine).

RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 g. 50) et de caféine (0 g. 05) pour un comprimé (tubes de 20) ou un cachet (étuis de 10).

La caféine ajoute à l'aspirine ses propriétés tonicardiaques.

Indications. — Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Prix de vente :

Tube de 20 comprimés.. 5 fr. 50

Etui de 10 cachets 5 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

RHUMOFAN

Cachets.

Composition. — 1 cachet =

Acide phénylcinchoninique.... 0,30

Soufre colloïdique..... 0,20

Sels de lithium..... 0,05

Indications. — Spécifique du rhumatisme goutteux, rhumatisme articulaire, myalgies, sciatique, névrites.

Mode d'emploi. — 2 à 10 cachets par jour, pris 2 par 2, dans un grand verre d'eau minérale ou tisane diurétique. Commencer par 6 cachets par jour, pendant deux jours, ensuite diminuer progressivement 2 par 2 ; dans les états aigus, augmenter au contraire jusqu'à 10 cachets par jour, puis rediminuer à nouveau.

Présentation. — Boîte de 20 cachets, prix : 16 fr. 80 pour 4 à 10 jours de traitement.

Littératures et échantillons :

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale ; 1 et 3, rue Soumet
CASTELNAUDARY. Tél. 3-10.

RICILAX

Formule :

Ricinéoléate de magnésie... 1 gr.
Diacétyldioxyphénylisatine 2 mmg.
Pour 1 cachet.

Combinaison nouvelle d'huile de ricin et d'oxyde de magnésie.

LAXATIF DOUX

Avantages. — Contient uniquement l'acide ricinéoléique ; dépourvu de ricinine et de ricine qui sont toxiques.

Chaque composant renforce l'action du produit auquel il est associé, l'acide ricinéoléique agissant immédiatement et l'oxyde de magnésie prolongeant l'effet laxatif.

Aucune action congestive sur le tractus et les glandes digestives, ni sur les organes du petit bassin. Peut être administré à tous les malades, en particulier : enfants, femmes enceintes, nourrices.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, banales ou spasmodiques, et toutes leurs conséquences. Entérocolite muco-membraneuse. Colites. Appendicite chronique.

Formes. — *Adultes* : Cachets.

Enfants : Granulé sans isatine.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 1 cachet le soir au coucher.

Enfants : 1/2 cuillerée à café par 3 années d'âge de granulé.

Posologie pouvant être modifiée suivant les tempéraments.

Prix : 12 francs pour 20 jours de traitement.

Laboratoire ROUX

60, route de Châtillon — MALAKOFF.

(Tél. : Alésia 12-55.)

RIODINE

$(C^{18} H^{38} O^3)^2 (I H)^4 C^3 H^6$.

Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable.
Action prolongée et durable sans iodisme.

Pour obtenir une *action rapide et intensive* prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

Indications. — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

LABORATOIRES du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52, 53 et 54.)

ROB OBERLIN

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	3 mgr.	6 mgr.	1 cgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06
Arséniat de soude	1/2 mgr.	1 mgr.	1 mgr. 1/2

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 2,3 et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

Prix : 16 fr. 50.

ROB CABANÈS

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	1 mgr.	2 mgr.	3 mgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 006	0 gr. 012	0 gr. 018

En moyenne, 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge, soit :

Un an : 1 demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Deux ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Trois ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

Quatre et cinq ans : 1 cuillerée à entremets 2 fois par jour.

Six à sept ans : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Prix : 14 fr. 50.

Leur présentation est discrète.

Laboratoire **OBERLIN**

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.

ROBRODYNE

Reconstituant général.

Élixir d'un goût agréable, qui pour 100 cc. d'exci-
pient liquideux contient :

Teinture de noix vomique.....	0,20
— d'orange amère	0,50
— d'orange douce	0,50
— cannelle	0,50
Métylarsinate de soude	0,08
Glycérophosphate de soude.....	1 gr.

Indications. — Faiblesse générale ; Convalescence ;
Anémie, Croissance.

Doses :

2 verres à liqueur par jour avant les repas.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous
le n° 1403-3.

L. ROBERT, pharmacien.

Rue des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).
(Tél. : n° 70.)

ROCHE-POSAY (LA)

Laboratoires des produits dermiques R. P.

Composition. — Produits aux sels silicatés naturels
de La Roche-Posay spécialement préparés et gradués
par des dosages de titane et de sélénium pour le trai-
tement des affections de la peau depuis les eczémas
aigus, prurits rebelles, dermatoses irritables jusqu'aux
soins et entretien des peaux sensibles.

Nomenclature et prix :

1. Sels de bains R. P.	La boîte	5 et 10 fr.
2. Savon dermique R. P.	Le pain	8 —
3. Poudre dermique R. P.	La boîte	10 —
4. Pâte à l'eau R. P.	Le pot	14 —
5. Lotion blanche R. P.	Le flacon	14 —
6. Cérat inaltérable R. P.	Le tube	8 —
Cold cream naturel R. P. ...	Le tube	10 —
7. Cold cream naturel R. P.	Le pot	14 —
Cold cream naturel R. P. .	Le grand pot	25 —
8. Cold cream salicylé R. P. ...	Le tube	10 —

Laboratoires des **PRODUITS DERMQUES R. P.**
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

ROGERMA

Traitement cytophyllactique des affections de la peau et des muqueuses.

Phagocytogène, reconstituant cellulaire.

Indications. — Anthrax, Brûlures, Plaies atones, Ulcères variqueux, Blépharites, Conjonctivites, Otites externes et moyennes.

Traitement adjuvant de choix des néoplasmes.

Mode d'emploi. — Pur et tiède en pansements très humides.

Présentation :

Flacon courant	15 fr.
Grand flacon (1 litre)	30 —
Flacon ophtalmique	16 —
Flacon otorhino.....	14 —

Échantillons :

Laboratoire ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

ROMARANTYL

TROUETTE-PERRET

est le spécifique des Affections du Foie.

Élixir ou granulé aromatiques à base de :
Romarin-Piscidia-Aphloïa-Ononis-Menthe.

L'efficacité du *Romarantyl T. P.* est due à son action cholagogue, stimulante, diurétique, antispasmodique.

Mode d'emploi :

1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Prix : 16 francs.

Échantillons et Littérature sur demande aux

Laboratoires TROUETTE-PERRET

61, avenue Philippe-Auguste

PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 87-34.)

ROMARÈNE

Présentation. — Granulé aromatique fondant de saveur agréable.

Composition. — Association de végétaux cholérétiques (*romarin, pissenlit, combrelum*) et de sels alcalins (*citrate de soude*).

Action thérapeutique :

Cholérétique : stimule la fonction hépatique, accroît la sécrétion biliaire.

Cholofluidifiant : modifie la nature de la bile et facilite son drainage.

Stomachique : résout les syndromes gastro-hépatiques.

Favorise la *diurèse* et la *régularité intestinale*.

Évite les réactions vésiculaires.

Indications :

Insuffisances hépatiques de toutes natures, cholémie, congestion du foie, hépatisme, ictères bénins, cholécystites, asthme hépatique, etc...

Syndromes gastro-hépatiques, dyspepsies, gastralgies, flatulences, état saburral, etc...

Cures d'entretien hépatique.

Mode d'emploi :

1 à 3 cuillerées à café par jour, croquer ou dissoudre dans 1/2 verre d'eau chaude ou de tisane aromatique.

Indications hépatiques : à jeun ou entre les repas.

Indications gastro-hépatiques : après les repas.

Cures d'entretien hépatique : 15 à 20 jours par mois

Durée de consommation d'une boîte : 8 à 15 jours

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire BEAUFOUR

Docteur en Pharmacie,

Licencié ès Sciences,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

DREUX (E.-et-L.).

(Tél. : 145.)

ROSALYL

Composition :

Ail	0 gr. 80
Thym	2 gr. 00
Marrube	1 gr. 00
Drosera	0 gr. 40
Grindelia	0 gr. 20
Bromure de sodium	0 gr. 60
Excipient liquide sucré et glyciné Q. S. P.	100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, sans toxiques, des grandes toux quinteuses et spasmodiques. Puissant désinfectant des bronches. Vermifuge par l'ail et le thym.

Forme. — Liquide sucré et glyciné. Une seule forme maintenant.

Indications. — *Coqueluche*. Toux nerveuses. Bronchites.

Posologie. — 1 an et 2 ans : 4 et 6 cuillerées à café par 24 heures.

3 ans et 4 ans : 4 et 5 cuillerées à café par 24 heures.

5 ans et au-dessus : 6, 7, 8 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix au public : 15 francs le flacon de 200 cc.

Préparé par : **Laboratoire MALMANCHE**

Pharmacien, Docteur ès sciences.

Vente et échantillons:

Laboratoires Drouet et Plet — RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 124.)

ROSASEPTOR

Poudre émolliente, tonique, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire ainsi que de la bouche, des amygdales et du pharynx.

Indications. — Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Chalazions, Orgelets, Ophtalmies, etc...

Mode d'emploi. — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, **tonique** et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux et traitement des stomatites, abcès dentaires, angines, pharyngites, etc.

La boîte de 10 sachets : 10 francs, pour 1 semaine de traitement.

La boîte de 20 sachets : 18 francs, pour 2 semaines de traitement.

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12°).

RUBIADERM

Pommade dans laquelle le *Rubiazol* est incorporé à un excipient représenté par les phospholipides.

Par son principe actif, détermine la stérilisation rapide des lésions septiques du revêtement cutané ; l'excipient, qui est soluble dans l'eau, assure une pénétration immédiate et intime de l'élément stérilisant dans toutes les parties de la région infectée.

Indications. — Plaies superficielles et anfractueuses, Dermites septiques, Trajets fistuleux, furoncles, anthrax, abcès, brûlures, etc...

Mode d'emploi. — D'une façon générale, on l'appliquera en couche épaisse ; si la plaie est anfractueuse, veiller à ce que toutes les parties soient bien imprégnées de *Rubiaderm*.

Prix au public : le tube, 15 fr.

Sont également préparés par les Laboratoires du Docteur Roussel :

L'ECTIAZOL : Solution de *Rubiazol* faiblement alcoolisée. Comporte les mêmes indications.

Prix au public : le flacon, 12 francs.

Le **COLLUBIAZOL** : Solution hydro-glycérinée de *Rubiazol*. Est utilisable pour le traitement des lésions inflammatoires des muqueuses.

Prix au public : le flacon, 15 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

RUBIAZOL

Première application de la chimiothérapie antibactérienne.

Produit sans aucune toxicité.

Indications. — A une action *curative et préventive* sur toutes les infections aiguës ou chroniques provoquées par le streptocoque, le staphylocoque, le colibacille.

Présentations :

Flacon de 40 comprimés à 0 gr. 20.

Boîte de 5 ampoules de 5 cc. contenant chacune 25 cgrs de principe actif (voie intramusculaire).

Posologie. — De 4 à 10 comprimés par jour, ou 2 à 3 ampoules de 5 cc. (voie intramusculaire).

Le traitement ne doit pas être prématurément interrompu, mais continué pendant 5 à 7 jours, à doses décroissantes, après l'apparition de la défervescence.

Prix. 40 comprimés 18 fr.

Boîte de 5 ampoules 25 fr.

Voir aussi **Rubiaderm**.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

RUBYL

Iodure double de quinine et de bismuth.

Suspension huileuse, injectable par la voie intramusculaire, bien tolérée. Ampoules de 3 cm³. dosées à 0 g. 075 de Bi-métal par ampoule. (Boîtes de 12 ampoules.)

Indications :

Bismuthothérapie de la Syphilis.

Posologie et mode d'emploi. — Injection du contenu d'une ampoule (3 cm³) tous les trois ou quatre jours ; série de 12 injections.

Chez les enfants : par année d'âge 1/20^e de la dose conseillée chez l'adulte.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 30 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Hypnotique et anti-épileptique succédané du gardénal, destiné aux malades intolérants ou résistants à ce médicament.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 20 (tubes de 20)..... 10 fr.

— à 0 g. 05 (tubes de 30)..... 6 —

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, Constitution épileptoïde.

Posologie. — *Adultes :* Deux à quatre comprimés à 20 ctg. par 24 heures.

Enfants : Deux à quatre comprimés à 5 ctg. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 3/4; Adonis vernalis, 1/4.
Formes : *Dragées, Gouttes.*

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 10 par jour.
Gouttes : LX par jour. — Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n^{os} 103-1 et 2.

Prix : 14 francs. Durée 4-6 jours.

COMTE, Pharmacien
60, rue Saint-Guilhem
MONTPELLIER

SABURRASE

Présentation. — Granulé soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Possède une action légèrement laxative sans modifier brutalement le pH intestinal, comme la plupart des laxatifs salins. A cette action sur l'intestin s'ajoute celle des composés magnésiens sur le foie et les voies biliaires.

Un antiseptique puissant libère progressivement du guéthol dans l'intestin et en assure la désinfection totale, sans troubler la concentration hydrique du milieu.

Indications thérapeutiques. — Médicament des affections du tractus digestif, des intoxications générales et des syndromes hépato-biliaires.

(Dyspepsies, Constipation, Gastro-entérites, Insuffisance hépato-biliaire, Intoxications générales, Suites de grippe, etc...).

Mode d'emploi. — Prendre le matin, à jeun, une ou deux cuillerées à café dissoutes dans un demi-verre d'eau.

Prix : 17 fr. 50 la boîte.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUcq

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71).

SAINT-ARÉ

(Même minéralisation que Carlsbad.)

Sulfatée sodique à 6 ‰.

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, calcique.

Propriétés :

Cholagogue, diurétique, hypotensive.

Indications thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.

Alcalose. Insuffisance hépatique. Dyspepsie biliaire. Stase du côlon droit.

Traitement à domicile.

Société des Eaux Minérales de Decize
(Nièvre)

Bureau à Paris, 49, boulevard de Port-Royal.
(Tél. : Gobelins 23-90.)

SALANTALE

Vaccins polyvalents polymicrobiens antiseptiques.

Antivirus. Antigènes.

Formes et indications :

AURICULO-SALANTALE

Vaccin glycérimé. Flacon pipette auriculaire.

Affections purulentes otogènes.

CYSTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin. Traitement par frictions cutanées.

Cystites, Pyélonéphrites, Colibacillooses.

GINGIVO-SALANTALE

Gelée pour massage gingival.

Gingivites, Stomatites, Pyorrhées et autres affections buccales.

OPHTALMO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube. Ni irritante, ni caustique,
ni toxique.

Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

OTO-SALANTALE

Pommade auriculaire en tube avec canule pour le conduit auditif.
Furoncles et affections purulentes du conduit auditif, Eczéma impétigineux, Otites externes, Pansements postopératoires.

OVULES SALANTALE

Odeur agréable. Désodorisants. Ne tachent pas le linge.
Leucorrhées et autres affections purulentes des voies génito-urinaires.
Pour fillettes : ovule petit format.

POMMADE SALANTALE

Applications par larges pansements et vaccination par voie
cutanée.

Furoncles, Anthrax, Panaris, Plaies infectées, Suppurations postopératoires et autres affections purulentes. Prophylactique de la Mastite.

RECTO-SALANTALE

Pommade calmante et décongestive, en tube avec canule rectale.
Affections du rectum et de l'anus, Hémorroïdes.

RHINO-SALANTALE

Pommade nasale en tube avec embout. Soulagement immédiat.
Rhumes, Grippe, Sinusites et autres Inflammations rhino-pharyngées.

SUPPO-SANTALE

Action calmante et décongestive.
Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

TRACHO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube avec canule breveté à l'usage oculaire.
Affections trachomateuses.

Echantillons et Littérature sur demande.

Laboratoires SALANTALE — STRASBOURG. Téléphone 53-26

SALBINE DU D^r FAYÈS

Pommade réalisant l'action simultanée de ZnO porphyrisé et du Soufre précipité.

Indications. — Eczéma, Prurits, Folliculites, Intertrigo, Cicatrisant des plaies ou brûlures superficielles, en particulier après diathermo-coagulation.

Les applications locales deux ou trois fois par jour n'irritent jamais, ce qui permet un usage prolongé.

Ne tache pas le linge.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SALÈNE SALÉNAL CIBA

Analgésiques externes.

Le Salène, mélange des éthers méthyl et éthyl-glyco-salicyliques, possède à un haut degré les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment, par 5 ou 10 gr.

Le SALÈNE (liquide) se prescrit en frictions.

Le SALÉNAL (pommade en tube) se prescrit en applications.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

SALGANYL

Dépuratif exclusivement médical.

Indications. — Lymphatisme, Dermatoses, Prurits, Arthritisme, Furunculose, Affections du foie, Infections, Intoxications.

Forme. — Elixir peu alcoolisé de goût agréable présenté en deux modèles, un normal (12 jours de traitement), un réduit destiné aux enfants (15 jours de traitement).

Composition. — Bardane stabilisée, Boldo, Salsepareille, Sulfate de manganèse, Iode en faible quantité sous forme de composé iodotannique : Chlorure de magnésium, Acide phosphorique.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe pour les adultes, une à café pour les enfants, pur ou dans un peu d'eau avant les deux repas.

Prix : 20 francs.

Modèle réduit : 12 francs.

Inscrit au Laboratoire national du Contrôle des médicaments sous le n° 1438.

Laboratoires GAMES

2, place de la Salamandre — NIMES.

SALIBRA

Médication polyphosphatée.

Composition. — Phosphates acides et chlorures de calcium, magnésium, sodium, potassium, lithium, manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique régulateur de la fonction acide-base, traitement de l'alcalose, régénérateur puissant de la cellule, minéralisation du terrain, reconstituant général énergétique.

Indications. — Anémies, Asthénies, Surmenages, Convalescences, Phosphaturie, Colibacillurie, Décalcification, Rhumatisme chronique, Déminéralisation, Grossesse, Rachitisme, Tuberculoses, Sénilité, Tous les états psychiques, Tonique général.

Forme. — Ampoules buvables de 4 cc.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour pendant les repas.

Prix : 22 francs.

Laboratoires du SALIBRA

1, r. des Jardins — ASNIÈRES. (Tél. : Grés. 27-94.)

SALICAIRE DAUSSE

Propriétés et indications thérapeutiques. — C'est le médicament de l'entérite sous toutes ses formes. Antidiarrhéique se prescrivant dans la dysenterie (Campardon), la diarrhée infantile et la diarrhée de la dysenterie, dans toutes les diarrhées chroniques ou tuberculeuses.

Formes spécialisées. — Extrait fluide de Salicaire Dausse :

Enfants : XX gouttes, 3 ou 4 fois par jour sur un morceau de sucre ou dans un peu de tisane.

Adultes : L gouttes, 3 à 4 fois par jour sur un morceau de sucre ou dans un peu de tisane.

Fondant de Salicaire, dosé à 0 gr. 15 d'extrait par mesure ou cuillerée à café.

Adultes : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 5 cuillerées à café par jour, suivant l'âge :

Jusqu'à 15 mois	1/2	à 1	cuillerée à café par jour.
— 3 ans.....	1	à 2	— — —
— 5 ans.....	2	à 3	— — —
— 12 ans.....	4	à 5	— — —

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turb.go 63-40.)

SALICAIRINE

Gouttes et comprimés.

Composition. — La *Salicaïrine* est une solution à 5 p. 100 de tanno-glucoside de la Salicaire. (*Lythrum Salicaria* ; *Lythracées*). Comprimés titrés à 2 p. 100.

Propriétés. — Antidiarrhéique et hémostatique intestinal, agissant en particulier par dédoublement diastasique du tanno-glucoside en polyphénols antiseptiques et atoxiques. Agit très rapidement et très efficacement sur les phénomènes douloureux (Action supérieure à celle des dérivés opiacés, sans en avoir les inconvénients.)

Indications. — Toutes les diarrhées des enfants et des adultes. Entérites aiguës et chroniques.

Posologie :

Enfants : de LX à C gouttes.

Adultes : de LXXX à CL gouttes, et plus (ou de 8 à 20 comprimés).

Doses d'autant plus élevées que l'état est plus aigu, les selles plus nombreuses. (Ni danger. Ni accoutumance).

Présentation : Flacon de 24 gr. : 15 fr. Comprimés. : 15 fr.

E. VIEL

37, avenue de l'Opéra. — PARIS.

(Tél. : Opéra 66-55 et 67-18.)

Usine à Rennes : 11 et 12, boulevard de Chézy. (Tél. : 20-61.)

SALICYLATE DE SOUDE CLIN

Toutes les préparations de Salicylate de Soude Clin sont à base de Salicylate de soude cristallisé, d'une pureté chimique absolue, exempt de phénols et d'acides libres.

Le dosage rigoureux, la composition toujours fixe, la stabilité, l'excipient adéquat assurent l'activité et facilitent la tolérance locale ou générale.

Indications et Formes.

Salicylothérapie : Rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Rhumatisme chronique. Arthralgies, myalgies, névralgies. Affections biliaires. Encéphalite, chorée et zona. Sclérose en plaques. Psoriasis.

Affections oculaires.

Voie buccale : *Solution de salicylate de soude du Docteur Clin.* — 2 grammes par cuillerée à soupe. Excipient d'un goût agréable et permettant une tolérance parfaite.

Voie veineuse : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 5 o/o* : Ampoules de 20 cc. (1 gr. par ampoule) de 40 cc. (2 grammes par ampoule), de 60 cc. (3 gr. par ampoule).

Solution de Salicylate de Soude Clin glucosé à 10 o/o. (Formule du docteur René Benard) : Ampoules de 10 cc. et 20 cc., boîtes de 3 ampoules.

Médication sclérosante (Méthode du professeur Sicard) : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 20, 30 ou 40 o/o*, en ampoules de 3 cc. Boîte de 6 ampoules.

Polysalicylates Clin (Formule du Docteur Lutembacher) :

Solution buccale — 0, 75 par cuillerée à soupe.

Ampoules 10 et 20 cc. à 5 o/o.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SALICYLATE SURACTIVÉ ANA

Définition. — Solution, en eau de mer, de Salicylate de soude chimiquement pur, en milieu calco-magnésien thiosulfaté.

Présentations :

a. *Solution* : 1/2 cuillerée à café mesure (incluse dans la boîte) = LXX gouttes;

= 1 gr. de Salicylate de soude suractivé.

b. *Ampoules* pour injections intra-veineuses : 1 gr. par ampoule.

c. *Dragées glutinisées* de 0 gr. 50.

Indications. — Toutes les indications du salicylate de soude.

Posologie. — Identique à celle du salicylate de soude.

Avantages. — Suractivité marquée (170 %) ; Goût agréable ; Tolérance parfaite ; Concentration forte.

Prix adapté :

Solution : 15 francs (32 grammes par flacon).

Dragées : 15 francs (32 grammes par flacon).

Ampoules : 15 francs (4 ampoules).

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 52-12.)

SALICYLNA

Dragées de Salicylate de Soude chimiquement pur, dont le mode de préparation spécial supprime les inconvénients habituels de la médication salicylée.

Trois avantages :

- 1° *Pureté chimique absolue*, assurant une efficacité régulière maxima ;
- 2° *Tolérance parfaite*, l'enrobage spécial des dragées évitant tout contact avec l'estomac ;
- 3° *Commodité d'emploi*, le dosage rigoureux (0 gr. 50 ou 0 gr. 25) permettant toutes les modalités de prescription.

Salicylna, 0,25. Étui de 120 dragées : 20 francs.

Salicylna, 0,50. Étui de 80 dragées : 20 francs.

Laboratoire du Docteur LAVOUE

RENNES (Ille-et-Vilaine).

SALIFORMIODE BOUCHEREAU

Chimiquement : Méthyliodosalicylate d'Hexaméthylène-amine et de sodium, nouveau dérivé aminé iodosalicylé cristallisé, hydrosoluble, non toxique d'action antiseptique 4 à 5 fois supérieure à celle de l'urotropine et du salicylate de sodium, d'une tolérance parfaite.

Indications. — *Spécifique des Rhumatismes surtout aigus et infectieux.* sciatiques, et troubles circulatoires :

L'action vaso-motrice de l'iode se manifestant aux doses thérapeutiques.

Formule. — 1° Ampoules dosées à 0,70 de saliformiode par 10 cc sérum glucosé : 1 à 2 ampoules par jour cas aigus de rhumatismes ; 1 tous les 2 jours, formes chroniques et troubles circulatoires, en intramusculaires profondes à employer aussi comme *anti-infectieux général*.

2° Gouttes contenant 16 gr. pour 100, 30 à 40 gouttes 2 fois par jour.

Boîtes Ampoules (6). Prix public 45 fr.

Flacon gouttes. Prix public 15 fr.

Laboratoire Contrôle n° 1621-4. Dépôt O. C. P.

Laboratoire P. BOUCHEREAU

Docteur en Pharmacie, lauréat de la Faculté de Paris.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : 197.)

SALITROPINE AGUETTANT

Contre tous les états infectieux aigus, localisés ou généralisés.

Composition essentielle. — Salicylate de Soude, Formine, en milieu glucosé.

Indications principales. — Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe aiguë, Encéphalite aiguë et phlegmonieuse, Fièvre puerpérale, Erysipèle, Rhumatisme polyarticulaire aigu et Maladie de Bouillaud, Infection des voies biliaires et urinaires, Etats typhiques et paratyphoïdiques, Colibacillooses.

Formes :

Ampoules de 5 et 10 cc. dosées à 0,10 de chaque composant par cc. *Comprimés* dosés à 0,165 de chaque composant.

Pilules kératinisées. — Même dosage que les comprimés. L'enrobage de ces pilules ne se dissout que dans l'intestin, elles n'éprouvent donc pas l'estomac, souvent sensible au salicylate (Procédé du Dr Philippe).

Posologie. — *Ampoules* : 1 à 2 par jour de 5 ou 10 cc. en injections intramusculaires ou mieux intraveineuses, ou pour les jeunes enfants, rectales.

Comprimés : dose moyenne, 6 par jour avant les repas ; pour les enfants, demi-dose.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.

SALSANOS

Complexe sodique.

Minéro-organique effervescent.

Composition. — Après effervescence la répartition des sels de sodium est approximativement :

Citrate trisodique naissant ($C^6H^5O^7Na^3$)	
$11H^2O$)	50
Tartrate naissant ($C^4H^4O^4Na^2H^2O$)	35
Sulfate (SO^4Na^2)	5,5
Phosphate (PO^4Na^3)	5,5

Propriétés. — Spécifique des troubles de l'équilibre. Acide-base. Met à la disposition de l'organisme les éléments ioniques et les tampons permettant la reconstitution et le maintien de la réserve alcaline.

Indications. — Acidose, Alcalose, Arthritisme, Artériosclérose, Lithiases hépatiques et rénales, Goutte, Hyperviscosité sanguine, Constipation.

Doses. — Une à deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

Prix : Le flacon 16 fr. 50 (15 jours de traitement).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. Galvani 84-41.)

SALVACID

Association de Bile, de Cholestérine, de Sauge et de Para-Thyroïde.

Indications thérapeutiques. — Aigreurs, Hyperacidité, Aérophagie, Gastrites, Spécifique des Ulcères d'estomac et du duodénum.

Mode d'emploi. — 2 comprimés dragéifiés après les 3 principaux repas et 1 comprimé en plus après les repas complémentaires, soit avec un peu d'eau, soit avec une tasse de tisane chaude.

Ne jamais les croquer (grande amertume). Ne jamais les avaler à jeun.

Conservation indéfinie.

50 comprimés. Prix : 20 francs.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e).

Tél. : Richelieu 35-10.

SALVATYL

Adopté par les Ministères de la Marine, des Colonies et de la Santé Publique.

Prophylaxie antivénérienne individuelle.

Pommade polyvalente agissant à la fois contre le tréponème et le gonocoque.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable. (Voir *Comprimés Proto-Gambier*.)

Mode d'emploi. — En applications dans le canal de l'urètre, sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. A employer le plus tôt possible; au plus tard dans les 8 heures consécutives à un contact suspect.

Présentations :

Salvatyl G. M.	15 francs.
— Rech	10 —
— P. M. (3 utilisations)..	5 —

Laboratoire du GAMBÉOL

42, rue Emile-Deschanel — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 17-67.)

SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

Indications. — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

Comprimés : avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

Adultes : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

Cachets : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

Adultes : 2 cachets par jour.

Comprimés : 13 francs.

Cachets : 15 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

SALVEBYL

(Granulé)

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux : artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

Indications. — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, urticaire, Prurigo strophulus.

Posologie. — *Enfants :* 1 cuillerée à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien —
PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

SALVENASE LEGOUX

Usage féminin.

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés non enrobés se désagréant très rapidement : constitués de :	Extraits secs.	Marron d'Inde (stabilisé). Cupressus. Hamamélis. Viburnum. Boldo.
	Poudre de glandes	Surrénales. Thyroïdes. Ovaires.

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains { Sulfate de potasse et d'alumine.
à base de : { Hydrochlorate de soude.
Carbonate de soude acide.

Indications. — Affections du système veineux. Traitement complémentaire de la cure aux eaux ou à défaut son meilleur succédané. (Bagnoles de l'Orne, La Léchère.)

Mode d'emploi :

Traitement interne. { 1° Matin à jeun, 1 cuillerée à café
pleine de granulé, dissous dans un
demi-verre d'eau.
(Prix : 17 fr. 50) { 2° A chaque repas de midi et du soir,
prendre 2 à 3 comprimés.

Traitement externe. { 1 bain ou 2 par semaine dans lequel
on aura fait dissoudre le contenu
d'une boîte Salvenase (sels pour
bains).
(Prix : 4 fr. 50)

Unité de vente { traitement interne, pour 10 jours,
{ traitement externe, pour 1 bain.

N° d'inscription au Lab. de Contrôle :

Traitement interne. { Comprimés 146-4.

{ Granulé ... 146-5.

Traitement externe 146-6.

Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, Pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

SALYFRÈNE

« Salicylate de Soude Actif, Toléré, Agréable. »

Composition. — Chaque demi-cuiller à café-Mesure (LXXX gouttes) renferme :

Salicylate de Soude	1 gr.
(Recristallisé très pur)	
Extrait de Frêne	0 gr. 37
(Plante Fraîche stabilisée)	
Extrait de Reine des Prés	0 gr. 03
(Glucosides Salicylés).	
Extrait de Pommes Reinettes	0 gr. 33
(Laxatif doux).	

Avantages. — Salicylate extrêmement pur, activé par des extraits végétaux diurétiques. Saveur très agréable remplaçant totalement le goût nauséux du Salicylate. Gouttes concentrées permettant de mieux fractionner les doses.

Prix adapté : 18 fr. les 30 gr. Salicylate.

Indications. — Toutes celles du Salicylate de Soude.

Mode d'emploi. — De 4 à 10 mesures par jour, toujours bien dilué (Eau alcalinisée ou Lait chaud).

Petites doses : LX gouttes (= 0 gr. 50 Salicylate) de 3 à 5 fois par jour.

Nouvelle Forme. — Dragées Glutinisées à 0 gr. 50 Salicylate. Les seules Dragées Glutinisées renfermant des extraits diurétiques « entourant » et « divisant » le Salicylate, et reconstituant la forme. Gouttes dans l'intestin. (Traitements ambulatoires. Cures de complément.)

Laboratoires du SALYFRÈNE

17, Avenue de la Capelette — MARSEILLE.

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Composition. Propriétés. — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus et du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone d'Aconit et d'Opium, Hypnal, Excipient glycérimo-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

Indications. — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

Formes. Posologie. — *Elixir (adultes)* : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

Gouttes (enfants) : jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

Elixir : 18 fr. Gouttes : 16 fr. 50.

Laboratoires Georges TINARD

134, bd Péreire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

SALYSÉRUM

Médication salicylée
avec anesthésie locale.

(Communication à l'Académie de Médecine.)

Indications. — Rhumatisme aigu ou subaigu, Rhumatisme musculaire, Goutte, Sciatique, Lumbagos, Torticolis, Pleurodynies, Rhumatisme gonococcique.

Forme. — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique *indolore*.

Doses. — 2 ou 3 ampoules chaque jour injectées au point douloureux.

Prix : 22 fr. la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

Tél. : 32.

SAMBUL

Médicament végétal, **sans Colchique**, non toxique, curatif et préventif.

Deux présentations : *Liquide désodorisé* et *Comprimés*.

Composition. — A base d'un suc extrait des baies du *Sambucus Ebulus*. Nouvelle formule donnant complète désodorisation du produit.

Indications. — Goutte, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies, Lumbago, Migraines, etc. **Antidiabétique.**

Posologie. — Une cuillerée à café ou 1 à 2 comprimés matin ou midi et soir, à distance des repas. Ni toxicité ni contre-indications.

Dans les cas chroniques et rebelles de prime abord, prolonger le traitement par cures ininterrompues de 3 flacons ou tubes de comprimés.

Préventif. — Une cure 2 ou 3 fois par an.

Le flacon ou le tube de comprimés pour 10 jours de traitement : 18 francs.

Littérature et spécimens médicaux sur demande.

Société des Laboratoires du SAMBUL

22, rue Saint-Pierre — EVREUX (Eure). — (Tél. : 241.)

SANALEPSI RUSSI

Pilules et gouttes.

Composition. — Chaque pilule ou XXV gouttes contiennent :

Ethylphénylmalonylcarbamide.....	0,05
Rhamnus pursh	0,10
Extraits antispasmodiques (Datura, Scopolia, Valériane)	0,04
Saccharine	0,002

Indications. — Epilepsies ; états spasmodiques ; troubles nerveux légers (agitation, insomnie, états d'angoisse, etc.).

Particularités thérapeutiques. — Action synergique des composants ; faible toxicité ; élimination rapide.

Doses :

Adultes : de 1 à 6 pilules (ou de XXV à CL gouttes) par jour.

Enfants : de V à L gouttes.

Suivant l'ordonnance médicale.

Prix :

Gouttes	22 fr. 50
Pilules, petit modèle.....	8 fr.
Pilules, grand modèle.....	22 fr. 50

Laboratoires SASSÉ

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

SANARGOL

Composition :

Argent colloïdal, hexaméthylène tétramine recristallisée dans l'alcool, salicylate de phényle, charbon de peuplier porphyrisé, charbon animal activé.

Une seule forme : granulé friable, aromatisé à l'anis.

Indications :

Désinfection intestinale, vésicale et biliaire. Fermentations, entéro-colites, flatulence, intoxications d'origine exogène et endogène. **Colibacillose**
Affections rénales, vésicales : cystites, néphrites.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas.

Enfants : 1/3 à 1/2 de la dose.

Un flacon suffit pour un traitement de 15 jours.

Le **SANARGOL** ne constipe pas.

Laboratoires BARDOU

13, quai Ragobert — JOIGNY (Yonne).

SANARTERYL

Hypotenseur.

2 formules : Masculine et Féminine.

Composition. — Gui, Belladone, Cratægus, Hamamelis, peptone iodée, phényléthylmalonylurée, Orchitine ou Ovarine, Renine.

Thérapeutique. — Hypotenseur, sédatif des troubles cardio-vasculaires et nerveux des hypertendus, antispasmodique neurotonique. Ménopause.

Posologie. — Une cuillerée à soupe 20 minutes avant les repas de midi et du soir.

Prix : 25 francs.

Laboratoire SANARTERYL

P. COLLIOT, Pharmacien

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SANAS

Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile ; ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

Formes :

- 1° Gouttes ;
- 2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.
Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

Posologie :

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 15 francs.

A. WELCKER et Cie

72, rue du Commerce — PARIS (XV°).
(Tél. : Vaugirard 42-40.)

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil paisible et naturel, d'une durée normale, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite, également par les personnes âgées, les affaiblis, les convalescents.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

Prix. Le tube de 10 : 10 francs. Le flacon de 100 : 85 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des toins, Hypotension, Dysménorrhée, Prévention des accidents allergiques.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 025 (tubes de 20). **Prix : 11 francs.**

Solution aqueuse à 3 % Flacons de 30 cm³ — 20 —

Solution huileuse à 2 % Flacons de 15 cm³. — 15 —

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 mg. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus et les prostatiques.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cm³. renfermant : Sanédrine (0 g. 02), et Rénaleptine (0 g. 0002) — (boîtes de 10 amp.).

Pour l'usage externe : solution aqueuse de Sanédrine à 3 %, solution huileuse de Sanédrine Base à 2 %.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usinos du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycérophosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes :

Cachets, la boîte de 42 : 17 francs.

Granulé de goût agréable, la boîte : 14 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.

Adultes : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

Laboratoires Ch. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 67-05.)

SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

Thiosulfate d'or et de sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc. Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

Forme. — Ampoules à doses progressives de 0 gr. 01 à 1 gramme.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuses ou intramusculaires.

Posologie. — On débute par des doses faibles en augmentant progressivement selon la tolérance du malade.

OLÉO-SANOCRYSINE

Thiosulfate d'or et de sodium.

En suspension huileuse.

Indications et posologie de la Sanocrysine aqueuse.

Forme. 1° En suspension à 1 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 02 de Sanocrysine.

— 3 cc. — 0 gr. 03 —

— 5 cc. — 0 gr. 05 —

2° En suspension à 5 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 10 de Sanocrysine.

— 3 cc. — 0 gr. 15 —

— 5 cc. — 0 gr. 25 —

3° En suspension à 10 p. 100.

Ampoule de 2 cc. contient 0 gr. 20 de Sanocrysine.

— 3 cc. — 0 gr. 30 —

— 5 cc. — 0 gr. 50 —

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.

Avant l'emploi, agiter l'ampoule jusqu'à ce que la suspension soit homogène.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépositaire pour la France :

Jean **DEDIEU**, pharmacien, 39, rue Fondaudège
BORDEAUX

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Forme. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques. —

- 1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;
- 2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

La boîte de 50 comprimés. Prix : 17 francs.
15 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.
A BRUXELLES :

LE MARINEL, Pharmacien,
4, avenue Orban.

SANOGYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 6 fr. 75.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 francs.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Marques de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e)
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SANO GYNOL

Désinfectant gynécologique à base de chloramine T, sulfate de zinc, borate de soude, essence de géranium.

Hygiène intime : Leucorrhée, Vaginites, Prurits.

Mode d'emploi :

Un ou deux sachets pour deux litres d'eau.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoire du SANO GYNOL

161, rue Croix-de-Seguey

BORDEAUX

SANOQUINOL

CIBA

Médicament antiarthritique.

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

CURES PROLONGÉES D'ÉLIMINATION URATIQUE

Action thérapeutique. — Exerce sur l'organisme une action lixivante caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, une stimulation de la fonction hépatobiliaire et de la fonction rénale, l'augmentation de la sécrétion de la bile et une diurèse abondante, éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme. A titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, les obèses, herpétiques et rhumatisants. Après les maladies infectieuses.

Doses : 1 à 4 cuill. à café de granulé par jour (aux repas).

Flacon de 20/30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

SANTAL MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Mysore, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorragie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et au moins un quart d'heure avant les repas.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de Pharmacologie Générale
VIAL et C^{ie}, 8, rue Vivienne — PARIS.
(Tél. : Gut. 27-03.)

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

Forme. — Capsules gélatineuses.

Composition. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques	0 gr. 16
Bleu de Méthylène.....	0 gr. 02

Propriétés. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique, le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des affections des Voies urinaires.

Indications. — Blennorragie, Cystites, Pyuries, Prostatites, Colibacillose urinaire.

Particularités. — Colore les urines en bleu.

Doses. — 6 à 10 capsules par jour.

Le flacon de 50 capsules : 20 francs.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS.

Tél. : Invalides 52-73.

SANTHÉOSE

Composition. — Théobromine d'une pureté parfaite, de préparation rigoureusement identique.

Propriétés. — Diurétique cardio-rénal, complètement inoffensif, d'une efficacité remarquable et d'une fidélité constante.

La *Santhéose* est prescrite pure, ou associée selon les cas au Phosphate de Soude, à la Caféine, au Benzoate de lithine, au Sulfate de Spartéine et à la Poudre de Scille.

Formes. — Pure, Caféinée, Spartéinée, Scillitique, Phosphatée, Lithinée.

Indications. — Affections cardiaques et rénales, Artériosclérose, Albuminuries, Urémie, Hydropisies, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Maladies Infectieuses, Intoxications, Convalescences.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour. Ces cachets, ayant la forme d'un cœur, se présentent en boîtes de 24, dosés à 0 gr. 50 de Santhéose. Toutefois la *Santhéose pure* (mais seulement cette forme) comporte également des boîtes de 32 cachets dosés à 0 gr. 25.

Laboratoire de la SANTHÉOSE

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 95-60.)

SANTONIA

Vermifuge énergique pour la destruction des vers intestinaux, quelle qu'en soit l'espèce (sauf le ver solitaire).

Formule :

Santonine.....	0 gr. 01
Calomel.....	0 gr. 02
Semen contra, riche en essence.....	0 gr. 10

Par comprimé.

Indications. — Le SANTONIA VENOT est le remède rêvé pour la destruction des oxyures, ascaris, tricocephales, ankylostomes, etc.

Mode d'emploi :

Enfants à partir de 3 ans : 1 comprimé le matin pendant 3 jours.

De 6 à 12 ans : 1 comprimé le matin pendant 6 jours.

Adultes : 2 comprimés le matin pendant 6 jours.

Laboratoires VENOT

139, avenue E.-Zola. — PARIS (XV^e).

SANUBROL MARS

Formule. — Essences antiseptiques diverses : formol, camphre, borate de soude, etc...

Indication. — Solution antiseptique et bactéricide très puissante pour le lavage de toutes les plaies et la toilette intime.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie pour le lavage des plaies, trois cuillerées à bouche par litre pour la désinfection des parquets, pure pour la désinfection des fèces à mettre directement dans le vase.

Échantillons sur demande.

Prix : 10 fr. Le flac. contient envir. 12 cuil.

Laboratoire MARS

GUÉRANDÉ (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

Et chez tous les grossistes.

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN, Adoucissante, antiprurigineuse, Dermites aiguës.

Sapocade. — (Sapolan et Huile de Cade.). Psoriasis, Séborrhée, Sycosis.

Lait de Sapolan. — Erythèmes.

Lait de Soufre Sapolan. — Acné.

Lait de Cèdre Sapolan. — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu.

Poudre de Sapolan. — Dermites aiguës.

Savon de Sapolan. — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables.

Sapobarbe. Infections cutanées.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 65-97.

Détail : Ph^{ie} 116, bd Haussmann et ttes ph^{ies}.

SAPOREX

Non caustique. Non toxique.

Enregistré au Lab. Nat. de cont. des médicaments sous le n° 1074-1.
Composition de savon liquide, neutre, stérile, impeccable, associée
au thymol, glycérine et essences aromatiques naturelles déterpenées.

Formule :

Essence lavande.....	0,35	Santal.....	0,07
— thym.....	0,13	Thymol.....	0,10
— citronnelle.....	0,08	Glycérine chimiquement	
Verveine.....	0,07	pure à 30°.....	5,00
Savon liquide.. Q. S. p. 100.			

Indications :

Obstétrique-gynécologie : 1 cuillerée à soupe par litre d'eau.

Oxyures : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède, en petit lavement et
savonner la région anale, traitement : 40 jours. (Traitement : 5 jours.
Repos : 5 jours).

Désinfection de toutes plaies : dilution 10 à 20 p. 100.

Désinfection buccale : quelques gouttes dans un verre d'eau.

Acnés juvénile et rosacée, sueurs profuses : massage au Saporex pur, jus-
qu'à absorption (application au coucher pendant 8 à 10 jours).

Furonculose, lavages et compresses chaudes : dilution 10 %.

Toilette intime, toilette des bébés : préventif de l'érythème fessier.

Flacons G. M. (500 gr.) : 17 francs. — Flacons P. M. (250 gr.) : 11 francs.

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

Laboratoires LIP

184, r. de Genas — LYON-MONTCHAT. (Tél. : Villeurbanne 93-88.)

SAPOSIDE

Composition. — Solution de Saponine à 2/1 000
en ampoules de 5 cc. pour injections intramus-
culaires.

Propriétés. — Troubles des métabolismes des
bases puriques, du calcium et des stérols.

Favorise leur élimination.

Accélère leur résorption.

Indications. — Arthritisme, Dermatoses, Cicatri-
sations traînantes.

Mode d'emploi :

1° Injection : intrafessière de 1/2 cc.

2° Injection : après 48 heures : 1 cc.

3° Tous les deux jours, augmenter de 1 cc. jusqu'à
5 cc.

4° Dose normale : 2 ou 3 injections de 5 cc. par
semaine, sauf intolérance exceptionnelle.

Laboratoires du Dr R. CAVAILLES

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 65-97.

SAPROXYL

Composition et propriétés. — Complexe glucidique agissant physiologiquement sur les infections, fermentations et putréfactions intestinales, en favorisant le développement de la flore acidogène normale et en plaçant les bactéries de la putréfaction dans un milieu acide défavorable (pH trop bas).

Forme. — Comprimés.

Indications. — Entérites (aiguës, subaiguës ou chroniques). Gastro-entérites. Côlites (ascendante ou transverse). Fermentations intestinales. Diarrhées. Infections intestinales spécifiques : Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Dysenteries, Salmonelloses, Cholérines, etc...

Posologie :

Cas aigus	18 à 24 comprimés par jour.
Cas moyens	12 à 15 — —
Cas bénins	6 à 9 — —

avalés en trois fois, avec un peu d'eau, avant chaque repas ou, si nécessaire, écrasés dans une boisson (eau bouillie, tisane).

Prix : La boîte de 140 comprimés environ (8 à 18 jours) : 14 francs

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Galvani 84-41.)

SARCOPTOL

Solution complexe à base de soufre colloïdal, acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatolulique, savons, essences.

Indications. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermmites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furunculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

Avantages. — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 15 fr.

— 120 — 28 fr.

Laboratoire du Sarcptol

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 29-54.)

SARIDON

Composition : Formule nouvelle :

Phényldiméthylisopropylpyrazolone.	0 gr. 15
Acétylparaphénétidine.....	0 gr. 25
Allylisopropylacétylcarbamide	0 gr. 06
Triméthylxanthine	0 gr. 05

Pour un comprimé.

Propriétés. — Jugule la douleur, supprime les maux de tête, apaise la fièvre, calme l'éréthisme nerveux. Aucune possibilité d'accumulation, aucun danger d'accoutumance, aucun risque de toxicomanie.

Indications. — Algies, névralgies, migraine, grippe, rhumatisme, maux de dents, sinusite, otite, etc...

Posologie. — 1 à 3 et même 4 comprimés par jour. A prendre avec un peu d'eau ou de liquide quelconque.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Boîte de 10 comprimés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-63.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

SATURALGINE

Comprimés calcaires fluorurés friables.

Propriétés thérapeutiques. — Produit absorbant et alcalin, neutralisant l'acide chlorhydrique. Sédatif des douleurs gastriques. En cas de diarrhée, espace les selles et leur rend leur consistance normale.

Indications. — Toutes les gastralgies et tous les troubles dyspeptiques liés à l'hyperchlorhydrie. Les fermentations anormales de la digestion accompagnées ou non de diarrhée.

Posologie et mode d'emploi. — 1 comprimé à la fin des repas. Sucrer ou délayer dans un peu d'eau. Ensuite 1 ou 2 comprimés au moment des douleurs.

La boîte : 8 fr. 75.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 38-31.)

SAUBARSINOL

Collutoire au *Novarsénobenzol* (1 gr. 60 %), à l'extrait fluide d'*Arnica Montana* et au *Citrate de soude*, avec du *Miel* comme excipient.

Indications thérapeutiques. — Angines rouges, Angines de Vincent, Angines pseudo-membraneuses, Angines herpétiques, Gingivites, Stomatites, etc.

Mode d'emploi. — En badigeonnages très légers sur les amygdales ou sur les gencives. En instillations nasales, III gouttes dans chaque narine, matin et soir.

Prix : 15 francs.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. — Tél. : Avron 25-80.

SAUCHOLINE

Forme. — Granulé soluble sucré et aromatisé à la framboise.

Composition. — *Peptones polyvalentes*, *peptone foie et albumine*, et *sulfate anhydre de magnésie*.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue puissant. Agit sur l'ensemble des fonctions hépatiques : biliaire, glycogénique, antitoxique. Assure la sécrétion régulière de la bile et un drainage rationnel des voies biliaires.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Ictère, Cholécystite, Lithiase biliaire, Troubles digestifs ayant une cause hépatique, Inappétence, Nausées, Constipation par insuffisance biliaire, Urticaire, Vertiges, Migraine.

Mode d'emploi. — Prendre la Saucholine le matin à jeun dans un peu d'eau chaude. S'étendre ensuite pendant un quart d'heure sur le côté droit.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 3 ans : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 17 francs.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. Tél. : Avron 25-80.

SAVONS A°. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE

A°. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD

pour les soins du cuir chevelu

(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION A°. MOLLARD A LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD

(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et C^{ie}

7, rue Charlot — PARIS (III^e)

(Tél. : Archives 20-71.)

SÀVONS LIQUIDES RAMET

Pour l'hygiène et comme complément de traitement des
maladies de la peau et du cuir chevelu.

Boraté.....	A l'huile de Cade vraie
Camphré.....	A l'huile spéciale pharmaceutique
Au coaltar.....	
Au coaltar concentré.....	A l'Ichthylol
Doux.....	A l'Oxygène de Mercure
Doux à la glycérine.....	Au Naphthol
Doux surgras à la lanoline.....	Au Sulfate de Quinine et teinture de Quinquina
A l'extrait de Camomille bleue....	A l'extrait de bois de Panama
A l'essence de Cèdre redistillée....	Au Pétrole
	Phénolé
A l'essence de Pin.....	Résorciné
A l'Eucalyptol.....	Au Romarin
Iodé.....	Salié
A la Formaldéhyde.....	Sinole
Au goudron végétal.....	Sulfuré ordinaire
Thymol.....	Sulfuré concentré
Au Trioxyméthylène.....	

Prix : l'ampoule 3 fr. 95	Boîte de six ampoules
11 fr.	1/4 de flacon 125 grammes environ
16 fr. 50	1/2 — 250 —
23 fr. 50	flacon 500 —

PHARMACIE GÉNÉRAL

54, Chaussée d'Antin — PARIS — (Tr. 21-06)

Echantillons gratuits des SAVONS RAMET aux

Laboratoires des SAVONS RAMET

Fontenay-Mauvoisin, par Mantes-Gassicourt (S.-et-O.)

SCILLARÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Glucoside cristallisé, principe actif du Bulbe de la Scille.

Formes. — Comprimés à 0 mgr. 8 de substance active, solution dosée à 0 mgr. 8 pour XX gouttes; ampoules pour injections endoveineuses ou intramusculaires profondes de 1 cc. dosées à 0 gr. 0005; suppositoires dosés à 1 mgr.

Propriétés. — Produit pur. Cardiotonique et diurétique général et *azoturique*. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Cœur sénile; 2° maintien de la compensation; 3° puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai*.

Posologie. — 1/2 à 1 ampoule par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour à doses régulièrement ascendantes, puis descendantes.

Prix :

Comp. : 14 francs. — Sol. : 17 francs.

Amp. (la boîte de 6) : 12 francs. — Supp. : 18 francs.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SCILLITRINE

Composition. — Association de Trinitrine, Scille et Phényléthylmalonylurée. Dragées à noyau mou contenant II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100^e, 2 cgr. d'Extrait de Scille stabilisé, 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Phényléthylmalonylurée.

Propriétés. — Antispasmodique par la Trinitrine et la Phényléthylmalonylurée. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

Posologie. — Conditionnée par la présence à l'intérieur des Dragées d'un *noyau mou* renfermant les principes actifs dont il permet l'absorption per-orale lorsqu'on *croque* les Dragées, d'où action *instantanée*.
Croquer de 1 à 4 dragées de *Scillitrine* en 10 minutes pour juguler les états aigus.
Absorber 3 dragées de *Scillitrine* pro die, pendant 15 jours par mois pour faire disparaître les troubles fonctionnels des Hypertendus.

Indications. — 1^o Toutes les *crises* : Crises d'Angor, Crises d'Hypertension paroxysmique, Crises d'Aérogastrie, Crises d'Aérocolie, Crises des Anxieux, Crises des faux Cardiaques, Crises d'Asthme, Crises de Tachycardie ou d'exaspération nerveuse des Basedowiens, Crises de vomissements de la grossesse.

2^o *Traitement d'entretien des hypertendus* chez lesquels l'absorption par voie gastrique fait disparaître les troubles fonctionnels.

Présentation. — Boîte contenant 45 dragées. Durée moyenne : 1 mois,

Prix : 20 francs.

Laboratoire PERRIER

17 bis, bd Rochechouart — PARIS (IX^e).
Tél. : Trudaine 03-01.

SCLÉROLYSINE DUCATTE

Thérapeutique de l'Artériosclérose et de l'Athérome.

Solution colloïdale de phosphatides organiques. Médication hypotensive dissolvante des dépôts artériels.

Trois formes : *Solution*, Ampoules de 2 cc., *Dragées* : de 1 gr. 25.

Action thérapeutique et usage. — Agit comme dissolvant des produits qui se déposent dans les artères, elle est indiquée dans le cas d'artério-sclérose confirmée, chez tous les sujets qui présentent les petits symptômes de la pré-sclérose. Prescrite toutes les fois que la tension artérielle est élevée, la *Sclérollysine* réussit à diminuer l'hypertension puis à la faire disparaître.

Posologie. Mode d'emploi :

Solution : 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre une *demi-heure* avant chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Aucune contre-indication.

Ampoules : Une injection sous-cutanée chaque jour pendant 15 jours. Continuer le traitement *per os* avec la solution en alternant l'un et l'autre.

Dragées : 2 à 4 dragées par jour, à prendre comme la solution une *demi-heure* avant les 3 repas, dans un peu d'eau. Cette forme facilite l'usage de la *Sclérollysine* et en assure une bonne conservation dans tous les pays chauds.

Durée minimum du traitement : Séries de 1 à 3 mois.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS.

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique

Spécifique de l'Artériosclérose.

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 18 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

SCLÉROSÉRUM

Injectons Sclérosantes.

Formule. — Solution en milieu oléocériné de chlorhydrolactate double de quinine et d'urée "ANA" (*Formule de Vendel.*)

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Hydrocèles, Tumeurs kystiques, Hygromas, Arthrites, Rhinites.

Technique et posologie. — Demander à nos Laboratoires l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

Avantages sur les autres solutions. — 1° Le plus actif des sels employés ; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe) ; le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires ; 4° nullement escarrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes ; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

Présentations. — Varices : 45 francs ; Hémorroïdes : 30 francs ; O. R. L. : 30 francs ; Hydrocèles : 30 francs.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e),

(Tél. : Dorian 52-12.)

SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non de Rénaleptine, pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SÉDACÔNES

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-38.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Papavérine, allylisopropylmalonylurée, cupressus sempervirens.

Propriétés pharmacodynamiques. — Spasmodytique, sédatif de la douleur, décongestif.

Indications. — Toutes les douleurs du petit bassin et de la région ano-rectale : douleurs des règles et de la zone génitale chez la femme ; spasmes et crises douloureuses de la musculature lisse ; Sédatif hypnogène, assure un sommeil calme et un réveil normal.

Posologie. — Un à deux suppositoires par jour suivant l'intensité de la douleur.

La boîte de 6 suppositoires : 15 francs.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 62-30.

SÉDACRINE

Gouttes

A base de Sédum acre, Polygonum hydropiper et Pœonia avec comme excipient :

Extrait stabilisé de marrons d'Inde et Hamamélis.

Indications. — Toutes affections du système veineux.

Mode d'emploi. — De XX à XXX gouttes avant chacun des deux repas.

Durée moyenne : 30 jours.

Prix : 12 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

SÉDAORTINE

Préventif et curatif de l'angine de poitrine.

Composition. — Dragées rouges à noyau pâteux contenant exactement par dragée :

Trinitrine en solution au centième.....	III gouttes.
Codéine	1 cgr.
Phényléthylmalonylurée	15 mgr.
Caféine	3 cgr.
Benzoate de soude	10 cgr.

Excipient sucré, Q. S. pour une dragée.

Propriétés. — La Sédaortine est un médicament *préventif* d'abord et toujours *curatif* de l'Angine de Poitrine, elle calme toutes les douleurs voisines du cœur et de l'aorte.

Indications thérapeutiques. — Angine de poitrine, spasmes artériels, aortites douloureuses, insuffisance ventriculaire gauche (Cf. *Journal de Médecine de Paris*, avril-mai 1935).

Mode d'emploi. — Croquer une de ces dragées :

1° Le matin dès le réveil.

2° Avant tout effort physique.

3° Avant l'horaire des douleurs (s'il en existe un).

4° Pendant une douleur.

Dose moyenne : 5 à 6 dragées par 24 heures. Après amélioration, continuer pendant un an à prendre 1 à 2 dragées par jour.

Prix au public : 16 francs.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e). (Tél. : Botzaris 38-78.)

SÉDARTHRYL

Médication synergique du rhumatisme articulaire et des arthrites.

Salicylate de Sodium . 18 gr. 1629	Azotate de Potasse 6 gr.
Salicylate de Potassium 3 gr. 782	Iodure de Sodium 4 gr. 50
Salicylate de Calcium. 4 gr. 4392	Antipyrine 4 gr. 50
Teinture de Colchique 2 gr.	Sirop d'écorces d'o-
Benzoate de Sodium .. 2 gr.	range amère..... 200 gr.
Benzoate de Lithine.. 2 gr.	Glycérine..... 45 gr.
Aspirine 0 gr. 25	Eau distillée q. s. p.... 310 cc.

Flacon de 310 cc. 10 jours de traitement. Prix : 22 francs.

Particularités. — Association hyperactive des 3 salicylates, aux diurétiques et à l'iodure de Sodium.

Emploi. — *Cas chroniques* : 3 fois par jour 2 cuillerées à café, au milieu des repas.

Cas aigus : De 8 à 12 cuillerées à café dans des tisanes bien sucrées.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu et surtout chronique, douleurs articulaires. Arthrites rhumatismales et tuberculeuses.

Laboratoires du PULMODYNOL

(Spécifique pulmonaire, tonique et eupnéique.)

A. GONTARD

22, rue de Nemours — PARIS.

SÉDASTHMINÉ

Composition :

Kl.....	0,10
Poudre thébaïque.....	0,005
Camphre.....	0,03
Benzoate de Soude.....	0,05
Extrait sec Polygala.....	0,01
— Lobélie.....	0,005
— Grindélia.....	0,01
Caféine.....	0,02

Pour une capsule.

Propriétés. — Active la circulation pulmonaire, désencombre les bronches, désaphyxié le malade, fluidifie l'hypersécrétion bronchique, facilite l'expectoration antispasmodique.

Indications. — Asthme et toutes dyspnées asthmatiformes, emphyseme, bronchites chroniques, gazés de guerre, tuberculeux, touseurs et cracheurs chroniques.

Présentation et prix. — Un étui de 40 capsules, enrobées dans du gluten toluisé : 12 francs.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Laboratoire Central de la Bastille.

F. BAYLOT,

3. boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 38-31.)

SÉDATUSSINE

Composition :

Poudre de racine d'aconit.....	0,03	ctg.
Extrait de Belladone.....	0,01	—
Dionine.....	0,01	—
Bromhydrate de Codéine.....	0,01	—
Extrait de Drosera.....	0,02	—

Pour 1 comprimé.

Indications. — Par l'action synergique de ses cinq composants qui agissent sur toute l'étendue de l'appareil respiratoire, c'est le médicament spécifique de la *Toux*, quelle qu'en soit la cause : *Affections du Larynx*, de la *Trachée*, des *Bronches*, des *Bronchites*, crises dyspnéiques asthmatiformes, crises d'asthme ; *Tuberculose pulmonaire* ou *Maladies déterminant des toux réflexes*. C'est le complément indispensable de toute cure hydrominérale à Cauterets, Luchon, Amélie-les-Bains, le Mont-Dore, La Bourboule, Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes, etc.

Posologie :

Chez l'Adulte : de 2 à 5 comprimés par 24 heures.

Chez l'Enfant : au-dessus de 10 ans seulement : de 1 à 2 comprimés suivant l'âge. Prix : 16 francs.

Laboratoires de la SÉDATUSSINE :

A. JOURDIN

6, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

SEDHÉPATINE

Cholagogue.

2 formes : Poudre et Granulés.

Composition. — Kaolin, bismuth, sulfate de magnésie, Boldo, Artichaut.

Thérapeutique. — Cholagogue, Sédatif des affections des voies Inodéno-Hépatobiliaires, traitement simultané des « Affections du carrefour ».

Posologie. — Une cuillerée à dessert pour la poudre, à soupe pour les granulés, le matin à jeun et avant les deux principaux repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de la **SEDHÉPATINE**

P. COLLIOT, Pharmacien,

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SED'HORMONE

Reconstitution des hormones bromées neuro-sédatives par le Dibromocholestérol.

Composition. — Le Dibromocholestérol est un composé bromé organique ; possédant pour l'hypophyse et les centres nerveux une affinité particulière, il exerce à la dose de quelques centigrammes une action neuro-sédative supérieure à celle de plusieurs grammes de bromure. Actif à faible dose, il n'expose jamais aux inconvénients et aux dangers des bromures. Il ne crée pas d'accoutumance. Son action, remarquable dans les grands syndromes d'excitation et contre l'insomnie, vient probablement de ce que son affinité pour l'hypophyse lui permet d'assurer dans les meilleures conditions la reconstitution des hormones bromées d'origine hypophysaire, qui sont la forme active du brome dans l'organisme (Zondek et Bier).

Indications. — Hyperexcitabilité nerveuse. Insomnie. Anxiété. Tous les grands syndromes d'excitation. Les manifestations convulsives et notamment les crises épileptiques et leurs équivalents. L'énurésie. Le médicament peut encore être utilisé comme anesthésique de base.

Formes. — *Dragées* dosées à 2 cgrs de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 6 par jour.

Le tube de 30 dragées : 15 francs.

Suppositoires dosés à 10 cgrs de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 3 par jour.

La boîte de 8 *suppositoires* : 18 fr.

Laboratoires AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

SÉDIBAÏNE

Comprimés glutinisés.

Composition. — Extrait de Strophantus, Phényléthylmalonylurée, Extrait de Jusquiame, Extrait de Cratægus, Extrait de Ballote, Extrait de Valériane, Poudre de Belladone.

Indication. — Sédatif nerveux, tonique cardiaque.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, de préférence avant les repas ou le soir au coucher.

Prix : 15 francs les 40 comprimés (10 à 20 jours de traitement).

Laboratoires de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès
SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp. 17-37.

SEDLITZ CHANTEAUD

Composition. — Granulé effervescent composé de Sulfate de Magnésie parfaitement déshydraté, rendu légèrement effervescent par l'addition d'une petite quantité d'Acide tartrique et de Bicarbonate de soude.

Indications. — Dépuratif, Laxatif, Purgatif.

Doses et mode d'emploi :

Laxatif : 1 cuillerée à café.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Se prend à jeun dissous dans un peu d'eau.

Prix de vente au public : 11 francs (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 02-28.)

SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré.

Tablettes. — 1 tablette = 1 gr. NaBr.
(Boîte de 30).

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* :
1 à 5 tablettes par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon
l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*
« *Roche* » : on prépare ainsi instantané-
ment un bouillon particulièrement savou-
reux que l'on peut prendre à n'importe
quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Médica-
ment sédatif, hypnotique et calmant
donnant des résultats certains et permet-
tant d'imposer un *traitement bromuré*
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-
ble le régime déchloruré.

Indications thérapeutiques. — Insom-
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-
diopathies, migraines, spasmes, convul-
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 504-31

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SÉDOFOLLINE

Composition et propriétés. — 1° *Folliculine ovarienne* : Dosage garanti, activité constante. — 2° *Extrait ovarien spécial* : Action naturellement synergique de toutes les hormones ovariennes à l'exclusion de l'hormone lutéinique. — 3° *Thyroïdine* (faible dose) : Synergie thyro-ovarienne. — 4° *Sédobenzyl* (non toxique) : Sédatif et antispasmodique.

Forme. — Dragées friables à enrobage soluble, dosées à raison de 12 unités physiologiques.

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne.

Dosage. — Chaque dragée est dosée à raison de 12 unités physiologiques de Folliculine.

Mode d'emploi. — 2 à 8 dragées par jour, loin des repas. Dose moyenne : 4 dragées par jour.

Traitement. — 8 jours de traitement, 8 jours de repos jusqu'à résultat satisfaisant. Continuer chaque mois pendant les 8 jours précédant l'époque présumée des règles.

Prix : 20 francs pour 10 jours.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

SÉDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium, Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*

Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*

Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

SÉDOGASTROL

Forme.

Poudre homogène, absorbante, aromatisée à la badiane.

Composition.

HOANG-NAN (*Strychnos Gauthierana*) pulv. (1), Belladone pulv., Carbonates alcalins (Ca, Mg, Na), Magnésie hydratée, Kaolin porphyrisé, Essence de badiane.

Propriétés. Avantages.

SÉDATIF et **ANALGÉSIQUE**, **non stupéfiant**, **ni hypnotique**, grâce à la belladone qui agit énergiquement sur les terminaisons nerveuses et sur l'élément « douleur » seul. Les opiacés et dérivés étant à rejeter, car, en calmant la douleur, ils anesthésient toutes les fonctions de l'estomac.

TONIQUE MUSCULAIRE, par la présence de **HOANG-NAN** (*Strychnos GAUTHIERANA*) (1), **6 fois moins toxique que la noix vomique**, dont l'action stimulante s'exerce **uniquement** sur la contractilité des fibres musculaires de l'estomac et de l'intestin, **sans** agir sur le système glandulaire.

CICATRISANT, NEUTRALISANT, par l'emploi de sels alcalins à vitesses d'action différentes, associés à une petite quantité de kaolin qui ralentit le cheminement de ceux-ci dans l'estomac. Médication équilibrée n'ayant aucune action laxative ni constipante. Aucune contre-indication. Emploi prolongé sans aucun inconvénient.

Indications thérapeutiques.

Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhidrie, Gastrites, Hypersécrétion, Gastralgies, Aérogastrie, Ulcères.

Posologie et mode d'emploi.

Après les repas et au moment des douleurs, prendre : une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau. — Ces doses peuvent être renouvelées ou renforcées à n'importe quel moment et toutes les deux ou quatre heures.

Prix : 12 francs.

(1) **Références scientifiques**: Dr Henri Leclerc, *Presse médicale*, 31 décembre 1927; *Année médicale pratique*, 1929, p. 326; *Courrier médical*, 21 février 1937. — Thèse : Dr B. Joyeux Mollinedo, Paris, 1936.

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SÉDO-GYNŒSTRYL

Solution avec :

Di-hydro-Folliculine..... 1/10^e de mgr.

Bromure de sodium..... 0 gr. 50

Extrait de jusquiame..... 0 gr. 02

pour 1 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Par la di-hydro-folliculine, agit sur le dysfonctionnement ovarien ; par les produits associés, remédie aux troubles nerveux concomitants.

Indications. — Nervosisme, anxiété, insomnies des aménorrhéiques. Phénomènes douloureux et dysménorrhéiques.

Présentation. — Flacon de 10 cc.

Posologie. — Dose quotidienne : 50 gouttes (1 cc.) en plusieurs prises, à n'importe quel moment de la journée.

Maintenir chaque mois pendant 10 à 12 jours le traitement, que l'on commencera 7 jours environ après la fin des règles précédentes.

Le flacon de 10 cc. Prix : 20 francs.

Voir aussi **Gynœstryl**, **Benzo-Gynœstryl** et **Benzo-Gynœstryl 5**.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

SÉDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Composition. — Comprimés de composés organiques nouveaux : le phényl-éthyl-barbiturate de Yohimbine et le phényl-éthyl-barbiturate de quinine.

Propriétés thérapeutiques. — Baisse de pression par vaso-dilatation ; action cardiotonique, action sédatrice. Cette préparation réalise pour la première fois un effet hypotenseur artériel concomitant d'un renforcement cardiaque et d'une sédation des troubles nerveux qui compliquent l'hypertension.

Indications. — Tous les cas d'hypertension artérielle (artériosclérose, spasmes vasculaires, palpitations, éréthisme cardiaque, extra systoles, angoisse, angine de poitrine).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour, 1 avant chaque repas, par périodes de 8 à 12 jours, avec intervalle d'une semaine entre 2 cures.

Pas de contre-indication autre que l'hypotension artérielle.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40).

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine-Spartéine.

Mode d'emploi et doses. — 1° Ampoules : 1 à 3 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° Comprimés (Pérosédol) : 1 à 3 par 24 heures.

3° Suppositoires : voir « Supposédol ».

Propriétés thérapeutiques. — Beaucoup plus actif que la morphine employée seule, suppression des inconvénients de cette dernière.

Indications. — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, Suites opératoires, etc.

Prix de vente au public :	{	La boîte de 12 ampoules :	25 fr.
		La boîte de 6 ampoules :	18 fr.
		Le tube de 12 comprimés :	10 fr.

(Pérosédol)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SÉDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer. »

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés :

Comprimés jaunes : Caféine 0,015

Comprimés roses : Strychnine.... 0,0002

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent, avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée.

Évite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs. Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes ; 8 jours les comprimés roses.

Indications :

Déséquilibres vago-sympathiques : Anxiété, agitation, hyperémotivité, désordres psychiques frustes, Instabilité des basedowiens et des hypertendus, etc.

Algies paroxystiques : migraines, angine de poitrine.

États convulsifs. Épilepsie et ses équivalences : Maladie de Parkinson et Parkinsonisme, Absences et vertiges, Asthme rebelle, etc.

Chez l'enfant et le nourrisson : manifestations spasmodiques du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, coqueluche, tétanie, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

Posologie :

Déséquilibres vago-sympathiques : 2 comprimés fractionnés dans la journée.

États convulsifs. Épilepsie : Commencer par 4 comprimés et augmenter progressivement la dose jusqu'à suppression des crises.

Enfants : 1/2 comprimé par année d'âge.

Nourrissons (tolérance parfaite) : 1/2 comprimé jusqu'à 6 mois, 1 comprimé de 6 mois à un an, en deux prises.

Un comprimé = 2 cgr. et demi de phényl-éthyl-malonylurée.

Petit modèle : 12 francs. — Moyen modèle : 26 francs.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

SÉDOPATHYL

Composition :

Extrait de cratægus stabilisé	0 gr. 05
Extrait de hyosciamus	0 gr. 01
Extrait de passiflora	0 gr. 05
Extrait de paulinia	0 gr. 03
Extrait de valeriana	0 gr. 04
Diéthylmalonylurée sodique.....	0 gr. 015

Pour 1 comprimé.

Indications. — Angoisse, anxiété, cauchemars, états dépressifs, états névropathiques, excitation nerveuse, insomnie nerveuse, irritabilité, mal de mer, mélancolie, neurasthénie, psychasthénie, surmenage intellectuel, troubles cardiaques, troubles nerveux de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi :

- a. Sédatif nervin : 1 à 2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.
 b. Hypnotique : 1 comprimé avant le repas du soir et 2 comprimés au moment du coucher, dans une tisane.

Présentation et prix :

Une boîte de 40 comprimés : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1115-2.

Laboratoires J. ESCOUBET

62, boulevard St-Germain — PARIS (V^e).

SÉDOPAVÉRINE

Sédatif Nerveux et Cardiaque.

Forme. — Comprimés.

Composition. — Chlorydrate, de Papavérine, 0,01 ; Phényléthylmalonylurée, 0,02 ; Bromhydrate de Quinine, 0,05.

Indications. — Troubles nerveux cardiaques, Tachycardies, Arythmie extra-systolique, Spasmes vasculaires, Hypertension paroxystique, Angines de poitrine et Algies cardiaques, Asthme essentiel, Toux spasmodiques et Spasmes de la glotte, Spasmes digestifs (gastriques et intestinaux), Coliques hépatiques et vésiculaires, Insomnie et Anxiété des vagotoniques, Mal de mer.

Posologie :

Adultes : 3 comprimés par jour avant les repas.

Enfants, au-dessus de 10 ans : 1 à 2 comprimés par jour.

Prix de vente au public : 16 francs.

Laboratoire PHILIPPE

122, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

SÉDOPROSTYL

Spécifique de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications.

Composition. — Association d'Extrait d'Hama-mélis et d'Extrait de Belladone, de Chlorure de Magnésium.

Agit sur les trois causes de l'affection : l'hypertrophie de la prostate, l'élément congestif de la glande, l'état spasmodique du sphincter lisse.

Indications. — Traitement médical rationnel de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications. Troubles urinaires aigus ou chroniques.

Posologie. — De 3 à 5 dragées immédiatement avant le petit déjeuner et de 1 à 3 dragées, si nécessaire, avant le repas du soir.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de Pharmacologie Générale
VIAL et Cie

8, rue Vivienne — PARIS (II^e).
(Tél. : Gut. 27-03.)

SÉDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

Indications. — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

Trois formes. — A) *Sedorhino mixte*, comprend dans une même boîte :

1^o Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2^o Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antisepsie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

Prix : Comprimés : 15 fr. — Pommade : 9 fr. — Mixte : 18 fr.

Durée moyenne du traitement 10 jours.

Laboratoires A. REGAGNON et Cie

[276, rue Lecourbe — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaugirard 26-30.)

SÉDORMID « ROCHE »

Allylisopropylacétylcarbamide.

(Chaque comprimé est dosé à 0 gr. 25.)

Propriétés :

Sédatif hypnogène doux et inoffensif,
très maniable ; ne s'accumule pas.

Indications :

Toutes les Insomnies légères de quelque nature qu'elles soient : Anxiété, Mélancolie, Symptômes hypernerveux, etc.

Doses et mode d'emploi :

Dose sédatif : 2 à 3 comprimés dans la journée.

Dose hypnogène : 1 à 2 comprimés au coucher.

Boîte de 20 comprimés.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 504-32.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SÉDOSALYL

Médication spécifique du Rhumatisme.

A base de salicylate double de sodium et de pyramidon en milieu alcalin.

Association avec le Phénylcinchoninate de soude et le Campho-Sulfonate de pipérazine destiné à combattre le collapsus cardiaque.

Deux formes :

- 1° *Granulé* : Les produits actifs sont associés au bicarbonate de soude qui évite l'intolérance gastrique. La saveur nauséuse du médicament est masquée par un excipient aromatique de goût agréable.
- 2° *Dragées* : Mêmes principes actifs sous une forme plus pratique. Un enrobage spécialement étudié permet aux dragées d'éclater seulement à leur arrivée dans l'intestin.

Composition. — Salicylate double de Sodium et de Pyramidon, Phénylcinchoninate de Soude, Camphosulfonate de Pipérazine, Bicarbonate de soude.

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Arthralgies, Diathèse urique, Névralgies, Douleurs articulaires, Infections hépatiques, Angiocholites.

Doses et Mode d'emploi :

- 1° Rhumatisme articulaire aigu : de 8 à 16 cuillerées à café, ou 2 dragées 4 à 8 fois par 24 heures.
- 2° Cure d'entretien (10 à 20 jours par mois) : 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 3° Rhumatisme chronique : de 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 4° Affections urinaires et hépatobiliaires : 2 à 4 cuillerées à café ou 1 dragée de 2 à 4 fois par 24 heures.

Nota. — Une ou deux cuillerées à café ou dragées de *Sédosalyl* devront être prises dans 1/2 verre d'eau de Vichy ou mieux de Tisane (réglisse, frêne ou reine des prés).

Prix : *Granulé* : 18 francs. *Dragées* : 20 francs.

Laboratoire du SÉDOSALYL

C. ROUX, Docteur en Pharmacie.

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).
(Tél. : Alésia 12-55.)

SÉDOSINE

Solution

Association végétale hyperactive.

Composition. — Extraits de : Passiflore, Jusquiame, Cratægus.

L'action antispasmodique de la Jusquiame utilisée à doses minimes est considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus (H. Leclerc).

Indications. — Etats spasmodiques, Excitation nerveuse, Insomnie, Neurasthénie, Psychasthénie, Mélancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.

Tél. : Maillot 17-75.

SÉDOSOL

Pommade anti-hémorroïdale à excipient gélosé

Composition :

Menthol	0,01
Camphre	0,03
Goménol	0,05
Stovaine	0,12
Acide phénique.....	0,30
Sous-Gallate Bismuth.....	0,30
Teinture de marrons d'Inde.....	0,90
Oxyde de zinc.....	1,20
Adrénaline au millième	1,50
Excipient gélosé.....	35

Indications. — Hémorroïdes.

Présentation. — Tube canule ébonite sous étui cellophané.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir. La canule ébonite permet d'atteindre les hémorroïdes internes.

Remarque. — L'excipient gélosé absorbé par la muqueuse assure une action certaine des médicaments véhiculés.

Prix : 12 fr. 50.

Les Laboratoires LUTSIA

4, Villa Ornano — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 23-31.)

SEDOTAN FONDA**Dragées****Composition :**

Phényléthylbarbiturate d'Yohimbine.	0,002
Phényléthylbarbiturate de Quinine..	0,01
Extrait de Gui stabilisé Dausse	0,03

Indications. — Spasmes cardiaques douloureux ; Eréthisme, palpitations, angisses, points ; Céphalées des hypertendus ; Hypertension.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, avant les repas ; prendre pendant 10 à 12 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Laboratoires des Établissements FONDA J. DAHIEZ et J. FONTAINE, Docteur en pharmacie.

10, rue d'Amiens — COMPIÈGNE.

SÉDOTONINE GROS

Composition. — Extrait de Strophanthus, phényléthylmalonylurée, extrait d'anémone.

Indications. — Médication tonicardiaque et antispasmodique. Traitement de l'hypertension artérielle. Sédatif général.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par jour, à prendre à intervalles espacés : 1 au réveil et 1 avant les deux principaux repas. A croquer ou à avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 francs (durée moyenne de l'unité : 15 jours).

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND
(Tél. : 0-55.)

SÉDOTYOL

Pommade antiprurigineuse et anesthésique.

Pommade non toxique, absolument inoffensive, ne contenant aucun produit du genre de la cocaïne, ni des tableaux A et B.

Indications. — Toutes les lésions épidermiques prurigineuses ou douloureuses : prurits, urticaire, piqûres d'insectes, brûlures, éruptions, zona, etc.

Action. — Le SÉDOTYOL calme instantanément le prurit et la douleur.

Mode d'emploi. — En larges applications *loco dolenti*, renouvelées selon les besoins.

Présentation :

Le tube : 12 francs.

Le 1/2 tube : 7 francs.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

SEIGNET'FRUITS

Composition. — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purge sans nausées ni coliques.

Propriétés thérapeutiques. — Purgatif et laxatif.

Indications. — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin. Purgation douce (opérations, accouchements).

Mode d'emploi :

Adultes : Purgatif. Un flacon le matin à jeun.

Enfants : 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

Laxatif : Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

Prix : 6 fr. 75.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

SEINDERM MARS

Composition. — Stovaïne, acide tannique pur, essences diverses, lanoline vaseline, etc.

Indications. — Toutes crevasses, gerçures, etc., mais tout particulièrement pour les gerçures et les crevasses des seins.

Appliquer quelques minutes avant la tétée sur les lésions ; celle-ci se fait alors sans aucune douleur. Les crevasses sont guéries en 4 ou 5 jours.

Pour éviter les crevasses, enduire les seins pendant une huitaine de jours avant l'accouchement, et la peau sera suffisamment durcie pour éviter ces accidents si douloureux.

Remarque. — Laver les seins à l'alcool avant chaque tétée et enduire de pommade aussitôt après.

Prix : 10 francs.

Laboratoires MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.
Et chez tous les grossistes.

SELAMON

Composition et présentation. — Chlorure d'ammonium pur en comprimés glutinisés dosés à 50 centigrammes.

Dose et mode d'emploi. — 6 à 12 comprimés par jour au milieu des repas.

S'emploie avec succès dans tous les cas où il y a intérêt à modifier l'équilibre acide-base dans le sens de l'acidité. Médication prophylactique très active de la lithiase rénale.

Laboratoires LECLERC — S. A.
10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SEL DE HUNT

Alcalin type.

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 9 fr. 50 le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT
16, rue de Boulainvilliers — PARIS.
(Tél. : Auteuil 20-21.)

SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac. Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café de granulé délayé dans 1/4 de verre d'eau avant les repas ou au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

Prix : 12 francs.

BRACQUEMOND et Cie,

Docteurs en Pharmacie,

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 05-54.)

SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

Forme. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate de soude, Magnésie, Carbonate de chaux léger, Lactose, Essence d'anis.

Indications. — Hyperacidose gastrique aiguë, Vomissements incoercibles.

Doses. — Une cuiller à café après chaque repas.

Prix : 7 fr. 50.

**Laboratoires Gastro-Entérologiques
ODINOT**

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 69-13.)

SÉLÉNIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le Séléniol est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections néoplasiques, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

Prix : 36 francs pour 8 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS.
(Tél. : Carnot 18-75.)

SELOR

**Complexe auro-médicamenteux assimilable
par voie buccale (cachets).**

SELOR N° 1.

Composition. — Chlorure d'or, codéine, extrait d'aconit, poudre de belladone, terpine, composé solide contenant du bromoforme, acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique, ergostérine irradiée, extrait de quinquina, pepsine amylacée, sels de chaux.

Propriétés et indications. — Actif, facilement maniable, ne causant pas d'accidents.

Par sa quadruple action :

1° Spécifique ; 2° Reconstituant ; 3° Calmant de la toux ; 4° Eupeptique ;

est indispensable au traitement de toutes les maladies pulmonaires, aiguës ou chroniques, tuberculeuses ou non.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 30 francs.

SELOR N° 2.

Composition. — Est celle du SELOR N° 1, mais sans calmant de la toux.

Indications. — Outre le traitement des affections pulmonaires ne nécessitant pas l'emploi de calmant de la toux, les SELOR N° 2 sont employés efficacement dans le traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 28 francs.

Laboratoires des Produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 21-10.)

SELS DE BAINS R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés naturels de La Roche-Posay.

Indications. — Indispensable à toutes les peaux malades ou fragiles. Permet le lavage des lésions, en particulier, avant et après pansement. Enveloppements sédatifs.

Employés avec le « Savon dermique R. P. » écartent tout danger d'infection secondaire.

Mode d'emploi. — Un paquet pour un grand bain. 2 à 6 cachets dans l'eau bouillie à 40° pour bains locaux.

Pour les peaux simplement fragiles ou pour les bébés : 1 sachet pour une cuvette.

Toujours poudrer ensuite avec Poudre Dermique R. P.

Présentation et Prix :

Sels de bains R. P. de La Roche-Posay. Le paquet	5 fr.
— — — Boîte de 30 sachets.....	10 fr.
Savon Dermique R. P. Le pain	8 fr.
Poudre dermique R. P. La boîte.....	10 fr.

Laboratoires des **PRODUITS DERMIQUES R. P.**
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

Nature. — Sels de Lithine.

Action. — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

Indications. — Carbonate: rhumatisme, goutte. Benzoate: coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. Salicylate: rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. Glycérophosphate: diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie, possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. Bromhydrate: sédatif par le brome; par la Lithine, dissout l'acide urique et les urates alcalins. Citrate: diathèse rhumatismale.

Posologie et mode d'emploi. — Chaque flacon de sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

Prix : 18 francs.

LE PERDRIEL

11, rue Milton — PARIS (IX^e)

SELS INTAR

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Chlorure de Mg, Sulfate de Mg, Sulfate, phosphate, bicarbonate de Na, etc...

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des grandes fonctions organiques : Nutrition, Digestion, Sécrétion, etc.

Indications. — Rhumatismes, Obésité, Paresse intestinale.

Arthritisme et ses conséquences.

Asthénie, Dermatoses (eczéma, urticaire).

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau le matin à jeun ou le soir au coucher. Cette dose peut être augmentée suivant les indications du médecin.

Prix : 15 francs.

Laboratoire FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS.

SELS-MAGS

Composition. — Sulfate sec de magnésie, sulfate sec de soude, citrate monosodique, sel halogène du magnésium, phosphate de soude, etc.

Propriétés. — Favorise la sécrétion et l'excrétion de la bile, réalise le drainage des voies biliaires.

Indications. — Toutes congestions du foie et de la vésicule biliaire, jaunisse, cholécystite, angiocholécystite, dyspepsies, aérophagies, constipation, migraines, hypocondrie, vertiges, prurits, urticaire, langue sale, eczéma, etc.

Posologie et mode d'emploi. — 2 comprimés le matin dans un verre d'eau chaude ou dans 1/2 verre d'eau avant le repas de midi. La dose peut être augmentée ou diminuée suivant les prédispositions individuelles.

Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Une boîte comprimés effervescents : 18 francs.

Inscrit aux Assurances Sociales.

G. LESOURD, Pharmacien

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

SELUNIC

Sel de fruits. Sel de santé.

Composition. — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

Forme. — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

Propriétés. — Régulateur simple et efficace de la Santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

Indications et mode d'emploi. — **Maladies du foie et des intestins.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

N. B. — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

Estomac, impuretés du sang, maux de tête. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas

État bilieux, indigestion, excès de table. — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

Désaltérant et rafraîchissant. — Contre la soif, état févreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

Obésité. — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

Comme breuvage. — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité, et produit une boisson de table pétillante.

Présentation. — En flacons de 240 grammes : 15 francs.
Le modèle « Week-End » de 40 grammes : 5 francs.

SELUNIC, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 333-1.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges MIQUEL, pharmacien de 1^{re} classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. ; Inv. 16-85.)

SEL VIAL**(Achloruré)**

Débilité rénale.

Affections cardiaques.

Affections du Tube digestif.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

SENEÇONINE

Médication régulatrice, sédative, analgésique du cycle génital utéro-ovarien.

Composition :

Extrait fluide de Seneçon.
Extrait fluide de Viburnum.
Extrait fluide Piscidia.
Extrait fluide de Gui stabilisé.
Extrait fluide de Gelsémium.
Extrait fluide de Cimicifuga.
Alcoolature d'Anémone.

Présentation. — *Élixir de goût agréable. Atoxique. Sans analgésiques chimiques. Sans opothérapiques.*

Action thérapeutique. — **Calme les douleurs, régularise le flux menstruel, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux.**

Indications. — Troubles de la circulation utéro-ovarienne au cours de la vie génitale de la femme, à la puberté et à la ménopause.

Aménorrhées, dysménorrhées, règles déviées. Congestion, névralgies pelviennes, migraines cataméniales. Douleurs du post partum, Déséquilibre vaso-moteur de la ménopause (troubles extra-génitaux, troubles du système cardio-vasculaire, troubles psychiques, etc.).

Doses et mode d'emploi :

Médication régulatrice : 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau.

Commencer le traitement 10 jours avant la date présumée des règles.

Médication sédative : prendre, dès les premiers symptômes précurseurs de la période menstruelle, 1 à 6 cuillerées à café par jour à une heure d'intervallé.

Prix. Le flacon, dose pour 1 traitement : 15 fr.

Laboratoire A. BESNIER,
Ex-interne des Hôpitaux de Paris,

1, rue Raynouard — PARIS (XVI^e).

Tél. : Auteuil 20-34.

SEPTAZINE

(46 R. P.)

Benzyl-Amino-Benzène-Sulfamide.

Chimiothérapie antistreptococcique et anti-infectieuse, non colorante, bien tolérée par les voies digestives, non toxique.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 g. 50 divisibles en deux (tubes de 20.) Prix: 12 francs.

Indications. — Erysipèle, Angines, Otites, Prévention et traitement de la fièvre puerpérale, des complications de la Scarlatine, Grippe et complications, Colibacillooses.

Posologie :

Adultes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau 4 à 8 fois par jour.

Nourrissons : 2 comprimés par jour.

Grands enfants : 2 à 6 comprimés par jour.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SEPTICÉMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine, iodobenzo-méthylée cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — **Infections aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

Infections chirurgicales. — Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites Péritonite tuberculeuse.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Doses. — Septicémies à marche rapide : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

Chez l'enfant en lavement à garder, 4 cc. dans 100 gr. d'eau bouillie sucrée.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes. Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : Pulvérisations alvéolaires et gingivales. Injections intragingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Prix :

La boîte de 8 ampoules de 4 cc. : 23 francs ; de 10 cc. : 40 francs.

La boîte de 4 ampoules de 10 cc. : la boîte : 21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

SEPTISAN

Poudre Porphyrisée. Agréable au goût.

Forme et Composition. — Boîte cylindrique renfermant 130 grammes = 30 cuillerées à café de poudre blanche porphyrisée et desséchée dans le vide, en partie soluble dans l'eau, en partie en suspension homogène, agréable au goût, en dilution dans l'eau.

Prix : 16 fr pour 20 jours de traitement.

1 cuillerée à café de Septisan = $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ gr. de peroxyde de Mg} \left\langle \begin{array}{l} \text{O}^2 \text{ naissant.} \\ \text{MgCl}^2. \end{array} \right. \\ 1 \text{ gr. de SO}^4\text{Na}^2 \text{ desséché} \\ 0 \text{ gr. 50 de citrate de soude.} \\ 0 \text{ gr. 50 de phosphate de soude.} \\ 0 \text{ gr. 50 de lactose.} \end{array} \right.$

Posologie — Dix jours par mois, une cuillerée à café, le matin à jeun, ou demi-cuillerée à café, au début ou un peu avant les repas de midi et du soir, dans un verre d'eau, en agitant afin d'obtenir une suspension homogène. Doubler la dose dans certains cas.

Action. — Stimule et régularise le métabolisme de la nutrition. (Assimilation. Elimination.)

Propriétés. — Oxydant, Activant échanges. Brûlant déchets, Antisep-tique, Antitoxique, Antiputride, Laxatif rationnel et doux, Stimulant, Diurétique.

Laboratoires OPOS

60, rue Nationale, 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY
(Tél. : 3-10.)

SEPTOPLIX

(1162 F.)

*Paraminobenzène sulfamide.***Chimiothérapie antimicrobienne.***Traitement spécifique, préventif et curatif;
des streptococcies.***Présentation.** — Comprimés dosés à 0 gr. 50
(tube de 20).**Indications.** — *Toutes les infections, médicales, chirurgicales et obstétricales, à streptocoques, méningocoques, colibacilles, etc... et en particulier infection puerpérale (action préventive nette), méningites, érysipèle, grippe, septicémies, phlegmons, abcès, mastoïdites, infections urinaires, etc...**Pas de contre-indications.***Posologie.** — **Adultes :** à titre curatif,
dans une *infection moyenne*, 8 à 10 comprimés par jour ;
dans une *infection grave*, 10 à 15 comprimés par jour ;
à titre préventif, 4 à 8 comprimés par jour.**Enfants, nourrissons :**

de 5 à 12 ans, 2 à 4 comprimés par jour ;
de 1 à 5 ans, 2 à 3 comprimés par jour ;
au-dessous de 1 an, 1/2 à 2 comprimés par jour.

(Diviser, autant que possible, la dose journalière en 6 parts, à prendre toutes les 4 heures. Terminer par des doses décroissant progressivement, en 5 à 6 jours.)

Prix de vente au public : 11 francs le tube de 20 comprimés.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques**“ THÉRAPLIX ”**98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e). Tél.: Ségur 13-10.

SÉRÉNOL

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des troubles de l'hyper-tonicité nerveuse par déséquilibre neuro-végétatif.

Indications. — Emotivité. Etats anxieux. Insomnies. Neurasthénies. Migraines. Vertiges. Palpitations. Syndrome solaire. Certains prurits.

Composition. — A base de Phenyl-Ethyl-Malonylurée. — Teinture de Belladone. — Hexaméthylène-tétramine. — Peptones polyvalentes. — Extraits de Boldo, Cratægus, Passiflore, Anémone.

Formes. — Comprimés, Liquide et Suppositoires.

Mode d'emploi. — 1° **Liquide :**

a) *Calmant du système nerveux :* 1 cuillerée à café avant les repas de midi et du soir dans infusion ou eau sucrée.

b) *Hypnotique :* 1 cuillerée à café avant le repas du soir, une seconde au coucher et, si besoin, une troisième au cours de la nuit.

2° **Comprimés :**

a) *Calmant du système nerveux :* 2 comprimés avant les repas de midi et du soir avec infusion ou eau sucrée.

b) *Hypnotique :* 2 comprimés avant le repas du soir, 2 autres au coucher et, si besoin, un cinquième au cours de la nuit.

3° **Suppositoires :**

a) *Calmant du système nerveux :* 1 suppositoire le matin et 1 suppositoire le soir.

b) *Hypnotique :* 1 ou 2 suppositoires au coucher. Un troisième dans le courant de la nuit si nécessaire.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e). (Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

SÉRICRINE-REY

Complexe Endocrino-Sérique.

Médication Hormostimulatrice.

Anti-Hémorragique, Recalcifiante.

Présentation :

Deux formes : Ampoules buvables de 5 cc. pour *Adultes*.

Ampoules buvables de 3 cc. pour *Enfants*.

Composition : Sérum + Ext. Hépatique + Ext. splénique + Ext. médullaire + Ext. Surrénal + Ext. Hypophysaire + Nucl. Fer et Manganèse.

Indications thérapeutiques : Toutes anémies, quelle que soit leur origine. Toutes carences et déficiences de l'organisme. Convalescences de maladies aiguës ou infectieuses, états hémorragiques (pré-ventif et curatif), asthénies avec dépressions physique et nerveuse (neurasthénie, anémie cérébrale), accidents de la croissance et de la puberté, troubles de la calcification, bacilloles et états pré-tuberculeux.

Posologie. — *Adultes :* 2 ampoules Sericrine adultes par jour.

Adolescents : 1 ampoule Sericrine adultes par jour.

Enfants : de 7 à 15 ans : 2 ampoules Sericrine enfants par jour.

de 3 à 7 ans : 1 — — — — —

Aucune contre-indication. Absence totale d'accidents sériques.

Prix : Sericrine adultes : Boîte de 10 ampoules de 5 cc. : 25 francs.

Sericrine enfants : — — 10 — — de 3 cc. : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 302-6/1 et 302 6/2.

Laboratoires REY — DIJON. (Tél. 22-12.)

SÉRIFER

Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.

Composition. — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

Indications. — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

Forme. — Délicieux granulé chocolaté.

Posologie :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 18 francs.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON & Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

SÉROBIOL

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc.

Formule. — Extraits de foie, rate. Acide phosphorique. Nucléinate de manganèse. Phosphate acide de sodium, Vitamine B tirée des levures. Sérum de cheval. Sérum de mouton.

Indications. — Carence, déficiences organiques, anémies, pré tuberculose, convalescences.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule matin et soir aux repas, dans un peu de liquide.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-8.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

SÉROCALCINE

Composition. — Poudre d'os frais, vitamines A (carotène) et D, rigoureusement titrées en unités biologiques antirachitiques, phosphatides cérébraux, extraits parathyroïdiens totaux, chlorophylle pure à pouvoir phyto-sensibilisateur extrême.

Propriétés. — Régulateur rapide du métabolisme calcique, reminéralisant, recalcifiant, activant de l'uréogénie, anti-toxique.

Indications. — Hypo-calcémie et hypo-phosphaturie, retards de croissance ou d'ossification, dystrophie osseuse, rachitisme, fractures, ulcères gastriques, cataracte post-opératoire.

Présentation { 25 francs la boîte de 25 cachets.
et prix : { 25 — — — de granulés.

Posologie. — Un cachet midi et soir au moment du repas ou 3 cuillerées à café de granulés par jour.

Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

SÉRO-COMPRIMÉS I. M.

Etuis de 40 et 100 comprimés de Sérums des-séchés.

Prophylaxie des affections de la gorge : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement local des angines courantes, pharyngites, porteurs de germes, etc. : 1 à 2 comprimés toutes les heures et le soir au coucher.

SÉROLACTYL

(Autopulvérisable) I. M.

En pulvérisateurs de 5 gr. de sérums des-séchés, lactosés.

Prophylaxie des affections rhino-pharyngées : 2 pulvérisations par jour.

Traitement local des rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, Coryzas tenaces, etc... : 4 à 5 pulvérisations par jour.

SÉRO-LIQUIDE I. M.

En flacons de 30 gr. de sérums liquides, gly-cérinés.

Prophylaxie des affections oto-rhino-pharyngées : 2 instillations ou pulvérisations par jour.

Traitement local des otites, sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, etc... : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

N. B. — Dans la diphtérie, les injections de sérum constituant la base du traitement, n'employer ces trois produits qu'à titre complémentaire (prévention et convalescence).

Durée d'utilisation des 3 produits : 10 années.

**Laboratoires des PRODUITS
BIOLOGIQUES I. M.**

S. SAVIGNEUX, pharmacien.
18, cours Suchet. — LYON.

SÉRODAUSSE ANTITOXISENYL

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose mensuelle de 3 ampoules, prises à raison d'une ampoule tous les deux jours, est suffisante.

SÉRODAUSSE OVARIEN

(Sérum activé de génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse Antitoxisenyl.

SÉRODAUSSE INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

SÉROGLOBINE

Dynamogène complet.

Composition :

Sérum musculaire de cheval..	3 gr.
Extrait hémopoiétique de foie frais de veau.....	0,30
Arrhénal	0,04
Hypophosphite de sodium	0,30
Glycérophosphate de magné- sium à 50 p. 100	0,30
Chlorure de manganèse.....	0,10
Ecorce de Quinquina.....	0,60
Noix de Kola.....	1 gr.
Véhicule délicieux au Rancio des Papes. Q. S. pour	100 gr.

(Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 440-14.)

Posologie :

Un verre à liqueur à chaque repas pour les adultes. Demi-dose pour les enfants à partir de 10 ans.

Action :

Dynamogène complet, agit comme exciteur de défense organique par son sérum musculaire, comme antitoxique, hémato-poiétique par son extrait de foie, et comme anti-anémique par son arrhéno-manganèse.

Indications :

Toutes les carences organiques, Toutes les anémies, Amaigrissement, Epuisement, Anorexie, Tuberculose, Convalescence, Déphosphorisation.

Prix :

20 francs la bouteille de 500 grammes, pour un traitement de 10 jours.

Laboratoires AUBÉRY
AVIGNON (Vaucluse).

SÉROMA REY

Sérum granulé, Activé, normal

Composition :

100 grammes de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés.....	90 gr. 90
Calcium	0 gr. 05
Fer	0 gr. 30
Manganèse	0 gr. 15

Indications. — Surmenages, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Prix : 20 francs le flacon.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-3.

Laboratoires REY

DIJON (Tél. : 22-12).

Séroma contient près de son poids de sérum activé.

SÉRO-NEUROPSYCHIQUE

Ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — Préparation tonique et reconstituante injectable. Contre tous les cas d'anémie, dépression nerveuse, surmenage physique intellectuel, neurasthénie.

Forme. — Ampoules injectables.

Mode d'emploi — 1 ampoule par jour.

Formule. — Glycérophosphates composés, Cacodylate de Manganèse.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-32.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

SÉRO-VACCIN ANTIPYOGÈNE

De Leclainche et Vallée pour applications locales.

Le complexe Séro-Vaccin (*Sérum polyvalent de Leclainche et Vallée*) associé au *Sérum équín normal* (Hémostyl) et aux *Antivirus* représente la médication de choix, pour le traitement local, dans toutes les *Infections pyogènes*.

Deux présentations :

1° *Microgel* (Séro-Vaccin Antipyogène gélifié de Leclainche et Vallée), en tubes de 50 grammes : Prix : 15 francs, le tube.

2° *Séro-Vaccin* Antipyogène liquide de Leclainche et Vallée, en boîtes de 10 ampoules de 5 cc. Prix : 15 francs, la boîte.

Indications. — Toutes les plaies, toutes les suppurations : abcès, furoncles, pyodermites, brûlures, ulcères, etc...

Mode d'emploi. — *En pansements exclusivement.* Suivant les cas, appliquer sur la partie malade une compresse imbibée de Séro-Vaccin liquide ou étendre une mince couche de Microgel. Recouvrir d'une compresse ordinaire stérile et appliquer un pansement de protection.

Observation importante. — L'usage d'un antiseptique avant l'application locale du Microgel ou du Séro-Vaccin liquide est formellement contre-indiqué. Si un lavage est nécessaire utiliser l'eau bouillie ou le Sérum physiologique.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 68-24).

SÉROXÉMA

Complexe séro-opothérapique ; traitement par voie buccale.

Composition. — Sérum de jeunes taureaux, activé par transfusion ; organes opothérapiques sélectionnés (dessiccation sous vide à basse température).

Indications. — *Dermatoses d'origine endocrinienne et tous phénomènes d'ordre anaphylactique.*

Prurits (même généralisé) ; *Eczémas* secs, suintants, squameux, *Eczématides*, *Herpès*, *Herpès* des muqueuses, *Urticaires*, *Dartres*, *Intertrigo*, certains *Psoriasis*, *Acné*, *Prurigo*, *Erythèmes* des enfants, *Lichen*, *Maladie de Quinck*, *Asthmes*, *Aérophagie*.

Présentation. — Flacons de 60 dragées.

Un flacon suffit dans les cas bénins. Les affections anciennes exigent un traitement plus prolongé. (Intervalle de 20 jours entre chaque cure).

Doses moyennes. — De 1 à 2 ans, 2 dragées par jour fondues dans le lait ; 2 à 5 ans, 3 dragées par jour fondues dans le lait ; 5 à 10 ans, 4 dragées par jour ; 10 à 16 ans, 5 dragées par jour *Adultes* : 6 dragées par jour en 3 fois le matin à jeun et avant les deux principaux repas.

Laboratoire DU SÉROXÉMA

G. BARTHET, Pharmacien,

1, rue de Phalsbourg — PARIS (XVII°).

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales, stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 22 francs.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes

Prix : 16 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

SÉRUM ANTITYPHOÏDIQUE

du Professeur Rodet.

Sérum de chevaux immunisés.

Actif contre le bacille d'Eberth et le Para A.

Partiellement contre le Para B.

Documentation. — Communication Académie de Médecine (9 mars 1915, 4 juillet 1915, 3 juin 1919).

Journal de Médecine de Lyon (5 novembre 1925).

Pas de contre-indications, il n'y a que des conditions de moindre efficacité.

La gravité n'est pas une contre-indication, au contraire. Commencer le traitement dès que le diagnostic est posé ou même seulement probable.

Posologie. — Pour la conduite du traitement, suivre avec soin les indications données sur l'imprimé joint aux ampoules.

Le traitement normal correspond à une série de trois ampoules 20 cc., puis 15 cc., puis 10 cc.

Le traitement normal comprend une série de 3 ampoules.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

SÉRUM DE JOUSSET

Sérum antibacillaire.

Sérum de chevaux immunisés contre les toxines du bacille de Koch. Combat l'infection non les lésions. Traitement de choix des primo-infections (s'aider pour le diagnostic de la cuti-réaction) : nuisible dans la tuberculose devenue phtisie. Convient surtout aux enfants : Typhobacillose, Pleurésie séro-fibrineuse, Pleuro-péritonite des jeunes, Polyarthrite tuberculeuse aiguë, Hémoptysie, Splénopneumonie tuberculeuse, etc...

Si après une semaine d'observation la température reste régulière ou peu oscillante, aborder la sérothérapie.

Contre-indications. — Température irrégulière (oscillation atteignant 3°). Asthmatiques, Emphysémateux.

Posologie. — Injections hypodermiques, face antérieure de la cuisse 3 à 6 cc. par kg. de poids du sujet, répartis en 3 injections à 2 jours d'intervalle ou lavements quotidiens à conserver, inoffensifs, de 2 à 3 cc. par kg. pendant 6 à 8 jours, le soir.

Fortes doses salicylates, si arthralgies 12^e jour.

La boîte de 1 flacon de 20 cc. Prix 35 fr.

La boîte de 2 flacons de 20 cc. Prix 68 fr.

Demandez notice explicative aux Dépositaires généraux.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

SÉRUM OLIVIÉRO

Equisélerine.

Sérum normal de cheval, créé en 1906.

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consomptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brûlures*.

Ampoules buvales de 10 cc., 1 par jour; de 2 cc. 2 à 4 par jour. Peuvent s'employer en pansements. Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

Prix amp. de 10 cc. la boîte : 20 francs.

— 2 cc. — 18 —

Comprimés. — Capsules. — Prix : 18 francs.

Sérum desséché pour pansements. Prix : 12 francs.

Laboratoire OLIVIÉRO
BOULOGNE-SUR-SEINE
Tél. : Molitor 27-06.

SÉRUM POLYVALENT

de Leclainche et Vallée,

Provient de chevaux solidement immunisés contre les variétés les plus multiples et les plus virulentes des germes capables de produire la suppuration des plaies et les grandes septicémies courantes : streptocoque, staphylocoque, colibacille, pyocyanique, etc...

Indications et mode d'emploi :

Sérothérapie interne, voie intramusculaire, intraveineuse sous-cutanée, rectale : Septicémies et Pyoémies.

Posologie :

Dose d'attaque : 1^{er} jour : 80 cc. ; 2^e jour : 80 cc. ; 3^e jour : 60 cc.

Dose d'entretien : 30 cc.

En injection intramusculaire. Dans les cas très graves recourir à la voie intraveineuse.

Présentation :

Sérum injectable : Boîte de 2 ampoules de 10 cc.

Prix : 25 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

SÉRUMS CLIN

Les sérums thérapeutiques Clin, antimicrobiens et antitoxiques, sont purifiés par *électro-osmose*, procédé n'altérant en rien leur efficacité et leur conférant les avantages suivants : disparition ou diminution des accidents de choc et des accidents sériques, très grande stabilité et très longue conservation. S'emploient en injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, ou localement.

SÉRUM CLIN ANTICOLIBACILLAIRE

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Indications. — Toutes les infections à colibacilles ou à association colibacillaire : Colibacillooses, pyélonéphrites, appendicite aiguë et ses complications, péritonites (avec le sérum antigangréneux), fièvre urinaire, périostite.

Doses. — Variables suivant le degré d'infection (de 10 à 60 cc. par jour pendant 4 à 5 jours).

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Ce sérum existe également sous forme *non purifiée*, pour l'administration par voie buccale.

SÉRUM CLIN ANTIDIPHTÉRIQUE

Sérum antitoxique et antimicrobien purifié. Sérum concentré en unités antitoxiques, mais d'une teneur normale en protéides. Hyperimmunisation des chevaux à l'aide de toxine diphtérique et de corps microbiens provenant de diphtéries graves et malignes récentes.

Formes. — Délivré en ampoules de 10 cc., sous deux concentrations :
1° Ampoules de 10 cc. à 1.000 U. A. par cc., soit 10.000 U. A. par ampoule.

2° Ampoules de 10 cc. à 500 U. A. par cc., soit 5.000 U. A. par ampoule.

3° Ampoules de 2 cc. à 1.000 U. A. par ampoule, en boîte de 2 ampoules pour usage préventif.

Posologie. — Se référer à notices plus détaillées.

SÉRUM CLIN ANTIGANGRENEUX

(Préparé d'après la méthode de H. VINCENT et G. STODEL.)

Sérum antigangréneux multivalent.

Indications. — Gangrène gazeuse, phlegmons, abcès gazeux, traumatisme avec gros délabrement musculaire, fractures ouvertes, appendicites graves, péritonite, gangrène pulmonaire, diabétique, etc...

Doses. — Préventives : 10 à 20 cc. ; curatives : 20, 30, 40 cc.

SÉRUM CLIN ANTISTREPTOCOCCIQUE MULTIVALENT

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Sérum équin hyperimmunisé contre les diverses races sélectionnées de streptocoques variés et très virulents.

Indications. — Toutes les infections graves, locales ou générales et septicémies à streptocoques.

Doses. — Variables suivant la gravité de l'infection, de 20 à 100 cc. (par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

Agir vite, suffisamment longtemps.

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SÉRUM-VÉGÉTAL

Du docteur Cuguillère.

Composition. — Le sérum-végétal du docteur Cuguillère à base d'essences d'ail rendues indolores par un procédé spécial ne présente aucune toxicité sur l'organisme, tout en possédant un pouvoir bactéricide très puissant contre le bacille de Koch.

Il renferme en outre de la *myrrhe* lui conférant des propriétés balsamiques remarquables et des sels de chaux à l'état naturel dans les végétaux et de ce fait entièrement assimilables.

Références scientifiques. — Le sérum a été expérimenté au Château Savignac, à Saint-Denis-de-Piles (Gironde), sous le haut patronage de M. le Marquis de Castellane.

Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'éminent vétérinaire M. Faure ; c'est à l'hôpital Bichat que le célèbre anatomo-pathologiste le docteur H. Martin-Roux reconnaît ces guérisons sur les pièces examinées.

L'Académie de Médecine reçoit en séance publique du 10 mars 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum-végétal du docteur Cuguillère.

Depuis, le sérum est employé avec le plus grand succès et il recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

Indications. — Le Sérum-Végétal du docteur Cuguillère est le traitement de choix et quasi spécifique des tuberculoses osseuses et ganglionnaires. Il guérit souvent en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott remontant à plusieurs années et même compliqués de mauvais état général et de fistulisations. Il donne également des résultats remarquables dans toutes les formes de tuberculoses.

Untraitement de trois mois à raison d'une à deux injections de 5 cc. par semaine, hypodermiques profondes (*adultes*), et d'une cuillerée à potage de sirop iodotannique associé à del'arrhénal (et surspécification « vitaminé » sur l'ordonnance, à 4 000 unités internationales, *pro die*), est suivi :

Cliniquement : par une amélioration de tous les signes stéthoscopiques et une reprise de l'état général.

Radiologiquement : par une régression des images pathologiques.

Bactériologiquement : par la diminution des B.K. par champ.

Chimiquement : par l'élévation du cholestérol et de la courbe de séroflocculation de Vernes.

Hématologiquement : par une amélioration très rapide de la formule sanguine.

Echantillons permettant un essai loyal et littérature ouvrage édité par la Lib. Norbert-Maloine de Paris, in-8, 140 p. : *Traitement phytothérapique de la Tuberculose.*

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

du D^r Cuguillère.

Docteur en médecine, Ancien externe des Hôpitaux, pharmacien de la Faculté de Paris, membre de la Société Botanique de France

19, rue des Chalets — TOULOUSE.

SERVO-FREINYL

Médicament type de la spasmodie
et des états spasmodiques.

Propriétés Thérapeutiques. — 1^o Action sédatrice purement symptomatique par la *phényléthylmalonylurée*. 2^o Modificateur humoral par les *borotartrates* et les ions *calciques* et *magnésiens*. 3^o Régulateur endocrinien par la *parathyroïdine* et de carence par la *vitamine D*.

Indications. — Chez l'enfant : manifestations du terrain tétanique. — Etats convulsifs. — Tics. — Etats choréiques du terrain comitial. — Troubles du caractère. — Instabilité. — Spasmes du pylore. — Toutes les manifestations spasmodiques.

Chez l'adulte : Crises comitiales et équivalents. Névroses cardiaques. — Agitations. — Troubles du sommeil. Tous les états spasmodiques.

Présentation. — Granulé d'un goût très agréable.

Formule.

Borotartrate de magnésie.....	0,35
Borotartrate de calcium.....	0,35
Carbonate de calcium.....	0,25.
Phényléthylmalonylurée.....	0,015.
Parathyroïdine.....	1/2 mm.
Ergostérine irradiée.....	500 U. I.
Extrait de piscidia.....	0,05 par cuillerée à café.

Posologie. — *Enfants*..... 3 cuillerées à café.
Adolescents..... 2 cuillerées à dessert.
Adultes..... 3 cuillerées à dessert.

(Doses moyennes que le médecin adapte à chaque cas particulier.)
 La boîte : 20 francs. — Durée moyenne : 10 jours.

Dépôt chez tous les grossistes.

Laboratoire **INNERVA**.

52, rue de Cambrai. LILLE.

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

SÉTI

Ampoules jumelées de Soufre et d'Iode
en milieu magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Les ampoules jumelées SETI permettent d'injecter une solution aqueuse magnésienne de Soufre et d'Iode ; c'est l'application de la méthode de Sulfoiodothérapie préconisée par André LERI et DEDET pour lutter contre le Rhumatisme chronique et ses complications — pratique, efficace et sans danger.

Indications. — Rhumatismes Chroniques. Arthrites. Névralgies rebelles. Périphlébites. Asthme.

Mode d'emploi. — Le médecin dans une seringue de 5 cc. aspirera 2 cc. de chacune des solutions, il agitera le liquide jusqu'à décoloration. Il fera l'injection intramusculaire profonde de la solution incolore obtenue en suivant très exactement la technique indiquée par A. LERI et DEDET. Le SETI s'injecte aussi par voie intraveineuse.

Laboratoires **BRISSON**

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,
 Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
 157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e)
 (Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

SICOVAIRE

Indications. — Troubles de la puberté ou de la ménopause chirurgicale ou naturelle. Aménorrhées, dysménorrhées.

Agit dans tous les cas de déficience ovarienne, avec insuffisance ou excès de folliculine.

Composition. — Extrait total d'ovaire, non désalbuminé, non délipoidé.

Forme. — Ampoules buvables.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 15 fr. 80.

La boîte de 18 ampoules : 45 fr.

Posologie. — Une ampoule par jour avant le repas dans de l'eau sucrée, après les règles, ou la période présumée des règles s'il y a absence de règles.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharmacien

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

Tél. : Wagram 75-75.

SIDÉRANYL

Spasmolytique Magnésien

(Borotartrate de Magnésium).

Propriétés Thérapeutiques. — Le type de la médication à la fois sédative et stimulante, respectant intégralement les fonctions mentales. — Sédatif cortical par le borotartrate. — Spasmolytique par l'action inhibitrice du magnésium sur la fibre musculaire lisse. — Vitalisant, cytophyllactique et excito-sécrétoire par le même magnésium.

Indications. — Médication de choix des troubles nerveux, relevant à la fois de l'asthénie et de l'hyperesthésie par carence magnésienne. États dépressifs avec irritabilité. — Emotivité, états choréiformes. Tics. — Relâchement mental, rêvasserie, somnolence, inattention. Léiasthénie viscérale (ptoses avec spasmes). Agitations. Instabilité.

Et surtout : paraépilepsie, crises nerveuses fonctionnelles

Présentation. — Solution pour Adultes et Enfants, 15 p. 100 : 20 fr.
Sirop pour Nourrissons, 6 p. 100 : 12 fr. 50.

(Durée moyenne : 10 jours)

Formule. — Borotartrate de Magnésie.

Posologie. — Solution : Adultes..... 2 à 3 cuillerées à soupe
Adolescents..... 2 à 3 — à dessert
Enfants..... 1 à 2 — —

Matin, Midi, Après-Midi.

Sirop Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

En dépôt chez tous les grossistes.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien, 52, rue de Cambrai. — LILLE.

Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pom-
mier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Prix : 15 francs.

Laboratoires G. RÉAUBOURG

115, rue de Paris

BOULOGNE-SUR-SEINE.

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des *états artérioscléreux*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, *P. M.* 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffer et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^{\circ} \text{O}^{12} \text{Na}^8$ et K^2 stables solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p. 100 de SiO_2 , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMES : Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse ; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma, Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minéralo-tissulaire : Bacillose, Consolidation accélérée des fractures. Surdité (Ionisation). Etats élastopatiques.

2° Artériosclérose, Hypertension, Aortite, Athérome aortique, Sclérose rénale, Angine de poitrine, Endartérite oblitérante progressive. Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale, Troubles cérébraux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scléreuse, Sclérose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Sclérose cardiaque, Anémie siliceuse.

Gouttes : 32 cc. 20 fr. — Ampoules : (5 cc. \times 6) 16 fr. —

Comprimés : (50 comp.) 18 fr.

Dépôt, Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Echantillons — Littérature.

Laboratoire CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(Tél. : Gobelins 00-70.)

SILIGONE

Hypotenseur Antisléreux.

Médication Silico-Phytothérapique.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour, 15 à 20 jours par mois, de préférence à jeun et un bon moment avant les repas.

Composition. — Silicate sodique, Ballote, Yohimbine (000066 par comp.), anémone pulsatile.

Action. — Abaisse la tension, régularise la circulation, dilate les artérioles, diminue la viscosité sanguine, s'oppose au processus sclérosant.

Indications. — Hypertension quelle qu'en soit la cause, angiospasmés, artério-sclérose, athérome, vertiges, sclérose rénale et auriculaire, angine de poitrine etc...

Prix. — L'étui de 50 comprimés : 18 francs.

Laboratoire E. BACHELARD

CHALETTE (Loiret).

SILIPLASTINE

Composition. — Pâte à l'eau à base de silice colloïdale, oxyde de titane, oxyde de zinc, talc.

Indications. — Les dermatoses suintantes. — les dermites irritatives — toutes les lésions que les pommades grasses « échauffent ».

Avantages. — La Siliplastine, très agréable à appliquer, est parfaitement blanche. Elle ne graisse pas et ne tache pas le linge; elle s'enlève facilement à l'eau tiède (bouillie).

Présentation : { Le tube..... 12 francs.
 { Le demi-tube.. 7 —

Laboratoires du Docteur DEBAT
60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).
Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40.

Benzoate de lithine : 0 gr. 10.

Dosé. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antiscléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-sclérose. Aortites. Angine de poitrine, Athérome.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

SINAHIN

Antidiabétique.

Forme. — Pilules de Semen-contrà total.

Propriétés :

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne
(Communication Académie de Médecine, décembre 1913).

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Prix de vente au public. La boîte, 12 francs.

Laboratoire CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er}).
(Tél. : Opéra 43-79.)

SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.
Le moins cher.

Mode d'action. — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

Prix de la boîte de 3 sinaplasmes doubles :
5 fr. 50.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} Classe
AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

SINAPOL

Pommade révulsive aux essences (en tubes).

Composition. — Essence de Sinapis Nigra, Teinture d'euphorbia resinifera, Eucalyptol, Goménol, Gaïacol, Menthol.

Indications. — Toutes celles des cataplasmes et enveloppements sinapisés, des sinapismes ou autres applications révulsives. Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires, douleurs, rhumatismes, névralgies, etc...

Posologie. — SINAPOL, 1 tube, étendre en onction *très légère*, puis recouvrir de coton cardé ou flanelle. Pour les épidermes spécialement sensibles, étendre au préalable une petite couche de vaseline, puis faire l'application de SINAPOL comme il est dit plus haut.

Prix : 12 francs.

Laboratoires DEODAX

R. RENAUD ❄ ❄

ANOULD (Vosges).

SINUSYL

Indications. — Toutes désinfections nasales. Sinusites, Coryza, Rhinites, Ozène, Rhume des foins.

Composition. — Résorcine, Camphre, Myrtol, Essence de violettes, Excipient huileux.

Forme et mode d'emploi. — Se fait :
En *huile* pour instillations nasales.
En *huile éphédrinée* à 2 p. 100, en pulvérisations.
En *pommade* dans un tube spécial ;
En *rhino-capsules* pour auto-instillations.
Employer également en période d'épidémie.

Laboratoires Pierre CHATEAU

33, rue du Bois — VINCENNES (Seine).
(Tél. : Daumesnil 25-30.)

SIPHURYL

(Orthosiphon Longuet).

Composition. — Extrait d'Orthosiphon Stamineus, en *gouttes aromatisées* (LX gouttes = 0,50 extrait sec) ou *comprimés* (1 comp. = 0,25 ext. sec).

Remplacelatisane impraticque et peu agréable.

Indications. — Diurétique hépato-rénal, sans aucune contre-indication.

Eliminateur d'eau, urée, acide urique et chlorures, Oligurie, Arthritisme, Lithiase rénale, obésité.

Doses :

LX gouttes dans 1/2 verre d'eau, 3 fois par jour ou 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS.
(Tél. : Roquette 21-95.)

SIROP BERTHE

Composition. — A base de codéine, 15 milligrammes de codéine par cuillerée à soupe de 20 grammes de sirop ; 11 milligrammes environ par cuillerée à entremets, 4 milligrammes par cuillerée à café.

Indications. — Préparation d'un goût agréable qui s'emploie contre les rhumes et les autres affections des voies respiratoires, maladies nerveuses, souffrance et insomnie dues à une maladie quelconque.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe, 1 à 6 cuillerées à café.

Enfants au-dessous de 3 ans, on prépare une petite potion en additionnant une cuillerée à café de sirop Berthé de deux cuillerées à soupe d'eau. On donne dans les 24 heures autant de cuillerées à café de cette potion à l'enfant que cela est nécessaire pour le calmer.

Enfants au-dessus de 3 ans, une 1/2 cuillerée à café par année d'âge.

Prix : le flacon 13 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUE

78, faubourg Saint-Denis. — PARIS.

(Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

SIROP BRAHMA

Composition. — Thiocolum, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane. Pour 4 à 5 jours de traitement.

Laboratoires G. COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

Tél. : 0-21.

SIROP CASSIBOR

Sirop à base de teinture d'aconit, substances pectorales, séné, cassis et borate de soude.

Goût agréable, ne fatigue pas l'organisme, ne constipe pas.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à café par année d'âge.

Indications. — Prescrit contre rhumes, angines, bronchites, gripes et névralgies. C'est le sirop type pour les enfants.

On l'emploie également après les opérations chirurgicales chez les malades enrhumés.

Le flacon : Prix : 13 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

Composition. — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

Avantages. — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

Indications. — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DE GAÏARSOL

Composition. — Méthylarsinate de Gaïacol.

Indications. — Calme immédiatement la toux, Désinfecte les voies respiratoires, Stimule la résistance organique. Tolérance absolue, assimilation parfaite.

La toux, les affections pulmonaires, les complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses.

Forme. — Sirop.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillerée, ou fraction de cuillerée à café.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

Au Gaïacol de synthèse cristallisé
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de potasse.

Composition. — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

Avantages et Propriétés thérapeutiques. — Ce sirop possède le mérite de ne pouvoir être antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

Indications. — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr. ; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Prix : le flacon 12 francs.

Dépôt : **Laboratoires H. NOGUÈS**
7, rue Galvani — PARIS.

SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SIROP D'EUCALYPTINE

Antiseptique pulmonaire, Calmant de la toux, Orexique, Phagocytoène.

Composition :

Essence déterpénée d'Eucalyptus	0,025
Phénolsulfonate de Sodium	0,15
Camphosulfonate de Sodium.....	0,25
Gaïacolsulfonate de Potassium	2,50
Codéine	0,10
Bromoforme	0,10
Teinture de Belladone et Aconit	0,50
Pour 100 grammes.	

Indications. — Toutes pneumopathies aiguës ou chroniques, gripes et complications pulmonaires, broncho-pneumonie, bronchite, coqueluche trachéo-bronchique, toux spasmodique, d'irritation ou catarrhales.

Posologie :

Adultes : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants : 2 à 4 cuillères à café ou à dessert selon l'âge.

Laboratoire LE BRUN

155, boulevard Magenta — PARIS (IX^e).

SIROP DU DOCTEUR CANAC

Formule :

Essence pure de Térébenthine	5 gr.
Essence pure de Cypres.....	2 —
Sirop simple.....	Q. S. pour 150 —

Bien agiter avant l'emploi.

Les Docteurs Germain See et Trousseau ont préconisé la Térébenthine pour son action dans les catarrhes chroniques de la vessie et des poumons. Rossbach a observé que l'inspiration d'air térébenthiné diminue la sécrétion bronchique. L'essence de térébenthine diminue l'excitabilité des appareils respiratoire et circulatoire et abaisse la température. C'est un puissant décongestionnant des glandes sécrétrices.

Indications. — Bronchites aiguës ou chroniques, Catarrhe des vieillards et des Mineurs (régions minières), Spécifique de la COQUELUCHE.

En traitement combiné avec les gouttes Géha pour la guérison rapide de la coqueluche.

Présentation. — Sirop en flacon de 150 cc. : 12 francs au public.
— — 310 cc. : 20 francs —

Mode d'emploi et doses :

Enfants : de 1 mois à 2 ans : 3 à 5 demi-cuillerées à café par jour ; de 2 à 7 ans : 5 à 8 cuill. à café ; au-dessus de 7 ans : 4 à 6 cuill. à dessert.

Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire Médical « GEHA »

à PORT-DE-BOUC, près Marseille (B.-du-R.). (Tél. : 30.)

SIROP DUBOIS au CRÉOSAL

Composition. — Le Créosal réunit dans sa composition le Galacol, l'Acide Phosphorique et le Calcium, que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications. — Récalcifiant puissant. Accélérateur de la Nutrition. Sédatif de la toux quelle qu'en soit l'origine. L'emploi du SIROP DUBOIS au CRÉOSAL est tout spécialement indiqué au début et au cours des gripes, bronchites, affections pulmonaires.

Formes. — Sirop de goût très agréable malgré haute teneur en principes actifs.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (de 10 à 15 ans) : 2 à 4 cuillerées à café.

Le SIROP DUBOIS au CRÉOSAL se prend de préférence dans une infusion ou de l'eau très chaude, à distance des repas.

Durée moyenne des unités de vente : de 5 à 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon : 12 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

Posologie :

Par cuillerée à soupe :

Kbr..... 1 gr. 50

Chloral cristallisé 1 gramme.

Arsenic 1 milligr.

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

Littérature et Échantillons sur demande :

Prix : le flacon : 16 fr. 50

Laboratoires J. MOUSNIER-DELERME

Nouvelle adresse :

28, rue Velpeau — ANTONY (Seine).

(Tél. : 225.)

SIROP ÉFRYL

à base d'Éphédrine et de Codéthyline.

Action. — Sédation constante de la toux, de la dyspnée. Diminution rapide de la congestion des organes respiratoires.

Action particulière de l'Éphédrine sur le système nerveux sympathique (ramifications des bronches) : suppression du spasme bronchique, excitation du centre respiratoire, diminution du travail du cœur par une élévation légère de la pression sanguine.

Indications. — *Toux en général.* Rhumes, Trachéites, Laryngites. Bronchites aiguës et chroniques, Complications pulmonaires de la grippe, *Emphysème, Asthme, Rhume des foins, Coqueluche.*

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour.
Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour
(au-dessus de 2 ans).

A prendre 1/2 heure avant les repas, ou 2 heures après.

Eviter de donner le Sirop ÉFRYL immédiatement avant le coucher

Prix de vente au public : 13 fr. 50 (flacon de 150 cc.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
« THÉRAPLIX »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SIROP GÉRAUDEL

Pectoral à l'Éphédrine.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 223-7.

Ephédrine chlorhydrate	...	0 gr. 07
Sirop de capillaire	50 grammes
Teinture de vanille	IX gouttes.
Teinture de safran	IX gouttes.
Sirop de tolu	Q. S. pour 100 grammes.

Toux. Asthme. Emphysème.

Une cuillerée à soupe matin et soir. Cette dose n'est pas limitative. Elle peut être répétée dans la journée et dans la nuit.

En cas de crise prolongée, de demi-heure en demi-heure une cuillerée à café.

Prix, le flacon de 270 grammes : 13 francs.

Laboratoire GÉRAUDEL

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-36.)

SIROP GIRARD

Iodo-tannique.

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique, reconstituant, reminéralisateur, dépuratif.

Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

Indications :

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

Prix : 14 fr. 75.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-3.

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada « *Prunus virginianus* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 9 francs.

PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 francs.

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 7 francs.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

SIROP HERCELL

Composition :

Bi-iodure d'Hg	0,005
KI.....	0,25
Extrait végétal de Larrey.....	0,20
Par cuillerée à soupe.	

Forme. — Sirop stabilisé.

Indications. — Toute la thérapeutique par l'Hg. dissimulé.

Médicament d'entretien. Tonique et dépuratif bi-iodé.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : par cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 18 francs le flacon de 310 cc.

Durée du flacon : dix jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle, sous le n° 1356-1.

G. MAHÉ, Pharmacien.

85, rue de Trignac

SAINT-NAZAIRE-PENHOET (L.-I.) — Tél. : 115.

SIROP IODOCALCIUM

La forme moderne du sirop iodotannique.

Association iocalcique assimilable.

Composition :

Gluconate de calcium.....	0 gr. 10
Chlorure de calcium.....	0 gr. 10
Iode en combinaison organique.	0 gr. 01

Par cuillerée à café.

Indications. — Toutes celles de l'iode et de la chaux. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, lymphatisme, pré-tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

Posologie :

Enfants : au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café, 2 fois par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert, 2 fois par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.
19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

SIROP LAXATIF GOBEY

Ses principes actifs, exclusivement végétaux, sont incorporés à un sirop à base de suc de fruits.

Action douce et constante, saveur agréable. Convient aux enfants et aux vieillards, aux opérés et pendant la grossesse.

Prix : 11 fr. 75.

Il existe également des dragées laxatives Gobey.

Flacon de 50 dragées : 8 fr. 50.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

SIROP LECŒUR

Rhus aromatica, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Acide phosphorique ; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques. Contre l'incontinence d'urine.

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

De 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café le 1^{er} et le 2^e soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

De 5 à 10 ans : 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

Plus de 10 ans : 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

Adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

Prix : 14 francs.

Laboratoires GAVIN, *.
VIMOUTIERS (Orne).

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris.

Indications thérapeutiques. — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans : 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Prix : 12 francs. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Admis aux Assurances Sociales.

Voir : « **SUFROL** » **CROSNIER**.

Comprimés ayant les indications du sirop.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

SIROP MIREILLE

Le plus agréable au goût, le plus actif pour le traitement polyvalent des affections de l'appareil respiratoire.

Calmant, sédatif de la toux, hypnotique, balsamique, antiseptique, diurétique, expectorant, émollient, sudorifique, à base de bromhydrate de codéine, terpène, aconit, belladone, benzoate de soude, etc...

Se prend à toute heure, aucune contre-indication, pas de toxicité, pas d'intolérance, pas d'accoutumance.

Prix au public : 13 fr. 80.

Laboratoires LEGENDRE et Cie

Section DS. — HOUILLES (S.-et-O.).

Avec Dépôts Généraux pour la vente en gros :
France et Colonies :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique :

M. RAMLOT

72, rue de l'Escaut — BRUXELLES-MARITIME

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 1045-2.

SIROP MORLAS

Pour nouveau-nés et enfants.

Iodo-lactate de Hg : 0,001. Fowler 1/10 mgr. par cuillère à café.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, hérédosyphilis, etc.).

Doses :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

35 cuillers à café par flacon.

Échantillons sur demande.

Prix : 15 francs.

L'*Elixir Morlas* est exclusivement réservé aux adultes.

Laboratoire MOURÉ

COTARD, Pharmacien,

Passage des Princes — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 82-56.

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

SIROP NOGUÈS

Composition :

Alcoolature d'aconit	} aa.....	0,030
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia		0,075
Bromoforme.....		0,016
Codéine.....		0,009
Benzoate de soude.....		0,079

Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise..... Q. S.
pour une cuillerée à bouche.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

SIROP PECTORAL GOBEY

Contient des extraits végétaux sans opium ni dérivés de celui-ci.

Donne toute sécurité, même chez les jeunes enfants.

Indications. — Bronchite aiguë, toux grippales et nerveuses, laryngites striduleuses, séquelles de coqueluche.

Prix : 10 fr. 50.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

SIROP POLÉRY

Composition :

Sirop erysimum composé.....	46 gr.
Sirop polygala senega.....	23 —
Laurus cerasus	5,75
Natrium benzoate.....	1,75
Codéine	0,138
Teinture belladone	0,95
Teint. rac. aconit Napel	0,75
Bromure sodium.....	0,40
Dioninum.....	0,019
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.

Propriétés. — Spécifique des irritations chroniques de la gorge, Antispasmodique, Calmant de la toux, Expectorant, Décongestif de l'appareil pulmonaire supérieur.

Indications. — Toux d'irritation, toux rebelles et chroniques, bronchites, grippe, catarrhe, asthme, enrouements, trachéites, pharyngites, laryngites.

Présentation et prix. — Le flacon de 240 grammes : 11 francs.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, loin des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans, par petites cuillerées à dessert.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires Biochimiques de l'Est

J. FRECHIN, Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur.
LURE (Haute-Saône).

SIROP RAMI

Au Bromoforme. Spécifique de la toux.

« Le remède d'élection de la muqueuse pharyngée. »

Composition. — Bromoforme-Codéine-Aconit-Tolu-Laurier-Cerise.

Mode d'action. — La formule du sirop Rami, judicieusement équilibrée, en fait un auxiliaire précieux dans le traitement des affections broncho-pulmonaires et un sédatif remarquable du système nerveux et de la toux spasmodique.

C'est de plus un sirop émollient, frais à la bouche, et aussi parfumé qu'agréable au goût. Sa belle couleur rose est due au coquelicot et à la rose trémière, ces *fleurs pectorales* dont nos pères savaient utiliser les vertus émollientes et sudorifiques.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à soupe, espacées dans les 24 heures : le Sirop Rami se prend pur ou dans un peu d'eau ou de tisane, et en dehors des repas.

Pâte Rami. — Hors de chez soi, elle remplace le Sirop. Elle est plus spécialement destinée aux maux de gorge et aux enrrouements, et très appréciée pour la souplesse et la sonorité qu'elle donne à la voix.

Laboratoires FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine). (Tél. : Pereire 00-32.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

Sirop Rami, 53, rue du Poinçon, Bruxelles.

SIROP ROBIN

(Formule du Docteur Bousquet.)

Composition. — 1 cuillerée à potage renferme 0 gr. 01 de chlorhydrate d'Ethylmorphine, II gouttes de Bromoforme, VI gouttes Teinture de racine d'Aconit, VI gouttes Teinture de Drosera, et 0 gr. 75 eau distillée de laurier-cerise.

Indications. — Traitement et sédation rapides de la toux et de l'oppression.

Posologie. — Doses quotidiennes : 4 à 8 cuillerées à potage (*adultes*) ; 2 à 4 cuillerées à potage (*enfants* au-dessus de 10 ans).

Prix : 16 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

SIROP « ROCHE » AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe de Sirop « Roche » = 1 gr. de Thiocol « Roche ».

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 cgr. de gâfacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. = *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café selon l'âge.

Prop. théér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocylogène, Eupeptique, Orexique.

Indic. théér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-51.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SIROP SÉDATIF DE L'ENFANCE

Neurocalcium

Composition. — Associe aux vertus sédatives, connues depuis longtemps du bromure de calcium, les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du gluconate de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodie, troubles de la dentition, convulsions, cris, terreurs nocturnes, etc.

Gluconate de calcium 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Bromure de calcium..... 0 gr. 05

Par cuillerée à café.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 cuillerées à café par jour, jusqu'à 6 cuillerées à café en cas d'accidents aigus.

Après un an : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

SIROPS HENRY MURE

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 0 gr. 65 par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Potassium.
Maladies du Système Nerveux : Epilepsie, Hystérie, Chorée, Névroses.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Sodium.
Maladies de l'Estomac : Gastralgies, Crampes, Contractures.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Strontium.
Maladies du système nerveux sympathique : Estomac, Reins, Intestins.

Sirop HENRY MURE Polybromuré.
Potassium, sodium, ammonium.
Action décuplée des Bromures en association.
Epilepsie, Névroses.

Prix : 15 francs.
L. N. C. 428-5.6.7.8.

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V^e)
(Tél. : Odéon 18-54.)

SIROP au SOLUCAMPHRE DELALANDE

Pectoral et Eupnéique.

Composition. — Solucamphre, Ephédra total, Codéine et Dioninum, Constituants essentiels du sirop Desessarts (Ipéca et Séné).

Actions thérapeutiques. — Calme immédiatement la toux, relève le cœur et facilite la respiration. Facilite l'expectoration.

Indications. — Toux en général, et en particulier la toux des bronchiteux, la toux spasmodique et la toux des tuberculeux.

Posologie :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chez les chroniques, des doses moindres suffisent.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire Michel DELALANDE

10, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 18-33.)

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson.

Indications thérapeutiques. — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Doses. — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 5 fr. 50 le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

74, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté.

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé 0 gr. 15

Extrait sec de ratanhia 1 gr. 10

Lactophosphate de chaux.... 2 gr. 25

Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

Prix : 12 fr. 50.

LABORATOIRE OBERLIN

J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de
Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

Avantages. — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

Propriétés thérapeutiques. — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

Indications. — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

Enfants : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

SISTOMENSINE

CIBA

Extrait ovarien Ipoïdique.

Action physiologique. — Régularise la fonction menstruelle et limite le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.

II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.

III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

IV. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec l'Agomensine).

Comprimés — Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comp. par 24 h. — 1 amp. tous les 2 jours.

Flacon de 40 comprimés.

Flacon de 100 —

Boîte de 4 ampoules.

(Voir Agomensine.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103-117, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

SODAMINE

Composition :

Salicylate de soude cristallisée ..	8 gr. 75
Benzoate d'urotropine	4 gr. 12
Acétate ammoniacque	2 gr.
Essence d'anis	0 gr. 055
Extrait de belladone	0 gr. 033
Teinture aconit	1 gr. 10
Teinture drosera	1 gr. 10
Glycérine	33 gr.
Eau	Q. S. pour 100 cc.

Indications :

Rhinites, sinusites, otorrhées, expectorations purulentes, suites de broncho-pneumonies, pharyngites, laryngites, trachéites.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillères à café par jour au moment des repas dans un verre d'eau, de tisane ou grog.

Enfants : 1 à 2 cuillères à café selon l'âge.

Présentation et prix. — Un flacon de 90 cc. : 12 francs.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs — PARIS.

SODERGYL

Modificateur de la Viscosité sanguine.

Composition :

Citrate de soude	12 gr.
Sulfate de soude sec	3 gr. 5
Bicarbonate de soude	4 gr.
Phosphate de soude sec	6 gr.
<i>Hyposulfite de magnésie</i>	1 gr. 50

Forme. — Granulé soluble.

Indications. — Etats congestifs, Hypertension, affections du système veineux, migraines, constipation.

Doses :

Le Sodergyl, *granulé citaté, sulfaté sodique et magnésien*, se prend à la dose de 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Durée de la boîte : 10 jours environ.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 10 82-3.

A. MIRONNEAU, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 18).

SODERSÉINE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières :

<i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois.....	100 gr.
— de 6 mois à 2 ans.....	150 —
— de 2 ans et au-dessus	200 —
(Échelle de doses sur le flacon.)	

Prix du flacon de 500 gr. : 10 francs.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} classe,
18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).
(Tél. : Tremblay 12-04.)

SODÉSYL

Paquets de Bourget.

Estomac — Foie — Intestin.

Préparation intégrale de la solution de **Bourget**.

Sulfate de soude.	} Chaque paquet dosé pour obtenir un verre de la solution de Bourget.
Phosphate de soude.	
Bicarbonate de soude.	

Forme. — Paquets.

Emploi et dose. — 1 paquet le matin à jeun dans un verre d'eau de Vichy tiédie au bain-marie.
Enfants : demi-dose adultes.

Indications. — Toutes les applications de la solution de *Bourget* : insuffisance hépatique, congestion du foie, hyperchlorhydrie, gastro-entérite de l'enfance, intoxication intestinale et toutes affections du tube digestif.

Prix : 12 fr. 50.

« Jamais d'insuccès ».

Laboratoire du **SODESYL**

R. JACQUET, Docteur en Pharmacie.

VIERZON (Cher). (Tél. : 89.)

SODOLACTINE

(Estomac.) Δ 0,38.

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle *facilite physiquement l'évacuation de l'estomac*.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons : (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide*. (A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 13 fr. 50

Laboratoires GERDA

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

SODOTHIOL

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable, de thio-sulfate de sodium (Hyposulfite).

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques :

Affections du foie et de la vésicule. — Insuffisance, Lithiase, Coliques hépatiques, Cholécystite calculueuse, Angiocholite lithiasique, Cholémie, Ictère émolif ou catarrhal, Hépatisme, Ascite, etc.

Manifestations arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculueuse, Calculs vésicaux, Rhumatismes chroniques noueux et déformants, Ankyloses fibreuses articulaires, et toutes manifestations arthritiques justiciables de la médication soufrée.

Accidents cutanés récidivants. — Eczémas, Prurits, Dermites, Acnés, Dishyrose palmaire.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaires, Accidents sériques, Accidents d'origine mercurielle, arsenicale, etc., et toutes manifestations anaphylactiques.

Ets congestifs chroniques des muqueuses respiratoires. — Bronchites chroniques, fétides, Pharyngites chroniques, etc.

Mode d'emploi :

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections six mois, puis un an après la première série.

Coliques hépatiques ou néphrétiques. — Les doses peuvent être portées à 2 ou 3 ampoules par jour en période de grande crise.

Dans les cas de *Rhumatismes chroniques noueux* ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaire chez l'adulte : 2 ampoules chaque jour, en une seule injection, pendant 10 jours. Autres cas d'anaphylaxie, désensibilisation : doses ordinaires.

Le SODOTHIOL étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé pendant tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilités :

Acides, sels acides, iodures.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe—BEAUVAIS (Oise) (Tél. : 0-50).
Echantillons et Littérature médicale sur demande.

SOJA « SOYOLK »

Farine de soja stabilisée.

Saveur agréable. Inaltérable.

Analyse. — Protéines végétales 43 p. 100.

Matières grasses, 20 p. 100 ; Hydrates de carbone solubles, 13 p. 100.

Lécithine. Vitamines. **Absence d'amidon.**

Valeur alimentaire : 1 gr. = 3 calories 60.

Indications :

Enfants : **Dyspepsie** et intolérance pour le lait et les farineux. **Eczéma.** (Voir **VEGELACT.**)

Adultes : **Diabète,** Colites, *Colibacillurie.*

(Le soja acidifie urines et fèces.)

Mode d'emploi. — Incorporer 5 à 10 p. 100 de SOYOLK aux bouillies et potages.

(Une notice détaillée donne tous les emplois culinaires.)

Le **SOJA « SOYOLK »** est employé dans les services de l'Assistance publique.

Prix : 6 fr. 50 la boîte de 350 gr.

Dépôt général O. C. P.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-51.)

SOLHERMOL

« MÉTÈRE »

Composition :

Mercure en solution huileuse colloïdale contenant 0,15 mgr. de métal par cc.

Indications :

Toutes les Indications du Mercure dans le traitement anti-syphilitique. Traitement mixte arsenico-mercuriel. Manifestations tertiaires. Traitement d'entretien ou de consolidation.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires, 2 injections par semaine, 10 piqûres par série. En même temps prendre 2 capsules par jour de Solhermol-capsules par la bouche.

Laboratoire MÉTÈRE

4, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

SOLUBÉOL

Composition. — Solution aqueuse d'huiles essentielles provenant exclusivement de produits de distillation de plantes fraîches, sans adjonction d'aucun produit de synthèse.

Formule par cc. : Rosmarinus officinalis.... 0,03
Abies balsamea..... 0,01
Satureja montana..... 0,01

Indications. — Toutes les affections et infections bronches et des poumons :

a. Affections aiguës : trachéite, bronchite, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.

b. Affections chroniques : bronchite chronique, emphy-sème pulmonaire, dilatation des bronches.

Tuberculose pulmonaire subaiguë et chronique.

Agent de désinfection générale.

Présentation :

A. Ampoules de 3 cc. Boîte de 8 ampoules.

A. — de 5 cc. — —

A. — de 10 cc. — —

Injectons sous-cutanées, intramusculaires, ou intravei-neuses en cas d'urgence.

B. Gouttes.

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

SOLUCALCINE

Chlorure de calcium pur et stable.

Composition. — Préparée à partir du calcium et de l'acide chlorhydrique purs, cette solution concentrée est stable et ne présente pas d'oxychlorures, même à la longue.

XXX gouttes de la solution contiennent 1 gramme de chlorure de calcium.

Action. — Le chlorure de calcium est un recalcfiant, un antihémorragique, un déchlorurant, un anti-hémoclasique.

Indications. — Tuberculose et pré-tuberculose. Hémorragies internes. Hémorragies opératoires, chirurgicales et obstétricales (traitement préventif). Spasmophilie, Tétanie, Eclampsie, Urticaire, Asthme, Rhume des foins.

Accidents post-sériques. Ascite, Œdèmes.

Posologie et mode d'emploi. — Doses faibles comme recalcfiant.

Doses fortes comme antihémorragique et déchlorurant.

Doses moyennes pour les autres indications.

Doses faibles : 1 gr., soit XXX gouttes par jour, en deux fois.

Doses fortes : 4 à 6 gr., soit CXX à CLXXX gouttes par jour en deux fois.

Faire tomber les gouttes dans 1/4 de verre d'eau très sucrée, à prendre pendant les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS. (Tél. : Ségur 02-79.)

SOLUCAMPHRE

Associations diverses.

Solucamphre adrénaliné. — Contenant 0,001 d'adrénaline naturelle dissoute dans le Solucamphre.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre caféiné. — Camphosulfonate de caféine, 0,30 correspondant à 0,189 de caféine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre éphédriné. — Camphosulfonate d'éphédrine, 0,07 correspondant à 0,032 d'éphédrine pure.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre strychniné. — Camphosulfonate de strychnine, 0,0015 correspondant à 0,001 de sulfate de strychnine.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre gaïacolé. — Camphosulfonate de gaïacol, et camphosulfonate de strychnine, correspondant à 0,024 de gaïacol pur et à 0,0005 de strychnine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Solucamphre quininé. — Camphosulfonate de quinine, 0,60 correspondant à 0,418 de quinine base.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 20 francs.

Camphosulfonate de quinine, 0,20 correspondant à 0,14 de quinine base.

Tube de 20 comprimés : 20 francs.

Solucamphre cholestériné. — Cholestérine et Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. : 25 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 5 cc. : 40 francs.

Laboratoire Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE
(Seine).

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle. Le Solucamphre à base de Camphosulfonate de pipérazine a une action beaucoup plus prolongée que le camphosulfonate de soude et se rapproche à ce point de vue de l'huile camphrée.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi:

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse, 10 à 15 cc. en chirurgie

Gouttes : XXV à C gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 3 cc., 5 cc., et 3 ampoules de 10 cc., gouttes et comprimés.

Le Solucamphre en *solution et en comprimés à prendre « per os »*.

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 10 fr. ; 6 ampoules de 2 cc., 13 fr. ; 6 ampoules de 3 cc., 14 fr. ; 6 ampoules de 5 cc., 17 fr. ; 3 ampoules de 10 cc., 17 fr. ; Gouttes, 14 fr. ; Comprimés, 12 fr.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

SOLUCAMPHRE SPARTÉINÉ

Delalande.

Sel de Spartéine du Solucamphre en dissolution dans le Solucamphre lui-même.

Correspondant à Sulfate de Spartéine : 0,05 par ampoule de 2 cc. et de 5 cc.

Avantages. — Tous les avantages du Solucamphre et de la Spartéine réunis.

Injections *indolores*.

Indications. — Toutes les indications de la Spartéine et du Camphre

Présentation

Ampoules : Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.....	16 fr.
— — — de 6 — — de 5 cc.....	22 »
Comprimés : Tubes de 20 comprimés	12 »
Gouttes	16 »

Mode d'emploi

Ampoules : 2 à 4 cc. en injection intramusculaire.

Comprimés : Adultes : 2 à 6 par jour ; Enfants : 1 à 2 par jour.

Gouttes : XXV à C gouttes par jour.

Peut être prescrit aux Assurances Sociales.

Bien prescrire *Solucamphre spartéiné*, ampoules bleues, à l'exclusion de tout autre nom générique.

SOLUPROTINE « ROCHE »

Solution à 10 p. 100 de Protéine Solubilisée (Peptone de Caséine « Roche ») de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — Toutes celles de la Protéinothérapie.

Posologie. — Injections intramusculaires.

États aigus : doses croissantes de 1/4 à 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

États subaigus et chroniques : de 1/2 à 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — De 1/4 à 1/2 cc. dans 10 cc. de sérum physiologique pour une injection tous les 3 ou 4 jours.

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-34.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SOLUSEPTAZINE

p (γ phényl-propyl) amino-phényl
sulfamide α — γ disulfonate de sodium.

Dérivé soluble de la *Septazine*. Solution aqueuse injectable à 6 p. 100 de sel. Toxicité nulle, activité très marquée sur le streptocoque. Médication complémentaire des traitements par la *Septazine*.

Indications. — Mêmes indications générales que la *Septazine* : érysipèle, streptococcémies, fièvres puerpérales, scarlatines graves, phlegmons, angines graves, phlébites, gripes compliquées d'infections pleuro-pulmonaires.

Présentations. — Ampoules de 5 et 10 cc. (boîtes de 5 ampoules), pour hôpitaux et cliniques (boîtes de 25 ampoules).

Mode d'emploi et Posologie. — Injections intramusculaires 10 à 20 cc. en 1 fois ou Injections intraveineuses 20 cc. en 1 fois pouvant être renouvelées 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 20 à 30 cc.

Nourrissons : 20 cc. en 2 fois.

Traitement mixte avec la *Septazine* dans les cas graves.

Prix de vente :

Boîte de 5 amp. 5 cc. 15 fr.

Boîte de 5 amp. 10 cc. 25 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (V^{III}^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SOLUSOUFRE LABOCIP

Sulfothérapie Intégrale.

Traitement rationnel des états séborrhéiques.

Solution saturée éthylénique de soufre possédant un pouvoir dégraissant remarquable.

Totalement ininflammable.

Non irritant.

Non toxique pour les voies respiratoires.

Non caustique pour la peau.

Indications et mode d'emploi. — Acné, séborrhée, application le soir avec un coton après savonnage à l'eau chaude et séchage en évitant de frotter et d'en répandre dans les yeux.

Alopécie séborrhéique : Tous les soirs, friction rapide, mèche par mèche, à la racine des cheveux, la tête penchée en arrière.

Epidermomycoses : Frictions locales.

Prix : 22 fr. 50 le flacon pour traitement d'un mois.

Laboratoire du SOLUSOUFRE LABOCIP
René CERBELAUD, Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux.

82, avenue de Suffren — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suf. 16-66.)

SOLUTION DU Dr J. JACOBSON

Composition :

Solution huileuse d'éther benzyl cinnamique.

Forme :

Ampoules de 1 cc.

Indications :

Lésions inflammatoires tuberculeuses : ganglionnaires, articulaires, testiculaires, buccales, laryngées, vésicales, et non tuberculeuses : salpingites, périviscérites. Trachome, opacités cornéennes.

Posologie et mode d'emploi :

1 injection intramusculaire quotidienne pendant 12 jours. Faire trois séries séparées par deux intervalles de 15 à 18 jours.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 20 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

SOLUTION du docteur WATELET

A l'extrait sec de Quinquina sans alcool ni sucre.

Composition. — 0 gr. 50 extrait sec des meilleurs quinquinas sauvages, par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Tonique par excellence.

Indications. — Anémie, anorexie, convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant les repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant les repas.

Prix : 15 francs.

Laboratoires BLANCHOT

15, av. du Parc-Montsouris, PARIS (XIV^e).
(Tél. : Gobelins 03-09.)

SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact

Caractéristiques. — Voir à la rubrique Nestosyl.

Indications. — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathéters et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, rectoscopie, changement de pansements, etc. ; et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie et soins cliniques. 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémas rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc...).

Posologie. — Anesthésie des canaux : instiller quelques cmc. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmc. (dose générale suffisante : 15 à 20 cmc.). Anesthésie des plaies et muqueuses : nettoyer et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entreenets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

Prix : 15 francs.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod — Paris.

SOLUTION NORMET

Chirurgicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (calcium, sodium, magnésium, fer et manganèse).

Présentations. — Ampoules de 20 cc. (boîte de 2). Ampoules de 10 cc. (boîte de 4).

Indications. — Grandes hémorragies, métrorragies.

Mode d'emploi. — Par injections intraveineuses après dilution de 20 cc. de sérum Normet dans 1 litre de sérum physiologique (chlorure de sodium à 7 p. 1 000).

SOLUTION NORMET

Médicale.

Composition. — Préparation à base de citrates métalliques (les mêmes que ci-dessus, mais avec une très faible proportion de manganèse).

Présentations. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6). Ampoules de 5 cc. (boîte de 12).

Indications. — Anémies graves, hypotension, myocardites, hémophilie, états infectieux.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques, 1 à 15 cc. En goutte à goutte rectal après dilution dans du Sérum physiologique, à raison de 20 cc. par litre de sérum. En injections intraveineuses (non dilué) à raison de 1/2 à 5 cc. et plus, en surveillant la réaction du sujet.

Laboratoires LECLERC S. A.

10, rue Vignon — PARIS.

SOLUTION NORMET SCLÉROLYTIQUE

Composition. — Solution polycitrâtée de composition analogue à la solution Normet médicale, mais sans calcium et un peu plus riche en magnésium.

Propriétés. — La solution attaque par double décomposition les sels de chaux insolubles qui s'accumulent dans l'organisme.

Présentation. — Ampoules de 15 cc. (boîte de 6).

Indications. — La solution Normet Sclérolitique constitue actuellement le traitement le plus sûr de toutes les scléroses organiques et de l'hypertension artérielle.

Mode d'emploi. — Une ampoule (15 cc.) en injection sous-cutanée tous les deux jours, pendant un mois ou deux, puis deux fois par semaine. Abaisser les doses à 10 cc. dès que les résultats cherchés auront été obtenus. Interrompre le traitement un ou deux mois par an.

Laboratoires LECLERC — S. A.

10, rue Vignon — PARIS (IX^e).

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Par cuillerée à potage : créosote pure de hêtre, 0 gr. 10 : chlorhydro-phosphate de chaux, 0 gr. 50.

Action. — A l'action anticatarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : bronchite chronique — rhumes — catarrhes — complications de la grippe — pré-tuberculose — tuberculose — Cqueluche.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Mode d'administration. — De préférence avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou gazeuse, de café léger ou de bière.

Prix : 18 francs le flacon de 350 cc. (6 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 26-47.)

SOLUTION QUINQUINA BARDET

Solution d'Extraits secs de Quinquinas.

Adoptée par le Ministère des Colonies.

Diplôme d'honneur : Exposition Internationale Paris 1931.

Composition. — Solution, *sans sucre et sans alcool*, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée à soupe et titrant au minimum 10 p. 100 d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Teneur constante en principes actifs assurant une action rapide et fidèle. Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte dose.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Convalescences ; Lymphatisme.

Pyrexies diverses, Paludisme en particulier.

Mode d'emploi et doses :

Tonique : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ;
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, au début des 2 repas principaux.

Fébrifuge : *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe ;
Enfants : 4 à 8 cuillerées à café, par 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : « **SOLUTION QUINQUINA BARDET** ».

Échantillons et Littérature :

Laboratoires BARDET

fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

SOLUTION TISCH

Cure hépato-alcaline à domicile.

Composition. — *Solution alcaline à base de sucs de plantes fraîches, reconnues pour leurs vertus cholagogues, hépatiques et stomacales.*

Originalité. — Véritable liqueur très agréable : ne contient ni sucre, ni alcool, ni opium ou dérivé, ni iodure ou composé iodé.

Posologie. — Affections hépatiques et arthritiques : 1 à 6 verres à madère par jour en dehors des repas.

Digestions difficiles : 1 à 2 verres à madère de *Tisch* après les repas copieux.

Indications. — Celles de la cure alcaline : Arthritisme, maladies d'Estomac, du Foie, des Reins, de la Vessie.

Calmant et décongestif dans les Coliques hépatiques, néphrétiques et menstruelles.
Apéritif et digestif.

Présentation. — Grand flacon de plus de 500 cc.

Le « Tisch » est de prescription strictement médicale.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux.

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e).
(Tél. : Gobelins 36-96.)

SOLVANT ANA

Spécialement préparé pour la solubilisation des Arsénobenzènes et des sels d'Or.

Indications. — Prophylaxie des incidents ou accidents de l'Arsénothérapie ou de l'Aurothérapie intraveineuse.

Mode d'emploi. — Uniquement en injections intraveineuses. S'emploie comme l'eau distillée, les sels arsénicaux ou auriques s'y dissolvant aisément.

Formule. — Hyposulfite de Sodium et Chlorure de Calcium en milieu bromuré.

Présentations. — En boîte de 6, 12, 25, 50, 100 et 250 ampoules.

Prix. — Sensiblement égal à celui d'ampoules d'eau bidistillée.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).
(Tél. : Dorian 52-12.)

SOLVURIC

Forme. — Granulé effervescent à base de formine et benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications. — Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Prix : 14 francs.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)

(Tél. : Grésillons 05-21.)

SOMNICONES

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.

Composition. — Chaque Somnicone contient :

Phényl éthyl barbiturate de soude	0 gr. 20
Scopolamine	1/10 ^e milligr.
Extrait de Valériane	0 gr. 10

Propriétés. — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

Indications. — Insomnies au cours des affections les plus variées. Affections aiguës, Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies), Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Etats neurasthéniques, Préoccupations obsédantes, Nervosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

Posologie. — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

Dans les affections chroniques, éviter l'accoutumance en suspendant l'emploi pendant 2 jours sur 6.

Formuler : Somnicones. Une boîte.

Prix : 12 francs.

ROGER, pharmacien,

194, rue de Rivoli — PARIS.

SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Étienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Dr^s Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teys-sieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délires, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Épilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Flacon de 12 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cc. (Boîte de 6).

pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.)

Ampoules de 5 cc. (Boîte de 3).

pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Éclampsie, Tétanos, État de mal épileptique, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-36 (*gouttes*), 504-35 (*ampoules*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie.)

Composition :

Une pilule =	{ Diéthylmalonylurée.....	0,20 gr.
	{ Analgésine	0,05
	{ Thyroïdine.....	0,001
	{ Salicylate d'Esérine.....	0,0002

Caractéristiques. — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité.

Pas d'accoutumance, sommeil calme et réveil agréable. Effet secondaire apaisant.

La diéthylmalonylurée arrive à réaliser à doses *réduites* et *atoxiques* un effet hypnotique rapide et sûr, grâce à l'action *sensibilisatrice* de l'ésérine à doses minimales, qui prépare l'état *vagotonique* favorable au sommeil.

Indications thérapeutiques. — Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles, Anxiété, Excitation psychique et maniaque, Cures de désintoxication, Insomnies de la Ménopause, Insomnies pré et post-opératoires.

En psychiatrie. — Action très nette chez les *mélancoliques anxieux*, *hypocondriaques*, *déprimés* et *psychoneurasthéniques*.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer, ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou mieux de tisane chaude le soir au coucher ou 2 heures environ après le repas.

D'une façon générale, prendre le premier soir une pilule. En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à 2 pilules prises au même moment.

En thérapeutique psychiatrique (grande agitation), donner 3 pilules d'emblée et essayer par la suite d'abaisser à 2 et 1 pilule.

N. B. — Éviter l'emploi simultané de médicaments tels que la Belladone, etc., qui peuvent contrarier l'action de l'Esérine.

Posologie en deux temps. — Chez certains malades dont l'excitation très rebelle (et non provoquée par un état fébrile) entrave la venue du sommeil, même par hypnotiques, il est souvent indiqué de procéder comme suit :

1° Absorption vers les 5 heures de l'après-midi d'une pilule de SOMNOTHYRIL, qui agit surtout comme *calmant* de l'excitation *vago-sympathique*.

2° Absorption à l'heure habituelle du coucher d'une seconde pilule de SOMNOTHYRIL.

Le tube de 20 pilules pour 12 à 20 jours de traitement.

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (Seine-et-Oise).

SONAGAR

Composition :

Association de farine de son et d'agar-agar aromatisé avec essence de légumes.

Propriétés thérapeutiques :

Aliment laxatif doux, Educateur et régulateur de l'intestin avec action nutritive marquée.

Indications :

Paresse intestinale. Spasmes de l'intestin.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à bouche tous les soirs dans le potage.

Prix : 15 francs.

SONAMEL

Présenté sous forme de cubes de pain d'épices.

Composition :

Sonamel *adultes* : son, miel, bourdaine désamérisée, faible dose de phénol-phtaléine. Aromatisé à l'anis.

Sonamel *enfants* : son, miel, manne, traces de bourdaine, angélique.

Indications :

Constipation, atonie intestinale, légère insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : Un cube, le soir après dîner.

Enfants : Un demi, ou un cube-enfant.

Prix : 13 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.
(Tél. : 308.)

SONÈNE

Son purifié.

Propriétés. — Action émolliente régulière sur l'intestin.

Indications. — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

Mode d'emploi. — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets, de poudre et de granulés.

Dose journalière. — 1 à 3 cachets par jour, ou 1 à 3 cuillerées à café de poudre, ou 2 à 6 cuillerées à soupe de granulés.

Boîte de 36 *Cachets*.

Boîte de 100 *Cachets*.

Poudre. — *Granulés*.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications. — Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

Présentation :

Comprimés à 0 g. 10, le tube de 20 : 6 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Deux comprimés à 10 ctg. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (*adultes*) : 6 comprimés par 24 heures.

SONÉRYL SODÉ

Dragées à 0 g. 15 pour la narcose préparatoire aux anesthésies générales par l'éther (Méthode de Desplas-Launoy, Chevillon.) Ampoules unitaires de 1 g. de poudre pour solution destinée à l'injection intraveineuse (anesthésie de base).

Prix de vente :

Dragées, le flacon : 15 francs — l'Ampoule : 15 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). (Tél. : Balzac 22-94)

SOPORALOSE

Composition. — Chloralose et dérivés cinnamiques.

Propriétés. — Agit comme sédatif à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Provoque un sommeil calme suivi d'un réveil euphorisant.

Atoxique, même aux doses très élevées.

Élimination totale et rapide.

Aucune action sur la circulation, la digestion, la respiration.

Indications. — Toutes insomnies : des surmenés, des nerveux, des intellectuels, des anxieux.

Pas de contre-indication. Peut être prescrit même aux organismes déficients par suite de sa complète inaction sur le cœur, les reins, le foie, l'estomac.

Convient même aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artério-scléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

Posologie. — La dose à prendre varie de 1 à 3 cachets.

Dose moyenne : 1 cachet.

Prix. La boîte de 12 cachets : 12 francs.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

SOPORIGÈNE

Composition :

Cachets de butyl-éthyl-malonylurée, dosés à 0 gr. 20 en milieu alcalin.

Action thérapeutique. — Hypnotique, analgésique.

Avantages :

Le moins toxique des hypnotiques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses.

Mode d'emploi :

1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, une 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Prix : 9 fr. 50 la boîte de 10 cachets.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71.)

Fournisseur des hôpitaux et des grandes compagnies de chemins de fer.

SOUFRE ORGANIQUE " INAVA "

I. *Rhumatismes.*

Thiophéol (*amp. inj. de 2 cc.*).

Solution huileuse de Thiocyclotétradiène.
 Traitement d'attaque : 1 ampoule par jour.
Effet rapide. Ni douleur. Ni réaction.

II. *Arthritisme. Dermatoses. Cachexie.*

Néo-Soufre (*dragées*).

Albumino-Cystine assimilable et glycérophosphate de chaux.

Catalyseur organique.

Traitement : 2 à 4 dragées par jour.

E. GUIGNIER, Pharmacien.

14, rue de Normandie. — ASNIÈRES (Seine).
 (Tél. : Grésillons 31-30.)

SOUTENSA

(Traitement pathogénique des hypertensions.)

Composition. — Association de Nitrate de Pilocarpine et de Silicate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — Agit sur le syndrome endocrino-sympathique et parasympathique par l'effet vaso-dilatateur du nitrate de pilocarpine et sur les vaisseaux eux-mêmes et les troubles humoraux par le silicate de soude.

Unit l'action vaso-dilatatrice à l'action cardiotonique.

Indications. — Toutes les hypertensions et particulièrement les hypertensions essentielles, humorales et nerveuses.

Soulagement rapide des troubles des hypertendus.

Préparation pharmaceutique. Posologie. — Pastilles contenant chacune :

Nitrate de Pilocarpine..... 2 mgr. 5

Silicate de Soude..... 30 cgr.

Une pastille matin et soir, un quart d'heure avant les repas. Ne pas dépasser 5 pastilles par 24 heures.

Séries de 8 à 10 jours de traitement séparées par un repos d'une semaine.

Prix, le tube de 20 pastilles : 15 francs.

Laboratoire ARMORIL

6 bis, rue Belloni — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 64-97).

SPARTÉDRINE

Composition au Sulfate de Spartéine, Chlorhydrate Éphédrine, Iodure de sodium.

Forme. — Élixir.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-asthmatique, Tonicardiaque, Diurétique, Aucune contre-indication.

Indications. — Asthme, emphysème, rhume des foins, rhinites aiguës ou chroniques, néphrites chroniques avec mal de Bright. Rétention chlorurée ou azotée.

Mode d'emploi. — Élixir 2-4 cuillerées à café par jour.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires SAUBA

MONTREUIL-PARIS. — Tél. : Avron 25-80.

SPARTÉINE HOUDÉ

C¹⁵ H²⁶ N².

Propriétés :

- 1° Toni-cardiaque énergique et progressif. Agit plus rapidement que la digitaline (1/2 heure après l'absorption). Régulateur du rythme cardiaque. Renforce l'impulsion systolique après l'action de la digitale. Pas d'accumulation (POUCHET). Augmente la pression moyenne (SOULA).
- 2° Sur le rein : Diurétique déchlorurant (MERCIER, BALANSARD et SIGAL).
- 3° Action antitoxique et antitoxinique marquée (BILLARD, PERRIN et CUENOT, DUJARRIC DE LA RIVIÈRE).

Indications :

- a. *Cardiaques* : Insuffisances cardiaques au début (dyssystolie et hyposystolie). Préparation à la cure digitalique. Tonique d'entretien après celle-ci. Défaillances myocardiques des maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie, pneumonie). Palpitations nerveuses, arythmies légères, tachycardies, tachyarythmies. Fibrillation auriculaire. Préventif des troubles cardiaques dans la rachianesthésie (RAMOND).
- b. *Rénales* : Rétention chlorurée et œdèmes.
- c. *Générales* : Dans la diphtérie, associée au sérum ou employée seule (Mme FRONTARD). Tétanos. Cure de désintoxication des morphinomanes. Delirium tremens. Intoxications phalloïniques ou par venin de vipère.

Présentation. — Granules à 2 cgr.

Posologie. — 4 à 8 granules par jour en 2 ou 4 fois, avant les repas. Sans toxicité, ces doses peuvent être largement augmentées jusqu'à 12 granules et plus, le maximum étant de 25 à 40 cgr. *pro die*.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

SPARTO-CAMPHRE

Composition. — Solution aqueuse de campho-sulfonates de spartéine (à 5 p. 100) et de sodium (à 15 p. 100,) représentant 1,75 p. 100 de spartéine base.

Propriétés. — Celles du *camphre* et de la *spartéine*. Réalise une véritable synergie médicamenteuse. Les effets thérapeutiques propres du camphre et de la spartéine s'y trouvent associés et renforcés. Action immédiate et prolongée.

Indications — Traitement d'urgence du collapsus cardiaque, des états adynamiques des maladies infectieuses, pneumonies, broncho-pneumonies, typhoïdes, gripes, etc...

Traitement préventif et curatif des accidents cardio-vasculaires des anesthésies générales, locales et de la rachianesthésie, du choc opératoire.

Indiqué également dans tous les états de déséquilibre du système nerveux vago-sympathique.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou de préférence intramusculaires, 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Formes. — Dragées et ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SPARTOPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine et 5 cgr. de Spartéine par centicube.

Représentent la meilleure préparation injectable d'Éphédrine pour la pratique courante.

Posologie et mode d'emploi. — Pour injections hypodermiques, musculaires ou veineuses.

1 à 2 centicubes en une fois.

2 à 4 centicubes par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

SPASA

Comprimés glutinisés.

Présentation. — En tube d'aluminium de 25 comprimés.

Principes actifs. — Phényléthylmalonylurée, Extrait de Cratægus, Extrait de jusquiame, Extrait de belladone, Extrait d'anémone.

Indications. — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Troubles névralgiques et névrosiques, Spasmes, Asthme, Palpitations, Algies, Insomnie, Migraine.

Mode d'emploi. — 1 comprimé au moment de la douleur. 3 par jour si nécessaire. Ne pas prendre plus de 4 comprimés par 24 heures.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

SPASÉDOL

« Supprime la douleur, lève le spasme »

Composition :

Phénylpropionate de morphine ..	0 gr. 004
Isobutyrate de morphine	0 gr. 004
Bromométhylate d'homatropine..	0 gr. 0015
Chlorhydrate de papavérine.....	0 gr. 040

pour une ampoule injectable d'un centimètre cube
ou un suppositoire (**Suppospasédol**).

Propriétés et avantages. — Le phénylpropionate et l'isobutyrate de morphine ont une *toxicité plus faible* que le chlorhydrate, bien que leur *action soit plus puissante*. Enfin, le bromométhylate d'homatropine et le chlorhydrate de papavérine sont des *spasmolytiques remarquablement actifs*.

Le **Spasédol**, qui ne provoque ni nausées, ni vomissements et ne diminue pas la diurèse, *doit remplacer la morphine dans toutes les affections douloureuses spasmodiques*.

Indications. — Coliques hépatiques, néphrétiques, saturnines, spasmes viscéraux, vomissements d'origine spasmodique, crises d'asthme rebelles, dyspnées angoissantes, douleurs angineuses, hypertonie et tranchées utérines, etc...

Posologie. — Adultes : une demi ou une ampoule (ou suppositoire), à répéter au besoin 2 ou 3 fois par 24 heures.

Enfants, nourrissons (doses à répéter 2 fois par 24 heures si nécessaire).

De 7 à 15 ans : 1/2 ampoule ou 1/2 suppositoire.

De 5 à 7 ans : 4/10 de cc. ou 1/3 de suppositoire.

De 3 à 5 ans : 3/10 de cc.

3 ans : 2/10 de cc.

Au-dessous de 1 an : 1/10 de cc.

Prix de vente au public : la boîte de 12 ampoules : 25 fr. ; la boîte de 10 suppositoires : 25 fr.

(Le **Suppospasédol** ne fait pas partie du tableau B.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
" **THERAPLIX** "

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e). Tél. : Ségur 13-10

SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.

2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Dosage. — 2,5° de mgr. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

Indications. — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

Emploi. — 1 ou 2 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 16 francs.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

41, rue de Rome — PARIS (VIII°).

(Tél. : Laborde 08-00.)

SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé ou 1 suppositoire contient :

1 centigramme	PANTOPON « ROCHE » (Opium total injectable).
2 centigrammes	PAPAVERINE « ROCHE », (Alcaloïde de l'opium le moins toxique à propriétés spasmolytiques spéciales).
1 milligramme	ATRINAL « ROCHE », (Ester sulf. d'atropine, sans action sur le centre para- sympathique).

Propriétés. — Les *propriétés antagonistes* des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine « Roche »* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyper-excitation, etc.

Doses et modes d'emploi :

Voie buccale <i>Comprimés</i> (Flacon de 20).	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire. <i>Ampoules</i> (Boîte de 6).	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.
Voie rectale <i>Suppositoires</i> (Boîte de 6.)	{	Dose moyenne : 1 à 2 suppo- sitaires par jour.
		Dose forte : 2 à 4 supposi- toires par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les nos 504-38 (*comprimés*), 504-37 (*ampoules*), 504-67 (*suppositoires*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

SPASMALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée (anti-spasmodique et analgésique).

Diméthylaminoantipyrine (analgésique classique).

Crataegus (sédatif du système nerveux, cardiaque et vasculaire).

Médicament du spasme par excellence. Sédatif du système nerveux. Analgésique puissant et rapide.

Indications. — *Tous les spasmes* : Laryngite striduleuse, spasme de la glotte, de l'œsophage, Hoquet, Crampes d'estomac, Coliques de toute nature, Règles douloureuses, Coliques du post-partum, etc..., etc..., Palpitations, Eréthysme cardiaque, Angine de poitrine. *Toutes les algies.*

Présentation. — Le Spasmalone est présenté sous forme de solution concentrée aromatisée, qui se prend dans de l'eau sucrée.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour (1/2 doses pour les enfants). Ces doses peuvent être augmentées et même doublées sans inconvénients.

Dans les crises très douloureuses, donner 2 cuillerées à café en une fois.

Prix : 16 francs.

Laboratoires du MALONE

D'HELIOT — DINARD (Ille-et-Vilaine).

SPASMINE JOLLY

Phytothérapie atoxique des névropathies et des cardiopathies.

Combinaison physiologique stabilisée de Valériane fraîche et d'Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Le plus actif des hypnotiques doux.

Formes. — Liquide et Comprimés.

Composition :

Intrait de Valériane..... 0 gr. 10

Extrait d'Aubépine..... 0 gr. 10

Par comprimé ou cuillerée à café.

Posologie :

Sédatif : 1 à 2 comprimés ou cuillerées à café matin et soir.

Hypnotique : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café le soir.

1/2 dose pour les enfants.

Action. — Par l'Aubépine, la Spasmine Jolly exerce sur le sympathique une action inhibitrice qui est prolongée et renforcée par la Valériane ; elle obtient et maintient l'équilibration du système neuro-végétatif et régularise le fonctionnement du muscle cardiaque. Aucune accoutumance. Aucune contre-indication.

Indications. — Angor, anxiété, petits nerveux, émotivité, éréthisme cardiaque, tachycardies, extra-systoles, hypertension, aérophagie, syndromes solaires, spasmes, prurit nerveux, énurésie, etc.

Comprimés : le tube de 24..... 9 fr.

Élixir : le flacon de 20 cuillerées à café 12 fr.

Laboratoire JOLY

1, rue Christine - PARIS (VI^e). (Tél. : Danton 49-39.)

L. N. C. M. 40-1 et 40-7.

SPASMOCALCYL

Spasmolytique Calcique (Boro-Tartro-Iodo-Bromé).

Propriétés Thérapeutiques. — Le plus complet des sédatifs minéraux. Modérateur de l'excitabilité générale et neurotrophique par ses *ions calciques*.

Triplement sédatif. — 1° Par sa molécule *iodée* sur la fonction thyroïdienne; 2° par sa molécule *bromée* sur l'excitabilité nerveuse; 3° par son *borotartrate* sur le cortex et sur l'équilibre acido-basique.

Protecteur de la cellule nerveuse par sa *vitamine B*.

Indications. — Médication de choix des états neurotiques, organiques ou fonctionnels, relevant de l'*hypocalcémie* et du *terrain tétanique*. — Hyperexcitabilité neuro-musculaire. — Agitation psycho-motrice, « énervement », « prurit ». — Érétisme végétatif avec angoisse, anxiété, mélancolie. Spasmophilie viscérale, crampes. Troubles du sommeil : insomnies, agitations, terreurs, et surtout états convulsifs habituels des enfants.

Présentation. — Sirop. — Durée moyenne : 15 jours. — Prix : 20 francs.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Borotartrate de calcium...	0,20	Iodure de calcium	0,06
Bromure de calcium.....	0,12	Peptones de levures de Bière (Vit. B).	

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 1 — café —

Nourrissons : 1/2 — —

Matin, Midi et Soir.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

En dépôt chez tous les grossistes. Enregistré au L. N. — Admis aux A. S.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA.

P. CORDONNIER, Pharmacien

52, rue de Cambrai. — LILLE (Nord).

SPASMONAL GROS

Composition. — Papavérine, phényléthylmalonylurée, Diurocalcine.

Propriétés. — Analgésique, antispasmodique et diurétique.

Indications. — Hypertension artérielle. Crises douloureuses angiospasmodiques, Tachycardies, Palpitations, Insomnie nerveuse, Troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par 24 heures : 1 au réveil, 1 dans le courant de l'après-midi, 1 au coucher. Avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 francs. Durée moyenne de l'unité : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 0-55.)

SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux.
(Formule Méglin modifiée.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Belladone	0,001
Extrait de Jusquiame	0,02
Extrait de Valériane	0,06

pour une dragée friable.

Indications :

Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires. Palpitations, Angors, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

Nervosisme, Anxiété, Angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

Syndromes convulsifs, Spasmodophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

Posologie :

Enfants : 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

Adultes : 1 à 8 par 24 heures (avaler avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 18 fr. 50.

Laboratoire du SPASMONEURAL

Jean LE COULANT, Pharmacien.

239, cours de l'Yser — BORDEAUX. Tél. : 822-64.

SPASMORYL

(Communication à la Société de Thérapeutique).

Traitement des spasmes digestifs et des complications mécaniques et spasmodiques de la lithiase hépatique et rénale.

Formule. — Chlorure de calcium suractivé et fixable par le thiosulfate de magnésium en milieu marin.

Présentation. — 1° Intraveineux. 2° Intramusculaire.

Indications :

Spasmes digestifs, œsophagiens, gastriques, pyloriques, duodénaux, coliques et leurs complications : dysphagie, régurgitations, atonie et dilatation gastrique, gastrites hypochlorhydriques, lenteur des digestions, renvois, vomissements, hoquet, spasmes pyloriques, colites entéro-colites, coli-bacilliose, constipation spasmodique.

Accidents spasmodiques et mécaniques des lithiases : Coliques vésiculaires, coliques hépatiques, cholécystites chroniques, coliques néphrétiques, calculs et spasmes vésicaux, prostatites.

Posologie :

Intraveineuses : 2 injections par semaine (pousser très lentement).

Intramusculaires : 1 injection profonde tous les 2 jours.

Prix : Intraveineuses : 30 francs.

Intramusculaires : 25 francs.

Laboratoires ANA

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 52-12.)

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(*Thérapeutique cardio-vasculaire.*)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine	0 gr. 05
Extrait de <i>Cratægus</i> stabilisé ...	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé	<i>glutinisé.</i>

Présentation :

Comprimés glutinisés.

Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois)

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois).

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine, etc.

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

Belgique : *Agent général* : **L. Prunières**

19, rue Louis-Hap — BRUXELLES.

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition. — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications. — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

Doses. — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Prix : 36 francs.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

SPÉCIFIQUE ET APPAREIL LANCELOT

L'usage de l'*Appareil* et du *Spécifique Lancelot* est une modification avantageuse de l'inhalation de la fumée, des poudres anti-asthmiques.

Le *Spécifique* contient tous les principes actifs de ces poudres, et rend les muqueuses respiratoires moins sensibles aux actions nuisibles extérieures.

Composition :

Nitrite de soude, 12,5 ; Résorcine, 0,125 ; Sulfate d'atropine, 0,10 ; Eau de laurier-cerise, 0,20 ; Sulfate d'hyo-sciamine, 0,05 ; Chlorhydrate de pilocarpine, 0,20 ; Chlorhydrate de benzoylepseudotropine. Excipient : Q. S. p. 100 grammes.

Indications. — Asthme, Emphysème, Coryzas et Toux spasmodique, Asthme des foin, Séquelles d'intoxication par les gaz.

Mode d'emploi. — Le *Spécifique Lancelot* s'emploie en pulvérisations avec l'*Appareil Lancelot*.

Spécifique : 16 francs le flacon de 20 grammes environ.

Appareil : 44 francs.

Laboratoire LANCELOT

100 ter, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 49-04.)

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

Composition. — Sérum frais hémopoiétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'hémo-poïèse.

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques.

Présentation. — Sirop agréable à prendre.

Posologie. — Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude). Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Prix : 18 francs.

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie.

9, rue Paul-Baudry, Paris (8^e). — (Tél. : Élysées 40-26).

SPIROCHTAN

Bismuthique hydrosoluble indolore à faible dose, associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

Formule :

Pentanoldioate méthylvioate de bismuth	32 mgr.
Arséniate de mercure	0 mgr. 36
Anhydride arsenieux	0 mgr. 36
Sel ammoniac	3 mgr. 3
Eau distillée.....	1 cc.

Ampoule de 1 cc.

Posologie. — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les jours. Traitement d'entretien 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours.

Avantages. — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, ce qui permet une thérapeutique antiseptique intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Concentration spéciale pour enfants, au 1/5 de la dose pour adultes.

La boîte de 10 ampoules : 16 francs.

Laboratoires pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél.: Odéon 73-92.)

SPIROGYL

Onguent gingival à base d'Antivirus fuso-spirochétique.

Pour le traitement des stomatites, gingivites rebelles, pyorrhées alvéolaires graves.

A employer 3 fois par jour en massage des gencives.

Prix : le tube : 9 francs.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Marque de la Biothérapie

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SPLÉNIQUE (Extrait)

du docteur Bayle.

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au Dr Bayle pour ses travaux, cliniques et expérimentaux, sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques (voir **COLLOIDOGENINE**).

Maladies infectieuses (voir **POLYVALINE**).

Ces deux produits, préparés selon les indications précises de l'auteur de la méthode, sont **LES SEULS** qui peuvent se réclamer du nom et des travaux du Dr Bayle.

Ils permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

SPLÉNOCRISINES

Solution injectable d'extrait de rate désalbuminée. Hautes concentrations.

Forme.— Ampoules, 5 ampoules de 3 cc.

Splénocrisine 15 correspondant à
15 gr. de glande fraîche par amp. 20 fr.

Splénocrisine 30 correspondant à
30 gr. de glande fraîche par amp. 30 fr.

Splénocrisine 60 correspondant à
60 gr. de glande fraîche par amp. 45 fr.

Indications. — Dermatoses rebelles prurigineuses, Asthme, Anaphylaxie, Tuberculoses.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

SPLÉNOGASTRINE

Complexe opothérapique gastrosplénique.

La *Splénogastrine* couple en une association judicieusement établie la méthode de Castle et les indications hématopoïétiques de l'opothérapiésplénique (Travaux de l'Ecole de Toulouse sur la rate (Soula), avec la médication cuivro-ferreuse.

Indications. — Toutes les anémies : graves, secondaires (tuberculose, paludisme, rhumatisme, cancer, saturnisme), légères ou moyennes, consécutives aux accouchements, aux interventions chirurgicales, aux hémorragies, aux traitements radiothérapique, bismuthique ou arsénobenzolique.

Présentation. — Sous les deux formes complémentaires suivantes, réunies dans la même boîte et qui doivent être prises concurremment :
1° Complexe opothérapique gastrosplénique : ampoules buvables de 5 cc.

2° Pilules de fer et de cuivre.

Posologie. — Dans les anémies graves : 2 ampoules et 4 pilules par jour.

Dans les anémies de moyenne intensité : 1 ampoule et 2 pilules par jour, au moment des repas.

Laboratoires des Lipides J. OLIVE, pharmacien.
14, rue des Minimes — PARIS (III^e). Tél. : Archives 03-94.

SPLÉNOMANGANOL

Propriétés thérapeutiques. — Réparateur puissant, reconstituant, reminéralisateur physiologique.

Indications. — Convalescences difficiles, grossesse, allaitement, amaigrissement, rachitisme, bacillooses pulmonaires et osseuses, anémie, neurasthénie.

Formule. — Extrait de vitamine B, fluorure de calcium, extrait de rate, nucléinate de manganèse, os frais pulvérisé, surrénale, foie, moelle osseuse rouge, céréaline, arseniate de strychnine 1/2 mgr.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose et mode d'emploi. — Deux à trois comprimés à chacun des deux principaux repas.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 403-4.

Laboratoires HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

SPLENOMEDULLA

Opothérapie Splénique et Médullaire associée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Leucémie, Paludisme, Rachitisme, Lymphatisme, Troubles de croissance.

Emploi. — *a.* Par voie gastrique : Extrait fluide ou sirop. Ampoules buvables.

b. Par voie hypodermique : Ampoules injectables pour injections intramusculaires quotidiennes.

Doses :

Adultes : Sirop 2 cuillerées à soupe par jour.

Ampoules buvables 1 tube par jour, matin et soir.

Enfants : Sirop 1 cuillerée à café matin et soir.

Voir la notice pour indications plus détaillées.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon

(ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 16-11.

SPLÉNYL

(Vitaminé.)

Composition. — Le SPLÉNYL est un reconstituant général à base de rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B ; sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication réellement active et que son prix de vente très bas rend accessible à tous les malades.

Indications thérapeutiques. — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Épuisement, l'Amaigrissement, les Maladies par carence, etc...

Présentation et posologie. — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : *Ampoules ingérables* de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et *Sirop de Splényl* (flacon de 190 cc.).

Adultes : 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Prix : *Sirop* : 18 francs.

Ampoules. Boîtes de 6 : 11 francs ; boîte de 12 : 21 francs

boîte de 30 : 48 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, méthylbenzénols, tanin, perborate de sodium (oxygène naissant).

Présentation. — Dernier mot de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques. Emploi commode et discret : dissolution complète et instantanée : ni caustiques, ni irritants, ni toxiques. Désodorisants, décongestionnants, antiseptiques. Ne tachent pas. Parfum agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les *Spyrolides* produisent instantanément un vif dégagement d'oxygène, donnant une solution puissamment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses, favorisant au contraire leur rapide régénération et assurant la défense de leur vitalité.

Mode d'emploi. — Un ou 2 comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou biquotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : 2 à 3 comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau *Spyrolidée* par 1 ou 2 comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : *Spyrolides* : 1 tube (faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer).

Tube de 28 comprimés : Prix : 9 francs

Échantillons et Littérature :

Laboratoires du D^r NARODETZKI
19, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS.

STADRHINE

Anciennement Stovoléine.

Baume nasal aseptique, vaso-constricteur, anesthésique, non toxique, non caustique.

Composition. — Acide borique, Stovaïne, Solution d'Adrénaline à 1/1000, Essence de Géranium rosat.

Propriétés. — Lubrifie, décongestionne et lénifie la muqueuse nasale.

Indications. — Effet incontestable et rapide dans tous les cas de rhinite aiguë spasmodique. Souverain dans le coryza chez l'adulte et chez l'enfant. Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Après avoir mouché de l'une et l'autre narine alternativement, gros comme un petit pois dans chaque narine, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec olive nasale.

Prix : 8 francs.

L. N. C. 314-36.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 14-14.)

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme ».

Coréïne bismuthée.

Pansement gastro-intestinal.

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréïne (mucilage pur) et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Co^3Ca .

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

Mode d'emploi :

Poudre : Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Tablettes : dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Prix : 20 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique.

Indications. — Furunculose, anthrax, acné, ostéomyélites, zona et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe, pas de réaction fébrile.

Formes : Buccale, *la plus pratique* (10 ampoules de 3 cc.). Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre*. Une ampoule de 1 cc. par jour.

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 25 fr. — 5 ampoules, 13 fr.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52 — 53 et 54.)

STANION

Description. — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon).

Ampoules : contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies, où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Prix : Ampoules : 30 francs pour 2 à 4 jours de traitement.

Capsules : 25 francs pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires CH. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

STANNOBARDANE HENRY

L'*Étain* sous forme de *Peptonate* produit les effets suivants :

- 1° Soulage la douleur dès le début du traitement ;
 - 2° Arrête la marche de l'inflammation, fluidifie le pus et fait résorber le bourbillon sans qu'il soit besoin d'exercer une pression.
 - 3° Produit rapidement la guérison ;
 - 4° Empêche la formation de nouveaux foyers.
- Il existe deux préparations à base de *Peptonate d'étain* :

- 1° Le **Stanno-Bardane Henry** (*Peptonate d'étain* + *Extrait de Bardane stabilisée*) ;
Le *Stanno-Bardane Henry* est présenté sous deux formes :

A. *Stanno-Bardane-gouttes* (LX gouttes répondant à 0 gr. 01 d'étain pur).

Doses. — LX gouttes à 1 cuillerée à café 3 fois par jour dans un liquide. Le flacon : 16 fr. 50. Traitement : 5 jours.

B. *Stanno-Bardane-pilules* (chaque pilule répondant à 0 gr. 015 d'étain pur).

Doses. — 3 pilules par jour. Le flacon : 19 francs pour un traitement de 15 jours.

- 2° Le **Peptonate d'Étain Henry** (solution sans *Extrait de Bardane* permettant un traitement *interne* et *externe*. Dosage en étain pur : 0 gr. 015 par XX gouttes).

Doses. — De XX à XL gouttes 3 fois par jour. Le flacon : 18 francs pour 10 jours.

En *lavages*, employer 1 cuillerée à café pour 100 gr. d'eau distillée, l'eau ordinaire provoquant un précipité.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE.

STANNO-SUFROL CROSNIER

Composition :

Étain, Oxyde d'étain, Soufre actif, Bardane stabilisée, Extrait splénique.

Indications :

Furonculose et Affections à staphylocoques.

Posologie :

2 à 3 comprimés et plus à chaque principal repas.

Prix : 10 francs la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny
MONTREUIL-PARIS
(Tél. : Avron 35-04.)

STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + *anatoxine*.

Indications. — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques. Zona.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Les 6 ampoules. Prix : 30 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 à 18 jours.

Littérature et échantillons :

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS.
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

STAPHYLASE du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Prix : 20 francs le flacon de 300 gr.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et Cie, pharmaciens

5. rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Propriétés thérapeutiques. — Agent de la phagocytose. Abaisse la glycémie.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses, Diabète, Acidose.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

Enfants : Moitié de ces doses au moins suivant l'âge.

Prix au public : Solution : 16 fr. 50 Comprimés : 16 frs.

Autorisé par les Assurances sociales.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS (Tél. : Trinité 29-29.)

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncles, Anthrax, Abscès tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou
1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 18 fr.

Boîte de 10 suppositoires 15 fr.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou
1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 13 fr.

Boîte de 10 suppositoires 12 fr.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Staphylocoques.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Abscès et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

Indications. — Erysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

Posologie. — Les lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes à 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

STAPROLYSAT

Vaccin neurotrope.

Indications. — Tous les accidents du système nerveux, central ou périphérique auxquels on attribue une origine infectieuse.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névraxies, Radiculites, Myélites, Encéphalites et ses séquelles, Sclérose en plaque, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona. Ulcères gastriques et duodénaux.

Composition. — Autolysat neurotrope de *Staphylocoque* et de *B. Prodigiosus*.

Forme. — Ampoules de 1 cc., à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

Série I. — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

Série II. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

Série III. — 6 ampoules semblables, dosées 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

Série P. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens pyocyaniques.

Mode d'emploi. — Une injection *intramusculaire* tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas sans arrêt, les 3 premières séries et *au besoin* la série P.

Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira les injections *intramusculaires* de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections intraveineuses prudentes de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements.)

Les trois premières séries sont en général indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Les trois premières séries : 30 francs l'une.

Série P : 35 francs.

Nota. — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

Laboratoires pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

STAVAFER

(Ancienne dénomination **STOVAFER**)

Granulé

Médication reconstituante à base d'acide oxyacétylamino-phénylarsinique, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse.

1 cuillerée à café contient 0,05 d'acide oxyacétyl amino-phénylarsinique.

Indications. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

Mode d'emploi. — *Enfants*, à partir de 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 20 francs.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien
PARIS (Tél. : Provence 34-87.)

STÉAROL

Antiseptique général.

Détruit tous germes Pathogènes, respecte la cellule vivante.

Action triple : *Détersive, Antiseptique, Cicatrisante.*

Composition. — Complexe de savon liquide neutre stérilisé, très fluide, avec présence de *formol* et d'essences aromatiques déterpenées parmi lesquelles *thym* et *lavande*. (PH = 7.)

Indications :

Plaies de brûlures : Employer pur, pouvoir analgésique puissant.

Plaies vives : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Plaies atones : solution à 50 p. 100 en lavages et compresses.

Soins gynécologiques : *Accouchement, métrites.* Emploi de la solution :

1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie, en injections et savonnages externes. Désinfection vulvaire.

Constipation, traitement des oxyures : Lavements avec la solution, 1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie.

Prurits, Acné, Furunculose : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Lavage des oreilles : Brossage des dents, *Gargarismes* : Solution au 1/10.

Désinfection des mains et des régions pileuses par savonnage avec une solution étendue sans irritation consécutive.

Prix. Petit modèle : 9 francs. Grand modèle : 15 francs.

Laboratoires du STÉAROL

rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

STENIC

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Extrait désalbuminé de rate, chlorure de Magnésium et de Manganèse, acide phosphorique, sérum de Mouton et de Cheval.

Indications. — Anémies, Prétuberculose, Tonique général, Amaigrissement, Convalescence.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 ampoules par jour dans un peu d'eau ou de vin avant ou après les repas.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le N° 882-7.

A. COUSIN

Pharmacien de 1^{re} classe.

BEAUMONT-SUR-SEINE (Seine-et-Oise).

STÉRAMINE

Crème antiseptique hydrosoluble.

Composition. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Prix : 5 francs le tube.

Échantillons médicaux sur demande.

Laboratoire Pharmaceutique.

DAUFRESNE

42, rue Thiers — LE HAVRE.

STÉRANDRYL

Propionate de Testostérone.

Préparation comportant comme principe actif un éther sel de l'hormone testiculaire obtenue synthétiquement.

Présentation : Le STÉRANDRYL est une solution huileuse de propionate de testostérone.

- a) Boîte de 5 ampoules. 1 cc. 10 mgrs. Prix au public : 90 francs.
 b) Boîte de 4 ampoules. 1 cc. 5 mgrs. Prix au public : 50 francs
 Voie intramusculaire.

Indications : Asthénie et sénilité précoce chez l'homme. Prostatisme à tous ses degrés. Mastopathies. Métrorragies. Troubles pouvant être attribués à l'hyperfolliculinie. Retard de la puberté et du développement des caractères sexuels chez l'enfant mâle.

Posologie. — Adultes hommes : 1 amp. de 10 mgrs. tous les 2 à 3 j.
 femmes : 1 ampoule soit de 5 mgrs, soit de
 10 mgrs tous les 2 à 3 jours suivant indications.
 Enfants : 1 ampoule de 5 mgrs. tous les 3 jours,

Laboratoires du Docteur ROUSSEL,

89, rue du Cherche-Midi, Paris (VI). — Tél. : Littre 58-43.

STÉROGYL

Solution huileuse de Vitamine D cristallisée, chimiquement pure ; substance inaltérable dénuée de toute toxicité et dont l'action est constante.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antirachitique, le Stérogyl est le traitement de toutes les décalcifications. La Vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue ; elle la remplace dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates : les états ganglionnaires, les anémies pré-tuberculeuses et gravidiques, la carie dentaire. Facilite la consolidation des fractures.

Présentation. — Flacon de 10 cc. contenant 5 milligrammes de Vitamine D (X gouttes : 0 gr. 002).

La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

Posologie. — Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour ; de 1 à 10 ans : X à XX gouttes ; au-delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Prix au public : Le flacon : 15 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littre 58-43.)

STHÉNOBIOSE

Élixir à base de Vin de Muscat (goût très agréable).

Composition. — Nucléinate de soude, Méthylarsinate de soude, Sulfate de strychnine, Glycérophosphates de soude, Potasse, Magnésium, Manganèse, *Vin de Muscat*.

Indications. — Anémie, Débilité, Anorexie, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences.

Posologie :

Enfants : 1/2 verre à liqueur, au début des repas.

Adultes : 1 verre à liqueur, au début des repas.

Contenance : 500 cc.

Prix : 20 francs.

Enregistré au Laboratoire national du contrôle des médicaments.

Laboratoires de la REXACARBINE

LAVIT (Tarn-et-Garonne).

STHÉNOXAL

Médication réparatrice et reconstituante, en comprimés dragéifiés. Fer et Arsenic organiques, Kola ; Strychnos.

Indications. — Syndromes d'hypovitalité générale. Insuffisances, appauvrissements et affaiblissements organiques. Grossesse, allaitement, vieillesse. Anémies, chlorose, hérédité. Déchéances progressives. Convalescences. Intoxications et toxi-infections.

Emploi et doses :

Adultes : 3 comprimés par jour au total, aux repas ; avaler sans croquer.

Vieillards : 2 comprimés par jour.

Enfants : A partir de 6 ans : 1 comprimé par jour ;
de 10 à 15 ans : 1 ou 2 comprimés par jour ;
de 15 à 18 ans : 2 comprimés par jour.

Prix : 17 francs.

Durée moyenne 15 à 20 jours.

Echantillons grandeur normale sur demande :

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne que des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

Présentation. — En flacons compte-gouttes M. S. à *pointe mousse* de 30 cc. D'où les avantages suivants :

- 1^o *Commodité* : Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.
- 2^o *Sécurité* : Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

Usages. — *Oculistique* : Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas : Conjonctivites, Blepharites.

Obstétrique : Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

Rhino-pharyngologie : Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

Affections de l'oreille : STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

Pédiatrie : Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

Prix : 1 %, 2 % : 13 fr. 50. — Prix : 5 %, 10 % : 14 fr. 50.
20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

LE MARINEL, pharmacien.

4, avenue Orban — BRUXELLES.

STIMULAXINE

Stimule le foie, relaxe l'intestin.
Cholagogue et laxatif doux.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire, cholécystites, lithiase, entérocologie, constipation chronique, dermatoses, hémorroïdes.

Composition. — Extraits végétaux, cholagogues et cholérétiques, adjuvants du péristaltisme intestinal : curcuma xanthorrhiza, boldo, artichaut, podophyllin, rhamnus pursh.

Extraits opothérapiques : bile desséchée et dépigmentée, poudre de glandes intestinales.

Antiseptiques : ferments lactiques.

Antispasmodique : extrait de belladone.

Posologie. — De 1 à 6 dragées par jour, selon les indications du médecin traitant. Demi-dose pour les enfants. La boîte contient soixante dragées, soit en moyenne un traitement de trois à cinq semaines.

Inscrite au Laboratoire National de Contrôle, donc remboursable aux assurés sociaux.

LABORATOIRES BARTIER

ARMENTIÈRES (Nord).

STINERGYX

Complexe Bio-Chimique.

Médicament type des fatigués et surmenés intellectuels.

Composition. — Extrait surrénal, androïque, cérébral, Thyroïde; Manganèse, Acide Phosphorique.

Indications. — Asthénie, Fatigue Générale. Fatigue cérébrale, Surmenage, Paresse intellectuelle, Nonchalance, Apathie, Lenteur psychique, Distraction, Inattention.

Propriété. — Tonifie la cellule nerveuse, élève le rendement intellectuel. Combat toutes les formes du surmenage physique.

Présentation. — Comprimés.

Posologie :

Enfants : 1 à 3 comprimés (avaler ou écraser).

Adultes : 2 à 4 comprimés (avaler).

De préférence 1/2 heure avant les repas.

Laboratoire THERINEX

R. CONDY, Pharmacien,

6, rue de Dunkerque — PARIS (X^e).

Enregistré au L. N. C. Admis aux Assurances sociales.

STOMAGYL

du Docteur Frémont.

Composition. — Mélange de poudres inertes désinfectantes cicatrisantes et de poudres végétales excitantes des fonctions digestives.

Caractéristiques. — Le STOMAGYL tapisse et cicatrise la muqueuse stomacale, excite la contractibilité de l'intestin, régularise les fonctions digestives déficientes, décongestionne et désintoxique le foie.

Indications thérapeutiques. — Dyspepsie, Gastralgie, Aérophagie, Pyrosis, Dilatations, États pré-ulcéreux, Urticaire, Vertiges, Entérites (sous toutes leurs formes), Diarrhées (de toutes natures), Intoxications, Dermatoses, Ictères, Maladies coloniales.

Mode d'emploi. — 1 cachet au début ou au milieu des deux repas.

Prix : 12 francs.

Laboratoire du STOMAGYL

143, cours de la Somme — BORDEAUX.

STOMAROL

Estomac de porc desséché et délipéïdé
(Méthode de Castle.)

Composition. — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipéïdé selon un procédé spécial qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

Présentation. — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont :

16 gr. 50 représentent 100 gr. estomac frais de porc.

Indications. — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse accompagnée d'achylie.

Posologie :

Adultes : 20 à 30 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

Enfants : 10 à 15 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

Mode d'emploi. — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

Prix : 30 francs.

Laboratoire Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

Musculopoiétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (*noix vomique*) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Cachets : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 15 francs.

Laboratoires CLAVERIE

Place Carnot — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Vilette 10-10.)

STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. Constipation. Fétidité de l'haleine, insuffisance hépatique.

Composition. — Peroxyde de magnésie, chimiquement pur, extraits biliaires, émodine et belladone (Travaux de Tschirch).

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Double réaction en milieu stomacal.	{	Dégagement d'O.	{	Naissant.	{	Action antiseptique.
		Production de chlorure de magnésium.		Naissant.		Action cytophylactique.

Propriétés thérapeutiques. — Action antifermentescible désinfectante, antiseptique, anticolibacillaire. Effets toniques et cytophylactiques des sels halogènes magnésiens. Laxatif puissant, sans accoutumance.

Indications. — Toutes les dyspepsies. Constipation sous toutes ses formes. Fétidité de l'haleine. Toutes les fermentations. Rééducation intestinale, colites, entérocrites, etc... et toutes les manifestations colibacillaires.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. Littérature et échantillons.

Durée : environ 3 semaines.

Prix : 12 francs.

Laboratoires du Stomoxygène.

2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre — SAINT-QUENTIN (Aisne).
(Tél. : 36-82.)

STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement.

Comprimés à avaler, ou à déliter dans l'eau auparavant.

Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme.

Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives.

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

Doses. — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 12 francs.

Échantillon grandeur normale sur demande (15 comprimés).

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

STOVAR SOL

Acide 4-oxy-3-acétylamino-phényl-1-arsinique.

Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

Indications. — Traitement des diarrhées toxi-infectieuses, cryptogénétiques, parasitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliose, Spirochétoses intestinales, Syphilis, Pian.

Présentations :

<i>Comprimés</i> à 0 g. 25. Le flacon de 30	20 fr.
<i>Comprimés</i> à 0 g. 05. Le flacon de 70	12 —
<i>Comprimés</i> à 0 g. 01. Le flacon de 200	10 —

Posologie et mode d'emploi :

Doses moyennes. — *Adultes* : 50 ctg. à 1 g. par 24 heures. *Enfants* : 1 à 2 ctg. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le *Stovarsol sodique*, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

STOVÉDRINE

Pommade. Solution.

Pommade nasale atoxique.

Formule normale :

Stovocaïne	6	p. 100
Ephédrine (Chlorh.)	5	p. 100

Formule B. B. déconcentrée :

Stovocaïne.....	1,50	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	1,25	p. 100

Solution aqueuse pour pulvérisations :

Formule :

Stovocaïne.....	5	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	5	p. 100
Chlorétone	1	p. 100

La *Stovédrine* est une association de Stovocaïne (Chlorhydrate d'Amyléine) et d'Ephédrine *naturelle* à un taux de concentration indispensable pour combattre efficacement les affections aiguës et chroniques de la pituitaire.

Indications. — Coryza, Sinusite, Céphalées, Obstruction nasale, Asthme, Rhume des Foies.

Posologie. — *Pommade*: Introduire gros comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

Solution: Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine, la solution de *Stovédrine*.

Prix :

Pommade	12 fr.
Solution avec pulvérisateur	22 fr.
Solution (flacon rechange).....	15 fr.
La <i>Stovédrine</i> sous toutes ses présentations est remboursable aux Assurés sociaux.	

Laboratoires LICARDY

38, bould Bourdon, NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. : Maillot 17-75.

STRAGOL MERLET

Aromaticothérapie.

Composition. — Association d'huiles essentielles rigoureusement pures et naturelles, sélectionnées pour leur action stimulante, désinfectante, digestive, carminative et même cicatrisante.

Indications. — Aérophagie, dyspepsie, hoquet.

Mode d'emploi :

V à X gouttes sur un morceau de sucre.
Ne pas omettre d'agiter avant usage.

Non toxique.

Laboratoire MERLET
24, bd Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

STREPTODERME

N'est pas une pommade-vaccin.

Traitement des Strepto-staphylococcies cutanées.

Formule. — Résorcine, Ac. salicylique, Oxyde jaune, Ichtyol du Tyrol, Oxyde de zinc, Talc.
Excipient gras enlevable à l'eau.

Indications. — Après lavage avec le **Microderme**, **Solution au 1/20**, appliquer le **STREPTODERME** sur les Pyodermites, Eczéma impétiginé, Dermoépidermites streptostaphylococciques, Parakératoses, Eczématides microbiennes, Intertrigo, Lichénification infectieuse, Dysdermie streptococcique et même mycosique, Ulcère de jambe, furoncles, etc...

Contre-indication. — *Ne pas associer le Streptoderme à une médication iodée externe (formation de HgI²).*

Prix du tube de 70 gr. : 13 francs.

Laboratoires BOUTROUX
25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).
Tél. : Laborde 08-51.

STRICTARGOL

Composition :

Chlorhydrate d'éphédrine naturelle.	0 gr. 25
Solution aqueuse de chlorhydrate d'adrénaline physiologique au 1/1000.....	5 gr.
Argyrol de Barnes	0 gr. 30
Eau distillée.....	Q. S. pour 30 cc.

Propriétés. — Vaso-constricteur local, antiseptique de la muqueuse rhino-pharyngée.

Indications. — Tous états congestifs, inflammatoires et infectieux de la muqueuse rhino-pharyngée et de ses annexes.

Rhinites, coryza spasmodique, sinusites, éthmoïdites, adénoïdites, rhino-pharyngites.

Posologie et mode d'emploi :

Instillations : I à III gouttes par narine 3 à 6 fois par jour.

Pulvérisations : 3 à 6 par jour.

Présentation et prix. — En flacon compte-gouttes de 20 cc. : 12 francs.

Laboratoire du **STRICTARGOL**

G. COUSSINET, Pharmacien,

20, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

STRICTOFORME

Composition. — Solution du principe vaso-constricteur du genêt (H. Busquet et Ch. Vischniac), titrée physiologiquement : 1 cc. correspond thérapeutiquement à 1/10 de mgr. d'Adrénaline.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique puissant, non toxique, actif par voie buccale, arrête les hémorragies artérielles et veineuses par resserrement des vaisseaux sans vaso-dilatation secondaire ; relève la pression chez les hypotendus ; action sympathomimétique générale.

Indications. — Hémoptysies, hématoméses, épistaxis, métrorragies ; toutes dilatations veineuses (hémorroïdes, varices, phlébites chroniques), états hypotensifs (tuberculose, dyspepsie) ; crise d'asthme (action broncho-dilatatrice).

Mode d'emploi. — XXV à XXXV gouttes dans un peu d'eau sucrée, avant chacun des trois repas.

Laboratoires **DAUSSE**

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

STRONG ÉNOL

Du Docteur Moity

Granulé soluble basé sur des notions de conception nouvelle.

- 1° Action anti-anémique des *proto-sels de fer* assurée par des traces de *sels de cuivre*.
- 2° Augmentation de l'acidité chlorhydrique stomacale par cation électif. *Développement de propriétés anti-anémiques par cet acide.*
- 3° Absorption intégrale du *phosphate de calcium colloïdal naissant* et de son *phosphore* en présence d'un sel alcalin à radical organique. Rétention tissulaire *catalysée par la vitamine D.*

Indications. — Anémies pernicieuses, Troubles de la croissance et de la minéralisation, Rachitisme, Caries Dentaires, Hypocalcémie, Tuberculose, Faiblesse, Surmenage, Phosphaturie, Convalescence, Fractures, Grossesse, Allaitement, Neurasthénie, Splénectomie, Traitement préliminaire aux interventions chirurgicales.

Posologie. — *Nourrissons et enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adolescents : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Prix de la boîte : 16 francs, 170 gr.

Triple boîte : 42 francs (économie de 6 fr.), 510 gr.

Peut être prescrit aux Assurés sociaux. Diffusion strictement médicale.

Laboratoire J.-O. MOITY

D^r en médecine. D^r en pharmacie, ex interne des hôpitaux de Paris,
199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE.

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite de *Strophantus gratus*.

Synonyme : **Ouabaïne**.

Indications. — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artériosclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

Le flacon de 50 granules : 10 francs.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 Extrait titré de *Strophantus*.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*.

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Le flacon de 50 granules : 10 francs.

Prix de l'Académie de médecine.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.

STRY-CALCIUM AGUETTANT

Norm nouveau du

STRY-CAL AGUETTANTPremière association stable de *Strychnine* et *Gluconate de Calcium*.Tolérance parfaite de la *Strychnine*.**Indication.** — Tonique musculaire et recalcifant par l'action stimulante de la *Strychnine* et les propriétés de l'ion Calcium assimilable.**Action.** — Evite sûrement les effets souvent violents de la *Strychnine*, ne surmène pas le foie. Le *Stry-Calcium* est donc sans danger pour les distoniques sympathiques, nerveux, convalescents, déprimés, particulièrement faibles et sensibles, souvent hépatiques.**Posologie.** — 1 à 2 ampoules par jour. Commencer par une demi-ampoule.**Forme.** — Ampoules injectables (2 cc. = 0,002 de *Strychnine*, et 0,20 de *Gluconate*). Conditionnements et prix spéciaux aux hôpitaux.**Laboratoire N. AGUETTANT**

36, quai Fulchiron — LYON (Rhône).

(Tél. : Franklin 24-63.)

STRYCHNALSulfate d'éthylbétaine de l'acide Strychnique, 10 fois moins toxique que la *Strychnine*.

Asthénie, Anémie, Anorexie, Paralysies post-diphthériques, Névrites, Surmenage, Paralysie du nerf optique.

Granules à 0,01, 2 à 4 par jour (flacon de 50 : 15 fr.).*Ampoules* à 0,01, 1 à 2 par jour (boîte de 12 : 18 fr.).*Gouttes* (Phospho-Strychnal : association Strychnal, 0,005 ; acide phosphorique, 0,15 ; Glycérophosphates, 0,24 pour XX gouttes), XL à LX gouttes par jour : 14 fr. 50.*Arsi-Strychnal* (Strychnal et cacodylate), 1 à 2 par jour : 18 francs.**Laboratoires LONGUET**34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable.

Glycérophosphate de soude, nucléinate de soude et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc. par 24 heures.

Indications.

Coup de fouet à l'organisme, Asthénie, Convalescence.

Prix : 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

STRYCHNOPHYL

Gouttes Strychno-Phosphatées-Magnésiennes.

Acide phosphorique ; Phosphate disodique ; Chlorure de Magnésium ; Sulfate de Strychnine, 1 milligramme par dose de XXX gouttes.

Indications. — Toutes Asthénies, Surmenage, Neurasthénie, Atonies Gastro-intestinales, Dépression, Convalescence des maladies infectieuses, Arthritisme, Alcalose, Etats pré-néoplasiques, etc...

Doses et mode d'emploi. — Sauf indications contraires du médecin :

Adultes : XXX gouttes dans un peu d'eau au début ou au cours des repas de midi et du soir.

Enfants : demi-doses.

Présentation. — Flacon pour 15 jours de traitement : Prix : 14 francs.

Dans les cas où la Strychnine est contre-indiquée, prescrire :

STHÉNOPHOS

Gouttes Phosphatées-Magnésiennes.

Même composition sans Strychnine, mêmes doses.

Laboratoires CREUZÉ

74, rue de Lourmel — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaug. 30-05.

STRYCHNOTONINE

Composition. — Une dragée =
0 gr. 0030 de méthylarsinate de calcium.
0 gr. 0005 de chlorhydrate de strychnine.

Action. — Tonique général et nervin, accélérateur de la nutrition, léger stomachique.

Indications. — Asthénie nerveuse, neurasthénie essentielle, psychasthénie, pithiatisme, mélancolie, anémies, convalescences, énurésies nocturnes infantiles.

Posologie. — 1 à 3 dragées 3 fois par jour avant les repas.

Présentation et prix. — Flacons de 75 dragées : 17 francs.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd Latour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

STUPHO

Antidiarrhélique sans toxiques.

Composition. — Lactate de Chaux, Salicaire, Benzo-naphtol.

Dépourvu de toute toxicité, doit remplacer le ferment lactique dont l'action est infidèle.

Convient à tous es âges :

2 présentations. Usage moyen. Durée : 4 jours.	{	Granulés : Vanillé, saveur très agréable. L'étui métal : 125 gr. Prix : 12 fr. A croquer ou dissous dans l'eau tiède.
		Prescrire par jour : { à bouche pour adultes. 2 à 4 cuil. { à dessert pour enfants. à café pour bébés.
		Comprimés : Le tube : 20 comprimés. Prix : 7 fr. Prescrire par jour : 2 à 6 comprimés pour adulte.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie.

BONDY (Seine).

Tél. : 24 Bondy.

SUCRE ÉDULCOR

dit le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical. Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

Prix : la petite boîte : 5 fr. 50.

La grande boîte : 20 francs.

LITHARSYNE

Indications. — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

Posologie. — *Gouttes* : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Prix : 12 francs.

Laboratoires E. FERRÉ

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 98-45.)

SUCRE « VITA D »

Juxtaposition de saccharose et vitamine D cristallisée (calciférol).

Composition :

Vitamine D.. 10 000 unités internationales.

Saccharose .. 100 grammes.

Chaque morceau de sucre pèse 5 grammes et contient 500 U. I. de Vitamine D.

Propriétés. — Associe les propriétés anti-rachitiques de la Vitamine D aux propriétés toni-nutritives du saccharose.

Le morceau de sucre « Vita D » est dosé rigoureusement à 500 U. I. de Vitamine D.

Indications. — Rachitisme, tous les cas de décalcification et de déminéralisation de l'organisme, Poussées dentaires chez l'enfant, Caries dentaires chez l'enfant et chez l'adulte, Fractures, Grossesse, Allaitement, Convalescences.

Présentation. — Le sucre « Vita D » se présente sous forme de morceaux de sucre de 5 grammes (boîtes de 320 gr. net).

Posologie et mode d'emploi :

Remplace, à quantité égale, les qualités nutritives et caloriques du sucre ordinaire.

Peut être facilement mélangé aux biberons du nourrisson ou croqué par les enfants et adultes.

Nourrissons : 1 à 4 morceaux par 24 heures dans les biberons.

Enfants de 1 à 10 ans : 4 à 8 morceaux par 24 heures.

Enfants au delà de 10 ans et adultes : 8 à 10 morceaux par 24 heures.

Laboratoires Français du Sucre

J. HERNANDEZ, Pharmacien

40, rue François-I^{er} — PARIS (VIII^e).

SUFROLAX

Régulateur physiologique des fonctions biliaires et intestinales.

Présentation. — Comprimés.

Composition. — Soufre actif. Opothérapie biliaire et pancréatique, Erepsine. Ferments lactiques, charbon activé. Extraits de *Laminaria* et *Rhamnus frangula*.

Avantages. — Médication soufrée nouvelle. Antitoxique. Rééduque sans accoutumance.

Indications. — Affections hépatiques et biliaires. Dermatoses. Arthritisme, Hypertension, Constipation.

Posologie. — 1 à 6 comprimés par jour suivant avis du médecin, au début des repas, ou le soir au coucher.

Prix : 10 francs. Durée moyenne 8 à 10 jours.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS
(Tél. : Avron 35-04.)

SUFROL CROSNIER

(Comprimés.)

Composition. — Complexe de Soufre sous ses 3 formes actives : Hydrogène sulfuré naissant, Hyposulfites alcalins, Soufre micellaire ; Térébenthine colloïdale.

Indications. — Toutes les indications du soufre, en particulier affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, pharyngites ; lymphatisme ; dermatoses ; arthritisme ; rhumatisme chronique ; goutte.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés au début des deux principaux repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 10 francs l'étui de 40 comprimés.

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.
(Tél. : Avron 35-04.)

SUISÉRYL

Composition. — Sérum normal de porc.

Indications. — Colibacillose dans toutes ses manifestations. Toutes les infections typhiques et paratyphiques. Fièvre de Malte.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 10 cc., pour un traitement de 3 jours.

Posologie : *Voie buccale :* Absorber le contenu d'une ampoule matin et soir, loin des repas, dans un peu d'eau sucrée.

Voie rectale : Dans les infections typhiques ou paratyphiques, injecter dans le rectum 30 à 40 cc. de *Suiséryl* dilués dans un égal volume d'eau après l'effet d'un lavement évacuateur.

Prix : 25 francs la boîte.

Laboratoires du D^r ROUSSEL.

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-24).

SULFAN

Forme. — Comprimés à sucer lentement.

Composition. — Monosulfure de sodium, Borate de soude, Extrait d'Erysimum, Teinture d'Aconit, sucre et réglisse.

Propriétés. — Type par excellence du gargarisme sec fondé sur l'action élective du soufre, de ses vapeurs et de ses dérivés sur les muqueuses et les ganglions des voies respiratoires. Agent essentiel de métabolisme.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des grosses bronches. Tous états infectieux ou toxi-infectieux.

Posologie. — 2 à 5 comprimés par jour.

Prix : le tube de 24 comprimés : 8 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire DALAYEUN, pharmacien

15, rue de Paris — SANNŌIS (Seine-et-Oise).
(Tél. : 19.)

SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de sodium. Teneur en arsenic : 19 p. 100.

Injections (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

Indications. — Syphilis, Hérédo-Syphilis, Paludisme, Pian, Infection puerpérale, Blennorrhagie, Érysipèle, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Goitre endémique, Angine de Vincent, Dermatoses chroniques, Zona, Pyorrhée alvéolaire, Interventions chirurgicales, Aphtes

Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 ctgr	1,5	2	3	6	12	18	24
5 6	7 8	9 10	11 12	13				
30 36	42 48	54 60	72 84	96 ctgr.				

Voir *Arsénos-Solvant* :

Durée moyenne des unités vente.

On considère généralement suivant les doses, que 12 ctgr. sont éliminés en 24 heures.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie,

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

SULFARSIODE

Composition et dosage :

Iode.....	0 gr. 006 par cc.
Arsenic.....	0 gr. 002 —
Soufre allylique	0 gr. 004 —
1 cc. représente XLII gouttes.	

Indications :

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie :

Bébés, selon l'âge, VI à XII gouttes par jour.

Adolescents — X à XX — —

Adultes — XV à XXX — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Forme et prix : Gouttes : 17 francs le flacon.

Préparé par le Dr ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON

Dr A. IMBERT, Pharmacien

(Tél. Burdeau 28-96.)

SULFEX

Traitement synergique.
Séborrhées, Acnés, Folliculites.

Forme. — Lotion.

Composition. — Soufre, Borate de soude, Chlorure mercurique, Éther, Camphre dans excipient glyciné aromatisé.

Indications. — Kérose, Acnés, Comédons, Folliculites, Eczématides, Séborrhée.

Posologie. — Tamponner les parties malades le soir avant de se coucher.

Nota. — Dans les cas rebelles, ajouter au traitement externe le traitement interne suivant : *prendre deux fois par jour une mesure de SULFEX POUDRE dans un peu d'eau après les repas.* (Chaque boîte de poudre est accompagnée d'une mesure.)

Prix :

Lotion : 18 fr. 50. Poudre : 18 fr. 50.

Le flacon vente est suffisant pour un traitement moyen d'environ 3 semaines.

Laboratoire du SULFEX

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE. Tél. : 19-84.

SULFHYDRAL CHANTEAUD

Composition. — Granules contenant chacun 1 cgr. de Sulfure de Calcium pur. Au contact des liquides organiques dégage de l'hydrogène sulfuré naissant.

Présentation. — Boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 granules.

Indications. — Antiseptique très actif des voies aériennes et digestives. Angine, Grippe, Rhume, Rougeole, Scarlatine, etc.

Mode d'emploi, doses. — Sans danger. Non toxique. On peut sucer les granules ou les dissoudre dans de l'eau plus ou moins chaude pour gargarisme ou boisson.

Enfants : Jusqu'à 5 granules par jour.

Adultes : Jusqu'à 12 ou 15 granules par jour.

Prix de vente : 12 francs (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine). (Tél. : Clignancourt 02-28.)

SULFOBIOI AGUETTANT

Antianaphylactique, antitoxique, anti-choc.

Granulé. — Groupement de soufre et d'Hyposulfite alcalin.

Ampoules. — Plasma naturel isotonsé, renforcé d'Hyposulfite, Anti-choc.

Indications principales. — Déséquilibres humoraux.

a. Insuffisance hépatique, Foie torpide, Langue saburrale, Inappétence, Lassitude, Maux de tête au réveil.

Intoxication intestinale et ses conséquences, Acné, Urticaire, Strophulus infantile, Prurigos, Psoriasis.

b. Inflammations chroniques du tube digestif (Pharyngite chronique, Entérocholite), et de l'arbre respiratoire (Asthme, Rhinite, Bronchite catarrhale).

c. Rhumatisme articulaire chronique, Algies musculaires, Névralgies.

Action. — Apport au foie de la molécule de soufre nécessaire à sa fonction thiopexique ; destruction des indols, scatols et poisons d'origine intestinale. Dissolution des floculats par l'hyposulfite.

Doses. — *Granulé* à croquer ou faire dissoudre. Matin et soir, une cuiller à dessert (enfants : une cuiller à café).

Ampoules en injection intramusculaire ou intraveineuse, ou en lavement à garder le soir au coucher.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

SULFO-BORE

Thérapeutique soufrée.

Composition :

Poudre antiseptique, désodorisante (par l'anhydride sulfureux et le soufre naissants).

Indications :

Gynécologie : Métrites, leucorrhée, suites de couches, toilette intime quotidienne, prurits (une à deux cuillerées à soupe par litre d'eau chaude).

Affections de la peau : Pellicules, acné, sueur des pieds, des aisselles (en lavage ou saupoudrage).

Coryza, ozène (en prise ou humage).

Maux de gorge (en gargarismes) : 1 cuillerée à café par verre d'eau chaude.

Avantages :

N'irrite pas, n'est pas toxique, ne tache pas.

Laboratoires A. ROY

81, boulevard Suchet — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 05-46.)

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal	0,02
Extrait de bile	0,05
Extrait de foie	0,05
Entérokinase	0,02
Extrait de pancréas.....	0,02
Urotropine	0,05
Aloïne	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hémotoclasique de Widal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 10 francs.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.

113 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

SULFOCAÏNE FAYÈS

Pastilles.

Composition. — Soufre naissant, Stovaïne, les alcaloïdes de la Belladone et de l'Aconit, aromat. à l'essence de menthe et menthol.

Indications. — Affections aiguës du pharynx et du larynx, Séquelles d'amygdalites, état congestif pharyngien des chanteurs, pharyngite des fumeurs.

Mode d'emploi. — 4 à 8 pastilles par 24 heures. Une pastille = 1 cuillerée à café de potion.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SULFOCRÈME LILESS

Composition. — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

Indications. — Séborrhée, acné.

Mode d'emploi. — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration ; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix : 12 francs.

Laboratoires FISH (S. A. R. L.)
Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :
104, faubourg Poissonnière (X^e).
(Tél. : Lamartine 92-52.)

SULFODERMOL FLAHAUT

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, Etats séborrhéiques, et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopécies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

Mode d'emploi. — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas. La boîte 30 cachets.

Prix : 13 francs.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommade.

Doses et mode d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesures 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 cgr. de soufre colloïdal. — Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires, 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritisme. Syphilis.

Prix : *Granulé* : 16 fr. — *Ampoules* : 18 fr.

— : *Pommade* : 1/15, 2/15, : 14 fr. ; 11 fr.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 37-85.)

SULFOLAX

Laxatif doux, toni-hépatique, antitoxique.

Composition. — Soufre de l'Ichthyol, Extraits biliaires, Artichaut, Boldo, Combretum, Evonymine verte, Cascara, Agar-Agar.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés au repas du soir.

Indications. — Constipation, Insuffisance hépatique, Auto-intoxications et tendances toxémiques, Manifestations du Neuro-Arthritisme.
*Innocuité absolue, Aucun toxique, Aucun drastique.
Pas d'accoutumance.*

Prix du flacon de 60 comprimés : 12 francs.

Laboratoires du VAGOSÉDYL

20 et 22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

SULFOLIVE

Composition. — Pommade à base du support actif : Oléostat (nom déposé), Huile d'Olive *Vierge* solidifiée et saturée par procédé catalytique assimilé synergiquement au soufre incorporé à l'Huile d'Olive par saturations fractionnées.

Propriétés et Indications. — Spécifique du Rhumatisme et de toutes les douleurs articulaires par pénétration du soufre *in loco*. Analgésique.

Indiqué également pour les dermatoses dans lesquelles la combinaison Soufre-Huile d'Olive a son application.

Mode d'emploi. — Le *Sulfolive* fond aussitôt au contact de la peau et pénètre par léger massage.

Grand tube. — Petit tube.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

(Voir Boldolive, Supplolive et Dermolive.)

SULFORGAN

Soufre organique naturel assimilable.

A haute teneur en soufre (13 p. 100 de soufre à l'état sulfinique), le *Sulforgan* recharge les tissus et liquides humoraux en soufre organique.

Composition. — Huile soufrée organique dans un véhicule approprié.

Avantages. — A doses thérapeutiques, le *Sulforgan* est parfaitement bien toléré.

Il ne présente aucune contre-indication. Piqûres indolores, sans aucune réaction fébrile.

Indications. — Douleurs rhumatismales récentes ou chroniques, lithiases hépatiques et rénales et leurs complications, maladies de la peau (eczéma, psoriasis, etc...), affections nerveuses (paralysies, névrites, zona), affections chroniques (ostéites, fistules, etc...), affections chroniques de l'appareil respiratoire, urinaire, etc... Infections intestinales.

Présentation, Posologie et prix. — *Ampoules de 2 cc.* Une ampoule intramusculaire tous les deux jours, tous les jours dans les cas aigus. 30 francs la boîte de 6 ampoules.

Pilules : 2 à 6 par jour, 15 francs la boîte de 50 pilules.

Pommade : 12 francs le tube de 35 grammes environ.

Laboratoires du Soufre Organique.

16, rue de Gramont — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 83-83.

SULFO-RHINOL DU D^r FAYÈS

Baume nasal au Soufre précipité naissant aromatisé à la teinture de benjoin.

Indications. — Affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx; modificateur des sécrétions nasales en particulier dans l'ozène. Préventif en cas d'épidémies.

Propriétés. — L'H²S naissant, qui se produit dans les voies aériennes supérieures, permet une inhalation prolongée de ces vapeurs à action bactéricide incontestable.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois dans chaque narine matin et soir.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

3, rue d'Alexandrie — PARIS.

SULFOSALYL

Complexe médicamenteux à base de Polysalicylates, Soufre et Calcium associés à l'Opothérapie. Capsules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin.

Suppression totale de toute irritation gastrique.

Composition. — Pour une capsule glutinisée :

Salicylate de Sodium.....	0,20
Salicylate de Potassium.....	0,01
Salicylate de Calcium.....	0,006
Hyposulfite de Sodium.....	0,10
Gluconate de Calcium.....	0,05
Thiosinamine.....	0,005
Poudre de Thyroïde.....	0,001
Poudre de Parathyroïde.....	0,0001

Indications. — Tous les Rhumatismes Chroniques, Arthrites, Arthroses, Algies rhumatismales (Compléter le traitement par *Histalgine* en piqûres intradermiques), Rhumatisme Articulaire Aigu (dans les cas de Salicylo-résistance).

Posologie. — 8 à 15 capsules et plus par 24 heures. De préférence pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Prix. Boîte normale : 14 fr. 50. Triple boîte : 33 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1001-16.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale (Sarein)

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37).

SULFOSINE « LEO »

Pyrétothérapie

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.

(Huile soufrée stérilisée.)

Indications. — Paralysie générale. Syphilis nerveuse et autres affections syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la démence précoce, la Schizophrénie, l'Encéphalite épidémique chronique, etc...

Forme. — Deux dosages :

1^o Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre.

2^o Fort : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 de soufre.

Deux séries : 1^o Une boîte de 10 ampoules de 10 cc. 2^o Une boîte de 10 ampoules assorties : 2 de 1 cc. ; 3 de 5 cc. ; 5 de 10 cc.

Sulfosine anesthésique à 1 et 2 p. 100.

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.

Posologie. — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier traitement est de 1 à 2 cc. ; on augmente ordinairement chaque dose de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc. La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX

Dépôt pour la France :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfite de Soude agréable au goût, granulé

1° Affections des voies respiratoires (Subaiguës ou chroniques)
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Ozène, adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites trainantes. Trachéobronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectorations tenaces (la Sulfo-Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermique par les eaux sulfureuses ; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

2° Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :

Accidents anaphylactiques, acné, eczéma, urticaire, etc.).

Laxatif léger. — Désinfectant sûr.

3° Maladies par ralentissement de la nutrition.

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc.,

4° Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or, de mercure, de bismuth, d'arsenic.

Renforce leur action — Empêche les phénomènes d'intoxication,

Posologie

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Prix : P. M. 13 fr. 50 — G. M. 35 francs.

Laboratoire de la Sulfo-Thiorine

39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

SULFOXAL

La seule pommade à base de soufre libre et dissous.

Composition. — Soufre: 4 p. 100. Excipient: lanoline, huile d'arachide, cire de Carnauba.

Indications. — Séborrhée et ses applications acnéiques (visage ou région dorsale). Surséborrhéides des vieillards. Formes érythrodermiques du Psoriasis, Dermatoses rouges, prurigineuses (séborrhéides et eczématides) ainsi que Prurigo et Lichen. Etats parasitaires, Rhumatismes. Pour certains eczémas suintants: surveiller le traitement.

Mode d'emploi. — Appliquer le *Sulfoxal* sur la partie malade et sur son pourtour. Frictionner si possible. Protéger du frottement des vêtements par un linge fin.

En cas de suintement: graduer l'action du *Sulfoxal*, afin d'éviter une trop grande réaction.

C'est seulement à **l'état libre** et surtout **en solution** dans un excipient absorbable par la peau que le soufre peut montrer toute son activité et agir avec son maximum d'efficacité: *Corpora non agunt, nisi soluta*.

Sulfoxal est le **seul produit actuel** présentant le soufre libre et dissous dans un excipient de pommade. Il constitue une véritable découverte chimique basée sur une réaction toute nouvelle. Il possède de ce fait une supériorité incontestable sur les soufres précipités ou colloïdaux. Il agit directement en surface et en profondeur.

Sulfoxal offre, de plus, l'énorme avantage de ne jamais irriter et d'éteindre instantanément la démangeaison.

Laboratoire du SULFOXAL

48, rue Claude-Lorrain. — LILLE.

SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

Propriétés. — Médication sulfureuse active, régulière, pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

Quatre formes. — a. *Pastilles* ; b. *Granulé* : composition stable, saveur très agréable, aucun goût sulfureux lors de l'ingestion. c. *Comprimés inhalants* : très fort dégagement sulfureux instantané ; d. *Ampoules buvables* : 1 ampoule permet d'obtenir immédiatement 1 litre d'eau sulfureuse synthétique, très économique.

Indications. — Infections du rhino-pharynx. Toutes infections catarrhales, traînantes, rebelles et récidivantes des voies respiratoires. Toutes affections traitées par les médications Arsenicales, Bismuthiques, Mercurielles, etc. (accroît leur tolérance et débloque les réserves toxiques accumulées par l'organisme).

Posologie et prix :

Pastilles. — États aigus : 4 à 10 par jour ; états chroniques : 2 à 5 par jour. *Enfants* : 1 à 5 par jour. Prix : 15 francs.

Granulé. — 4 à 9 cuillerées à café par jour suivant l'âge. Prix : 15 francs.

Inhalant. — 1 à 3 comprimés dans un verre d'eau. Prix : 15 francs.

Ampoule. — Diluer 1 ampoule dans un litre d'eau ; en prendre 1/2 verre matin et soir. Prix : 27 francs la boîte de 12 ampoules.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS — OULLINS (Rhône).

SULFUR CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

Composition. — Soufre colloïdal, 0 gr. 10 pour une ampoule de 10 cc.

Posologie. — Diluer l'ampoule dans 250 cc. d'eau (1/4 de litre). De la dilution : 2 à 3 cuillerées à soupe au coucher. C'est donc une AMPOULE-SEMAINE.

Avantages. — Etat colloïdal, véritable pseudo-solution conservant les mouvements browniens. Pas de mauvaise odeur sensible.

Indications. — *Arthritisme* : Rhumatisme aigu et chronique, lumbago, Dermatoses (eczéma, acné), Bronchite emphysémateuse, catarrhe. — *Oto-rhino-laryngologie* : faire 4 ou 5 inhalations avec une ampoule diluée, y associer le traitement par voie buccale. — *Adjuvant du traitement syphilitique* (Hg As Bi) forcer les doses : 6 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 18 francs la boîte de 3 ampoules-semaines.

Laboratoire MORELLET, Pharmacien,

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

BAGNOLES-DE-L'ORNE.

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie aux Arts et Métiers à Paris.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant.

Indications thérapeutiques. — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, **Extinctions de voix**, Fatigue des cordes vocales, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales et en lavements contre les oxyures.

L'effet désensibilisateur et curatif est certain dans l'Eczéma, l'Acné et toutes les affections de la peau.

L'emploi simultané de la boisson et du bain sulfureux prévient et guérit les intoxications par métaux lourds (Hg, Bismuth, etc.).

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson, en bains et en comprimés inhalants. Il est des plus efficaces en *inhalations* et pulvérisations.

Mode d'emploi :

- 1° *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.
- 2° *Pour oxyures* : 5 jours de suite un lavement de un verre d'eau tiède avec une mesure de poudre sulfureuse ; à garder quelques minutes. Répéter 3 séries de 5 jours avec intervalles de 8 à 10 jours.
- 3° *Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.
- 4° *Pour pulvérisations* : se servir d'un pulvérisateur pour solutions aqueuses.
- 5° *Pour prévenir ou guérir l'intoxication par les métaux lourds* : Hg, Bis, Or ... ; un verre d'eau sulfureuse le matin ou matin et soir.

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix et durée moyenne :

Boisson : 13 fr. 50, 20 jours. — Bain : 6 francs, 1 bain.

Comprimés inhalants : 14 fr., 15 jours.

Laboratoire POMPANON

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

(Tél. : Trudaine 95-69.)

SULFURINE DU Dr LANGLEBERT

A base de soufre associé au carbonate sodique.

Présentation :

- a. Boîte pour bains contenant des tablettes cristallines nécessaires pour un bain entier. Chaque boîte contient, en outre, un comprimé permettant de parfumer le bain à volonté.
- b. Savon.

Indications thérapeutiques :

- a. *Bain*. — Bain soufré alcalin, sans odeur ou parfumé, réalisant à domicile le bain hygiénique par excellence. Tonique, fortifiant. Beauté et souplesse de la peau. Dermatoses, rhumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, rachitisme, convalescence.
- b. *Savon*. — Le meilleur des savons de toilette complète l'heureuse action de la sulfurine pour bains.

Posologie. — Bains : une boîte entière pour un bain d'adulte. 2 ou 3 tablettes pour un bain local. Un quart de boîte pour un petit bain d'enfant.

Savon pour la toilette journalière.

La boîte	6 fr.
Le savon	6 —

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anciennement **ADRIAN et Cie**,
9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 97-80, 81-82.)

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Prix : 30 francs pour 8 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIÈUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

SULFURYL MONAL

Médication Sulfureuse. — 2 Usages, 5 Formes.

Cinq formes. — Pastilles, Granulé, Comprimés inhalants, Bain inodore, Savon.

Usage interne. — Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

Usage externe. — Comprimés inhalants pour inhalations, humages, gargarismes, pulvérisations, etc. Bain tonique inodore ; Savon, soins de la peau, dermatoses.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Propriétés. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges. Permet d'instituer d'une façon active partout, et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Doses. — *Usage interne :* Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour ; Croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour (forme recommandée pour les enfants).

Usage externe. — Inhalations : Un comprimé dans un récipient d'eau chaude toutes les 2 minutes.

Un paquet Bain SULFURYL MONAL pour un bain d'adulte et 1/2 paquet pour un bain d'enfant. Savon de SULFURYL MONAL pour la toilette des peaux délicates.

Prix. — Sulfuryl Monal :

Pastilles. Le tube.....	14	francs
Granulé. La boîte	14	—
Comprimés inhalants. Le flacon.....	14	—
Bain (sans odeur). La boîte..	6	—
Savon. Le pain.....	6	—

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

SULF-Y

Composition. — Fenugrec et soufre.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Amaigrissement, affections chroniques du poumon (toux opiniâtre, bronchites chroniques, bronchites suspectes, prébacillose, bacillose) et de l'intestin (entérite bacillaire, entérites chroniques, infections intestinales).

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 12 francs.

Durée de la boîte : 12 à 14 jours.

M. SALAVERT

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (Gironde).

Tél. : 243.

SULSOD

Désinfection intestinale par osmose. Carence soufrée.

Comprimés renfermant 0,44 de SO^4NA^2 anhydre pur.

Indications. — Toutes maladies de l'appareil digestif, et conséquences : constipation, entérite, diarrhée, infections intestinales, aérophagie, affections cutanées. Adjuvant dans le traitement des affections hépatiques, biliaires, rénales, colibacillose, pyélo-néphrites.

Action. — Soluble très lentement dans l'intestin, détruisant les bactéries par plasmolyse. Absence de toxicité.

Emploi. — Généralement associé au LEPTAB à raison de 5 Sulsod et 1 leptab à la fin des repas. On peut augmenter les doses si nécessaire.

Présentation. — 2 modèles, sous boîtes aluminium :
8 francs (8 jours) ; 24 francs (1 mois).

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

SUNALCOL

Solution alcoolo-acétonique à 2 p. 100 de

Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine.

Propriétés. — Puissant antiseptique cutané dépourvu de toute toxicité et de causticité. Très pénétrant, stimule les moyens de défense de l'organisme.

Supplante la Teinture d'Iode dans tous ses emplois antiseptiques et antimycosiques. Inaltérable.

Indications. — Asepsie du champ opératoire. Désinfection des plaies traumatiques. Traitement des dermites microbiennes, des mycoses, des levurides.

Stomatologie. — Tous les usages de la teinture d'iode comme antiseptique et désodorisant.

Mode d'emploi. — Emploi à l'état pur en badigeonnages et seulement en applications externes.

Présentation :

Forme normale. — Non colorée, ne tache pas.

Forme chirurgicale. — Colorée, pour la désinfection des champs opératoires.

Flacons de	25 cc.....	7 fr.
—	125 cc.....	25 —
—	500 cc.....	80 —

Établissements KUHLMANN

Produits R. A. L. Spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e). (Tél. : Élysées 99-51.)

SUNOXOL

Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine

Propriétés. — Antiseptique non toxique, non caustique, non irritant pour usage général. Ne coagule pas les albumines, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

Indications. — Antisepsie en dermatologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie, gynécologie, obstétrique. — Traitement de l'oxyurose en lavements dilués.

Présentation et mode d'emploi :

I. Comprimés à 0 gr. 50 de Sunoxol.

Solution à 0,5 p. 1 000 (1 comprimé par litre d'eau). Asepsie générale. Soins intimes.

Solution à 1 p. 1 000 (2 comprimés par litre d'eau). Gargarismes, irrigations rhino-pharyngiennes, instillations nasales, lavages des plaies complexes, injections vaginales.

Solution à 4 p. 1 000 (1 comprimé pour 125 cc. d'eau). Lavements pour le traitement de l'oxyurose (à appliquer en même temps que le traitement *per os* au Binoxol).

Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50 : 7 francs.

II. Solution hydroglycérinée à 33 p. 100 de Sunoxol.

Peut servir à préparer, par simple addition d'eau, toutes les dilutions voulues.

Une mesure jointe au flacon correspond à 2 comprimés à 0 gr. 50 de Sunoxol (voir Table des dilutions ci-dessus).

Solution pure. — Badigeonnage des plaies infectées et ulcérées, des dermatoses.

Flacons de 25 cc. : 15 francs ; 125 cc. : 48 francs ; 500 cc. : 180 francs

III. Ovules au Sunoxol.

Dosés à 0 gr. 20 de Sunoxol par ovule. Ne tachent pas le linge.

Boîte de 6 ovules : 15 francs.

IV. Pommade au Sunoxol.

Dosée à 1 p. 100 de Sunoxol.

Affections microbiennes et mycosiques de la peau : impétigo, eczéma intertrigo.

Prurit anal et vulvaire.

Décongestionnante et cicatrisante, elle est un auxiliaire précieux dans le traitement des brûlures, engelures, gerçures, crevasses, rougeurs, hémorroïdes.

Tube : 7 francs.

V. Pansements sur adhésif au Sunoxol.

Gaze imprégnée d'une solution à 10 p. 100 de Sunoxol sur sparadrap adhésif à l'oxyde de zinc.

Pochette : 8 francs.

Établissements KUHLMANN

Produits R. A. L. Spécialisés

145, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Elysées 99.51 à 57.)

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne.

Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — *Adultes.* — Suppositoires à 0 cgr. 04 de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrissons : 0 cgr. 01 et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0 cgr. 02.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instables. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif. On mélange à une solution d'arséno-benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'*EXTRAIT de FOIE*, les tréponèmes sont foudroyés. Peuvent être prescrits comme désinfectants ou hépatogènes.

(Expériences de Levaditi.)

Prix, Taxe d'état comprise :

Adultes : 14 francs. — Enfants : 12 francs. — Nourrissons : 12 francs.

Laboratoires du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien.

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

SUPPOALGOS

Composition :

Extrait de belladone	0,015
Extrait de jusquiame	0,025
Extrait de piscidia	0,025
Amidopyrine	0,30
Citrophénétidine	0,50
Dionine	0,03
Beurre de cacao	Q. S. pour 3 gr.

Actions thérapeutiques. — Spécifique de l'élément. douleur. Antispasmodique, Hypnotique, Analgésique, Sédatif, Antithermique.

Indications. — Névralgies, Douleurs tabétiques, rhumatismales et utérines. Spécifique des règles douloureuses, Accès d'asthme et d'emphysème, Coliques intestinales, Néphrétiques, Hépatiques, Angines, Otites, Mastoïdites, Hémorroïdes, Prostatites, Insomnie causée par la douleur.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6 : 15 francs. (Impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

Tél. : Moncey 14-35.

SUPPOCAMPHYRL

Composition :

	<i>Adulte.</i>	<i>Enfant.</i>	<i>Bébé.</i>
Sulfocamphonate de soude.	1 gr.	0,50	0,25
Beurre de cacao. Q. S. P.	3 gr.	2 gr.	1,40

Actions thérapeutiques. — Stimulant des affections pulmonaires et cardiaques et du système nerveux. Antispasmodique.

Indications. — Les mêmes que celles de l'huile camphrée. Adynamie, Collapsus cardiaque, Pneumonie, Broncho-pneumonie. États de shock traumatiques et opératoires.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance. — La boîte de 10 :
Adultes : 15 francs. — *Enfants* : 13 fr. 50. — *Bébés* : 12 francs. — (Impôt compris.)

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

Tél. : Moncey 14-35.

SUPPOGLANDINES

Suppriment les piqûres et leurs ennuis.

Traitement des déficiences glandulaires par suppositoires d'extraits d'organes frais et de lécithine (0 gr. 50 par suppositoire) qui tonifie le système nerveux et régularise l'assimilation.

Nos dosages sont en organes frais et non en extraits.

Les boîtes sont de 10 suppositoires : Un au coucher.

Nous exécutons toutes formules sur prescription.

Formule

Prix à titre indicatif.

1	Ovaire 1 gr.	Insuffis.; Ménop.; Ovariot.	22 fr.
2	Surrénale 0,25 Testicules 0,75	Défic. sexuelle, surmenage Toutes psycho-asthénies	21 fr.
3	Thyroïde 0,05	Défic. et Instabilité, Obésité	18 fr.
4	Testicules 2 gr. Prostate..... 0,20 M Gl. Interstitielle . 0,30 Hypophyse 0,20 Yohimb.; Nucléin. Mn.	Impuissance Prostatite Neurasthénie sexuelle Sénilité précoce	35 fr.
5	Hypophyse 0,25 Thyroïde 0,05 Ovaire 0,70	Troubles interglandulaires et adiposo-génitaux	26 fr.
6	Cortico-surrénal 0,50	Hypotension, Interv. chirurg.	22 fr.
7	Parathyroïde..... 0,02	Tr. du Métab. calcique, etc.	25 fr.
8	Post-hypophyse 6. U. I	Hypoviscosité sanguine	35 fr.
A	Thyroïde 0,01 Hypophyse 0,10 Surrénale 0,05 Ext. belladone .. 0,01 Ext. Lobelia..... 0,01 Ext. Euphorbia . 0,04 Chl. Ephédrine . 0,08 Iodure caféine .. 0,10	Asthme 1 à 2 suppositoires par jour	20 fr.
C	Post-hypophyse 5 U. I. Parathyroïde.... 0,05 Thyroïde 0,02	Constipation chronique Stase, Atonie, Parésie intest. 1 tous les 2 jours.	26 fr.
D	Foie..... 10 gr. Thyroïde 0,02 Surrénale 0,10 Caséinates fer et Cu.	Toutes affections cutanées : Eczéma, Psoriasis Prurit, Urticaire	20 fr.
V Y	Foie..... 10 gr. Sels biliaires 0,05 Peptone sèche... 0,01	Tous les troubles de la fonc- tion hépatique	26 fr.

SUPPOGLANDINES INFANTILES

J F	Ovaire	0,20	Troubles et retard de la puberté et de la croissance. Insuffis. glandul. des fillettes Troubles adiposo-génitiaux Instabilité et nervosisme	20 fr.
	Hypophyse	0,10		
	Surrénale	0,10		
	Lécithine	0,25		
	Caséinates de cuivre + fer $\alpha\alpha$	0,001 0,001		
J G	Nucléinate de Mn.	0,001	Troubles de la puberté des jeunes garçons Adynamie des fillettes Troubles adiposo-génitiaux Enurésie	20 fr.
	Testicule	0,15		
	Hypophyse	0,10		
	Surrénale	0,10		
	Lécithine, Caséinate, Nucléinate (Voir J. F.)			
R I	Thyroïde	0,01	Retard de développement physique et psychique Cryptorchidie, Ectopie Enurésie, Crétinisme Rachitisme infantile Etc., etc.	25 fr.
	Parathyroïde	0,01		
	Thymus	2 gr.		
	Hypophyse	0,10		
	Lécithine ; Caséinates. Nucléinate (Voir J. F.)			

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS. (Tél. : Trudaine : 45-18.)

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénéçon, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un **Suppo-Gynal**. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

En raison de leur faible teneur en morphine les Suppo-Gynals ne font pas partie du tableau B.

Prix : 13 francs.

Laboratoires LEES

Directeur : **Docteur Pierre Rolland.**

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 22-01.)

SUPPOLIVE

Composition. — Huile d'olive *Vierge* neutre rendue concrète.

Le *Suppolive* en suppositoire de 4 grammes contient 4 grammes d'huile d'Olive.

Aucun support. Aucun corps étranger.

Propriétés. — Réalise le lavement d'Huile d'Olive *Vierge* adoucissant et riche en vitamines.

Pansement intestinal.

Indications. — Colites, constipation chronique, amibes, recto-colites, hémorroïdes, stase intestinale.

Forme Belladonnée: 1 suppositoire de 4 grammes contient :

Huile d'Olive (Oléostat).....	3 gr. 73
Extrait total de Boldo	0 gr. 24
Intrait de Belladone	0 gr. 01
Intrait de Jusquiame	0 gr. 02
Total	4 gr.

Antispasmodique

Dose: 1 ou 2 suppositoires le soir ou 1 suppositoire au coucher et un autre le lendemain matin.

Boîte de 12 suppositoires *adultes*.

Boîte de 12 suppositoires *enfants*.

LES LABORATOIRES DU PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE.

Voir **Boldolive, Dermolive et Sulfolive**)

SUPPONÉRYL

Composition. — Suppositoire à base de Butyl-éthyl-malonylurée (« Sonéryl », nom déposé) et camphre.

Propriétés. — Hypnotique, analgésique (par le « Sonéryl »), calmant, eupnéique, cardio-tonique (par le camphre).

Indications. — *Toutes les insomnies : nerveuses légères, des vieillards, des anxieux, des maladies infectieuses ou fébriles, nerveuses tenaces, provoquées ou entretenues par la douleur.*

Hypoalgésie opératoire et obstétricale.

N. B. — Le *Supponéryl* ne contenant aucun alcaloïde (morphine ou autre) peut être administré en toute sécurité après les opérations abdominales.

Posologie. Adultes : — Un ou deux *Supponéryl* par 24 heures. *Enfants :* de 7 à 12 ans, un demi-*Supponéryl* et un entier à partir de 12 ans.

Prix de vente au public :

La boîte de 10 suppositoires : 13 fr. 50.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SUPPOPIRINE SECLO

Suppositoires à l'aspirine.

(Pureté absolument garantie.)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antithermique, contient en outre un anesthésique non toxique. Supprime les inconvénients dus à l'absorption de l'aspirine par voie buccale. Combat en même temps la constipation nuisible dans tous les états fébriles.

Présentation :

Adultes : 0 gr. 50 et 1 gr. d'aspirine par suppositoire.

Enfants : 0 gr. 25 et 0 gr. 50 d'aspirine par suppositoire.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires ou plus par jour selon avis médical. Pour les enfants au-dessous de 5 ans, ne pas employer sans avis médical préalable.

Prix : 12 francs.

Laboratoires SECLO

J.-P. PINTA, Pharmacien.

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE.

Tél. : Wag. 62-71.

SUPPOPULMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	<i>Adult.</i>	<i>Enfants.</i>		<i>Bébés.</i>
		N° 2	N° 1	
Créosote	0,50	0,25	0,10	0,05
Tanin.....	0,50	0,25	0,10	0,05
Scuroforme	0,10	0,05	0,02	0,01
Beurre de cacao. Q. S..				
pour.....	3 gr. 60	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Anticatharrhale, Stimulant de l'état général, Suppositoires indolores et non caustiques.

Indications. — Toux rebelles, Bronchites aiguës et chroniques, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculoses suspectées et confirmées, Gangrène pulmonaire, Préventif des affections grippales et des complications pulmonaires, Anti et post-opératoire.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 10. *Adultes* : 18 francs. *Enfants* : 16 et 15 francs. *Bébés* : 14 francs (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

Tél. : Moncey 14-35.

SUPPOQUINOL

Suppositoires anti-infectieux et anti-pyrétiques pour nourrissons et enfants.

Composition et formes. — 2 présentations :

	<i>Enfants.</i>	<i>Nourrissons.</i>
Diméthylaminoanalgésine.....	0,10	Jusqu'à
Oxéthylparaacétanilide.....	0,05	2 ans 1/2.
Chl. de quinine chim. pur.....	0,15	0,08
Argent coll. à petits grains.....	0,08	0,05

Présentation nouvelle : Boîte de 6 suppositoires ; chacun entièrement isolé dans un étui assurant une conservation rigoureusement aseptique.

Indications. — Toutes fièvres chez nourrissons et enfants
Maladies infectieuses : rougeole, grippe, scarlatine.
Pyrexie des affections respiratoires, bronchites, angines.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire matin et soir.

Aucune contre-indication.

Prix :
La boîte de 6 supp. { rose pour nourrissons. } 12 fr. 50.
 { orange pour enfants. }

Laboratoire THIERS
LE RAINCY (Seine-et-Oise).

SUPPO-SÉDOL

Association de morphine-scopolamine-spartéine en suppositoires.

Toutes les indications du Sédol (ampoules et comprimés, voir à Sédol) : sédation de la douleur intense, obstétrique, pré-anesthésie et suites opératoires, etc...

Les **Suppo-Sédol** sont, toutefois, plus particulièrement indiqués dans les :

Affections gynécologiques, règles douloureuses, prostatites, cystites, hémorroïdes, rectites, en un mot dans toutes les affections douloureuses des organes du bassin.

Efficaces pour combattre les menaces d'avortement, les **Suppo-Sédol** sont aussi utilisés avec succès dans le mal de mer.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

Prix de vente au public : la boîte de 3 suppositoires : 9 fr.

La boîte de 10 suppositoires : 25 francs.

N. B. — *Le Suppo-Sédol ne fait pas partie du tableau B.*

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10 6 lignes groupées.)

SUPPOSITOIRES ALMINE LOUVEAU

Composition pour 100 gr. :

Intrait de Marron d'Inde.....	1 gr.
Dithymol bi-iodé.....	2 gr.
Gaiacol-Phénol-Menthol, aa	0 gr. 20
Camphre Japon	1 gr. 40
Salicylate Bismuth	5 gr.
Oxyde pur de Zinc	30 gr.
Excipient spécial. Q. S. p.	100 gr.

Cette masse pour 20 suppositoires.

Propriétés. — Décongestifs et résolutifs remarquables. Action rapide, soulagement immédiat ne contenant aucun toxique.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prostatites, Rectites.

Posologie et mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir au coucher jusqu'à résultat satisfaisant.

Prix : 15 francs la boîte de 10.

Laboratoires A. LOUVEAU

Pharmacien de 1^{re} classe

78, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 65-49.)

SUPPOSITOIRES AMIBIASINE

Extrait mou de Garcinia Mangostana 0 gr. 0996

Extrait mou de Simarouba 0 gr. 0498

Beurre de Cacao Q. S. pour 2 gr.

Propriétés. — Calmant du ténesme, du prurit anal, décongestionnant, désinfectant, cicatrisant de la muqueuse ano-rectale, vermicide, anti-helminthique. Non toxique.

Indications. — Toutes affections d'origine parasitaire (amibes, lamblas, trichomonas, etc.), oxyures, ascaris, tricocephales, prurit anal, énesme rectal, rectites de toutes natures et origines.

Posologie :

Adultes : Un suppositoire chaque soir en se couchant. Série de 10 suppositoires.

Enfants : Un suppositoire tous les deux jours.

Première série de 5 suppositoires, repos 10 jours.

Deuxième série de 5 suppositoires, un tous les 2 jours.

Administration. — Mouiller légèrement le suppositoire et l'introduire le plus profondément possible.

Remarque. — La sensation de chaleur ou de fourmillement éprouvée parfois tient à l'action des principes actifs sur une muqueuse altérée. Ne pas s'en inquiéter.

Prix de la boîte de 10 suppositoires : 15 francs.

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 75-52.

SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide de la douleur; anti-sepsie et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Règles douloureuses, etc.

Posologie. — Délai nécessaire à l'action du suppositoire : 1/2 heure environ. Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*. Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutilisable, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

Prix : 15 francs, la boîte de 12 suppositoires.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél.: Ségur 96-46.) — Adr. télégr : Labobod Paris.

SUPPOSITOIRES CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone; Extrait thébaïque; Camphre; Extrait d'anémone; Extrait d'hamamelis; Chlorydrate de para-haminobenzoyl; Diétyl; Amino-éthanol; Onguent hydrargyrique double; Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blénnorragies aiguës, cystites aiguës, blénnorragies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE

192-194, rue Saint-Denis — PARIS (II^e).

Tél.: Gutenberg 41-01.

SUPPOSITOIRES CALMOVARINE

Analgésiques et Sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocaïnum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat, Aucune toxicité, Aucune irritation pour les tissus, Administration facile, Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, Dysménorrhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokystiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux, Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaux chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorragie, Cystite, Prostatite, Affections de l'appareil urinaire chez l'homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum tous les matins ou tous les soirs un suppositoire. Cas très douloureux : un suppositoire matin et soir suivant avis du médecin traitant.

Laboratoire CALMOVARINE

192-194, rue St-Denis — PARIS (II^e).

(Tél. : Gut. 85-65.)

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée et à tous les principaux médicaments, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi. — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments pour leur administration par la voie rectale.

Prix : *Adultes*, 8 francs ; *Enfants*, 6 francs.

Durée moyenne : 12 applications.

Établissements FUMOUCHE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.
Prix : 18 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 id.
Prix : 16 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.
Prix : 15 francs.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE

Antiseptiques pulmonaires.

Antithermiques.

Anti-oxydants.

Composition :

Eucalyptol	0,12
Acide Phénique	0,01
Camphre.....	0,05
Gaïacol	0,05
Codéine	0,01
Larocaïne	0,001

Beurre de Cacao... Q. S. pour 1 suppositoire.

Avantages. — Remplacent la piqûre lorsqu'elle est impossible : éloignement, pusillanimité du malade, etc.

Indications. — Celles de l'*Eucalyptine*, c'est-à-dire les affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires. Grippe, pneumonie, broncho-pneumonie, coqueluche, tuberculose pulmonaire (dans certaines formes d'évolution à tendance scléreuse ; dans les formes à tendance congestive hémoptoïque employer la forme *non-gaïacolée*), maladies infectieuses.

Laboratoire LE BRUN

155, boulevard Magenta — PARIS (IX^e).

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit, 0,015 Hg. métal.

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

SUPPOSITOIRES LOGEAIS

Composition:

Marron d'Inde.....	0,04
Genêt	0,01
Cupressus.....	0,01
Jusquiame	0,012
Teskra.....	0,012
Lanoline anhydre.....	0,015
Extrait total d'hamamélis.....	0,33
Sulfoïchtyolate de soude.....	0,33

Pour 1 suppositoire.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante, Prostatites.

Propriétés :

ATOXIQUES : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGESIQUES : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTS : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUES : Action antiseptique de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, après lavage, un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 13 fr. 75.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAIS

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

SUPPOSITOIRES MICTASOL

Réalisent la décongestion pelvienne et la sédation rapide des symptômes subjectifs et fonctionnels.

Composition :

Malva purpurea	0,50
Stovaïne.....	0,01
Extrait de Jusquiame.....	0,05
Ichtyol	0,25

Indications thérapeutiques. — Prostatisme vasculaire, rétentions, incontinence, cystites, séquelles de blennorrhagie, hémorroïdes.

Posologie. — 1 ou 2 par jour.

Laboratoire du MICTASOL

BARBE, pharmacien

155, boulevard Magenta — PARIS (IX^e).

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques.)

Adrénaline	0 gr. 00015
Stovaïne	0 gr. 025
Anesthésine.....	0 gr. 025
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé	0 gr. 05
Extrait d'Hamamelis.....	0 gr. 01

Pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi. — Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin 1 heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

N. B. — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Prix : 13 francs.

Durée du traitement : une semaine.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 51-37 et 38.)

SUPPOSITOIRES PACHAUT

Huile de Palma Christi, Glycérine,
Beurre de Cacao.

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

Présentation :

1^o Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.

2^o Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Prix :

Adultes : 10 francs. — Enfants : 7 fr. 50.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS

(Tél. : Laborde 16-72.)

SUPPOSITOIRES PAUTAUBERGE

Composition. — Chaque suppositoire contient :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Créosote de hêtre.....	0 gr. 40	0 gr. 125
Para-Amino-benzoate butylique.....	0 gr. 01	Néant.
Camphre du Japon.....	0 gr. 025	0 gr. 01
Gluconate de Calcium	0 gr. 50	0 gr. 25
Excipient au beurre de cacao.....	Q. S.	Q. S.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant et antithermique par sa créosote, reminéralisateur par son gluconate de calcium.

Indications. — Affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques de l'enfant et de l'adulte.

Action curative spécifique dans les affections à pneumocoques.

Action préventive des complications pleuro-pulmonaires de la grippe et des complications pulmonaires post-opératoires.

Posologie. — *Adultes* : un suppositoire matin et soir.

Enfants à partir de 2 ans : un suppositoire d'enfant matin et soir.

Nourrissons : 1/2 suppositoire d'enfant le soir.

Prix de la boîte : *Adultes*, 16 francs. — *Enfants* : 14 francs
(5 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS.

(Tél. : Laborde 26-47.)

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HÉMORROÏDES

La boîte : 16 francs.

La 1/2 boîte : 9 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Pereire.

PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédatrice et antithermique de choix,
complétée par une action tonique diurétique et
désinfectante.

Aspirine, Quinine, Caféine.

Administration facile chez l'enfant.

Médication précieuse chez l'adulte.

Ne fatigue pas l'estomac. Respecte le foie.

Soutient le cœur. Favorise le rein et la fonction
respiratoire.

Trois dosages : *Bébés* jusqu'à 3 ans. — *Enfants*
au-dessus de 3 ans et *adultes*.

Présentation. — 3 étuis de 2 suppos par boîte.

Posologie. — 1 à 3 par jour.

Prix :

Bébés : 7 fr. 50. — *Enfants* : 9 francs. — *Adultes* :
12 francs.

Échantillons.

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).

(Tél. : Observatoire 01-83.)

SUPPOTHERMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>	<i>Bébé.</i>
Bromhydrate de quinine	0,25	0,10	0,05
Amidopyrine	0,25	0,10	0,05
Phénacétine	0,25	0,10	0,05
Citrate de théine ...	0,10	0,05	0,02
Beurre de cacao. Q.			
S. pour	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antithermique et analgésique.

Indications. — Toutes les fièvres en général, Grippe, Infections purulentes, Courbatures fébriles, Maux de tête.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6. *Adultes* : 12 francs. *Enfants* : 10 francs.
Bébé : 8 francs (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

Tél. : Moncey 14-35.

SUPPOTONIC LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Méthylarsinate de soude.	0,05	0,025
Méthylarsinate de strychnine	0,001	Néant.
Nucléinate de soude ...	0,05	0,02
Nucléinate de manganèse	0,05	0,02
Glycérophosphate soude	0,10	0,05
Beurre de cacao. Q. S.		
pour	3 gr.	2 gr.

Actions thérapeutiques. — Tonique reconstituant. Antidéperditeur.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Rachitisme, Phosphaturie, Cachexies chroniques, Convalescences, Tuberculose pulmonaire, Dyspepsies atoniques, Paralysies d'origine périphérique.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire le soir pendant 10 jours.

Prix et contenance :

La boîte de 10. *Adultes* : 15 francs. *Enfants* : 12 francs (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON. — Tél. : Moncey 14-35.

SUPRASTHÉNYL

(Élixir)

Arséniate de soude.....	0,0025
Sulfate de strychnine.....	0,0015
Sulfogaïacolate de potasse.....	0,50
Lactophosphate de chaux.....	0,75
Excipient aromatisé.....	Q. S.

pour une cuillerée à soupe d'Élixir.

Indications. — Convalescence des affections broncho-pulmonaires. Asthénies post-grippales. Asthénies de toutes natures. Tonique des Poux-mons. Puissant antiseptique des Voies Respiratoires. Reconstituant énergique.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas.

Adolescents : au-dessus de 15 ans, 2 cuillerées à dessert.

Prix : 16 francs.

N. B. — Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau.

Laboratoire OMNITHER

33, rue Barthou — ANGOULÊME (Charente.)

SUR-BI-CAL

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Cachets.

Composition. — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ; Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour 1 cachet.

Propriétés. — Particulièrement assimilable en raison de sa solubilité dans tous les acides faibles y compris les acides de fermentation.

Indications. — Toutes les indications des phosphates de chaux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 16 francs pour 20 jours.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

SUROXYDAL

Catalyseur suroxydant Dinitrophéno-Manganeux.

Présenté en tubes de 42 comprimés dragéifiés dosés selon le poids du sujet. (Un milligr. de Dinitrophénol par kilog. et par dragée.)

6 dosages : Tubes pour personnes pesant respectivement :
50 à 59 kg. (prix : 15 fr.) ; 60 à 69 kg. (16 fr.) ; 70 à 79 kg. (17 fr.) ; 80 à 89 kg. (18 fr.) ; 90 à 99 kg. (19 fr.) ; 100 à 109 kg. (20 fr.).

Économie : Un tube pour trois semaines de traitement.

Avantages. — De la spécialité et de la formule magistrale. Permet de réaliser la *Cure d'Amaigrissement* selon la *Méthode du Dr A. Marguet*, gage d'*Effacité* et de *Sécurité*.

- 1° Restrictions alimentaires maxima.
- 2° Doses de Dinitrophénol minima.
- 3° Élimination des sujets incapables de restrictions.

Posologie. — Débuter, après perte de poids par le régime seul, par 2 dragées par jour. Ne passer à trois que lorsqu'il y a amaigrissement inférieur à 2 kg. par mois et après mesure de la valeur exacte du régime.

Longues périodes de Désimprégnation obligatoires : 1 mois de repos après 3 mois à 2 dragées ou après 2 mois à 3 dragées.

Ne pas envisager de cures d'entretien de durée indéfinie pour corriger les reprises de poids par suralimentation. (Danger d'opacification du cristallin par surimprégnations prolongées).

Grosses améliorations à espérer, mais prudence particulière au début pour traiter les complications de l'Obésité : Cardiopathies, Fortes Hypertensions, Albuminuries notables.

Indications en dehors de l'Obésité : Augmentation des oxydations cellulaires ; suractivation des échanges nutritifs ; réchauffement corporel ; activation de la circulation périphérique ; action générale euphorique. (A la dose de 2 dragées par jour, pas d'amaigrissement avec régime normal).

Toutes les affections arthritiques. Rhumatisants frileux. Plaies atones. Ulcères variqueux, Acrocyanose. Engelures.

Etats nerveux dépressifs avec asthénie, anorexie, mélancolie.

Affections gastriques atoniques. Insuffisance hépatique avec intolérance pour les graisses. Enfants inadaptés urbains. Nourrissons débilés.

Séquelles de paralysie infantile, réveil de l'activité musculaire latente.

Echantillons, Littérature. Service gratuit de la *Revue de l'Obésité*. Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments, n° 1536/2/1, 2, 3, 4, 5, 6.

Admis aux Assurances sociales.

Laboratoires C. LE FOLLET

NOZEROY (Jura).

(Tél. : Nozeroy 5.)

SURPARINE

Spasmolytique de choix.

Composition :

1 comprimé	0 gr.	06 de Perparine	— 0 gr.	002 de Novatropine
1 ampoule	0 gr.	04 de Perparine	— 0 gr.	0015 de Novatropine
1 suppositoire	0 gr.	04 de Perparine	— 0 gr.	0015 de Novatropine
	0 gr.	015 d'acide phényléthylbarbiturique		

Mode d'action et avantages. — L'antispasmodique par excellence. La Perparine, d'effets comparables à ceux de la Papavérine, est 3 fois moins toxique pour une activité triple. Sans action sur le système nerveux central, ne déterminant pas d'accoutumance, d'effet prolongé. Sans réaction atonique secondaire, elle est administrable par voie buccale. La Novatropine, pour une toxicité 50 fois moindre, produit l'effet total de l'atropine.

Indications. — Tous les spasmes. Spasmes du pylore et du cardia, vomissements, ulcus gastriques et duodénaux, hyperacidité, colites aiguës, constipation spasmodique, coliques hépatiques, cholécystites, crises d'asthme, spasme glottique, angiospasme, dyspnée paroxystique, angoisse, coliques néphrétiques, cystites, spasmes du col vésical, dysménorrhée, etc. Hoquet. Rétention gazeuse post-opératoire.

Références. — Communication à l'Académie de Médecine du 19 décembre 1933.

Posologie adultes. — La « SURPARINE » s'ordonnera de préférence avant les repas ou au moment des douleurs :

1° Per os : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

2° En injection sous-cutanée ou intra-musculaire : 2 à 3 ampoules par jour.

3° Par voie intraveineuse : 1/2 à 1 ampoule.

4° En suppositoires, 2 à 3 par jour

Il s'agit là de doses moyennes, qui peuvent être sensiblement augmentées selon les indications du médecin.

Posologie infantile. — a. *Nourrissons* : dans les vomissements habituels on donnera 1/4 comprimé dissous dans du lait avant chaque tétée, ou l'on fera une injection de 0 cc. 2 sous-cutanée. Dans ces deux cas on pourra répéter ces doses 3 à 4 fois par jour.

b. *Enfants* : jusqu'à 1 an, 1/4 comprimé ou 0 cc. 2 en injections sous-cutanées 3 à 4 fois par jour.

De 2 à 5 ans, 2 à 6 demi-comprimés ou 0 cc. 4 en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

De 6 à 12 ans, 2 à 4 comprimés ou 1 cc. en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

Présentation :

20 comprimés : 20 frcs.

100 comprimés : 90 frcs.

5 ampoules : 22 frcs.

6 suppositoires : 18 frcs.

30 suppositoires : 80 frcs.

SYNTHESIS

R.-L. MATHIVAT

Docteur en pharmacie Ex-Interne des hôpitaux de Paris.

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI°).

(Tél. : Trocadéro 32-91 et Passy 31-06.)

SURRASTHÉNINE

Composition. — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

Indications thérapeutiques. — La Surrasthénine, médicament stimulant et tonique par excellence, est le véritable spécifique de *toutes les asthénies*, et notamment de l'asthénie post-grippale.

Posologie. — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

Prix : 21 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

SURYALI

Granulé effervescent agréable. Se dissout dans peu de liquide.

Formule :

Tartrate sodique	30 gr.
Sulfate sodique.....	10 gr.
Bicarbonate sodique	16 gr.
Acide tartrique.....	18 gr.
Edulcorant	Q. S. P. 100 gr.

Indications. — Purgatif. Laxatif. Merveilleux et rapide décongestionnant du foie. Parfait diurétique.

Mode d'emploi. — *Pour le foie et comme laxatif :*
1 cuillerée à café tous les matins au réveil.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe au réveil.

Apéritif : une demi-cuillerée à café un quart d'heure avant les repas.

Durée : 2 à 4 semaines.

P. BLOUIN, pharmacien

50, rue de Turenne — PARIS. Tél. : Archives 93-14.

Dépôt général : **DARRASSE Frères**

13, rue Pavée — PARIS. — Tél. : Turbigo 84-40.

SYL CASE

Silicium, Calcium.

Formule du Docteur CRÉTIN.

Rachitisme, Décalcifications, Croissance, Fractures, Carie dentaire, Allaitement, Evite l'hypertension.

Présentation. — Comprimés, granulés, poudre, ampoules injectables.

Posologie. — 1 à 5 comprimés ou cuillers à café par jour suivant l'âge, 1 ampoule par jour.

Prix :

Comprimés.....	15 fr. 75
Granulé et poudre, grand modèle.	10 fr. 50
Granulé et poudre, petit modèle..	10 fr. 50
Injectable, 6 ampoules de 3 cc. ..	45 fr.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS (Sarthe).

SYMPATHOCRINE

Médication Sympathico-régulatrice en Élixir.

Formule :

Ethylphénylmalonylurée.....	0,20
Extrait fluide de Passiflore	2,00
Alcoolé de Cratægus	2,00
Teinture de Jusquiame.....	0,80
Thyroïde (extrait glycéринé).....	0,02
Ovaires { — — }.....	1,00
Surrénales { — — }.....	0,10
Excipient et parfum Q. S. pour 100 cc.	

Indications. — Troubles de la tonicité nerveuse, Etats anxieux, Emotivité, Troubles circulatoires, Palpitations, Vertiges, Rééducation du Sommeil.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café au moment du coucher.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

SYMPATHORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance sympathique.

Formule :	Salicylate d'ésérine.....	1/10 de mgr.
	Lobe postérieur d'hypophyse	0,002
	Camphre monobromé.....	0,10
	Glycérophosphate de Manganèse	0,02
	Valérianate de Zinc	0,025
	Extrait de Basilic	0,01
	Extrait de Ballote	0,01
	Extrait de Passiflore	0,03
	Poudre de Guarana	0,015
	Poudre de Fenugrec désodorisé	0,03
	Poudre de Jusquiame.....	0,015
Par comprimé dragéifié.		

Indications. — SYMPATHICOTONIE, Hyperémotivité, Hyperactivité, Hyperesthésie, Fausse angoisse, Agitation, Tremblements, Sommeil capricieux, Spasmes, Instabilité des fonctions gastro-intestinales, Douleurs épigastriques, précordiales, neurotonie à prédominance sympathique.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix : 18 francs (40 dragées par boîte).

Pour les Vagotoniques, voir : VAGORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le N° 988-1.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

SYMPATHYL

Synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Érétisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires et toutes insomnies d'origine neuro-végétative.

Composition :

Extrait spécial de cratægus	0,06
Extrait de boldo	0,01
Phénylméthylmalonylurée	0,01
Hexaméthylènetétramine	0,06
Peptone polyvalente	0,03

Pour 1 comprimé.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Prix : 16 fr. 50 le tube de 40 comprimés.

Laboratoire du Sympathyl

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

SYMPAX

Troubles du système Vago-Sympathique.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Extrait valériane stabilisée, Extrait Jaborandi, Extrait passiflore, Extrait de Cratægus, Extrait de ballote, Extrait muguet, Phényléthylmalonylurée, Bromhydrate de quinine, Bromure de camphre, Anémone pulv.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour, à prendre avant les repas, selon les indications du docteur.

Indications. — Céphalées, Vertiges, Insomnies, asthénie, Dépression générale, Anxiété, Angoisse, spasmes, artériosclérose, hypertension, Sédatif nerveux.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-20.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

SYNCRINES CHOAY

Nature. — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

Formes pharmaceutiques et posologie :

Cachets et Comprimés, en tubes hermétiques :
2 à 4 par jour.

Ampoules injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

Nomenclature des principales formules :

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 *bis.*.. Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 2 *bis.*.. Thyro-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 *bis.*.. Thyro-Surréno-Ovariennne.
- 4..... Thyro-Ovariennne.
- 4 *bis.*.. Surréno-Ovariennne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 5 *bis.*.. Surréno-Orchitique.
- 6..... Hypophyso-Orchitique.
- 6 *bis.*.. Hypophyso-Ovariennne.
- 7..... Thyro-Hypophyso-Ovariennne.
- 7 *bis.*.. Thyro-Hypophyso-Orchitique.
- 8..... Pluriglandulaire digestive.
Peptosthénine (Voir ce mot).
- 9..... Surréno-Hypophyso-Ovariennne.
- 10..... Placento-Mammaire.
- 11..... Ovaro-Mammaire.
- 12..... Spléno-Médullaire.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Boîte de 6 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

SYNTHÉMA

L'Hématopoiétique intégral.

Composition. — Une dragée contient :

0,150 de muqueuse gastrique spécialement préparée ; 0,020 de protosalate de fer ; 0,0002 de sulfate de cuivre ; 0,001 d'hypophosphite de manganèse.

SYNTHEMA réalise ainsi la synthèse des grands principes hématopoiétiques de l'organisme sain.

Mode d'action et avantages. — 1° SYNTHEMA reconstitue et catalyse la fonction hématopoiétique. — 2° SYNTHEMA augmente la qualité hématique par élévation rapide du taux de l'hémoglobine. — 3° SYNTHEMA suractive le métabolisme général, et partant, fortifie l'organisme. Action particulièrement rapide.

Indications. — Anémies secondaires de toute origine, médicales, chirurgicales, obstétricales. Asthénies, surmenage, convalescences. Anorexies, amaigrissement, lymphatisme, rachitisme, troubles de croissance. Cachexie infectieuse ou néo-plasique.

Aucune contre-indication. Pas d'action secondaire indésirable.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 dragées après chacun des trois principaux repas. *Enfants* : jusqu'à 6 ans : 3 dragées par jour ; jusqu'à 12 ans : 5 dragées par jour.

Présentation et prix. — Boîte de 100 dragées : 20 francs.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien,

25, boulevard de Latour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Tél. : Ségur 60-77.)

SYNTROPAN « ROCHE »

Phosphate de l'ester-3-diéthylamino-2, 2-diméthyl-propylique de l'acide tropique.

Action thérapeutique :

Antispasmodique puissant d'action qualitativement voisine de celle de l'Atropine, mais plus élective sur les spasmes du tube digestif, des voies biliaires et des voies urinaires ainsi que sur les douleurs menstruelles et permettant le traitement intensif de la maladie de Parkinson.

Aux doses thérapeutiques, pas d'action sur la pupille (mydriase), sur la sécrétion salivaire et sur la pression sanguine.

Indications thérapeutiques :

Spasmes de l'estomac, spasmes du pylore et du cardia, constipations spasmodiques, coliques, dysménorrhée spasmodique, ulcères de l'estomac et du duodénum, cholécystite, cholélithiase, néphrolithiase, coliques néphrétiques, ténésme vésical, etc...

Doses et modes d'emploi :

Comprimés (Flacon de 20 dosés à 2 cgr.).

1 à 3 par jour selon les cas.

Ampoules (Boîte de 6 amp. de 1 cc. dosées à 1 cgr.).

1 à 3 par jour selon les cas.

Suppositoires (Boîte de 6 dosés à 3 cgr.).

1 à 2 par jour selon les cas.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-66 (*comprimés*), 504-68 (*ampoules*), 504-69 (*suppositoires*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SYPHONÉOL

Pilules de protoiodure Hg, arrhénal, Fer, Quinquina.

Propriétés thérapeutiques. — Cure d'entretien de la syphilis, Anémie, Asthénie, Action régulatrice sur le métabolisme. Cure préventive des néoplasmes (théorie de Pfeiffert). Paludisme. Ulcères variqueux.

Posologie. — 1, 2 ou 3 pilules par jour 1 heure avant le repas, midi et soir.

Prix : 15 francs le flacon de 30 pilules.

Pharmacie BAUDE

SAINT-AUBERT (Nord).

(Tél. : 16.)

SYSÉROS

Composition. — Hoang Nan, Berce, Cascarille.

Indications. — Le *Syséros* est un stimulant de la sécrétion et de la motricité de l'appareil génital. Le *Syséros* est d'une efficacité certaine dans le traitement de l'impuissance. Aphrodisiaque le plus énergique, le plus rationnel avec absence complète de toxicité.

Posologie. — De 6 à 8 pilules par jour, avant les repas. Cette dose, le cas échéant, pourra être élevée jusqu'à 10 pilules, sans qu'on ait à craindre d'effet nocif de cette augmentation.

Le tube compte-pilules contient 60 pilules dragéifiées.

Prix : 30 francs.

L. N. C. 428-10.

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

Tél. : Odéon 18-54.

TABLETTE PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

Prix : 16 francs.

Laboratoire PERROUD

3, rue Sébastien-Gryphe — LYON
(anciennement 7, rue des Archers).

TABLETTES HOVA

Composition. — Dialysés de HOublou et de VALériane.

Propriétés. — Sédation inoffensive et progressive du système nerveux.

Indications. — Toutes les affections d'origine nerveuse : surexcitations, insomnie, neurasthénie, troubles de la ménopause, angoisses, cure de désintoxication.

Avantages. — Produit naturel d'une innocuité parfaite, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Posologie. — 1° Sédatif :

Enfants : 1 à 2 tablettes trois fois par jour.

Adultes : 2 à 4 tablettes quatre fois par jour.

2° Hypnotique :

Adultes : deux fois 3 tablettes le soir dans l'intervalle d'une heure.

Ces doses peuvent être élevées et prolongées sans inconvénient.

Prix du flacon : 14 francs.

Laboratoire ZYMA

Dépôt général.

Laboratoires LOBRU

26, rue Vauquelin — PARIS (V°).

(Tél. : Gobelins 28-33.)

TABLETTES SÉDATIVES ROBIN

(Formule du Docteur **BOUSQUET**)

Composition. — Comprimés, dosés à 0,02 Chlorhydrate d'Ethylmorphine (méthylcodéine, non stupéfiant).

Indications. — Toux et douleur de toute nature.

Posologie. — Dose quotidienne : 3 à 4 tablettes (*adultes*).

Prix : 20 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

TABLETTES ZEVA

Formule. — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits **secs** d'hydrastis, hamamelis, viburnum, bourdaine, kola, Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr. 03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois (Aucune contre-indication.)

Indications. — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE
Médaille d'Or Strasbourg 1927.

TABUROL MONAL

Dynamogène, Hématopoïétique, Leucocytogène.

Trois formes. — Ampoules, Dragées, Gouttes.

Composition. — Hémoglobine, manganèse, strychnine, fluor, méthylarsinate, glycérophosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules, pas d'hémoglobine.

Propriétés. — Stimule la nutrition cellulaire. Restaure les déficiences nerveuses. Reminéralise l'organisme.

Indications. — États anémiques, convalescences, troubles palustres, dépression nerveuse.

Doses. — *Dragées* : 4 à 6 par jour aux repas. Avaler sans croquer.

Gouttes : XV à XX gouttes avant les repas.

Ampoules : 1 ampoule chaque jour.

La boîte de 10 ampoules : 15 francs.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TACHYGASTRINE DUCLOY

Accélérateur physiologique des sécrétions
gastriques totales.

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium-calcium.

Propriétés thérapeutiques. — *Eupeptique complet excitant : des nerfs* gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et anti-nauséeux ; de la *sécrétion acide* par les alcalins choisis ; de la *sécrétion peptique* par l'albumose.

Indications. — **Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :**

Primitives : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypopepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

Secondaires : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons ; — anaphylaxies.

Contre-indication. — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Posologie :

Adultes : Une ou deux ampoules avant les repas.

Prendre le médicament *dix minutes avant les repas* matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demitasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

Nourrissons : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

Enfants : De 5 à 12 ans accomplis : VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 21 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).

TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : Tænias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent :
a) Le Tænifuge proprement dit; b) Le Purgatif.

Posologie. — **Tænias** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois, à 20 minutes d'intervalle le Tænifuge aux doses suivantes :

Adultes : la totalité du contenu du flacon ;

Adolescents de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

Enfants de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

Enfants de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon, 4 à 5, 3 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

Tous les autres vers. — Pendant 4 à 5 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe ;

Adolescents de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

Enfants de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5^e ou 6^e jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Échantillon et Littérature détaillée :

Laboratoires BARDET

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

TÆNIFUGE CASTEL

Cachets

Composition :

Cachet Rose (Laxatif).

Cascara sagrada pulv...	0 gr. 30	Scamonnée résine pulv..	0 gr. 20
Podophylline.....			0 gr. 02

Pour 1 Cachet.

Cachets Gris (Taenifuges).

Filicine pulv.....	2 gr. 50	Calomel chimiquement pur.....	0 gr. 30
Oxyde stanneux pur....	2 gr.	Thymol.....	0 gr. 10
Etain pulv. pur.....	2 gr.	Aspidium pulv.....	2 gr.

Pour 9 Cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des taenias de toute espèce.

Présentation. — Tube aluminium contenant 1 cachet rose (laxatif) et 9 cachets gris (Taenifuges).

Mode d'emploi (*Adultes* seulement). — Médicament très bien supporté efficace et inoffensif. Après un repas du soir peu abondant, prendre le cachet rose avec une infusion. Dès le lendemain matin, l'effet laxatif obtenu, absorber de 10 minutes en 10 minutes chacun des 9 cachets gris avec un peu de café, d'eau ou d'infusion. Ne prendre aucun purgatif huileux ni aucun aliment avant le repas de midi qui sera normal.

Prix : 20 francs.

Laboratoires CASTEL, 1, place Bouquerie — NIMES

A. CASTEL, Pharmacien. Ingénieur-Chimiste, Licencié ès Sciences.

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt de travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

Doses. — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* de plus de 7 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 14 fr. 50.

Unité de vente : 1 traitement pour adultes.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

TÆNIFUGE DU D^r JACQUÈME

Composition :

Liquide en capsules à base d'*Aspidium Filix Mas* et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

Indications :

Expulsion radicale du Tænia.

Avantages :

Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

Mode d'emploi :

Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Prix : 25 francs.

Temps de conservation : un an.

Préparé par

E. LARROUYET, Pharmacien

Laboratoires CHIARINI

68, rue du Roi-René—AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 3-95.)

TÆNIFUGE KIRN

En capsules

à base de *filicine*, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pelletière.

(Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la *filicine*, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation ; 2° la veille, diète presque absolue (lait) ; 3° le matin à jeun l'absorption, de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

Enfants : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Prix : *Adultes* : 20 francs. — *Enfants* : 15 francs.

Admis aux Assurances Sociales.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-S/S. (Tél. : Auteuil 11-86).

TÆNIFUGE LARIX

(en 5 capsules).

Expulsion du *Tænia* en 2 heures.

Composition. — Extrait de fougère mâle, calomel, éther et chloroforme. Prix : 12 francs.

Indications. — *Tænia*s, ankylostomes, parasites intestinaux.

Posologie. — *Adultes* : les 5 capsules, une toutes les 2 minutes.

Jeunes gens au-dessus de 16 ans : 4 capsules.

Enfants âgés de 10 ans : 3 capsules. Ne pas en donner aux enfants âgés de moins de 10 ans.

Une demi-heure après l'absorption de la dernière capsule 10 à 15 gr. sulfate de soude (*enfants*) ou 10 à 15 gr. eau-de-vie allemande (*adultes*).

La veille s'être tenu à la diète depuis midi, sauf café, thé, lait. Si nausées pendant l'absorption des capsules, prendre limonade ou champagne. Observer diète hydrique durant la journée d'évacuation du *Tænia*. Durée du traitement : 24 heures.

Laboratoires Félix ABADIE

25, rue Thiers — TARBES (Htes-Pyr). (Tél. : 1-39.)

TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

Présentation. — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au séné ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

Doses. — Un bonbon le soir en se couchant.

Enfants : un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances Sociales.

Prix. Boîte de 12 bonbons : 12 francs.

Société du TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infaillible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales.

Posologie :

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

Adultes : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire de la TAMARINE

4, route du Médoc

LE BOUSCAT, près Bordeaux.

TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet. (Boîte de 6).

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine. Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-42.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

TANIGLANE

(Élixir.)

Iode métalloïdique	0,015
Tannin officinal	0,004
Phosphate de chaux.....	0,10
Extrait de feuilles de noyer	1,50
Alcoolature d'oranges douces.....	0,50
Sirop de sucre.....	50.
Excipient alcoolique et aromatique. Q. S. p. 100 grs.	

Indications. — Régénérateur de l'enfance. Etats lymphatiques. Engorgements ganglionnaires. Reconstituant général : anorexies, recalcification, convalescences, chloro-anémies de la puberté, asthénies. Dépuratif agréable : dermatoses infantiles.

Doses :

Enfants de 3 à 8 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

Au-dessus de 8 ans : 2 cuillerées à soupe par jour.

(Se prend pur ou dans un peu d'eau.)

Prix : 15 francs.

Laboratoire OMNITHER

33, rue Barthou

ANGOULÊME (Charente).

TANNO-CALCINE

Médication reminéralisante.

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca. Extrait
hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A contenant 0,05 de
Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B contenant 0,15 de
Tannin lavé à l'alcool et purifié.

Indications. — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-s.-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

TANNURGYL

du Docteur **LE TANNEUR**

Sel de Vanadium non toxique.

Tonique général puissant avec modification humorale profonde.

Indications. — Colibacillose, Déficience endocrinienne.

Posologie :

Adultes :

1 ^{re} Sem. 10 gttes par repas.	}	Doses élevées et progressives nécessaires.
2 ^e — 20 —		
3 ^e — 30 —		
4 ^e — 40 —		

Enfants : demi-dose.

Nourrissons : 1/4 de dose dans le biberon.

Prix : Grand flacon : 23 francs. Petit flacon : 14 francs.

Durée : 20 à 30 jours.

Renseignements médicaux : **D^r LE TANNEUR**

87, avenue Borriglione — NICE.

(Vente : **FAURE et DUSSUEL, Pharmaciens**)
AIX-LES-BAINS (Savoie).

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites colibacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Laboratoires MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 16-55.)

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur à faire dissoudre au moment de l'emploi.

Conservation parfaite.

Indications. — Épilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à : 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.

(Tél. : Laborde 16-72.)

TARTROBOROL

Composition. — Tartrate borico-potassique.

Indications. — Traitement des Maladies nerveuses : Épilepsie, Hystérie, Névroses, Danse de Saint-Guy, Affection de la moelle épinière, Convulsions, Vertiges, Eblouissements, Fatigue cérébrale, Migraines, Insomnie, Spermatorrhée, etc.

Posologie. — Comprimés dosés à 0 gr. 50. 2 gr. par jour pour les enfants, soit 4 comprimés. 4 gr. par jour pour les adultes, soit 8 comprimés. Jusqu'à 10 gr. par jour, chez les adultes sans aucun danger.

Les prendre avant les repas du matin, de midi et du soir. Faire dissoudre le nombre de comprimés fixé dans un verre d'eau sucrée ou non, chaude ou froide, ou dans une infusion et on avale.

La solution n'a aucun mauvais goût.

En flacon de 60 comprimés. Prix : 12 francs.

L. N. C. 428-3.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

TAXOL

Composition :

Poudre de muqueuse intestinale	0 gr. 05
Extrait biliaire	0 gr. 10
Agar-Agar	0 gr. 05
Ferments lactiques	0 gr. 05
Pour un comprimé.	

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance.

Indications. — Constipation, Entérite chronique
Entérocolite, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par deux comprimés par jour après un des repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

TEBEPHAGUINE FORNET

Vaccin buccal antituberculeux.

Principe actif. — Bacilles de Koch isolés des affections tuberculeuses les plus diverses ; dégraissés par le procédé FORNET, breveté en France et retenu par l'Institut Pasteur.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Posologie. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la fièvre, des sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse. Augmentation du poids et des forces. Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Prix : 36 francs.

Vente et Échantillonnage :

Laboratoire de Microbiologie

11, chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

TÉCARINE

Homocaféinate de sodium.

Diurétique déchlorurant.

Présente sur la théobromine l'avantage de ne pas provoquer de troubles gastriques ni de céphalée.

Présentations.

Comprimés (tubes de 10) : 6 fr. 50.

Solution injectable : boîtes de 5 ampoules : 8 francs.

Indications :

Toutes les indications de la Théobromine.

Posologie et mode d'emploi. — Voie buccale : 1 à 3 comprimés à 25 ctg. par 24 heures.

Voie hypodermique ou intramusculaire : 1 à 3 ampoules de 2 cm³. dosées à 0 g. 25 par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

TEINTURE DE COCHEUX

(Origine 1832)

Goutte, Arthritisme, Rhumatisme.

Composition. — Teinture alcoolique de colchique d'automne privée de son principe drastique ; c'est la mieux supportée des préparations à base de **Colchicine**. Elle n'occasionne aucun trouble.

Au Congrès de la Goutte, à Vittel, en 1935, plusieurs rapporteurs ont parlé de la « Colchicine, spécifique de la Goutte ».

En reconnaissant, il y a peu de temps, l'action désensibilisatrice très efficace de la Colchicine, on a établi scientifiquement la valeur thérapeutique de la Teinture de Cocheux empiriquement adoptée jusqu'alors.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau sucrée, à jeun. Souvent il est bon de prolonger la cure.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-36.)

TENSÉDINE

Médication sédatrice, antipasmodique et régulatrice du tonus artériel.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition : Crème de tartre soluble 0,15
 Aminophylline 0,03
 Ether trinitrique de la glycérine..... 1/2 goutte
 Phényléthylmalonylurée 0,005
 Bromure d'acétylcholine..... 0,0025
 Extrait de pancréas..... 0,20
 Extrait de muscle strié 0,05

Pour un comprimé.

Indications. — Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels. Troubles vaso-moteurs et spasmes vasculaires. Artério-sclérose, Aortites, Artérites. Troubles de la circulation périphérique. Troubles de la ménopause. Maladie de Raynaud.

Posologie :

Dose moyenne : 2 comprimés au début de chacun des trois repas. Dose d'entretien : 3 comprimés par jour, une semaine sur deux.

Prix : 18 francs.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, av. de Ségur — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 52-73.)

TENSOL

Composition. — Association synergique de médicaments hypotenseurs (Cholalate de soude, Silicate de soude, Iode organique). Sédatifs antispasmodiques (dérivés barbituriques, Benzoate de Benzyle), Tonicardiaque, diurétique (Spartéine, Carbonate de Lithine).

Présentation et doses. — Médication par voie buccale, 4 à 6 comprimés par jour, par 2 à la fois.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Arthritisme, Asthme, et tous les accidents secondaires qui en découlent, d'origine artérielle, cardiaque, cervicale, rénale, nerveuse et pulmonaire.

L'étui de 48 comprimés : 15 francs.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON & C^{ie}, Pharmaciens

11, rue François-Giraud.

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

TENSORYL

Médication hypotensive.

Composition. — Complexe végeto-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

Silicate de soude	0,10
Nitrite de soude	} \overline{aa} 0,05
Poudre de scille	
Extrait stab. Cratægus.....	} 0,03
— — Gui	
— — Muguet	

Indications. — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

Emploi. — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 27-3.

Prix : 15 fr. l'étui de 60 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS — (Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

TERBINTHIOL THOMAS

Présentation et composition. — Capsules à base de sulfure de térébenthène ($C^{10}H^{16}S$), soit 19 p. 100 de soufre inoxydé. (*Thèse de Paris*, Dr J. Lefèvre, 11 juillet 1934.)

Propriétés et indications. — Antisep-tique biliaire, urinaire et intestinal, colibacillose, préventif des coliques hépa-tiques, néphrétiques et curatif de la goutte, bronchites aiguës et chroniques, rhino-pharyngites, rhumatismes chroniques, ma-nifestations anaphylactiques (asthme, ur-ticulaire, rhume des foins) et toutes indi-cations du soufre.

Posologie et mode d'emploi. — Dans les cas aigus : 6 capsules par jour en 3 fois aux repas.

En dehors des cas aigus : 3 capsules par jour en 3 fois aux repas, 20 jours consé-cutifs par mois.

Remarque. — Pendant le traitement au **Terbinthiol Thomas**, ne pas employer de laxatifs huileux qui diminuent l'acti-vité du produit ; employer de préférence des graines mucilagineuses, faire conti-nuer le traitement malgré les éructations qui pourraient être signalées et qui ne constituent pas un signe d'intolérance.

Prix : 15 francs les 50 capsules.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 650-10.

Laboratoires L. THOMAS

33, Faubourg Montmartre — PARIS

(Tél. : Provence 49-77.)

TERCODAL

Traitement symptomatique des toux, bronchite, catarrhe, asthme, Emphysème.

Formule :

<i>Sirop.</i>	
Benzoate de soude.....	4,16
Dionine	0,042
Anesthésine	0,04
Peptone	1,666
Teinture racine aconit...	0,833
Teinture drosera	0,833
Teinture de belladone....	0,833
Sirop de tolu	45, gr.
Sirop capillaire	45, gr.
Excipient.. Q. S. pour...	100 gr.

Prix : 15 fr.

<i>Comprimés.</i>	
Ephédrine	0,003
Terpine	0,10
Aconit (extrait)	0,001
Dionine	0,003
Excipient Q. s. p. un comprimé terminé à ..	0,35

Prix : 12 fr.

Posologie :

Sirop : *adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 10 à 17 ans, 3 cuillerées à dessert.

Comprimés : avaler sans croquer 5 à 6 comprimés entre les repas par jour.

Enfants à partir de 5 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

TERGYL LAMO

Spécialité Dermatologique.

1° Pommade.

Composition. — Sulfo-Ichtyolate, Amm., Sulfo-Gallate de Bismuth, Oxyde de Titane, Onguent de Naphte, Chlor. de Mg., Huile adrénalinée.

Indications. — La plupart des Eczémas, Acnés, Rougeurs des nouveau-nés, Prurits, etc...

Prix au public :

Petit tube	6 fr. 50
Tube moyen	11 fr.
Triple tube	24 fr. 50

2° Poudre C. T. L.

Composition. — Chlor. de Mg., Sulfo-Ichtyolate d'Amm., Extrait mou d'hamamelis, Onguent de Naphte, Ceyssatite, Kaolin, Oxyde de Titane, etc...

Indications. — Complément de la pommade, mêmes indications thérapeutiques. Parfum léger.

Prix au public. La boîte : 6 fr. 50.

Laboratoires LAMO

R. ROUSSEAU, Docteur en Pharmacie

49, rue du Château-d'Eau

Dépôt général : 52, rue de Crimée — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 16-71.)

TERKAL MONAL

Sédatif de la toux.

Forme. — Dragées.

Composition. — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Propriétés. — Calmantes, Expectorantes, Antiseptiques, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Le flacon de 30 dragées : 12 francs.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TERPINE GONNON

Présentation et composition. — *Elixir* : Terpene et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr. 20 de terpene).

Granulé : Terpene, Phosphate de codéine, Aconit, Tolu, Polygala, Erysimum et gaïacosulfonate de potassium.

Pilules : Terpene, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

Pâte : Terpene, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

Pastilles : Terpene 0 gr. 05 et Tolu.

Propriétés thérapeutiques. — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

Posologie :

Elixir : 2 à 4 verres à liqueur par jour (pour 8 jours environ).

Granulé : 5 à 6 cuillerées à café par jour (pour 8 jours environ).

Pilules : 4 à 6 pilules par jour (pour 12 jours environ).

Pâtes : 15 à 20 morceaux par jour (pour 4 jours environ).

Pastilles : 8 à 10 pastilles par jour (pour 6 jours environ).

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème. Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TERPINE GRANULÉE BARON

Composition. — Terpene pure et benzoate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

Indications. — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Enfants : demi-dose.

Prix : 13 francs les 125 grammes.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).
(Tél. : Gobelins 39-44.)

TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00384 pour 10 gr.

Propriétés. — Bactéricide désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide, atoxique et non caustique.

Indications. — Plaies, Ulcères variqueux, Gerçures des seins, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge. Angines, Coryzas, Otites, Pyorrhées alvéolaires, etc.

Posologie. — En solution de concentration croissante depuis 1/10 de TerpoxyL externe pour 9/10 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : G. M., 16 francs ; P. M., 6 fr. 50.

OVULES au TERPOXYL

du Docteur Barinque.

Antiseptiques — Cicatrisants — Ne tachent pas.

Indications. — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Prix de la boîte de 6 : 14 francs.

TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00096 pour 10 gr.

Propriétés. — Anti-thermique, anti-toxique, bactéricide, tonique et vitalisant.

Indications. — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile rapide). Toutes maladies infectieuses.

Posologie. — *Fièvre intense* : XV gouttes toutes les heures dans 1/2 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

Tonique : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 12 francs.

Durée : 12 à 15 jours.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires JOLLY

1, rue Christine — PARIS (VI°).

(Tél. : Danton 49-39.) — L. N. C. M. 40-2-3-4.

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition :

Comprimés de Tétranitrato d'Érythrol à
1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

Indications :

Hypertension : Angine de poitrine,
asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue
(de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Comp. à 1-2-5 mmgr. et 1 centgr.

Prix: 10 fr. ; 12 fr. 50 ; 15 fr. ; 20 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 62-27.)

THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées.
Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 et 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Thaolaxine paillettes { La boîte : 12 francs.
 { La boîte triple dose : 27 fr.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis.
ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Wagram 05-99.)

THÉINOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 363-9.

Forme. — Élixir.

Composition. — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipyrine.

Propriétés pharmacodynamiques. — Permet le travail intellectuel dans un cerveau débarrassé des algies de toute origine. Régulateur des fonctions nerveuses.

Indications. — Migraines. — Névralgies. — Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre. Le flacon : 15 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 62-30.)

THÉISINE DUBAT

Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café = $\begin{cases} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{cases}$

Prix : 15 francs.

Échantillons sur demande.

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 13-03.)

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e)
(Tél. : Archives 18-67.)

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé.

Prop. théér. — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, outre son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^o Solution. Dose : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée. — Une cuillerée contient 0,25 cgr. de théobrominate de lithium.

2^o Gouttes. (Exportation.) — Dose : 1 cuiller-mesure ou LX gouttes, une à trois fois par jour. — LX gouttes ou une cuiller-mesure contiennent 0,25 gr. de théobrominate de lithium.

3^o Comprimés. — Dose : 2 à 6 par jour. — 2 comprimés contiennent 0,25 cgr. de théobrominate de lithium.

Enregistrée au Lab. National de Contrôle sous les n^{os} 1-5, 1-6 et 1-7.

Prix : 22 francs.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS. (Tél. : Archives 37-44.)

THÉOBRYL « ROCHE »

(Théobromine injectable.)

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigouroux, Colombiès, Crampon, etc.)

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL « ROCHE » AMPOULES

(Boîte de 6 ampoules de 2 cc.).

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 3 fois par jour.

THÉOBRYL « ROCHE » GOUTTES

(Flacon de 40 cc.).

Cette forme permet de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

Adultes : dose moyenne utile, X gouttes, 4 à 8 fois par jour.

Enfants : III gouttes 2 à 6 fois par jour.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-44 (*ampoules*), 504-45 (*gouttes*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

THÉOCALCIODE

Composition. — Association de Théobrominate de Lithium, Salicylate de Chaux, Iode combiné (peptones).

Comprimés contenant :

Théobrominate de Lithium.....	0 gr. 15
Salicylate de Chaux	0 gr. 25
Iode combiné	0 gr. 002

Indications. — Diurétique idéal des néphrites avec rétention sèche et des grands œdèmes cardiaques. Médicament de fond de la Dyspnée cardiaque, de l'Asthme, des Scléroses organiques, de l'Obésité, des Hyperthyroïdiens, des Etats endocriniens complexes.

Présentation. — Boîte contenant 40 Comprimés. Durée moyenne : un mois.

Posologie. — Six à huit Comprimés par jour comme diurétique. Quatre à six Comprimés par jour, aux repas, dix jours de suite, chaque mois, pour les affections chroniques.

Prix : 20 francs.

Laboratoire PERRIER

17 bis, boulevard Rochechouart — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 03-01.)

THÉOCARDINE LALEUF

Association :

Composition. — *Théobromine et Crinocardine.*

Propriétés et indications. — Diurétique puissant, déchlorurant de premier ordre. Action toni-cardiaque s'exerçant sur la contractilité du myocarde.

Toutes les indications de la THÉOBROMINE, en tenant compte toutefois que la THÉOCARDINE LALEUF agit mieux, plus vite, à doses beaucoup plus faibles, sans provoquer de phénomènes d'intolérance.

Remède de choix du CARDIO-RÉNAL.

Formes. — Dragées à noyau glutinisé.

Trois formules différentes : Simple, Digitalique, Spar-téinée.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 8 dragées par 24 heures (suivant avis du médecin traitant).

Durée moyenne des unités de vente : 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUQUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

THÉOPHYLLINE BRUNEAU

Médication pulmonaire et cardio-rénale.

Solution injectable par voie veineuse ou intramusculaire.

Présentation et composition. — 5 ampoules de 4 p. 100 à 6 p. 100 (24 centigr. de théophylline par ampoule).

Indications.

Affections pulmonaires : crises d'asthme, respiration de Cheynes-Stocke, paralysie respiratoire, dyspnée d'origine centrale.

Affections cardiaques et vasculaires : insuffisance cardiaque, asthme cardiaque, sclérose pulmonaire, oppression douloureuse des cardiaques.

Affections rénales : œdème cardiaque et rénal, oligurie des maladies infectieuses, tous les cas d'insuffisance du débit urinaire.

Mode d'emploi. — Une injection intraveineuse ou intramusculaire profonde tous les jours pendant 3 jours et ensuite une ampoule tous les 2 jours.

P. S. — La Théophylline se fait également en suppositoires (boîtes de 6 suppositoires dosés à 0,40 de Théophylline par suppositoire).

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e)

THÉOPHYLLINE " CARÉNA "

Les formes de Théophylline les plus employées sont :

La Théophylline-éthylène-diamine, ou aminophylline (*Caréna*).

La Théophylline calcique (*Caréna Calcium*).

Propriétés thérapeutiques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).

Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).

Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

La théophylline-éthylène-diamine est le plus puissant dilatateur des artères coronaires (voir *Aminophylline*).

La théophylline calcique, plus lentement absorbée par l'épithélium intestinal que l'aminophylline, possède une action moins rapide mais plus persistante.

Le calcium augmente l'action diurétique de la théophylline (*Pr. Zunz*) et contribue à la diurèse chlorurée et aqueuse (*Pr. Blum*).

La théophylline calcique est le médicament spécifique de la dyspnée de Cheyne-Stokes (*Vogl*).

Présentations :

Théophylline-éthylène-diamine :

Comprimés, gouttes, suppositoires (voir *Caréna*).

Ampoules intramusculaires et intraveineuses (voir *Caréna injectable*).

Théophylline calcique :

Comprimés, ampoules intraveineuses (voir *Caréna Calcium*).

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES
39, Bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e) (Tél. : Invalides 43-60.)

THÉOSALVOSE

Composition. — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, barbiturique caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 15 francs et 17 fr. 50.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

THÉOVÉRINE LALEUF

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure	0,15
Papavérine chlorhydrate.....	0,01

Propriétés et indications. — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVÉRINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVÉRINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement symptomatique). — Artériosclérose. — Insuffisance aortique. — C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

Formes. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 3 à 6 dragées par jour suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — 15 à 20 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

THÉOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique
en comprimés *glutinisés*.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais la combinaison, assez instable, est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé ce complexe sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage de gluten, se désagrégeant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi, au cours de la traversée intestinale, une absorption lente et continue de la Théobromine solubilisée par le Phosphate disodique. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

Composition : { Théobromine cristallisée pure 0 gr. 25
Phosphate disodique 0 gr. 10
Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par jour.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 79-59.)

THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique; décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications thérapeutiques. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

Ovules « Roche » au Thigénol (Voir page spéciale).

Tampol « Roche », pansement gynécologique idéal (Voir page spéciale).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-46 (liquide), 504-47 (ovules), 504-42 (tampol).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

THI-LIP AGUETTANT

Pyrétothérapie.

Soufre en solution huileuse
spécialement préparée.

Forme. — Ampoules injectables dosées à 1 p. 100 de soufre.

Propriétés. — Agent pyrétogène sans action nocive. Les injections sont immédiatement suivies d'une élévation de température. Celle-ci peut atteindre et dépasser 39°,5. La fièvre tombe dès qu'on interrompt les injections. Réactions douloureuses très faibles ou nulles.

L'amplitude du choc thermique varie largement avec les individus.

Tous les agents pyrétogènes sont soumis à cette relativité.

Les ampoules ne cristallisent pas à la température normale.

Emploi. — Injections intra-musculaires profondes (dans la cuisse).

On injecte généralement une série de doses progressives allant jusqu'à 10 cc. à des intervalles de 3 à 6 jours. Mais cette règle doit être adaptée aux réactions et à l'état général du malade. On peut prolonger le traitement avec quelques injections de 10 cc.

On reprend le traitement après une interruption de plusieurs mois.

La boîte contient 10 ampoules de 1 à 10 cc.

Sur demande : boîte de 6 ampoules de 10 cc.

(Aux hôpitaux : prix et conditionnements spéciaux.)

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

THIOBYL BOURCET

Composition. — Médication polyvalente (peptones, sulf. magn., hyp. de Na, extr. mou boldo, d'artichaut) enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les Nos 754-3 et 754-4.

Indications. — Toutes les affections du foie et des voies biliaires.

Formes pharmaceutiques. — Granulé et dragées.

Mode d'administration du granulé. —

Adultes : 1 cuillerée à café le matin à jeun ou 1/2 cuillerée à café 1/2 heure avant les repas (syndr. hépato-vagotoniques). —

Enfants : 1/4 à 3/4 de cuillerée à café suivant l'âge.

Mode d'administration des dragées. —

Adultes : 4 dragées le matin à jeun ou 2 dragées avant les deux repas. —

Enfants : 1 à 3 dragées suivant l'âge en une fois ou à dose fractionnée avant les repas.

Le flacon de granulés a une durée de 25 jours de traitement pour les adultes.

Le flacon de dragées a une durée de 15 jours de traitement pour les adultes.

Laboratoires du QUINA BOURCET

Échantillons :

7, avenue du Doyenné,
LYON-SAINT-JEAN.

Tél. 25-35.

THIOCITRAN THÉVENOT

Granulé soluble.

Citrates — Soufre — Magnésium — Peptone.

Composition. — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

Propriétés. — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires, Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

Laboratoire THÉVENOT

DIJON.

THIOLCOL « ROCHE »

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol « Roche » = 0,52 ctgr. de gaïacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP « ROCHE » au Thiocol.

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol « Roche »)

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

(1 cachet = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)
2 à 4 cachets par jour

COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.

(1 comprimé = 0,50 ctgr. Thiocol « Roche »)
2 à 4 comprimés par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène,
Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires,
Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-50 (*poudre*), 504-51 (*sirop*), 504-48 (*cachets*), 504-49 (*comprimés*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

THIODACAÏNE MIDY

Boîte de 4 ampoules injectables.

Composition :

Thiocarbamide	20 mmg. (42 % de soufre actif, soit 1 cgr.)
Iodazine M	100 mmg. (64 % d'iode libre, soit 6 cgr. 4)
Dunacaïne	100 mmg.

Pour une ampoule de 20 cc.

Dose et mode d'emploi. — Série de 1 à 6 injections *loco-dolenti*, une injection tous les 2 ou 3 jours.

Jamais d'accident de résorption.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate et définitive de la douleur rhumatismale.

Indications. — Arthrites et péri-arthrites, Algies rhumatismales, Névrites, Lumbagos, Sciatiques, Algies cervico-brachiales, Névralgies intercostales, Coxarthrie, Talalgie, Lipo-Arthrite sèche du genou.

Prix : 25 francs.

Durée du traitement : 10 à 20 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

THIODÉRAZINE MIDY

Boîte de 10 ampoules injectables.

Composition :

Thiocarbamide	0,010
Iodazine M.....	0,100
Pipérazine.....	0,050
Chlorétone	0,005

Pour une ampoule de 5 cc.

Dose et mode d'emploi. — Série de 8 à 15 injections, une tous les jours ou tous les 2 jours, intramusculaires ou intraveineuses.

Jamais d'accident de résorption.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration du terrain rhumatismal, Suppression de la douleur et de l'impotence.

Indications. — Rhumatisme chronique généralisé, Arthrites, Arthroses.

Rhumatisme chronique localisé, Péri-arthrites, Coxarthrie, Rhumatisme vertébral, Spondylose rhyzomélisque ankylosante, Rhumatisme déformant des mains et des pieds. Toutes névrites et myalgies rhumatismales.

Prix : 23 francs.

Durée du traitement : 10 à 20 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.

(Tél. : Étoile 51-37 et 38.)

THIONAÏODINE LOGEAIS

Nouveau composé injectable pour le traitement de la **maladie rhumatismale chronique**, et plus particulièrement de la **douleur rhumatismale**.

Formule. — Complexe Iode-Soufre-Magnésium, sous forme de combinaison en solution aqueuse de NaI Logeais et de S^4O^6 Mg, à l'exclusion de tout autre analgésique et de tout stupéfiant.

- 1° **Thionaïodine « A »**, pour intramusculaire, à 2 p. 100 de NaI et 1 p. 100 de S^4O^6 Mg ;
- 2° **Thionaïodine « B »** pour intraveineuse, à 5 p. 100 de NaI et 5 p. 100 de S^4O^6 Mg.

Formes :

Thionaïodine « A »	{	6 ampoules de 5 cc	16 fr.
		6 — de 10 cc	23 —
Thionaïodine « B »	{	6 — de 10 cc	27 —
		4 — de 20 cc	23 —

Propriétés. — Grâce à ses trois principes actifs : antirhumatismal (S), antialgique (NaI) et neuro-sédatif (Mg), la **Thionaïodine (A ou B)** réalise la médication injectable la plus puissante de tous les syndromes douloureux aigus ou chroniques et spécialement de la douleur rhumatismale.

Tolérance parfaite, atoxicité absolue.

La **Thionaïodine « A »** en injections intramusculaires lentes est parfaitement indolore et dénuée de toutes réactions secondaires appréciables.

Indications :

Rhumatisme chronique et plus particulièrement **douleur rhumatismale**.

Thionaïodine « A » : Toutes douleurs rhumatismales, sciatiques, rhumatisme chronique, algies rhumatismales, arthrites et périarthrites douloureuses, etc...

Thionaïodine « B » : Tous syndromes douloureux aigus ou chroniques, zonas, névrites, névralgies faciales, cervico-brachiales, intercostales, algies postencéphaliques, radiculalgies, etc.

Posologie :

Thionaïodine « A » : 5 à 20 cc. par jour, dans une masse musculaire quelconque, jusqu'à sédation rapidement obtenue.

Thionaïodine « B » : 10 à 40 cc. par jour, en intraveineuses très lentes. Dans les algies aiguës ou rebelles, prolonger sans inconvénient la série d'attaque de 40 cc. Peut être administrée aux enfants : demi-doses jusqu'à 10 ans ; deux tiers de doses de 10 à 15 ans.

Contre-indications. — Celles de l'iode chez certains bacillaires et celles des intraveineuses chez les cardio-rénaux, chez les vieillards grands hypertendus (au-dessus de 25 au Vaquez Laubry), ou chez les malades dont l'état artériel athéromateux est par trop considérable.

Laboratoires Jacques LOGEAIS

71, avenue de Clamart — ISSY-LES-MOULINEAUX

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

THIONAÏODINE

(Comprimés glutinisés de)

Composition. — Complexe I. - S. - Mg. associé aux sels de Lithine.

Formule :

S^2O^3 Mg 0 gr. 20

Nal stabilisé Logeais..... 0 gr. 06

Théobrominate et Benzoate de Lithine 0 gr. 04

Propriétés. — *Antirhumatismales* par le soufre labile de S^2O^3 Mg et l'iode de Nal.

Désensibilisantes, antianaphylactiques, neurosédatives, stimulantes de l'activité hépatique par S^2O^3 Mg.

Uricolytiques par les sels de Lithine.

Indications. — 1° Cure d'entretien et de complément de la *maladie rhumatismale chronique* (à administrer entre les séries de Thionaiodine injectable). Traitement des petites myalgies, préparatoire à la cure hydro minérale (eaux sulfureuses) et complément de celle-ci, des maladies par ralentissement de la nutrition, arthritisme, etc...

2° *Insuffisance hépatique et maladies anaphylactisantes*, accidents anaphylactiques: acné, eczéma, urticaire, diarrhées post-prandiales, désintoxication par formation de sulfo-conjugés atoxiques.

3° *Affections des voies respiratoires*: pharyngites, bronchites chroniques, scléroses bronchiques, asthme, emphysème.

Doses moyennes. — De 4 à 6 comprimés par jour.

Contre-indications. — Pulmonaires congestifs.

LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS

71, av. de Clamart, ISSY-LES-MOULINEAUX (Tél. Mich. 07-50 et 51.)

THIONAPHTE

Composition. — Le premier « soufre soluble » (combinaison électrolytique sous pression à l'autoclave). Conservation indéfinie.

Propriétés. — Antiprurigineux, Calmant.

Indications. — Eczéma sec, Sycosis, Psoriasis, Impétigo.

Contre-indications. — Eczéma suintant, Ulcère variqueux.

Forme liquide.

Ne contient aucun corps gras.

Prix : P. M., 12 fr. — G. M., 25 fr.

Traitement Interne. — Dépuratif Santa.

P. LACHAISE, Docteur en Pharmacie.

TULLE (Corrèze). (Tél. : 1-08.)

THIOPHYL

Composition. — Association à la médication sulfureuse (H^2S) et à l'étain, antistaphylococciques, des équilibrants humoraux Ca, Mg, K, Na, du charbon activé et de la magnésie calcinée légère.

Avantages : Disparition rapide de la douleur. Régression des phénomènes inflammatoires dès le 3^e jour.

Posologie et Mode d'emploi. — Entre les repas. 3 fois une pilule le premier jour.

Augmenter d'une pilule par jour et par prise, jusqu'à 3 fois 9 pilules par jour.

Présentation et Prix. — Le flacon de 100 pilules pour une cure complète : 20 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

THIORINE

Voir

**Sulfo-Thiorine,
Pulmo-Thiorine,
Hypo-Thiorine,
Inhalo-Thiorine,
Bacturyl.**

Laboratoire

de la SULFO-THIORINE

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

(Tél. : 820-04.)

THIOSÉDAL BORNE

Composition. — Sirop et Comprimés.
1 cuillerée à café contient : Thiocol, 0,10 ctgr.;
Dionine, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.
1 comprimé contient : Thiocol, 0,10 ctgr.;
Dionine, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.

Action pharmacologique. — Par le Thiocol antiseptique pulmonaire, par la Dionine sédatif puissant de toutes les Toux.

Indications. — Toutes affections broncho-pulmonaires, Toux nerveuses et d'irritation, Toux des cardiaques, Insomnies, spasmes, Tuberculose, bronchites chroniques, Asthme, Emphysème.

Avantages. — Sans accoutumance, sans constipation, sans intolérance gastrique.

Mode d'emploi :

Adultes. — Sirop : 3 fois 2 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 3 fois 2 comprimés par jour.
Toux rebelles :

3 cuillerées à soupe par jour.

3 fois 3 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Présentation. — Sirop : flacon de 30 cuillerées à café : 15 francs.

Comprimés : boîte de poche de 40 comprimés : 14 francs.

Produits enregistrés au Laboratoire National de Contrôle.

Laboratoires M. BORNE, Pharmacien,
79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 02-78.)

THIOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : A partir de 3 ans : (4 cuillerées à café par jour, à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Prix : 15 francs.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

THIOXYOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Sodium thioélaïdinosulfonate, Zincum Oxydatum calibré chimiquement pur 999 pour 1000 prix liquida depurata.

Propriétés. — Le *Thioxyol* pâte réductrice très active.

Indications. — Eczémas secs, squameux, jambiers pré ou post-ulcéreux. Eczémas. Psoriasis, parakératoses, prurit circonscrit avec lichénification, trychophytie.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther appliquer en couche très mince et ne laisser sur les lésions que 24 heures au maximum. Surveiller l'action.

Demander les brochures des Docteurs P. et
R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injections hebdomadaires intramusculaires indolores.

Ses indications. Sa posologie.

Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciatique, Spondylose Rhizomélisque, Psoriasis : 8 à 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 microgrammes, par 50 microgrammes, ne pas dépasser l'activité 300.

Leucémie, Lymphadénie, Maladie de Hodgkin, Tumeurs, Néoplasmes : 5 piqûres consécutives, à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 microgrammes.

Psychoses : 3 piqûres hebdomadaires : 500, 600, 700 microgramme. Ampoule préparatoire : 250 microgrammes.

Prix de vente au public :	Paris et	
	Banlieue.	Province.
25 micros	5 »	6 »
50 —	10 »	12 »
75 —	15 »	18 »
100 —	20 »	24 »
150 —	22 50	27 »
200 —	30 »	36 »
250 —	37 50	45 »
300 —	45 »	54 »
400 —	60 »	72 »
450 —	67 50	81 »
500 —	75 »	90 »
600 —	90 »	108 »
700 —	105 »	126 »
1.000 —	150 »	180 »

Remise au Corps médical : 25 % net.

Droit fixe par ampoule : 7 francs.

Le THORIX (médicament à décroissance rapide) se prépare une fois par semaine; il est donc indispensable de passer les commandes **le lundi au plus tard.**

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris et banlieue, et le jeudi en Province. Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de Bromure de Radium.

Laboratoires RHEMDA

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs.

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Wagram 58-89, Défense 18-41.)

R. C. Seine 255-068 B.

THYMÉPHÉDRINE

Gouttes nasales à l'éphédrine.

Formule :

Ephédrine	0,01
Thymol.....	0,4
Gaiacol	0,05
Essence Niaouli	2
Excipient.....	Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Toutes les affections rhinopharyngées, rhume, grippe, rhume des foins, coqueluche.

Posologie. — IV à VIII gouttes dans chaque narine de 4 à 8 fois par jour. Aspirer fortement.

Prix : 14 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.

Produit rigoureusement dosé, toujours identique à lui-même ; conserve indéfiniment ses propriétés, renferme tous les principes actifs du corps thyroïde ; exclusivement thyroïdien, sans parathyroïdes.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance thyroïdienne, myxoedème de l'enfant, de l'adulte et post-opératoire, signes nerveux, respiratoires, cutanés, menstruels, etc...

Formes pharmaceutiques :

- 1° Pilules dosées à 2 cgr. de principes actifs. Correspondant à 0 gr. 20 de glande fraîche.
- 2° Tablettes pour enfants, dosées à un cgr. de principes actifs correspondant à 0 gr. 10 de glande fraîche.
- 3° Gouttes : X gouttes équivalent à 1 pilule, soit 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.
- 4° Ampoules : 1 cc. correspond à 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.

Prix : 20 francs. — Ampoules : 25 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROCRÉINE GRÉMY

Médication polyvalente thyro-ovarienne.

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire 0 gr. 20

Glande thyroïde 0 gr. 005 d'extrait

2 à 6 pilules par jour pendant 20 jours.

Indications thérapeutiques. — Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées. — Éveil des fonctions ovariennes au moment de la puberté. — Myxœdème fruste. — Basedow de la Ménopause. *Obésité* de la ménopause.

Rhumatisme chronique déformant de la ménopause.

Prix : 20 francs.

Laboratoires G. GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

THYROÏDINE BOUTY

Composition. — Poudre de corps thyroïde desséché à froid sous vide profond. Cette poudre est standardisée et biologiquement contrôlée selon les conditions exigées par le Laboratoire national de Contrôle des médicaments qui procède, pour chaque lot numéroté, aux essais et titrage en iode tyroxinien.

Chaque produit porte le label du contrôle de son lot de poudre.

Indications. — Myxœdème, Crétinisme, Hypothyroïdisme, Incontinence d'urine. Certaines formes de somnolence pathologiques. Narcolepsie. Tous les cas où le métabolisme basal doit être activé. *Obésité*. Rhumatismes.

Gedèmes, Néphrites, Néphroses lipoïdiques, Troubles de la circulation sanguine, Thrombose, Embolies, Engelures, Erythrocyanose.

Formes. — Dragées, Ampoules (hypodermie) Liqueur.

Posologie :

Adultes: de 1 à 3 dragées par jour (dosage d'une dragée = 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché).

Enfants: prescrire la liqueur, dont une cuillerée à café contient 0 gr. 02 de corps thyroïde desséché.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules (boîte de 6) : une ampoule de 1 cc. = 1 milligr. de thyroxine.

Comprimés (flacon de 30) : un comprimé = 1/2 milligr. de thyroxine.

Solution (flacon de 15 cc.) : 1 cc. = 2 milligr. de thyroxine.

Indications :

Obésité générale, Myxoedème, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : 1/2 à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-52 (*ampoules*), 504-53 (*comprimés*), 504-57 (*solution*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e)
(Tél. : Archives 91-10.)

TIODINE COGNET

$C^6S N^2H^{13}I$

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*, par la Thiosinamine Iodée, combinaison organique soluble. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Anti-scléreux.**

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %), avec la thiosinamine.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre ensemble ou séparément. **Toutes scléroses.** Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabes, Scléroses médullaires, Asthme, Emphysème, Syphilis, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 3 à 6 par jour. *Enfants* : 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, de préférence).

Prix au public : Pilules — Le flacon : 13 francs.

Ampoules — La boîte : 15 francs.

15 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits COGNET

Armingeat et C^{ie}

43, rue de Saintonge — PARIS (ARC. 15-10).

TISANE HÉPATIQUE DAUSSE

Composition. — Combretum et Boldo, associés aux stomachiques végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue, provoquant par drainage la désinfection des voies biliaires.

Indications. — Lithiase biliaire, cholécystites, congestion hépatique, ictère et tous accidents de l'hépatisme.

Mode d'emploi. — 1 à 2 tasses à café, le soir au moment de se coucher.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

TISANE HÉPATIQUE LAHAYE

Phytothérapie hépato-biliaire.

Composition et action :

Cholérétique, grâce à la présence de boldo, de romarin et de menthe.

Cholagogue, par l'adjonction de bourdaine en faible quantité.

Diurétique, par l'action bien connue de l'Uva-Ursi.

Sédative, grâce aux vertus d'une plante de l'Inde « L'Andropogon Schoenanthus ».

Infusion très parfumée et agréable au goût. Chaque tasse d'infusion peut être additionnée de sucre ou de glycérine.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Jaunisse, Lithiase biliaire, Fièvre bilieuse hématurique. Entéro-colite muco-membraneuse. Constipation opiniâtre. Migraines. Dermatoses par dyshépatie. Cirrhose, Calculs, Hypertension.

Doses et mode d'emploi. — 1 pincée de plantes pour une tasse d'infusion. 3 à 4 tasses par jour selon les cas. La boîte : 6 fr. 75. La triple boîte cure : 14 fr. 80

Laboratoire J.-B. LAHAYE

145, rue des Bourguignons — BOIS-COLOMBES.

TISANE TANIT

Emménagogue.

Composition. — Absinthe, Anémone pulsatile, Armoise, Hamamelis, Matricaire, Millefeuilles : parties égales.

Indications thérapeutiques. — Quelle que soit la préparation emménagogue, prescription magistrale ou spécialité pharmaceutique, la faire toujours prendre dans une infusion de Tisane Tanit bien sucrée.

Prix : 5 francs.

ROUANET, Pharmacien

ANTIBES (A.-M.).

Approvisionnement pharmaceutique O. C. P.
et Grossistes.

TOCHLORINE

Para-toluène-sulfo-chloramide sodée.

Action antiseptique durable, par mise en liberté progressive d'hypochlorite de soude (principe de la solution de Dakin).

Présentation. — Flacons de 20 et de 100 g. de Poudre pour préparation extemporanée des solutions (4 et 12 francs).

Indications :

Antisepsie (chirurgie générale et spécialités).

Purification des eaux de boisson.

Posologie :

Chirurgie générale : Solution aqueuse à 2 p. 100.

Urologie : Solut. de 0,10 à 0,50 p. 100.

Gynécologie : Sol. de 0,5 à 2 p. 100.

Stomatologie : Solut. à 1 p. 100.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Bazac 22-94.)

TONICARDINE GONNON

Composition :

	Par granule.
Adonidine	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de Strophantus ...	0 gr. 001
Extrait de Scille	0 gr. 004

Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine. Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas.
(pour 20 jours environ).

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine.....	1 mgr.
Cacodylate de soude	0,05
Glycérophosph. soude (Codex 1908).....	0,20
Eau de mer diluée	5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer, auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

6 ampoules de 5 cc. Prix : 14 francs.

12 ampoules de 5 cc. Prix : 22 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-32. Télégr. Chevrematte-90 — Paris.

TONI-PECTORAL ADRIAN

Bonbon pectoral et stimulant à base de chlorure de magnésium et parfumé à l'anis.

Présentation. — Pâte pectorale, forme boursier.

Indications thérapeutiques. — Produit béchique, calmant et antiseptique par l'action de ses constituants (réglisse, benzoate de soude, cachou, menthol, extrait thébaïque). Tonique général, grâce à l'action du chlorure de magnésium.

Posologie. — Chaque bonbon contient un dixième de milligramme d'extrait thébaïque et 1 centigramme de chlorure de magnésium. 20 bonbons en moyenne par 24 heures pour les adultes.

La boîte : 5 francs.

Société Française de Produits Pharmaceutiques,

Anciennement ADRIAN et Cie,

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

TONIQUE FAVROT

Élixir reconstituant.

Composition :

Teinture de noix vomique	0,15
Arrhénal.....	0,02
Nucléinate de soude	0,04
Glycéro soude	0,30
Phosphate de soude	0,10
Acide phosphorique	0,10
Excipient.....	Q. S. p. une cuillerée à soupe.

Propriétés et indications. — Stimulant des échanges nutritifs. Faiblesse générale, anémie, débilité, surmenage, dépression nerveuse, etc.

Posologie. — Une cuillerée à soupe avant les 2 repas.

Prix : 15 francs.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

Propriétés thérapeutiques. — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

Indications. — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

Forme et Posologie :

Vin et sirop : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Granulé : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).

Demi-dose pour les enfants.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Vin : 8 jours. — Sirop : 6 jours. — Granulé : 12 jours.

Produits GONNON

14, rue Victor-Hugo — LYON.

TONIQUE NEDA

Composition :

Phosphore ..	{ Nucléinate de soude	0,03
	{ Glycérophosphate de soude..	0,20
Arsenic	Arséniate de soude.....	0,003
Strychnine .	Teinture de Noix vomique ..	0,30
Caféine	Teinture de kola	1
Catalyseur...	Sulfate de manganèse.....	0,02
Stomachique.	Elixir de Garus	1,50

Par cuillère à soupe.

Propriétés. — Tonique, Digestif.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, anémie, neurasthénie, inappétence.

Présentation. — Élixir en flacon de 400 cc. pour 15 jours de traitement : 18 francs.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires DANEY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 27-10.)

TONIQUE « ROCHE »

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.

Goût très agréable. Efficacité certaine.

Propriétés thérapeutiques :

Propriétés classiques de ses constituants : Acide phosphorique, Arsyène, Strychnine, Kola, complétées et renforcées par un catalyseur de choix : le Manganèse.

Indications :

Tous Surmenages, Asthénies, Neurasthénie, Anémies, Prétuberculose, Convalescences, Adénopathies, etc.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (de 8 à 15 ans) : demi-doses.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-54.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

TONIVEININE

Médication spécifique des affections veineuses.

Composition. — Association de *Sylibum marianum*, galbules de *Cupressus*, *Echinops viscosus*.

Avantages. — Effets stimulants sur les fibres lisses des veines, vaso-constricteurs et hémostatiques. Légère excitation de la sécrétion biliaire. Action générale sur la circulation veineuse.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Troubles de la puberté et de la ménopause.

Posologie. — XX à XLV gouttes matin et soir. X gouttes dans la grossesse.

Dès que les symptômes pénibles sont amendés, le Docteur prescrira les doses diminuées 20 jours par mois.

Prix : 10 francs, flacon de 30 cc. avec compte-gouttes.

Laboratoires BLANCHOT

15, avenue du Parc-Montsouris — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Glacière 03-09.)

Échantillons et Littérature sur demande.

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc., tous les jours ou tous les 2 jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Prix. Ampoules : 19 francs. — Comprimés : 15 francs.
Granulé : 15 francs.

Laboratoires LIOARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

TOPHOL

(C¹⁶H¹¹N⁰³.)

Acide phénylquinolique² carbonique⁴.

Indications :

Toutes les manifestations douloureuses de la diathèse urique : Rhumatisme articulaire aigu et chronique. Goutte. Gravelle, Arthrites fébriles et déformantes, Névralgies, Sciatique, Lumbago.

Posologie et mode d'emploi :

Présenté en cachets et comprimés dosés à 0 gr. 50. Suivant le cas, le TOPHOL se prend à la dose de 1 à 8 cachets ou comprimés par jour, dans de l'eau alcaline, aux repas.

Dès l'effet obtenu, diminuer progressivement la dose de 1 à 2 cachets ou comprimés par jour.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires du TOPHOL

3, rue Condillac — GRENOBLE (Isère).

TORITANE LAMO

Spécialité antisiphilitique.

1° Sirop.

Principe du Sirop de Gibert, Arséniate de Soude et Biphosphate de Calcium ; excipient agréable. Traitement dissimulé, présenté comme dépuratif polyvalent.

Doses efficaces par jour :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.

Nourrissons : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans une infusion ou du lait).

2° Dragées.

Mêmes propriétés que le sirop.

1 dragée = 1 cuillerée à café.

Prix au public : Sirop : 20 fr. — Dragées : 19 fr.

Laboratoire LAMO

R. ROUSSEAU, Docteur en pharmacie,
49, rue du Château-d'Eau.

Dépôt général :

52, rue de Crimée — PARIS (XIX^e).

Tél. : Nord 16-71.

TORITANOL LAMO

1° Sirop.

Iodures simples, très purs (potassium, sodium, str., Mg.), goût parfait.

Lymphatisme, Goitre, Sclérose, Mycose, etc.

Doses efficaces par jour :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café.

Nourrissons : 1/3 à 1 cuillerée à café (dans infusion ou lait).

2° Dragées.

Mêmes propriétés que le sirop.

1 dragée = 1 cuillerée à café.

Doses efficaces par jour :

Adultes : 3 à 12 dragées.

Enfants : 1 à 3 dragées (avalier sans croquer avec eau ou infusion).

Prix au public :

Sirop..... 20 fr.

Dragées 19 fr.

Laboratoires LAMO

R. ROUSSEAU, Docteur en Pharmacie

49, rue du Château d'Eau, Paris.

Dépôt général : 52, rue de Cimée — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 16-71.)

TOTAL MAGNÉSIEN

Composition. — Chlorure de magnésium déshydraté en association synergique avec les sels halogénés du magnésium.

Indications. — Asthénie, impuissance, sénilité, entérite, insuffisance hépatique, cholécystite, dermatoses, verrues, hypertrophie prostatique.

Présentation et prix :

Granulé : Un flacon de 60 grammes : 13 fr. 80.

Comprimés : Un flacon de 100 comprimés : 15 francs.

Dragées : Un flacon de 100 dragées : 15 francs.

Posologie :

Granulé : 2 cuillères-mesures par jour, diluées dans un peu de liquide.

Comprimés : 2 par jour.

Dragées : 4 par jour.

La cuillère-mesure jointe au flacon de TOTAL MAGNÉSIEN représente, pleine, environ 0 gr. 60.

Laboratoires du Total Magnésien.

24, boulevard Sébastopol — PARIS.

(Tél. : Turbigo 62-30, lignes groupées.)

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique
des Reconstituants.

Forme. — Élixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal)	0,05
Manganèse (sulfate)	0,0375
Phosphate de soude	0,50
Acide phosphorique officinal	0,25
Méthylarsinate de soude	0,015
Extrait de quinquina.....	0,25
Teinture de noix vomique	0,25
Teinture de coca.....	1,25
Extrait fluide de kola	0,32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 16 francs.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

TOT'HAMÉLIS

Composition. — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

Indications. — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. États congestifs, Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Prix :

Comprimés, Cachets : 13 fr. 50.
(pour 15 jours de traitement).

Suppositoires
(boîte de dix) : 16 francs.

Laboratoire CHANTEREAU

(Produits Innothéra)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TOT'HÉMA

Hématopoiétique total.

Composition :

- 1° Un Hématopoiétique nouveau correspondant aux acides aminés (histidine et tryptophane) obtenus par photoclase en partant de la molécule hémoglobine hydrolysée (lysât globulaire).
- 2° La TOTALité des éléments minéraux rentrant dans la composition de l'HÉMATie, sous forme de caséinates, complètement ionisables, et nécessaires à sa régénération (fer, cuivre sans lequel le fer ne peut être assimilé, manganèse).
- 3° De l'inosito-hexaphosphate de chaux et magnésie, aliment tonique de la cellule nerveuse, toujours déficiente dans les cas d'anémie.

Indication :

Toutes les anémies et déficiences organiques simultanées ou consécutives.

Présentation :

Granulé sucré, agréable au goût (chaque cuillerée à café renferme le contenu d'une ampoule de 10 cc. de lysât globulaire et renferme de plus les éléments minéraux insolubles qui sont le complément indispensable du principe hématopoiétique).

Mode d'emploi :

Deux cuillerées à café par jour, aux repas.
TOT'HÉMA ne présente aucune contre-indication et pourrait être utilisé par doses massives dans des cas spéciaux (hémorragies).

Prix :

La boîte (correspondant à 12 jours de traitement normal) : 22 francs.

Laboratoire CHANTEREAU

Produits Innothéra.

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 30-07.)

TOURANOL

Composition. — Dionine, Pyramidon, Terpène, Benzoate de soude, Sulfogaiacolate de K, extraits de Grindelia, Aconit, Marrube.

Propriétés. — Sédatif, Expectorant, Modificateur des sécrétions, Antispasmodique, Asepsie des voies respiratoires.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour. De 12 à 16 ans ; 2 à 3 comprimés par jour.

Indications. — Trachéobronchites aiguës, Bronchites chroniques, Toux spasmodiques, Bronchopneumonie.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires P. BASUYAUX

117, rue de Belleville — PARIS.

TOURANYL

(Cachets)

Codéine, 0,005 ; Dionine, 0,005 ; Extr. Drosera, 0,015 ; Terpène, 0,15 ; Sulfogaiacolate K, 0,30 ; Benzoate Na, 0,20 ; Iodol, 0,05 ; Monosulfure Na, 0,01 ; Amidopyrine, 0,10.

Pour 1 cachet.

Propriétés. — Sédatif, Antispasmodique, Désinfectant, Modificateur des sécrétions, Expectorant, Décongestif, Antithermique et Analgésique.

Indications. — Trachéite, Bronchites aiguës ou chroniques, Toux spasmodiques, Emphysème, Laryngites, etc...

Présentation. — Etui de 24 cachets = 12 francs. Durée normale, 6 à 12 jours.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 6 cachets par jour ; de 12 à 16 ans : 2 cachets par jour.

Laboratoires P. BASUYAUX

117, r. de Belleville, PARIS (XIX^e). (T. : Com. 11-02.)

TRACHÉDRINE

FORME GOUTTES

Composition. — Teintures antispasmodiques (gelsémium, drosera, ballote, thym, serpolet) associées à l'Orthoformiate d'Ethyle éphédriné et à la Cinnaméine du Baume du Pérou.

L'avantage de cette préparation sur les similaires est dû en grande partie à son absence presque totale d'odeur et de saveur.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche, Grippe, Toux rebelles et nerveuses, Asthme. Toux émétisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie trachéo-bronchique.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence : tisane béchique, eau, grog ou lait.

Adultes : XL à L gouttes à renouveler 3 fois le 1^{er} jour. — 4 fois le 3^e jour. — 5 fois à partir du 6^e jour.

Ne pas dépasser 6 fois par 24 heures.

Enfants : V gouttes de 1 à 2 ans. — VIII gouttes de 2 à 3 ans. — X gouttes de 3 à 5 ans.

XV gouttes de 5 à 7 ans. — XX gouttes de 8 à 10 ans.

A renouveler 3 fois par jour.

Augmenter ces doses de II gouttes par jour, jusqu'à doubler les doses initiales, comme doses maxima.

Prix : 16 francs. (Taxe comprise.)

Laboratoires TAVERNIER, Docteur en Pharmacie
32, rue de l'Ouest — PARIS. (Tél. : Ségur 08-13.)

TRAITEMENT AMBULATOIRE

du Praticien.

Indications. — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué sur les ulcères de jambes par le médecin. Au moment des périodes aiguës des affections suivantes : phlébites, scepticémie veineuse, périphlébites ou ulcères trop infectés, il serait prudent de surseoir à l'application du traitement.

Propriétés. — L'application de cette méthode suivant les concepts de P. Bourggraff, assure :

- 1° La reprise obligatoire de l'activité du malade dès l'institution du traitement.
- 2° La suppression complète des douleurs dues à l'ulcère de jambe et partant la disparition de l'insomnie.
- 3° La guérison rapide de l'ulcère (dans la généralité en quelques semaines).

Composition. — Le traitement se compose de :

- 1° Une poudre noire dénommée « Axyol » ;
- 2° Une pâte blanche « Bioxyol » ;
- 3° Une pâte grise « Oxythyl » ;
- 4° Une bande dite « du Praticien » élastique à double enrobage assurant le coefficient optimum de contention, coefficient bien loin d'être indifférent. Elle active les échanges nutritifs au niveau des veinules et de l'ulcère.

Technique. — L'application du Traitement du Praticien doit être faite avec minutie. La citation du docteur Dekeyser, Professeur de Dermatologie à Bruxelles, convaincra nos confrères :

« J'insiste sur la nécessité d'appliquer le traitement selon les règles prescrites si l'on veut obtenir un résultat. J'ai eu l'occasion de voir un cas où l'on avait appliqué ce traitement sans en observer scrupuleusement la technique. Le résultat fut déplorable. Depuis que je le traite selon la méthode décrite, l'amélioration s'accroît chaque jour ».

Prof. DEKEYSER.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.).

Demander également littérature pour tous eczémas jambiers, d'origine variqueuse pré et post-ulcéreux.

TRANSITOL

Produit entièrement nouveau pour le traitement de toutes les constipations.

Composition :

Paraffines amorphes suraffinées et émulsionnables *in vivo* 70 gr.
Saccharure d'hespéridées Q. S. p. 100 —

Propriétés essentielles. — Viscosité inégalable (à l'Engler, 6° à 50°) supprimant tout suintement ou fuite anale.

Composition absolument neutre ($pH = 7 = pH$ intestinal.) Absence d'accoutumance. Réduction progressive des doses au cours du traitement. Pouvoir maximum de rééducation du transit intestinal. Absence de tout produit irritant.

Goût très agréable. Tolérance parfaite.

Toutes les Constipations, quel que soit leur mécanisme et quelles que soient leurs causes :

Entérite aiguë ou chronique, Appendicite, Sigmoïdite, Hémorroïdes, Interventions chirurgicales, Colite acide, Rectite, Obstacles mécaniques, Colite muco-membraneuse, Grossesse (allaitement).

Toutes les fermentations et putréfactions intestinales et leurs conséquences, Tous les syndromes anaphylactiques d'origine intestinale.

Posologie :

Doses d'attaque. *Adultes* : 4 à 8 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Enfants : 2 à 6 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Doses d'entretien. *Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café, par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Laboratoires GRANGER

13, rue Basly — GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 16-06.)

TRAPHÉINE

Indications. — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, pré tuberculose.

Forme. — Poudre agréable au goût, à diluer dans un verre d'eau.

Composition. — Association synergique : Acide phosphorique-Koïa caféinée avec catalyseur de chlorure de magnésium par milieu marin.

Posologie :

Adultes : deux fois par jour aux principaux repas, une cuillerée à soupe dans un verre d'eau ordinaire.

Enfants : deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune des contre-indications habituelles chez les hépatiques.

Prix de la boîte pour un traitement d'une semaine : 15 fr. 80.

La TRAPHÉINE se vend également en comprimés, de même formule et de mêmes indications, au prix de 10 francs les 20 comprimés.

Laboratoires S. I. C. A.

R. MICHY, Pharmacien,

13, rue Beudant — PARIS (XVII^e).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1248-2.

TRASENTINE

Chlorhydrate de l'ester diéthylamino-éthylrique
de l'acide diphenylacétique
CIBA

ANTISPASMODIQUE

Puissant antispasmodique de synthèse, agissant par voie nerveuse et musculaire, possédant à la fois l'activité physiologique des alcaloïdes de la belladone (atropine) et de la papavérine sans aucun de leurs inconvénients (mydriase, tachycardie, sécheresse des muqueuses) et avec une toxicité très atténuée. Traitement le plus efficace de tous les phénomènes algiques ou des troubles fonctionnels liés au spasme. Sans effets stupéfiants, ne déterminant pas d'accoutumance, la Trasentine peut être administrée aussi longtemps que persiste l'état douloureux ou dysfonctionnel.

Indications. — Tous états spasmodiques et troubles neuro-végétatifs. Spasme de l'œsophage, du pylore. Gastralgie, entéralgie, constipation spasmodique. Coliques hépatiques, cholécystite. Hoquet. Laryngospasme, asthme bronchique, toux spasmodique. Angine de poitrine et pseudo-angor, Angiospasme. Spasme urétral et vésical, colique néphrétique. Dysménorrhée. Hypertonie utérine, spasme du col. Spasmophilie. Convulsions, Chorée. Parkinsonisme. Névralgie faciale. Comprimés — Ampoules — Suppositoires.

Doses. — *Adultes.* — Voie buccale : 1 à 2 comp. 2 à 3 fois par jour. Voie sous-cutanée : une ampoule. Voie rectale : 1 à 2 suppositoires par jour.

Enfants — 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte suivant l'âge.

Flacon de 20 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

— 5 suppositoires.

Laboratoires CIBA, O. Rolland

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu, — LYON. Tél. Moncey 43-26.

TRÉPALLIX

Composition. — Lactate de mercure en solution stabilisée par un procédé de laboratoire, associé à l'arséniate de soude.

Avantages. — Le lactate présente sur les autres sels d'hydrargyre les avantages suivants :

Ne s'accumule pas dans l'organisme ;

Est le moins toxique et, en particulier, le mieux toléré par le tube digestif ;

Est *anti-diarrhéique*.

Indications. — Syphilis acquise, ancienne : Traitement d'entretien et de consolidation.

Syphilis héréditaire : Médicament complémentaire. Médication d'attaque dans la syphilis massive du nourrisson, dans la syphilis avec organopathies spéciales (hépatiques, nerveuses, oculaires), dans la syphilis larvée.

Gouttes Trépallix A pour adultes, adolescents, enfants jusqu'au poids de 10 kgs.

Lactate de mercure 1 gr. pour 100 gr.

Arséniate de soude 0 gr. 10 — —

Posologie pro die.

Lactate *pro die*. Arséniate de soude *pro die*

Ad. 25 à 50 gttes 1 ctg. à 2 ctg. 0,001 à 0,002

Adol. 20 à 40 — 8 mg. à 1 ctg. 60,0008 à 0,0016

Enf. 5 à 25 — 2 mg. à 1 ctg. 0,0002 à 0,001

En deux ou trois prises dans un demi-verre d'eau sucrée ou non, aux repas.

Un flacon de *Trépallix A* contient 24 cc., soit 600 gouttes, soit 24 ctg. de lactate de Hg, correspondant à 0gr. 126 de métal et 0 gr. 024 d'arséniate de soude par flacon.

Gouttes Trépallix N pour nourrissons jusqu'au poids de 10 kgs.

Lactate de mercure..... 0 gr. 20 par 100 gr.
 Arséniate de soude..... 0 gr. 01 — —

Posologie. — II à V gouttes par kg. et par jour,
 en 2 ou 3 prises, dans un peu d'eau sucrée ou
 dans du lait.

Enfants de	en 2 ou 3 prises pro die.	Lactate Hh pro die.	Arséniate de soude pro die.
3 kg. à 3 kg. 250	8 à 15 gouttes	0 mg. 6 à 1 mg. 2	0,00003 à 0,00006
3 kg. 500	9 à 18 —	0 mg. 7 à 1 mg. 4	
4 kg. 250	10 à 22 —	0 mg. 8 à 1 mg. 8	
5 kg.	12 à 25 —	1 mg. à 2 mg.	
5 kg. 500	15 à 28 —	1 mg. 2 à 2 mg. 2	0,00006 à 0,00011
6 kg.	18 à 30 —	1 mg. 4 à 2 mg. 4	
7 kg.	20 à 35 —	1 mg. 6 à 2 mg. 8	
7 kg. 500	22 à 38 —	1 mg. 8 à 3 mg.	
8 kg.	25 à 40 —	2 mg. à 3 mg. 2	0,0001 à 0,00016
8 kg. 400	28 à 42 —	2 mg. 2 à 3 mg. 4	
8 kg. 700	30 à 44 —	2 mg. 4 à 3 mg. 5	
9 kg.	32 à 45 —	2 mg. 6 à 3 mg. 6	
9 kg. 500	34 à 47 —	2 mg. 8 à 3 mg. 8	
9 kg. 850	36 à 49 —	2 mg. 9 à 3 mg. 9	0,00014 à 0,00016

Un flacon de *Trépallix N* contient 24 cc., soit
 600 gouttes, soit 0 gr. 048 de lactate de Hg,
 correspondant à 0 gr. 025 de métal, et à 0 gr. 0024
 d'arséniate de soude par flacon.

Prix. — 18 francs le flacon de 24 cc. de chaque pré-
 paration, ce qui équivaut à une dépense journa-
 lière maxima de :

0 fr. 45 à 1 fr. 50 pour les doses prescrites aux nour-
 rissons.

0 fr. 75 pour la dose de XXV gouttes aux enfants.

1 fr. 20 pour la dose de XL gouttes aux adolescents.

1 fr. 50 pour la dose de L gouttes aux adultes.

SYNTHÉSIS — **R.-L. MATHIVAT**, docteur en
 pharmacie, Ex-interne des hôpitaux de Paris,
 66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél. : Passy 31-06.

TRÉPARSOL

Acide formyl méta-amino para-oxy-phényl-arsinique.

Indications. — Syphilis, à tout âge et à toute période. Hérédosyphilis, Dysenterie amibienne, Protozooses intestinales, Diarrhée des tuberculeux, Entérocolites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse), Pian et toutes spirochètoses.

Présentation et Prix :

Tube de 30 comprimés pour Adultes : Prix 22 francs.

— 15 — : Prix : 13 fr. 20.

— 40 comprimés pour Enfants : Prix : 13 fr. 20.

— 60 comprimés pour Nourrissons : Prix 11 fr.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 2 centigr. par jour et par kilog. Traitement discontinu (3 à 4 jours consécutifs par semaine) et progressif (débuter par des doses faibles).

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET.

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

TRÉPHONYL

(L'Hépatothérapie associée à la Sérothérapie et aux Tréphones embryonnaires.)

Composition. — Extrait de foie fœtal, Suc embryonnaire, Sérum hémo-poiétique.

Mode d'action. — Par l'extrait hépatique fœtal et le sérum hémo-poiétique constitue la médication de choix de toutes les anémies même les plus graves.

Par les Tréphones du suc embryonnaire, accélère la croissance et assure la régénération des tissus.

Indications. — Toutes les anémies, même les plus graves. Toutes les déficiences organiques : convalescences difficiles ; retards dans le développement ou la croissance chez les enfants.

Présentation :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.

2° Boîte de 10 flacons-ampoules de 6 cc.

3° Flacon de Sirop de 300 grammes.

Pour un traitement de 6 jours environ.

Prix : 20 francs.

4° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc.

5° Coffret de 30 flacons-ampoules de 6 cc.

Pour un traitement de 3 semaines environ.

Prix : 55 francs.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24).

TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intramusculaire en ampoules stérilisées (3 cc.). Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 p. 100 de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

La boîte de 12 ampoules : 36 fr. ; de 6 : 20 fr.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

**Laboratoires pharmaceutiques
L.-G. TORAUDE**

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

TRÉPOSITOIRES

Composition. — Tréposan (succinate de bismuth).

Présentation. — Suppositoires, forme qui permet d'administrer facilement ce médicament spécifique aux malades qui ne peuvent recevoir d'injections.

Indications. — Infections et Parasitoses intestinales, Oxyûres, Syphilis.

Posologie. — Chaque Trépositoire contient 0 gr. 20 de succinate de bismuth, ce qui correspond à 0 gr. 15 environ de bismuth métal et s'administre 3 fois par semaine, le soir au coucher. Après une série de 10 Trépositoires, repos de 15 jours, puis nouvelle série de 10 avec repos.

La boîte de 10 suppositoires : 12 francs.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Carnot 07-13.)

TRIANO

(Liquide)

Présentation. — En flacon.

Principes actifs. — Citrate de fer et de soude, Terpène, Glycérophosphate de chaux, Pyrazoline, Thym.

Indications. — Reconstituant, Récalcifiant, Tonique, Contre la Neurasthénie, Phosphaturie, Débilité, Surmenage, Rachitisme, Convalescence, Asthénie musculaire, Épuisement, Chlorose.

Mode d'emploi :

Pour adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Pour enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant âge. Pur ou dans de l'eau sucrée ou dans 1/2 tasse de lait chaud sucré.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et magnésie nécessaires à l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller-mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers-mesures.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou 1 cuillerée à café de granulés.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas.

Tricalcine injectable : 1 ampoule, par jour : pendant 12 jours.

Tricalcine Opothérapique (1) 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat : comprimés : de 13 à 15 fr. 50 ; Méthylarsinée, adrénalinée, florée et opothérapique : 17 francs.

Irradiée : 21 fr. 50 Injectable (12 amp.) : 19 francs.

Pour traitement de 3 semaines à 1 mois.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium : Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.

Autorisé par les *Assurances sociales*.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél : Trinité 29-29.)

TRICALM

Sédatif rapide et durable des Névralgies Faciale, Rhumatismale et Utérine.

Comprimés dosés à :

Diméthylanilomophényldiméthylpyrazo-	
lone	0,40
Diéthylmalonylurée	0,10
Dionine	0,005

Indications :

Migraines, Névralgies de toute nature et de toute intensité, Névralgie vraie, Névralgie faciale et intercostale, Sciatique, Algies fébriles, Grippe, Angine.
Manifestations articulaires et toutes douleurs rhumatismales, Règles douloureuses, Dysménorrhée.

Doses et mode d'emploi :

Migraines et Névralgies : 1 ou 2 comprimés à la fois.
Douleurs rhumatismales : 1 ou 2 comprimés à la fois, matin et soir.

Règles douloureuses : 1 ou 2 comprimés par jour.

Prix du tube (12 comprimés) : 10 fr.

Laboratoires du DONAGOL

PÉRONNE (Somme). (Tél. : 32.)

TRICARBONE LEFRANC

Granulé fondant, d'une saveur agréable.

Composition :

Charbon animal purifié	10 gr.
Charbon végétal purifié	10 —
Charbon végétal activé	10 —
Benzonaphtol	5 —
Hexaméthylène tétramine	2 —
Sacchar. Ess. menthe	Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Infections du tube digestif, de la vessie, du foie, pyrosie, aérophagie, flatulences, colibacillose, gastro-entérite, grippe à forme intestinale et états intestinaux toxi-infectieux, appendicite chronique.

Posologie. — 1, 2 à 3 cuillerées à café avant ou après le repas.

Prix : 12 francs la boîte de 40 cuillères à café environ.

Laboratoire de chimie appliquée de Nanterre

G. LEFRANC, Pharmacien

31, rue du Chemin-de-Fer — NANTERRE (Seine).
(Tél. : Malmaison 11-97.)

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Le flacon : 12 fr. 50.

Laboratoire DALLOZ

13, boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e).

TRIDYNOL

Composition. — Cinnamate de Soude, Collargol, Acide nucléinique.

Traitement des tuberculoses. Leucopoiétique puissant. Action nette dans tous les états infectieux, *salpingites, entérites, suppurations, cachexie.*

Mode d'action. — Dans la tuberculose, augmentation des globules blancs, surtout des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses lypases et oxydases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Fiessinger.

Agglutination des bacilles avec des formes d'involution et de souffrance, diminution et souvent disparition après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la *diathermie transpulmonaire* (1 500 à 2 000 milliampères), qui, employée seule, est inutile. Faire 3 séances de 1/2 heure, trois fois par semaine. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois, momentanément, dépression et fatigue vers 10^e ou 15^e jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats, qui deviennent souvent abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

La diathermie ne provoque pas d'hémoptysie (professeur d'Arsonval). Réaction thermique au début et défervescence après un temps variable.

Le **Tridynol** permet de très bons résultats dans les 1^{er} et 2^e degrés, variables selon l'état général au 3^e degré.

Tous les avantages des Sels d'or, aucun de leurs dangers ni de leurs inconvénients.

Médication spécifique des états infectieux.

Mode d'emploi. — Pilules : 5 par jour en moyenne : 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas. Les doses sont ainsi fractionnées pour éviter le choc.

Médication efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultra-violet (sans diathermie).

Prix : 20 francs.

Laboratoires JOURNET

18-20, rue Vavin — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 70-07.)

TRIGLANDINE

Composition. — Thyroïde, hypophyse, ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

Indications. — Par l'administration de ces trois glandes nobles, rétablit l'équilibre d'ensemble du système endocrinien.

Asthénies endocriniennes féminines. — Puberté, stérilité, troubles de l'appareil génital, hypertension de la ménopause et des dysendocri-niens, rhumatismes endocriniens, troubles de la circulation.

Aménorrhée, oligoménorrhée, ménorrhagies.

Formes. — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc.

Posologie. — 1 à 3 dragées (ou 1 ampoule de 1 cc. ou 3 cc.) par jour, pendant 10 jours par mois environ.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

TRIGOSTHÈNE

(Cachets bleus apéritifs et analeptiques.)

Composition. — Association intime de Trigonelle, Fenugrec, Rhubarbe et Gentiane, stabilisée au fluorure de Na et catalysée au sulfate de protoxyde de Manganèse (*procédé Angla*).

Propriétés. — Toni-reconstituant de valeur. Con-voyeur d'oxygène et fixateur des graisses. Stimu-lant des fonctions nutritives *permis même aux hépatiques*. Ne constipe jamais.

Indications. — Débilisations de toute étiologie. Anémie, Anorexie, Amaigrissement, Etats pul-monaires chroniques, Lymphatisme, Grossesse et Allaitement, Convalescences, Suite d'affections coloniales, etc.

Posologie :

2-3 cachets et plus par jour aux repas.

Boîte de 30 cachets : 15 francs.

Littérature et échantillons à volonté :

**Produits Spécialisés « Angla » — Monte-Carlo,
« La Barbiflore en thérapeutique ».**

TRINIBAÏNE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine à 1/100..... II gouttes (3 cgr.).
Ouabaine cristallisée 1/10 de milligr

Propriétés et Indications. — Remède de la défaillance du ventricule gauche. La *Trinibaïne* réalise à la fois la médication d'urgence et la médication d'entretien. C'est le remède d'urgence par excellence de l'angine de poitrine de décubitus et de l'œdème pulmonaire aigu.

Forme. — Dragées rouges à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour aux repas.

Prix. — L'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement) : 20 francs.

S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e)

Tél. : Trocadéro 62-24.

TRINITRAL LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 cgr.).
Phényléthylmalonylurée 0,01
Extrait apocynum cannabinum..... 0,003

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur à action immédiate, Sédatif puissant des algies cardiothoraciques et des spasmes vasculaires.

Diurétique et cardiotonique.

Médicament de choix des angoisses précordiales, des crises douloureuses d'origine aortique ou cardiaque, des troubles fonctionnels de l'hypertension, de l'aérophagie.

Forme. — Dragées jaunes à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, 1 à 3 fois par jour.

Prix : 20 francs l'étui de 60 dragées (de 20 à 60 jours de traitement).

S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

Composition :

Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).

Caféine..... 2 centigrammes.

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme cardiaque, l'Œdème pulmonaire.

Formes. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.

Dose maximum : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 15 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

Composition :

Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).

Chte Papavérine 5 milligrammes.

Propriétés et indications. — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : Angine de Poitrine, Asthme cardiaque et pulmonaire, Aortites, Artérites, Urémie.

Formes. — Dragées roses à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et, par là même, une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées à quelques minutes d'intervalle, au moment ou en prévision des accès.

Dose maximum : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public : Étui de 60 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications :

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

Prix : 8-9-10 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 62-27.)

TRINITRINE SIMPLE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à : Trinitrine à 1/100 — 1 gtte. (1 egr.5).

Propriétés et Indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée. Médicament de choix de l'angine de poitrine.

Forme. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — La *Trinitrine Simple Laleuf* se recommande par son faible dosage (une goutte par dragée) chez les sujets très sensibles à la trinitrine.

Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision des crises.

Maximum : 20 dragées par 24 heures.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour aux repas.

Prix : 12 francs l'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.
51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Troc. 62-24).

TRINITRINE VICARIO

En petits comprimés d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certaine contenant I, II et III gouttes de la solution alcoolique au centième.

Boîtes de 60 comprimés à I, II ou III gouttes.

Dose. — De II à VI gouttes par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament vasodilatateur et hypotenseur. Exerce sur le système nerveux une action analogue à celle du nitrite d'amyle, moins violente et plus durable.

Indications. — Aortite, Angine de poitrine, Presclérose, Artério-sclérose, Anémie cérébrale, Céphalalgies, Asthme, Maladie de Stokes-Adams, etc.

Prix. — Boîte de 60 comprimés : 6 francs.

Pour éviter toute confusion, prescrire Trinitrine
« Vicario ».

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

TRINIVÉRINE

Angine de Poitrine.

Forme. — Dragées vertes à noyau mou.

Composition. — Trinitrine (Vasodilatateur), Chlorhydrate de papavérine (antispasmodique), Caféine (toni-cardiaque, vaso-dilatateur des coronaires).

Indications. — Angine de poitrine, Cardialgie des aortiques, des hypertendus, Crises vasculaires, Angio-spasmes des artérites, de l'hypertension (éclipses), Asthme cardiaque.

Mode d'emploi. — Croquer une dragée pour prévenir ou calmer l'accès. Si nécessaire, croquer 2 ou 3 dragées à quelques minutes d'intervalle. Ne pas dépasser 10 dragées par 24 heures.

Prix : 17 francs.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TRINO BENZYLE

Médication hypotensive.

Forme. — Comprimé dragéifié.

Composition. — Solution alcoolique de Trinitrine, poudre de Scille, Extrait de gui, Benzoate de benzyle, Phényléthylmalonylurée.

Indications. — Par son association de gui, scille, trinitrine, benzoate de benzyle et gardénal, le TRINO BENZYLE est le médicament indiqué dans les hypertensions, artério-sclérose, vertiges, angoisses, troubles cardiaques.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à prendre par deux avant les repas. En cas de crises d'angor, croquer de 1 à 4 comprimés à 2 minutes d'intervalle.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-27.

P. BLOUIN

Pharmacien de 1^{re} classe,
50, rue de Turenne — PARIS.

TRIRADOL

Association d'iode organique, de menthol, de camphre et d'éléments radioactifs.

Indications. — Adénopathies cervicales et trachéo-bronchiques. Affections pulmonaires chroniques. Toute tuberculose pulmonaire et pleurale à évolution lente et à lésion limitée. Toute tuberculose chirurgicale.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — 1 ampoule par jour ou 2 à 6 capsules pendant 15 jours par mois.

Boîte de 10 ampoules : 20 francs.

Flacon de 60 capsules : 20 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

TRISALYL

Indications. — Traitement de la maladie rhumatismale. Rhumatisme articulaire aigu et toutes ses complications.

Composition. — Salicylates chimiquement purs de sodium, potassium et calcium, associés dans les proportions physiologiques du sérum de Ringer-Loocke

Propriétés. — Le Trisalyl réalise l'association salicylée isoionique au sang, permettant l'emploi massif, continu, sans contre-indications ni intolérance, du Salicylate.

Formes :

Voie buccale : Solution dosée à 1 gr. 50 par cuillerée à soupe (22 fr. — 250 cc.).

Voie veineuse : Ampoules I. V. 22 francs.

8 ampoules 10 cc..... 0 gr. 50 par ampoule.

8 — 10 —..... 1 gr. — —

4 — 20 —..... 2 gr. — —

Posologie :

Voie buccale : à partir de 3 cuillerées à soupe, monter à 6 cuillerées pro die.

Voie veineuse : d'abord 0 gr. 50, puis 1 gr., puis 1 gr. 50 par injection intraveineuse : 2 injections par 24 heures.

Traitement d'entretien. — Moitié des doses ci-dessus ; au bout d'un certain temps, n'employer que la voie buccale.

TRAITEMENT EXTERNE ADJUVANT

BAUME TRISALYL

Composition. — Salicylate de glycol, Salicylate d'ammonium, Salicylate d'antipyrine, excipient *non gras*.

Indications. — Traitement externe des rhumatismes, lumbagos, douleurs, etc...

Propriétés. — Association d'un éther salicylique, absolument non irritant, au salicylate d'analgésine, calmant et antipyrétique. Absorption favorisée par salicylate d'ammonium. Excipient non gras. S'enlève à l'eau

Mode d'emploi. — Onctions douces 2 fois par jour, *in loco dolenti* (le grand tube : 15 fr.).

J. OLIVE, Pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésié, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine et des Colonies après expérimentation.

Propriétés Thérapeutiques. — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue. absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

Originalité. — Produit d'une innocuité parfaite assurant, en même temps, l'évacuation des canaux biliaires et la désinfection des voies digestives, biliaires et urinaires. Contient une forte proportion de citrate de soude, lequel agit très heureusement sur le foie et les voies digestives, fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant pour l'intestin, se transforme en carbonate dans l'organisme et, avec les benzoates de soude et de lithine, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le pH biliaire dans le sens de l'alcalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

Indications. — Infections des voies digestives, biliaires et urinaires. Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences (cholécystite, colibacillose, lithiase biliaire, entérite, cystites, furonculose, etc...) Séquelles fonctionnelles de la cholécystectomie.

Posologie habituelle :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Laboratoires G. LAMBERT, O. ✱, Docteur en Pharmacie
6, rue de Longchamp, 6 — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54).

TRYNOL

(Comprimés.)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien. (Boîte de 50 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères. en empêchant les formations scléreuses.

Indications. — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

Prescription. — 1 boîte comprimés Trynol.

Prix : 15 francs.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e), Tél : Etoile 18-26.

TUBÉROL

TUBÉROL (pur)

Forme. — Liquide.

Composition. — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

Indications. — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

Prix : le flacon, 24 fr. 50 et 14 fr. 50.

TUBÉROL (onguent).

Composition. — Tubérol + Excipient adhésif.

Indications. — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

Prix : 11 fr. 90.

TUBÉROL (Oléo).

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — Tubérol + Huile stérilisée.

Indications. — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

Mode d'emploi. — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

Prix : 11 fr. 90.

TUBÉROL (injectable).

Forme. — Ampoules.

Composition. — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

Indications. — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

Mode d'emploi. — 1 à 6 ampoules par jour suivant gravité.

Prix { ampoules de 5 cc. : 25 fr. 50; la 1/2 boîte : 14 fr.
 ampoules de 2 cc. : 22 fr. ; la 1/2 boîte : 12 fr.

TUBÉROL (Sirop).

Composition. — Tubérol + véhicule.

Indications. — Antiseptique des voies respiratoires.
 Calme la toux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 15 francs.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 04-02.)

TUBES BLACHE

Toutes formules en pommades pour l'Ophthalmologie à partir de 7 fr. 25.

Liste des principales préparations :

Aminothionine Westermann, Analgo-contractine, Analgo-Mydriatine, Argovyl, Aristol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Zinc, Campho-Cuivre, Chaulmocuprine, Chlorhydratine, Colorants composés, Compositol, Contractine, Dioptrol, Hydrargyre composé, Ichto-Zinc, Iodoforme, Iodure alcalino-calcique, Kinargol, Nitrate d'argent, Organo-Bismuth, Ortho-Paléocaline, Oxy-arsine Hg, Oxyde Hg, Paléocaline, Phocéol, Précipité blanc, Thiosulfol cadique, Thiosulfol hydrargyrique, Zircotanyl, etc.

TUBES CHAUVIN

Toutes formules en pommades pour l'Oto-Rhinologie et pour la Dermatologie.

Série *Rhino* pour le nez, à partir de 11 fr. 50.

Série *Oto* pour les oreilles, à partir de 12 fr.

Série *Dermo* pour la peau, à partir de 12 fr.

Autres spécialités des Établissements Alfred Chauvin.

Acoégénol, 20 fr. ; Acoégénol éphédriné, 25 fr. ; Acoégénol opothérapique, 25 fr. ; Atropophédrine, 10 fr. ; Cachets Chauvin au quinocitrate de Lithine composé, 9 fr., 24 fr. ; Crème au Collohirtol, 12 fr. ; Comprimés Chauvin à l'extrait d'Alibour, 7 fr. 50 ; Dépuratif Chauvin (aux hyposulfites), 16 fr. ; Dépuratif infantile Chauvin, 16 fr. ; Désensibilisant infantile Chauvin, 16 fr. ; Désensibilisant Chauvin, 16 fr. ; Ergophédrine, 20 fr. ; Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure, 25 fr. ; Gouttes Chauvin à la Sclérocure, 18 fr. ; Laborol, 14 fr. ; Laborol phosphoré, 16 fr. ; Lactoscoparine, 25 fr. ; Paratyl, 20 fr. ; Pré-Paratyl, 16 fr. ; Phocéol interne, 20 fr. ; Sirop Chauvin à l'Adréno-éphédrine, 20 fr. ; Sirop de Sozopeptone éphédriné, 25 fr.

Établissements Alfred CHAUVIN
AUBENAS (Ardèche).

TUBES DULCIS POMMADES ASEPTIQUES

Argolène (1, 5 et 10 p. 100) : Bactéricide, conjonctivites aiguës.

Aristol (1 et 2 p. 100) : Antiseptique.

Asepto-Bismuth (5 p. 100) : Bactéricide puissant, non irritant, inodore.

Atropine (0,50 et 1 p. 100) : Mydriatique.

Bleu de Méthylène (0,50 et 1 p. 100) : Colorant aseptisant, inodore.

Cadmiol-Zinc (1 p. 100) : Conjonctivites à diplobacilles.

Calomel (5 p. 100) : Antiseptique, résorbant.

Cuprinol (1, 2 et 5 p. 100) : Conjonctivites chroniques.

Dionine (2 p. 100) : Lymphagogue, analgésique profond.

Eserine (Sulfate 0,50 p. 100) : Myotique.

Ichtyol-Zinc : Blépharites.

Iodo-Calcique : Cataracte.

Iodo-Rubidium : Cataracte.

Iodoforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antiseptique.

Kilogan (anciennement Ektogan) : Antiseptique non irritant.

Mercurobrome : Antiseptique colorant.

Myosine faible : Myotique.

Myosine forte : Myotique puissant.

Mydriasine : Mydriatique énergique.

Novoptine : Ulcères à pneumocoques.

Oxyde Orangé de Mercure (1, 2, 3, 4 et 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Ophtalmoforme (1, 2 et 3 p. 100) : Antipurulent.

Pilocarpine (1,2 p. 100) : Myotique.

Polyvaccin-Antivirus Dulcis : Immunisent les cellules en contact et stérilisent le foyer infecté, sans réaction locale ni générale. Pommade Type Ophtalmo et Type Oto-Rhino.

Ampoules de 2 cc. Type Ophtalmo et type Oto-Rhino.

Précipité blanc (1, 2, 5 p. 100) : Antiseptique résorbant.

Sédargol (collyres ampoules) : 2 %, 5 % et 10 %. Toutes les infections.

Sédoléine (Brûlures des paupières et de la conjonctive).

Thiosinamine (1 p. 100) : Opacités de la cornée.

Vitamine A : Avitaminoses.

Xéroforme (5 p. 100) : Antipurulent.

Laboratoire du Docteur FERRY

MONTE-CARLO

TUBES DU Dr GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL).

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

1° Tubes RATIO

Tubes Hydrargyl, Aseptoforme, Halocalcine, Bléphargyl, Mydriatique de Montpellier, Myotique de Montpellier, Tracholéol.

2° Tubes Ferlux classiques.

Huile de Chaulmoogra, Chaulmoogra-Butelline.

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100.

— jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100.

Iodoforme, Calomel, Précipité blanc. Ethyl-hydrocupréine (optochin), ($I Na + CaCl^2$), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc., etc.

Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Prix moyen : 10 francs.

Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie — ALBI.

TUBES STRANA

Pommades ophtalmiques en tube breveté.
Toutes formules à partir de 9 fr. 75.

Liste des Préparations — Antipneumo, Argyrol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Laro-Zinc, Calomel, Chlorhydrate d'Ethylmorphine, Eserine, Ichtyol, Ichtyol-Zinc, Iode-Calcium, Mydriatique puissant, Myotique puissant, Noviforme prov. Heyden, Oxyde jaune de mercure, Oxyde de zinc, Calmocaïne, Pilocarpine, Précipité blanc, Rouge écarlate, Sulfo-cuivre, Sulfo-laro-zinc, Tanargine, Xéroforme.

Laboratoires SALANTALE
STRASBOURG.

TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore de toutes plaies
(des plus bénignes aux plus graves).

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

Constitution. — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

Propriétés. — Evite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le **Tulle gras Lumière** permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

Présentation. — Le **Tulle gras Lumière** est présenté en carrés de dimensions fixes :

0m10 x 0m10.	Boîte de 10 compresses.	Prix :	15 francs.
0m10 x 0m10.	— 20 — —	—	22 francs.
0m10 x 0m10.	— 30 — —	—	27 francs.
0m22 x 0m22.	— 30 — —	—	110 francs.

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi — Placer un carré de **Tulle gras** sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

Constitué par un carré de 13×13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli, Pélargonium.

Le **Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique ; il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le **Tulle Rose Beslier** est livré en boîtes de 10 carrés de 13×13 .

Prix : 10 francs la boîte.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant

DIGOIN (S.-et-L.).

(Tél. : 45.)

TYMPANYL MAY

Otites Catarrhales, Otagies.

Composition :

Novocaïne.....	1	gramme.
Diméthylamino-analgésine.....	4	grammes.
Alcool éthylique pur	16	—
Glycérine anhydre chim. pure	79	—

(En association *anhydre*).

Indications. — Affections inflammatoires et congestives de l'oreille moyenne et de l'oreille externe : Otites catarrhales et congestives, Otagies ; Furoncles du conduit.

Mode d'action. — Analgésique, antiseptique, décongestif par osmose per-tympanique.

Non toxique. Non caustique.

Mode d'emploi. — V à X gouttes en instillation dans l'oreille malade ; à renouveler toutes les heures ou deux heures.

Prix : Le flacon 15 cc. : 13 fr. 50.

Laboratoires P. MAY, Pharmacien.

Lauréat de la Faculté de Paris.

215, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 41-51.)

UCLARSYL

Novarsénobenzol Codex, voie intraveineuse.

Rigoureusement pur, instantanément soluble. Maximum de tolérance.

Poudre d'un jaune très clair, en ampoules scellées sous vide.

Syphilis à toutes les périodes. Traitement d'attaque et d'entretien.

Doses unitaires de 15 à 90 cgr. par fractions successives de 15 cgr.

Prix au public, suivant doses, de 2 francs à 11 fr. 20.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 58-43.

Dépositaire :

Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 20-20.

ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *escarres*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions { Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim.
 { Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 24 ou 36 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 30 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04.

ULCÉOSINE

Poudre soluble.

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-arsenio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension artérielle, Varices, Congestions variqueuses et phlébitiques, Plaies atones, Ulcères variqueux, Rhumatisme chronique, Troubles hépatiques, Hyperglycémie, Diabète.

Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Prix : 12 francs.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-Sodique-Silicatée.

Par leur action sédatrice sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses. Arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume. Font résorber l'œdème et l'empâtement. Guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

La boîte pour 4 bains de jambe. Prix : 8 francs.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS. (Tél. : Roq. 1904.)

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde et peroxyde de zinc, acide orthobenzoïque, sulfate de cuivre, excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 10 francs.

ULCÉOSOL-POUDRE

Acide orthobenzoïque, magistère de bismuth, oxyde et peroxyde de zinc, acide boracique. Poudre siccative, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 10 francs.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04.

ULCÉRINE BERGER

Spécifique des Ulcères Variqueux.

Composition. — Pommade stérilisée aux principes actifs suivants : populine, salicine, pectine, acide benzoïque, acide gallique, associés au Baume du Pérou et à certaines huiles volatiles (*Thymus vulg.* et *Calendula off.*), dont les propriétés bactéricides et cicatrisantes sont remarquables.

Propriétés. — Décongestionnant. Suppression de la douleur et du prurit. Cicatrisation rapide de l'ulcération *par bourgeonnement*. Evite l'adhérence des pansements aux plaies et assure des cicatrices souples.

Indications. — *Ulcères variqueux*, même les plus rebelles.

Eczémas variqueux, secs et suintants.

Toutes les plaies atones : Radiodermites, Ulcérations chroniques, Brûlures anciennes, engelures, escarres, plaies diabétiques et par vésication.

Mode d'emploi. — Nettoyer la plaie à l'eau bouillie, ou, si elle est infectée, avec de l'eau oxygénée au 1/3. Appliquer la pommade étendue sur une compresse de gaze stérilisée. Renouveler le pansement tous les 2 jours, 1 ou 2 fois par jour, si les sécrétions sont abondantes.

Historique. — Présentée à la Société de Dermatologie par le Dr Gastou, chef du Laboratoire Central de l'Hôpital Saint-Louis, l'Ulcérine Berger a été admise dans les hôpitaux de Paris à la suite des rapports médicaux fournis par MM. les docteurs Brocq et Balzer, médecins des hôpitaux, Rieffel, chirurgien des hôpitaux, etc.

Prix : Le tube : 10 fr. 50. — Le grand tube : 18 francs.

Laboratoires P. NADAUD

Docteur en Pharmacie, licencié ès Sciences.

31, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 66-58.)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition. — Bande de 0 m. 13×10 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action. — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications. — Toutes les plaies atones des membres variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi. — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 25 fr. la bande.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

ULTRACALCIUM IRRADIÉ

Reminéralisateur physiologique assurant toutes les propriétés physiologiques de l'Ion Calcium.

INDICATIONS. — Assimilation défectueuse du calcium, déminéralisations, déficiences constitutionnelles, troubles de croissance, anémie, lymphatisme, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, pré tuberculose.

Ergostérine irradiée.....	0 gr. 03
Poudre de parathyroïde.....	0 gr. 06
Poudre de surrénale.....	3 gr.
Poudre d'os frais.....	20 gr.
Poudre de thymus.....	5 gr.
Glycérophosphate de chaux.....	40 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	6 gr.
Fluorure calcium.....	5 gr.

Sucre aromatisé : Q. S. pour 1.000

Ultracalcium se présente sous la forme d'un granulé fondant, de goût très agréable et facile à prendre.

L'association d'extraits des glandes parathyroïdes, surrénales, etc..., aux minéraux nécessaires à l'organisme (Phosphore, calcium, manganèse, magnésium), assure une reminéralisation optimale. La présence d'ergostérine irradiée ajoute à ces principes reminéralisateurs les propriétés considérablement augmentées de l'huile de foie de morue. Le granulé **Ultracalcium** peut être administré depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, sans aucun inconvénient.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café, par jour, suivant prescription médicale. Prix : le flacon 16 fr.

LABORATOIRE AUCLAIRE,

E. Auclaire, Pharmacien de la Faculté de Paris.

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

ULTRAFORMINE

B. et S.

Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).

Composition. — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

Propriétés. — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

Indications. — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

Dose moyenne. — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

ULTRA-LEVURE

Levure ultra-haute (37°) de H. Boulard.

Composition. — 120 à 150 millions de globules de levure par ampoule de 3 cc. 5 dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

Propriétés. — Température d'activité et de reproduction optimum correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Passe dans la circulation et se retrouve dans les urines.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamine B). Action spéciale sur les dermatoses par la vitamine B.

Indications. — *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (se prend dans du lait), diarrhées et dysenteries amibiennes ou bacillaires, entérites, furonculose et dermatoses, *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats très rapides).

Mode d'emploi. — Livrée en boîte de 12 ampoules de 3 cc. 5. *Dose normale* : 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée ; *dans les cas aigus* : 1 ampoule deux fois par jour ; *dose d'entretien* : 2 ampoules par semaine.

La boîte de 12 ampoules : 22 fr. 50.

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

ULTRA-VIOLETS

1° Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies.

2° Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéale, génitale.

3° Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus et affections du cuir chevelu, pelade.

4° États de surmenage et d'asthénie, convalescence.

5° Infections de l'oreille, tuberculoses oculaires, carie dentaire, pyorrhée, blanchiment des dents.

Vente et location de tous appareils et accessoires à :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

ULTRAVITAMINE 4

“ U 4 ”

Puissant dynamogène. Recalcifiant intégral, plus actif et plus régulier que l'huile de foie de morue.

Composition. — Association des Vitamines avec des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, et des éléments opothérapiques : Moelles et Poudres d'Os frais.

Indications. — Déminéralisation, Rachitisme, toutes Carences et Convalescences, Dépression nerveuse, Fatigue musculaire, Allaitement, Prétuberculose.

Forme. — Granulé bicolore, délicieusement parfumé.

Posologie. — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, 1/2 heure avant les 2 ou 3 principaux repas.

Prix : 16 fr. 50.

**Laboratoire d'Actino-Biologie
LAURENÇON et Cie, Pharmaciens**

11, rue François-Giraud —
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône.)

UMCKA

Gouttes

Phytothérapie antibacillaire

Composition. — Complexe végétal contenant les principes actifs d'une plante Africaine de la famille des Polygonacées.

Propriétés. — Amélioration du terrain. Augmentation des moyens de défense.

Indications. — Tous les états prétuberculeux pulmonaires et chirurgicaux.

Avantages. — Innocuité absolue, aucune contre-indication, parfaitement toléré, même par les organismes les plus délicats, convient particulièrement aux enfants (ganglions).

Présentation. — Petit modèle (P. M.). Extrait fluide inscrit au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 278-2. Durée moyenne 20 jours. Grand modèle (G. M.). Extrait fluide concentré inscrit au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 278-1. Durée moyenne 4 mois.

Mode d'emploi :

Adultes : V à XXX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : II à XV gouttes 2 fois par jour, dans une demi-tasse d'eau chaude ou tisane une demi-heure avant les repas.

Laboratoire E. REVEL
34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX°).
(Tél. : Trinité 13-38.)

URALYSOL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

Forme. — Granulés.

Formule. — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine, anhydro-méthylène-citrate d'hexaméthylène - tétramine, Sels de lithine.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, matin et soir dans un verre d'eau.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

URASEPTINE ROGIER

Principes actifs. — Hexaméthylènetétramine et son citrate, Benzoates de soude et de lithine, Diéthylènediamine.

Forme. — Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de matière active par cuillerée à café.

Action thérapeutique. — Puissant antiseptique urinaire et biliaire par dédoublement assuré de l'hexaméthylène, Antisepsie générale, Dissout et chasse l'acide urique.

Indications. — Pyélites, cystites et toutes affections vésico-rénales, cholécystites, Colibacillooses, maladies infectieuses, diathèse urique, arthritisme.

Posologie :

Adultes : Antisepsie vésico-rénale : 3 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Arthritisme : 2 à 4 cuillerées par 24 heures par périodes alternées de dix jours longtemps répétées.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par 24 heures suivant l'âge.

Le flacon : 14 fr. 50.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Pereire — PARIS.

(Tél. : Wagram : 33-70.)

URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

Indications :

Goutte, Gravelle, Rhumatisme.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 ctg. : trois ou quatre par jour, au moment des repas (tubes de 20 comprimés). Prix : 8 fr.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas (flacons de 85 g. env.).
Prix : 15 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

UR-CLAR

Antiseptique urinaire.

Forme : Capsules.

UR-CLAR BLEU

Composition. — Bleu de Méthylène, Citraminoxypène, Poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

Indications. — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

Mode d'emploi. — 6 à 9 capsules par jour.

Prix : 20 francs les 60 capsules.

UR-CLAR BLANC

Forme : Capsules.

Composition. — Santalol citraminoxypène, poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

Indications. — La blennorrhagie et ses complications.

Mode d'emploi. — 9 à 12 capsules par jour.

Prix : 20 francs les 60 capsules.

Laboratoire M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS.

(Tél. : Trudaine 54-69.)

URÉMIASE

(Comprimés Anti-Urémiques.)

Composition. — Produit concret extrait du cerveau de certains poissons (Gadidés), associé à la Rénine (substance corticale rénale).

Propriétés thérapeutiques. — L'UREMIASE rend d'immenses services dans le traitement de l'urémie d'origines diverses et des rétentions azotées. Douée de propriétés antitoxiques et en même temps diurétiques, elle produit un abaissement sensible du taux de l'urée sanguine, une diminution et même la disparition de l'albumine, l'activation de la diurèse dans l'Oligurie. On peut dire que, sous son action, le rein est débloqué.

Indications. — Crises d'Urémie, Néphrites chroniques, Azotémie, Hypertension, Artériosclérose, Oligurie, Insuffisance rénale, etc. L'UREMIASE n'agit comme diurétique que dans les troubles fonctionnels du rein, dans tous les accidents de nature urémique, et non chez les sujets normaux.

Posologie. — *Adultes, Vieillards* : 3 comprimés dans une cuillerée d'eau toutes les deux heures. Après 5 ou 6 prises ainsi réparties, réduire à deux comprimés toutes les 2 ou 3 heures jusqu'à résolution.

Etats chroniques : 6 par jour, matin, midi, soir, pendant 2 ou 3 semaines.

Enfants à tout âge jusqu'à 14 ans environ : Même mode d'emploi avec 2 comprimés au lieu de 3.

Prix : 20 francs.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

URÉOL CHANTEAUD

Composition. — Granulé contenant par cuillerée à café :

Héxaméthylène tétramine	0 gr. 40
Benzoate de soude	0 gr. 30
Benzoate de lithine	0 gr. 10

Indications :

Désinfectant très actif des voies urinaires et biliaires.
Manifestations arthritiques, goutteuses, suppurations rénales et des voies urinaires.

Doses et mode d'emploi :

1 cuillerée à café 2 fois par jour que l'on fait dissoudre dans un peu d'eau.

Prix de vente : 12 francs (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

3 et 5, rue Alexandre-Dumas

SAINT-OUEN (Seine). — (Tél. : Clignancourt 02-28.)

URICÉMINE

Excès d'acide urique, diurèse.

Antiseptie urinaire et biliaire.

Synergie médicamenteuse à doses non flocculantes.

Composition de 2 cuillerées à café : Salicylate de pipézarine, 0,065 ; benzoate de soude, 0,25 ; benzoate de lithine, 0,25 ; silicate de soude, 0,025 ; urotropine-0,25 ; citrate monosodique 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité à l'état naissant par synergie et sans provoquer de précipitation.

Mode d'action. — Dissolvant de l'acide urique, anti-purinique, anti-flocculant, anti-sclérosant, antiseptique.

Indications. — Hyperuricémie, Lithiase rénale, hypertension artérielle, artério-sclérose, athérome, goutte, sciatique, asthme, pléthore, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

Prix : 15 francs le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

Propriétés thérapeutiques. — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

Indications. — Maladies infectieuses des Voies Urinaires, Cystites, Pyélites, Colibacilloses, Blennorrhagie.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e.)

(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action antirhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

La boîte de comprimés ou pilules : 12 francs,
prix public.

La boîte de 10 ampoules : 13 fr. 50,
prix public.

Produits STÉNÉ

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

URISANINE

Composition. — Une cuillerée à café représente:

0,75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine et 0,25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans un excipient balsamique (buchu).

Indications :

Antiseptique: par le benzoate d'hexaméthylène-tétramine toujours bien toléré.

Diurétique: par l'extrait spécial de maïs.

Sédatif: par le buchu et l'extrait de plantes balsamiques.

Toutes les affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésicorénale.

Solution aromatique concentrée, à prendre par cuillerée à café dans un demi-verre d'eau.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : X gouttes par jour et par année d'âge.

Prix du flacon : 15 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 21-95.)

UROBOLDINE

Composition. — Pipérazine, Phosphate de soude, Phénylcinchoninate de soude, Carbonate de lithine, Hexaméthylène-tétranine, Chlorhydrate de boldine.

Présentation. — Granulé effervescent agréable au goût.

Propriétés thérapeutiques. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'Acide urique, cholagogue. La Boldine associée aux plus actifs dissolvants actuels de l'acide urique assure à l'UROBOLDINE un pouvoir d'attaque et d'entretien.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Gouttes aiguë et chronique, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, artériosclérose, arthritisme, troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires, auto-intoxications.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

Dans les crises aiguës, 3 à 5 cuillerées à café.

Laboratoires de l'UROBOLDINE
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

UROBUCCOL MALMANCHE

Composition :

Formine (uroformine, urotropine)...	25	centigr.
Benzoate de soude	20	—
— de lithine	10	—
Sirop de buchu.....	2	grammes.
— de maïs	2	—
— de térébenthine.....	2	—
— d'orthosiphon.....	2	—

par cuillerée à café.

Forme. — Liquide sirupeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires, antiseptique général, balsamique et diurétique puissant. Dissolvant phosphatique, urique et uratique.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatite, Blennorrhagie, Uricémie, Goutte, Lithiase rénale, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion.

Prix au public : 14 francs le flacon de 90 cc.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.)

UROCÉDROL

Composition. — Cedrus Atlantica, Salol, Camphorate d'Hexaméthylène-Tétramine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant dans toutes les affections des voies urinaires, Diurétique et calmant. Aucune intolérance, et par conséquent supérieur à tous les balsamiques connus.

Indications. — Cystite, Pyélite, Catarrhe vésical, Blennorrhagie aiguë et chronique.

Mode d'emploi. — 6 à 10 capsules par jour.

Prix : 18 francs le flacon pour 8 jours de traitement.

Laboratoires GALLO

Docteur en Pharmacie

AURILLAC (Cantal).

Tél. : 0-57.

UROCHOLINE

Composition. — Salicylate d'hexaméthylène-tétramine, Peptones, Sulfate de magnésie, extrait d'artichaut, extrait de boldo, glycyrrhizine.

Indications thérapeutiques. — Lithiase biliaire, constipation, ictère, urticaire, hémorroïdes, cholécystites simples et chroniques, intoxications du tube digestif.

Présentation. — Granulé soluble, odeur et saveur agréables.

Posologie et mode d'emploi. — De une à trois cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun. Enfants demi-dose.

Prix. — 17 fr. 50 pour un traitement moyen de 1 mois environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1.100.01.

Laboratoire de l'UROCHOLINE

20, pl. de la Mairie — PARC-SAINT-MAUR (Seine).
(Tél. : Gravelle 00-43.)

UROCLAROL

Antiseptique urinaire et biliaire.

Composition. — Uroformine, 0,15 ; Benzoate de lithine, 0, 10 ; Sulfate de magnésie, 0,25 ; Extrait de belladone, 0,005, pour un comprimé glutinisé.

Propriétés. — *Antiseptique* des voies urinaires et biliaires par l'Uroformine. — *Uricolytique* grâce au Benzoate de lithine. — *Cholagogue* et légèrement laxatif (Sulfate de magnésie). — *Antispasmodique* : l'Extrait de belladone agit sur le syndrome colique si fréquent au cours des Lithiases (bilaires et rénales) et des Suppurations rénales.

Indications. — Colibacillose, Coliques néphrétiques et biliaires, Cholécystites, Pyérites, Cystites, Prostatites, Blennorragie. Toutes infections urinaires.

Mode d'emploi. — Quatre à dix comprimés par jour.

Il est recommandé de faire alterner les cures d'Uroclarol et de Buchobleu.

Boîte de 40 comprimés : 18 francs.

Laboratoires de l'UROCLAROL

117, rue Victor-Hugo — HOUPLINES (Nord). Tél. 11.

Médicament enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

UROCLASE

Gouttes

Traitement causal de l'uricémie et des états alcalosiques.
Anti-urique vrai (préventif et curatif). Non toxique.

Définition :

L'*Uroclase*, chimiquement non acide, agit exclusivement par l'état colloïdal dans lequel ses composants s'y trouvent, comme le prouve sa formule : (pour 100 gr. de solution) :

Bioxyde de silicium : 0,25, uni par adsorption au Carbonate de K : 0,02, au Chlorure de Na : 0,19 et au Carbonate de Lithium : 0,005

Dispersés en milieu aqueux par procédé spécial.

Mode d'action :

L'*Uroclase* est essentiellement un *modificateur du terrain*, bien que son action immédiate en fasse également le plus actif éliminateur des dépôts existants d'acide urique. Son efficacité est profonde, progressive et durable.

En effet, par sa forme colloïdale, il permet la self-acidification de l'organisme, corrige progressivement le métabolisme, rétablit l'équilibre acido-basique dévié vers l'alcalose et redresse jusqu'à la normale le pH humoral et tissulaire. La précipitation de l'acide urique endogène et exogène devient ainsi impossible dans l'organisme.

Il agit à la façon des diastases suivant les lois de la physico-chimie des colloïdes, sans altérer l'organisme ni déclencher les réactions alcalines de défense.

Indications :

- 1° *Uricémie*: Arthritisme, goutte et rhumatisme goutteux, artériosclérose et hypertension artérielle, névralgies (sciatique, lumbago, migraines) et tous les troubles de même étiologie (arthrite alvéolo-dentaire, bourdonnements, cataracte uricémique, etc...).
- 2° *Toutes les manifestations alcalosiques*: Influence heureusement les asthéniques, les psychasthéniques, les surmenés ; retarde la sénilité.

Posologie :

Son inobservation diminuerait sensiblement l'efficacité du traitement.

Prescrire: V à X gouttes d'*Uroclase* à prendre dans un peu d'eau seulement, le matin à jeun (1/4 d'heure avant toute autre ingestion) par décades alternées de cure et de repos.

En bonne règle, commencer par V gouttes seulement (au delà, le traitement peut réveiller au début, tout comme une banale cure hydro-minérale, une légère manifestation arthritique de courte durée), puis atteindre graduellement (dès la 3^e décade de cure) la dose journalière optima, à savoir : 1 goutte par 10 kg. de poids.

Pas de contre-indication, ni intolérance, ni accoutumance. Inoffensif et sans saveur, il n'a pas d'action nocive sur le cœur ni sur aucun autre organe.

Pas de régime (une alimentation variée est à conseiller), mais proscrire l'alcool et tous excès en général.

Pour atteindre pleinement le but visé, la persévérance doit être exigée ;

le traitement sera prolongé au besoin plusieurs mois, en raison du caractère causal du traitement et de l'origine toujours ancienne (souvent atavique) de ces manifestations pathologiques.

Contrôle de l'efficacité de l'Uroclase.

Avant de commencer le traitement (à instaurer dès terminaison de la période aiguë).

- 1° Prendre la tension artérielle ;
- 2° Faire le dosage de l'acide urique dans les urines ;
- 3° Faire le dosage de l'acide urique dans le sang.

Au cours du traitement :

a. Constatations immédiates :

- 1° Augmentation du taux de l'acide urique dans le sang, et secondairement dans les urines ;
- 2° Eventuellement, légère manifestation arthritique (sujets fortement uricémiques).

b. Constatations ultérieures :

- 1° Abaissement de la tension artérielle ;
- 2° Diminution du taux de l'acide urique dans le sang, jusqu'à la normale ;
- 3° Diminution du taux de l'acide urique dans les urines, jusqu'à la normale ;
- 4° Sensation de légèreté, de bien-être, de lucidité mentale ; une sorte de rajeunissement, de goût au travail, etc...

UROCLASE « M »

GOUTTES

Diathèses Mixtes (uro-oxaliques, uro-phosphatiques)

Même composition chimique que l'Uroclase normal, mais avec micelles colloïdales plus fines ; son emploi doit être réservé aux cas suivants : Lithiase urinaire (rénale ou vésicale), rhumatismes déformants, tophi, etc...

Posologie spéciale. — Prescrire un traitement prolongé, avec alternances d'Uroclase normal et d'Uroclase « M ».

Mêmes décades de cure séparées par des repos équivalents.

Commencer par 5 gouttes journalières, dose à porter progressivement, dès la 3^e ou 4^e décade de cure, jusqu'à 15 et même 20 gouttes (selon la sensibilité du sujet).

On constate tout d'abord des éliminations de gravelle avec arrêt dans l'évolution des formations calculeuses ; puis, *avec le temps*, une lente désagrégation de ces dépôts ou calculs (que confirme l'examen radiologique). Ces résultats remarquables s'expliquent par le mode d'action physico-chimique d'Uroclase.

Prix de vente :

Le flacon Uroclase normal (pour 2 mois de traitement) : 23 francs.

Le flacon « Uroclase M » : 25 francs.

Littératures spéciales et échantillons sur demande aux :

Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL

G. BERTIN, pharmacien

95, rue de Prony — PARIS (17^e) — (Galv. 76-86.)

UROCYLATE

Composition. — Héxaméthylène tétramine et Salicylate de soude.

Forme. — Liquide sirupeux.

Dosage. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 75 d'Héxaméthylène tétramine + 0 gr. 75 de Salicylate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires. Antiseptique général.

Indications. — Celles de la médication urosalicylée. Tout état infectieux, grippe, voies urinaires, colibacillose, cholécystite, affection thyphoïde, état arthritique.

Posologie. — Voies biliaires : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun. Autres états infectieux : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 18 francs.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion A. CHATAIN
Docteur en Pharmacie

Ex-interne en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie de l'Université de Lyon.

Dépôt général :

57, rue Pierre-Corneille — LYON.

UROFLUX

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Extrait rénal, 0 gr. 02, Tartrate de pipérazine, 0 gr. 05. Benzoate de lithium, 1 gr. Benzoate de sodium, 1 gr. Hexaméthylène tétramine, 3 gr. Pipérazine, 0 gr. 50. Excipient effervescent au citron Q. S. pour 100 gr.

Propriétés pharmacodynamiques. — Diurétique, antiseptique des voies urinaires et biliaires, régulateur de l'activité hépatique, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Affections urinaires (urétrites, cystites, prostatites). — Manifestations arthritiques (goutte, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques).

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dissoute dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour entre les repas.

Prix : 14 francs pour 10 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12°).

UROFORMINE GOBEY

Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure, cristaux solubles dans l'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique sanguin pouvant être utilisé contre toutes les infections.

Indications. — Fièvres infectieuses, grippe simple, encéphalites, complications bronchiques et pulmonaires, etc... Infections des voies biliaires et urinaires, colibacillose.

Présentation :

Boîte de 50 comprimés simples à	0,50
Boîte de 50 comprimés effervescents à.....	0,25
Boîte de 12 ampoules de 2 cc. à.....	0,25
Boîte de 6 ampoules de 5 cc. à.....	0,25

Boîte de 8 suppositoires associant Uroformine, Ichthyol, Jusquiame et Codéine.

Posologie :

2 à 4 comprimés simples par jour.

4 à 8 comprimés effervescents par jour (dans un grand verre d'eau).

2 à 3 suppositoires par jour.

Prix au public :

La boîte de 50 comprimés à 0,50	14 fr.
La boîte de comprimés effervescents.....	14 —
La boîte de 8 suppositoires.....	15 —

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

UROÏODINE

Composition. — Iodoéthylate d'hexaméthylène-tétramine, associé à un sel de lithine.

L'*Uroïodine* n'est pas une simple association Iode-urotropine-lithine, mais une combinaison chimique nettement définie.

Elle ne peut donc être remplacée par une formule magistrale. Elle contient 43 p. 100 d'iode rigoureusement titré, au lieu de 17 p. 100 dans les iodopeptones.

Propriétés physiques. — Solution dialysable — se décomposant lentement — s'éliminant dans l'urine, sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique, pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques :

- 1° Par sa molécule iodée : excitateur puissant des fonctions lymphoïdes ;
- 2° Par sa combinaison iodo-formine : agent anti-infectieux particulièrement énergique.
- 3° Grâce à l'association formine-lithine : diurétique très actif, urisolvant puissant.

Indications. — *Diathèse urique* : Goutte, gravelle, lithiases biliaire et rénale.

Diathèse arthritique : Rhumatismes chroniques et subaigus, sciatique.

Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires ; Toutes affections justiciables d'un traitement iodo-ioduré intensif : adénopathies, végétations, asthme, emphysème, scléroses viscérales, artério-sclérose, hypertension artérielle.

Toutes maladies infectieuses, du Système nerveux notamment.

Présentations. — Ampoules de 4 cc., injectables indifféremment en I. M. ou I. V. — sans réaction locale, ni choc — résorption parfaite. Comprimés de 0 gr. 50, enrobés de gluten : ne se dissolvant donc pas dans l'estomac, tolérance parfaite.

Posologie :

Chez l'enfant : au-dessous de 15 ans : 1/2 à 1 ampoule par jour ; 1 à 2 comprimés par jour.

Chez l'adulte : 1 à 3 ampoules par jour, simultanément (à la dose maxima, de préférence en I. V.) ; 4 à 8 comprimés par jour. Avaler les comprimés avec un peu d'eau, sans les croquer, de préférence avant les repas.

Chaque ampoule correspond à 148 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Chaque comprimé correspond à 48 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Prix : Ampoules : 28 francs ; Comprimés : 24 francs.

Laboratoires de l'UROIODINE

17 bis, rue Juge — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 08-02 et 41-22).

UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure.

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Ampoules : Prix 16 francs. — **Comprimés :** 14 francs.
Littératures et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

UROMÉTHYL

Composition. — Hexaméthylènetétramine chimiquement pure, Citrate d'Hexaméthylènetétramine, Bleu de méthylène, Salol.

En association stable.

Formes et posologie :

a. Cachets à noyau médicamenteux glutinisé (3 à 6 par jour).

b. Dragées glutinisées (6 à 8 par jour).

Action thérapeutique. — La libération d'une partie des principes actifs a lieu seulement dans l'intestin : d'où *activité renforcée et tolérance parfaite*, même par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Affections et infections des voies urinaires et biliaires, Manifestations des diathèses urique et arthritique.

Prix :

Cachets : 21 francs.

Dragées : 17 francs.

Concessionnaires exclusifs :

Les Laboratoires NOVALIS

OULLINS (Rhône).

UROMIL

Composition. — Ether éthyl-phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène-tétramine, phosphate disodique.

Forme. — Granulés effervescents, instantanément solubles dans l'eau. Solution de goût agréable.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Possède un pouvoir dissolvant double de celui des pipérazines granulées et est toujours bien toléré. Par ses éléments phosphoriques, empêche la néo-formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique. Combat ainsi efficacement la cause même de la diathèse urique.

L'ion H dérivé de ses phosphates acides et le CO qui se développe au moment de son ingestion assurent l'équilibre acido-basique du plasma sanguin.

Indications. — Diathèse urique, rhumatismes, goutte, lithiases, coliques néphrétiques, cystite, pyélite.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dissoute dans un verre d'eau.

Laboratoires UROMIL
L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie,
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).
Tél. : Provence 04-00.

UROPHÉNYL

Composition. — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène-tétramine recristallisée.

Action. — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

Indications. — Goutte et rhumatisme.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Prix : 18 francs.

Laboratoires CROUY
Docteur en Pharmacie.
VERNON (Eure).

UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 363-10.

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui : 15 francs (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

UROPIAT

Association de l'Urotropine aux meilleurs Balsamo-toniques et antigonorrhéiques de la pharmacopée.

Composition. — Urotropine, 0,05 ; Santalol, 0,05 ; Térébenthine, 0,05 ; Baume de Copahu, 0,07 ; Cubèbe, 0,07 ; Kawa-Kawa et cannelle, Q. S. pour 1 pilule glutinisée.

Indications. — Blennorragies aiguë et chronique, métrites, vaginites, cystites, prostatites, etc.

Avantages. — Parfaitement toléré, l'Uropiat ne fatigue jamais ni l'estomac ni les reins.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour au début ou au milieu des repas.

Prix : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1318-1.

Laboratoire SARDA

119, rue de Sèze — LYON.

UROQUINOL

Antiseptique urinaire et biliaire.

Action :

- 1° Mobilisatrice par le Phénylcinchoninate de Soude.
- 2° Cholagogue par l'extrait d'artichaut.
- 3° Antivisqueux par le citrate trisodique.
- 4° Empêche la formation des purines et entrave la précipitation de l'acide urique par son phosphate de soude.

Formule :

Phénylcinchoninate de soude	1
Urotropine	3
Tartrate pipérazine.....	1
Phosphate de soude pulvérisé	1
Citrate trisodique	2
Extrait mou artichaut repris.....	0,50

Pour 100 grammes.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans un verre d'eau, pris le matin à jeun et avant les repas.
Dans les crises aiguës : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Présentation. — Granulé soluble.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

UROSALYL

Association Urotropine-Salol stabilisée par un excipient spécial qui augmente son pouvoir cholagogue et lui donne une remarquable activité.

Deux formules : I. — UROSALYL SIMPLE

Cachets (boîte blanche).

1 cachet correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine..... 0 gr. 40

Salol..... 0 gr. 50

Granulé :

1 cuiller à café correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine..... 0 gr. 10

Salol..... 0 gr. 10

II. — UROSALYL-MÉTHYLE.

(Sans Urotropine).

Cachets (boîte bleue) :

1 cachet correspond à :

Bleu de méthylène cristallisé chimiquement pur... 0 gr. 03

Salol..... 0 gr. 65

Particularités. — Grâce à l'heureuse association de ses composants qui retarde la décomposition de l'urotropine dans l'estomac, crée le milieu favorable à son dédoublement dans l'intestin et assure son élimination par les urines, l'Urosalyl est bien plus actif que chacun de ses éléments, qu'ils soient pris ensemble ou isolément.

Propriétés. — Puissant antiseptique des infections gastro-intestinales, urinaires, biliaires, rhumatismales et toutes maladies infectieuses. Le bleu de méthylène étant un puissant sédatif de l'élément douloureux, l'Urosalyl méthylé est particulièrement indiqué dans toutes les affections douloureuses de l'appareil urinaire (cystites et prostatites tuberculeuses), ainsi que dans les crises aiguës de rhumatisme arthritique et toutes les fois qu'il y a intolérance à l'Urotropine.

Indications thérapeutiques.

Infections gastro-intestinales. — Fermentations intestinales, auto-intoxications, intoxications alimentaires, colibacillose et toutes maladies d'origine infectieuse ou microbienne : agit comme antiseptique général interne par son urotropine, comme antiseptique intestinal par son salol.

Infections biliaires. — Angiocholites, cholécystites, lithiase biliaire et toutes les manifestations de l'hépatisme : agit comme antiseptique par son urotropine, comme cholagogue par son salol dont l'excipient vient renforcer son action sur le foie et la bile.

Infections urinaires. — Urines troubles, purulentes, microbiennes, toutes infections urinaires, rénales, vésicales, cystites, urétrites, prostatites, pyélonéphrites, syndrome entéro-rénal.

Rhumatismes. — Agit par son salol qui se décompose dans l'intestin avec mise en liberté d'acide salicylique, spécifique du rhumatisme.

Posologie :

Cachets (simple ou méthylé) : 2 à 3 par jour au début des repas.

Granulés : 2 à 6 cuillerées à café dans un peu d'eau au début des repas.

Présentation :

Cachets (simple et méthylé) : boîte de 24 cachets (8 jours de traitement) : 12 francs. — Boîte de 60 cachets (20 jours de traitement) : 25 francs.

Granulé : étui de 125 gr. (8-10 jours de trait.) : 15 fr.

Enregistrés au laboratoire national de contrôle des médicaments sous les n^{os} 300-1, 300-2 et 300-3 (peuvent être prescrits aux assurés sociaux).

Laboratoire Clément GARDIOL

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Montpellier,
6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE (Tél. : National 49-10.)

Échantillons et littérature sur demande.

UROSCLÉRAL

Iodo-Calcio-Formine.

Antiseptique général interne, désinfectant urinaire, Hypotenseur et Antihémorragique.

Infections de l'appareil urinaire, Néphrites, Pyélites et Pyélonéphrites, Etats infectieux et septicémiques, Infections du névraxe.

Boîte de 20 comprimés à 0 gr. 50 : 15 francs.
3 à 6 par jour.

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. à 10 p. 100 :
18 francs. 1 ampoule ou plus par jour.

H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens,
5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

UROSIPHON

Forme. — Infusion, de goût agréable.

Composition. — Orthosiphon Stamineus de culture, sélectionné et desséché suivant un procédé spécial, conservant toutes les propriétés et tout l'arome de la plante fraîche.

Propriétés. — Puissant diurétique hépato-rénal, azoturique, déchlorurant, hydrurique, sédatif, stimulant de la dépuratation urinaire.

Indications. — Oligurie, hyperazotémie, uricémie, hypochlorurie, cystite, pyélonéphrite, rhumatisme goutteux, œdèmes, hépatisme.

Posologie. — Chacun des 10 paquets contenus dans la boîte d'*Urosiphon* sert à préparer un demi-litre d'infusion qui représente la dose quotidienne à absorber en 3 ou 4 prises au cours de la journée.

Laboratoire de l'UROSIPHON

J. HUCHEDÉ, Docteur en Pharmacie.
1, rue de l'Odéon — PARIS.

UROVITINE

Composition. — Vitamine A, extrait d'Orthosiphon, Hexaméthylène-tétramine, Chlorure d'Ammonium.

Propriétés. — Antiprécipitant biologique, Diurétique, azoturique, déchlorurant. Antiseptique interne. Acidifiant léger du pH urinaire. Anticolibacillaire. Antiinfectieux.

Indications. — Affections des Voies Urinaires, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Chirurgie pré et post-opératoire.

Présentation. — *Dragées* — Prix : 17 francs.

Mode d'emploi. — 3 à 6 dragées par jour, en 2 ou 3 fois, avec un peu d'eau.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

UROXYL

Composition (pour comprimé).

Helmitol (hexaméthylène citrique)	0,05
Benzoate sodique	0,30
Salicylate phényle	0,20
Bleu de Méthylène	0,03

Propriétés. — Décongestives, sédatives, antiseptiques et modificatrices des sécrétions urinaires.

Indications. — Urétrites, métrites, cystites, néphrites, pyélonéphrites, incontinence urine, etc...

Posologie. — 3 comprimés par jour, un à chaque repas (avalé sans faire fondre le comprimé).

Prix : 7 francs le tube de 20 comprimés.

Laboratoire COTER

11, place Sainte-Eulalie — BORDEAUX
(Gironde).

URTICIDE DRAGÉES

Antianaphylactique.

Composition. — Pancréatine, Hépatine et 12 peptones (Poissons, crustacés, sérum de cheval, caséine, gluten, ovalbumine, etc.).

Indications. — Urticaire alimentaire ou sérique. — Migraines rebelles. — Eczéma prurigineux. — Prurits. — Tous états anaphylactiques. — Zona.

Mode d'emploi. — Traitement d'attaque : 2 dragées toutes les heures pendant au moins 6 heures. — Les jours suivants, 4 fois par jour, 3/4 d'heure avant les 3 repas et le soir au coucher. — Prolonger le traitement 15 jours.

Cas chroniques : 2 dragées matin, midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

L'étui de 80 dragées 20 fr.

L'étui de 40 dragées 12 fr. 50

CHARLES ROCHE, * ☼ ☼ ☼, **Pharmacien**,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée, Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

URTICIDE LIQUIDE

Pour enfants et adultes.

Composition et Indications. — Les mêmes que sous forme dragées et comme indications particulières : Asthme infantile, Prurigo Stophulus, Prurit des fièvres éruptives, Vomissements des nourrissons.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café à prendre à la même fréquence que les dragées.

Contre les vomissements des nourrissons : 1 cuillerée à café 1/4 d'heure avant les tétées.

Observation importante. — Une cuillerée à café d'Urticide liquide correspond à une dragée d'Urticide et peut se donner aux adultes par cuillerées à dessert.

Le grand flacon (40 doses) 20 fr.

Le petit flacon..... 12 fr. 50

CHARLES ROCHE, * ☼ ☼ ☼, **Pharmacien**.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée, Ex-chef de travaux de chimie.

2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 8-91.

Adr. télégr. : Gaipharmcy Alger. Dépôt général :

O. C. P. Paris.

UTÉRO-STREPTINE

Vaccin polyvalent spécialement mis au point pour la Prophylaxie et le Traitement des Infections Puerpérales ainsi que pour la préparation des donneurs de sang pour Immuno-Transfusions.

Posologie. — Vaccination préventive : une injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de $\frac{1}{4}$ de cc. à 1 cc. (une série de 4 injections au 7^e mois de la grossesse).

Les 4 ampoules : 30 francs.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

UTERSAN

Décongestif Utéro-ovarien.

Composition. — Extrait mammaire, Extrait placentaire, Anémone pulsatille, Bourse à Pasteur, Cimicifuga, Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Sépia.

Posologie. — 6 dragées par jour, 10 à 20 jours par mois. Cesser pendant les règles.

Indications. — Traitement *per os* des états congestifs, inflammatoires, douloureux et des hyperplasies de l'appareil utéro-ovarien. Métrites. Salpingites. Prolapsus, Rétroversions. Fibromes. Métrorragies et Leucorrhées. Suites de couches.

Prix de l'étui de 60 dragées argentées : 18 francs.

Laboratoire du VAGOSÉDYL

20 et 22, rue des Martyrs — PARIS (IX^e).

G. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

UVARGOL

Argent colloïdal irradié. Plus actif et plus constant dans ses effets que l'Argent colloïdal ordinaire. Agit sans effet toxique en raison de la faible dose nécessaire.

Forme. — Dragée (à avaler) à 0,01, pour adultes 6 à 8 par jour.

Prix : 20 francs.

Comprimés Solubles à 0,01 pour enfants (3 à 5 par jour) ou adultes (6 à 8).

Prix : 18 francs.

Ovules à 0,05. Prix : 18 francs.

Pommade à 5 p. 100. Prix : 12 francs.

Indications. — Maladies infectieuses de l'intestin et des voies urinaires (Entérites, diarrhées, cystite, Syndrome entéro-rénal, etc.).

Antiseptique général.

Laboratoire MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 1122-1 à 1122-4.

UVÉ

(Gouttes.)

Composition. — Solution aqueuse de Phosphate monocalcique, Chlorures de Manganèse, de Magnésie et de Fer, Acide Phosphorique, activés.

Ni **Arsenic**, ni **Strychnine**.

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les **Anorexies** (nourrissons, enfants, adultes) dont elles sont le véritable spécifique. Convalescences, Asthénies, Surmenage, **Décalcifications**, Alcalose.

Posologie. — *Adultes* : L à C gouttes. *Enfants* : XX à XL gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau pure ou bicarbonatée.

Nourrissons : I goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois, I goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Prix. Le flacon : 9 fr. 80 ; grand modèle : 18 francs.

Laboratoire CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Alésia 28-51.)

UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violet.

Indications. — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furunculose.

Mode d'action. — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

Mode d'emploi. — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

Prix du tube de 40 gr. : 10 francs.

Ovules à l'Uvéoline.

Traitement de toutes les lésions utéro-vaginales.

Prix de la boîte de 6 ovules : 16 francs.

Laboratoire de l'UVÉOLINE

Pharmacie AMBARD

CARCES (Var).

(Téléphone n° 35.)

UVÉSTÉROL

Vitamines A. B. C. D. + Cholestérine.

Composition. — Émulsion non huileuse contenant par cc. (XXXV gouttes) :

Vitamine D cristallisée, 6 000 unités antirachitiques ;

Cholestérol irradié..... 5 mgr.

Extrait de levure de bière vitaminé... 1 mgr. 3

Mode d'action. — Fixe chaux et phosphore, Active la croissance, Antitoxique, bactéricide, hématopoiétique.

Avantages. — Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la Vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique de la Cholestérine. Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré, même par les fébricitants.

Activité décuplée si absorbé dans le lait (Hess et Wieland).

Indications. — Croissances difficiles ou retardées. Lymphatisme, Pré-tuberculose.

Rachitisme, tétanie, décalcifications.

Améliore rapidement l'état général des tuberculeux chroniques.

Conservation. — Garde son activité intacte même après plusieurs années.

Posologie :

Adultes : XL à LXXX gouttes. *Enfants* : XV à L gouttes diluées dans une boisson lactée de préférence, une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le nourrisson sain (action préventive) : V à XX gouttes.

Chez le nourrisson rachitique : XX à XXX gouttes.

N. B. — Bien faire agiter le flacon avant l'usage.

Prix. Le flacon : 10 fr. 50 ; grand modèle : 18 fr. 50.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Dr-Lannelongue — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Alésia 28-51.)

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs (prix au public).

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification « véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale. Enraye immédiatement toutes gripes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

Mode d'emploi. — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique. »

La boîte de 5 ampoules. Prix au public : 35 francs.

Produits " STÉNÉ "

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

VACCIN ANTICOLIBACILLAIRE POLYVALENT M. M.

à ingérer, du D^r Canoz.

Composition. — Émulsion de culture de 24 heures sur gélose de nombreuses souches de *Bacterium Coli* dans un bouillon vaccin de 5 jours, préparé avec les mêmes microbes.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. Durée d'utilisation : 18 mois.

Indications. — Appendicite, auto-intoxications, entérocrites, syndrome entéro-hépatique et cholécystite, syndrome entéro-rénal, pyélonéphrite (gravidique), cystite. Syndrome entéro-génital. Prostatite.

Posologie. — Doses moyennes : Adultes, pendant 12 jours, prendre chaque matin, à jeun, le contenu d'une ampoule avec un peu d'eau aromatisée au gré du malade (menthe ou citron).

Enfants : demi-dose.

Prix : La boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 30 francs.

FILTRAT-VACCIN POLYVALENT M. M.

pour pansements et instillations, du D^r Canoz.

Composition. — Résultat du filtrat de multiples cultures de *B. Coli* en bouillon de 15 jours.

Présentations. — Ampoules de 20 cc. Durée d'utilisation : 18 mois.

Indications. — Pansements locaux dans les plaies accidentelles ou opératoires souillées par le *B. Coli*. Traitements locaux dans les affections urinaires à *B. Coli* : Instillations vésicales, instillations du bassin.

Prix : La boîte de 2 ampoules de 20 cc. : 15 francs.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL,

43 et 45, rue des Fauvelles, COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Carnot 07-13.)

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.

Médication causale naturelle.

A PRESCRIRE PAR N^{os} ou PAR LETTRES SYMBOLIQUES

Innocuité absolue.

1. Vaccin Ac. Sa (acné).....	Cépède.
2. Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
3. Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
4. Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
5. Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
6. Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
7. Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
8. Vaccin E. S.....	Cépède.
9. Vaccin E. Sa.....	Cépède.
10. Vaccin G. (gonocoocie).....	Cépède.
11. Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
12. Vaccin G. O. S. E. S. (affections blennoragiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
13. Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
14. Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
15. Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
16. Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
17. Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
18. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
19. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otites, sinusites)...	Cépède.
20. Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
21. Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
22. Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
23. Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
24. Vaccin S. E. S. (puerperalité, abcès chauds, phlébites).....	Cépède.
25. Vaccin S. P. E. S. (100 millions).....	Cépède.
26. Vaccin S. P. E. S. (400 millions).....	Cépède.
27. Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
28. Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
29. Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.
30. Vaccin Sa (furoncles).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande
de MM. les médecins.

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajoutée.

La boîte de 10 ampoules : 32 francs au public.

Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régner et 47, rue Bargue — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 11-40).

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.
Adoptée par les Hôpitaux.

VACCINOTHÉRAPIE PROBIOS

En outre des produits *Ampoules, Pommades, Comprimés* préparés avec des Antivirus et des Bactériophages associés connus sous le nom générique de *Probios* destinés aux *vaccinations locales* (ingestion buccale, instillations, pansements locaux), les **Laboratoires PROBIOS** préparent des émulsions microbiennes destinées aux injections sous-cutanées (suivant la méthode de Wright). Ces émulsions microbiennes ou vaccins sont préparées de façon à éviter les phénomènes de choc dont les effets souvent inquiétants pour les malades ou leur entourage peuvent détourner la clientèle d'une méthode thérapeutique cependant efficace.

VACCIN PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE

Formule. — Gonocoques de Neisser, Synocoques, Bac de Hoffmann, Staphylocoques (d'origine urétrale).

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc.

Indications. — Urétrites, Métrites gonococciques et complications.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, d'abord faibles puis progressivement croissantes.

Pour la discrétion et la commodité des prescriptions nous avons le même produit, qui peut être prescrit sous le nom *Vaccin Probios 365*.

INJECT-APYO

Formule. — Filtrat de cultures de :

Staphylocoques.....	50 parties.
Streptocoques	30 —
Bacilles Pyocyaniques	20 —

Présentation. — 6 ampoules jaunes de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Abscesses, Phlegmons, Anthrax, Erysipèle, Impétigo, Intertrigo, Staphylococcies, Lymphangites. Toutes les affections à germes Pyogènes.

Mode d'emploi. — a. *En injections.* — b. *Applications locales.*

PRÉV-AKINTYL

Vaccin préventif injectable.

Formule. — Bacilles de Bordet et Gengou : 100 millions par cc.

Présentation. — 3 ampoules claires de 2 cc.

Indications. — Traitement préventif de la coqueluche.

Mode d'emploi du Prév-Akintyl. Nous conseillons de faire 3 injections de *Prév-Akintyl* séparées par des intervalles de 5 à 7 jours à des doses différentes selon les âges.

INJECT-AKINTYL

Vaccin curatif injectable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou	100 millions.
Bacilles de Pfeiffer.....	10 —
Bacilles de Friedländer	100 —

Bacilles Pyocyaniques	50 millions.
Streptocoques.....	10 —
Staphylocoques	200 —
Pneumonocoques	10 —
Micrococcus Catarrhalis.....	50 —

Par centimètre cube.

Présentation. — 10 ampoules jaunes de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche.

Mode d'emploi. — Il est recommandé de commencer dans tous les cas par utiliser des doses faibles en vue d'éviter les réactions de choc ou les réduire le plus possible.

BUV-AKINTYL

Vaccin Curatif buvable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou	1 milliard.
Bacilles de Pfeiffer.....	100 millions.
Bacilles de Friedländer	1 milliard.
Bacilles Pyocyaniques	500 millions.
Streptocoques.....	100 millions.
Staphylocoques	2 milliard.
Pneumocoque	100 millions.
Micrococcus Catarrhalis	500 millions.

Pour un centimètre cube dans un mélange d'Antivirus des mêmes bactéries, en proportions correspondantes.

Présentation. — 10 tubes scellés bleus de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche et ses complications.

Mode d'emploi. — Réservé aux cas où, pour des causes diverses, les injections ne sont pas acceptées ou sont pratiquement irréalisables. Le *Buv-Akintyl* sera employé selon les indications du médecin.

INJECT-APLEURYL

Vaccins préventif et curatif dans les affections
des Voies respiratoires.

Formule :

Filtrats de cultures de Pneumocoques I-II-III.....	3 parties.
Filtrats de cultures Bac. de Friedländer	1 partie.
Filtrats de cultures de Streptocoques	2 parties.
Filtrats de cultures de Staphylococoques.....	2 parties.
Filtrats de cultures de Proteus.....	1 partie.
Filtrats de cultures Bac. de Pfeiffer.....	1 partie.

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, Grippe et ses complications, pleurésie, asthme, emphysème.

Le Vaccin *Inject-Apleuryl* s'emploie en injections sous-cutanées à doses progressives en commençant par des doses faibles avec les précautions aseptiques d'usage.

Laboratoires PROBIOS

8 rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

VACCI NOVULES

(Adultes et fillettes).

Forme. — Ovules.**Composition.** — Culture atténuée de gonocoque, synocoque, staphylo, strepto B. d'Hoffmann, Excipient Q.S.**Indications.** — Métrites, Urétrites, Pertes blanches, toutes affections microbiennes.**Posologie.** — Pansement gynécologique idéal (ne tache pas).Prix : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Adultes : 20 francs.} \\ \text{Fillettes : 18 francs.} \end{array} \right.$ **Laboratoire E. BOUTEILLE**23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 04-02.)

**VACCINS ATOXIQUES
STABILISÉS**

Stock-vaccins, constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, composition polyvalente.

Nomenclature et Indications :*Néo-Dmègon* : Antigonococcique. (Voir ce nom.)*Néo-Dmesta* : Antistaphylococcique. (Voir ce nom.)*Néo-Dmètys* : Anticoquelucheux. (Voir ce nom.)*Aplexil* : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »**Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône**21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie.

VACCINS : Antityphoïdique.
 — Antistaphylococcique.
 — Polyvalents.
 — Pneumo-streptococcique.
 — Anticoquelucheux.
 — Antigonococcique.
 — Antistreptococcique.
 — Anticolibacillaire.
 — Antimélitococcique.
 (Injectables en injections sous-cutanées.)
 Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines, Entérophyloxine.

Prix : 20 francs.

Anasthmyl, Vaccin antispasmodique I. O. D 40 fr.

Rhino-Vaccin, Pansement I. O. D 25 fr

Dépositaires généraux :

Éts **DEFFINS** et **GRUAT**, 40, faub. Poissonnière — PARIS

LABORATOIRE de BIOLOGIE MÉDICALE

16, rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et **HAYAT**, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons : 16, rue Dragon — MARSEILLE.

VACCINS

Bruschettini

1° Antipyogène Polymicrobien Polyvalent.

2° Antigonococcique.

Forme. — 5 ampoules de 2 cc. : 26 francs.

Indications :

1° *Vaccin Antipyogène Polymicrobien Polyvalent* : Etat infectieux, Etat grippal, Angines, Vaccination pré-opératoire, accouchements, Broncho-pneumonie, Pneumonie.

1, 2, et même 3 ampoules par jour.

Aucune réaction générale ni locale, même en thérapeutique infantile.

2° *Vaccin Antigonococcique* : Applications spécifiques.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

VACCINS CARRION

Le nombre de germes est exprimé en millions par centimètre cube.

- 1° **Vaccins monomicrobiens.** — Ampoules de 1 cc. Colibacillaire à 100 et 500 ; Coquelucheux à 100 et 500 ; Gonococcique à 100, 500 et 1 000 ; Paratyphique A ou B à 100 et 500 ; Pfeiffer à 100 et 500 ; Pneumococcique à 200, 500 et 1 000 ; Staphylococcique à 200, 1 000 et 5 000 ; Staphylo acné à 5 000 ; Staphylo anthrax à 1 000 et 5 000 ; Staphylo abcès de l'aisselle à 5 000 ; Staphylo ostéomyélite à 1 000 et 5 000 ; Streptococcique à 100, 500 et 1 000 ; Typhique à 100, 500 et 1 000. L'ampoule de 1 cc. : 5 francs.

Entéroccoccique à 1 000 :

La boîte de 12 amp. : 18 francs. — La boîte de 6 amp. : 10 francs.

Staphylococcique endocardite à 1 000.

L'ampoule : 8 francs.

- 2° **Vaccins polymicrobiens.** — Vaccin polymicrobien polyvalent ; Pyo-Vaccin ; Vaccin polymicrobien antigrippal ; Vaccin coquelucheux mixte à 1 000 et 5 000 ; Vaccin typhique mixte T. A. B. à 100 et 500.

L'ampoule : 6 francs.

Vaccin formule Delbet.

L'ampoule de 4 cc. : 8 francs. — La boîte de 3 ampoules : 15 francs.

Vaccin typhique mixte pour vaccination préventive à 3 000 pour 1 cc.

L'amp. de 1 cc. : 6 francs. — L'amp. de 2 cc. : 8 francs.

- 3° **Vaccins régionaux.** — Auriculo, Broncho, Intestino, Naso, Oculo, Pharyngo, Uro, Uréthro et Utéro-vaccin :

L'ampoule de 1 cc. : 6 francs.

- 4° **Lysats sodiques** (D^r Mauté). — Colibacillaire, Staphylococcique, Streptococcique, à 1 mgr. pour injections sous-cutanées et à 1/10^e de mgr. pour injections intraveineuses.

L'ampoule de 1 cc. : 6 francs.

- 5° **Bouillons immunisants pour pansements.** — En ampoules de 5 cc.

L'amp. : 5 francs. — La boîte de 6 amp. de 5 cc. : 25 francs.

Naso et Auriculo-Bouillon.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 20 francs.

- 6° **Vaccins buvables.** — Ampoules de 5 cc. : Colibacillaire, Staphylococcique, Typhique, Typhique mixte.

La boîte de 6 ampoules : 15 francs.

Voir aussi « Entéroccoccène » et « Coliflorine ».

Entéroccoccique buvable en ampoules de 1 cc. (nourrissons).

La boîte de 12 ampoules : 18 francs. — La boîte de 6 ampoules : 10 francs.

- 7° **Anavaccins** (D^r Jaubert). — Voir : Gonagone, Staphylagone, Cardio-Streptine, Utéro-Streptine.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

VACCINS CLIN

Stocks-vaccins, lysés et détoxiqués, d'une concentration élevée en espèce microbiennes judicieusement choisies et fréquemment renouvelées.

Constitution constante, tolérance parfaite, conservation illimitée.

Formes : Vaccins injectables, en ampoules de 1 cc. de concentration microbienne.

Vaccin Clin antistaphylococcique.

Vaccin Clin antigonococcique. — N° 1 monomicrobien. — N° 2 polymicrobien (gonocoques, staphylocoques, pseudo-diphthériques, Friedlander, microcoques, entérocoques).

Vaccin Clin anticoquelucheux. — 3 concentrations. 1-2-3 milliards. (B. de Bordet-Gengou).

Pneumo-bronco-vaccin Clin. — *Adultes, Enfants.* (Pneumocoques, Friedlander, Pfeiffer, streptocoques, staphylocoques, entérocoques, Coli-entéro-vaccin Clin. Injectable, Buccal.

Vaccin Clin antistreptococcique.

Vaccin Clin pré-opératoire antipyogène (streptocoques, staphylocoques, colibacilles, entérocoques, pyocyaniques).

PYOVARCOL

(Pommade colloïdo-vaccin Clin argentique antipyogène)

Vaccin pour usage local, constitué par une émulsion microbienne (streptocoques, staphylocoques, microcoques, colibacilles, pyocyaniques) ayant fixé par absorption une certaine quantité de micelles argentiques.

L'action curative spécifique du vaccin se trouve renforcée par les colloïdes.

Indications. — Plaies infectées, suppurations localisées, furoncles, anthrax, abcès, panaris, pyodermites, dermatoses infectées.

Forme. — Tube de 35 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

VACCINS CREUZE

Polyvalents et polymicrobiens.

Application de la théorie de l'antagonisme microbien.

Bactériolysothérapie.

Eucratol. — Blennorragie et ses complications chez l'homme et chez la femme.

Vaccin M. A. — Affections non tuberculeuses des voies respiratoires, bronchite chronique, asthme, emphyseme, etc...

Antixénol. — Entérovaccin polyvalent, furunculose, arthritisme, etc...

Formes : 14 ampoules de 1 cc. ou 60 comprimés. Prix public, la boîte : 30 francs. La demi-boîte (7 ampoules) : 18 francs.

Modes d'emploi :

Ampoules : une injection un jour non l'autre, progressivement de 1/8 cc. à 1 cc.

Comprimés : 1 à 4 par jour au début des repas.

Crèmes-Vaccin Creuze à base de filtrats (méthode de Besredka).

Le tube avec embout : prix public, 12 francs.

N° 1 Derma : Eczéma, furoncles, plaies infectées, etc.

N° 2 Ophto : Blépharites, conjonctivites, orgelets, etc...

N° 3 O. R. L. : Grippe, rhume des foins, sinusites, ozène, etc.

Rhino Sec-Rhino Vaccin : Poudre à priser : le tube : 5 francs.

Rhumes de cerveau, grippe, rhinites, etc...

Laboratoire CREUZE

74, rue de Lourmel — PARIS (XV^e). Tél. : Vaugirard, 30-05.

VACCINS DEMONCHY

A forte concentration.

Antidiplococcique. — 25 milliards de gonocoques, de 12 souches différentes, au centimètre cube.

Posologie. — Injections (sous-cutanées) tous les 2, 3 ou 4 jours, la première de 1/4 ou de 1/8 de centimètre cube.

L'intensité des réactions générale et focale déterminées par chaque injection permettra de fixer la dose suivante, qui pourra ainsi, suivant les cas, être supérieure, égale ou même inférieure à la précédente. Donc, n'augmenter les doses que lorsqu'une amélioration se manifeste et que la réaction générale reste discrète.

Prix de vente au public :

La boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 22 francs.

Antidiplo-entéro-staphylococcique. — (25 milliards de germes, comme le précédent). *Vaccin mixte spécialement destiné aux affections gynécologiques, aux urétrites ayant subi de nombreux traitements locaux et à leurs complications.*

Prix de vente au public :

La boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 22 francs.

Anti-staphylococcique. — Staphylocoques blancs et dorés de plusieurs souches, *vaccin puissant* (15 milliards de germes au centimètre cube).

Prix de vente au public :

La boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 17 francs.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques.

THERAPLIX.

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VACCINS « INAVA »

(par voie sous-cutanée).

Souches sélectionnées. Lyse mécanique. Tyndalisation à froid laissant intacts les antigènes concentrés et solubilisés.

Affections génitales.

Gynécologique.....	« M » Inj.
Antigonococcique.....	« G » Inj.
Ovules-Vaccins.....	« M » (Voir à)

Affections dermatologiques

Antipyogène.....	« P » Inj.
Antistaphylococcique.....	« D » Inj.
Pyogénol-Gelée.....	(Voir à)

Infections grippales

Antibronchitique.....	« A » Inj.
Rhino-Vaccin Gelée.....	(Voir à)

Infections intestinales

Dientyl — Anticoli.....	(Voir à)
-------------------------	----------

Bouillon DC antidysent buccal.

Vaccin antityphique (dragées).]

Infections bucco-dentaires

Pyodarsénol (Vacc. B et Sulfarsénol)

(Inject. et Gelée).

Insensine — Anesthésie dentaire.

Pâte Dentaire Bleue.

(Voir à)

Affections rhumatismales

Soufre Organique.

(Voir à)

E. GUIGNIER, Pharmacien

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine)

(Tél : Grésillons 31-30.)

VACCINS IVAGO

(Procédé L. Goldenberg.)

Les vaccins Ivago se présentent sous trois formes : Vaccins injectables, — Vaccins buvables, — Gelées-vaccins par pansements.

Vaccins IVAGO injectables (voie intradermique).

Les procédés spéciaux de préparation des vaccins IVAGO leur assurent les principaux avantages suivants :

Haute teneur microbienne et pouvoir antigénique très élevé sous le plus petit volume.

Absence de choc et de toute réaction générale.

Efficacité égale à tous les âges, chez le tout jeune enfant comme chez le vieillard.

Possibilité d'étendre la vaccinothérapie aux états septicémiques qui contre-indiquent la voie sous-cutanée.

Les vaccins IVAGO empruntent la *voie intradermique* parce que la peau « revêtement protecteur » est, par destinée, un organisme de défense considérable en liaisons physio-pathologiques directes ou réflexes, avec tous les organes.

Ils sont injectés par gouttes (I à VI gouttes) dans la peau.

IVAGO « A » (antigrippal et broncho-pulmonaire).

IVAGO « B » (antipyorrhéique).

IVAGO « D » (antistaphylococcique).

IVAGO « G » (antigonococcique).

IVAGO « M » (gynécologique).

IVAGO « P » (antipyogène), avec *streptocoques*.

IVAGO « R » (antiozéneux).

IVAGO « U » (anticolibacillaire).

Vaccins IVAGO buvables.

La vaccinothérapie par voie buccale est indiquée comme thérapeutique adjuvante à la méthode de vaccination intradermique, 2 ampoules par jour dans un verre d'eau éloigné des repas.

IVAGO-COLI: pyélite, pyélonéphrite cystite, colibacillose.

IVAGO-STA: furonculose, anthrax, abcès, acné, sycosis.

IVAGO-GRIPPE: affections broncho-pulmonaires, bronchites, complications grippales.

IVAGO-PYO, états septicémiques et infections causées par pyogènes communs.

Gelées-Vaccins IVAGO (Usage externe).

Les gelées-vaccins réalisent l'*immunité locale* de la peau.

Gelée-vaccin IVAGO, Antistaphylococcique : furonculose, anthrax, sycosis, acné.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyogène (avec streptocoques) : infections causées par les pyogènes communs.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyorrhéique : pyorrhée alvéolaire, abcès dentaires.

Gelée-vaccin IVAGO, Gynécologique : métrites, salpingites, leucorrhée.

OVULES VACCIN IVAGO.

LUCHORHINE (Gelée-vaccin anticoryza).

Pâte Dentifrice Bleue IVAGO GM + PM.

Laboratoires IVAGO

L. BELIÈRES, docteur en pharmacie.

17, rue de Provence, PARIS (IX^e) (Tél. : Prov. 76-18).

VACCINS RONCHÈSE

AMPHO-VACCINS

AMPHO-VACCINS A INGÉRER.

Par cc. lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Amphoprophyl: (voir ce nom) Vaccin *préventif* antityphoparatyphique.

Ampho-Quintivaccin: (voir ce nom) Traitement efficace de la coqueluche et de ses complications.

Anti-infectieux: Toutes infections générales ou locales. Dermatoses. Vaccination pré ou post-opératoire.

Anti-staphylococcique: Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Antityphoïdique T. A. B.: Agent *curatif* remarquable des infections typhique et paratyphiques et, grâce à une association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

Intestinal: Auto-intoxications d'origine intestinale, entérites, appendicites, cholécystites, syndrome entéro-rénal, certains rhumatismes, insuffisance hépatique, préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux accouchements.

Pulmonaire: Grippe, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire: Toutes infections de l'appareil urinaire.

Présentations. — Les ampho-vaccins à ingérer, sauf l'*Amphoprophyl T. A. B.* et l'*Ampho-vaccin intestinal*, sont présentés en : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc.: Prix : 25 francs.

D'autre part, l'*Ampho-Quintivaccin* et les ampho-vaccins pulmonaire et urinaire à ingérer sont également présentés en : Coffrets de 24 ampoules de 2 cc. Prix : 50 francs.

L'*Amphoprophyl T. A. B.* (préventif) est présenté en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile. Prix : 20 francs.

L'*Ampho-Vaccin intestinal* à ingérer est présenté :

En boîtes de 8 ampoules de 5 cc. 25 fr.

En coffrets de 24 ampoules de 5 cc. 65 fr.

En coffrets de 50 ampoules de 5 cc. 120 fr.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux : Toutes infections générales ou locales.

Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

Anti-staphylococcique : Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Intestinal : Tous états intestinaux aigus et chroniques.

Pulmonaire : Pneumonie, broncho-pneumonie, bronchites, gripes, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire : Toutes infections de l'appareil urinaire.

Les Ampho-Vaccins injectables sont vendus en boîtes de 6 ampoules de 1,5 cc. Prix : 25 francs.

AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrats de cultures additionnés par cc. de 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Antipyogène : Furoncles, anthrax, abcès, dermatoses infectieuses, interventions abdominales, curetages, cancers du col.

Trois présentations :

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc.....	15 fr.
Coffrets 12 ampoules de 10 cc.....	40 fr.
Ampho-vaccin antipyogène pour petits pansements, en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.....	15 fr.

Rhino-Pharyngien : Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Présenté en ampoules auto-instillables.

Présentations :

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.....	20 fr.
Coffrets 20 ampoules de 2 cc.....	45 fr.

Rhino-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien). Rhino-Prophylaxie de la grippe et du coryza (Voir ce nom).

Ampho-tablettes (Voir ce nom). (Comprimés à base d'ampho-vaccin rhino-pharyngien.)

Pyo-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'ampho-vaccin, pansement antipyogène.)

Laboratoires des Ampho-Vaccins

A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e).

Tél. : Turb. 72-34.

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin antifuronculeux « Sténé ». — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques.

En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

La boîte de comprimés. Prix public : 12 francs.

Bouillon-vaccin antifuronculeux « Sténé », pour pansements.

La boîte de 5 ampoules. Prix public : 20 francs.

Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent. —

Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Le tube. Prix public : 10 francs.

Ovules-Vaccin « Sténé ». — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

La boîte. Prix public : 18 francs.

Vaccin « opératoire » Sténé. — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé. — Pour pansements.

Vaccin antipyogène Sténé. — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».

Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

Produits « STÉNÉ »

14, rue des Guillemites — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 46-47.) Adr. télégr. : Sténé 21 Paris.

VACCINS « VIRULTRA »

Anti-Pyogène chirurgical « Virultra ». — Pré et postopératoire.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 25 fr.

Anti-Pyogène général « Virultra ». — Toutes affections pyogènes et septicémies.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

— : 3 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Furunculose, Eczéma, Erysipèle.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 25 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr.

Brûlures, Plaies, Anthrax, Phlegmons, etc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 18 fr.

Broncho-Vaccin « Virultra ». — Grippe, Broncho-Pneumonies et toutes affections broncho-pulmonaires.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

— : 3 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. — : 18 fr.

Dermultra « Virultra ». — Pour toutes affections dermatologiques.

Une seule forme : Pommade-Vaccin. Le tube : Prix public : 12 fr.

Enterultra « Virultra ». — Colibacillémies, Enterococcémies et toutes affections intestinales.

Une seule forme : Ampoules buvables.

6 amp. de 5 cc. Prix public : 18 fr.

Gynécologique « Virultra ». — Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc...

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

— : 3 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 25 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr.

Ophthalmologique « Virultra ». — Toutes affections oculaires suppurées.

Une seule forme : Pansement.

Prix public : 6 amp. de 2 cc. : 18 fr.

Oto-Rhino-Laryngologique « Virultra ». — Rhinites, Sinusites, Mastoïdites, Coryzas, Laryngites, Otites, Rhume des foins, etc.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

— : 3 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Forme pansement : 6 amp. de 5 cc. — : 24 fr.

— : 6 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Uro-Vaccin « Virultra ». — Toutes affections gonococciques.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 30 fr.

— : 3 amp. de 2 cc. — : 18 fr.

Forme pansement (pour homme) : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 18 fr.

Forme pansement (pour femme) : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 25 fr.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 18 fr.

Nota. — **L'Uro-Vaccin « Virultra ».** — Pansement (H. ou F.) peut être utilisé *in loco* pour le traitement de l'ophtalmie purulente du nouveau-né.

Ultrouvules « Virultra ». — Pour pansement génital de la femme dans toutes affections microbiennes utérines.

Une seule forme : ovules-vaccin. Prix public : 22 fr.

G. TAUPIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général pour la France : O. C. P.

Laboratoires « VIRULTRA »

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure). — (Tél. : 19 à Serquigny.)

VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Rhino, Staphylo et Strepto-Vaclydun ; Grippo-Vaclydun.

VACLYDERM

Composition. — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

Indications. — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furunculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 18 francs.

Laboratoires CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.) — Télégr. : Pantuto 74 Paris.

VAGOGASTRYL

Traitement rationnel des Gastralgies, des Spasmes, des Etats Anxieux.

Présentation. — Cachets.

Composition. — Belladone totale (1 cgr.). Kaolin colloïdal. Carbonate de Bismuth purifié. Bicarbonate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Saturant de l'acidité gastrique ; 2° Sédatif du Vague.

Indications. — 1° *Gastralgies* : Hyperchlorhydries, Ulcères, Aérophagie. 2° *Spasmes* : Gastriques, Intestinaux, Utérins, Vaginaux, Sphinctériens, Coliques hépatiques.

3° *Vomissements réflexes* : Mal de Mer, Mal de l'Air, Mal de Montagne, Etats gravidiques.

4° *Etats anxieux* : Psychasthénie, Neurasthénie, Mélancolie, Anxiété dans les Psychoses.

Posologie. — 1 à 2 cachets après chacun des 2 principaux repas et au moment des douleurs.

Pour un traitement d'une semaine. Prix : 12 fr. 80.

Prix spéciaux aux Etablissements hospitaliers.

Laboratoires de Vagothérapie,

M. Crozet, docteur en pharmacie.

SAINT-VENANT (Pas-de-Calais).

VAGORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance Vagale,

Formule :

Lobe antérieur d'hypophyse	0,01	Extrait de Cratægus	0,01
Camphre monobromé.....	0,05	— Valériane	0,015
Diéthylmalonylurée	0,05	— Boldo	0,015
Chlorure de Magnésium....	0,05	— Guarana.....	0,015
Extrait de Passiflore.....	0,025	— Jusquiame	0,0075
— Ballote	0,01	— Marron d'Inde.	0,005
— Combretum.....	0,01	— Belladone.....	0,005

Par comprimé dragéifié.

Indications. — VAGOTONIE, dépression, vertiges, anxiété, insomnies ou mauvais sommeil, torpeur et inquiétude, désordres psychiques frustes, douleurs erratiques variées, céphalées frontales et occipitales, état nauséux, auto-intoxication, spasmes, anabolisme, perturbations circulatoires, désordres mensuels chez la femme et dysgénésie chez l'homme.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix: 16 fr. 50 (40 dragées par boîte).

Pour les Sympathicotoniques, voir : SYMPATHORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le n° 988-2.

Laboratoire FOSSET

21, Grande Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél.: 11.)

VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Phényléthyl-Malonylurée	} 0 gr. 017
Extrait de Jusquiame titré en alcaloïdes.....	
Extrait de Valériane fraîche et stabilisée	
Oxyde de zinc préparé par voie humide	

VAGOSÉDYL réalise une formule de Méglin améliorée.

Doses moyennes. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications principales. — Hypervagotonie, Spasmodophilie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéronévroses, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des ptoses, Malaises en rapport avec la Menstruation, la Grossesse, la Ménopause, Symptômes subjectifs du Cœur, Artériospasme, Dyspnées spasmodiques, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Neurasthénie, Excitation psychique, Troubles du Sommeil.

Prix du flacon : 16 fr. 50.

Laboratoire du VAGOSÉDYL

20 et 22, rue des Martyrs — PARIS (IX°).

G. COUSSINET, Pharmacien.

Licencié ès sciences.

VAGOSTABYL MONIN

Comprimés dragéifiés.

A base de Marjolaine. — Sans Barbituriques.

Traitement phytothérapique de toutes dystonies Vago-Sympathiques.
Communication Société de Biologie, tome CXV.

Composition. — Oleosaccharure de Marjolaine (*Origanum majorana*, labiées). Lactate de Calcium, Cimicifugine. Hyposulfite de magnésie.

Propriétés. — Régulateur et stabilisateur très actif du système nerveux.
Action tonocardiaque : diminue la fréquence, augmente l'amplitude.

Indications. — Toutes Dystonies vago-sympathiques. — Insomnies. — Affections cardiaques : Tachycardie, Arythmie, Palpitation, Angor. — Troubles de la vie végétative : Basedow, Ménopause, grossesse, déséquilibre du métabolisme basal. — Asthme nerveux. — Symptômes nerveux pré et post-opératoires. — Algies : Céphalées rebelles, Névralgie faciale, Douleurs des sinusites. — Troubles nerveux divers : Bourdonnements et sifflements d'oreilles, hoquet, mal de mer. Aérophagie, Vertiges, spasmes. — Epilepsie, Agitation. Dermatoses nerveuses.

Posologie. — 1^{er} jour : 6 à 8 dragées, doses fractionnées. Jours suivants : doses décroissantes jusqu'à 2 dragées.

Laboratoire MONIN

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 37-45.)

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ;
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

N. B. — La Valbornine n'est pas un soporifique. Le sommeil n'est régularisé qu'au bout de quelques jours par sédation du système nerveux.

Le flacon : 11 fr. 50

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i>	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 005
Extrait de datura	0 005
Extrait alcoolique de passiflore	0 03
K Br	0 05
Extrait alcoolique de cratægus.....	0 03

pour une dragée de 0 gr. 16.

40 dragées par étui — Prix en France : 14 fr.

Propriétés. — Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jusquiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit synergiquement.

Indications. — Etats nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété, Insomnie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthylisme, affections cardiaques ou vasculaires, digestives, génitales.

Posologie. — Etats nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

VALEDYL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

Indications. — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

Formule. — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de gelsénium.

Forme. — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

Mode d'emploi. — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Prix : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-34.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

VALÉNAL NOVALIS

Sédatif nerveux. Hypnotique doux.

Composition. — Pour 1 dragée :

VALÉrian e extrait	0,045
Cratægus extrait.....	0,015
Saule blanc extrait	0,015
Passiflore extrait	0,015
Hamamélis extrait	0,01
LugoNAL (Phényléthylmalonylurée) ...	0,005

Association logique, bien dosée, active et sans danger.

Indications. — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitation nerveuse, Hyperémotivité, anxiété, palpitations. Etats nerveux de la ménopause. Hypertension (surtout spasmodique).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour (dose pouvant être largement dépassée).

Prix : 16 francs, le tube de 60 dragées.

Les Laboratoires NOVALIS
OULLINS (Rhône).

VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

Simple ou Bromuré (Élixir Gabail).

Composition :

Simple : 0 gr. 50 d'extrait de Valériane, par cuillerée à café.

Bromuré : 0 gr. 50 d'extrait et 0 gr. 25 de Bromure de Strontium, par cuillerée à bouche.

Indications. — Toutes les affections nerveuses.

Simple : 4 cuillerées à café par 24 heures.

Bromuré : 4 cuillerées à bouche par 24 heures.

(Comme *Hypnotique* : 2 cuillerées à bouche au coucher).

Prix : Le flacon : 20 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée.

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 10 francs.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Caumartin 30-50.)

VALÉRIANATE PIERLOT

RESTE TOUJOURS ET MALGRÉ
TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Neurotrope, actif, sédatif, inoffensif, il rétablit toujours l'équilibre du système nerveux en supprimant l'excitabilité morbide des neurones.

Liquide : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non, le soir avant de se coucher et le matin à jeun.

Prix : 18 francs.

Nouvelle forme :

DRAGÉES PIERLOT

à la liqueur concentrée de Valérianate Pierlot associée au cratægus.

Croquer de 1 à 4 dragées par jour.

Prix : 20 francs.

Laboratoires RIVIER

10, pas. Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : + Alésia 22-46.)

VALÉRIANE GMET

Composition. — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse. Sans alcool. Sans sucre.

Propriétés. — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

Indications. — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse, Névroses, Insomnie, Epilepsie, Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir ce nom.)

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.
Prix : 18 francs.

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est **inodore** et d'une **saveur agréable**.

Prix : 14 francs.

Laboratoires PACHAUT

130, boulevard Haussmann — PARIS.
(Tél. : Laborde 16-72.)

VALÉRIINODOR MALMANCHE

Composition. — Préparation liquide sirupeuse contenant par cuillerée à café : 0 gr. 05 d'Intrait de Valériane stabilisée, 0 gr. 50 d'Extrait fluide de *Passiflora incarnata*, 0 gr. 15 de Véronal sodique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant sédatif du système nerveux central. Tolérance parfaite. Sommeil calme sans nausées au réveil.

Indications. — Insomnies, Palpitations, Spasmes musculaires, Excitation psychique, Angoisse, Chorée, Convulsions, Toux nerveuse.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, pur ou dans une infusion de tilleul.

Prix au public : 15 francs le flacon de 90 cc.

Laboratoire MALMANCHE

Pharmacien, Docteur ès sciences.

101, avenue Paul-Doumer,

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise). (Tél. : 124.)

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium*, sans odeur, de P. Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de *Valérium P. Thibault* sont dosées à 0,05 de principe actif.

Prix : 15 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-10.

VALÉROBROMINE LEGRAND

Composition. — Ethers-Sels de l'acide « Bromovalérianique ».



Avantages. — La VALÉROBROMINE LEGRAND (brome organique) offre, par rapport aux bromures (brome minéral), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (arsenic et phosphore organiques), par rapport aux arséniate et aux phosphates (arsenic et phosphore minéraux). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates; sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

Indications. — Toutes les névroses : Epilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc...

Formes. — Liquide : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour. — Capsules : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, ne se dissolvant que dans l'intestin. 4 à 12 capsules par jour.

Ce produit peut être prescrit aux bénéficiaires des Assurances sociales.

Prix : 18 fr. 50.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux **sans odeur.**

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Acide diéthylbarbiturique en solution

ammoniacale..... 3 gr 25

Intrait de Valériane..... 0,05

par 100 cc. d'excipient liquide.

Dose sédative. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé
2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

Prix : Solution : 16 francs.

Comprimés : 16 francs.

Peut être prescrit aux Assurés Sociaux.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

VALLATHEN

Traitement des maladies de la peau.

Organothérapie Bellas.

Présentation. — En boîtes de 50 dragées : 30 francs.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pan-créas, Extrait hépatique, Soufre lavé.

Indications. — Acné vulgaire, Acné rosacée, Eczéma, Séborrhée, Blépharite, Furunculose, Anthrax, Urticaire, etc.

Posologie : Adultes : Dose moyenne, 2 dragées 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas ;

Enfants : (au-dessus de 6 ans), Dose, 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon la gravité des cas.

Veiller à ce que le malade ait tous les jours une selle régulière.

Enreg. au lab. nat. de cont. des médic. n° 167-16.

Dépôtaires pour la France et les colonies :

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, pl. Intérieure-St-Michel - TOULOUSE. Tél. 213-06.

VAL'OVARINE FARMA

Déficiences ovariennes, Nervosisme, Douleurs, Malaises.

Composition : { Ovarine intégrale 20 cent.
(Par cachet) { Intrait de valériane fraîche stabilisée.. 12 —

Avantages. — Odeur agréable. Conservation garantie par procédé spécial. Présentation soignée. Tolérance parfaite. Assimilation facile.

Posologie. — Sauf indication spéciale du médecin traitant, la cure moyenne de VAL'OVARINE doit être faite chaque mois à raison d'une boîte de cachets à prendre au cours des dix jours qui précèdent les règles. (Un au milieu de chaque grand repas, soit deux par jour.) (Traitement à suivre également en cas d'obésité glandulaire.)

Pour obtenir un effet certain et durable, on continuera ce traitement pendant 3 à 4 mois consécutifs.

Les femmes ayant subi l'ablation des ovaires ou qui ont passé l'âge critique choisiront de préférence pour suivre un traitement de dix jours de VAL'OVARINE une période où elles constatent soit du nervosisme, soit de l'insomnie, soit une sensation de pesanteur.

Prix : 20 francs.

Laboratoire de la VAL'OVARINE

1, avenue Eugène-Thomas — KREMLIN-BICÊTRE (Seine).

(Tél. : Italie 20-18.)

VALOVOSAN

Régulateur de la fonction ovarienne
et sédatif nervin.

Composition. — Un comprimé = 40 unités-souris internationales d'hormone sexuelle femelle, 0 gr. 40 de poudre d'ovaires frais, 0 gr. 15 de bromisovalérylurée.

Indications. — Troubles psychiques de la puberté et de la ménopause, psycho-névroses génitales féminines, frigidity, dysménorrhées, aménorrhées accidentelles, troubles nerveux sous la dépendance de l'hypo-ovarie, vomissements de la grossesse.

Posologie. — 2 comprimés 3 fois par jour.

Présentation et prix. — Flacon de 40 dragées : 19 fr. 50.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. Lefebvre, Pharmacien

25, bd Latour-Maubourg — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 60-77.)

VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

Indications. — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

Composition. — Alcoolature d'Alium Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

Ne contient aucun toxique. Goût agréable.

Posologie. — *Doses moyennes* à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an...	V à X gouttes.	
— de 1 an à 5 ans	X à XX	—
— au-dessus de 5 ans...	XX à XL	—
Adultes.....	L à LX	—

Flacon de 30 cc. Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire de la VALTHÈNE
VALAT

166, rue de la Roquette — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 25-47.)

VAMÉTOL**(Granulé)**

Chlorure de magnésium	0,0015
Citrate de soude	0,15
Hyposulfite de sodium	0,005
Bitartrate de potassium.....	1,50
Soufre	1,50
Glucoside de bourdaine	0,022
Excipient aromatisé	Q. S. pour 1 cuillerée à soupe.

Indications. — Traitement des hémorroïdes, varices et toutes affections du système circulatoire.

Pas de toxicité, aucune accoutumance.

Doses. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe le matin à jeun à croquer ou à délayer dans un demi-verre d'eau.

Pendant grossesse ou allaitement, ramener les doses à 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoire VAMÉTOL

14, rue de Périgueux — ANGOULÊME.

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler : dose moyenne : X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 12 francs.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné.)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cc.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cc. par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos, recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 15 fr.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 20 fr.).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

VANOXYLE MILLET

AMPOULES

Composition :

Solution isotonique et isoionique de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, non arsénée.

Propriétés :

Médication vanadiée oxydante, amélioratrice du terrain. Stimulante et tonique.

Indications :

Toutes les asthénies, anémies, convalescences, tuberculose, pré-tuberculose, paludisme, syphilis.

Présentation :

12 Ampoules de 10 cc. correspondant à 20 mgr. de Métavanadates, soit 8 mgr. 3 de Vanadium métal.

Mode d'emploi :

En injections intra-musculaires, chez les adultes Commencer par une demi-ampoule, puis 3/4, puis l'ampoule entière, tous les deux jours.

Prix : 20 francs.

GOUTTES

Composition :

Solution stable de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, *non arsénée*, à 5 p. 1000.

XX gouttes correspondant à 5 mgr. de Sels de Vanadium.

Propriétés et indications :

Celles des ampoules.

Mode d'emploi :

Les gouttes de Vanoxyle se prennent au début du repas, dans un peu d'eau.

Adultes : XX à XXX gouttes deux fois par jour.

Enfants : selon l'âge, V à X gouttes deux fois par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

Provence 20-20 et 58-43.

VAN-SOL

Cachets

Formule :

Poudre de colchique.....	0,03
Acide acétylsalicylique	0,50
Acide phénylcinchoninique	0,25

Forme. — Boîte de 20 cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

Mode d'emploi. — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers en laissant un intervalle de 4 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 15 francs la boîte.

Laboratoire P. et R. PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES
(S.-et-O.)

VANUCLÉOL LACROIX

Soluté leucosthénique

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Propriétés. — Oxydant par le Vanadium. Leucosthénique par les Nucléines. Tonique par l'arsénostrychnine.

Indications. — Neurasthénie, Asthénie, Surmenages, suite de grippe, Convalescences, Anémies.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Ampoules indolores* de 2 cc. en boîtes de 12. Trois séries d'injections avec repos intercalaire de huit jours.

La boîte de 12 ampoules de 2cc. : 18 francs.
2° *Gouttes* : X à XX gouttes au milieu des deux principaux repas.

Le flacon de gouttes : 12 francs.

Peut être prescrit aux Assurances sociales.

Échantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

V. MEROBIAN et Fils, Successeurs

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Nord 54-57.)

VAPOSULPHIUM

Comprimés sulfurés pour inhalations.

Propriétés thérapeutiques. — Le Vaposulphium comprimés inhalants sulfurés rend pratique la cure soufrée externe par inhalation. Il complète la cure soufrée interne par le Sulphium.

Indications. — Rhumes, Enrouements, Laryngites, Pharyngites, Catarrhes.

Mode d'emploi. — Mettre un comprimé dans un bol d'eau bien chaude (salée, si on désire un liquide voisin de l'isotonicité), et respirer les vapeurs sulfureuses.

Laboratoires BRISSON

Docteur DEDET et Cie Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01-75-02.)

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,
numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Durée moyenne : 50 jours.

Prix : 10 francs la boîte.

Laboratoire de la VARILAXINE

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

VARIPHILE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Extrait de cupressus, 0,04 ; Extrait d'Hamamélis, 0,04 ; Extrait d'oesculus, 0,04 ; Poudre d'ovaire, 0,004 ; Poudre de surrénale, 0,004 ; Poudre de thyroïde, 0,004, pour une pilule.

Propriétés pharmacodynamiques. — Tonifie les vaisseaux, fluidifie le sang et active la circulation générale par une association médicamenteuse synergique d'extraits de glandes endocrines et d'extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives et hémostatiques.

Indications. — **Affections veineuses** (varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites).

Troubles circulatoires (accidents de la puberté et de la ménopause).

Mode d'emploi. — 2 pilules à chacun des 2 principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 16 fr. 50 la boîte de 60 pilules pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

VARISCLÉRINE

(Ampoules).

**préparées selon les indications
du professeur Sicard.**

Injectons sclérosantes intravariqueuses,
sans accidents, sans insuccès.

Varisclérine A : Salicyl. de soude.

Varisclérine B : Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 30 francs.

Prix spéciaux au corps médical.

Laboratoire Angelini,

61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous les commissionnaires
de droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

VASCOSODINE

Sa préparation demande environ deux mois.

Contre l'Artériosclérose et pour la circulation du sang en général. Dépourvue de toute action irritante et de toute toxicité. Ne contient pas d'iode.

Composition. — Hamamélis, Seneçon, Gui, Passiflore, Cimicifuga, Viburnum, Gossypium, Marron d'Inde, Citr. de Na., Organes frais : pancréas, foie.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Artériosclérose, Vertiges, Bourdonnements d'oreille, Surdité, Otosclérose, Rougeurs du visage, Congestions, Chaleurs, Lourdeurs de tête, Dartres, Eczémas, Puberté, Menstruation, Angoisses, etc...

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée ou non, avant chacun des deux principaux repas.

Cure immédiate : 2 flacons. Cure d'entretien : 1 flacon tous les deux mois.

Prix : 12 francs

Laboratoire **LORMEAU**

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose, Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Prix : 20 francs.

Laboratoire **P. GUÉRIN**

15, rue Cavallotti — PARIS (XVIII^e).

VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques.

Troubles circulatoires : Troubles des règles et Ménopause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

Troubles glandulaires : Congestion thyroïdienne, ovarienne, pancréatique : Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés. Sécrétion lactée.

Troubles sensitivo-moteurs : Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

Mode d'emploi. — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin midi et soir.

Prix de vente au public : 18 francs le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 35-25.)

VASONITRYL

Forme. — Dragées à enrobage spécial.

Composition. — Complexe Nitrite de Calcium—Théobromine calcique (0 gr. 20 par dragée), soit : Nitrite de Calcium 0,05, Théobromine Calcique 0,15.

Indications. — Hypertension artérielle sous toutes ses formes, Angine de poitrine, Aortite, Artériosclérose, Spasmes vasculaires périphériques, Claudication intermittente, Sensation de doigt mort, Migraines, Bourdonnements d'oreilles.

Action thérapeutique. — Vaso-dilatation périphérique. Diminution des spasmes vasculaires. Légère action cardiotonique. Diurétique. Tolérance parfaite.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 dragées de Vasonitryl jusqu'à 3 fois par jour, de préférence avant les repas. Avaler avec un peu d'eau sans croquer. Quand il s'agit de traitements de longue durée, y intercaler des repos de quelques jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-3.

Littérature et échantillonnage médical sur demande :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85 16-86 et 16-87.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge et le Grand-Duché de Luxembourg.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol ; Para-amido benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

Indications. — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

Doses. — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Prix : 13 francs.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

Forme. — Pommade pour enfants et adultes.

Composition. — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

Prix : 8 francs.

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Prix : 9 francs.

Indications. — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

Laboratoires des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

V. A. V.

Technique du Dr Vaudremer.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

Indications thérapeutiques. — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacilloses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

Forme et mode d'emploi :

- a) Emulsion forte pour les tuberculoses chirurgicales (injectable).
- b) Emulsion faible pour les tuberculoses chirurgicales et pulmonaires associées (injectable).
- c) Emulsion 3 souches pour les tuberculoses pulmonaires (à ingérer) en ampoules ou en comprimés.

Valables 2 ans.

Prix au public : 60 francs.

Laboratoire ÉLOCINE

51, rue du Ranelagh — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 84-18.)

VAXITOL BOUTY

Vaccin Intestinal Polyvalent
à support sulfo-sodique.

Composition. — 1^o Du vaccin : Colibacilles (10 milliards), Entérocoques (6), Staphylocoques (2).
Proteus Vulgaris (1) ;

2^o Du support sulfo-sodique : Hyposulfite de soude et Solution de Bourget.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et associés, colibacilliose, auto-intoxication intestinale et séquelles anaphylactiques, entéro-colite...

Chirurgie et accouchements : vaccination pré- et post-opératoire des complications (infections, phlébites).

Gynécologie : séquelles des maladies infectieuses et d'accidents colibacillaires.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Cas aigus : matin et soir.

Cas moyens et chroniques : une fois par jour.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

VÉGANINE

Médicament à action renforcée.

Analgésique — Antipyrétique — Antigrippe.
Comprimés assurant une désagrégation immédiate par
un procédé nouveau de fabrication.

Composition :

Phosphate de Codéine	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique	0 gr. 25	
Phénacétine	0 gr. 25	

Action thérapeutique et indications :

La Véganine, composée d'après la théorie de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine,
Analgésique par l'Acide acétylsalicylique,
Analgésique et antithermique par la Phénacétine.
Elle constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, **névrites**, **sciaticque**, **lumbago**; également utile en neurologie (états anxieux).
Par son association synergique, l'action thérapeutique de la Véganine est considérablement renforcée, et cela sans intoxication secondaire.

Doses et mode d'emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec café ou thé.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-1.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16.85-16.86-16.87.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

VÉGÉLACT

Lait sec végétal au Soja-Soyok.

Formule p : 100 : crème de riz, soja, lait sec, sucre, aa-94 Malt, 4, P² O⁵, Na, Ca, Mg. Vitamines A. B. C. D.

(Vitamine C contenue = 10 cc. jus de citron.)

Indications. — Régime lacté restreint. — Intolérance au lait, Dyspepsie, Tétanie, Eczéma infantile, Colites de l'enfant et de l'adulte.

Mode d'emploi. — Délayé au 1/5 dans de l'eau, le **VÉGÉLACT** est l'équivalent alimentaire du lait de vache et s'emploie aux mêmes doses (en biberons ou bouillies). Se prépare comme toute farine maltée. Une cuillerée à soupe arasée de **VÉGÉLACT** pèse 7 gr. 20 et équivaut à 40 gr. de lait de vache. Le **VÉGÉLACT** ainsi préparé peut être donné aux enfants à partir de deux mois.

Prix : le kilo : 40 francs.

La boîte de 350 gr. : 16 francs.

VÉGÉLACT-SPÉCIAL

Pour les nouveau-nés, les prématurés et rebelles à toute alimentation, utiliser exclusivement, *en ne le faisant pas cuire*, le **VÉGÉLACT-SPÉCIAL**, solubilisé, prédigéré et survitaminé. Faire dissoudre à température tiède 10 gr. dans 60 gr. d'eau bouillie.

Préparé en boîtes hermétiques de 350 gr. (Dose pour 35 biberons de 70 gr.). Prix : 40 fr.

Le **VÉGÉLACT** est employé dans les services de l'Assistance publique.

Laboratoires BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-51).

VÉGÉLAX

Laxatif végétal.

(Comprimés)

Composition. — Extraits de bourdaine, séné, cascara sagrada, boldo, artichaut. Poudres de scammonée et rhubarbe.

Indications :

Constipation rebelle. — Rééducation Intestinale. — Affections du foie. — Arthritisme. Action douce et progressive. Ne donne pas de coliques.

Doses :

De 2 à 4 comprimés par jour le soir au coucher.

Enfants : 1/2 dose.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien

47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

VÉGÉPHOS

Inosito Hexaphosphate de chaux
et de Magnésie.

Composition. — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

Propriétés. — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

VÉGUMINE

Aliment à base de poudres de légumes frais stabilisés.

Composition. — Poudre totale de légumes frais stabilisés (carottes, tomates, épinards, bananes mûres) associée aux hydrates de carbone et au dextromaltose. Riche en éléments minéraux ; apport de vitamines A. B. C.

Forme. — Poudre.

Propriétés. — Complément indispensable de l'allaitement artificiel, stimule et régularise les fonctions digestives, reminéralisateur, favorise la croissance et la dentition, pouvoir calorique élevé.

Indications. — Végumine facilite le sevrage, évite les carences, les accidents dyspeptiques dus au régime trop exclusif des farineux et du lait, éduque les voies digestives. Anorexie, avitaminoses.

Dose. — De 3 à 4 mois : 1/2 cuillerée à café par biberon.

De 5 à 6 mois : 1 à 2 cuillerées à café par biberon.

A partir de 7 mois : 1 cuillerée à soupe par repas.

Pour les poudres de légumes frais voir également : VEGUVA et CAROTTASE.

Durée moyenne de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

VÉGUVA

Composition. — Aliment végétal concentré riche en vitamines A, B, C, renferme, à l'état de poudre impalpable, la totalité des substances azotées, des sels minéraux et de la cellulose des épinards, carottes et tomates.

Forme. — Poudre.

Indications. — *Nourrissons* : Anorexie, arrêt de croissance, troubles du développement, troubles nutritifs aigus et chroniques, alimentation de transition pour passer du régime lacté au régime mixte.

Adultes : Régime achloruré, acidose.

Doses. — *Nourrissons* (après 5 mois) : une mesure répartie dans les biberons de la journée.

Adultes : deux à trois mesures à répéter plusieurs fois dans la journée.

Délayer le Veguva à l'aide d'un liquide bouilli et refroidi (lait, eau, bouillon), puis l'incorporer à l'alimentation déjà prête.

Ne pas faire cuire.

Pour les produits à base de légumes frais, voir également : CAROTTASE et VÉGUMINE.

Laboratoires WANDER

CHAMPIGNY-SUR-MARNE.

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

VEINICURA

Médication Spécifique des Troubles de la Circul. veineuse.

Composition et forme. — Association d'extraits végétaux à propriétés vaso-constrictives et toniques du système veineux, d'extraits glandulaires (thyroïde et hypophyse) modificateurs de la nutrition générale, et d'un sel fluidifiant du sang (citrate acide de soude).

Présentée en comprimés *bicolores* : comprimés rouges contenant les extraits végétaux et le Citrate; comprimés blancs contenant les extraits glandulaires seuls (Thyr. 1 cgt., hyp. 2 ctg. p. comp.), afin d'éviter leur altération qui se produit fatalement lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits, surtout lorsque ceux-ci sont hygro-métriques.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles circulatoires dus à la stase veineuse ; varices et varicosités, hémorroïdes, varicocèles, congestions passives de l'utérus et de la prostate, pesanteur et œdème des jambes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés de chaque couleur en moyenne par jour, les rouges pendant le repas, les blancs entre les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire FABIU

132, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85).

VEINOGENE

Ovoïdes à base d'extraits de genêt, hydrastis, hamamélis, viburnum, marron d'Inde, iodure, bromure, phényléthylmalonylurée.

Circulation veineuse, Troubles de la puberté et de la ménopause, États congestifs, Phlébites, Hémorroïdes, Ulcères.

Posologie :

2 à 6 ovoïdes par jour avant les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en Pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratœgus, Œsculus, Viburnum, Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules et gouttes* : 14 francs.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

VEINOSÉRUM

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1° *Forme gouttes* : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses. — XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 16 francs.

2° *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses. — 1 cuillerée à soupe matin et soir 15 jours par mois. — 12 francs.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, Place Intérieure Saint-Michel
TOULOUSE
(Tél. : 213-06.)

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica
Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes
thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites
aiguës et chroniques. Insuffisance valvu-
laire de la saphène, Varices, Varices de la
grossesse, Pseudo-varices par troubles des
glandes à sécrétions internes, Hémor-
roïdes, Troubles de la vie génitale chez la
femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas
de midi et du soir.

Prix : 14 francs, la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires LEBEAULT

Besins et Cie, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la maladie veineuse et de ses complications.

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la puberté.

Composition :

A. — VEINOTROPE M.

(Usage masculin, comprimés roses.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— orchitique	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde	0,005

Pour un comprimé.

B. — VEINOTROPE F.

(Usage féminin, comprimés violets.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— d'ovaires	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde.....	0,005

Pour un comprimé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés au lever et 2 comprimés au coucher, ou suivant prescription médicale ; 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

Formule F. — Interrompre pendant la période menstruelle.

VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du pancréas..	3 —
Calomel	4 —
Talc stérile, Q. S. pour	100 —

Mode d'emploi. — Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, 2 lignes groupées.)

BANDE DE CRÊPE VELPEAU

Bande de tissu élastique sans caoutchouc.

La *meilleure* des bandes de crêpe : **Légère, douce, extensible, chaude lavable.**

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

Plaies, Varices, Efforts. Prix marqués 5 cm. : 6 fr.
7 cm. : 8 fr. ; 10 cm. : 10 fr. 50.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire. **Douleurs, Rhumatismes.**
5 cm. : 7 fr. 50 — 7 cm. : 10 fr. — 10 cm. : 14 fr. ; 50
15 cm. : 20 fr.

Ceintures de 20 à 30 cm. (27 et 40 fr.) pour **Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge, *Spécialement créée pour l'usage féminin. Prati-*
quement invisible sous les bas fins.

5 cm. : 8 fr. ; 7 cm. : 10 fr. 50 ; 10 cm. : 15 fr.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe **Velpeau**. Exiger la marque **Velpeau**.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

VERACHOL

Cholagogue physiologique.

Augmente et fluidifie la sécrétion biliaire.

Composition. — Comprimés enrobés à base de sels biliaires associés à des laxatifs légers.

Indications. — Préventif et curatif de la lithiase biliaire. Ictères, Insuffisance hépatique, Gros foie des alcooliques et des coloniaux, Constipation par insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — Commencer par une dragée et jusqu'à trois, si nécessaire, le soir en se couchant, ou une dragée après chaque repas. A avaler sans croquer. Pas d'intolérance, pas d'incompatibilités.

Échantillons médicaux sur demande :

Laboratoires FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

(Tél. : Pereire 00-32.)

VÉRALGINE

Supprime toute douleur. Complète l'action du traitement curatif.

Combinaison barbituro-analgésique (Phénétine-Amidopyrine-Sonéryl) agissant sur les centres encéphaliques de la douleur : centres corticaux et pseudo-centres de Sherrington.

Sans stupéfiant.

Sans intolérance.

Sans réaction cutanée.

Indications. — Tous les états douloureux quelles qu'en soient la cause ou l'origine : Névralgies, Rhumatismes, Douleurs opératoires, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Ulcères, Cancer, Menstruation, etc.

Art dentaire, Périostite, Pulpite, Extractions, Fraisages, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/2 ou 1 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

12 Comprimés : 8 francs. — 8 Cachets : 6 francs.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie à BONDY (Seine).

Échantillons sur demande. (Tél. : 24 Bondy.)

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 d'amide barbiturique diéthyle et 1 gramme de Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle et inodore ; sommeil calme, réveil normal. Sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats.

Posologie :

Adultes. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café, espacées dans les 24 heures. Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 2 heures avant l'heure du sommeil dans une infusion ou dans de l'eau sucrée.

Enfants. — XXV gouttes par 24 heures et par année d'âge, soit espacées, soit avant l'heure du sommeil suivant les cas.

Forme « Comprimés ».

Un comprimé = une cuillerée à café.

Durée moyenne 8 à 10 jours.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23.)

VÉRICARDINE

Tube de 30 comprimés glutinisés à base de **Papavérine**.

Chaque comprimé représente :

Chlorhydrate de Papavérine	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Cratægus stabilisé	0,05

Excipient Q. S. pour 1 comprimé.

Indications. — Traitement énergique et rapide de l'instabilité cardiaque, Troubles cardiaques, Etats d'anxiété et de nervosité, Spasmes digestifs, Insomnies.

Grâce à la Papavérine, antispasmodique puissant de tous les muscles lisses.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1 à 3 comprimés avant chacun des principaux repas.

Contre les insomnies : 2 à 4 comprimés en se couchant.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 14 francs.

Laboratoire de L'IODARSENIC GUIRAUD

10, Impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

VERMIFUGE CORNET

Composition. — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.), de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

Forme. — Liquide, de conservation indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales)

Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans	1 —
De 8 à 15 ans	2 —
Adultes.....	1 à souve.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Prix : 6 francs.

Échantillons sur demande.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoires SERRÉ

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. Tél. : 840-78.

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contra d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contra, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë doubler les doses.

Dans les cas d'*oxyurase*, en plus de l'administration par la bouche, donner en outre le Vermirène, aux mêmes doses que ci-dessus, en lavement à conserver, mélangé à une ou deux cuillerées à café d'eau tiède.

Prix : 11 francs.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.
Cinq-Cantons — BAYONNE.

VERNIS A LA DIACHUSINE

Arsénicale.

Traitement externe des Néoplasmes, Cancroïdes, Cancer épithélial de la face.

Le Vernis à la Diachusine arsénicale s'adresse aux cancroïdes en général, surtout aux petits cancroïdes de la face.

Mode d'emploi. — On commence à déterger l'ulcération cancroïdale de ses croûtes à l'aide de compresses humides. puis on pratique l'assèchement exact à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Cela fait, à l'aide d'un pinceau, on recouvre de vernis à la Diachusine arsénicale la surface ulcérée, de façon qu'il dépasse et recouvre largement ses bords ordinairement épaissis. Il n'y a plus rien à faire alors, qu'attendre que la croûte formée se détache spontanément, ce qui arrive généralement du quinzième au vingtième jour. Une palpation minutieuse permet alors de s'assurer qu'il ne reste aucune induration suspecte, auquel cas on devrait recourir à une nouvelle application de vernis.

Prix : 15 francs le flacon.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.)

VÉROGÉNOL

Le traitement des maladies nerveuses.

Formule :

Diéthylbarbiturate de soude 0 gr. 25
Extrait fluide valériane fraîche.. 0 gr. 10

Par cuillerée à café ou comprimé.

Indications. — Insomnie (quelle qu'en soit la cause), Nervosisme (tics, toux nerveuses, hoquet persistant, démorphinisation, etc...).

Mode d'emploi. — 2 cuillerées à café ou comprimés le soir en se couchant procurent le sommeil.

2 à 3 cuillerées à café ou comprimés en 24 h. calment les nerfs.

Laboratoires VENOT

139, avenue E.-Zola — PARIS (XV^e).

VÉRONIDIA

Composition. — Diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflore dans un véhicule synergique et agréable au goût.

Chaque cuillerée à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de diéthylmalonylurée.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse, Traitement des insomnies, Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Terreurs nocturnes, Mal de mer, Tremblements, Bourdonnements d'oreilles, etc...

Doses pour 24 heures. *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café espacées dans le courant de la journée, comme antispasmodique ; 1 à 2 cuillerées à soupe — ou comprimés — comme hypnotique.

<i>Enfants</i> :	{	Au-dessous de 2 ans, nourrissons.	X à XXX gouttes.
		De 2 à 5 ans	XX à LX —
		De 5 à 7 ans.....	L à C —
		De 7 à 9 ans	1/2 à 1 cuillerée à café.
		De 9 à 11 ans....	1 cuillerée à café à 1 cuillerée 1/2.
		De 11 à 14 ans..	1 cuillerée 1/2 à 3 cuillerées à café.

Dans une infusion de tilleul ou dans du lait, le mélange étant pris en plusieurs fois, comme une potion.

Prix de vente au public : 18 francs (solution).

Le tube de 12 comprimés : 15 francs.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VERRULYSE

Composition. — A base de phosphore, chaux, fer, manganèse, magnésie lourde et légère, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Forme. — Poudre divisée en petits cachets ouvrables. Boîtes de 80 cachets, quantité suffisante dans la plupart des cas.

Dose et mode d'emploi. — Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes : 2 cachets par jour pendant 40 jours au début des repas.

Pour les enfants de moins de 8 ans : 1 cachet tous les jours.

Pour les enfants, et même pour les adultes. dans les cas rebelles, pour augmenter l'assimilation, ouvrir le cachet et prendre la poudre délayée dans un peu de potage, purée, compote, etc., la poudre ne communiquant aucun goût désagréable.

Propriétés. — Reconstituant de la cellule. Antiverruqueux.

1° *Effet général* : Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

2° *Effet local* : La deuxième ou la troisième semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent peu à peu.

Condition essentielle : Suivre le traitement sans arrêt, régulièrement, avec patience, jusqu'au résultat escompté.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action de redressement dans toute production cellulaire anormale.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 4 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Prix public : la boîte de 80 cachets : 16 francs.

Voir à **Formule JACQUEMAIRE n° 60.**

Laboratoires FLUXINE

J. BONTHOUX, Pharmacien.

VILLEFRANCHE (Rhône).

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, colloïdal.

Action. — Hypotensive-antiathéromateuse, — déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux. Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose. Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Verticurine, liquide : le flacon, 18 francs.
Verticurine, comprimés : le flacon, 14 francs.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} classe.
47, rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.).

VERTOX

Comprimés vermifuges pour parasites intestinaux (trichocéphales, oxyures).

Dosés à 0,15 de poudre de semen-contra.

Action. — Se dissolvent dans la seconde partie du tube digestif et agissent électivement sur : trichocéphales, anguillules, oxyures, etc...

Doses. — (Moyennes) 5 Vertox et 2 à 3 comprimés Leptab, avalés avec un peu d'eau, loin des repas. Les adultes peuvent répéter 2 à 4 fois cette dose, dans la journée, si la crise de parasitisme est grave. Suivre le traitement pendant 3 à 4 jours, au moment des lunaisons.

Présentation. — En boîte aluminium 55 comprimés : 10 francs (11 jours effectifs).

Laboratoires A. V. E.
56, rue Beaubourg — PARIS (III^e)
(Tél. : Turbigo 51-12.)

VÉRYL

Composition. — Dérivé organique aminé du cyanure de mercure, nettement plus actif, beaucoup moins toxique que le cyanure ordinaire.
Pas d'intolérance.

Indications, Posologie et Mode d'emploi. —

Toutes les indications du cyanure de mercure, Syphilis à toutes les périodes. Même posologie que HgCy : 1 ampoule de 1 cc. par jour.

En injections intraveineuses ou intramusculaires profondes indolores.

Diurétique mercuriel de toxicité minimum, 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Présentation et Prix. — La boîte de 20 ampoules de 1 cc., 20 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

Au Cantharidate de Soude.

Le **Vésicatoire Rose Beslier** à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

Indications. — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonies, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

Présentation. — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10 × 10.

Prix : la pochette : 5 francs.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.) (Tél. : 45.)

VIABYLIS

Stimulant des fonctions hépatiques.

Forme :

Gouttes. Durée moyenne : 15 jours. Prix : 19 fr. 50.

Composition :

Boldo, Artichaut, Iris versicolore, Chimaphila,
Jambul, Leptandra.

Indications :

Coliques hépatiques, Insuffisance hépatique, Diabète
et leurs conséquences.

Doses :

X à XX gouttes, 3 fois par jour.

Prescription. — Viabylis : un flacon.

En dépôt chez tous les droguistes.

Préparé par THERINEX

R. CONDY, Pharmacien

6, rue de Dunkerque — PARIS

Enregistré au L. N. C. — Admis aux A. S.

VICALPHOS IRRADIÉ

Composition :

- 1° Ergostérine, carotène ;
- 2° Parathyroïde, surrénale, thymus ;
- 3° Fluorure, phosphate et glycérophosphate de chaux, inosito-phosphate acide de chaux et de magnésie.

Indications. — Tous les états de déminéralisation.

Forme. — Granulé sucré aromatisé à la framboise, d'un goût agréable, est très bien accepté par les enfants.

Posologie :

Enfant : Une demi-cuillerée à café.

Adolescent : Une cuillerée à café.

Adulte : deux cuillerées à café.

Au début de chacun des trois repas.

Prix au public : 22 francs.

VICALPHOS SIMPLE

Composition :

- 1° Parathyroïde, surrénale, thymus ;
- 2° Phosphate, glycérophosphate, gluconate de chaux, inosito-phosphate acide de chaux et de magnésie.

Indications. — Tous les états de déminéralisation.

Forme. — Granulé sucré aromatisé à la mandarine, d'un goût très agréable.

Posologie :

Enfant : Une demi-cuillerée à café.

Adolescent : une cuillerée à café.

Adulte : deux cuillerées à café.

Au début de chacun des trois repas.

Prix au public : 16 fr. 50.

Peut-être prescrit aux Assurés sociaux.

Laboratoire du VICALPHOS
P. LAURENT, pharmacien,
48, rue Saint-Jean — LYON.

VICELIASE

Formule dragéifiée.

Antitoxique. Tonique. Cytophylactique.

Composition. — Citrate de soude, Phosph. de soude, Noix vomique, Chlorure de magnésium, Hyposulfite de magnésium.

Propriétés. — Reconstituant général, Tonique du système nerveux, Régulateur des fonctions digestives et nutritives, Prophylactique des néoplasmes.

Indications. — Asthénies, Surmenage, Débilité des vieillards, Troubles digestifs par hypofonctionnement, Troubles de la nutrition, Insuffisance hépatique, Hypertrophie de la prostate, Préventif des maladies de la peau et du cancer.

Toutes indications du Chlorure de Magnésium.

Tube de 80 dragées (traitement pour 1 mois) : 17 fr.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue de la République — CHAMPIGNY (Seine).

VICHY-AMAIGRISANT

du Dr Blancher.

Dragées.

Action double. — Régulateur glandulaire et intestinal.

Formule :

Hypophyse ant. .	0,001	Podophyllin	0,005
Thymus	0,01	Cascara désamérisé.	0,02
Ovarine	0,01	Ext. Jusquiame .	0,005
Fucus vesiculosus	0,02	Poudre Digitale... .	0,01

pour 1 dragée gluténisée à 0,30.

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour.

Indications. — Obésité par insuffisance glandulaire associée à une constipation plus ou moins aiguë. (Cas fréquent chez la femme.)

Prix :

Flacon (40 dragées) : 15 francs.

Cure de 3 flacons (coffret) : 40 francs.

(Durée moyenne d'un traitement : six semaines.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1008-4.

Laboratoires BLANCHER-VICHY

Tél. : 45-64.

VIGOFRUITS

Composition. — Acide phosphorique associé aux divers glycérophosphates et aux chlorures de Calcium et de Magnésium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Sans strychnine ni arsenic, sans alcool, stimule et tonifie sans exciter.

Indications. — Toutes les asthénies cérébrales ou musculaires, combat la fatigue et les effets du surmenage, abrège les convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 16 francs, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Mouleau — ARCACHON.

VIN ANTI-DIABÉTIQUE TALON

Composition. — A base de quinium associé à des toniques végétaux et arsenicaux. Médication complémentaire de l'insuline.

Indications. — Diabète et ses conséquences. Revitalise les tissus, arrête la déminéralisation, empêche la formation du sucre.

Dose. — 1 verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

Prix. La bouteille : 18 fr.

Laboratoire du Dr TALON

153, boulevard Montparnasse — PARIS.

Paris c/c 1557-94 (Tél. : Danton 51-07.)

VIN BRAVAIS

Composition. — Kola, Coca, Caféine, Théobromine, Malaga.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Débilité, Convalescence, Surmenage, Maladies nerveuses.

Posologie. — *Adultes* : le gobelet-mesure joint au conditionnement représente la quantité à prendre deux fois par jour avant les deux principaux repas.

Demi-doses pour les enfants à partir de 10 ans.

Prix : 17 francs le flacon de 500 cc.

NOTA. — Il existe également l'Elixir Bravais, même composition que le Vin mais à base de Curaçao, et le Granulé Bravais, spécialement indiqué dans les cas où le Vin et l'Elixir sont interdits.

AUBRIOT, Pharmacien

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 28-90.)

VINCE

Poudre antiseptique, désodorisante et cicatrisante.
Soluble dans l'eau.

Composition. — A base de parahydroxybenzoate de propyle, de perborate de soude spécialement préparé et d'une pureté absolue, additionné d'essences antiseptiques et aromatiques qui en corrigent le goût et en augmentent l'activité.

Indications. — Spécialement l'angine de Vincent, les ulcérations fuso-spirillaires, les stomatites ulcéro-membraneuses, les gingivites ulcéreuses, les accidents de dent de sagesse et la pyorrhée. S'emploie également comme dentifrice.

Mode d'emploi. — Pour lavages de bouche ou gargarismes : une cuillerée à café de Vince dissoute dans un verre d'eau tiède. En applications, sous forme de pâte, dans les cas d'angine de Vincent, pyorrhée ou irritation des gencives. A laisser de 4 à 10 minutes.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85-16-86-16-87.)

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

Composition. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Indications thérapeutiques. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie,

12, rue Charles-V — PARIS (Tél. : Arc. 68-10.)

VIN DE CARNÉOSE

Vin supertonique.

Composition. — Quina-cola-guarana, lacto-phosphate, condurango, plasma musculaire, arrhenal, citrate de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Super-toni-nutritif et sûr. Ne fatigue pas l'estomac, ne constipe pas.

Posologie. — *Adultes* : 1 verre à madère 3 fois par jour avant les repas.

Enfants : demi-dose.

Prix :

Le litre : 22 francs.

Le demi-litre : 13 francs.

USINES ET LABORATOIRES
DU BLOSSET

MOULINS-SUR-YÈVRE (Cher).

VIN DE VIAL ET SIROP TONIQUE VIAL

A. *Vin de Vial*: Strychnine. Quinine. Arséniate de Sodium. Viande. Lacto-Phosphate de chaux. Quinquina. Malaga.

Composition pour 1 verre à liqueur (30 cc.).
 Sulfate de strychnine..... 1/2 milligramme.
 Quinine pure..... 2 centigrammes.
 Arséniate de sodium 1/2 centigramme.
 Substances extraites de la viande. 50 centigrammes.
 Lacto-phosphate de calcium... 50 centigrammes.
 Ecorces Quinquina..... 2 grammes.
 Malaga et Muscat Q. S.

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications — et couramment un verre à liqueur pour les adultes — une cuillerée à bouche pour les adolescents, dix minutes avant le repas. *Le goût est très agréable.*

Indications. — Asthénies de toutes espèces. Convalescences. Rachitisme léger. Croissance et puberté. Grossesse. Allaitement. Etats déficients des vieillards.

B. *Sirop Tonique Vial*. Même composition, sans *Strychnine ni Arsenic*.

Composition pour une cuillerée à soupe (20 gr.).
 Substances extr. de la viande.... 1 gramme
 Lacto-phosphate de chaux 1 —
 Quinine..... 1/2 centigramme.
 Sirop de Gentiane..... 6 grammes
 Sirop de Quina 3 —
 Sirop simple 8 —

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications et généralement : *Adultes* : une cuillerée à soupe. *Enfants* : une cuillerée à café, pur ou dilué dans un peu d'eau pure ou minérale, avant les principaux repas.

Indications. — Le *Sirop Tonique Vial* est en somme du *Vin de Vial*, sans Strychnine, ni Arsenic, et en outre sans alcool. Il est particulièrement réservé aux enfants et aux malades qui ne peuvent utiliser un produit alcoolique.

Laboratoires pharmaceutiques : H. VIAL
 36, Place Bellecour — LYON
 Tél. : Franklin 33-59.

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage.

Un verre à madère, ou deux cuillerées à soupe de Vin Girard, correspondent à :

Iode	0 gr. 04
Tannin.....	0 gr. 08
Lactophosphate de chaux	0 gr. 30

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

Indications. — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

Prix : 18 fr. 50

Pour un traitement de 12 à 15 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-2.

VINOCRINOL

Vin hépato-minéral.

à l'extrait de foies de veau frais.

Médication des Syndromes Anémiques et des Déchéances Organiques par la méthode de Wipple.

Toutes anémies (pernicieuses, secondaires, post-hémorragiques), Convalescence, Tuberculose, Troubles de la croissance et de la puberté, Dépressions physiques et nerveuses.

Formule :

Extrait concentré de foies de veau sélectionnés	10
Arrhénal.....	0,20
Carb. lithine	0,05
Sulfate strychnine	0,025
Teint. écorce orange amère	7
Teint. kola	10
Vin de liqueur, Q. S. pour.....	1 litre.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 verres à madère par jour.

Enfants : 2 à 3 verres à liqueur par jour.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires du VINOCRINOL

30, rue de Sète — LONGUYON (Mthe-et-M.). Tél. : 80.

VIN RACI-BEL

RACIne de BELLadone
en décoction à 5 p. 100.

« Cure Bulgare. »

Traitement des rigidités extrapyramidales : Parkinson, Little, Wilson, Athétoses avec rigidité, spasme de torsion, etc...

Titre en alcaloïdes totaux.

Stabilisé, se conserve.

Avantages. — Egalité d'action, activité constante. Beaucoup moins toxique et plus actif que les grosses doses d'atropine.

Posologie. — Demander notre notice.

En principes, doses croissantes : de CXXV gouttes à sept cuillers à café par jour.

Pour avoir rapidement un vin fraîchement préparé, faire prendre des flacons de 210 grammes à 20 francs ou de 500 grammes à 35 francs.

Adresser les prescriptions à la :

Pharmacie de la CROIX-D'OR

« Spécialités neurologiques »,

85, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 53-63.)

(Livraisons dans Paris, envois en Province.)

VIOFORME

CIBA

Iodochloroxyquinoléine.

ANTISEPTIQUE, CICATRISANT.

Poudre inodore. Non toxique, jamais irritant.

Indications. — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100. Se formule magistralement.

Boîte poudreuse : 12 francs.

Usage interne. — Voir **Entéro-Vioforme**.

OVULES AU VIOFORME. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

Boîte de six ovules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :
fabrication entièrement française.

- Propriétés.** — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids.
2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.
3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinhémique.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

Posologie. — 2 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures, au repas, Boissons abondantes. Cure intermittente.
Présentation : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

Viophan injectable : associé à l'iode de Na.

2 formes : **Viophan amp. M** (intramus.) avec novocaïne.
— **amp. V** (intraveineux).

5 ampoules : Prix 25 fr.

Laboratoire National de Contrôle, 196-1 et 2.

Laboratoire du Viophan

81 et 83, rue de Lille — ROUBAIX.

VIOSTEN

Composition. — Lipoides irradiés. Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzylcinnamique. Vitamines.

Comprimés. — Granulé. — Injections de 1 cc.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme, Grossesse, Suites de couches.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Ergostérol irradié).

Doses. — *Enfants* : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour avant les repas.

De 3 à 7 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 7 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

LABORATOIRES LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

VIOXYL

Médication Céro-arsénio-hématique.

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale.

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose. Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie :

Adultes : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prix : Elixir, 16 fr. 50. Granulé, 16 fr. 50.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Nord 03-34 et 66-53.)

VIRADÈNE

Synergie de glandes génitales, composé phosphorique, phytothérapique, extrait de noix vomique, nucléinate de manganèse, extrait de maté.

Indications. — 1° *Chez l'homme :* *dépression nerveuse, affaiblissement* des facultés, neurasthénie, *sinistrose, surmenage, sénilité prématurée, difficultés de l'acte génésique*, frigidité, troubles de la puberté, convalescences difficiles, etc...

2° *Chez la femme :* dans le cas de *troubles à tendance dépressive*, d'asthénie, de surmenage, d'affaiblissement des facultés intellectuelles, physiques ou génésiques, etc.

Doses. — 4 dragées par jour en moyenne.

Prix de la boîte : 23 francs. Pour un traitement de deux semaines.

Laboratoires du FÉMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).

VIREDOX

Composition. — Levure de bière désamertumisée, purifiée, séchée et IRRADIÉE.

Protéines.....	56 p. 100
Hydrates de carbone.....	26 —
Lécithine.....	1 —
Glutathion.....	0,65 —
Vitamines B ¹ , B ² , B ³ , B ⁴ , B ⁵ , B ⁶ , et 165 unités internationales de Vitamines D par gramme.	

Indications :

Carie dentaire, rachitisme, fractures osseuses, hypogalactie, toutes les formes de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 à 5 grammes par jour.

Enfants : 5 à 10 grammes par jour.

Adultes : 10 à 20 grammes par jour.

Remarque. — Le goût agréable du VIREDOX en permet la prescription infantile. Il est recommandé de l'ajouter aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux légumes ou pâtes. Bien délayé, le VIREDOX se prend également très facilement dans un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 13 francs, le flacon de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. — (Tél. : 11-35.)

VIRMONAL « PIAM »

A base de phosphore organique.

Forme et dosage. — Comprimés contenant 0 gr. 0033 de phosphore organique.

Posologie. — 3 à 6 comprimés à la fois, 3 fois par jour, avant les repas. Ces doses peuvent être augmentées, le VIRMONAL ne renfermant ni alcaloïdes ni substances toxiques.

Indications. — Neurasthénie, Hystérie, Hypocondrie, Faiblesse nerveuse, Tics, Epilepsie, Insomnie, Surmenage.

Prix. — Le flacon de 90 comprimés : 25 francs.
Echantillons et vente en gros :

H. PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON.

D^r A. IMBERT, Pharmacien

(Tél. : Burdeau 28-96.)

VISCO-SÉRUM

Visco-sérum injectable reproduit exactement la formule minérale du plasma sanguin : $\frac{K + Na}{Ca + Mg} = 30 ; \frac{K}{Ca} = 2.$

Stimulation du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des organes hématopoïétiques.

Indications. — Tous les états asthéniques. Les affections chroniques déprimantes. Convalescences. Neurasthénies, Surmenages. Débilité physiologique. Pré-sénilité.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les jours ; voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Visco-sérum buvable. — Complète l'action du Visco-Sérum injectable, mais peut également être administré isolément.

Solution phosphorique acide radioactive. Fer, manganèse, zinc.

Catalyseur des métabolismes, fait l'appoint des carences minérales, ramène à la normale l'acidité humorale.

Indications. — Les déminéralisations, les anémies quelles que soient leurs causes. Tous les états asthéniques avec hypoacidité urinaire. Tous les états de dénutrition.

Posologie. — 2 ampoules buvables de 3 cc. par jour, 10 à 20 jours.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 18 francs.
Boîte de 10 ampoules buvables de 3 cc. : 18 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

VISCOVEINE

Composition. — XL gouttes =

Citrate de soude.....	0,10
Ext. stab. de Marron d'Inde Dausse ...	0,10
Ext. stabilisé de Monesia.....	0,05
Ext. stabilisé de Gui (fluide)	0,02
Bourse-à-pasteur.....	0,05
Ext. fluide de Viburnum, Cupressus, hamamelis āā.....	0,10
En milieu glyciné.	

Indications. — Hémorroïdes et tous états variqueux, Aménorrhée, Dysménorrhée, Règles douloureuses, Troubles de la ménopause.

Posologie. — XXX à XL gouttes aux repas.
Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous le n° 988-3.

Prix : 16 fr. 50

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (S-et-O.).

VITACALCINE MONCOUR

Complexe reminéralisant et énergétique.

Reminéralisant par sa vitamine D, ses poudres de glande thyroïde et surrénale et son carbonate de calcium.

Energétique par sa vitamine A, sa poudre totale de foie de bœuf, son phosphate de magnésium et son nucléinate de manganèse.

Indications. — Toutes affections déminéralisantes et hyposthénisantes : carences vitaminiques, états de déchéance organique, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, fragilité des os, fractures, anémies, chlorose, cachexies, troubles de croissance, carie dentaire, neurasthénie, psychasthénie, scrofule, prébacillose, bacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, ou 1 à 4 cachets.

Enfants : 1 à 4 comprimés ou 1 à 2 cachets (suivant l'âge).

Dose d'entretien : la moitié de la dose normale.

Le traitement sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Laboratoire MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

(Tél. Molitor 08-47.)

VITACHOLINE

Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques.

Puissant tonique du foie.

Composition. — VITAMINE A. Sulfate de Magnésie. Extrait d'Artichaut, Lacto-sérum.

Propriétés. — L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une *action tonifiante et anti-infectieuse* considérable de la cellule hépatique. Active la sécrétion et l'excrétion biliaires. Régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif. Diurétique.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule, Lithiase, Ictère, Cholécystite chronique, Cholémie, Insuffisance. Constipation, Entérocólite. Urticaire. Prurit, Eczéma chronique, Acné chronique, Asthénie et fatigue générale.

Présentation. — Granulé soluble. Prix : 15 francs.

Mode d'emploi. — *Drainage biliaire* : 1 à 3 c. à café de granulé à jeun avec 1/2 verre d'eau tiède.

Cure d'entretien : 1/2 à 1 c. à café de granulé, 20 minutes avant les repas.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

VITACRINE

Association hormono-vitaminique.

Deux formules : Vitacrine *M* (Masculine) et Vitacrine *F* (Féminine).

Composition. — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant pluriglandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

Mode de présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Asthénies, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Troubles de la puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour.

Prix : 20 francs (flacon de 42 comprimés).

Laboratoire DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

188, cours de la Somme — BORDEAUX
(Tél. : 91-609.)

VITACUROL SAVARE

Huile d'olive, pure, naturelle, sélectionnée.

SURACTIVÉE

100 unités VITAMINE A par cuillerée à café.

Cholagogue. — Cholérétique. — Laxatif doux. — Anti-infectieux. — Catalyseur d'Oxydation.

Le *Contrôle biologique* en garantit la haute teneur en VITAMINE A et assure la constance de son action à doses réduites. L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une action tonifiante considérable de la cellule hépatique.

Le *contrôle chimique* en garantit la très faible acidité et surtout la richesse la plus élevée en glycérides de l'acide oléique, d'où : efficacité accrue, et digestibilité parfaite.

Indications. — Lithiases, Ictères, Cholécystites, Constipation chronique, Hyperchlorhydrie.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à dessert le matin à jeun.

Prix : 17 francs.

LABO-VITA

190, boulevard Haussmann — PARIS.

VITADIASE

Composition et présentation :

Comprimés d'inositophosphate de chaux et magnésie associé aux extraits hydroalcooliques de levure de bière, de son et germe de blé.

Indications :

Surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, convalescence, rachitisme, tuberculose, grossesse et allaitement.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 comprimés.

Prix au public : 15 francs.

Docteur J. GALIMARD O. * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES

VITADONE

Vitamines A et D en ampoules injectables.

Titrage : 20.000 u. i. de vitamine A. } par ampoule de 2 cc.
20.000 u. i. de vitamine D. }

Propriétés thérapeutiques. — La VITADONE agit puissamment contre la tuberculose pulmonaire, par sa vitamine D, qui calcifie les lésions tuberculeuses, et par sa vitamine A, anti-infectieuse et protectrice des épithéliums (notamment de l'épithélium pulmonaire).

Indications et posologie. — Dans la tuberculose pulmonaire, 2 injections intra-musculaires par semaine ; cures de 10 semaines, séparées par des périodes de repos de 15 jours.

La VITADONE, qui se fait aussi en GOUTTES (XX à C gouttes et davantage, par jour) et en CHOCOLATÉS (2 à 4 par jour en moyenne), peut remplacer, dans toutes ses indications, l'huile de foie de morue, dont elle contient tous les principes actifs. Elle est, en somme, une huile de foie de morue synthétique et hyperconcentrée.

Prix :

Ampoules : 25 francs la boîte de 6.

Gouttes : 19 francs. — *Chocolatés* : 20 francs.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS.

(Tél. : Danton 08-11.)

VITAGAR

à base de Vitamine B

Composition. — Mucilage exclusivement végétal, à base de Vitamine B (300 U. I.), Agar-Agar, Bourdaine, exempté de principes amers et irritants.

Forme. — Petits grains dragéifiés, faciles à absorber.

Action. — Déconstrictant complet. Par sa Vitamine B régénère les fibres lisses de l'intestin, auxquelles il restitue le tonus contractile. Combat ainsi en même temps la constipation et sa cause principale, l'atonie intestinale. — La Vitamine B agit également contre l'auto-intoxication due à la stase stercorale.

Indication. — Traitement complet et rationnel de la constipation. Laxatif purement physiologique. D'action douce et d'emploi agréable, particulièrement indiqué chez les enfants et les femmes enceintes.

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à café (1 ou 2 pour les enfants), après chacun des deux repas. Avaler sans mâcher à l'aide d'une gorgée de liquide.

Laboratoires UROMIL

L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

Tél. : Provence 04-00.

VITALACTYL

Comporte :

1° Un tube de Pommade vitaminée (vitamine A et D).

2° Une boîte saupoudreuse de ferments lactiques vivants. La Pommade *Vitalactyl* active le bourgeonnement des cellules.

La Poudre *Vitalactyl* change le P. H. des plaies et contribue à la destruction des pathogènes.

Indications thérapeutiques. — Ulcères variqueux et plaies sphacélées de toutes natures.

Mode d'emploi. — Laver la plaie à l'eau bouillie tiède sans addition d'aucun antiseptique. Tamponner à la gaze stérile.

Saupoudrer avec la Poudre *Vitalactyl* de façon à recouvrir légèrement la plaie.

Étaler une mince couche de pommade, puis recouvrir de gaze stérile.

Renouveler le pansement matin et soir.

Prix au public : 20 francs.

Laboratoires SAUBA

Montreuil — PARIS.

(Tél. : Avron 25-80.)

VITALIUM F. 2

A base d'énergie électronique.

Composition. — Chlore 1 gr. 59, Phosphore (en P_2O_5) 3 gr. 57, Magnésium 1 gr. 75, Aluminium (en Al_2O_3) 4 gr. 77, Silicium (en SiO_2) 5 gr. 62, Eau distillée : Q. S. pour 1 litre.

Solution rendue énergétique par la stabilisation d'une énergie électronique et obtenue par l'action de rayons β et γ d'une intensité et d'une durée déterminées.

Indications. — Augmente la puissance vitale.

Toutes déficiences organiques, Rachitisme, Prétuberculose et Tuberculose sous toutes ses formes.

Présentation et prix. — Vitalium F. 2. (*adultes*) : boîte de 12 ampoules buvables de 10 cc., pour un mois de traitement : 85 francs.

Vitalium F. 2 (*infantile*) : boîte de 12 ampoules buvables de 2 cc. pour un mois de traitement : 25 francs.

LABORATOIRES D. F. L.

97, boulevard Arago — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Por. 17-48.)

VITAMINE D CORTIAL

Vitamine D cristallisée.

Composition. — Vitamine D cristallisée incorporée au chocolat. Pastilles dosées à 4 centièmes de milligramme de vitamine cristallisée pure.

Indications. — Spécifique de toutes les formes du rachitisme.

Curatif. — Chez l'*enfant* : retard de croissance, déformations osseuses, retard de la dentition, carie dentaire, troubles scorbutiques.

Chez le *nourrisson* : accidents convulsifs, tétanie, décalcification.

Chez l'*adulte* : prétuberculose, grossesse, allaitement, consolidation des fractures, ostéomalacie.

Préventif. — Enfants prématurés ou de constitution faible, pour prévenir les troubles rachitiques ; dans les convalescences de maladies infectieuses.

Avantages. — Dosage précis, pureté de la vitamine D, conservation indéfinie, absorption agréable pour les enfants.

Mode d'emploi et doses. — Au-dessous d'un an, 1/2 pastille chaque matin. — Jusqu'à 10 ans : 1/2 pastille matin et soir. — Au-dessus : de 1 à 2 pastilles par 24 heures.

Pour les nourrissons, faire fondre la pastille dans du lait tiède.

Prix : le tube de 20 tablettes (20 à 40 jours de traitement) : 18 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

VITAMINES SECLO

Huile naturelle de foie de Fletan (Halibut).

Contenant : 35 000 unités int. Vitamines A par gramme.
2 500 unités Int. Vitamines D par gramme.

Formes. — Gouttes, dragées.

Permettent l'absorption des Vitamines A et D à haute dose, sous un faible volume.

Elles ne provoquent ni dégoût, ni troubles digestifs.

Propriétés thérapeutiques. — Débilité générale, rachitisme, pré tuberculose, lymphatisme, xérophtalmie, troubles de la nutrition, croissance, dentition, ostéomalacie, grossesse, allaitement, convalescence, surmenage.

Posologie :

Nourrissons, de ..	2 à 6	gouttes par jour.
Enfants, de	6 à 12	— —
Adultes, de	20 à 30	— —
Adultes, de	2 à 5	dragées —

Prix :

Le flacon compte-gouttes de 5 cc.....	14 fr.
La boîte de 30 dragées	14 —

Laboratoires SECLO

J.-P. PINTA, Pharmacien

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE
(Tél. : Wagram 62-71.)

VITAMORRHUINE

Composition. — Concentré d'huile de foie de morue à 1/50 associé au phosphore et au calcium sous forme de granulés chocolatés. Une cuillerée à café de Vitamorrhaine représente:

3 500 unités internationales Vitamine A. naturelle.
750 — — — — — D. —

0 mgr. 02 de phosphore.

0 gr. 05 de calcium.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Croissance, Rachitisme, Scrofuleuse, Convalescence, Carie dentaire, etc.

Doses. — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique. S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMORRHUINE

Perles

Composition :

1 perle contient 0,10 cc. d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50 et correspond à :

3.500 unités internationales, Vitamine A. *naturelle* ;

750 unités internationales, Vitamine D. *naturelle*.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Inappétence, anémie, aux femmes enceintes pendant la période de gestation, convalescence, etc.

Doses :

Adultes : 4 à 6 perles par jour.

Adolescents : 3 à 4 perles par jour.

Enfants : 1 à 2 perles par jour.

A avaler après les repas.

Pharmacie Centrale de Belgique,

Soc. Anonyme

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMYL

Vitamines A. B. et C. en extrait concentré.
Une cuillerée à café à chaque repas.

Prix public : 18 francs le flacon.

VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées.

Vitamines A. B. C. et D. en solution huileuse,
finement émulsionnée. Une cuillerée à café ou
2 dragées à chacun des 3 repas.

Une cuillerée à café renferme 2 200 unités anti-
rachitiques internationales, 1 dragée renferme
1 000 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

Le flacon de solution grand modèle : 20 francs.

— — petit modèle : 12 francs.

Le flacon de 40 dragées : 18 francs.

VITAMYL IRRADIÉ CHLOROPHYLLÉ

Ampoules buvables.

Chlorophylle pure associée aux vitamines A, B, C
et D.

1 à 3 ampoules buvables par jour.

Chaque ampoule contient 10 cgr. de Chlorophylle
et 2 500 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

La boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 22 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours
de traitement à dose journalière maximum.

Indications. — Toutes les indications du trai-
tement de carence. Tous les cas de déminérali-
sation. Les différentes formes de ce produit sont
aromatisées et d'un goût agréable.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

VITAOL

Huile de foie de morue survitaminée en vitamine A.

De très faible acidité facilement assimilable. Teneur en vitamine A constamment contrôlée et ramenée à un titre uniforme de 2 000 unités internationales par gramme.

Produit très actif.

Indications. — Troubles de la croissance, état infectieux, lymphatisme, prétuberculose et précarence — sans contre-indication.

Doses : *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, avant le repas du soir.

Présentation. — Forme liquide flacon de 180 cc. Prix : 13 fr. 50.

Lab. pharmaceutiques CHABRE Frères.
TOULON.

VITARGYL

Composition. — Protéose argentine contenant 20 p. 100 d'argent.

Propriétés. — Antiseptique de toutes les muqueuses. Non irritant. Sédatif et décongestif externe. Non corrosif. Action absolument indolore.

Indications. — Traitements préventif, abortif et curatif de toutes les affections des muqueuses.

Posologie. — **Oto-rhino-laryngologie :**

Coryzas, sinusites, amygdalites, angines, désinfection-pré ou post-opératoire, prophylaxie de grippe, oreillons, rougeole, otites :

Vitargyl 1 p. 100. Solution en flacon compte-gouttes..... 12 fr.

Vitargyl 5 p. 100. Solution en flacon compte-gouttes..... 14 fr.

Pour les cas aigus :

Vitargyl éphédriné, en flacon compte-gouttes. 14 fr.

Ophthalmologie :

Conjonctivites banales ou purulentes. Ulcères. Ophthalmies, préventif de l'Ophthalmie des nouveau-nés :

Collyre au Vitargyl 5 p. 100 en flacon compte-gouttes..... 14 fr.

Collyre au Vitargyl 10 p. 100 en flacon compte-gouttes..... 16 fr.

Urologie :

Blennorrhagie :

Préventif : Prophylargyl ou crayons.

Abortif : injections 20 p. 100.

Curatif : lavages 5 et 1 p. 100.

Urétrites, cystites : injections 10 p. 100 ou crayons.

Métrites du col, Bartholinites : Crayons, ovules ou lavages.

Vitargyl 20 p. 100, en boîte de 6 tubes scellés de 5 cc..... 20 fr.

Vitargyl-Crayons urétraux, 2-5 ou 10 p. 100, en boîte de 6..... 14 fr.

Vitargyl-Crayons utérins 10 p. 100, en boîte de 6..... 14 fr.

Vitargyl ovules 10 p. 100, en boîte de 6..... 18 fr.

Prophylargyl, en flacon compte-gouttes.... 16 fr.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

Tél. : Archives 03-29 et 42-40.

VITARSENIC

Une seule forme parce que la seule stable.
Dragées de 0 gr. 25.

Contenant :

Vitamine D..... 500 unités.
Triiodure d'Arsenic 1 milligramme.

Indications. — *Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Anémie, Convalescence, Anorexie, Asthénie.*

Mode d'emploi. — 2 à 10 dragées par jour pour enfants de 2 à 10 ans.

Adultes : 12 à 16 dragées par jour.

Littérature et Echantillons :

Laboratoire du BLAGNY
René PAMELA, Pharmacien
85, rue Turbigo — PARIS (III^e).
Tél. : Archives 12-39.

VITASCORBOL

Acide Ascorbique.

Médication spécifique des états de précaréence et de carence en vitamine C.

Indications :

Scorbut, Préscorbut, Anorexie, retard de la marche, Anémie, Syndromes hémorragipares, retards de la dentition, Allaitement artificiel.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 025. (Tubes de 20) 18 fr.

Vitascorbol injectable :

Boîte de 10 amp. de 1 cc. à 0 gr. 05. Prix .. 25 fr.

— 10 amp. de 2 cc. à 0 gr. 10. Prix .. 25 —

Posologie :

Nourrissons : 2 comprimés à 0 g. 025 *pro die*.

Adultes et enfants : 2 à 4 comprimés *pro die*.

Par voie intraveineuse : 10 à 30 ctg. *pro die* suivant les cas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{les} .
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Capsules de 0 gr. 20:

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{les} .
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Propriétés. — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

Indications. — *Chez l'enfant :* Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — *Chez l'Adulte :* Convalescence, Surmenage, Lésions bacillaires. — *Chez la femme enceinte :* Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — *A tous les âges :* Agent anti-infectieux.

Mode d'emploi. — *Nourrissons :* X gouttes matin et soir. — *Enfants :* XX gouttes matin et soir. — *Adultes :* 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Prix : 20 francs

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

VIVACURE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule :

	<i>Adulte.</i>	<i>Infantile.</i>
Bi-iodure de Mercure (Hg)	0 gr. 02	0 gr. 01
Iodure de potassium	0 gr. 25	
Arséniate de soude	0 gr. 01	0 gr. 005
Extrait atropa bellad.	0 gr. 02	0 gr. 005
Arome q. s.	15 cc.	15 cc.

Indications. — 1° Toutes les indications de la syphilis soupçonnée ou connue et de l'hérédo-syphilis.

2° Adjuvant indispensable de tous les traitements antisyphilitiques soit au cours de la grossesse, de la croissance ou entre les périodes de traitement (cure de repos).

Avantages. — Présentation spéciale (ampoules buvables) ne comportant aucune indication susceptible de dévoiler la nature du traitement.

Mode d'emploi. — A prendre immédiatement avant les repas dans un verre d'eau gazeuse de préférence.

Posologie : Une ampoule par jour. Cette dose ne peut être dépassée que sur indication spéciale du médecin.

Note très importante : En cas de prédispositions anaphylactiques contre l'iodure de potassium, prescrire la **forme infantile**.

La boîte de 14 ampoules : 21 fr. 50.

Laboratoires de la JÉCOBIASE

Dr R. PIONNEAU, Pharmacien
VAYRES (Gironde).

VIVARGYRE

Traitement mercuriel dissimulé en ampoules buvables.

Deux dosages. — Adultes :

Phénoldisulfonate Hg et Na	0,05
Arséniate de soude	0,01
Excipient pour	10 cc.
Phénoldisulfonate Hg et Na	0,02

Enfants :

Méthylarsinate de soude	0,01
Excipient pour	5 cc.

Présentation. — Boîtes de 10 ampoules de 5 et 10 cc.

Indications. — Traitement Hg d'entretien ;
Troubles généraux ; Déficiences organiques ;
Agent dépuratif et reconstituant.

Doses. — 2 ampoules par jour (enfants et adultes)
dans de l'eau gazeuse, sucrée ou non.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle
sous les n^{os} 403-23 24.

Laboratoires HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71.)

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines :

(Vitamines antirachitique et de croissance.)
(Contrôle biologique rigoureux).

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année).

N.-B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 16 francs.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie. — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

- 1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*

+ H²O = Inhalation (respiration nasale).
+ chaude = Gargarisme (bain buccal).

Inhalation sans alcool. Thèse de Doctorat.

Prix : 8 fr. 95.

- 2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

Prix : 12 fr. 75.

Indications. — Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

Prescriptions. — Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

LABORATOIRE LARYNGOLOGIQUE

222, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 34-71.)

VOLTARGOL ROBIN

Composition. — Argent colloïdal électrique à très petits grains, isotonique et stabilisé, à 0,50 0/00

Propriétés. — Anti-infectieux, antiseptique, non toxique ; ne produit pas de choc.

Indications. — Toutes infections aiguës : grippe, fièvres typhoïdes et puerpérales, etc...

Forme et mode d'emploi. — Ampoules de 5 et 10 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses, 1 à 10 cc. par 24 heures ; jusqu'à 50 cc. et plus dans les cas graves.

Prix : 6 ampoules à 5 cc 22 fr.

— 6 ampoules à 10 cc 36 —

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

VULCAPIL

**Lotion ininflammable au soufre
pour le cuir chevelu.**

Propriétés thérapeutiques. — Le VULCAPIL rend aisé, agréable, et sans danger le traitement de la Séborrhée et des Alopécies ; il apporte au cuir chevelu le soufre nécessaire à sa kératinisation et le débarrasse de ses sécrétions anormales et des desquamations de pellicules.

Indications. — Affections du cuir chevelu : Alopécies, Séborrhées.

Mode d'emploi. — Tous les matins faire une friction suivie d'un léger massage du cuir chevelu.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Cie, Pharmaciens,
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-cholagogue.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses. Arthritisme.

Mode d'emploi. — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Cie, Pharmaciens
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01, 75-02.)

VULCRINOL

Pilules dragéifiées.

Opothérapie hépatique et chimiothérapie humorale associées.

Composition :

Extrait total de foie de veau frais.

Thiosulfate de magnésium.

Hexaméthylènetétramine.

Propriétés thérapeutiques :

Spécifique idéal des manifestations de l'insuffisance hépatique et des syndromes d'intolérance : agit comme excitant propre de la cellule hépatique et comme catalyseur de l'équilibre humoral.

Indications :

- 1° *Maladies d'intolérance et états anaphylactiques.* — Dermatoses, Prurits, Urticaires, Migraines, Asthme, Rhume des foins, Accidents sériques, Intolérances diverses.
- 2° *États hépatiques.* — Torpeur du foie et troubles digestifs consécutifs, Hépatites chroniques, Ictères, Foie colonial, Cholémie familiale, Arthritisme sous toutes ses formes : obésité, goutte, certaines formes de rhumatismes chroniques.
- 3° *Intoxications.* — Médicamenteuses et alimentaires, Auto-Intoxications, Adjuvant des traitements anti- Σ et de l'aurothérapie, Convalescences des maladies infectieuses.

Posologie :

3 à 4 pilules avant les deux principaux repas. Cure de 7 jours consécutifs, à répéter plusieurs fois avec intervalle d'une semaine entre les cures.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Prix : L'étui de 50 pilules : 20 francs.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Opéra 43-79.)

VULNÉRINE DU D^r BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Éther éthylpyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc...

Forme. — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones. Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Érysipèle, Engélures, Impétigo, Cancers ulcérés inopérables.

Spécifique de la gangrène gazeuse.

La VULNÉRINE calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de VULNÉRINE. Nettoyage à l'éther.

Prix du tube : 13 francs.

Laboratoire DUCOQ

LANGEAIS (Indre-et-Loire). — (Tél. : 68.)

R. C. Chinon 2059.

XANTHARLEM

Le Médicament du Foie.

Forme.

Pilules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin.

Composition.

Haarlem Bardet, Curcuma Xanthorriza (1), Cynara Scolymus.

Propriétés thérapeutiques.

Par accroissement de la cholérèse, augmente, progressivement et sans provoquer ni spasmes, ni coliques, l'écoulement de la bile, dont la teneur en bilirubine se trouve augmentée. Cholagogue énergique, mais non brutal. Assure l'asepsie de la vésicule et de l'intestin grâce à ses propriétés bactéricides. Antispasmodique, frénateur des contractions vésiculaires. Cholestérolytique.

Indications thérapeutiques.

Angiocholite, Cholécystite aiguë ou chronique, Péri-cholécystite, Cholélithiase, Cholémie, Cholestérinémie, Congestion du foie, Ictère catarrhal, Insuffisance hépato-biliaire, Cirrhose, Coliques vésiculaires, États hypercholestérinémiques, Constipation, Asthme hépatique, Colibacillose.

Posologie et mode d'emploi.

Affections aiguës : 4 à 6 pilules par jour.

Affections chroniques et cures d'entretien : 2 à 4 pilules par jour, à prendre au cours des repas.

(1) **Références scientifiques :** Dr Henri Leclerc, *Courrier médical*, 30 juin 1935 ; *Presse médicale*, 9 novembre 1935 ; *Journal de médecine et de chirurgie*, 25 mars 1937. — *Thèse :* Dr Van Loon, Amsterdam, 1934 ; H. Kalk et K. Nissen, *Deutsche mediz. Wochenschrift*, 18 septembre 1931 et 28 octobre 1932 ; Koch, *Congrès intern. de la lithiase biliaire*, Vichy, septembre 1932, etc.

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

XANTHORRYL

Composition :

Curcuma Xanthorhiza	5 centigr.
Extrait réglisse.....	5 —
Magnésie hydratée	10 —

Indications :

Insuffisance hépato-biliaire, états congestifs du foie, cholécystites, angiocholites, cholé-lithiase, constipation chronique, cellulite. Augmente la sécrétion biliaire sans spasmes ni coliques.

Présentation et prix :

18 francs la boîte de 60 comprimés glutinisés.

Mode d'emploi :

2 à 6 comprimés dans les 24 heures immédiatement avant les repas.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire des Produits XANTHORRYL

E. AUCLAIRE, Pharmacien,

4, rue d'Aumale — PARIS (IX^e).

XÉRODERME

Composition. — Pommade à base d'Oxyde de Zinc, de précipité blanc, d'Amidon, de Tribromophénate de Bismuth, de Vaseline.

Indications. — Spécifique de toutes les affections de la Peau.

Dartres, Eczéma, Herpès, Démangeaisons, Dermatoses, Rougeurs, Impétigo.

Emploi. — Après lavage de la région malade à l'eau bouillie ou avec une solution antiseptique, faire une légère application de Xéroderme. Faire deux ou trois applications par jour.

Prix au public : 9 francs.

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (M.-et-M.).

YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie. — *Nourrissons.* — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

Prix : Dragées 12 francs. — Granulés : 15 fr.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe

18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 64-90 à 95.)

YO-ANDROL

Médication hormono-vitaminique.

Composition :

Un complexe endocrinien :

Lipoïdes orchitiques	0, 03 cgr.
Antéro-hypophysine	0,005 mmgr.
Cortico-surrénine	0, 02 cgr.
associé à la vitamine E	0, 02 cgr.
et à la Yohimbine	à dose infinitésimale.

Présentation. — 1° Pilules (*tube de 60*).

2° Ampoules injectables en solution huileuse indolore. (*boîte de 6*.)

Mode d'emploi. — *Per os* : 8 à 12 pilules par jour, avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : 1 injection sous-cutanée ou intramusculaire journalière ou tri-hebdomadaire.

Indications. — Traitement spécifique des asthénies. Opothérapie complémentaire chez la femme.

Note. — Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : **Yo-Androl sans Yohimbine.**

YO-GYNINE

Médication ovarienne renforcée.

Associant la totalité des hormones ovariennes à l'antéro-hypophysine, à la Vitamine E et à la Yohimbine

Présentation. — Pilules.

Mode d'emploi. — 9 pilules par jour, avant chacun des principaux repas et dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

Indication. — Donne des résultats là où l'opothérapie ovarienne seule a échoué.

Laboratoire ISCOVESCO

107, rue des Dames — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 07-90.)

Adr. tél. : Lipoïdes Paris 54.

YOHIMBINE HOUDÉ

Alcaloïde cristallisé du *Pausinystalia Yohimbe*, spécialement purifié, constant et contrôlé par titrage physiologique.

Propriétés :

- 1° Aphrodisiaque (par vaso-dilatation élective et excitation directe du centre érecteur) ;
- 2° *Système nerveux*. Sympathicolytique véritable (R. Hamet).
- 3° *Système vasculaire*. Vaso-dilatateur général, donc hypotenseur (Loeper et Lemaire). Bons résultats dans l'aménorrhée et la dysménorrhée.
- 4° *Sécrétions*. Augmente la sécrétion lactée (Cortia, Nolle, Del Buono, Levent). Résultats remarquables et constants.

Présentation :

- 1° Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes et demi sous le nom de **Yohimbine Houdé**.
- 2° Sous le nom de **Gynimbine Houdé**, avec une *littérature faisant abstraction complète des propriétés aphrodisiaques* :
 - A. Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes et demi.
 - B. Ampoules de solution stabilisée, de 2 cc., à 5 milligrammes de chlorhydrate par cc. (Gynimbine).

Doses :

- Frigidité, impuissance psychique : 6 à 9 granules par jour en 3 fois, avant les repas. Prescrire sous le nom de Yohimbine ou de Gynimbine.
- Sympathicotomie, Exophtalmie basedowienne, Hypertension, Dysménorrhée : 3 à 6 granules par jour, ou 1 ampoule (sous-cutanée). Prescrire sous le nom de Gynimbine.
- Hypogalactie : 1 ampoule Gynimbine de 10 milligrammes par jour, en injection sous-cutanée, pendant 4 à 6 jours ; commencer autant que possible dans les 3 jours suivant l'accouchement. A défaut d'injections, 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

Tél. : Nord 40-58.

YOHIMBINE VICARIO

Comprimés de Chlorhydrate d'Yohimbine à 5 mmgr.

L'YOHIMBINE est un tonique du centre médullaire génito-spinal ; il donne les meilleurs résultats dans l'impuissance quelle qu'en soit l'origine (psychique, paralytique, insuffisance de la glande interstitielle du testicule, etc...).

Dose moyenne. — 3 comprimés par jour, 1 après chaque repas. Le comprimé s'avale comme une pilule ; une gorgée d'eau est prise ensuite.

Dose maxima. — 9 comprimés par jour. Cette dose qui ne convient qu'à des cas exceptionnellement rebelles, est généralement inutile.

Le tube de 15 comprimés : 4 fr.

La boîte de 60 comprimés : 15 fr.

Laboratoires VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IX^e).

YOHOURTHOGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation domestique du Yohourth.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, fournis par les *cultures pures* des microorganismes producteurs du Yohourth.

Indications. — Le Yohourthogène permet la fabrication du Yohourth lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — La technique à suivre et la description de l'étuve à utiliser pour la fermentation requise (à 45°) sont données par une notice spéciale. Le contenu d'une ampoule correspond à 200 grammes environ de lait ; une cuillerée à café du ferment en flacon correspond à un demi-litre de lait.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 10 francs.

Le flacon (pour 20 pots de 120 cc.) : 4 fr. 50.

Laboratoires CARRION et LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur. 40-30.)

YPTOR

Bougies solubles sans radium, pour le traitement local et la prévention des urétrites. Remplacent, dans les cas récents, les bougies Rethragine *radifères* destinées de préférence aux urétrites chroniques.

Nature. — Bougies à base d'argent colloïdal cuivreux, acide urique, excipient non gras.

Antiseptiques, Détersives, Antiphlogistiques, Calmantes.

Les bougies YPTOR sont délivrées en tubes scellés et stérilisées dans un milieu lubrifiant, facilitant leur introduction dans l'urètre.

Deux longueurs :

Courtes..... 7 cm. Longues .. 15 cm.
Sauf indication particulière du médecin traitant il est délivré des *bougies courtes*.

Pour les longues, BIEN SPÉCIFIER :
BOUGIES LONGUES

Prix :

Boîte de 10 bougies courtes : 32 francs.

—	5	—	—	: 17	—
—	10	—	longues	: 35	—
—	5	—	—	: 18	—

Pour l'urètre féminin, nous conseillons de couper la bougie YPTOR ordinaire de 7 cm. à la longueur voulue.

Laboratoires Pharmaceutiques
L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).
(Tél. : Odéon 73-92.)

YSEULT**(Gouttes)**

Admis dans les Hôpitaux de Paris

Composition. — Adjonction à des vaso-constricteurs et sédatifs pelviens d'action sûre, du Boldo et du Cratægus. Tous ces malades sont de petits insuffisants hépatiques ou cardiaques, souvent les deux (Conception nouvelle confirmée par la mesure de la pression veineuse).

Indications. — Traitement nouveau des troubles de la circulation veineuse chez la femme et chez l'homme.

Doses. — X gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.

Les résultats cliniques ne se comparent à aucune autre préparation, ils sont surprenants.

Prix : 15 francs pour un mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

Propriétés. — Déconstipant, Cholagogue alcalin, Pansement des muqueuses. Empêche les fermentations intestinales, Antiémétique. Eupeptique.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Dermatoses, Hépatisme.

Adultes : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Affections hépatiques, Dermatoses.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 1/2 cuillerées à café par jour dans le lait (biberons), eau, bouillies. (Éviter température supérieure à 50°.) Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café suivant effet, dans un demi-verre d'eau avant le repas, 2 à 3 fois par jour.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

Indications. — Médications hépato-digestive et reminéralisante associées.

Doses : *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

— 1 an : — matin, midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 1/2 cuillerées à café matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

ZYMION

Traitement du rhumatisme chronique.

Description. — Capsules glutinisées contenant : Soufre colloïdal, Manganèse colloïdal, Lithium colloïdal, Etain colloïdal et Levurine Extractive.

En flacons de 60 capsules.

Action pharmacodynamique. — L'action résolutive du soufre sur les tissus fibreux, celle du Lithium sur la diathèse uratique, du Manganèse sur la goutte et l'érythème noueux, et la présence d'Etain colloïdal (qui existe dans diverses sources thermales) et de *Levurine extractive*, antitoxique, antiglycémique et stabilisant des colloïdes minéraux, expliquent l'activité du *Zymion* dans de nombreuses formes de rhumatisme.

Indications. — Rhumatisme chronique simple, fibreux, déformant, noueux, infectieux, arthrite sèche, goutte, lumbago, et toutes manifestations arthritiques ou rhumatismales chroniques avec réactions douloureuses.

Doses. — 4 à 10 capsules par jour aussi longtemps qu'il est nécessaire
Prix : 25 francs pour 6 à 15 jours de traitement.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

Tél. : Carnot 18-75.

ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

Forme. — Poudre.

Composition. — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

Mode d'emploi :

A. Adultes. — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café soit : une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit : une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. Nourrissons. — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

Indications. — Tous états nauséeux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 13 fr. 50

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien
3 et 5, rue Alexandre-Dumas
SAINT-OUEN (Seine).

ZYMOSTOL

Levures vivantes irradiées, présentant une association de vitamines B et de vitamines D sur un organisme vivant.

Indications. — Toutes déficiences de Calcium, Magnésium et Phosphore, Décalcification, Soudures osseuses, Asthénies, Convalescences, Certaines déficiences glandulaires.

Posologie. — *Ampoules buvables*: Une ampoule de 3 cc. 5 par jour ou tous les deux ou trois jours dans un peu d'eau sucrée ou non, le matin à jeun.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 3 cc. 5.


Prix : 25 francs.

Laboratoires Pharmaceutiques

L.-G. TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).





2^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs
Fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 1^{re} partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.

ENCLOSURE NOMINALE DE
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
MEDICALES

les adresses des
Fabricants

les adresses des
Fabricants
les adresses des
Fabricants

A

- *A 313
 Abactériol
 Absinthine Houdé
 *Absuric
 *Acaïol
 *Acatar
 Accessoires d'Électri-
 cité médicale
 Accod
 *Acécoline-Acecolex
 *Acépile
 Acépyrol Brun
 *Acéryl
 *Acésine Guillaumin
 *Acétamone
 Acétémine
 Acétosulfol Huerre
 *Acétylarsan
 Achlorol
 Acide oléique P. Thi-
 bault
 Acidural Dupraz
 Acimyl Monimart
 *Acobella
 Acodros
 *Acoégénol
 *Acolitol
 *Aconitine Houdé
 Acripyoril
 Acrisol Clérambourg
 *Actibaïne
 Acticalcine
 *Acticarbène
 *Actiformine
 CHABRE Frères, Toulon.
 54, bd Jacquemain, Bruxelles.
 9, rue Dieu, Paris.
 17, rue de Provence, Paris (IX^e).
 LAMO, 52, rue de Crimée, Paris.
 BEAUXIS-LAGRAVE, 72, quai
 Jemmapes, Paris.
 LA VERRERIE SCIENTI-
 FIQUE, 12, av. du Maine,
 Paris (XV^e).
 28, rue de l'Hôpital-Militaire,
 Lille.
 Lab. L. LEMATTE & G.
 BOINOT, 52, rue La Bruyère,
 Paris.
 74, rue Monge, Paris.
 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
 J. BLANCHARD, Pont-de-Vaux
 (Ain).
 13, r. Cherche-Midi, Paris (VI^e).
 40, r. de Bellechasse, Paris.
 16, av. de la Victoire, Nice.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 SPECIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 110, route de Colmar, Strasbourg.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 (Voir : Oléocidase.)
 41, rue Étienne-Marcel, Paris.
 23, rue Grand-Cerf, Meaux.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 BOUVELOT, 62, rue d'An-
 tibes, Cannes (A.-M.).
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 15, r. Catulienne, St-Denis
 (Seine).
 10, r. St-Antoine, Paris.
 Lab. NATIVELLE, 27, r. de la
 Procession, Paris (XV^e).
 109, rue de Sèvres, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 149, av. des Minimes, Toulouse.

- Actine**
Actinophore
***Actiphos**
Actipyrine
Adénocédran
Adénocynésine
Adénoseptyl
Adiploc
Adipolysine
Adolan
Adolol
***Adonal Vicario**
Adonidine Clin
***Adoverne Roche**
Adragol
Adral
Adréargyre
***Adrénaline Aguetant**
Adrénaline Byla
***Adrénaline Carrion**
***Adrénaline Choay**
***Adrénaline Clin**
Adrénaline Houdé
***Adrénaline Invar**
***Adrénaline Sauba**
***Adrénergol**
***Adrénine Mialhe**
***Adrénocalcine**
***Adrénoides Béral**
Adrénol Cortex
Adrénol Total (Voir Lipoides)
***Adrénoléine**
Adrénolive
Adrénophyséine
Adrénopituine Byla
Adrénol - Styptique Middy
***Adrèpatine Laleuf**
***Adrèphédrine Béral**
Adrialgine
Adrianine
Adrogestill
Adsorgan
***Aéine**
Aérasthmyl Mossion
***Aérocid**
 60, rue Vieux-Pont-de-Sèvres, Billancourt.
 84, av. de Saint-Mandé, Paris.
 42, rue Emile-Deschanel, Courbevoie (Seine).
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 GRUYER, Anizy - le - Château (Aisne).
 10, rue Rabelais, Asnières (Seine).
 50, rue de Turenne, Paris.
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
 45, rue du Marché, Neuilly.
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 17, bd Haussmann, Paris.
 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières.
 Lab. ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
 75, bd de Strasbourg, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 26, av. Observatoire, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 48, av. Théo.-Gautier, Paris (16^e).
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 Montreuil-Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 8, rue Favart, Paris.
 L. ADAM, à Granville (Manche).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 FALVY, 40, rue des Acacias, Paris.
 Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 6, place des Ternes, Paris.
 6, place Clichy, Paris.
 20, r. d'Angoulême, Cognac.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.

- *Aérococyl 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- Aérol 19, rue Drouot, Paris.
- *Aérophagyl 12, bd Saint-Martin, Paris.
- *Æsculase MICHELON, 20, bd Heurte-
loup, Tours.
- *Aéthone 135, rue Boissonnade, Paris.
- Afatyl Lab. ISCOVESCO, 107, rue des
Dames, Paris.
- *Affinex 2, rue des Lombards, Paris.
- Agamétol Lab. SALLE, 4, rue Elzévir,
Paris.
- Agaraffine 58, bd Port-Royal, Paris.
- *Agarase 115, rue de Paris, Boulogne-s.-S.
- Agardol 58, bd Port-Royal, Paris.
- Agarham CATOR, r. Huguerie, Bordeaux.
- Agaricine Clauss GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
- Agarlaxine AURAI, Combronde (P.-de-D.).
- *Agarol 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
- Agaryl Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- Aglo 21, rue Cacheux, Boulogne-sur-
Seine.
- Aglucol PATRICE, à Vichy.
- Agobyl FOUCHERE, Rive-de-Gier
(Loire).
- *Agocholine Zizine 24-26, rue de Fécamp, Paris.
- Agofluine B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-
Tours (I.-et-L.).
- *Agomensine Ciba 103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
- Agonal 28, rue de Seine, Paris.
- Agonoccine 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
- Agonol Cognet 43, rue de Saintonge, Paris.
- *Agorexine 37, av. de la République, Paris.
- *Ago Sels Lab. FOSSET, Montfermeil (S.-
et-O.).
- Agosthénine 2 GIRARD, 3, pl. de l'Hôtel-de-
Ville, Vienne (Isère).
- Agoxyl LETTRY, 69, rue de Sèvres,
Paris.
- *Agozymase 71, av. République, Champigny
(Seine).
- Agrippol SAUBA, Montreuil (Seine).
- *Aigue d'Or 53 bis, bd de la Liberté, Lille.
- Aimaquinase Société Régionale de l'Ouest, à
Rennes.
- Aimhepar PETIT, 29, rue Jean-Perréal,
Lyon.
- *Airoglyce 55, rue Chabrol, Paris.
- Akésol Musi Sarlat (Dordogne).
- *Albu-Coli 84, av. Versailles, Paris (XVI^e).
- Albumar 28, rue Marceau, Angers.
- Albuol Leisy 1 bis, rue Molitor, Paris.
- Albuplast 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
- *Alburénol Lab. ALPHA, Montreux-le-Châ-
teau (Haut-Rhin).

- Alburol**
Albuvore
***Alcacyl Wander**
Alcaderma
Alcadermine
Alcala
Alcalax
Alcalinase
***Alcalinose**
***Alcalisalyl**
Alcaloïdes seuls et
combinés
Alcalovules
Alcalozal
***Alcamfétol**
Alcasalyl
Alcasodine
Aldhylène
***Aldine**
Aldogène Carteret
Aldophène
Aldor
***Alepsal Genévrier**
***Alexime**
Alfane
Algaliment
Algalopol
***Algane**
Algarine Nyrdhai
Algarol
Algatan
Algbiogyl
Algécrine
Algilaxine
Algional
***Algipan Midy**
Algoldine
***Algocratine Lancosme**
Algocrinol
Algocurine
Algodigestine
Algoil du Dr Guiraud
Algolane Poulenc
***Algonal**
- rue Albert-1^{er}, Beaumont-s.-Oise.
 19, rue Jacob, Paris.
 151 bis, rte de Joinville, Cham-
 pigny (Seine).
 47, r. de la Boule-d'Or, Romilly
 (Aube).
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 M. LE FLOCH, à Quessy-Cité.
 (Aisne).
 14, av. Perrichont, Paris.
 23, bd Hoche, Saint-Brieuc.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 35-37, rue Joinville, Laval
 (Mayenne).
 Labor. DULCIS, place Clichy,
 Monte-Carlo.
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 LE FLOCH, Quessy-Cité (Aisne).
 Lab. DOR, 17 bis, av. Parmen-
 tier, Paris.
 GATEL, Evron (Mayenne).
 GLORY, 38 bis, bd Beaumar-
 chais, Paris.
 74, rue de Rome, Marseille.
 37, rue de la Fédération, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 17, avenue République, Auber-
 villiers.
 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
 8, rue Riblette, Paris.
 GERAUDEL, 3, rue Watteau,
 Courbevoie.
 47, rue Colbert, Tours.
 132, rue de Turenne, Paris.
 35, rue de Paris, Clichy (Seine).
 12, r. de la République, Puteaux.
 6, rue des Dames, Paris.
 13-9, rue des Alouettes, Nanterre
 (Seine).
 Lab. Paul FONTANIER, Mou-
 lins-sur-Yèvre (Cher).
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Lab. P. FONTANIER, Mou-
 lins-sur-Yèvre (Cher).
 id.
 67, av. Wagram, Paris (XVII^e).
 3, pl. Interieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 15, rue Cavalotti, Paris (XVIII^e).
 PONCET, à Limoges.
 5, pl. Francheville, Périgueux
 (Dordogne).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.

- *Algophagine** UNIS-SPÈS, 14, r. Demarquay, Paris.
- Algophos** FONTAINE, r. d'Amiens, Compiègne (Oise).
- Algoplast** FOURNIER, Dijon
- Algor** 137 *ter*, Grande-Rue, Roubaix.
- Algosédine** DORDIN, 58, Grande Rue, Harnes (Pas-de-Calais).
- Algosédol** 27, rue Georges-Teissier, Saint-Etienne (Loire).
- Algosodyl** PHARMA-SPÈS, 15, rue Corneille, Lille.
- Algostérine** Oliviero Boulogne-sur-Seine.
- Algovitine** P. FONTANIER, Moulins-s.-Yèvre (Cher).
- Algozone** Lab. Marin de Pontailac-Royan (Ch.-Inf.).
- *Alibourine** Lab. B. E. A., Belfort.
- Alimentine** Mory OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Aliment Mono** 7, rue de Sèze, Paris.
- *Aliment Tinardon** 17, rue Cadet, Paris.
- *Alisal** 191, faub. St-Antoine, Paris.
- Allcock's Porous Plas-
ter** 5, rue de la Paix, Paris.
- *Allergantyl** Miluc L. RAGOUCY, pharm., 2, r. J.-Bara, Paris (VI^e).
- *Alliocardia** 14, rue des Pyramides, Paris.
- *Alliosote** D'HELIOT, Dinard (I.-et-V.).
- *Allisatine** 20, rue Vernier, Paris.
- *Allium Coirre** 5, bd Montparnasse, Paris.
- *Allocaine** Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- *Allochrysine** Lumière id.
- *Allonal** Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Allophaquina** 3, rue Watteau, Courbevoie.
- *Aloïne** Houdé 9, rue Dieu, Paris.
- *Aloplastine** 19, av. d'Orléans, Paris.
- *Aloysine** GOUZENE, 139, rue de Paris, Pantin.
- *Alsodine** Lab. B. C. L., 29, faub. de Bourgogne, Orléans.
- Altsara** 151, rue Saint-Maur, Paris.
- *Alucol** Wander 151 *bis*, rte de Joinville, Champigny (Seine).
- *Alunozal** SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Alvoricine** id.
- *Alzine** 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- Amalariol** JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- Amandol** 5, av. des Tilleuls, Paris.
- *Ambocurine** 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
- Amborhinol** 276, rue Lecourbe, Paris.
- Ambrine** 48, bd La-Tour-Maubourg, Paris.
- *Amibiasine** 69, rue de Wattignies, Paris.

- Amicrargol**
- * **Amidal**
Amidon Planche
 * **Amiflorine**
 * **Aminoléine**
 * **Aminophylline**
- Amino-Sel Byla**
 * **Amiphédrine**
 * **Amiphène**
- Amipyrine**
Ampélamine
 * **Amphomuth**
- * **Amphoprophyl T. A. B.**
Ampho-Pulvérisateur
 Ronchèse
 * **Ampho-Quintivaccin**
Amphormone
- * **Amphostabyl**
 * **Amphosthène**
Ampho-Tablettes Ron-
 chèse
 * **Amphotonyl**
 * **Ampho-Vaccins** de
 Ronchèse
 * **Ampolases-opolases**
 (Voir Opothérapie
 E. Vergelot)
Ampoules Aguetant
Ampoules antalgiques
Ophidios
 * **Ampoules Anti-H.**
Ampoules de benzoate
et bi-iodure Hg. Vi-
gier
Ampoules bi-iodure
Hg. Midy
 * **Ampoules Boissy**
Ampoules Cantonnet
- Ampoules Cardio-Cam-**
phre (simple et spar-
téiné)
Ampoules Churchill
Ampoules de Digalène
- Ampoules Dubé**
Ampoules Egralène
Brisson
Ampoules « Gay-Lus-
sac »
Ampoule huile soufrée
Brisson
- AMICROS, 177, r. de Courcelles,**
 Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
 72, r. de Bagneux, Montrouge.
 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 6, place Jean-Jaurès, Montrouge.
CARRON, 69, rue Saint-Cloud,
 Clamart (Seine).
 113, bd Voltaire, Paris.
 7, r. de l'Arbre-Sec, Lyon.
RONCHÈSE, 21, bd Riquier
 Nice.
 id.
 id.
 id.
 4, av. M. Berteaux, Poissy
 (Seine-et-Oise).
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 21, bd Riquier, Nice.
LERSAM, 92, bd Murat, Paris.
 21, bd Riquier, Nice (A.-M.).
 163, rue de Flandre, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 67, rue de Grenelle, Paris, (VII^e).
 160, av. d'Italie, Paris.
VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
velle, Paris.
 67, av. Wagram, Paris.
SOUDAN, 48, r. d'Alésia, Paris.
BELIERES, 19, rue Drouot,
 Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 12, rue Castiglione, Paris.
HOFFMANN LAROCHE & C^{ie},
 10, rue Crillon, Paris.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 1, rue de la Martinière, Lyon.
 157, rue Championnet, Paris.

- *Ampoules de Pantopon « Roche »
 *Ampoules de Spasmalgine Roche
 *Ampoules névrosthéniques Dausse
 *Ampoules Ophidios
 Ampoules Optima
 Ampoules Pinceaux
 *Ampoules Reipar
 Ampoules Romon
 Ampoules Sulfa
 Ampoules Suractives Leisyn
 Ampoules Sigmuth
 Ampoules d'Uriage
 Ampoules V.-E. Doumer
 Amunine
 *Amybdine
 Amyliodine
 Amylobromine
 *Amylodiastase Thépénier
 Anacamphre
 Anacidase
 *Anaclasine Ranson
 Anadiposine
 *Analgénine
 *Analgésol
 Analgine dentaire
 Analgol
 *Analpyrine
 *Anapeptone Vassal
 Anaphylène
 *Anapylol
 *Anaquintine Lescène
 Anasectol
 Anatoxine diphtérique
 Anaural
 Anaxeryl
 Androbion Netter
 *Androcalcion
 HOFFMANN LAROCHE & C^{ie},
 10, rue Crillon, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 67, rue de Grenelle, Paris (VII^e).
 Gde - Rue - au - Bois, Bruxelles.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 DRAPIER, Rethel (Ardennes).
 13, av. de Ségur, Paris.
 Cauterets (Htes-Pyrénées).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
 15, Champs-Élysées, Paris.
 BOMEL, à Annonay (Ardèche).
 BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 44, av. Pasteur, Courbevoie (Seine).
 163, rue de Flandre, Paris.
 id.
 12, rue Clapeyron, Paris.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 MEUNIER, Auxerre (Yonne).
 96, rue Orfila, Paris.
 FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 24, rue des Plantes, Paris (XIV^e).
 FANDRE, 4, faub. Stanislas, Nancy.
 Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 M. BERTRAND, Nomexy (Vosges).
 28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
 Lab. HYGIO-DONTIS, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.
 DEBRUÈRES, 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 Institut Pasteur, 22, rue Dutot, Paris.
 Lab. BARTHÉLEMY, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rh.).
 BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
 100, bd Sébastopol, Paris.
 CORTIAL, 7, r. de l'Armorique, Paris.

- Androcrinol**
Andropolycrinol
***Androsthénol**
***Androstine Ciba**
***Androvar**
***Androvules**
Andryl Vicario
***Anégrine Rivier**
Anéo Leisyn
Anestile Bengué
Aneuvryl
***Anexol**
***Angéiol**
***Angihormol**
Angiocholine
***Angiolymphhe**
***Angiosédine**
Angiosthénine
***Angioxyl**
***Angoral**
Angostyl
Angyl
Anhémor
***Anictérol**
***Aniodol**
***Anoïde**
***Anorexyl**
Anoxyne
Anozyl
Antacidyl
***Antalgol Dalloz**
***Antalgyl**
***Antasthène**
Antasthme Cibrand
***Antélobine Byla**
***Antéparsine Grémy**
***Anthema**
- Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 DEBAT, 60, rue de Monceau Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 139, rue Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine).
 139, rue Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine).
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, passage Morel, Montrouge (Seine).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 47, rue Blanche, Paris.
 71, rue du Fort, Aubervilliers.
 DROUET & PLET à Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).
 10, r. du Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 4 bis, r. Hébert, Courbevoie.
 81, rue de la Roquette, Paris.
 5, av. des Tilleuls, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 CHAMBON, 5, pl. Francheville, Périgueux, (Dordogne).
 D^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly, Nanterre.
 44, av. Pasteur, Courbevoie (Seine).
 LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris (1^{er}).
 3-9, r. des Alouettes, Nanterre (Seine).
 116, bd Haussmann, Paris.
 6 bis, rue Belloni, Paris (XV^e).
 GUERET, 23, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret).
 D. DEROZIER, 24, rue Jardel, Bordeaux.
 DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).
 13, bd La Chapelle, Paris.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 199, av. Victor-Hugo, Aubervilliers.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

- Anthiomaline**
Anthracalcine
 ***Anthraseptol**
Anthraxone
Anthylline
 ***Antialgos Christiaens**
Anti-anémique F. F.
 ***Anti-Asthénie Lauriat**
 (Ex-Lauriatol)
Anti-asthmatiques du
Dr Cléry
Anti-asthmatique du
Dr Hallay
 ***Antiasthme Bengalais**

Anti-asthme Noirot
 ***Anti-Asthmine**
Antibilieux Fuzor
Antibronchitique

 ***Anti-diabète H**

 ***Anti-dermite**
Antidiabétique Midy
 ***Antidiabétique Monavon**
 ***Antidiabétique Requis**
Antidolor
Antidotase
Antidote-malaria §
 ***Antidouleur Barbessou**
Antiépileptique de
Liège
Antifébra
Antifluor
Antifuronculeux

Antigastralgique
Winckler
Antigel

Antigélures
 ***Antigénines**
Antiglaire Forézen
Antiglairol
Antigonol
Antigrippal Demay
 ***Antigrippine Midy**
Antikamnia

Anti-kokytine
Antimucose Mariani
 ***Antimycose**
 ***Antinéase**
- SPECIA**, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
SAUBA, Montreuil.
BAUDE, Saint-Aubert (Nord).
 23, rue du Caire, Paris.
 88, rue Duhesme, Paris.
 4, rue Colbert, à Reims.
 163, rue de Flandre, Paris.
 31, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine).
Lab. du Dr CLÉRY, 53, bd Saint-Martin, Paris.

 36, rue Eugène-Carrière, Paris.
FAGARD, 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
Vesoul, (Haute-Saône).
 50, rue Nationale, Lille.
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
M. LOISEAU, Pharm. Spécial., 22, fg St-Michel, Angers.
Lab. ALPHA, Montreux-lé-Château (Haut-Rhin).
 4, rue de Metz, Toulouse.
 67, av. de Wagram, Paris.

 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 "ANGLA", Monte-Carlo.
 36, Quai Fulchiron, Lyon.
 10, allées Damour, Bordeaux.

 48, rue Claude-Lorrain, Lille.
 132, rue de Turenne, Paris.
 26, r. des Petits-Champs, Paris.
DOMERGUE, Agen (Lot-et-Garonne).
MIDY & Co, 67, av. de Wagram, Paris.
DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 62, rue Marengo, St-Étienne.
CASTELLANE, Morteau (Doubs).
 26, r. des Petits-Champs, Paris.
 42, rue des Martyrs, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 41, bd Haussmann, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
SALAVERTE, Ste-Foy-la-Grande (Gironde).

Antipaludique	COUTURIEUX, 18, av. Hoche, Paris.
Antipaludique Lumière	45, rue Villon, Lyon.
Antiphi	CAPIN, Roquefort (Landes).
*Antiphlogistine	11, rue du Petit-Parc, St-Maur (Seine).
Antiphlogosine	126, rue de la Pompe, Paris.
Antiphymase Meurice	Union chimique Belge, 61, av. Louise, Bruxelles.
Antiphymique Vadam	111 bis, rue de Turenne, Paris.
*Antipiol	8, av. Walkanaer, Nice.
Antipsorine	14, r. A. Briand, Levallois (Seine).
Antipur	121, av. de St-Ouen, Paris.
Antipyrine effervescente Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Antipyrine U. R.	21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Antirrhoïde Bélières	19, rue Drouot, Paris.
*Antisciatique	CHAMBON, pl. Francheville, Périgueux.
Antiseptinol	F.C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
Antiseptique Nenita	58, rue de Maubeuge, Paris.
*Antiseptoma	L. ROBERT, Pharm. à Niort (Deux-Sèvres).
Antispasmyl	30, bd Raimbaldi, Nice.
Antisuce	FERCOCO, La Varenne-St-Maur (Seine).
Antiurique de Contréxeville	5, avenue Victoria, Paris.
*Antivirus	La Biothérapie, 5, rue Paul-Barruel, Paris.
Antixénol	74, rue de Lourmel, Paris (XV ^e).
Antodyne Poulenc	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antonal	Lab. CARESMEL, 2, qu. Paul-Bert, Tours.
Anturic Labesse	38, rue des Lices, Angers.
Anucalm	21, rue de Lyon, Paris (XII ^e).
Anuline	10, rue de l'Union, Clichy.
*Anurique Duplex	DREYER-DUFER, Nogent-sur-Marne.
*Anusol	13, r. Pagès, Suresnes et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
Anytal Brisson	157, rue Championnet, Paris.
*Anxiol	FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
Anxiosédine	74, fg d'Ambrail, Épinal.
Anxyl	4, av. Maurice-Berteaux, Poissy (Seine-et-Oise).
Anytal Brisson	157, r. Championnet, Paris.
*Aortol	16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris.
Apaisyl	133, rue Lecourbe, Paris.
Apaludol	AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
*Aphloïne	61, av. Philippe-Auguste, Paris.
*Aphosal	48 bis, av. Mozart, Paris.
Apiol	PALC, Messigny (Côte-d'Or).
*Apiol Tanit	ROUANET, Antibes (Alp.-Mar.).

*Apioline Chapoteaut	8, r. Vivienne, Paris.
*Apivène	39, r. Claude-Bernard, Paris (V ^e).
Aplexil	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Apocynine du D ^r Des-champs	LALEUF, 51, rue Nicolo, Paris.
Appareils faradiques	LA VERRERIE SCIENTIFIQUE, 12, av. du Maine, Paris (XV ^e).
Appareils galvaniques	id.
Appareils galvano - faradiques	id.
Appareils de haute fréquence	id.
*Appareil Lancelot	100 ter, av. de St-Mandé, Paris.
Appetonyl	27, r. Georges-Teissier, Saint-Étienne (Loire).
*Appetyl	37, av. de la République, Paris.
Aprol Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Apsophol	40, rue des Carmes, Orléans.
Appyrexine Optima	OPTIMA, 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Aquasoluble	16, rue Ficatier, Courbevoie.
*Aquintol	Lab. du D ^r MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Arachise	Lab. BÉLIÈRES, 19, r. Drouot, Paris.
*Arapal	La Biothérapie, 5, rue Paul-Barruel, Paris.
Arcanan	CRUET, 13, rue Miollis, Paris.
Arcésine Trouette-Perret	61, av. Philippe-Auguste, Paris.
*Arcica	84, rue Rochechouart, Paris.
Ardogène	9, rue du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).
*Argent-Boulard	82, av. de Suffren, Paris (XV ^e).
Argent colloïdal élec-trique	MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Argent colloïdal Nyr-dhal	12, r. de la République, Puteaux.
*Arg-Eph	63, av. Wagram, Paris (XVII ^e).
*Argolacta	140, rue Lamarck, Paris.
Argolion	18, avenue Hoche, Paris.
Argolène	Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Argy	133, rue Lecourbe, Paris.
*Argybil	LANCOSME, 71, av. V.-Emma-nuel-III, Paris.
Argycarbonate	96, rue Lafayette, Paris (X ^e).
*Argycuprol	4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
*Argyrescine Mars	Guérande (L.-Inf.).
Argyrex	7, rue N.-D.-des-Champs Paris (VI ^e).
*Argyrine	26, rue Chaptal, Paris (IX ^e).
*Argyrophédrine	20, av. Jean-Jaurès, Suresnes (Seine).
Arhémapectine Gallier	38, bd Montparnasse, Paris.

- *Arhéol Astier
 *Arhine Lambiotte Fr.
 Arhinoline
 *Aristargol
 Aristoplast
 *Aristoplastic (aristo-
 plats élastique)
 *Arkhébios
 *Armanite
 Armosine
 Aromalt
 Aromoka R. U. F. É.
 *Arquéritol
 *Arrhéнал Adrian
 Arrhéналитine Bureau
 Arrhéniques Clin
 Arrhénomartiol Clin
 Arrhéno-Splénine
 *Arrhénuclène Bergevin
 Arrow-root
 Arsallyl
 *Arsaminol Clin
 Arsébényl Meurice
 Arsécrinol Lersam
 Arsenic Organique
 Glasser
 *Arséniode
 *Arsénobenzènes Clin
 Arsénobenzol Billon
 Arséno-fer Henry
 Arsénogéyl
 *Arsénomyl
 *Arsénos-Solvant
 Arsétonyl
 *Arshémo-Fer-B
 Arsiodyle
 Arsiquinine Lemaître
 Arsi-quinoforme
 Arsi-Strychnal Lon-
 guet
 Arsocléine
 Arsoplasmine
 Arsyncodyle Leprince
 Arsyène Roche
 42, rue du Dr-Blanche, Paris.
 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 10-12 r. de la Fraternité, St-
 Mandé.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 1 et 3, Villa Saint-Mandé, Paris.
 ROUX, 58, rue de Maubeuge,
 Paris.
 KARCHER, 139, rue des Pyré-
 nées, Paris.
 54-56, av. République, Paris.
 LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, rue Mathilde, Courbevoie,
 à Châteaudun (Eure-et-Loir).
 BLOCH, Tomblaine, près Nancy
 (M.-et-M.).
 11, square Marie-Louise,
 Bruxelles.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 Union chimique Belge, 61, av.
 Louise, Bruxelles.
 92, bd Murat, Paris.
 COIRRE, 5, bd Montparnasse,
 Paris.
 BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
 CLIN, 20, rue des Fossés-St-
 Jacques, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 RAVAUD, 6, pl. de Breteuil,
 Paris.
 MOUNEYRAT, Villeneuve-la-
 Garenne.
 19-21, rue Van-Loo, Paris.
 CALMEL-DOMERGUE, 20 bis,
 rue Gravelotte, Toulouse.
 H. BENOIT, Poligny (Jura).
 CHASSAIGNE, Ruffec (Cha-
 rente).
 60, rue E.-Dolet, Malakoff
 (Seine).
 37, rue Pajol, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 CHATELAIN, Niort (Deux-
 Sèvres).
 52, rue La Bruyère, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.

- Arsynal Legrand**
Arsysérum
Artérase
 ***Artériocrinol**
 ***Arterion Vincardi**
 ***Arteriolex (ex Miné-
 ralogène)**
 ***Artério-Phan**
 ***Artérioveinine**
Artérol
Arthricétol
Arthrident
Arthridol
Arthrila
 ***Arthrilyse**
Arthri-sel
Arthritose
Arthrizol
Arthrolyl
Arthrosédol
Artichaut Rosa
 ***Articholine**
 ***Artobyl**
Artoradine
 ***Artrex-Croz**
 ***Artrocolchine "C"**
 ***Arvensyl**
Arzonil
 ***Ascéine**
 ***Asciatine**
Ascle
Asclérogénol
Asclérosol
 ***Ascoléine Rivier**
 ***Aseborhal-Nador**
 ***Aséphéine**
**Aseptampoules Du-
 mesnil**
Aseptobiline
Aseptocarbine
Aseptoline Freysse
- GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 GILBERT, 6, rue du Laos,
 Paris.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 14, av. Georges-Clemenceau,
 Nice.
 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
 5 bis, bd des Italiens, Paris.
 121, av. St-Ouen, Paris.
 PESLIN, Planchez du Morvan
 (Nièvre).
 20 bis, rue Gravelotte, Tou-
 louse.
 FERCOCO, La Varenne-St-
 Maur (Seine).
 D^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly,
 Nanterre.
 LYONS, 30, rue Monge, Paris.
 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
 22, rue Morère, Paris.
 La Biomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
 DELAUNAY, Joué-lès-Tours
 (Indre-et-Loire).
 11, rue Lafayette, Paris.
 PHARMA-SPÈS, 15, rue Cor-
 neille, Lille.
 11, rue Roger-Bacon, Paris.
 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
 DAGONNOT, pl. de l'Hôtel-de-
 Ville, Cannes (A.-M.).
 Lab. de Radiumthérapie, 25, r.
 Vaneau, Paris.
 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
 26, rue Gay-Lussac, Paris.
 GERDA, 163, bd Croix-Rousse,
 Lyon.
 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 3, pl. Intérieure-St-Michel, Tou-
 louse.
 11, quai St-Clair, Lyon.
 10, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 25, rue de Tocqueville, Paris.
 20, rue des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 SCHMIDT, 71, rue Sainte-Anne,
 Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).

***Aseptone**

Aseptopoudre
Aseptoradol

***Aseptorhine**

Aseptovules
Asepturine

Asepturol
Asfarol
Asm

Asmocrine

Aspiphan

Aspirine Lafran

Aspirine U. R.

Aspirine Vicario

Asquirol Poulenc

***Astasol Douetteau**

Asthma

Asthmacidine

Asthmalène

Asthmapepton

Asthmaphédrine

Asthmasédine**Asthmatyl*****Asthmédrine**

Asthmenthol

***Asthmo-Actine**

Asthmolène

Asthmolysin

Asthmor

***Asthmosine**

Asthmyl

Asthmylose

Astmavol Reys

Asuorol

Atemnol

***Atens**

Atensyl

Athérolysine

Atihal

Atlasantol

***Atocrazine**

Lab. MOULIN, 50, r. de République, Puteaux (Seine).

46, rue de Rome, Marseille.

Établ. LABORADIUM, 33, rue Saint-Jacques, Paris.

21, rue de Lyon, Paris.

46, rue de Rome, Marseille.

30, rue Saint-Jacques, Namur (Belgique).

86, bd Port-Royal, Paris.

14, av. Perrichont, Paris.

THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).

122, Champs-Élysées, Paris.

26, rue Ste-Claire, Mulhouse.

8, rue de Prague, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

17, bd Haussmann, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

20, fg St-Honoré, Paris.

94, rue Michelet, Alger.

OPTIMA, Gde-Rue au Bois, Bruxelles.

3, rue de Vouillé, Paris.

MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).

Lab. OPTIMA, 78, Gde-Rue-aux-Bois, Bruxelles.

Lab. H. SCHÉHADÉ, 17, rue Chomel, Paris (VII^e).

38, rue du Louvre, Paris.

19, av. Secrétan, Paris (XIX^e).

33, fg Montmartre, Paris.

BERTHON, à Dornes (Nièvre).

3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).

HOFSTETTER, 6, rue des Cigognes, Strasbourg.

88, av. J.-B. Clément, Boulogne-sur-Seine.

L. TATTEVIN, 3, rue E.-Burgault, Vannes.

ROUSSELET, 9, bd de la République, Noisy-le-Sec (Seine).

2, rue Lesdiguières, Paris.

21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).

163, bd Croix-Rousse, Lyon.

126, rue de la Pompe, Paris.

26, rue Gay-Lussac, Paris (V^e).

DORANTOWICZ, 17 bis, av. Parmentier, Paris.

41, av. Joffre, La Garenne (Seine).

Lab. Demasles, Vienne (Isère).

MARONNEAU-MOREL, 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

14, rue des Guillemites, Paris.

- Atolysan
 156, r. des Fauvelles, Courbe-voie.
 *Atomine
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 Atonos
 97, r. J.-d'Arc Rouen (S.-Inf.).
 Atophan Cruet
 13, r. Miollis, Paris (XV°).
 Atophanyl
 Lab. CRUET, 13, rue Miollis, Paris (XV°).
 *Atoquinol Ciba
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 *Atospirine
 19, rue du Bac, Paris.
 Atoxyl Poulenc
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Atrabiline Gory
 JOOSS, Montreuil (Seine).
 Atropophédrine
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 Attaches Néoplastex
 71, fg St-Martin, Paris (X°).
 *Atural
 10, rue de Strasbourg, Paris (X°).
 *Aubéliode
 60, rue Nationale, Castelnau-dary (Aude).
 Aubémone
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 *Audigénine
 VAILLANT, 19, r. Jacob, Paris.
 Auriculine
 21, rue de Lyon, Paris.
 Aurion
 18, av. Hoche, Paris.
 *Aurixéma
 2, rue Mélingue, Paris.
 Autocalor
 14, av. Perrichont, Paris.
 Autogénol
 57, rue Edgar-Quinet, Nantes.
 Auto Inhalation Legras
 28, rue Monge, Dijon.
 Auxergyl
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Avantol
 GOUIN, 20, rue des Écoles, Paris.
 Avistyl
 11, rue Lepic, Paris.
 Axonal
 20, r. H.-Martin Vanves (Seine).
 *Axyol
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 *Azama
 8, rue St-Martin, Paris (IV°).
 *Azigol
 Thévenot, 21, rue des Roses, à Dijon.
 *Azotyl
 25, rue Jasmin, Paris.
 *Azufrol
 18, av. Hoche, Paris.
 *Azym
 PARET, 28, r. Guibal, Marseille.

B

- *Babeurre Dardelet
 Bonnard (Yonne.)
 *Babeurre Guigoz
 2, 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
 *Babeurre Lactella
 à Tourcoing.
 Babeurre Molard
 25, cours Lafayette, Lyon (VI°).
 *Babeurre sec Nestlé
 6, av. César-Caire, Paris (VIII°).
 « Élédon »
 *Babeurre Nutricia
 1, bd Saint-Martin, Paris.
 *Babeurres Carrion-Laguel
 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.

Babeurres Lafaye*Babysanine****Babutyrose****Baby-Bala****Babydermine****Baby-Ossine****Bacilacrine****Bacilactine****Bacillactine Nutricia****Backérine****Bacté-Coli-Phage****Bacté-Dysentéri-Phage****Bacté-Intesti-Phage****Bacté-Phages****Bacté-Pyo-Phage****Bacté Rhino-Phage*****Bacté-Ricyl****Bacté-Staphy-Phage****Bactioxylene*****Bacturyl****Bagnolax*****Bains Bagnor radioactif****Bains Brimox****Bains carbogazeux de
Royat*****Bains carbogazeux
Wolo*****Bain Carré****Bain Chrysocadique
Fisch****Bain de Royan Varech****Bain de bouche du
Dr A. Boll*****Bains de Bouche à la
Duna-caine*****Bain de bouche Estève****Bain Fagard (Sulfador)*****Bain Flévar*****Bain Salvia****Bains médicamenteux****Bainsulphium****Bakolyse*****Baldisedan*****Ballotyl*****Balmiga****Ferme de « La Faye ». Marlihes
(Loire).****37, r. du Veil-Abreuvoir, Rou-
baix (Nord).****59, bd Gambetta, Tourcoing.****BRICHARD et fils, Bar-le-
Duc (Meuse).****14, av. Perrichont, Paris.****Billy-Montigny (Pas-de-Calais).****50, r. de la République, Puteaux.
id.****142, rue Fransman, Bruxelles.****4, pl. des Vosges, Paris.****37, rue de Bourgogne, Paris.****id.****id.****id.****id.****37, rue de Bourgogne, Paris.****72, r. du Commerce, Paris (XV^e).****37, rue de Bourgogne, Paris.****15, rue d'Argenteuil, Paris.****39, rue Fondaudège, Bordeaux.****MORELLET, Bagnoles - de-
l'Orne.****SCIENTIA, 21, rue Chaptal,
Paris (IX^e).****Lab. BRIMONT, 74, r. Blanche,
Paris.****Royat (Puy-de-Dôme).****Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).****LANCOSME, 71, av. Victor-
Emmanuel-III, Paris.****Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).****Labor. Marin, Pontailac (Ch-
Inf.).****7, av. du Doyenné, Lyon.****17, rue de Berri, Paris.****187, rue de la Croix-Nivert,
Paris (XV^e).****44, rue d'Aguesseau, Boulogne-
sur-Seine.****22, rue de la Sorbonne, Paris.****139, av. Émile-Zola, Paris.****Dr FAYES, 199, r. St-Denis,
Paris.****157, rue Championnet, Paris.****122, rue du Cherche-Midi, Paris.****133, rue Lecourbe, Paris.****113, bd Voltaire, Paris.****127, bd Saint-Michel, Paris.**

- Balnéradol**
- *Balsaformine**
- Balsaine
Balsamiode
***Balsamol Lescène**
- *Balsamorhinol**
- Balsaniodol
Balsapector
- *Balsoforme**
- *Balsofumine**
- *Balsorhine (Huile, Capsules, Pommade)**
Balsosantol
- *Bandes crêpe Néo-plastex**
- *Bandes Mérinos Bébé**
Bandes ulcérophiles
Nozan
- *Barbiflorine**
- *Bardane stabilisée**
Dausse
- Bardanyl**
Barkyl
Baromyl
- *Barytol**
- *Baryx-Colloïdal**
- *Baryxine**
- *Basedowine**
- *Basmyl**
- *Baume Adol**
- Baume Agerca
Baume Aparé
- *Baume Aroma**
- *Baume Bengué**
- *Baume D^r Baissade**
- Baume D^r Blancard
Baume Boeglin
- *Baume Coqueluchyl**
- *Baume Crésa**
Baume Dalet
Baume Darnocel
- *Baume Delacour**
Baume de Dentition
Baume de la Faculté
- LABORADIUM, 33, rue Saint-Jacques, Paris.
42, r. Émile-Deschanel, Courbevoie (Seine).
156, av. Victor-Hugo, Paris.
19, cours Morand, Lyon.
à Livarot (Calvados) et 58, r. de Vouillé, Paris.
Lab. FIDES, 14, r. de la Comète, Paris.
10, rue Washington, Paris.
15, rue Catulienne, Saint-Denis (Seine).
SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Lab. DEBOUDAUD, 22, rue Turbigo, Paris.
- id.
39, r. Fondaudège, Bordeaux.
71, fg Saint-Martin, Paris.
3, rue des Reculettes, Paris (III^e).
6^{ter}, rue Voltaire, La Garenne-Colombes.
"ANGLA", Monte-Carlo.
4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
30, rue Bobillot, Paris.
2, rue Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin.
184, rte de Genas, Lyon (3^e).
1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).
id.
GALLIER, 38, bd Montparnasse, Paris.
A. BOUCHAND, Melle (Deux-Sèvres).
L. GIROUD, 78, cours de la Liberté, Lyon.
30, rue Bobillot, Paris.
27, bd de Courtais, Montluçon (Allier).
1, pl. Victor-Hugo, Paris.
16, rue Ballu, Paris (9^e).
Saint-Loup, près Marseille (Bouches-du-Rhône).
114, av. Jean-Jaurès, Paris.
26, rue Ste-Claire, Mulhouse.
38, rue du Louvre, Paris.
14, r. des Guillemites, Paris.
24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
HUBERT, Romorantin (L.-et-C.).
56, bd Péreire, Paris.
32, fg Montmartre, Paris.
3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.

Baume de l'Echalp Albert	Lab. GÉHA, Port-de-Bouc, près Marseille.
Baume Dolora	50, rue de la République, Pu- teaux.
Baume du Dr Heder	36, rue Eug.-Carrière, Paris.
Baume Dulac	55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
*Baume Duret	ROUTIER, 20, rue Saint- Lazare, Paris.
Baume Flozo	8, rue St-Martin, Paris (IV).
Baume Fuba	37, rue des Lois, Toulouse.
Baume Géluroi	35, av. de Versailles, Paris (XVI ^e).
Baume du Dr Gigon	25, bd Beaumarchais, Paris.
Baume Heptalgine	J. BERTHOUMEYROUX, Souillac (Lot).
Baume Iki	MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
*Baume Kalendol	116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
Baume Kamol	6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
*Baume Lartigol	78, fg Saint-Denis, Paris.
Baume Lorol	ZEDAIRE, à Grenoble.
Baume Marta	BONNAURE, à Alès (Gard).
*Baume de la Mater- nité	7, rue Galvani, Paris.
Baume Merveilleux	RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
Baume Oco	87, rue Lafayette, Paris.
Baume Oculaire Alpha	Montreux-le-Château (Ht-Rhin).
*Baume Panthésine	20, rue Vernier, Paris.
Baume Pélévine	15, bd des Batignolles, Paris.
Baume de Port-Royal	MOREL, 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
Baume Py	58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
Baume des Pyrénées	Chalet du Réve, Bayonne.
*Baume Rafax	4, rue Boulard, Paris (XIV ^e).
*Baume Rhodia	SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Baume Robernard	Phar. Moderne, r. Victor-Hugo, Mauléon-Soule (B.-Pyrénées).
*Baume Robur	72, av. Thiers, Le Mans.
Baume Saint-Antoine	4, avenue de Bayonne, Pau.
Baume Saint-Roch	place Forbin, Aix-en-Provence.
*Baume Selenia	49, rue de Bitché, Courbevoie.
Baume du Dr Serin de Gaillac	10, allées Damour, Bordeaux.
Baume Suelta	16, rue Henri-Regnault, Cour- bevoie.
Baume Tanex	DEBRUÈRES, 66, rue de Paris, Poissy (S.-et-O.).
*Baume Thomas	33, fg Montmartre, Paris.
Baume Valentin-Chail- lot	10, Square de Châtillon, Paris.
Baume Vérandy	G. LAURENS, Pharm., Aix-en- Provence.
Baume Victor	PELAUD & BAYLE, La Cour- tine (Creuse).
Baume Zénopal	Miribel (Ain).

- *Baumix Ph. DELAPRÉE, Mortagne (Vendée).
- *Baumolacpinine Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- *BB Derm Mars Guérande (Loire-Inférieure).
- *Béatol 25, rue Jasmin, Paris.
- Béarnyl à Salies-de-Béarn.
- *Bécalciol « Mètère » 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne- (Seine).
- *Bédénal LAURENÇON et Cie, Ville- franche-sur-Saône (Rhône).
- Beef Lavoisier Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Beef Lavoix 5, av. Victoria, Paris.
- *Begessol 57, bd A. Briand, Champigny (Seine).
- Belanesie 47, rue de Bretagne, Paris (III^e).
- *Belcarmine 33, Gde-Rue, Besançon.
- *Belhémine Lab. de Sérothérapie, 3, im- passe Adam, Boulogne-s.-Seine.
- *Belladenal 20, rue Vernier, Paris.
- Belladoforme 14, av. Perrichont, Paris.
- *Belladone Dausse 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- *Bellafofine 20, rue Vernier, Paris.
- *Bellasodine 13, Gde Rue, Herblay (S.-et-O.).
- *Bellergal 20, rue Vernier, Paris.
- *Bellinguol 3, pl. Intérieure-St-Michel, Tou- louse.
- *Bemax 4^{ter}, rue Barbès, Courbevoie (Seine).
- Bémecé 21, rue Violet, Paris.
- Benedictus (Produits) 17, rue Duguay-Trouin Paris.
- *Bensamine 72, quai Jemmapes, Paris.
- Benzethanopneumol 84, r. du Commerce, Villeneuve- le-Roi (S.-et-O.).
- Benzhermyl 36, q. Fulchiron, Lyon.
- Benzoate de Folliculine BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Benzoate Le Perdriel 11, rue Milton, Paris.
- Benzoate de Naphtol FRAUDIN, 4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
- *Benzo-Bismuth Millot 177, r. de Courcelles, Paris.
- Benzobromine HÉRAULT, 14, pl. de l'Hôtel- de-Ville, Beauvais.
- Benzocalyptol 213, rue St-Honoré, Paris.
- Benzocarbène FOUCHÈRE, Rive-de-Gier (L.).
- *Benzoflorine Julien 105, rue de Rennes, Paris.
- *Benzo-Gynœstryl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- *Benzo-Gynœstryl 5 id.
- *Benzo-iodhydrine 10, Passage Morel, Montrouge (Seine).
- Benzolactine 38, rue Albouy, Paris.
- Benzo-Lactol 10, rue du Parc-Royal, Paris.
- Benzo - phosphine 4, rue Colbert, Reims.
- Christiaens 25, rue de Calais, Dunkerque.
- *Benzoquinol 35, rue Boissonade, Paris.
- Benzo-Ringyl Lab. MARTINIE, 62, av. Ph.- Auguste, Paris.
- *Benzosulfène

- Benzothymol**
Benzyanyl
***Benzylcalcium**
Benzylol
Berkendyl
Berralgine
Béryline du Dr Fayès
***Bétul-Ol Midy**
***Bévita**

***Bévitine**
***Bexinine**
Bexoforme
Bi-98

***Bi-Actival**
Bianterol

Biarsol

***Biazan**
Bi-Carbène

Bichlorhydrol
***Bi-Ci-Pa**

***Bi-Citrol Marinier**
Bicolyre
***Bières des Nurses**
Bière Fanta (nourrices)
Bifermets lactiques
stables
Bifolarsine
Bigonor
Bigynol
Bi-Iodural Novat
Bi-iodure Cros
Bi-iodure Domergue
Bi-iodure Midy
Bi-iodure Souffron
Bikréol
***Bilaxyl**
Bilentéric
Bilexabol
***Biléyl Fournier**
***Biliase Raby**
***Biliboldo**

***Bilicrinol**
***Bilifluine**

***Bilifluol**

Bili-Magnétol

***Biliogastrine Chevillon**
- 50, r. de la République, Puteaux.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 37, rue Galilée, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 NOÏROT, Vesoul (Haute-Saône).
 199, rue Saint-Denis, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 SANAVITA, 7, rue Fontaine-
 Delsaux, Lille.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 L. COLIN, 19, r. St-Jean, Caen.
 13, rue Beudant, Paris.
 MARONNEAU-MOREL, 156, r.
 des Fauvelles, Courbevoie.
 49, r. du Château-d'Eau, Paris.
 Lab. chimie physiologique, 37, r.
 Tivoli, Bordeaux.
 Lab. ORRILLARD, 245, r. de
 Vaugirard, Paris.
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 25 bis, qu. de la Bibliothèque,
 Lyon.
 14, av. Perrichont, Paris.
 P. MOISIÈRE, Pharm., 62, r.
 du Gros-Noyer, Ermont (S.-
 et-O.).
 23, rue Ballu, Paris.
 276, rue Lecourbe, Paris.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 77, rte d'Orléans, Montrouge.
 98, r. J.-Maillotte, La Made-
 leine (Nord).
 47, rue de Bretagne, Paris (III^e).
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 54, rue de Paris, Charenton.
 BOMEL, à Annonay (Ardèche).
 12, rue de Nice, Paris.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 67, av. de Wagram, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 7, rue Biscornet, Paris.
 à Asnières (Seine).
 Lab. BARTHÉLEMY, pl. For-
 bin, Aix (B.-du-R.).
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 Lab. STÉNÉ, 14, rue des Guil-
 lemites, Paris (IV^e).
 44, r. M.-Sembat, Aulnay-s.-Bois
 (S.-et-O.).
 M. A. ROUX, 58, r. de Mau-
 beuge, Paris.
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).

- Biliol Bouty
 Biliose Vichy
 Bilirhéine
 *Bilivaccin
 *Bilivaccin Anticolibacillaire
 *Billabstine
 Billeros
 Billirgyl
 Bilogène Reys
 Bilolive
 Bil Soda
 Biminéral Reynaud
 *Binidia
 Binol Roger
 *Binoxol
 *Biocalcium
 *Biocalcose
 Biocalmine
 Biocatalyseur-Rolland
 *Biocéane
 Biocholine
 *Biocrina
 Biocrine
 *Biodarcine
 Bioderma
 Biodermyl Monal
 *Biodynamine
 Biodynol
 *Bioélixir
 *Bioentérase
 Bioforcil
 Biogastrine
 *Biogénol
 *Biolactyl Fournier
 Biolax
 *Biolipase
 Biomagnésium
 Biomucine
 *Bionéol
 Bionergyl
 Bionine
 Bionucléine
 *Bio-Organic
 Biopausine
 *Biophène
 3, rue Dunkerque, Paris.
 PATRICE à Vichy.
 41, rue Étienne-Marcel, Paris.
 La Biothérapie, 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 id.
 117, rue de Belleville, Paris.
 33, rue Rennequin, Paris.
 30, rue Miromesnil, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 DURAND, à Aigues-Mortes.
 145, bd Haussmann, Paris.
 177, bd St-Germain, Paris.
 145, bd Haussmann, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 LEMATTE & BOINOT, 52, r. Labruyère, Paris.
 DEHAUSSY, 50, r. Nationale, Lille.
 85, r. Victor-Hugo, Levallois-Perret.
 Oliviéro, à Boulogne-sur-Seine.
 ROBERT et CARRIÈRE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 122, fg St-Honoré, Paris.
 2, rue Mélingue, Paris.
 Gonneville-la-Mallet (Seine-Inférieure).
 13, av. de Ségur, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 FOUCHÈRE, Rive-de-Gier (Loire).
 160, av. d'Italie, Paris.
 69, r. de Wattignies, Paris.
 1, rue des Augustins, Perpignan.
 1, bd Henri-IV, Paris.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 7, rue Biscornet, Paris.
 ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 20, fg Saint-Honoré, Paris.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.
 16, rue Saint-Gilles, Paris.
 LECRONIER, Domfront (Orne).
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 160, av. d'Italie, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.

- *Biophorine Girard**
 Biophosphine
 Biophosyl
***Biophytol**
 Bioplasmyl
***Bioplastine**
 Biopulmol
***Biorégine**
 Biorénine
 Bio-Rob
 Bio-Sel
 Biosérine
***Biosine Le Perdriel**
***Biosodine**
***Biosulfol**
***Bio-Titane Prima**
***Biotrignon**
 Biovigorine
 Biovital
***Bioxyol**
 Biozol
***Biphédrine**
 Biquinyl Meurice
 Bi-Ricin
 Bisalicylate
 Bisalyl
 Biscamph
 Biscols Fraudin
 Biscopaks Clin
 Biscottes Delft
 Biscottes Grégoire
 Biscottes et Biscuits
 Nutricia
 Biscottes Redeuil
 Bisermol
***Bis-Hyd**
 Biskalose
***Bis-ka-ma**
 Bismétine Clin
***Bismhydral**
 Bismint
 Bismogénol
- 48, rue d'Alésia, Paris.
 DÉPOUILLY, Le Creusot.
 BERTRAND, Nomexy (Vosges).
 R. BOUYSSOU, Chambois
 (Orne).
 LE DAVAY, 2, r. Notre-Dame,
 Guingamp (Côtes-du-Nord).
 25, r. Dagorno, Paris (XII^e).
 Lab. TERMES, Miramont-de-
 Guyenne (Lot-et-Garonne).
 CHAMBRON, Portes (Drôme).
 12, rue Pavée, Paris.
 DELAUNAY, Joué-lès-Tours
 (Indre-et-Loire).
 5, rue Diderot, Nice.
 63, cours Victor-Hugo, Lyon.
 11, rue Milton, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 191, rue St-Honoré, Paris.
 3, rue des Reculettes, Paris.
 22, r. Perceval, Paris.
 6, rue du Colonel-Renard, Paris.
 Lab. DEXO, 7, r. de la Répu-
 blique, Puteaux (Seine).
 Hussigny-Godbrange (Meurthe-
 et-Moselle).
 25, rue Drouot, Paris.
 47, rue de Bretagne, Paris.
 Union chimique Belge, 61, av.
 Louise, Bruxelles.
 72, route de Châtillon, Malakoff.
 Lab. du Gastroc carbone, Saint-
 Louis (B.-du-R.).
 41, av. Joffre, La Garenne
 (Seine).
 55, avenue des Écoles, Cachan
 (Seine).
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 45, r. Grange-aux-Belles, Paris.
 24, r. du Bois, Clichy (Seine).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nou-
 velle, Paris.
 45, rue du Marché, Neuilly-
 Paris.
 HOSSELOPP GRANDADAM,
 Buhl (Bas-Rhin).
 DURET et REMY, Asnières
 (Seine).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 LANCOSME, 71, av. Victor-
 Emmanuel-III, Paris.
 2, rue Paradis, Paris.
 8, r. Lafayette, Paris (IX^e).

- *Bismokaol** 7, r. de la République, Puteaux (Seine).
- *Bismucarbonate** 7, Petite Place, Douai.
- Bismupaine** 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Bismusodine** 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
- Bismutartrol** RAVAUD, 6, pl. de Breteuil, Paris.
- Bismuth Adler** 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Bismuth Adrian** 9-11, rue de la Perle, Paris.
- *Bismuth B3** BORNET, 5, bd des Brotteaux, Lyon.
- *Bismuth (Crème de)** Lab. QUESNEVILLE, 5, rue d'Angoulême, Paris.
- *Bismuth Desleaux** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- Bismuthine** LOGEAY, Le Langon (Vendée).
- *Bismuthion** 18, av. Hoche, Paris (XVI^e).
- Bismuth léger Adrian** 9, rue de la Perle, Paris.
- *Bismuthoidol Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- Bismuth Perroud** 7, rue des Archers, Lyon.
- *Bismuth Pointet Girard** (Voir Novismuth.)
- Bismuth Terrial** 22, rue de la Bienfaisance, Paris.
- *Bismuth Tulasne** 48, boulevard des Batignolles, Paris.
- Bismuth 25** OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Bismuthyl « Meurice »** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Bi-So-Dol** 4, rue d'Aumale, Paris.
- Bissine** DECAUD, St-Hilaire-des-Loges (Vendée).
- *Bissyl** 117 ter, rue Ordener, Paris.
- Bistan** DUCATTE, 31, rue Francs-Bourgeois, Paris.
- *Bistomax** LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris (VIII^e).
- *Bivatol** Lab. du D^r ROUSSEL, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- Bivigor** SCOTT, 38, r. du Mont-Thabor, Paris.
- Bladérol du D^r Jenrout** 18-20, rue Vavin, Paris.
- *Blagny (sirop, gouttes, dragées)** R. PAMÉLA, 85, rue de Turbigo, Paris.
- Blastéase** 21, pl. des Vosges, Paris.
- Blécao Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
- *Blédine Jacquemaire** id.
- *Blennopiat** GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Blennoradine** Radiumthérapie, 25, r. Vaneau, Paris.
- *Blennosine Fornet** 11, Chaussée de la Muette, Paris.
- Blennotoxyl** 172, rue d'Alésia, Paris.
- Blénosédol** PHARMA-SPÈS, 15, rue Corneille, Lille.
- Bléomaltine** AXAREL, 15, r. Catulienne, St-Denis (Seine).
- Bleumyl 5 et 10** G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).

Blimal
***Blocs Vécot**

Blokao
Blutetine

***Blüyl**
Bokanol
Bolcitol
Boldagar
***Boldine Houdé**
Boldine Verne
Boldo-Basma Palc
Boldo-Biline

Boldobyl
***Boldochol**

***Boldocrinol**

***Boldocyna**
Boldo Glucine Chapoteaut

***Boldo-Gmet**
***Boldoïne Eparvier**
***Boldolactic Lagoutte**
***Boldolactol**

***Boldolaxine**

***Boldolive**
***Boldomucyl**
Boldorhéine

***Boldo-Verne**

***Boléase Monal**
***Bolène**
Bolsurol

Bonbons Lucas (Vermifuges)
Bonbons vermifuges Royer
Boréol
***Boricine Meissonnier**

Borinhalant
Bornyval
Boro-borax Vigier
Borocalcyl Thévenot
Boroformyl
Boromyl

Boroseptine

42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 3, imp. Adam, Boulogne-Billancourt.

BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.).
MEILLER, Dumières (Haute-Loire).

(Voir Collyre Spécial Blüyl.)
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 88, rue Duhesme, Paris.

239, fg Saint-Honoré, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.

13, r. Docteur-Mazet, Grenoble.
Messigny (Côte-d'Or).

DUCLOY & C^{ie}, Arques (P.-de-Calais).

SAUBA, Montreuil (Seine).
 145, chem. de la Madrague-de-Montredon, Marseille (B.-du-R.).

Lab. JAMMES, 86, rue Michel-Ange, Paris.

6, av. V.-Hugo, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 26, Grande-Rue St-Clair, Lyon.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
A. SALLES, 11, bd de Strasbourg, Paris (X^e).

Lab. E. CHARPENTIER, 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.

19, rue de Ponteves, Marseille.
 45, rue Cambronne, Paris (XV^e).

D^r CHAPELLE, 8, rue Vivienne, Paris.

13, rue du D^r-Mazet, Grenoble (Isère).

13, av. de Ségur, Paris.

154, av. Malakoff, Paris.

16 bis, rue Dufrenoy, Paris (XVI^e).

JOUBERT & SIBASSIÉ, Nantes.

LAUMONNIER, 225, r. St-Martin, Paris.

21, rue de Lyon, Paris.

LOGEAS, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).

156, av. Victor-Hugo, Paris.

2, rue des Lions, Paris.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

21, rue des Roses, Dijon.

47, rue Nollet, Paris (XVII^e).

2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin.

20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.

- *Borosodine Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
Borosol 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
***Borostyrol** MAYOLY, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Borotropine Sevin 2 bis, rue Chevallier-de-la-Barre, Saint-Quentin.
Boues Radioactives de Pistyan - les - Bains (Tchécoslovaquie) 45, rue du Marché, Neuilly.
***Boues radioactives Rhemda** 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).
Bougies Américaines LOGEAI, 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Bougies Chaumel 78, fg Saint-Denis, Paris.
Bougies coricides Dermopode 22, rue Saint-Pierre, Évreux.
Bougies Franklin 100, bd Sébastopol, Paris.
Bougies radioactives Rhemda 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).
Bougies Raynal 12, rue de Nice, Paris.
Bouillie Molard aux amandes 25, cours Lafayette, Lyon (VI^e).
Bouillon Vaccin opératoire Sténé 14, rue des Guillemites, Paris (IV^e).
***Boules Quiès** 8, r. Aug.-Chabrières, Paris (XV^e).
Bouragar BONNAURE, à Alès (Gard).
Bourdainol 6, rue Berbisey, Dijon.
Bourgène Blanc CELLIER, 8, rue de Loge, Montpellier.
Boustrol FUMOUIZE, 78, fg Saint-Denis, Paris.
***Bovcardiac Lefrancq** 32, av. de Metz, Romainville (S.).
***Bovhépatie Lefrancq** id.
***Bovstrol Lefrancq** id.
***Bradygastrine** DUCLOY & C^{ie}, Arques (P.-de-Calais).
Bréthyl Dumesnil 10, rue du Plâtre, Paris.
Brévanyl 15, qu. de Bourbon, Paris.
Brimox 74, rue Blanche, Paris.
Briona 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Brional 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Brodynol FOUCHÈRE, 44 bis, rue du Mouillon, Rive-de-Gier (Loire).
***Bromadyl Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
Bromalbin Adrian 9, rue de la Perle, Paris.
***Broméine Montagu** 49, bd Port-Royal, Paris.
Bromephra 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
Bromhydrate Le Perdriel 11, rue Milton, Paris.
***Bromiase** 18, av. Hoche, Paris.
Bromidia 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
Bromidine Henry 39, rue Sclessin, Liège.
Bromisténine 171, rue de Belleville, Paris.

Bromocarbone*Bromocarpine** Rocher***Bromocodéine** Chenu**Bromoderme*****Bromo-Garnal****Bromogastrine*****Bromogénol** Pépin***Bromomaïsine*****Bromone** Robin**Bromophène****Bromopirine****Bromoquietol****Bromovaleron** Henry***Bromovose*****Bromure de calcium****Bromure de camphre****Clin*****Bromure de Codéine****Bromure d'éthyle****Bromure Laroze****Bromures Pachaut****Bromure de sodium du****D^r Gigon****Bromures Souffron*****Bronchasmine****Bronchialis****Bronchitol** Henry**Broncho-Baume*****Bronchodermine*****Broncho** Favrot**Bronchofluid*****Bronchoforme****Bronchogénine*****Broncho-Lactol****Bronchonal****Bronchopan****Bronchophile*****Bronchophilos****Bronchorectine****Bronchorose*****Bronchosanyl** Estève***Bronchosédol****Bronchosédyl*****Bronchoseptol*****Broncho-Sérum** Con-
nat**Bronchotonine*****Broncho-Vaclydun****LEURQUIN**, 50-52, rue Pierre-
Legrand, Lille.

32, rue Grenelle, Paris.

Montferrand (Puy-de-Dôme).

8, av. Walkanaer, Nice.

13, rue Boinod, Paris (XVIII^e).

4, imp. de Béarn, Paris.

à Courbevoie (Seine).

48, rue d'Alésia, Paris.

13, rue de Poissy, Paris.

ROUSSEL, Gde-Rue, Flers (O.).**PATRICE**, à Vichy.

14, av. Perrichont, Paris.

39, rue Sclessin, Liège.

Lab. MADYL, 14, rue Miro-
mesnil, Paris.18, rue des Écoles, Paris (V^e).

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

DAUSSE, 4, rue Aubriot, Paris.**OPTIMA**, Gde-Rue- au - Bois,
Bruxelles.

2, rue des Lions, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

98, rue de Sèvres, Paris.

THORAL, Le Mont-Dore (Puy-
de-Dôme).

6, rue Berbisey, Dijon.

39, rue de Sclessin, Liège.

34, rue Turgot, Narbonne.

34, bd de Clichy, Paris.

6, rue Dombasles, Paris.

66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.

229, cours Gambetta, Lyon.

6, pl. de l'Académie, Angers.

14, av. Perrichont, Paris.

112, rue de Gerland, Lyon.

Lab. BADEL, Valence (Drôme).

6, rue Berbisey, Dijon.

21, Grande-Rue, Argenteuil.

23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.

187, rue de la Croix-Nivert,
Paris (XV^e).**Ph. GUELY**, 16, cours Gam-
betta, Lyon.

276, rue Lecourbe, Paris.

Lab. E. LAURIAT, à La
Garenne-Colombes (Seine).**M. Folliet**, Rumilly (H.-Savoie).**Lab. L.-G. TORAUDE**, 22, rue
de la Sorbonne, Paris (V^e).

27, rue Desrenaudes, Paris.

Broncodyl	177, rue Saint-Maur, Paris.
Bronco-sérum Connat	FOLLIET, Rumilly (H ^{te} -Savoie).
*Broncosol	Lab. BRÉSIL, 12, rue Saint-Gilles, Paris.
*Broncurol	10, r. de Constantinople, Paris.
*Bronphélia	6, rue Berbissey, Dijon.
Bronxia	id.
Brophytol	14, imp. Ronce, Paris (XX ^e).
*Broseyl	40, rue des Acacias, Paris.
Brumarsyl	65, Cours National, Saintes.
Bruméol Elixir	id.
Brunyl	17, rue de Berri, Paris.
*Bruzarine	LATOURL, Terrasson (Dordogne).
Bucchu-Basma	Lab. PALC, Messigny (C.-d'Or).
Buccochlore	BEAUCHAMP, 5, c. St-Louis, Marseille.
Buccolan	24, rue Jardel, Bordeaux.
Bucco-Progone	15, rue Catulienne, St-Denis (Seine).
Buccospérine	11, rue Malher, Paris.
Buccothymol	IMBEY, 27, r. du Juge-de-Paix, Lyon.
Buccurol	83, bd de la Villette, Paris.
*Buchobleu	117, rue Victor-Hugo, Houplines (Nord).
*Bucmine	WARIN, 4, ch. de La Muette, Paris.
Buctol Paris	4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
Buc-Vac	4, ch. de La Muette, Paris.
*Bulgarine Thépénier	12, rue Clapeyron, Paris.
Bursol	COUSSINET, 20, rue des Martyrs, Paris.
Butyral	121, av. de Saint-Ouen, Paris.
Buvanhol	2, r. du Cherche-Midi, Paris.
Bylac	99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.).
Bylierine	37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
Byl-Efa	Lab. EFA, Carentan (Manche).
Bylyxyl	37, r. de Bourgogne, Paris.

C

*C. 40	DROUET & PLET, 37, r. Marly, Rueil-Malmaison (Seine).
Cachets Adol	GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
Cachets antigrippe	D ^r FLAMAND, 6, pl. Clichy, Paris.

- Cachets Asminol 1, rue Paul-Bert, Angers (M.-et-L.).
- Cachets Aspéca P. DORDIN, Harnes (Pas-de-Calais).
- Cachets Atlantis 66, rue Paradis, Marseille.
- * Cachets B. Q. S. C. 38, rue St-Ferdinand, Paris.
- Cachet Caillau Argentat (Corrèze).
- Cachets Castanet Lab. Marin, Pontaillac-Royan (Charente-Inférieure).
- Cachets C. A. S. 49, rue de Metz, Nancy.
- Cachets Céli LANDES, à Gramat (Lot).
- Cachets Charvoz 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire (Rhône).
- Cachets Chauvin au quinocitrate de lithine composé Aubenas (Ardèche).
- Cachets Cy-troène 4, av. de Bayonne, Pau.
- Cachets Dellé LE NAOUR, à Quimperlé (Finistère).
- Cachets digestifs Carbowil 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
- Cachets digestifs du D^r Bern 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
- Cachets digestifs Gydé 4, cours Tolstoï, Lyon.
- Cachets Dolozymes SAUBA, Montreuil, Paris.
- Cachets Donol 21, rue de la Gare, La Broque (B.-Rhin).
- Cachets du D^r Boveil 1, rue Lassalle, Lyon.
- Cachets du D^r Faivre à Lyon.
- Cachets du D^r Marck Lab. J. BLANCHARD, Pont-de-Vaux (Ain).
- Cachets Gau 87, rue de la République, St-Mandé (Seine).
- Cachets Hériol THEVENIN, Feurs (Loire).
- * Cachets Kapytan 76, rue de Sèvres, Paris.
- * Cachets Lekma P. Guin, Contres (L.-et-C.).
- Cachets Louix GIROUD, 78, cours de la Liberté, Lyon.
- Cachets Merveilleux Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Cachets Mictosidine 21, rue de Lyon, Paris.
- Cachets Némi Lab. GÉHA, Port-de-Bouc, près Marseille.
- Cachets opothérapiques Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- * Cachets Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.
- Cachets Phebor 64, rue des Tournelles, Paris.
- Cachets Phydès Miribel (Ain).
- Cachets Prodiger 12, rue Grande, Évreux.
- * Cachets Pulmonix Polvi 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
- Cachets Pyrana 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
- Cachets Rabelais LOGEAY, Le Langon (Vendée).
- Cachets Rava 4, ch. de la Muette, Paris.
- Cachets Réal 62, rue des Petits-Champs, Paris.
- Cachets réparateurs HÉRIN, 98, r. Jeanne-Maillotte, La Madeleine.

- *Cachets du Dr Ri-
chomme 19, rue Pache, Paris.
- *Cachets Roche de
Thiocol HOFFMANN-LA ROCHE &
C^{ie}, 10, rue Crillon, Paris.
- Cachets de Roux 56, r. des Minimes, Marseille.
- Cachets Saunier 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
- *Cachets S. F. T., 38, rue Saint-Ferdinand, Paris
(XVII^e).
- Cachets Séda 149, av. des Minimes, Toulouse.
- Cachets Sedrob 35, rue Périssé, Toulouse.
- Cachets de Sidérol
PEM 1, rue de l'Odéon, Paris.
- *Cachets Spévin CHAUVIN, 3, rue de Vouillé,
Paris (XV^e).
- Cachets Tacet 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- Cachet Urby P. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).
- Cachets Van-Sol 18, r. du Maréchal-Foch, Ver-
sailles.
- Cacodylate Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Cacodyle Gonnon 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
- Cacodyle Mars 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
- *Cacodyline Jammes 86, rue Michel-Ange, Paris.
- Cacodylo Phosphate
vital Jacquemaire à Villefranche (Rhône).
- Cacospermine Lab. SASSE, 78, bd Beaumar-
chais, Paris.
- Cacticardine du
Dr Conraux à Caudebec (Seine-Inférieure).
- *Cadior 10, rue Vignon, Paris.
- Cadmiol zinc Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.
- Cæcaline Gagnière à Clermont-Ferrand.
- Cafacétyl-Codéine BŒGLIN, 26, rue Sainte-Claire,
Mulhouse.
- *Cafédrine SAUBA, Montreuil (Seine).
- *CaféinegranuléeHoudé 9, rue Dieu, Paris.
- Caféine Invar 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Calcéose Boillo 9, rue Saint-Paul, Paris.
- *Calcériode Marin M. BOULAY, 62, r. de Montreuil,
Paris.
- *Calcibronat 20, rue Vernier, Paris.
- Calciclo 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- Calcifixine Bureau 86, bd Port-Royal, Paris.
- Calcigénie 90, bd Saint-Denis, Courbevoie
(Seine).
- *Calcigénol PINARD, 90, bd Saint-Denis,
Courbevoie (Seine).
- *Calcigénol irradié 90, bd Saint-Denis, Courbevoie
(Seine).
- *Calciline 21, rue Violet, Paris.
- *Calciocholine BERTRAND, Nomexy (Vosges).
- Calciodyl 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- *Calcio-Dynamil 45, r. Lazare-Carnot, Clamart
(Seine).
- *Calcional LEMATTE & BOINOT, 52, r
La Bruyère, Paris.

- Calcior**
Calci-Ostéline
Calciphorine
Calciphose
Calcitanol
Calcisthénine
- * **Calcium Corbière**
* **Calcium Français**
- Calcium Francalcium**
* **Calcium-Plé**
* **Calcium-Sandoz**
Calcium Vehem
* **Calcivitam**
Calco-céril
- * **Calcoléol**
- * **Calcomagnésie**
Calco-magnésol
Calcophore
* **Calcozymase**
* **Calmaby**
* **Calmag-Na.**
- Calmant Meunier**
- Calmasmine**
Calménol
- Calmidex**
Calmigorge
Calmitine
- * **Calmobro - Niel (ex-Kalmobrol)**
* **Calmocardine**
Calmogastrol
- * **Calmopelvine**
* **Calmosuppos**
- * **Calmovarine**
Calobil
Calogyre
Calomel R.-B. Lagrave
* **Calomel Vicario**
Calox
* **Calsédine**
- * **Camformine**
Camphal
Camphemol
- 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
46, rue Claude-Lorrain, Lille.
74, r. de la Jonquière, Paris.
14, r. des Pyramides, Paris.
7, r. des Petits-Carreux, Paris.
MAIRE, 171, r. de Belleville, Paris.
27, rue Desrenaudes, Paris.
7, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris.
3, rue St-Roch, Paris.
111 bis, rue de Turenne, Paris.
20, rue Vernier, Paris.
7, rue St-Isaure, Paris.
rue du Moulleau, Arcachon.
20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Produits SCIENTIA, 21, rue Chaptal, Paris.
47, rue Bokanowski, Asnières.
52, bd Diderot, Paris.
6, rue Raoul-Berton, Bagnolet.
3, rue Fernand-Widal, Paris.
84, rue Rochechouart, Paris.
SUBSTANTIA, 13, rue Pagès, Suresnes et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
rue du Commerce, Montmarault (Allier).
137, fg St-Antoine, Paris.
DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
27, r. des Batignolles, Paris.
à Thury-Harcourt (Calvados).
BILLEBAUD, Paray-le-Monial (S.-et-L.).
3, rue Royet, Lyon-Caluire.
85, cours Albert-Thomas, Lyon.
41, av. Joffre, La Garenne-Colombes.
192-194, rue St-Denis, Paris.
BOIVERT, La Mothe-Saint-Héraye (Deux-Sèvres).
192-194, rue St-Denis, Paris.
84, rue Rochechouart, Paris.
IMBERT, à Toulon (Var).
72, quai de Jemmapes, Paris.
17, bd Haussmann, Paris.
5, rue de la Paix, Paris.
GERDA, 163, bd. Croix-Rousse, Lyon.
6 bis, rue Belloni, Paris (XV^e).
15, r. Mercière, Erstein (B.-Rh.).
1, pl. Morand, Lyon.

- Camphex
 *Camphocalyptol
 *Camphodausse
 Camphoral Aguettant
 Camphoran
 Campho - Spartéine
 Dubois
 *Camphostyl
 Camphroluble
 Camphro-Salyl Fraisse
 *Camphydryl Robin
 Camphydryl Spartéiné
 *Camphydryl strychno-
 spartéiné Robin
 *Canol
 *Cantéine Bouteille
 Caoglands
 *Caparlem
 Capillairal
 Capsellase
 Capsol
 Capsoléol
 Capsorhinol
 Capsovules Diptlos
 Capsules Bonnefond
 *Capsules Bruel
 Capsules Cédro-Mé-
 thyle
 Capsules Cognet
 Capsules Dartois
 Capsules de Gonosan
 Capsules d'Euviscol
 Capsules Dieu
 Capsules Enos
 *Capsules et sirop Préga
 Capsules Goubaux
 Capsules grises Ca-
 banes
 Capsules Gurgol
 *Capsules Haarlem
 Bardet
 *Capsules Henry
 Capsules d'Hojasol
 *Capsules Huile de
 Haarlem véritable
 (Voir Huile de Haar-
 lem)
 Capsules d'Ichtyol Vi-
 gier
 59, bd Lefebvre, Paris.
 ÉCHEMAN, 26, rue des Moines,
 Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV°).
 36, q. Fulchiron, Lyon.
 59, bd Lefebvre, Paris.
 16, bd Peretie, Paris.
 LACROIX, 37, rue Pajol, Paris.
 DELAUNAY, Joué-les-Tours
 (I.-et-L.).
 8, rue Jasmin, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 id.
 id.
 Maizet (Calvados).
 23, rue des Moines, Paris.
 10, rue Poncelet, Paris.
 Lab. Lorrain de Produits Purs,
 Étain (Meuse).
 ARQUEVAUX, Étampes (S.-
 et-O.).
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 74, rue Blanche, Paris.
 Lab. ANINAT, à Nîmes (Gard).
 17, rue Chomel, Paris.
 18, rue Pierre-Curie, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 10, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 55, rue de Chabrol, Paris.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 2, r. des Lions, Paris.
 44, r. d'Aguessau, Boulogne-
 s.-Seine.
 7, rue Charlot, Paris (III°).
 Lab. BAPAUME, 85, av. de
 Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
 50, r. Nationale, Lille.
 4, rue Colbert, Reims.
 17, rue Cadet, Paris.
 JEHAN & BRERA, à Montau-
 ban (Lot-et-Garonne).
 76, rue de Sèvres, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 10, rue Gay-Lussac, Paris.
 33, fg Montmartre, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Capsules Franklin
***Capsules Joret et Homolle**

***Capsules Kuchner**
Capsules de Morrhuine Puy

***Capsules Noguès**
Capsules Pneumal
Capsules Raquin
Capsules Ricord
Capsules salolées

Capsules Sédomictol
Capsules Sérafon
Capsules de sulfate de quinine

Capsules Taptz
Capsules Therpinol
Capsules Vigier

Captobyl

***Carb**
***Carbagol Marinier**
Carbaine Clin
***Carbalcaloides**

Carbalga

***Carbargyre**
Carbarseno
***Carbatropine**
Carbémétine
Carbeserine
Carbintol

***Carbobel**
***Carbo - Bismuth**
Adrian

Carbocarpine
***Carbocitrol**
***Carbo-Combrosmol**

***Carbodaussé**
Carbonxine

***Carbogénase**
Carbolodine

***Carboiodure** **Fraudin**

***Carbolactyl**
***Carbolaxine**

Carboléine
***Carbolin**

Carbomagnesol

Carbométine
***Carbomucil**
***Carbonal**

100, bd Sébastopol, Paris,

165, rue Saint-Honoré, Paris.
HINGLAIS, Epernay (Marne),

Grenoble (Isère).

7, rue Galvani, Paris.

172, rue d'Alésia, Paris.

78, fg Saint-Denis, Paris.

3, bd Beaumarchais, Paris.

LACROIX, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris.

21, rue de Lyon, Paris.

9, rue de la Perle, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

2, rue Lesdiguères, Paris.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Joué-les-Tours (I.-et-L.).

25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).

23, rue Ballu, Paris.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.

id.

25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).

49 bd, Port-Royal, Paris.

id.

id.

id.

151, rue de Charenton, Paris.

12, r. du Téléphone, Bruxelles.

9 et 11, rue de la Perle, Paris.

49, bd Port-Royal, Paris.

96, rue Lafayette, Paris (X^e).

59, r. Boissière, Paris (XVI^e).

4, rue Aubriot, Paris.

34, rue Sedaine, Paris.

45, fg Saint-Denis, Paris.

132, r. de Turenne, Paris.

4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine).

19, rue de Fleurus, Paris.

VALENTIN, 1, rue d'Arras, Béthune (P.-de-C.).

14, rue Demarguay, Paris.

MIDY, 67, av. de Wagram, Paris.

Lab. ASCO, 63, rue de Charonne, Paris.

229, c. Gambetta, Lyon.

41, rue de Rome, Paris.

14, rue Cantin, Courbevoie.

- *Carbonaphtolan** B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
- *Carbonate de Bismuth** 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.
- *Carbonate de Chaux** 9-11, rue de la Perle, Paris.
- Adrian 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- *Carbonate de Chaux** 11, rue Milton, Paris.
- Lancosme 12, bd Saint-Martin, Paris.
- Carbonate de Lithine** 98, rue de Sèvres, Paris.
- Le Perdriel NOË, St-Amand-les-Eaux.
- *Carbonésie** 13, Grande-Rue, Herblay (S.-et-O.).
- Carbone Théraplix** 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
- *Carbophos** Lab. E. MILLET, Rambouillet (Seine-et-Oise).
- *Carboquinol** 49, bd Port-Royal, Paris.
- *Carborexyl** Lab. SEDROB, 35, rue Périssé, Toulouse.
- *Carbos** 94, rue Michelet, Alger.
- *Carbosanis** Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
- *Carboseptine** 18, rue de Ménilmontant, Paris.
- Carboseptyl 16, bd Pereire, Paris.
- *Carbotrignon** 15, bd Pasteur, Paris.
- Carboxine 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
- Cardialgine Dubois** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- *Cardibaine** "ANGLA", Monte-Carlo.
- *Cardiobromine** 14, av. Georges-Clemenceau, Nice.
- Cardiocrinol** Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
- *Cardioflorine** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- Cardion Vincardi** GRÉMY, 14, rue Clichy, Paris.
- *Cardiosthénine** OPTIMA, 78, Grande-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
- *Cardiostreptine** L. ROBERT, Ph^{ie}, place des Halles, Niort.
- Cardiotonic** MILAN, 7, rue Bonald, Lyon.
- Cardiotonine** LOBICA, 25, rue Jasmin, Paris.
- *Cardirène** 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- Cardisédine** id.
- *Carditone** id.
- *Caréna** id.
- *Caréna Calcium** Produits FAYES, 199, rue St-Denis, Paris.
- *Caréna Injectable** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Caréna Ouabaïne** PALC, Messigny (Côte-d'Or).
- Carminase** 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
- Carnéose Dr Spès**
- Carnets de Régime du Dr Corset de Vichy**
- Carnicalcine**

- *Carnine Lefrancq** 332, av. de Metz, Romainville (Seine).
Carnix Robert 62, rue Marengo, St-Étienne.
Carnofer EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- *Carottase** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
Cartilos 56, rue Beaubourg, Paris.
Carypaine 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
Casaldyl 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
Casbyl 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
Cascalobyl 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
Cascara Alexandre 41, rue de Rome, Paris.
***Cascara Eparvier** 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon.
Cascara Henry HENRY, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
***Cascara Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
Cascarine Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
Caséoline Girard 48, rue d'Alésia, Paris.
***Caséone Fabre** 33, rue de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine).
***Casol** 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).
***Cassilax** A. DJIAN, 137, rue de Belleville, Paris.
Cassitol MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
***Castanol** 9, pl. Municipale, Tulle (Corrèze).
Catalgine 98, rue de Sèvres, Paris.
***Catalyl** 10, rue J.-Hachette, Ivry (Seine).
Cataplasme etbouera- GENEVRIER, 145, r. du Mar-
dioactive de Pistyan ché, Neuilly.
***Cataplasme du Dr Le-** 19, r. de la Porte-Trivaux, Cla-
lièvre mart (Seine).
Cataplasme Electrique 46, rue Dauphine, Paris.
Morgin
Cataplasmes de Fango
Fisch
Cataplasme Optima
Catarasmine
Catéchiode Martinet
***Catéményl**
***Cathacide**
Catnartine
Cathiode Brisson
Catramina
Cautère Lumière
***Caveorm**
C. B. K.
Cedrel Bel

157, r. Championnet, Paris.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 12, avenue du Maine, Paris.
 114, rue Solférino, Lille.
 15, rue Catulienne, St-Denis.
 DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.

Cédro-Méthyle	PIALOUX , 55, rue de Chabrol, Paris.
Cèdre bleu	P. HARDY , 42, bd St-Marcel, Paris.
Cédrosan	BREANT , 11, r. de Clichy, Paris.
*Cellargos	CORBIÈRE 27, rue Desrenaudes, Paris.
*Cellona	Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
Cellopansements	La Cellophane Bezons, (S.-et-O.).
Cellucrine	5, rue Paul-Barruel, Paris.
*Cellulax	PION , quai J-d'Arc, Chinon (I.-et-L.)
Cellules Paret	28, rue Guibal, Marseille.
Cellu-Son	AUBRY , 62, rue Erlanger, Paris.
Cemag	D^r LALAURIE , Cuxac-d'Aude.
Centrosorum Grosjean	36, rue de Malte, Paris.
*Cépaïne	27, rue Planchat, Paris (XX ^e).
Cephamail	17, rue de Berri, Paris (VIII ^e).
Cephcemétine	49, rue Maleret, Bordeaux.
Cerdesol	12, r. de Strasbourg, Paris.
Céréales-Bébé	FAVRICHON , à St-Symphorien-de-Lay (Loire).
Céréales granulées	FAVRICHON , à St-Symphorien-de-Lay (Loire).
Céréaline Tulivet	52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
Céréalose	Lab. ASTIER , 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
*Cérébrine Fournier	6 bis, rue Campagne-Première, Paris.
Cérébrinol	72, quai Jemmapes, Paris.
Cérébrocrinol	Lab. ISCOVESCO , 107, rue des Dames, Paris.
Cérébroïl Leisyn	1 bis, rue Molitor, Paris.
*Cérébrolipase	17, rue Soufflot, Paris.
*Cérébron	191, rue St-Honoré, Paris.
*Cérébrosthénine Dalin	49, quai St-Vincent, Lyon.
Cérédine Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Céréol Gigon	25, bd Beaumarchais, Paris.
*Céréossine	50, rue Nationale, Lille.
*Cérinil	20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Cériocalcine	id.
Cériomine	id.
Cerotto Bertelli	78, bd Beaumarchais, Paris.
Cersomine	12, r. de Strasbourg, Paris.
Cervol	19, rue de Fleurus, Paris.
Cetamol	15, rue d'Argenteuil, Paris.
*Cethocal	6, rue Abel, Paris (XII ^e).
Cétrarose Gigon	25, bd Beaumarchais, Paris (IV ^e).
Charbenzo Lafran	8, rue de Prague, Paris.
*Charbon Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine).
*Charbon Tissot	34, bd de Clichy, Paris.
Chardyl Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.

***Charleben**

Charrier (Eau Minérale Naturelle vivante)

Chasvers Michel

Chatel-Biasse

Chaulmorhuat Po-
maret

***Chélibile**

Chelicyne

Chéloïdine**Chenanthol**

Cheralys comprimés

Chibromercurobrome**Chlocol*****Chlomag**

Chlorakin

***Chloral bromuré**

Dubois

Chloral Dalis

Chloral-Geranie

***Chloralgine**

Chloralgot

Chloralosane**Chloramine**

Chlorasepthymol

Chloraseptine

***Chloréthyle Bengué**

Chlorhydroeptine

Chlorhydrol

Chlorical**Chloridia*****Chlorinol*****Chloripepsine*****Chlormagnesium Fisch**

Chlorobacilline

Chlorobyl

***Chloro-Calcion**

Chlorofoline

***Chloroforme Adrian**

Chloroforme anesthé-
sique

Chloroforme amp.

11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville,
Cannes (A.-M.).

à Laprugne (Allier) et 24, av
de l'Opéra, Paris.

Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.).

MIRATON, Châtel-Guyon.

21, rue Marbeuf, Paris.

A. COUSIN, Pharm., Beaumont-
sur-Oise (S.-et-O.).

49, rue Maleret, Bordeaux.

DORANTOWICZ, 17 bis, av
Parmentier, Paris.

HINGLAIS, à Épernay.

12, rue des Sts-Pères, Paris.

Lab. H. CHIBRET, 5, r. St-
Hérem, Clermont-Ferrand (P.-
de-D.).

L. ADAM, Granville (Manche).

18, rue des Écoles, Paris (V^e).

37, r. de Bourgogne, Paris.

DURIEZ, 20, pl. des Vosges,
Paris.

84, rue Rochechouart, Paris.

GROSJEAN, 36, rue de Malte,
Paris.

3, cours Gambetta, Cavaillon
(Vaucluse).

8, rue de la Paroisse, Versailles.
KUHLMANN, 145, bd Hauss-
mann, Paris.

FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
Saint-Sever (Landes).

OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
Bruxelles.

16, rue Ballu, Paris. (9^e).

D^r COIRRE, 5, bd Montpar-
nasse, Paris.

FOUCHE, 2, bd Pershing, Paris,
Lab. SAUBA, Montreuil, Paris.

Produits Dannech'h, 64, rue des
Tournelles Paris.

40, rue des Acacias, Paris.

25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).

TULIVET, St-Germain-en-Laye.
25, rue Jasmin, Paris.

MICHEL, 4 bis, rue du Colo-
nel-Moll, Paris (XVII^e).

D^r BRINGER, 21, rue de Pic-
pus, Paris.

9-11, rue de la Perle, Paris.

USINES DU RHONE, 21, r.
Jean-Goujon, Paris.

OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.

- Chloroforme** Lam-
bierre frères
Chloroma
***Chloro-Magnésien**
Chloro - Magnésium
Hatier
Chloro-magnésium
Henry
Chloropectase
20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
52, bd du Temple, Paris.
- 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
HENRY, 39, r. de Sciessin,
Liège (Belgique).
NOË, 14, r. Thiers, St-Amand-
les-Eaux.
- ***Chlorophylle du Dr Da-**
vid
Chlorostomalise
Chlorosulfol Vigier
***Chlorumagène**
***Chlorure d'ammo-**
nium Bréant
***Chlorure de Magné-**
sium Adrian
***Chlorure d'Éthyle**
Adrian
Chlorurol
39, bd de La Tour-Maubourg,
Paris (VII^e).
BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
42, rue Mont-Cenis, Paris.
- 11, r. de Clichy, Paris.
- 9-11, rue de la Perle, Paris.
- 9-11, rue de la Perle, Paris.
PIALOUX, 55, rue de Chabrol.
Paris.
22, rue Morère, Paris.
- Chlory choline**
Chocolat au lait Nu-
tricia
Chocolat Redeuil
Chocolax
***Chocynol**
142, r. Fransman, Bruxelles,
7, rue Couche, Paris (XIV^e).
6, r. A.-La-Lyre, Courbevoie (S.).
HUYGHE (G. et J.), Brazey-en-
Plaine (Côte-d'Or).
REBOUL, 62, av. de Paris,
Villejuif (Seine).
48, bd des Batignolles, Paris.
95, rue de Prony, Paris.
- ***Cholagol**
Cholagon
***Cholal**
***Cholécystine**
VINCENT, 14, av. Mac-Mahon,
Paris.
- ***Choléfluine**
LECONTE, 7, rue des Petits-
Carreaux, Paris.
74, rue Lourmel, Paris.
- Cholégastron**
***Choléine Camus**
DARRASSE, rue St-Maurice
Nanterre (Seine).
DARRASSE, rue St-Maurice,
Nanterre (Seine).
26, av. de l'Observatoire, Paris.
8, rue Jean-du-Bellay, Paris.
- ***Choléine lactique**
DARRASSE, rue de la Fédération, Paris.
21, rue des Roses, Dijon.
37, rue de la Fédération, Paris.
6, rue Berbisey, Dijon.
- Choléitoires Byla**
***Cholélyse Carbou**
Choléoboldine Thévenot
***Choléo-Combretol**
Choléocytol
***Choléo-Fluase**
E. VERDON, Pharm., Celles-
sur-Belle (Deux-Sèvres).
- ***Choléokinase**
DURET & RÉMY, Asnières
(Seine).
7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
R. COLAS, 133, r. Lecourbe,
Paris.

- *Choléo-peptine
 *Choléo-Zymatine
 Cholépan
 *Cholérène
 *Cholergine

 Cholestériodine
 Cholétrypsine
 Choline Roche
 *Cholofluol
 Cholotoxine

 *Chophytol (Ampoules,
 Dragées et Gouttes)
 Christolax

 Chromo - Thermo -
 Thérapie
 *Chrysalmiode Aguet-
 tant
 *Chrysemine Carteret
 Chymosine Fisch
 *Cibalgine

 Cibrol
 Cicabi
 Cicatrigène
 Cicatrisant Leisyn
 Cicatryl
 G^d Cidre Bol régime

 Cigares Gicquel

 Cigarettes anti-asthm.
 Cigarettes Barral
 Cigarettes du D^r Cléry

 Cigarettes Espic
 Cigarettes Indiennes
 Grimault
 Cigarettes Salva

 Cigarettes Schulze

 Cigarettes Zani

 *Cimalvol
 Cimarsényl

 Cimatryl
 *Cinalose
 *Cinarascol

 *Cinascol
- 24, rue des Plantes, Paris.
 58, rue de Vouillé, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 52, rue La Bruyère, Paris.
 5, rue de Vic, Nancy.
 10, rue Crillon, Paris.
 13, pl. de la Nation, Paris.
 CHAUMONT-CAZALS, à Vi-
 chy (Allier).
 ROSA, 11, rue Roger-Bacon,
 Paris (XVII^e).
 151 bis, rte de Joinville, Cham-
 pigny.
 12, av. du Maine, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 Lab. CIBA, 103-117, boul. de la
 Part-Dieu, Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 2, bd Pershing, Paris.
 54, r. du Commerce, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris.
 M. LANGLOIS, La Cresson-
 nière, Pont-l'Évêque.
 Produits DANNECH, 64, r. des
 Tournelles, Paris.
 ESCOUFLAIRE, Baisieux (N.).
 78, fg St-Denis, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil
 (Seine).
 20, rue St-Lazare, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 Lab. Central de France, r. de
 Châteaudun, Rennes.
 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-
 sur-Seine.
 52, r. de Poissy, St-Germain-
 en-Laye.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 MEYNARD, 50, av. de Nor-
 mandie, Colombes.
 4, pl. Royale, Nantes.
 60, route de Châtillon, Malakoff.
 Lab. DAGONNOT, 11 bis, pl.
 de l'Hôtel-de-Ville, Cannes
 (Alpes-Maritimes).
 G. BAETZ, Chef-Boutonne (D.-
 Sèvres).

- *Cinéyl
- *Cinnozyl Clin
- *Cinol
- *Cipromarol
- Circogénol
- Citol
- *Citralin
- *Citra-Quint
- Citrarose du D^r Gigon
- Citrase
- Citraspirine
- Citrate de Lithine Le
- Perdriel
- *Citrhémol
- Citrina
- *Citrocarbine
- *Citrocholine
- Citro-fer
- *Citrofluyl
- Citrolactine
- *Citrolargol
- Citroléol
- *Citronai
- *Citronema
- *Citropaïne
- *Citropeptol
- *Citrophos
- Citrosalol
- *Citrose-Vichy
- *Citrosodine
- Citro-thymol
- Clairmine
- Clangoryl
- *Clearol
- *Cleinol
- Clinax
- Clinuryl
- Clisémine Longuet
- *Clonazone Daufresne
- *Clupéyl (Voir Laitancyl)
- *Coagulène Ciba
- *Coaltar Le Beuf
- Coalt Derma
- 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
- 12, r. de la République, Puteaux.
- 2, pl. République, St-Ouen.
- Lab. REPITON, Saint-Gents, Laval (Rhône).
- 10, imp. Milord, Paris.
- 74, r. de La Fère, St-Quentin (Aisne).
- 25, bd Beaumarchais, Paris.
- 37, r. de Bourgogne, Paris.
- 22, bd Sébastopol, Paris.
- 11, r. Milton, Paris.
- G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- Lab. Sauba, Montreuil (Seine).
- WARIN, 4, ch. de la Muette, Paris.
- 49, rue du Loing, Montargis (Loiret).
- M. LOISEAU, 22, fg St-Michel, Angers.
- 4, ch. de La Muette, Paris.
- 155, bd A. Briand, Savigny-sur-Orge.
- LEBEAULT, BESINS & C^{ie}, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
- 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- J. FRÉCHIN, Lure (Hte-Saône).
- 10-12, r. de la Fraternité, St-Mandé.
- 304, r. Saint-Jacques, Paris.
- 83, bd de la Villette, Paris.
- NOË, St-Amand-les-Eaux.
- 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.
- 7, rue Galvani, Paris.
- 34, rue Sedaine, Paris.
- 49, rue de Bitché, Courbevoie.
- 6, rue du Laos, Paris (XV^e).
- 26, rue Norvins, Paris.
- 194, rue Rivoli, Paris.
- G. GAYRAUD, Lavit (T.-et-G.).
- 95, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).
- B.-F. DELAUNAY, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
- 34, rue Sedaine, Paris.
- 42, rue Thiers, Le Havre.
- Pharmacie PANIER, à Malo-les-Bains.
- 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
- 11, rue Milton, Paris.
- 30, bd Raimbaldi, Nice.

Cobranyl

*Cobratoxine Katox

*Cocaine Midy

Coccidal Grémy

Codarsyl

*Codéphryl Dufour

*Codérax

Codebromyl

*Codocol

*Codoforme Bottu

Colargyl

Colarsé

*Colarsénol (collutoire
et pommade)

*Colave

*Colchicine Houdé

Colchiflor Vial

*Colchi-Sal Midy

Colhépatyl

*Coliflorine Carrion

Coliformine

Colilactol

*Colisel

*Colitique

*Coli-Vaclydun

*Colizyl

Collargol

*Collargophédrine

Collecodin Leo

Collo-Bacilline

*Collobiase de Sulf-
hydrargyre

*Collobiase d'Or

*Collocrine

Collohistol

Colloïdes Amicros

Colloïdes Clin

*Colloïdine

*Colloïdogénine

Colloïl Letsyn

Collo-iode Dubois

Collophérine Bapt.

Collosol Pépin

*Collosoufre

Collothiol

*Collovaccins

MEURICE, 68, rue Berkendael,
Bruxelles.

87, r. Denfert-Rochereau, Paris.

67, av. de Wagram, Paris.

14, rue de Clichy, Paris.

DUBOIS, 16, bd Pereire, Paris.

40, rue des Carmes, Orléans.

COIRIER, 69, av. du Maine,
Paris.

SAUBA, Montreuil (Seine).

20, rue des Martyrs, Paris.

115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.

49, rue de Bitché, Courbevoie.

49, rue Thiers, Boulogne-s.-Mer.

43, r. de Créteil, Joinville-le-
Pont (Seine).E. VERDON, Celles-sur-Belle
(D.-S.).

9, rue Dieu, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

67, av. de Wagram, Paris.

50, fg Poissonnière, Paris.

54, rue du Fg-Saint-Honoré, Paris.

5, r. du Calvaire, Nantes (L-
Inf.).11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville,
Cannes (A.-M.).LAROZE, 54, rue de Paris,
Charenton (Seine).42, rue du D^r-Blanche, Paris.

27, rue Desrenaudes, Paris.

15, r. de Chilly, Longjumeau
(Seine-et-Oise).

67, av. de Wagram, Paris.

2, rue Mélingue, Paris.

11, square Marie-Louise, Bru-
xelles.

11, rue Mansart, Paris.

DAUSSE, 4, rue Aubriot, Paris.

4, rue Aubriot, Paris.

155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
Orge (S.-et-O.).

CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).

177, r. de Courcelles, Paris.

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.

54, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

8 et 10, r. Alp-Bertillon, Paris.

1 bis, rue Molitor, Paris.

16, bd Pereire, Paris.

4, rue de l'Alma, Asnières.

116, bd Haussmann, Paris.

Lab. LORRAÏN de Produits
purs, Etain (Meuse).

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.

74, rue Blanche, Paris.

- Collubiazol**
Colluborine
Collubleu
***Collunovar**

Colluséda
***Collusulfar**

Collutoire gargarisme
Neyret
***Collutoire Mexyl**
***Collutoire V.-E. Doumer**
Collybor

***Collyres Chibret**

Collyres Stéryl
Collyre des Alpes Vica-
rio
***Collyre Spécial Blüyl**

Collyres stérilisés Clin
Colmatol
Coloplastre
***Colpophile**
***Coltène**

Columiel
***Coluval**

***Combey-Lax**
Combrétine Boquillon
Combretochol

Combrosmol
***Comitiol**

Complextraits

***Composé Gmet**
***Compressees grasses**
« Onctua »
***Compressif Beslier**

Comprimés Adolan

Comprimés Alla

Comprimés Anta
Comprimés Aqua Pura

***Comprimés d'Alibour**

Comprimés Aseptuter

89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e).
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 11, rue Lepic, Paris.
 7, rue de la République, Pu-
 teaux (Seine).
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 Ch. DESGREZ, 19-21, rue Van-
 Loo, Paris (XVI^e).

35, rue de la Bourse, Lyon.
 6, rue des Dames, Paris.

BOMEL, Annonay (Ardèche).
 ADLER, 36, rue des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 5, rue St-Hérem, Clermont-Fer-
 rand.

94, rue Michelet, Alger.

17, bd Haussmann, Paris.
 Lab. PHILBERT, 6, av. Mira-
 beau, Nice.

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 4, rue d'Aumale, Paris.

29, rue Singer, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 Lab. J. BLANCHARD, Pont-
 de-Vaux (Ain).

156, av. Victor-Hugo, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La
 Garenne (Seine).

134, av. Parmentier, Paris (XI^e).
 12, rue de Nice, Paris.

B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-
 Tours (L.-et-L.).

59, r. Boissière, Paris (XVI^e).
 GRORICHARD, 12, pl. de la
 Révolution, Besançon.

HUCKEL, à Héricourt (Haute-
 Saône).

27, fg Montmartre, Paris.
 ECHARD-GILLIER, L'Arbresle
 (Rhône).

COQUELU, Digoin (Saône-et-
 Loire).

GENÉVRIER, 45, r. du Mar-
 ché, Neuilly.

LAPEYRE, Neuvic-sur-l'Isle
 (Dordogne).

178, rue Montmartre, Paris.
 ROBERT & CARRIÈRE, 37,
 r. de Bourgogne, Paris.

DURET & RÉMY, Asnières.
 (Seine).

156, av. Victor-Hugo, Paris.

- Comprimés Chauvin
d'Alibour
Comprimés de Calomel Aubenas (Ardèche).
MILLET, Rambouillet (S.-
et-O.).
- Comprimés de carbo-
nate de chaux id.
Comprimés de Char-
bon Fraudin 4, av. Desfeux, Billancourt
(Seine).
Comprimés Chéralys 12, r. des Saints-Pères, Paris.
Comprimés de Gibert 19, rue d'Aubagne, Marseille.
*Comprimés de Proto-
Gambier 42, r. Émile-Deschanel, Courbe-
voie (Seine).
*Comprimés Galac LAMBERT, pl. du Châtelet,
Orléans.
Comprimés Garga OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
Bruxelles.
- *Comprimés Guillau-
min 13, rue Cherche-Midi, Paris.
*Comprimés Kléos 2, rue des Cordeliers, Meung-
sur-Loire.
Comprimés Luc JACQUET, Vierzon (Cher).
Comprimés Mercier à
l'Iodorganine 41, route de Turin, Nice.
Comprimés N. B. M. 56, rue Beaubourg, Paris.
Comprimés Néotho-
rium Millot 177, rue de Courcelles, Paris.
Comprimés Neyret 35, rue de la Bourse, Lyon.
*Comprimés Nican Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-
et-O.).
- Comprimés Panto-
laxine du D^r Boveil 1, rue Lassalle, à Lyon.
Comprimés Pausis JARMON, 4, pl. de la Gare,
Tunis.
- Comprimés du Prof.
Pénières COUPAT, Ussel (Corrèze).
*Comprimés Ortho-
Malleval 34, rue du Plat et 9, rue Sala,
Lyon.
*Comprimés Probios
Antipyogène 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
*Comprimés Purgos 7, rue Galvani, Paris (XVII^e).
*Comprimés Recal Lab. FLEURY, Arcachon
(Gironde).
Comprimés Rhinol 80, fg. Saint-Denis Paris.
*Comprimés Roche de
Thiocol HOFFMANN LA ROCHE, 10,
rue Crillon, Paris.
*Comprimés Roy 81, bd Suchet, Paris.
Comprimés Salvé Lab. RICHER, 7, av. Marceau,
Paris.
- *Comprimés Sériques
Clin 20, r. des Fossés-St-Jacques,
Paris.
*Comprimés de Thio-
naiodine 71, av. de Clamart, Issy-les-
Moulineaux (Seine).
Comprimés Urbé LAFFARGUE, Barsac (Gi-
ronde).
- Comprimés vaginaux
Leisyn 1 bis, rue Molitor, Paris.

- Comprimés Vérandy** G. LAURENS, Pharm., Aix-en-Provence.
- ***Comprimés Vichy-État** G. PRUNIER & C^{ie}, 4, rue de la Coutellerie, Paris.
- Conarsynol** 12, pl. Puget, Toulon.
- Condurango Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Condurango granulé Astier** 42, r. du Docteur-Blanche, Paris.
- ***Cônes Antiseptiques Rendell** 61, rue Damrémont, Paris.
- Conhydrargol** 12, pl. Puget, Toulon.
- Conjonctol** Lab. des Établ. SALJE, 4, r. Elzévir, Paris.
- ***Continol** 2, pl. de la Porte-des-Ternes, Paris (XVII^e).
- ***Convalbaine** 17 bis, bd Rochechouart, Paris.
- Convallamarine** DEGLAUDE, 15, bd Pasteur, Paris.
- ***Cophed** 47, rue Bokaowski, Asnières.
- Copraxe** 77, bd de Grenelle, Paris.
- ***Coprex** 120, rue Lecourbe, Paris (XV^e).
- Coqluplaste** COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
- ***Coquelicônes** 24, av. Mac-Mahon, Paris (XVII^e).
- ***Coqueluchyl** 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
- ***Coramine** Lab. CIBA, 103-117, bd. de la Part-Dieu, Lyon.
- Cordicura d'Ott. Candela** 78, bd Beaumarchais, Paris.
- ***Coréine** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- ***Corizol** 24, pl. des Vosges, Paris.
- Coroplasme** 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- Corpogénine** LEBON, Charost (Cher).
- Corps Thyroïde Moncour** 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- ***Cortiode** 7, rue de l'Armorique, Paris.
- Corylase** 105, r. de Rennes, Paris.
- ***Coryphédrine** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Coryza-Ouate** 14, av. de Paris, Biarritz.
- Cosmargyre** THÉVENOT, 21, r. des Roses, Dijon.
- CratæGINE** 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
- ***Cratægol** 14, rue Eug.-Delacroix, Paris.
- Cratægiode** 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- CratæGus Bocquillon** 10, rue du Bac, Paris.
- ***CratæGus Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
- Crayon à la chrysarobine Vigier** 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- Crayons Antifissure** DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
- Crayons Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Crayons néothorium Millot** 177, rue de Courcelles, Paris.

Crayon Thermosan
***Crayons Thomas**

Créacalcine
***Créagénol orbière**
Créatine Aubert

Créatonine

***Crédone Dehaussy**
Crémasepta
***Crème de Bismuth**
Quesneville

Crème de Bichlor.
magnésienne

Crème de lainine Vi-
gier

Crème de Lait Nutricia
Crème de Lygie

***Crème de Nujol (voir**
Nujol)

Crème de quinine Sa-
polan

Crème Diadermine

Crème Graziana

***Crème Mégève**
Crème Probios anti-
pyogène

***Crème résolutive du**
D^r Rap

Crème Stéar
Crèmes-Vaccin

Crémolax
Crémo-plastol Dumes-
nil

***Créoformine**

***Créofruits**
Créogarlic
Créoline Pearson

***Créosal Dubois**

***Créositaires**

***Créosoforme Lam-**
biotte Frères.
Créosote soluble Va-
cheron

***Créo-suppo-camphre**

Crêpe Eglanos
***Crêpe Velpeau**

30, rue Singer, Paris.
 Lab. du Donagol, Péronne
 (Somme).

3, pl. Jussieu, Paris.

27, r. Desrenaudes, Paris.
 D^r AUBERT, 3, pl. Jussieu,
 Paris (V^e).

D^r AUBERT, 3, pl. Jussieu,
 Paris.

50, rue Nationale, Lille.

D^r LALAURIE, Cuxac-d'Aude.
 L. COLLESSON, 5, rue d'An-
 goulême, Paris.
 (Voir Bismuth.)

12, rue de Buci, Paris.
 (Voir Bismuth.)

9, rue de la Gare, Levallois.

142, r. Fransman, Bruxelles.

BEAUGOURDON, 43, av. Klé-
 ber, Paris.

98, rue de Sèvres, Paris.

29, rue Singer, Paris.

60, rue Étienne-Dolet, Malakoff
 (Seine).

15, rue Catulienne, St-Denis.

9, rue de la Gare, Levallois.

8, rue Saint-Martin, Paris (IV^e)

29, rue Singer, Paris.

34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône)
 CREUZÉ, 74, rue de Lourmel,
 Paris.

57, rue du Cherche-Midi, Paris.

10, rue du Plâtre, Paris.

18, rue de Jouvence, Dijon.

Rte du Moulleau, Arcachon.

15, av. Parmentier, Ivry.

J. MIDY, 41, rue de Courbevoie,
 La Garenne (Seine).

(Voir Sirop Dubois au Créosal).
 Lab. MARGEX, 13, r. Mélingue,
 Paris.

20, r. Dumont-d'Urville, Paris
 (XVI^e).

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

REBOUL, 62, av. de Paris,
 Villejuif (Seine).

3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).

25, bd Beaumarchais, Paris.
 (Voir Velpeau.)

- Crescogénol**
Crescol
 ***Crésentyll**
Crésolargol
 ***Crésophanyl**
 ***Crésopirine**
 ***Crésotanol**
Crésyl Jeyes
 ***Crinex**
 ***Crinhémol**
Crinocalcine
 ***Crinocardine**
 ***Crinoflux**
 ***Crino-Menstryl**
 ***Crinopancrine**
 ***Crino-Sérum**
 ***Crinosthényl**

Crinothéine
 ***Crisalbine**

Cristolax

Croquettes Marida
 ***Cruzol**

Crynol
 ***Cryogénine Lumière**
 ***Cryosan**

 ***Cryptargol Lumière**
 ***Crypthermol**
 ***Crypthiol**

Cryptos

 ***Cryptosote Neda**
 ***Cryptotoxyl**

 ***Crysiodal**

Crystol
Cupraneo Leisyn
 ***Cupranine**
 ***Cuprase-Ducatte**
 ***Cupremone F**
 ***Cupremone simple**
 ***Cupressiode**
Cupressus Dausse
Cuprifer
Cuprinal
Cuprinol

Cuprion
 ***Cuprobact**
- 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
 35, r. de Fr.-Bourgeois, Paris.
 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
 Lab.DEMASLES, Vienne (Isère).
 HATIER, à Saint-Étienne.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 41, rue Germam, Lyon.
 7, rue Biscornet, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 passage des Princes, Paris (II^e).
 FOURNIER, 7, rue Biscornet,
 Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 151 bis, route de Joinville,
 Champigny (Seine).
 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.
 MONIN, 49, rue de Maubeuge,
 Paris.
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 Lab. Lorrain de Produits purs,
 Etain (Meuse).
 45, rue Villon, Lyon.
 50, rue Nationale, Lille.
 RENARD, 35, rue de Paris,
 Clichy (Seine).
 4, av. Maurice-Berteaux, Poissy
 (Seine-et-Oise).
 134, cours de Verdun, Bordeaux.
 14, r. des Guillemites, Paris
 (IV^e).
 La Biothérapie, 5, rue Paul-
 Barruel, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 P. V. Léger, St-Pourçain (Allier).
 191, rue Saint-Honoré, Paris.
 GOUIN, 20, r. des Écoles, Paris.
 id.
 6, rue Dombasle, Paris (XV^e).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 à La Ferté-Macé (Orne).
 BÉRTRAND, Nomexy (Vosges).
 Labor. DULCIS, pl. Clichy
 Monte-Carlo.
 18, av. Hoche, Paris.
 7, rue Saint-André, Le Mans
 (Sarthe).

- Cuprocithine**
 * **Cuproformine**
Cupro-Génitol
 * **Cupro-Glycol**

Cupro-Salyl
 * **Cuprosténol**

 * **Cuproxil**
Curalgine

Curalsine
Curaluès D^r Lafay
 * **Curamida**

Curandra (onguent, ovules)
 * **Curasme**

 * **Curatine Brunet**
Curatoxine
Curgol Vicario
Curiodé
 * **Curiosan**

Curocalcine
 * **Curogène**
Curospasm
Curovaccins atoxiques
Cépède (Voir Vaccinothérapie)
 * **Curoveinyl Gef**
 * **Curoxyure**
 * **Curozéma**

 * **Cuscutine Foulon**
Custodine
Cutidermine
Cutiphile

Cutiplaste
 * **Cutisanine**

 * **Cutobronchyl**
Cutopralgine

Cyalène
Cyanargyre

Cyanauroil du D^r Gigon
 * **Cyanhermine**
Cyanhermyl Dalin
Cyanovaïne
Cyanure indolore Ercé
 * **Cynabiline**
 * **Cynara Rosa**
- GRÉMY, 14, rue Clichy, Paris**
17, rue Soufflot, Paris (V^e).
198, av. du Maine, Paris.
2, place de la Duchesse-Anne, Nantes:
5, rue d'Angoulême, Paris.
24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
26, r. Gay-Lussac, Paris (V^e).
P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
27, rue Planchat, Paris.
54, ch. d'Antin, Paris.
A. CHAPPELLIER, à Champagnac-le-Vieux (Hte-Loire).

71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
260, rue de Rosny, Montreuil (Seine).
23, rue des Ecoiffes, Paris.
114, r. du Temple Paris.
17, bd Haussmann, Paris.
17 bis, av. Parmentier, Paris.
43 45, rue des Fauvelles, Courbevoie.
11, bd de Strasbourg, Paris.
145, r. Yves-Le-Coz, Versailles. Saint-Sever (Landes).

60, rue Mathurin-Régnier, Paris.
269, rue Judaïque, Bordeaux.
Lab. B. E. A., Belfort.
Lab. VALTRY, 122, Champs-Élysées, Paris.
20, fg Poissonnière, Paris.
24, rue Flégier, Marseille.
10, av. de Wagram, Paris.
BRUNEAU, 17, r. de Berri, Paris.

id.
37, rue du Vieil-Abreuvoir, Roubaix.
2, r. Sédillot, Strasbourg (B.-R.).
2, rue Sédillot, Strasbourg (B.-R.).
156, av. Victor-Hugo, Paris.
GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
25, bd Beaumarchais, Paris.
37, r. de la Fédération, Paris.
1, rue de la Martinière, Lyon.
34, bd Beaumarchais, Paris.
37, rue de Bourgogne, Paris.
38, quai des Minimes, Toulouse.
11, rue Roger-Bacon, Paris.

Cynarine Estèbe	à Villefranche-du-Lauragais.
Cynarine Rosa	11, rue Roger-Bacon, Paris.
Cynefluine	199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
Cynhépatil	BENDERITTER, Vendôme (Loir-et-Cher).
*Cynurol Rosa	11, rue Roger-Bacon, Paris.
Cyprol	JANELLE, ph ^{ica} , Sens (Yonne).
*Cyproveinol	18, rue de Beaune, Paris.
Cystitol	57, rue du Cherche-Midi, Paris.
*Cystocône	15, rue des Champs, Asnières (Seine).
Cystocure	CALMELS, Auterive (H.-G.).
*Cystoflorine	« ANGLA », Monte-Carlo.
Cystorénol	16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI ^e).
Cytobaume	8, rue Vivienne, Paris.
*Cytobiase	25-27, rue du Commandant-Ri- vière, Colombes (Seine).
*Cyto-choline Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
Cytomagnésium	OLIVIÉRO, Boulogne-sur- Seine.
*Cyto-Manganol	CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
*Cytopan	54, rue de Paris, Charenton.
Cytophédrettes	27, rue Desrenaudes, Paris.
Cytophédrine	id.
Cytoplasmine Ducatte	191, rue St-Honoré, Paris.
Cytopulmase	21, Grande-Rue, Monfermeil (S.-et-O.).
Cytosal	37, fg. Poissonnière, Paris.
*Cyto-Sérum Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
*Cyto-Sirop	CABASSON, 183, r. de Rome, Marseille.
Cystostyrychnine	27, rue Desrenaudes, Paris
Cytotropines	FOURNIER Fr., 7, rue Bis- cornet, Paris.
Cytuline	18, av. Hoche, Paris.

D

*Daboïne	38, bd Montparnasse, Paris.
Daturasolène	11, rue de Clichy, Paris.
*Debreyrol	L. BAILLEUL, Mortagne (Orne).
*Décholestrol	M. et P. LEDENT, Montreuil-s.- Mer (Pas-de-Calais).
Déclonal	SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

- *Decorpa**
 Defensol B
***Delbiasse**
 Delbosel
***Delcaine Roques**
***Dermalgon**
 Dérniéters
***Demorphène**
 Denisia Brisson
***Denisoline Brisson**
 Dentoline
***Dentoma**
 Dentoryl
 Dentoxyl
***Depressyol**
 Dépuratif Berry
***Dépuratif Chauvin**
 Dépuratif Infantile
 Chauvin
 Dépuratif des Vosges
 Dépuratif Dubreuil
 Dépuratif du Dr Régot
 Dépuratif Dumesnil
 Dépuratif Fuba
 Dépuratif Kromelinck
 Dépuratif Nox
 Dépuratif Rob-Lechaux
 Dépuratif Sainte
 Dépuratif Saint-Michel
 n° 1 et 2
 Dépuratives Mercier
 Dépurhemo
***Dépuriode**
 Dépurlaxyl
***Dépurogène**
***Dépurogène T**
 Dépurose
 Dépursan
***Dercusan**
***Dermacide Porcher**
 Dermadésine
 Dermajie
- 41, rue de Rome, Paris.
 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
 8, rue Vivienne, Paris.
 id.
 36, rue Ste-Croix-de-la-Breton-
 nerie, Paris.
 25, bd Latour-Maubourg, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 BIOLABO, 9, bd Malesherbes,
 Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 id.
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 Lab. G. BEYTOUT, 12, bd St-
 Martin, Paris (X^e).
 3, r Ch.-Gounod, St-Raphaël.
 HAUTDIDIER, 37, rue Galilée
 Paris.
 4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 Aubenas (Ardèche).
 Aubenas (Ardèche).
 21, rue de la Gare, La Broque
 (Bas-Rhin).
 172, rue d'Alésia, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 19, rue Drouot, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 9, place Municipale, Tulle (Cor-
 rèze).
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 41, route de Turin, Nice.
 25 bis, quai de la Bibliothèque,
 Lyon.
 ANGELINI, 61, rue de Seine,
 Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon
 2, place des Vosges, Paris.
 id.
 r. des Marchands, Apt (Vaucluse).
 23, bd Ray.-Poincaré, Bar-le-
 Duc.
 Lab. SASSE, 78, bd Beaumar-
 chais, Paris.
 35, rue des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 41, rue Saint-Pierre, Caen.
 R. MONIMART, 23, rue du
 Grand-Cerf, Meaux

Dermal Hanbro	Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes.
Dermaline Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Dermaline Demeule-naere	KERFYSER, 25, rue de Calais, Dunkerque.
Dermathorium Rhem-da	51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).
Dermatyon	L. GODART, Andenne (Belgique).
Derméon	3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
Dermobel	20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
*Dermodulcis	85, cours Albert-Thomas, Lyon.
*Dermofagine	15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
Dermogène	10, rue de l'Union, Clichy.
Dermolène	158, Promenade de la Corniche, Marseille.
*Dermolive	19, rue de Pontevès, Marseille.
*Dermoplastol	10, rue du Plâtre, Paris.
Dermopode	Évreux (Eure).
Dermoradol	Établ. LABORADIUM, 33, r. St-Jacques, Paris.
Dermo-rhinhistol	2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux, Paris.
Dermoschistol	LECRONIER, Domfront (Orne).
*Dermose	Lab. SASSE, 78, bd Beaumarchais, Paris (XI ^e).
*Dermosplénine	14, rue des Minimes, Paris.
Dermosufrol	44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
Dermotyl	Le Naour, Quimperlé (Finistère).
Dermovse	R. KLEIN, Baccarat (M.-et-M.).
*Derphyl	Lab. A. BAILLY, 15, rue de Rome, Paris (VIII ^e).
*Desartyl (ex-Detensyl)	8, avenue Walkanaer, Nice.
Désensibilisant Chauvin	Aubenas (Ardèche).
Désensibilisant Infantile Chauvin	Aubenas (Ardèche).
*Désensibilysine	BÉLIÈRES, 19, r. Drouot, Paris
*Desitin	8, rue La Fayette, Paris (IX ^e).
Desitinol	Id.
*Détergine	D ^r BOURDEAU, à Parthenay.
Dexiode	7, r. de la République, Puteaux (Seine).
Dexogyne	DEXO, 7, r. de la République, Puteaux (Seine).
*Dexoplasma	7, r. de la République, Puteaux (Seine).
*Dextrosol	29, rue de Berri, Paris.
Diabétalim	2, rue de Compiègne, Paris.
*Diabétifuge	21, rue Chaptal, Paris.
*Diabétosan	48, rue d'Alésia, Paris.
Diabétuline	V. CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).

- *Diachusine** 142, rue de Picpus, Paris.
 (Voir Vernis à la Diachusine.)
***Diadermine** 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
***Diagnothorine** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
***Dial Ciba** 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
Dialine C. I. P., 128, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Dialyl Brunot** 16, rue Boulainvilliers, Paris.
Dialyses Golaz 4, rue Bellart, Paris.
Diardyscol 86, bd Port-Royal, Paris.
Diasclérol 26, rue Norvins, Paris.
***Diasés** PROGIL, 10, quai de Serin, Lyon et Ris-Orangis (S.-et-O.).
Diasténine Gremy 14, rue de Clichy, Paris.
***Diastogène** 50, rue Nationale, Lille.
***Diasto-Pepsine Richepin** Lab. Dr TISSOT, 31, bd de Clichy, Paris.
Diatergol 2 et 2 bis, rue de Solférino, Paris.
***Diathermie** La Verrerie Scientifique, 12, av du Maine, Paris.
***Diathès « Mètère »** 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne (Seine).
***Diatol** Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
Diatonine 2 et 2 bis, rue de Solférino, Paris.
***Dibromotyrosine** 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
***Dicaliode** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
***Dicodéine Lafran** 8, rue de Prague, Paris.
***Didial Ciba** 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
***Diéménal** 18, rue de Beaune, Paris.
***Diénol** 18, rue de Beaune, Paris.
***Dientyl** INAVA, 14, r. de Normandie, Asnières (Seine).
***Digalène Roche** 10, rue Crillon, Paris.
***Digastrine** 11, rue St-Agricol, Avignon.
Digeryl 33, rue du Bois, Vincennes.
Digestal CHENU, Montferrand (P.-de-D.).
Digestif Capmartin 7, rue Charlot, Paris (VIII^e).
Digestif Dal 36, rue de Verdi, Nice.
Digestif Goy 23, rue Beautreillis, Paris.
***Digestif Harvey** 101, av. Paul-Doumer, Rueil (S.-et-O.).
Digestif Henry 39, rue Sclessin, Liège.
Digestif Maulin 50, r. de la République, Puteaux.
Digestif Pinel à Bonnelles (Seine-et-Oise).
Digestif Polvi 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
***Digestonic** Produits Scientia, 21, r. Chap-tal, Paris.
Digestose BATTUT, à Vatan (Indre).
***Digex** 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
***Digibaïne Deglaude** 15, bd Pasteur, Paris.
***Digicardine** Lab. IMMUNOS, av. des Sources, Nice.
Digicardine quininée id.

- *Digifoline Ciba** 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
***Digi-Lanatine** 8, rue Favart, Paris.
***Digilanide** 20, rue Vernier, Paris.
***Digi-mial-baine** 8, rue Favart, Paris.
***Digistabiline** P. C. B., 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
Digitale Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
Digitale Ecalie 98, rue de Sèvres, Paris.
Digitaline Homolle & Quévenne 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
***Digitaline Invar** 25, bd Beaumarchais, Paris.
Digitale Labelonye 21, rue Chaptal, Paris.
***Digitaline Mialhe** 8, rue Favart, Paris.
***Digitaline de Nativelle** 27, rue de la Procession, Paris.
Digitalis Purpurea OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Dilodoforme Taine 9, rue de la Perle, Paris.
***Diiodotyrosine Byla** 26, avenue de l'Observatoire, Paris.
***Diiodotyrosine Roche** 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
***Dilubyl** Lab. A.-G. BERTON, 61-63, r. Danrémont, Paris (XVIII^e).
***Dimétol Vicario** 17, bd Haussmann, Paris.
Dimol Bois-Colombes (Seine).
***Dinitra** 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
***Diocamphine Borne** 79, rue de Paris, Saint-Denis (Seine).
Diocol 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
***Dionine Borne** 79, rue de Paris, Saint-Denis (Seine).
***Dionol** FLEURY, Arcachon (Gironde).
Dio-Quint 74, r. de La Fère, St-Quentin (Aisne).
***Diorine** PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
***Dioséine Prunier** 1, quai Aulagnier, Asnières.
***Dipentyl** 42, bd Saint-Marcel, Paris.
***Diphasol** 57, bd A.-Briand, Champigny (Seine).
Dippol 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
Dismenine Henry 39, rue Sclessin, Liège.
Disménol SAUTER, Bellegarde (Ain).
***Dismine Favrot** Lab. H. FERRÉ, 6, r. Dombasle, Paris.
Disolurane 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
***Disonyl** 97, rue Vaugirard, Paris.
Disurol 42, rue des Martyrs, Paris.
Disuryl 23, rue des Moines, Paris.
Ditagel 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
Dithioléine 157, rue Championnet, Paris.
***Dithioral** 145, bd Haussmann, Paris.
Diumnal TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Diurédause 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

Diuregan	11, square Marie-Louise, Bruxelles.
Diurégine	CHARRET-TOMASI, St-Just-sur-Loire (Loire).
Diurélax	111 bis, rue de Turenne, Paris (III ^e).
*Diurène	15, rue d'Argenteuil, Paris.
*Diuréphédrine	THORAL, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
Diurésinol	1, rue des Augustins, Perpignan.
Diurétique Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Diurétique Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
*Diurobromine	9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
*Diurocalcine Gros	13, pl. Delille, Clermont-Fd-id.
Diurocalcine iodurée	9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
*Diurocardine	id.
*Diurocystine	45, bd Lafayette, Calais.
Di-Uroïdine	Lab. LORTHIOIR, 22, r. Perceval, Paris (XIV ^e).
*Diurophyte	JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
Diurotonine	SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Dmégon (Néo)	id.
*Dmelcos	id.
Dmesta (Néo)	id.
Dmetys (Néo)	id.
Docteurine	Lab. VIGNAL, DEJOUX & RAOUX, Périgueux (Dord.).
Doganol	23, rue de Douai, Lille (Nord).
Dolental	187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
Doliseti	157, rue Championnet, Paris
*Doloma	29, pl. Bossuet, Dijon.
*Dolophos	COLMANT, à Caudry (Nord).
Dolosol	FOIRET, à Montargis (Loiret).
*Dolozymes	Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
*Dolpyc	78, avenue de St-Ouen, Paris (XVIII ^e).
*Dolysine Rochereau	Salbris (L.-et-Ch.).
Domnol	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
*Donagol	THOMAS, à Péronne (Somme).
Donaline	id.
Dontera	id.
*Do-Sa-No-Sal	42, r. du Mont-Cenis, Paris.
Dosarter	156, rue des Fauvelles, Courbevoie.
Dosotol	54, rue de Paris, Charenton.
*Dosurine (Trousses)	16, rue Charlemagne, Paris.
Doxa	JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
Dozéol Deglaude	15, bd Pasteur, Paris.
Dracoline	5, av. Boissier, Nantes.
*Dragécalcion	DUC, 24, avenue Mac-Mahon, Paris.

- Dragées Adrian** 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
Dragées anticatar-
rhales du Dr E. Du-
hourcau 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes.
Dragées aux Algues
Marines 6, rue Berbisey, Dijon.
***Dragées Bengué** 16, rue Ballu, Paris.
***Dragées Blagny** Pamela, 85, rue Turbigo, Paris.
Dragées Bondonneau 49, r. de Bitché, Courbevoie.
Dragées Calm 98, rue Jeanne-Maillotte, La
 Madeleine (Nord).
Dragées Carbonel 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Dragées de Charbon
Fraudin 4, av. Desfeux, Billancourt
 (Seine).
Dragées de fer Cognet 43, r. de Saintonge, Paris.
Dragées de fer Rabu-
teau COMAR & C^{ie}, 20, rue des
 Fossés-St-Jacques, Paris.
Dragées gargarisme de
Luchon SAUBA, Montreuil, Paris.
Dragées de Mastho-
phile Annie Montbron (Charente).
Dragées Demazières 131, rue de Vaugirard, Paris.
Dragées de Frasion 14, rue Eug.-Delacroix, Paris.
Dragées de Royat 26, av. de Royat, Chamalières-
 les-Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
Dragées d'iodurine OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
Dragées Dubourg 43, rue de Saintonge, Paris.
Dragées Eige 40, av. Secrétan, Paris.
***Dragées Elkin** DÉPRUNEAUX, 18, rue de
 Beaune, Paris.
***Dragées Gelineau** MOUSNIER, 28, r. Velpeau,
 Antony (Seine).
Dragées Fernel 76, bd Haussmann, Paris.
Dragées Gesta 43, av. de la République, Paris.
Dragées Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Dragées Grimaud La Courtine (Creuse).
***Dragées Hecquet** 49, bd Port-Royal, Paris.
Dragées hépatiques OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
Dragées Japat 252, fg St-Martin, Paris.
***Dragées Lebrun toni-**
cardiaques 155, bd Magenta, Paris (IX^e).
***Dragées Lumeval** 52, bd du Temple, Paris.
***Dragées Mannet** Loudun (Vienne).
Dragées menthol-bo-
rax, cocaïne OPTIMA, Grande-Rue au Bois,
 Bruxelles.
***Dragées Névrosthé-**
miques « Yse »
Dragées Northon 65, rue Louis-Blanc, Paris.
Dragées Nyrdhal GACHAT, Evian-les-Bains
 (Haute-Savoie).
Dragées Pautauberge 12, r. de la République, Puteaux.
Dragées Phlébos 10, r. de Constantinople, Paris.
 229, cours Gambetta, Lyon.

- Dragées pulmonaires**
 Giry 49, rue de Metz, Nancy
Dragées St-André-Mayniel 85, rue Turbigo, Paris.
Dragées Sédocardiaques Pélissier 33, av. de Villiers, Paris.
Dragées Séranti R. St-Maurice, Nanterre (Seine)
Dragées Somedo à Meudon (Seine-et-Oise).
Dragées Tasch 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
Dragées Vityl 72, quai Jemmapes, Paris.
 ***Dragélines** Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
 ***Dragurol** 13, rue Boïnod, Paris.
 ***Drainobyl** Lab. du Dr LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, et 69, r. de Provence, Paris (IX^e).
 ***Drainochol** 95, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).
Drainosel 73, rue de Balagny, Paris.
 ***Drinal** MIRONNEAU, Chef-Boutonne (Seux-Sèvres).
Droséfruits Route du Moulleau, Arcachon.
 ***Drosol** J. Boutes, Muret (Hte-Garonne).
Dryam-Microlysate 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 ***Dryco (Lait sec)** 5, rue Saint-Roch, Paris.
Dryol 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Dulcilax Lab. TINARD, 134, bd Pereire, Paris (XVII^e).
Dulcrem Quiétiéville, par Mézidon Calvados).
 ***Duna-caine (Bains de bouche)** 17, rue de Berri, Paris.
 ***Duna-cainol** id.
Duodénase 12, rue de Nice, Paris.
Dusart (sirop, solution) 8, rue Vivienne, Paris.
Dymozyl 40, rue des Carmes, Orléans.
Dynabiose 6, rue d'Alsace, Grenoble.
Dynaïode 66, rue d'Hauteville, Paris.
 ***Dynamine Connat** FOLLIET, Rumilly (Hte-Savoie).
Dynamoferol PIALOUX, 55, rue de Chabrol, Paris.
 ***Dynamogénine** Boîte Postale, 33, Aix-les-Bains (Savoie).
Dynamose 84, fg. du Temple, Paris.
Dynasthénine MARTIN, Bordeaux-Cenon (Gironde).
Dynavone 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Dynos 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 ***Dynosthène** CABASSON, 183, r. de Rome, Marseille.
Dyspepsia 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
 ***Dyspeptine Hepp** Le Chesnay (Seine-et-Oise).
Dyspeptol PATRICE, Vichy.
 ***Dyspné-Inhal** 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
 ***Dysthène** 47, rue Bokanowski, Asnières.

- *Dystonine
 Dysurol
 Dyuril
- 45, r. Cambronne, Paris (XV°).
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon
 Boulogne-sur-Mer.
- Eatan
 *Eau de Charrier
- Eaux de Châtel-Guyon
 Eau de Lorraine
- Eau d'Enghien
 Eau Sova
 *Eaux-Mères
- Ebanyl
 Ectiazol
 Ectobiase Bonnay
- *Eczéda
- Eczémacure
 Eczémine
 *Eczosec
- Edalginé
 *Edistol
 Edo-vaccins
- *Edricamphre
 *Eductyl
 Edulcoral
 Efflozone Labocip
 *Égidol
 Egralene
- Eitreb-embrocation
- *Ektal
 *Ektogan
 *Ektophanol
 *Elastoplaste
 *Elatine Bouin
- Elbon Ciba
- 34, rue Vignon, Paris.
 Laprugne (Allier) et 24, av. de
 l'Opéra, Paris.
 6, square de l'Opéra, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 10, rue Caumartin, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 Établ. Thermal, Salles-du-
 Salat (Haute-Garonne).
 59, rue Nollet, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 112, Grande-Rue, Nogent-sur-
 Marne (Seine).
 35, rue des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 121, av. Saint-Ouen, Paris.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 35, rue des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 40, rue des Carmes, Orléans.
 Vierzon (Cher).
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
 PATRICE, à Vichy.
 82, av. de Suffren, Paris.
 74, rue Blanche, Paris.
 P. BRISSON & C^{ie}, 157, rue
 Championnet, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 SEGUIN, 7, r. Ste-Isaure, Paris.
 12, rue Lamartine, Paris.
 19-21, rue Van-Loo, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 44, rue d'Aguessau, Boulogne-
 sur-Seine.
 103-117, boul. de la Part-Dieu,
 Lyon.

Electralgine	Vierzon (Cher).
*Electrargol Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Electrauroil Clin	id.
Electrocuprol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro Hg	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromanganol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromartiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electropalladiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-platinol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-Rhodiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electrosélénium	COMAR & C ^{ie} , id.
*Elédon	Soc. NESTLÉ, 6, av. César-Caire Paris.
Eleodermine	4, av. de Bayonne, Pau.
*Eligine Julien	105, rue de Rennes, Paris.
*Elipol	DROUET & PLET, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).
*Elixir Bonjean	FAURE & DUSSUEL, Aix-les-Bains.
Elixir Bravais	56, bd Ornano, Paris.
Elixir Bryol	97, av. Ledru-Rollin, Paris.
Elixir de Catéchiode	16, rue du Petit-Musc, Paris.
Elixir de Larsa	77, bd de Grenelle, Paris.
Elixir de Pepto-Cardine	5, av. des Tilleuls, Paris.
Elixir dépuratif aux Algues Marines	6, rue Berbissey, Dijon.
*Elixir Déret	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Elixir digestif de pep-sine Grimault	8, rue Vivienne, Paris.
*Elixir Duchamp	Lab. DE GRAUWE, La Plaine-St-Denis (près Paris).
*Elixir Ducro	20, pl. des Vosges, Paris.
*Elixir du Dr Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Elixir Duret	12, rue de Nice, Paris.
*Elixir Dussaud	1, rue Fondère, Marseille.
*Elixir eupeptique Tisy	GUILLAUMIN & GÉRARD, 12, rue Charles-V, Paris.
Elixir eupnéique Martin Mazade	Saint-Raphaël (Var).
Elixir de fer Kœnig	37, av. Marceau, Paris.
Elixir Fleig	18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
Elixir Gabail	5, rue Lefebvre, Paris.
Elixir Glover	13, rue des Minimes, Paris.
*Elixir Godfrin	6, r. de Paris, Joinville-le-Pont.
*Elixir Grez	49, rue de Maubeuge, Paris.
Elixir hépatique Henry	39, rue Sclessin, Liège.
Elixir Houde	9, rue Dieu, Paris.
*Elixir Hymel	DUTEIL, 90, av. de St-Ouen, Paris.
Elixir I. A. M.	18, bd de la Liberté, Rennes.
Elixir iodépuratif Pépin	116, bd Haussmann, Paris.
Elixir Koff	BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
Elixir Lyctine	42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.

- *Elixir Mannet**
 Elixir Mannet à l'Io-
 dure de Potassium
 Elixir Mannet à l'Io-
 dure de Sodium
 Elixir Mannet au Salol
 Elixir Mariani
 Elixir Morlas
 Elixir Percy
- Elixir Phospho-Mel
 Elixir polybromuré
 Baudry
 Elixir polybromuré
 Yvon
- *Elixir Rodi**
 Elixir Seda
 Elixir Spark
***Elixir Spes**
 Elixir supertonic Stel-
 la
 Elixir du D^r Thermes
- Elixir thiogalacolé Ar-
 quevaux
 Elixir Tonicardiaque
 Roussel
 Elixir tribromuré Man-
 net
- *Elixir Valéro-bromuré**
 Elixir vermifuge All-
 vers
 Elixir vermifuge Chia-
 rini
 Elixir Virenque
 Elixir de Virginie Nyr-
 dhal
 Elixir Vital Quentin
 Elixir Zidal
- *Elkin Dragées et Gra-
 nulé**
 Elzévir Dentition
- *Embrocane**
 Embrocation Richer
 Embrocation Roche
- Embrocation Salas
 Embrocation Siamoise
- *Embryohormone**
***Embryochoe**
***Embryocytol**
***Embryol**
 Embryonine du D^r
 Barré
***Embryotonyl**
 Emencyl
- Loudun (Vienne).
 Loudun (Vienne).
 Loudun (Vienne).
 Loudun (Vienne).
 41, bd Haussmann, Paris.
 Passage des Princes, Paris (II^e).
 145, chem. de la Madrague-de-
 Montredon, Marseille.
 2, pl. Duchesse-Anne, Nantes.
 8, rue Vivienne, Paris.
 5, rue Robert-Planquette Paris.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 Produits Dannec'h, 64, rue des
 Tournelles, Paris.
- Étampes (Seine-et-Oise).
 10 rue Washington, Paris.
 Loudun (Vienne).
 (Voir Valérianate Gaball.)
- DOMERGUE, Agen (L.-et-G.)
 Aix-en-Provence.
 131, rue Vaugirard, Paris.
 12, r. de la République, Puteaux.
 28, rue Velpeau, Antony.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 DÉPRUNEAUX, 18, rue de
 Beaune, Paris.
 H. SALLÉ, 4, r. Elzévir, Paris.
 Saporta, 59, bd Lefebvre, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 132, rue de Turenne, Paris.
 M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).
 191, fg St-Antoine, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 82, rue Desrenaudes, Paris.
 id.
 HAMEL, 10, pl. Thiers, Le
 Mans.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).

- Emerson's Bromo-Seltzer** 62, av. Champs-Élysées, Paris.
- Emétinol Viel** 7, rue Saint-Yves, Rennes.
- *Emgé Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
- Emonctine** G. BAUDE, St-Aubert (Nord).
- Emollian** rue Faidherbe, Lille.
- *Emplâtres R. Cavaillès** 29, rue Singer, Paris.
- Emplâtre Duret** 61, rue de Vaugirard, Paris.
- Empyrol** Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- Emulsion Bonnefond** MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
- Emulsion Marchais** 11, pl. Castellane, Marseille.
- Emulsion Scott** SECLO, 6, rue Ad.-La Lyre, Courbevoie (Seine).
- *Encytal Cordonnier** LABIOLA, 52, rue de Cambrai, Lille.
- Endocaïne** 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
- *Endocaïne-Adrianine** 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Endocalcase** 74, rue des Jacobins, Amiens.
- Endocalcine** 3, bd Beaumarchais, Paris.
- Endocrisines Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
- Endodermol** 42, av. de Draveil, Vigneux-sur-Seine (S.-et-O.).
- *Endolacgénine** 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
- *Endo-Ovarina** 25, rue Dagorno, Paris.
- *Endopancrine** 48, rue de la Procession, Paris.
- Endoplex Polvi** 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
- *Endothymusine** 48, rue de la Procession, Paris.
- Endoxène** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Endoxidine** 25, rue Dagorno, Paris.
- Energésines** 276, rue Lecourbe, Paris.
- Energétènes végétaux** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Byla** ALPHA, Montreux-le-Ch. (Ht-Rhin).
- Energétyl** 10, rue du Bloc, Amiens.
- *Energine Iodée de Berck** 10, rue du Bloc, Amiens.
- *Energine Phosphorée de Berck** 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- Energinoze D^r Fraysse** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Enésol Clin** 22, rue de Vienne, Paris.
- Engeluroil** 2, rue Duphot, Paris.
- *Eniode Lefebvre** 37, r. de Bourgogne, Paris.
- Ennego** 4^{ter}, rue Barbès, Courbevoie.
- *Eno** LUMIERE, 45, r. Villon, Lyon.
- Entalva** CH. LAVERGNE, r. de Rome, Cannes (Alpes-Marit.).
- Entaseptine** 24, bd Sébastopol, Paris.
- Entelactol** 143, Cours de la Somme, Bordeaux.
- *Entérargol** 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- *Entéraspirine** BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
- Entéricure** 39, rue de Clichy, Paris.
- *Entériode** 112, r. de Gerland, Lyon.
- Entérisane** 31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Entéro-Antigènes**

- *Enterobyl Dehaussy 50, rue Nationale, Lille.
- Entérochir LECLERC, 10, r. Vignon, Paris.
- *Entérococcène CARRION, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
- *Entérodausse et Enté-
rodausse calcique 4, rue Aubriot, Paris.
- *Entérofagos 8, av. Walkanaer, Nice.
- Entéroformine 141, rue de Paris, Angoulême.
- Entéroglandex 58, rue de Maubeuge, Paris.
- *Entérohépatine 77, bd de Grenelle, Paris.
- Entéromucine 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Entéropansement du 24-26, rue de Fécamp, Paris
D^r Zizine (XII°)
- Enterophage 10, rue Vignon, Paris.
- Entérorubiase 14, av. Perrichont, Paris.
- *Entérosalicyl id.
- *Entéroseptyl 78, bd Beaumarchais, Paris.
- *Entérovaccin Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- *Entéro-Vaclydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
- *Entéro-Vioforme CIBA, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
- *Entéroxin 10, rue Vignon, Paris.
- Entérozinc JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- Entérozone 56, bd Péreire, Paris.
- Entérozyme 52, rue Labruyère, Paris.
- Entéryl FALQUE, Besançon.
- *Enzypan ALEXANDRE, 41, r. de Rome, Paris.
- *Epanal 47, rue de Bretagne, Paris.
- Eparseno 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Ephargol GUY SIMON, 44, rue d'Inker-mann, Lille.
- *Ephasma 50, rue Nationale, Lille (Nord).
- *Ephédermine 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédraféine id.
- Ephédramélis 20, av. J.-Jaurès, Suresnes (Seine).
- *Ephédrampoules 194, rue de Rivoli, Paris.
- Ephédrargol 99, bd Lafayette, Calais (P.-de-Calais).
- *Ephédrasmine THORAL, Le Mont-Dore (P.-de-D.).
- *Ephédrine Béral 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédrine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
- Ephédrine Proba FALVY, 40, rue des Acacias, Paris.
- *Ephédrisol 194, rue de Rivoli, Paris.
- *Ephédrivaine 2, rue Mélingue, Paris.
- Ephédrocamphre 16, r. Henri-Regnault, Courbe-voie (Seine).
- *Ephédrocure 2, rue Mélingue, Paris.
- *Ephédroides Béral 194, rue de Rivoli, Paris.
- Ephédrol 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- *Ephédrolénol 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.

- *Ephédrolénol Aqueux** 24, Bd J-Jaurès, Boulognes/Seine
***Ephédrolyptol** id.
***Ephédromel** 194, rue de Rivoli, Paris.
***Ephédro-rhinol** 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
***Ephéiodine Béral** 194, rue de Rivoli, Paris.
***Ephétropine Béral** 194, rue de Rivoli, Paris.
Ephodol 156, av. Victor-Hugo, Paris.
***Epholéine** 40, r. des Acacias, Paris.
***Ephydion** 18, bd de la Liberté, Rennes.
***Epical** LAMBERT, 6, rue de Long-
 champ, Vichy.
Epidermin 112, rue de Gerland, Lyon.
Epidosine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
Epinesthol 33, rue Vaugirard, Paris.
***Epipaline** 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
Epoqualine François 16, c. Gambetta, Lyon.
***Equisétol** 59, rue Boissière, Paris.
***Eranol** 45, rue de l'Échiquier, Paris.
Eranyl SANSON, Mer (Loir-et-Cher).
Erцерhinol 37, rue de Bourgogne, Paris.
Ergényl 1, pl. du Griffon, Lyon.
***Ergépatine** St-Just-en-Chaussée (Oise).
***Ergocoline** 32, rue de l'Ouest, Paris.
Ergophédrine CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
***Ergophos** 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
***Ergorone** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
Ergostol Violet REBOUL, 62, av. de Paris,
 Villejuif (Seine).
Ergot de seigle Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
***Ergotine Bonjean** SCIENTIA, 21, rue Chaptal,
 Paris.
Ergotine Lamante M. PARIS, 1, r. Lassalle, Lyon.
Ergotine Yvon 5, rue Robert-Planquette, Paris.
Ergotinine Tanret 10, r. du Comte-Rivière, Paris.
Ergotinine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Erystypticum Roche 10, rue Crillon, Paris.
***Erysulfure Eon** Dinan (Côtes-du-Nord).
***Erythéma** 139, rue Jean-Jaurès, Maisons-
 Alfort (Seine).
***Erythra** 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
Erythraseptol 3, pl. Thiers, Le Raincy.
Erythrolués LECOQ & FERRAND, 14, r.
 A.-Briand, Levallois-Perret.
Erséol Prunier 4, rue de la Coutellerie, Paris.
Esanofèle Bisleri 25, rue Dagorno, Paris.
Escaïne 14, av. Perrichont, Paris.
Esculéol 16, rue Henri-Regnault, Cour-
 bevoie.
Eska 76, rue Orfila, Paris.
Essence Algérienne pl. de l'Entonnoir, Berck-Plage.
Essence Japonaise MAUGER, 79, rue Legendre,
 Paris.

- Essence Landaise**
Essoforme
Etain Amicros
Ether amyvalérianique
***Ether anesthésique**
Adrian
Ether anesthésique
Ether pour narcose
Ether valérianique Vial
Etheforme
***Ethyl-Pneumine Ler-**
sam
Etoléase
***Eubine**
Eucalcium
Eucalcyll
Eucalinal
Eucalypéol Antoine
***Eucalyptine Lebrun**
***Euchol**
Eucortone
Eucratol
Eudermyl
Eudigérase
Eudynol
Euférine
Eufosyl
Eugaline
Eugastrol
Eugéine Prunier
Eugestol
***Euglyma**
***Eugynol Grandval**
Eukénil Clément
Eukinase Carrien
Eumistine Leprince
***Eunéryl**
***Euonymine P. Thibault**
Eupatorine
***Eupaveryl**
***Eupeptique Menavon**
Eupeptyl
Euphélios
***Euphon**
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 G. BRUEL, 36, rue de Paris.
 Colombes (Seine).
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 8, rue Vivienne, Paris.
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 92, bd Murat, Paris.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
 Lab. KOEHL, 18, r. de Ménil-
 montant, Paris.
 50, bd de Paris, Marseille.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 8, rue Vivienne, Paris.
 155, boul. Magenta, Paris.
 Bagnoles-de-l'Orne.
 SCOTT, fg St-Honoré, Paris.
 74, rue de Lourmel, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 11, quai St-Clair, Lyon.
 20, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 r. Albert-Ier, Beaumont-sur-Oise.
 Lab. BOUTROY, 8, r. de Passy,
 Paris.
 4, rue de la Coutellerie, Paris.
 187, rue de Créteil, Maisons-
 Alfort (Seine).
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 12 et 14, rue Féry, Reims.
 7, pas. Thionville, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 BIOLABO, 9, bd Malesherbes,
 Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Lab. d'Allopathie générale, Bri-
 gnaix (Rhône).
 PACHAUT, 130, bd Hauss-
 mann, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 66, r. d'Hauteville, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo Paris.

Euphonol	Aguettant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Euphorine, D ^r	Chaboud	FAURE et DUSSUEL, à Aix les-Bains.
Euphorol	Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
*Euphoryl		18, av. Daumesnil, Paris.
*Eupheryl	Infantile	id.
Euphrénine	Bastia	1, pl. Carnot, Lyon.
Euphysol		22 bis, av. de Saint-Cloud, Versailles.
*Euphytose		Lab. MADYL, 14, rue de Miro-mesnil, Paris.
Euplasmol		VALENTIN, 79, rue de Wazemmes, Lille.
*Euplastyl		13, rue Beudant, Paris.
Eupnéol		THÉVENOT, 21, rue des Roses, Dijon.
*Eupnine	Vernade	r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
*Eupnogénol		116, av. Berthelot, Vienne (Isère).
*Eupnol		26, r. des Moines, Paris (XVII ^e).
Eupnoléine		id.
Eupnophédrol		id.
*Euquinargol		SAUZE, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy (Loire).
*Eurectol		Lab. J. PERROCHON, Tours (I.-et-L.).
Eurexine		D ^r PETIT, 11, rue des Postes, Angoulême.
Eurhéine		7, pas. Thionville, Paris.
*Eurinase		FLEURY, Arcachon (Gironde).
Euronol		15, rue d'Argenteuil, Paris.
Eurythmine	Dethan	11, r. Al.-de-Neuville, Paris.
Eusébine		RADIFER, Nantes (L.-Inf.).
*Eusedyl		32, rue des Vallées, Colombes (Seine).
*Euskiné		45, fg Saint-Denis, Paris.
*Eusomnine	Bélières	19, rue Drouot, Paris.
Eutectyl		108, rue du Maréchal-Pétain, Vichy.
*Eutensyl	Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Euvagol		17, rue Chomel, Paris (VII ^e).
Evaloïne		75, bd de Strasbourg, Paris.
*Evatmine	Carrion	54, fg Saint-Honoré, Paris.
*Evine		15, bd des Batignolles, Paris.
Evoiline		LAFFORT, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
Evolax		27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
*Evolaxine		40, rue de Bellechasse, Paris.
*Evonyl		BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône.
Excyltol		MARTINET, 16, rue du Petit-Musc, Paris.

- *Exentérol
 *Exhépa
 *Exobol
 Exol Cognet
 Exolysés Byla
 Exonagar
 Exonérol
 *Exsugyl
 *Extensoplast
 Extrait antiseptique
 du D^r Wolf
 *Extrait de Bile Le-
 francq
 Extrait de céréales
 Adrian
 *Extrait de Malt Fran-
 çais Déjardin
 Extrait de Malt Grütli
 Extrait du D^r Rap
 *Extrait Hamyd
 *Extrait Hépatique Le-
 francq
 Extraits injectables
 Choay
 Extrait Juvinium
 Extraits Moncour
 Extraits opothérapi-
 ques S. I. C. A.
 Extraits totaux Choay
 Extrait surrénal Meu-
 rice
 Extrait de Yogourth
 Ilgaz
 Exubyle
 DEBAT, 60, rue de Monceau,
 Paris.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne (Seine).
 43, rue de Saintonge, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 8, rue de Passy, Paris.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 VIGIER, 9, r. de la Gare, Le-
 vallois (Seine).
 46, rue des Faures, Bordeaux
 Romainville (Seine).
 9 et 11, rue de la Perle, Paris
 10, r. Parent-de-Rozan, Paris
 (XVI^e) (Voir Malt).
 139, av. de Verdun, Issy-les-
 Moulineaux.
 29, rue Singer, Paris.
 GMET, 27, fg Montmartre,
 Paris.
 Romainville (Seine).
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 sur-Seine.
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 13, rue Nouvelle, Charenton.
 7, rond-point Mirabeau, Paris

F

- Fabérian (dragées,
 ovules, pommades,
 suppositoires)
 *Fanerval
 *Fango Fisch
 *Fantine Adoue
 112, rue des Pyrénées, Paris.
 42, r. Mont-Cenis, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht.-Rh.).
 36 bis, r. Scaliger, Bordeaux.

- Fantol** 22, r. de l'Arsenal, Angoulême (Charente).
- Fantyl Manseau** à Margaux (Gironde).
- Farine de malt Heudebert** 85, r. de Saint-Germain, Nanterre.
- *Farine de Soja «Soyolk»** 25, rue Général-Foy, Paris.
- Farine lactée diastasée Salvy** 4, rue Lambrechts, Courbevoie.
- Farine lactée Heudebert** 85, r. de St-Germain, Nanterre.
- Farine lactée Larousse** 99, Cours Balguerie, Bordeaux.
- Farine lactée Nestlé** 6, av. César-Caire, Paris.
- Farine maltée Vial** 8, rue Vivienne, Paris.
- Farine Mont-Blanc** Rumilly (Haute-Savoie).
- Farines Benedictus** 74, rue Lamarck, Paris.
- Farines de céréales : légumes et fruits** BLOCH, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.).
- *Farines de régime Bloch** à Tomblaine près Nancy.
- Farines Favrichon** St-Symphorien-de-Lay (Loire).
- Farines Maltées Favrichon** St-Symphorien-de-Lay (Loire).
- Farines Maltées Jame** 47, rue Miromesnil, Paris.
- Farines Nutricia** 142, r. Fransman, Bruxelles.
- Farine Redeuil** 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
- Farré-Cure** 29, rue Mogador, Paris.
- Febrifuge Couturieux** 18, av. Hoche, Paris.
- Fébrifuge** MOLIÈRE, à Constantine.
- Fébriline** 4, fg Stanislas, Nancy.
- Fébrosérum Kylna** 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
- *Féculyse Heudebert** 4, rue Lamartine, Nanterre (Seine).
- *Félamine** 20, rue Vernier, Paris.
- Félargent** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Félicol** 10, rue Vignon, Paris.
- *Félisédine** 18, bd de la Liberté, Rennes.
- Félosine** 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine).
- Felsol** pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
- *Féminadène** 120, rue Lecourbe, Paris.
- Féminoglandol** 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Féminose** 7, rue Coq-Héron, Paris.
- *Fénucalcium** 191, fg St-Antoine, Paris.
- *Fénucine** pl. du Châtelet, Orléans.
- Fenugrec Ravin** G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- *Fenugrène** 2, pl. des Vosges, Paris.
- *Fénurobur** ABARNOU, 72, av. Thiers, Le Mans.
- Fer Amicros** 177, r. de Courcelles, Paris.
- Férandrine Vitalis** 38, bd de Charonne, Paris.
- Fer-Arsenic** AUCHER, La Ferté-Macé (Orne).
- Fer-Basma** PALC, Messigny (Côte-d'Or).

***Fer Bravais**

Fer Girard

Fer Henry

Fer injectable Rousse

Fer intraveineux

Fraisse

Période Byla

Fer-ion

Fer Jaquemaire

Fer Larcade

Fer Leras

Fer Manganèse Ami-

cros

Fermentérol

***Fermentéryl**

Ferment Bos

Ferment lactique Van
Lier

Ferment pur de raisins

Ferment pur de raisin

Jacquemin

Ferment pur de raisin

Médicoferment

Ferments immuno-
lactiques

***Ferments lactiques**
Fabre

Ferments organiques
Zévon

***Férogyl**

***Fer-Ovarine Vitalis**

Fer Quévenne

Fer Rabuteau

Ferrocaltiose

Ferrocaltine

Ferrocaltose

Ferrocodile et Ferrico-
dile Leprince

Ferrocol

Ferrogyl

Ferroneurol

Ferropeptone

***Ferrophytine Ciba**

***Ferroxyline**

Ferrygène Carrau

***Ferydal**

Fibrinine

Lab. de GRAUWE, La Plaine-
Saint-Denis (près Paris).

8, rue Vivienne, Paris.

39, rue Sclessin, Liège.

MOUSNIER, 28, r. Velpeau,
Antony (Seine).

8, rue Jasmin, Paris.

26, av. l'Observatoire, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

à Villefranche (Rhône).

23, rue Beautreillis, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

177, r. de Courcelles, Paris.

15, rue d'Argenteuil, Paris.

40, rue des Acacias, Paris.

10, rue de la Viotte, Besançon
(Doubs).

30, r. St-Jacques, Namur (Bel-
gique).

10, rue de la Viotte, Besançon
(Doubs).

à Malzéville-Nancy (M.-et-M.)

10, rue de la Viotte, Besançon.

8, av. des Sources, Nice.

33, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine).

COIRRE, 5, bd Montparnasse,
Paris.

3, bd Beaumarchais, Paris.

40, bd de Charonne, Paris.

26, rue Petit, Saint-Denis.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

164, rue St-Honoré, Paris.

15, rue Cavallotti, Paris (XVIII°)

71, rue du Fort, Aubervilliers.

62, rue de la Tour, Paris.

132, rue de Turenne, Paris.

3, bd Beaumarchais, Paris.

TERMES, à Miramont-de-
Guyenne (Lot-et-G.).

17, rue Cadet, Paris.

103-117, boul. de la Part-Dieu,
Lyon.

26, Gde-rue-St-Clair, Lyon.

34, bd de Clichy, Paris.

ROY, 29, av. Charras, Clermont-
Ferrand.

37, r. de Bourgogne, Paris.

- Fibrogénine**
- Ficabyl**
Fidulax Warin
Figadol Vivien
- *Filhosa**
Filtrat Inosepta
***Filtraxyl**
- *Fixase**
- *Fixase Irradiée**
Fixocalcine
Fixococcine Corbière
Fixogène Loudenot
- *Fixophos**
Flavol-Boeglin
***Flavuroi**
Flébosanine
***Flétase**
***Flétobiol**
- Flocons d'avoine Nutricia**
Floculysine
Floravène
Floréases
Florénal
Florhamélis
***Florhépatine**
Florisana
Florisédyl
Florosine
- *Flor-Peyotl**
- *Fluase**
- *Fludiose**
Fluène
Fluenzyl
Fluérase
- Fluidbos Moyet**
***Fluidobile**
Fluidostérol
- *Fluobyl**
Fluocholine
***Fluodyle**
Fluiformol Gonin
- Lab. HYGIODONTIS, Croissy-sur-Seine (Seine-et-Oise).**
 20, rue du fg Saint-Honoré, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly-sur-Seine.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
Lab. MEXYL, 6, r. des Dames, Paris.
PARET, 28, rue Guibal, Marseille.
 id.
 9, rue Victor-Latalle, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
 151, rue de Charenton, Paris, Hagueneau (Bas-Rhin).
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
DARRASSE, 13, rue Pavée, Paris.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 122, Champs-Élysées, Paris.
MORTIER & C^{ie}, Bordeaux.
 20, fg Poissonnière, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
CAVY, à Montluçon (Allier).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
BADEL, 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme).
Lab. du D^r L. LAFAY, 54, Chaussée-d'Antin, et 69, r. de Provence, Paris.
Lab. ARDISSONE-GAYRAUD, Allauch (B.-du-Rh.).
TÉTARD, à Beauvais.
LANDRIN, 12, r. de la République, Puteaux.
 1. pl. Victor-Hugo, Paris.
FOUCHERE, Rive-de-Gie (Loire).
 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
MICHEL, Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.).
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 38, bd Bourdon, Neuilly-Paris.
 50, rue de Turenne, Paris.
 10, rue Pierre-Ducreux, Paris.
 60, rue Saussure, Paris.

- Fluoganèse
 *Fluokol
 Fluol
 Fluor dia
 *Fluosalyl
 Flusan
 *Fluveinose Mauchant
 *Fluvia
 Fluxhémio
 *Fluxidia
 *Fluxine (gouttes)
 Fœnugol
 Foie - Endocrisines
 Fournier
 *Fokienyl
 Foliavène
 *Follestrine
 *Follicormone buccale
 *Folliculine Crinex
 *Folliculine cristallisée Roussel
 *Follilobine
 Folliovarine Laleuf
 *Fondants de Soufre
 Dausse
 *Fondant Iodotanique
 Dausse
 Forcéase
 *Forcival
 Fordynol
 *Foriod
 Formadermine
 Formagol Bouty
 Formétine
 Formine Adrian
 Formitrol Wander
 *Formobenzyl
 *Formocarbène
 *Formocarbos
 *Formocholine
 46, rue de Rome, Marseille.
 LAFFORT, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 43, av. Kléber, Paris.
 50, rue de Lille, Tourcoing.
 BEAUGOURDON, 43, av. Kléber, Paris.
 132, rue de Turenne, Paris.
 Gennevilliers (Seine).
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 112, rue de Gerland, Lyon.
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e)
 J. BONTHOUX, Villefranche-sur-Saône.
 88, rue Duhesme, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 117, rue de Belleville, Paris.
 STELVIA, 59, rue Boissière, Paris.
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.
 HINGLAIS, 30, rue de Mirosmesnil, Paris.
 1, av. du Dr-Lannelongue, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 FRAYSSE, 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 4, rue Aubriot, Paris.
 GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris.
 13, rue du Général-Foy, Saint-Étienne.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 3, rue Dunkerque, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 9, rue de la Perle, Paris.
 151 bis, rue de Joinville, Champigny.
 50, rue Nationale, Lille.
 TÉTARD, à Beauvais (Oise).
 MILLET, à Rambouillet (S.-et-O.).
 ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

- Formocitrine**
- Formogastrine**
- Formojectine**
- Formoline**
- *Formosaline Houdé**
- Formo-Vaccins**
- *Formule Jacquemaire**
60
- Formyl**
- *Fornose**
- Fortiane**
- *Fortossan Ciba**
- Forvital**
- Foscal Seroxo**
- *Fosfomagnyl**
- *Fosfoxyl Carron**
- *Fosyls Carron**
- *Francalcium**
- *Francoplaste Kraus**
- Frangoléine**
- Frangulose Flach**
- *Franlaxol**
- Freinix**
- *Freinolutéine**
- Freinospasmyl**
prince
- *Frenasma**
- Frène Gmet**
- *Frenovex**
- Frey**
- Frialine Grémy**
- *Frigyl**
- Fructines Vichy**
- *Fructuval**
- *Frugeolines Vichy**
- Fruits de Régimo**
Tilloy
- Fucobiline Prothière**
- Fucodinitrol**
- Fucogem**
- *Fucoglycine**
- Fucoiodine**
- Fucophosphine**
- *Fucosine Prothière**
- Fuculose**
- *Fucus Gmet**
- 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine.
- 21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.
- 112, rue de Gerland, Lyon.
- rue de la Loge, Montpellier.
- 9, rue Dieu, Paris.
- LUCINIA, 154 bis, rue Breteuil, Marseille.
- Villefranche (Rhône).
- 23, r. Valéry-Meunier, Pau.
- Lab. CHAVIALLE, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
- BONNAFÉ, Milhau (Aveyron).
- 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
- BRICHARD & FILS, Bar-le-Duc (Meuse).
- 25, rue Dagorno, Paris.
- 12, rue de Castiglione, Paris.
- 69, r. de St-Cloud, Clamart (Seine).
- 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- 3, rue Saint-Roch, Paris.
- 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- à Aigurande (Indre).
- 6, rue de la Cossonnerie, Paris.
- MYORAL, 3, r. St-Roch, Paris.
- 98, rue de Sèvres, Paris.
- 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
- 62, rue de la Tour, Paris.
- 71, rue Saint-Blaise, Paris.
- 27, fg Montmartre, Paris.
- 1, av. du D^r Lannelongue, Paris.
- 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).
- 14, rue de Clichy, Paris.
- F.Montanton, Buzançais (Indre).
- 1 et 3, r. Lafoque, Vichy.
- Lab. du COMTAT VITICOLE, Avignon (Vaucluse).
- 1 et 3, rue Lafoque, Vichy.
- J. MIDY, 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
- 55, rue Auguste-Comte, Lyon.
- 12, rue de la Boule-Rouge, Paris.
- 38, rue du Louvre, Paris.
- 11, rue Milton, Paris.
- 132, rue de Turenne, Paris.
- COUGET, à Olonzac (Hérault).
- 55, rue Auguste-Comte, Lyon.
- 223, rue Saint-Martin, Paris.
- 27, fg Montmartre, Paris.

*Fucusol	2, pl. des Vosges, Paris.
*Fumar du D ^r Fournier	Saint-Sever (Landes).
Fumigalène	CLÉMET, 5 et 7, r. du Marché, Blaye (Gironde).
Fumigator Gonin	60, rue Saussure, Paris.
Furcol	47, r. Carnot, Versailles (Seine- et-Oise).
Furonculase	24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
Furonculine	COUGET, à Olonzac (Hérault).
Furol	5, r. Chauveau-Lagarde, Paris.
*Furoplast	VIGIER, 9, r. de la Gare, Le- vallois (Seine).
Furosyl	156 r. des Fauvelles, Courbevoie.
Fusol	15, bis, r. de Breteuil, Marseille.

G

Gabiol	2 bis rue Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin.
Gadéinol	6, bd Arago, Paris.
Gadilène Vasseur	114, r. Faidherbe, Boulogne-sur- Mer.
*Gadiodine	38, rue des Lices, Angers.
*Gaduamine	RENARD et C ^{ie} , 35, rue de Paris, Clichy (Seine).
*Gaduase	Lab. SERVIER, 25, r. E.-Vignat, Orléans.
Gaduine algovitinée	P. FONTANIER, Moulins-sur- Yèvre (Cher).
Gaïacalcine Latour	16, r. du Petit-Musc, Paris.
*Gaïacamphre	PLAGNOL, 18, rue Maréchal- Foch, Versailles.
Gaïcanthine	133, rue Lecourbe, Paris (XV ^e).
Gaïacodil Godard	13, rue Chernovitz, Paris.
Gaïacol phosphaté Pau- tauberge	165, r. Saint-Denis, Courbevoie.
Gaïacophosphal Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Gaïarsénan Ducatte	191, rue Saint-Honoré, Paris.
Gaïarsol Bouty	3, rue de Dunkerque, Paris.
Galabactéine	154 bis, rue Breteuil, Marseille.
Galactésia	AXAREL, 15, rue Catullienne, Saint-Denis.
Galactina	68, rue Phalsbourg, Le Havre.
Galactogènes Jolivet	140, fg Saint-Honoré, Paris.

- *Galactogil** Étab. Jacquemaître, Villefranche (Rhône).
- Galactose** 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Galaphos** 92, r. C.-Pelletan, 2, r. d'Amiens Marseille.
- Galazène** 15, quai Bourbon, Paris.
- Galegalactol** 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Galform** 20, rue Dumont-d'Urville, Paris (XVI^e).
- Galliasec** CH. GERVAIS, 11, rue de Prony, Paris.
- Galliodine** 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- *Gambéol** 42, rue Émile-Deschanel, Courbevoie.
- *Gamostyl** 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- *Ganderma** 42, rue Émile-Deschanel, Courbevoie.
- Gangliosaa** 2, allées Spach, Strasbourg.
- *Gardenal** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Gardorinol** 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Garéphédrine** THORAL, Le Mont-Dore.
- Gargarinal** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Gargarisme Lancosme** 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- *Gargarisme du Mont-Dore** SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).
- *Gargarisme Salmon** 151, r. Charenton, Paris (XII^e).
- *Gargyl** CHEMINEAU, à Vouvray (L.-et-L.).
- Garnitures Obstétricales « Parturia »** Echard-Gillier, l'Arbresle (R.).
- Garsedol** SIMON, 44, r. Inkermann, Lille.
- *Gasmanyl** E. VERDON, Celles-sur-Belle (D.-Sèvres).
- *Gasmar Legendre** Houilles (Seine-et-Oise).
- *Gastéose** 37, rue Brochant, Paris.
- Gastergyl** PHARMA-SPÈS, 15, r. Corneille, Lille.
- Gastérinase** 77, bd de Grenelle, Paris.
- Gastérine Frémont** à Vichy (Allier).
- Gastérodyne** 137, fg St-Antoine, Paris (II^e).
- Gastérol** 37, rue Galilée, Paris.
- Gastérophiline** rue Balainvilliers, Clermont-Fd.
- *Gastiase** 14, rue Demarquay, Paris.
- Gasto-Entérol** 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
- *Gastrépatine** Lab. B. C. L., 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- *Gastrhéma** 71, r. Saint-Blaise, Paris (XX^e).
- Gastrhépase** CELLIER, Saint-Uzé (Drôme).
- Gastria** MIRATON, Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).

*Gastricine du Duhourcau	D ^r	6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
Gastrilène		M. RICHARD, Aubenas (Ardèche).
Gastrine Mercier		41, route de Turin, Nice.
Gastrisodyl		27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
*Gastrobellone		49, rue du Château-d'Eau, Paris.
Gastrobiase		2, pl. des Vosges, Paris.
*Gastrocalcine		17, rue Cadet, Paris.
Gastrocalmine		178, rue Montmartre, Paris.
*Gastrocaol		BENDERITTER, à Vendôme (Loir-et-Cher).
*Gastrocarbone		Saint-Louis (B.-du-Rhône).
*Gastrocitrine		Luc-sur-Orbieu (Aude).
*Gastroclean		ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Gastrocolase		14, av. Perrichont, Paris.
Gastrodium		51, rue de Paris, Pierrefitte (Seine).
Gastrofluid		66, bd Exelmans, Paris (XV ^e).
Gastrolex		BERTRAND, Nomexy (Vosges).
*Gastronaldine		58, rue de Maubeuge, Paris.
*Gastroniger		11, rue de Mogador, Paris (IX ^e).
*Gastropansément		D ^r ZIZINE, 24-26, r. de Fécamp, Paris.
*Gastropeptyl		40, rue des Acacias, Paris.
Gastrophiline		53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
Gastrosaline		Lab. du BLOSSET, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Gastrosalvine		P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
*Gastro-Sédatif Atcia		20, rue des Martyrs, Paris (IX ^e).
Gastrosédase		41, rue de Rome, Paris.
*Gastro-Sodine		21, rue Violet, Paris.
Gastrosic Léo		11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
Gastrosthénol		29, av. d'Orléans, Paris.
Gastrotherib		LA BIOTHÉRAPIE, 5, r. Paul-Barruel, Paris.
*Gastrozymase	Bouty	3, r. de Dunkerque, Paris.
*Gastruth		42, bd Saint-Marcel, Paris.
Gastryl		108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
Gatercodéine		DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
*Gatran		14 r. A.-Briand, Levallois-Perret.
*Gaurol		30, r. Armand-Sylvestre, Courbevoie.
Gaze Anadhère		CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
Gaze Néolée		115, r. N.-D.-des-Champs, Paris
Gelax		33, rue du Bois, Vincennes.
Gelchol		56, rue Beaubourg, Paris.
Gelciver		49, rue Maleret, Bordeaux.
Gelée antidiarrhéique		
Lumière		45, rue Villon, Lyon.
Gelées Vaccins Gordenberg		IVAGO, 17, rue de Provence, Paris.

- Gélicrème Dumesnil**
***Géliderm**
***Gélobarine**
 Géloboldine
 Gélocalcine
 Géloelbiase
***Gélogastrine**
***Gelok**
 Gélo-Pansement Byla
 Gélo-Pansements gastro-intestinaux
***Gélor**
 Gélo-Son
***Gélotanin**
 Gélotube 29
 Gelsémium Dausse
 Gemaline
 Gemiodol
 Gemmenagol
 Gémocarpine
***Génacide**
 Génaldyl
***Génalyptol**
***Génatropine**
 Gencigel
***Génécarmine**
 Générgosine
***Génésérine**
 Genêt Gmet
***Genhyoscyamine**
 Génisténal
 Génoderme
 Génolactine
***Génomorphine**
***Génoscopalamine**
***Genosthéniques**
***Génostrychnine**
 Génovital
 Génysil
 Géo-baryum
 Géodyl
 Géraldine
- 10, rue du Plâtre, Paris.
 Lab. GELIA, Champdeniers (Deux-Sèvres).
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 LICARDY, 38, bd Bourd n, Neuilly-sur-Seine.
 LEURQUIN, 50-52, rue Pierre-Légrand, Lille.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, av. de Grammont, Tours.
 63, rue Faisanderie, Paris.
 35, rue Cler, Paris.
 Lab. CHOAY, 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 49, rue de Bitche, Courbevoie (Seine).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 38, rue du Louvre, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 38, rue du Louvre, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
 COSPHA, 76, rue des Jacobins, Amiens.
 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).
 4, pl. des Vosges, Paris.
 Lab. MARGEX, 13, rue Mélingue, Paris.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
 Lab. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 24, rue de Montessuy, Paris.
 3, bd Courcelles, Paris.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 id.
 id.
 3, rue Dulong, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 J. ROBERT, 39, rue de Bourgogne, Paris.
 121, av. de St-Ouen, Paris.

***Geranine**

Geraseptol
 Gérasol Cimon
 Gercecure
 Gercéol

Gercérine Eon

Gerdabyl

Germex 42
 Germocalcine
 Germoléol

Germolysine

***Germose**

Germyl
 Gérol Testart
 Gesto Serum

Girasiol Dumesnil
 Givrinol

Glandex phoscalcique**Glandimbine Lafran**

*Glandocalcyl
 Glandophile
 Glandovital
 Glaucuroi
 Glaukosan Levogyre
 Glaxo

***Gléfina**

*Glésol
 Globabyl
 Globépal

***Globexine**

*Globinofer
 Globugénol

Globular

Globules Hébert
 *Globules Fumouze
 Globules Laincar

Globules Rébaud**Globules Romon**

Globules Secrétan

19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).

60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).

34, bd de Clichy, Paris.

rue Balainvilliers, Clermont-Fd.

154 bis, rue de Breteuil, Marseille.

3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du.-N.).

GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.

85, rue du Canal, Roanne.

29, rue de Metz, Toulouse.

A. BLANC, Barcelonne-du-Gers (Gers).

2, Grande-Rue, Enghien (S.-et-O.).

LEBEAULT, BÉSINS & C^{ie}, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

9, rue Petitot, Dijon.

Chalais (Charente).

Sté d'Élevage et Produits biologiques, Saint-Philibert (Côte-d'Or).

10, rue du Plâtre, Paris.

14, rue d'Auge, Caen.

58, rue de Maubeuge, Paris.

8, rue de Prague, Paris.

40, r. Claire-Paulhac, Toulouse

15, r. Martel, Paris.

id.

74, rue Blanche, Paris.

59, r. de Charenton, Paris.

RISSA, 46, rue Claude-Lorrain, Lille.

348, rue Saint-Honoré, Paris.

18, av. Hoche, Paris.

25, r. de Calais, Dunkerque.

BOUTY, 3, rue de Dunkerque, Paris.

SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.

10, rue Crillon, Paris (IV^e).

Lab. COMTOS, Feschés-le-Châtel (Doubs).

Lab. GÉHA, Port-de-Bouc, près Marseille.

à Saint-Lô (Manche).

78, fg Saint-Denis, Paris.

LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.

33, bd Dubouchage, Nice.

MONAL & C^{ie}, 13, av. de Ségur, Paris.

J. LOGEAIS, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).

- *Gloma** Malt Wander) 151 bis, rte de Joinville, Champigny (Seine).
- *Glottyl** 20, rue du Laos, Paris.
- *Gloxines** 6 bis, rue Campagne-Première, Paris.
- Glucalcium** 5, Bd des Italiens, Paris.
- *Glucamonix** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- Gluchol** 56, rue Beaubourg, Paris.
- *Glucochaux** E. DUFOUR, Amplepuis (R.).
- *Glucocithine** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- Glucoflavine** route Nationale, Wattignies (Nord).
- Gluconate de calcium**
- Sandoz** SANDOZ, 20, r. Vernier, Paris.
- *Gluconyl** 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Glucosalyl** 14, avenue Perrichont, Paris.
- *Glucosium** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Glucoxyl Nacher** 71, bd Carnot, Toulouse.
- Gluphosol** 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
- *Gluquinix** 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- Glutéokina** MAZURE, 3, r. de Vouillé, Paris.
- Glutines Chabre** 16, cours Gambetta, Lyon.
- Glutinettes d'Aspirine** 14, rue des Pyramides, Paris.
- Glutipolysalyl** 24, r. Paul-Bert, Paris.
- *Glutisalyl** id.
- *Gluti-Santal** TORAUDE, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- Glycalcion** 21, rue de Lyon, Paris.
- *Glycarsol** 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- Glycaspirine** 13, rue Antoine-Vollon, Paris.
- Glycérine créosotée** 3, bd Saint-Martin, Paris.
- phosphatée Catillon** OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycéro-bromurine** 151 bis, r. Joinville, Champigny (Seine).
- Glycéro Gloma** OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycéro-iodurine** 5, rue Mézelle, Tarare (Rhône).
- Glycérolive** 6, rue Dombasle, Paris.
- Glycérométhylarsénié** OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycéro-ovarine**
- *Glycérophosphate Daloz** 13, bd de La Chapelle, Paris.
- Glycérophosphate Le Perdriel** 11, rue Milton, Paris.
- Glycérophosphates de chaux granulé Girard** 48, rue d'Alésia, Paris.
- Glycérophosphates Freyssinge** 6, rue Abel, Paris.
- Glycérophosphates Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).

- ***Glycér phosphates Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
Glycéro-Thyroidine OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Glycéro-Tribromurine** id.
- ***Glycobyl** 4, pl. des Vosges, Paris.
- ***Glycocarpine** DALIN, 49 q. St-Vincent, Lyon.
- Glycogène Clin** 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- Glycojasol** 10, rue Gay-Lussac, Paris.
- ***Glyco-lactimase** 18, av. Hoche, Paris.
- ***Glyco-M.** 1, av. Lowendal, Paris.
- Glyco-phénique du** 4, rue de la coutellerie, Paris.
- D^r Déclat**
- Glycophosphates gran-** 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
- nulés Astier** 5 bis, r. des Haudriettes, Paris.
- ***Glyco-Thymoline** ARQUEVAUX, à Étampes
- Glyctone phosphatée** (Seine-et-Oise).
- Charrière**
- Glyphospher** 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
- ***Gmet (Extraits)** 27, fg Montmartre, Paris.
- Gobérol** 26, av. de Royat, Chamalières-
lès-Clermont-Ferrand.
- Gobillettes Hypnos** Chabeuil (Drôme).
- Golarsyl Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- ***Goménol** 48, r. des Petites-Écuries, Paris.
- Gometer** ROBERT & CARRIÈRE, 37,
r. de Bourgogne, Paris.
- Gométyl** id.
- ***Gonacrine** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
Paris.
- ***Gonagone** CARRION, 54, fg St-Honoré,
Paris.
- ***Gonarthri Vaclydun** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Gonéine (Caspules)** A. GUILLAUMIN, 13, rue
Cherche-Midi, Paris.
- Gonocure** SAUBA, Montreuil.
- ***Gono-Vaclydun** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Gonoyatrène** 26, rue Vauquelin, Paris.
- Gonurol A et B** 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
- Gorgéine** FOIRET, à Montargis (Loiret).
- Gorgex** 33, Grande-Rue, Besançon.
- ***Gosiérine Dalloz** 13, bd La Chapelle, Paris.
- Gossyl** 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- ***Gossypiol Maurin** 19, rue Brunel, Paris (XVII^e).
- ***Gotira** Lab. RICHOU, 39, r. Taitbout,
Paris (IX^e).
- Goudrinhal** 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
- ***Goudroline** POINTET & GIRARD, 30, r.
des Francs-Bourgeois, Paris.
- Goudron des Vosges** 21, r. de la Gare, La Broque
(B.-Rhin).
- Goudron Le Beuf** 11, rue Milton, Paris.
- Goudron Freyssinge** 6, rue Abel, Paris.

- Gouttes amères de Baumé
 *Gouttes antiasthmiques du D^r Hallay
 Gouttes Antigél
 Gouttes antirhumatismales du D^r Hallay
 Gouttes antirhumatismales Wagner
 *Gouttes Antispasmodiques Adol
 Gouttes Antispasmodiques Dausse
 *Gouttes Arsénosthéniques Dausse
 *Gouttes Blagny
 *Gouttes Bernamont
 *Gouttes Bronchophiles André
 Gouttes calciques Zanit
 Gouttes C. C. U.
 Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure
 Gouttes C. Z. A.
 Gouttes dépuratives Fuba
 Gouttes Efgé
 *Gouttes Eryl
 Gouttes Esurine
 *Gouttes Géha
 Gouttes Gydé
 *Gouttes Fluvia
 Gouttes halogènes du D^r Bern
 Gouttes Him
 Gouttes hypotensives
 *Gouttes Iodopan
 Gouttes iodopeptiques Narud
 *Gouttes Leconte
 *Gouttes Linober
 Gouttes livoniennes
 Gouttes Lo-Lo Tsé
 Isberg
 *Gouttes Magalo
 *Gouttes Malone
 *Gouttes M. I. A.
 Gouttes Milko
 *Gouttes Molinal
 Gouttes Narkay
 *Gouttes Nican
 Gouttes au Nitrite de Soude Roussel
 D^r GIGON, 25, bd Beaumarchais, Paris.
 36, rue Eug.-Carrière, Paris.
 18, rue de Beaune, Paris.
 36, rue Eug.-Carrière, Paris.
 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
 78, Cours de la Liberté, Lyon.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 85, rue Turbigo, Paris.
 Voir *Pommade Bernamont*.
 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme).
 3, pl. Intérieure-St-Michel, Toulouse.
 88, rue Duhesme, Paris.
 Aubenas (Ardèche).
 88, rue Duhesme, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 40, av. Secrétan, Paris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 D^r R. PETIT, Angoulême.
 Port-de-Bouc, près Marseille.
 4, Cours Tolstoï, Lyon.
 Voir *Fluvia*.
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 FRAISSE, 8, rue Jasmin, Paris.
 9, rue de la Platière, Lyon.
 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 F. BOUVIER, 31, bd de la Villette, Paris.
 GOY, 23, r. Beautreillis, Paris.
 D'HELIOT, Dinard (I.-et-V.).
 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
 CLUZEL, 60, c. E.-Zola, Lyon.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 SAUBA, Montreuil (Seine).
 CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).
 10, rue Washington, Paris.

- *Gouttes Paléophiles du
D^r Guiraud (Voir Iodarsénic Guiraud)
Gouttes P. A. S.
Gouttes Pectiques du
D^r Albert
Gouttes de Pectosérum
10, imp. Milord, Paris.
GOUIN, 30, rue des Écoles, Paris.
- Gouttes Perettes
Gouttes Phosbel
*Gouttes Phosphothéniques Dausse
*Gouttes Pilka
Gouttes de Quarantaine
42, av. de Breteuil, Paris.
5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
- *Gouttes Quassinol
Gouttes Reynaud
4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
26, rue Vauquelin, Paris.
38, rue des Lices, Angers (M.-et-L.).
73, bd Baille, Marseille.
- *Gouttes Sap
Gouttes Scandinaves
Gouttes Schmidt anti-convulsives
Gouttes Sclérocitrine
*Gouttes de Sérû
*Gouttes Trina
Gouttes Vigor
Gouttes Vocis
*Gouttes Yseult
*Gouttolysine
DURAND, Aigues-Mortes (Gard).
2, rue des Lombards, Paris.
36, quai Fulchiron, Lyon.
- Goyl Meurice
Grains céphalgifuges
G. Vilas, à Châlons-sur-Marne.
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- Grains de Seltz
Lab. ALPHA, Montreux-le-Château (Haut-Rhin).
- *Grains de Vals
*Grains d'Évian
Lab. J. PERROCHON, Tours (I.-et-L.).
- *Grains d'Éphédrine
Grains du D^r Jehan-Meyer
Grains Miraton
Grains de santé du D^r Franck
59, rue Nollet, Paris.
CHASSAIGNE, Ruffec (Ch.-I.).
- *Granions de Fouard
61, rue Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine).
- *Granoxyl
*Granstimul
*Granuchol
46, rue du Petit-Musc, Paris.
78, fg St-Denis, Paris.
54, rue de Paris, Charenton (Seine).
- Granulé Bravais
*Granulé Cabasson
Granulé Calmafenkel
56, bd Ornano, Paris.
18^e, r. de Rome, Marseille.
- Granulé Caresmel
LEMATTE, 52, rue La Bruyère, Paris.
2, quai Paul-Bert, Tours.

- Granulé de Panphos-
 phates
 Granulé du Dr Mous-
 saud
 Granulé dépuratif
 Künckel
 *Granulé Edges
 *Granules Elkin
 Granulé Girard
 Granulé Hormos

 Granulé pulmonaire
 Giry
 Granulé Sabel

 Granulé Tinardon
 Granules 3 cachets

 *Granules Chanteaud

 Granules Chevrier
 Granules Colchicine

 Granules Crosnier

 Granules d'Aloïne

 Granules de Boldine
 *Granules de Bourget
 Granules de Digitaline

 Granules Homolle &
 Quévenne
 Granules Houdé
 Granules Hydrastinine

 Granules Hyosciamine
 Granules Pantofort du
 Dr Boveil
 Granules du Dr Papil-
 laud
 *Granules Salicyle
 Dausse
 Granules Spartéine
 *Granules des Vosges
 *Granulochrysine
 Lumière
 Granusel
 Grappuval

 Grassyl
 *Gravidostyl
 Graumanyl Meurice
 *Gravural
 Griponal
 *Grippalgine
- 119 bis, av. Chemin-de-fer,
 Rueil (Seine-et-Oise).
 H. RIVIER, 10, passage Morel,
 Montrouge.

 3, rue Watteau, Courbevoie.
 59, rue Boissière, Paris.
 18, rue de Beaune, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 4, av. M. Berteaux, Poissy
 (Seine-et-Oise).

 49, rue de Metz, Nancy.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 17, rue Cadet, Paris.
 Dr COIRRE, 5, bd Mont-
 parnasse, Paris.
 3 et 5, rue Alex-Dumas, Saint-
 Ouen (Seine).
 21, fg Montmartre, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 44, r. de Lagny, Montreuil
 (Seine).
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.

 id.
 8, r. St-Martin, Paris (IV°).
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.

 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.

 id.
 1, rue Lassalle, à Lyon.

 GIGON, 25, bd Beaumarchais,
 Paris.

 4, rue Aubriot, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 11, rue Lafayette, Paris.

 45, rue Villon, Lyon.
 « ANGLA », Monte-Carlo.
 Lab. AUBERY, Avignon (Vau-
 cluse).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 28, rue de Seine, Paris.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 154, av. Malakoff, Paris.

- Grippol**
Gripposédine
- *Grippo-Vaclydun**
Grog antigrip Labo-
rom
Guanec Lafosse
Guarana Grimault
***Guaraphos**
***Gubline**
Guérysipèle
- *Guéthural**
- Gui Byla**
***Gui Gmet**
***Guigoz (Lait)**
Guilyl
***Guimelinde**
Guinitrol
***Guipsine Leprince**
***Guitose**
Gunose
Guttoléol
- Gutturyl**
Gynaicéol
***Gynarsol**
Gynaseptone
Gynécolactyl
***Gynéco-Vaclydun**
Gynéoline
Gynéose
***Gynergène**
Gynésodine
- Gynévrine**
Gynimbine Houdé
Gynium
***Gynocalcion**
- Gynochlor**
- Gynocrinol**
- Gynocure**
- Gynodine**
***Gyncestryl**
- *Gyno-gouttes**
- Gynohypophysol**
- Gynoïds**
- 23, rue du Caire.
M. RICHARD, Aubenas (Ar-
dèche).
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
4, av. Brazza, Romainville
(Seine).
- 48, av. de la République, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
- 26, rue Vauquelin, Paris (V^e).
61, bd Malesherbes, Paris (8^e).
71, av. de la République, Cham-
pigny (Seine).
- Lab. PEPIN & LEBOUQC**,
Courbevoie (Seine).
- 26, av. Observatoire, Paris.
27, fg Montmartre, Paris.
- 2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
Ancenis (Loire-Inf.).
- 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
62, rue de la Tour, Paris.
- 11, quai St-Clair, Lyon.
D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
MAIRE, 171, r. de Belleville,
Paris.
- 58, rue de Maubeuge, Paris.
17, rue Cadet, Paris.
- 16, rue du Petit-Muse, Paris.
BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.
- Lab. V.B.**, Les Bourdons, Nevers.
27, rue Desrenaudes, Paris.
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
14, rue des Pyramides, Paris.
- 20, r. Vernier, Paris.
- 47, r. Bokanowski, Asnières
(Seine).
- 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
Voir *Yohimbine Houdé*.
- 37, rue des Lois, Toulouse.
Lab. CORTIAL, 7, r. de l'Armo-
rique, Paris.
- 36, r. des Francs-Bourgeois,
Paris.
- Lab. ISCOVESCO**, 107, r. des
Dames, Paris.
- DEBROCK**, 22, rue de Paris,
Houilles (Seine-et-Oise).
- 23, rue de Douai, Lille (Nord).
ROUSSEL, 89, rue du Cherche-
Midi, Paris.
- Lab. ISCOVESCO**, 107, r. des
Dames, Paris.
- Lab. ISCOVESCO**, 107, r. des
Dames, Paris.
- LABIOLA**, 52, r. de Cambrai,
Lille (Nord).

- Gynolutéol**
Gynolysats
Gynomalvine
***Gynométine**
Gynopausine
Gynophiline
Gynophyl Reboul
***Gynoplix**
Gynopolycrinol
Gynosanine
Gynosol
Gynoster
- Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 36, r. des Francs-Bourgeois Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 42, du Mont-Cenis, Paris.
 DOUARD, Uzel (C.-du-N.).
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
 151, rue de Charenton, Paris.
 1, av. Eug.-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre (Seine).
 133 rue Lecourbe, Paris.

H

- Hæmabæo**
***Halifléto**
***Halocalcion**
Halocure
Halogénol
Halomagnésine
Hamamelidine
Hamacitro
***Hamaméline Roy**
***Hamaméliode**
Hamamélis Dausse
***Hamamélis Gmet**
***Hamamélis Grandval**
***Hamhydril**
Hansénol
***Harléidine**
***Hébéol**
***Hectargyre Naline**
***Hectine Naline**
Hectiode
Hédéranol
***Hédéryl**
- BAILLY, 15-17, rue de Rome, Paris.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris (II^e).
 90, bd Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin (Aisne).
 1, pl. du Griffon, Lyon.
 41, bd Haussmann, Paris.
 J. LOGEAIS, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 34, rue Sedaine, Paris.
 41, rue de Rome, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 12-14, rue Féry, à Reims.
 Lab. SEDROB, 35, r. Périssé, Toulouse.
 116, bd Haussmann, Paris.
 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 20, rue de Rivoli, Paris.
 à Villeneuve-la-Garenne.
 id.
 CANONNE, bd Sébastopol, Paris.
 151, r. de Charenton, Paris (XII^e).
 Lab. LETTRY, 69, r. de Sèvres, Paris (VI^e).

- *Hedopeptol** Lab. SAUNIER, 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
***Hédusol** 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
***Héganol** 33, fg Montmartre, Paris.
Heinobiose 145, chem. de la Madrague-de-Montredon, Marseille.
***Hélénine de Korab** R. BOUYSSOU, Chambois (Orne).
***Helguerol** 17, rue Soufflot, Paris.
**Héniatol (poudre, pom-
made)** 4, pl. Royale, Nantes.
Hélieurone BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Hélital 15, pl. Nationale, Dieppe.
Helmazil 25, rue du Général-Foy, Paris.
Helminthose 132, rue de Turenne, Paris.
Helminthyl 14, r.A.-Briand, Levallois-Perret.
Hémabéol 72, av. Kléber, Paris.
Hémabione MOURGUES, chemin Neuf, Ganges (Hérault).
***Hémagène Tailleur** 10, r. Le Chapelais, Paris.
***Hémagénine Giraud** 65, rue Louis-Blanc, Paris.
Hémaldine BILLEBAUD, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).
***Héma-Rhéol** 27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
Hémarsyl du D^r Roux CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
Hématéol 81, r. Le Corrège, Bruxelles.
Hématocalcyl 1, pl. du Griffon, Lyon.
***Hématoéthéroïdine** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
Hématogénol 37, rue Galilée, Paris.
***Hémato-iodine** 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
Hématopan 263, rue Lecourbe, Paris.
Hémaxol 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
***Hémédonine** 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
***Hémoantitoxine Sofos** 11, quai St-Clair, Lyon.
Hémobiose M. AUBANEL, Pointe-Rouge, Marseille.
***Hémocalcine** FERCOCQ, La Varenne-St-Maur (Seine).
***Hémocalciopectine** BOUDIER, 37, rue de Bourgogne, Paris.
Hémocléan 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
Hémocléine Lafay 54, ch. d'Antin, Paris.
Hémo-Coagulène 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
***Hémo-Cyto Sérum** Labor. CORBIÈRE, 27, rue Desrenaudes, Paris.
Hémodrainase COSSON, Romainville (Seine).
***Hémodrome** LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
***Hémoductyl** LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.
Hémoferrine OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Hémofixine 4, r. Beaurepaire, Paris.

Hémofluidol*Hémogénase*****Hémogénol Dausse****Hémogényl Godart****Hémoglobine Bovel****Hémoglobine Dalloz*****Hémoglobine Des-
chiens****Hémoglobine Star****Hémoglobine Van Lier****Hémoglyne Thuau****Hémo-Hépatext*****Hémoluol****Hémoneurol Cognet*****Hémopaniline*****Hémopausine*****Hémopectal*****Hémo-Phagosthyl*****Hémophiline Planche****Hémophytol*****Hémoplase Lumière****Hémoplasmine****Hémopoïne*****Hémopylore****Hémoradol****Hémorex*****Hémorroïdine****(Pommade, Gout-
tes, Suppositoires)****Hémorroïdyl*****Hémosamine (Utéra-
mine)****Hémosépine****Hémosine****Hémosérum****Hémostase*****Hémostatique Coudert*****Hémostatique Goy*****Hémostérine irradiée*****Hémostra Roche*****Hémostyl*****Hémotal****Hémotonine****Hémo-Tonikéine****Hémovarine****Lab. LÉONARDON, Angers
(M.-et-L.).****à Courpière (Puy-de-Dôme).****4, rue Aubriot, Paris (IV^e).****Andenne (Belgique).****101, av. Mozart, Paris.****13, bd de La Chapelle, Paris.****9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII^e).****7, rue Charlot, Paris (III^e).****30, rue Saint-Jacques, Namur.****22, fg Saint-Michel, Angers.****TAILLANDIER, 107, av. Jean-
Jaurès, Paris.****11, rue Mogador, Paris (IX^e).****43, rue de Saintonge, Paris.****Annonay (Ardèche).****16, r. du Petit-Musc, Paris.****A. FALVY, 40, rue des Aca-
cias, Paris.****A. PARIS, 4, rue La Motte-
Picquet, Paris.****2, rue Volney, Paris.****BEDEIL, Lavelanet (Ariège).****45, rue Villon, Lyon.****30, rue Saint-Jacques, Namur.****Dr SCHOLL, à Gembloux,
Belgique.****42, r. E.-Deschanel, Courbevoie
(Seine).****25, rue Vaneau, Paris.****7, Rond-Point Mirabeau, Paris.****25, rue de Calais, Dunkerque
(Nord).****ROUSSEL, Grande Rue, Flers
(Orne).****26, rue Vauquelin, Paris.****19, rue de Fleurus, Paris.****89, bd Sébastopol, Paris.****JARMON, 4, pl. de la Gare,
Tunis.****156, av. Victor-Hugo, Paris.****13, rue Antoine-Villon, Paris.****23, rue Beautreillis, Paris.****188, cours de la Somme, Bor-
deaux.****10, rue Crillon, Paris.****97, rue de Vaugirard, Paris.****UNIS-SPÈS, 14, r. Demarquay,
Paris.****98, rue de Sèvres, Paris.****52, rue La Bruyère, Paris.****ADLER, 36, rue des Francs-
Bourgeois, Paris.**

Hémovaryl Farma	1, av. E.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine).
*Hémoveine	BRICHARD et fils, à Bar-le-Duc.
Hémoviris (cachets, élixir)	54, r. de Sablonville, Neuilly-sur-Seine.
Hémozol	12, boul. Saint-Martin, Paris.
Hémynne	13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
*Hemypnal	103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
Henrick's bill	VERGELOT, 163, r. de Flandre, Paris.
Hényl	31, av. Foch, La Garenne-Colombes.
Hépacholine	36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
*Hépacrine	DEBAT, 60, rue de Monceau, Paris.
Hépacynase	35, rue Cler, Paris.
*Hépadrainase	16, rue du Petit-Musc, Paris.
*Hépaflorine	« ANGLA », Monte-Carlo.
*Hépafluol	Lab. GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
Hépagaströl	33, av. de Villiers, Paris.
*Hépaglycérol	CARRION, 54, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
*Hépagyl	97, rue de Vaugirard, Paris.
Hépaline	BLANCHER, Vichy (Allier).
*Hépalomel Védé	2, pl. Gambetta, Paris.
*Héпамine Mauchant	Gennevilliers (Seine).
*Héпамult	41, rue de Rome, Paris.
*Héпанème	54, fg St-Honoré, Paris (VIII ^e).
*Héпанова	37, rue Brochant, Paris.
Hépapeptine	DEBAT, 60, rue de Monceau, Paris.
*Hépaphos	4, rue Platon, Paris (XV ^e).
Héparadénine	OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Héparbiline	id.
Héparcyl	23, rue du Caire, Paris.
*Héparéguline	151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
Héparfier	PELLISSIER, 33, av. de Villiers, Paris.
Héparmone Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
*Hépartichaut	19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine).
*Hépasel	27, rue Planchat, Paris (XX ^e).
Hépasodyl	9, rue Laloy, Chaumont.
Hépastéryl	MARTIN, Bordeaux-Cenon (Gironde).
Hépatergol	COUSIN, r. Albert-I ^{er} , Beaumont-sur-Oise.
*Hépathemo Deschiens	9, rue Paul-Baudry, Paris.
*Hépaticalcion	14, rue de Clichy, Paris.

- *Hépatie Efa** 16 et 18, rue du Château, Carentan (Manche).
- *Hépaticol** BRUN, La Demi-Lune (Rhône).
- Hépatine Bouty** 3, rue Dunkerque, Paris.
- Hépatine Gad** OLIVIERO, Boulogne-sur-Seine.
- Hépatique Delfos** Lab. OCCITAN, Auterive (H.-G.).
- *Hépatismine** 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- Hépatobiline** E. BASSOL, St-Alvère (Dordogne).
- Hépatato-Byl** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- *Hépatocarnine Le-francq** 32, av. de Metz, Romainville (Seine).
- Hépatocrinol** Lab. ISCOVESCO, 107, r. des Dames, Paris.
- *Hépatocynol** 62, bd St-Germain, Paris.
- *Hépatodiagnose** 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Hépatodiase** UNIS-SPÈS, 14, rue Demarquay, Paris.
- *Hépatoformine** 26, av. de Royat, Chamalières-lès-Clermont-Ferrand (P.-de-Dôme).
- Hépatogastrine** 4, chaussée de la Muette, Paris.
- Hépatogènes Charvoz** 3, chem. du Vallon, Lyon-Caluire.
- *Hépatogénine** P. BOIVERT, Montguyon (Ch.-Infér.).
- *Hépatoglobine** CH. VERGELOT, 6, rue de Navarin, Paris.
- Hépatolax** 201, r. du Fg-St-Denis, Paris.
- *Hépatomagnésion** 57, r. Pierre Corneille, Lyon.
- *Hépatomanganol** 11, pl. Louis-XII, Blois.
- Hépatato-Muscolisine** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Hépatonia** PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
- *Hépatoplasmine** R. Fraysse, rue de Neuilly, Nanterre.
- Hépatorga** Lab. ORGA, Avignon (Vaucluse).
- Hépatoseptyl** 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
- Hépatato-Sérine** 22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
- *Hépatosodine** DURET & RÉMY, Asnières (S.).
- Hépatotanic** 14, rue de Clichy, Paris.
- Hépatato - Vésiculite du Dr Phélyx** 25, av. du P^t-Wilson, Montluçon.
- *Hépatoxane** 81-83, r. de Lille, Roubaix.
- *Hépatozyl** 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- *Hépatrol** 4, rue Platon, Paris (XV^e).
- *Hépavita** 2, rue Mélingue, Paris.
- *Hepax** 32, rue de l'Ouest, Paris.
- *Hepbi** 4, r. Platon, Paris (XV^e).
- *Hepenteryl** Bouchy, Gde Place, Louvrol (Nord).
- Heptanol** DROUET, r. Condorcet, Poitiers.

- Héracléine**
Héracléol
***Hergénol**
Hermasinal
Hermomuthol
***Hermophényl**
Hermoplast (Furoplast élastique)
Hermostyrum
Héroïne Vicario
Herpur
***Hespéridausse**
Hétérolysine
Hétraménol
Hévoglan
Hexacar
Hexacarbène
Hexachol
Héxafel
Hexaformine
Hexalithine
Hexaranol
Hexarubrine
***Hexorcène**
***Hexotal**
Hippo-Carnis
Hippohémo
Hippoplasine du Dr
Gran
***Hipposarcine Roy**
***Hirudinase**
***Hista-Histamine**
***Histaclartyl**
***Histalgine**
***Histamyl**
Histocalcine
***Histogénol Naline**
***Histogerma**
Histonyl
Hojasol
Holaseptine
Holocalcine
Hololax
***Holos Deschiens**
***Holosplénine**
- COUTURIEUX**, 18, av. Hoche, Paris.
SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 50, r. Nationale, Lille.
 50, rue Nationale, Lille.
 45, rue Villon, Lyon.
 9, rue de la Gare, Levallois.
WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
OLIVIERO, Boulogne-sur-Seine.
 6, rue Berbisey, Dijon.
A. BLANC, Barcelonne-du-Gers (Gers).
PHARMA-SPÈS, Lille (Nord).
 83, bd de la Villette, Paris.
 26, r. Sainte-Claire, Mulhouse.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 123, pl. Beauvoisine, Rouen.
REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 88, rue Duhesme, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
SPÉCIA, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
LE GALLO, à Auray (Morbihan).
 157, r. de Paris, Vanves (Seine).
BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 14, av. Perrichont, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris (III^e).
 201, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 à Villeneuve-La-Garenne.
MAHIEU, Lens (Pas-de-Calais).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 10, r. Gay-Lussac, Paris.
 rue de Rome, Cannes (Alpes-Maritimes).
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
 13, rue Boinod, Paris.
 9, rue Paul-Baudry, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.

- *Holovarine
 Holuryl
- *Hopogamyl
 48, rue de la Procession, Paris
 A. FALVY, 40, rue des Aca-
 cias, Paris.
- *Hopogan
 Hopoganasé
 Horbyl
- *Hordénol
 Hordéomaltine
 Hordosé
- 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beau-
 vais (Oise).
- 12, rue Lamartine, Paris.
 12-18, rue Lamartine, Paris.
 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 10, rue Richelieu, Paris.
 31, r. des Pierres, Bruges (Bel-
 gique).
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La
 Garenne (Seine).
- 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
 A. MIRONNEAU, Pharm., Chef-
 Boutonne (Deux-Sèvres).
- 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 22, r. de l'Arsenal, Angoulême
 (Charente).
- 44, r. M.-Sembat, Aulnay-sous-
 Bois (S.-et-O.).
- 52, r. La Bruyère, Paris.
 19, rue Brunel, Paris (XVII^e).
 4, rue Aubriot, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 6, rue du Petit-Mux, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
 20 bis, r. du Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
- DÉGÈCE, 7, rue Princesse,
 Paris.
- 26, av. Observatoire, Paris.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 9, r. du 4-Septembre, Paris.
 4, rue Saint-Anastase, Paris.
 ZYMA, 26, r. Vauquelin, Paris.
- 10, rue du Plâtre, Paris.
 15, rue de Rome, Paris.
 22, bd Circulaire d'Épinay, Gen-
 nevilliers.
- 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
- 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 RHONE POULENC, 21, rue
 Jean-Goujon, Paris.
- 6, r. Ad.-La-Lyre, Courbevoie
 (Seine).
- *Hormaline
 *Hormantoxone
- Hormex
 *Hormiadyne
- *Hormobiline
 Hormocalcium
- Hormocarnyl
- *Hormocline
 *Hormocrinol F et M
 *Hormodausse
 *Hormoflavéine
 Hormo-gynol
 Hormolaxine
 *Hormoléol
 *Hormolutéine
 *Hormone Gonado -
 trope
 Hormotensyl
- Hormotone
- *Hormovarine Byla
 *Hormovitol
 *Hormuclases (V. Opo-
 thérapies du D^r
 Roussel).
 Hordénine Lauth
 Horsine
- *Hova (Tablettes)
 Huile au Calomel Du-
 mesnil
 Huilaxine
 Huile Boris
- *Huile camphrée Man-
 ganésée « Mètère »
 *Huile Crolas
 *Huile de foie de morue
 médicinalesuractivée
 Huile de foie de morue
 Seclo

- Huile de genévrier Vial 8, rue Vivienne, Paris.
 *Huile d'Harlem 33, fg Montmartre, Paris.
 Huile Gallina 4, rue Candolle, Paris.
 Huile grise Duret 12, rue de Nice, Paris.
 Huile grise Ercé 37, rue de Bourgogne, Paris.
 Huile grise stérilisée VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Huile de Hogg 13, r. Paul-Baudry, Paris.
 *Huile iodée Finikoff 21, rue Chaptal, Paris.
 Huile Parlux 65, rue Douy-Delcupe, à Montreuil (Seine).
- Huiles Cholestérinées**
 Dausse 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 *Huilorhine 29, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 Humoro Stabiline 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
 *Hupnosol Adrian 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 Hycnal DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
- *Hydralin 37, rue de la Fédération, Paris.
 Hydramélis 33, Grande-Rue, Besançon.
 *Hydrargyre-Boulard 82, av. de Suffren, Paris.
 Hydrargyrettes Hubert HUBERT, Romorantin (L.-et-Cher).
 Hydrariode à La Ferté-Macé (Orne).
 *Hydrastine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
 Hydrastis Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
 *Hydrastis Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.
 Hydrastol 222, fg Saint-Martin, Paris.
 *Hydrate de Magnésie 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Hydrocamphre 88, rue Duhesme, Paris.
 Hydroclonazone 42, rue Thiers, Le Havre.
 Hydrocotyle 21, rue Chaptal, Paris.
- Hydrogemmine La- 4, chaussée de La Muette, Paris.
 gasse
 *Hydrorrhéol CORDIER, 222, fg Saint-Martin, Paris.
- *Hydroxydase 10, rue Blanche, Paris.
 Hygiénane 172, rue d'Alésia, Paris.
 *Hygienyl du Dr Gaudier 38, rue Saint-Ferdinand, Paris (XVII^e).
 Hygiodine 5, av. Victoria, Paris.
 *Hymel 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
 Hyol 109, rue de Sèvres, Paris.
 *Hyoscyamine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
 *Hyostinal 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 *Hypalène 127, bd St-Michel, Paris.
 Hypercytol MATRAY, à Aubière (Puy-de-Dôme).
- Hypergal Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
 *Hypersan P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.

Hyper Sérum Nac*Hyperstyl****Hypiode****Hypnase Vergelot****Hypneural Cos****Hypnodausse****Hypnosédine****Hypnovel****Hypochlorine****Hypochloryl*****Hypocholeate****Hypodermozone*****Hypoguistyl****Hypolyse*****Hypophédrine****Hypophos Hurbourgne****Hypophosphites Chur-**
chill**Hypophosphites Fel-**
lows**Hypophydose****Hypophyse - Endocri-**
sines Fournier**Hypophysine****Hypophysol*****Hypostrontium*****Hyposulfène*****Hypotan*****Hypotan injectable*****Hypotenseur Vale****Hypotensiode*****Hypotensol*****Hypo-Thiorine****Hyrganol****D^r RENAUD**, 2, pl. de la
Duchesse-Anne, Nantes.**Établ. H. O. E.**, 239, r. Natio-
nale, Villefranche-en-Beaujo-
lais (Rhône).**16, r. H.-Regnault**, Courbevoie
(Seine).**163, rue de Flandre**, Paris.**99, rue d'Aboukir**, Paris.**4, rue Aubriot**, Paris.**11, ch. de La Muette**, Paris.**41, av. Joffre**, La Garenne
(Seine).**l'Antiseptique**, 48, r. de Londres,
Paris.**7 bis, rue de Musset**, Paris.**14, r. des Guillemites**, Paris(IV^e).**56, bd Péreire**, Paris.**191, r. du Faubourg-St-Antoine**,
Paris.**24, av. Châtillon**, Paris.**18, rue de Beaune**, Paris.**à Montmeyan** (Drôme).**12, rue Castiglione**, Paris.**7, r. L.-Jeannin**, La Garenne-
Colombes (Seine).**D^r FRAYSSE**, 21, r. de Neuilly,
Nanterre.**7, rue Biscornet**, Paris.**OPTIMA**, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.**107, rue des Dames**, Paris.**22, rue de la Sorbonne**, Paris.**22, rue de la Sorbonne**, Paris.**LEMATTE & BOINOT**, 52, r.
La Bruyère, Paris.**LEMATTE & BOINOT**, 52, r.
La Bruyère, Paris.**Hesdin** (Pas-de-Calais).**21, rue de Neuilly**, Nanterre.**LABESSE**, 38, rue des Lices,
Angers (M.-et-L.).**39, rue Fondaudège**, Bordeaux.**SPÉCIA**, 21, rue Jean-Goujon,
Paris.

I. A. M. (Gouttes)*Iasthol****Ibogaine Nyrdhal**
Ichtyol Zinc***Icorase****Idéalax**
Idéolaxine***Idonil****Iénol*****Ifranol****Iloglandol Roche*****Imido Roche*****Iminasthme****Immunase*****Immunicorps*****Immuniderm Grémy****Immuniphages Grémy*****Immunizols Grémy****Immuno-Antivirus****Immunovaccin anti-
pyorrhéique*****Immunovaccin Anti-
rhumatismal****Immunovaccin bron-
chopulmonaire****Impaludol*****Impétigol****Inacrine****Inajuglane*****Indhaméline Lejeune
simple et pluriglan-
dulaire****Indine*****Indoberbérine****Inertyl*****Infangyl Carlier****Infantonyl****D^r LAVOUÉ, à Rennes (Ille-
et-Vilaine).****Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).****12, r. de la République, Puteaux.
Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.****THÉRINEX, 6, rue de Dun-
kerque, Paris.****62, rue Marengo, Saint-Étienne.****OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.****56, rue Beaubourg, Paris.****37, rue Galilée, Paris.****98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).****10, rue Crillon, Paris.****id.****Lab. SERVIER, Orléans (Loi-
ret).****26, av. d'Italie, Paris (XIII^e).****6, rue Dombasle, Paris.****14, rue de Clichy, Paris.****14, rue de Clichy, Paris.****14, rue de Clichy, Paris.****61, av. Louise, Bruxelles.****8, av. des Sources, Nice.****id.****id.****23, rue Beautreillis, Paris.****181, av. V. Hugo, Clamart (Seine)****95, rue de Vaugirard, Paris
(VI^e).****46, rue des Faures, Bordeaux.****142, rue de Picpus, Paris.****DABAT, à Pau (Bas.-Pyr.).****TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest,
Paris.****CHARVOZ, 3, chem. du Vallon,
Lyon-Caluire.****43, rue de Créteil, Joinville-le-
Pont (Seine).****PHARMA-SPÈS, 15, rue Cor-
neille, Lille.**

***Infra-rouges**

Infusion orientale R.
B. L.
Inhabillol

***Inhalantyl**

Inhalateur Hojasol
Inhalateur et Inhalations

Inhalation-Gargarisme**Inhalation Lancosme**

Inhalation Sargéthyl

Inhalations Vocis
Inhalatoriol
Inhalène
Inhalex

***Inhale-Bol**

Inhalogène
Inhalol

Inhalone

***Inhalophédrine**

Inhalopin

Inhale-Sel**Inhale-Thiorine*****Inhaloxyl*****Inhalypitol**

Inhalyl
Inhaphone

Inhatillol

Inhovap
Injection Clin Strychno
Phospharsinée
Injection sèche Bréra

Innerclean**Inocrinines*****Inogyl*****Inolaxine*****Inolène**

Inophyline

***Inorénol**

Inorhinyl

***Inosepta**

Inosphacelol
Inosplénol

La Verrerie Scientifique, 12, av.
 du Maine, Paris.

72, quai Jemmapes, Paris.
 36, rue des Francs-Bourgeois,
 Paris.

14, rue de la Comète, Paris.
 19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
 Lab. INHAL, 98, r. J.-Maillotte,
 La Madeleine, Lille.

VOCALDOP, 222, fg St-Martin,
 Paris.

71, av. Victor-Emmanuel-III,
 Paris.

STOLZ, 56, av. Édouard-Vail-
 lant, Boulogne-sur-Seine.

23, rue Beautreillis, Paris.

57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
 à Berson (Gironde).

37, rue Galilée, Paris.

P. TAVERNIER, 32, rue de
 l'Ouest, Paris.

3, bd Beaumarchais, Paris.

62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-
 Maritimes).

CH. DEHAY, à Arras.

4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.

P. TAVERNIER, 32, rue de
 l'Ouest, Paris.

39, rue Fondaudège, Bordeaux.

4, chaus. de la Muette, Paris.

4, rue Raymond-Poincaré,
 Nancy.

33, rue du Bois, Vincennes.

20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.

ADLER, 36, rue des Francs-
 Bourgeois, Paris.

151, rue de Charenton, Paris.

20, rue des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.

JEHAN & BRÉRA, Montau-
 ban (L.-G.).

46, rue Pierre-Charron Paris.

4, route du Médoc, Bordeaux-
 Bouscat (Gironde).

60, rue de Monceau, Paris.

id.

42, rue du Mont-Cenis, Paris.

177, rue de Courcelles, Paris.

60, rue de Monceau, Paris.

id.

DEBAT, 60, rue de Monceau,
 Paris.

id.

id.

*Inotyol	DEBAT, 60, r. de Monceau, Paris.
Inoxemol	id.
Inoxyl	id.
Inoxine	22, av. Opéra. Paris.
Insensine	14, r. de Normandie, Asnières (Seine).
Insevaccins	DEBAT, 60, rue de Monceau, Paris.
Inshépatyl	20, fg Poissonnière, Paris.
*Institut Pasteur	22, r. Dutot, Paris.
*Insulanol	
*Insuline (voir *Endo-pancrine)	97, rue de Vaugirard, Paris.
Insuline A. B.	48, rue de la Procession, Paris.
*Insuline buccale Fornet	1, rue Dajot, Melun.
Insuline Byla	11, chaussée de La Muette, Paris.
*Insuline Choay	26, av. Observatoire, Paris.
	48, av. Théophile-Gautier, Paris (XVI ^e).
*Insuline Léo	39, rue Fondaudège, Bordeaux.
*Insuline Novo	16, rue du Petit-Musc, Paris.
Insuline Phylose	48, rue de la Procession, Paris (XV ^e).
	56, bd Pereire, Paris.
Insuline Rogier	97, rue de Vaugirard, Paris.
*Insulyl	THOMAS, Chemillé (Maine-et-Loire).
Intaline	12, rue Paul-Baudry, Paris.
Integral Vaccin	5, av. de Saxe, Lyon.
Interlactine	162, r. de l'Hay, Gentilly (Seine).
*Intestarsol	PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
*Intesto	4, rue Aubriot, Paris (IV ^e).
*Intraits Dausse	DRAPIER, Rethel (Ardennes).
*Intra-Reipar	78, fg St-Denis, Paris.
Introl	63, rue de la Faisanderie, Paris.
Ioda	9, rue de la Perle, Paris.
Iodalbin Adrian	60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
Iodalina	51, av. G.-Clemenceau, Reims.
Iodalis	10-12, rue de la Fraternité, St-Mandé.
*Iodalose Galbrun	71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
	2, rue des Deux-Ponts, Paris.
*Iodamelis Logeais	3, bd Beaumarchais, Paris.
	37, av. de l'Opéra, Paris.
Iodaminase	42, av. de Breteuil, Paris.
*Iodamol Michel	10, imp. Milord, Paris.
*Iodargol Viel	304, rue St-Jacques, Paris.
Iodarsène	21, rue de Neuilly, Nanterre.
*Iodarsenic Guiraud	SANOVA, 103, rue Saint-Lazare, Paris.
*Iodarsine	49, r. Thiers, Boulogne-sur-Mer.
Iodarsyle	7, rue de l'Armorique, Paris.
*Iodasclérine	id.
	22, r. de la Sorbonne, Paris.
Iodaselle Delamarre	51, r. Nicolo, Paris (XVI ^e).
Iodaseptine Cortial	
*Iodaseptine salicylée	
Iodassium	
Iodatoxine Laleuf	

***Iodaupébine**

Iodavelan
Iode Aucher

***Iode Colloïdal Roze**

Iodehameline Louveau
Iode liquide Lambiotte

***Iodéine Montagu**

Iodentérol
Iode Oberlin
Iodéolaxine

Iode Organique Boissy***Iodéol Viel*****Iodéopirine**

Iodeptol
Ioderme

***Iode Tulasne**

Iodéyl Fournier

Iodex**Iodhéma**

Iodhyrine du Dr Des-
champs

***Iodiformine**

Iodine Médol

***Iodinjectol Jammes**

Iodion

Iodo-Bismuthate de
Quinine

Iodo-Bismuth Ercé

Iodo-Brou

***Iodocaïne**

Iodo-calcique

Iodocalcium**Iodocardine**

Iodocéréol Dalloz

Iodocitrane**Iodo-Citrol**

Iodo-dépuratif Jacquet

Iodofosfal

Iodogalle Vial

Iodogargyval

Iodogéline

***Iodogénol Pépin**

Iodo-Hamamelis Du-
coq

ADLER, 36, rue des Francs-
Bourgeois, Paris.

BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
La Ferté-Macé (Orne).

2, allée de Chelles, Le Raincy
(Seine-et-Oise).

78, bd des Batignolles, Paris.

OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.

49, bd Port-Royal, Paris.

4, rue Candolle, Paris.

17, rue Cadet, Paris.

OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.

48, rue d'Alésia, Paris.

37, av. de l'Opéra, Paris.

id.

102, av. Michelet, Saint-Ouen.

20, rue de Verdun, Carcassonne.

48, bd des Batignolles, Paris.

7, rue Biscornet, Paris.

46, rue Claude-Lorrain, Lille.

4, rue Candolle, Paris.

49, av. Lamotte-Picquet, Paris.

94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).

J. MIDY, 41, av. Joffre, La
Garenne (Seine).

86, rue Michel-Ange, Paris.

94, rue Michelet, Alger.

FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.

37, rue de Bourgogne, Paris.

3, bd Beaumarchais, Paris.

VINCENT, 14, av. Mac-Mahon,
Paris.

Labor. DULCIS, pl. Clichy
Monte-Carlo.

Lab. Biologique de l'Île-de-
France, 19, av. d'Orléans,
Paris (XIV^e).

4, rue d'Aumale, Paris.

13, bd de La Chapelle, Paris.

SCIENTIA, 21, rue Chaptal,
Paris (IX^e).

CODY, Brive-la-Gaillarde (Cor-
rèze).

Vierzon (Cher).

18-20, rue Vavin, Paris.

4, pl. Croix-Rousse, Lyon.

156, av. Victor-Hugo, Paris.

CROZET, à Cannes (A.-M.).

à Courbevoie (Seine).

Langeais (Indre-et-Loire).

- Iodo-Juglan**
***Iodolipine**
***Iodo-Magnésium**
***Iodo-Maisine**
Iodométine Hautdidier
***Iodone Robin**
***Iodonésyl**
Iodonine

Iodonion
Iodonoses Clin
***Iodonucléol**

Iodonyl
***Iodopan**
Iodopeptyl

Iodophosfer Duplex

Iodoplasme
Iodoplume

***Iodorganine Mercier**
Iodo Rubidium

Iodo Salva Evesque
Iodosaufryl
Iodoscilline

Iodosigol
Iodosclérol

Iodosoufre

Iodostarine Roche
***Iodosulfène**
Iodotensyl
Iodo-Théine Henry
***Iodo-Thyroidine Catil-**
lon
Iodo-Trypsine
Iodoveine Leduc
Iodo-Vitasine
Iodoxinol
Iodoxol

***Iodurase**
***Iodure Boulard**
***Iodure d'Amidon**
Iodures Cros
Iodures Domergue
Iodure de fer

Iodures Foucher
Iodures Laroze
Iodure Philippe
***Iodures Pachaut**
- LEGALLO**, à Auray (Morbihan).
MONAL, 13, av. de Ségur, Paris.
72, avenue Kléber, Paris (XVI^e).
48, rue d'Alésia, Paris.
37, rue Galilée, Paris.
13, rue de Poissy, Paris.
34, rue Saint-Lazare, Paris.
OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.
9, rue Victor-Letalle, Paris.
20, r. d. Fossés-St-Jacques, Paris.
MAUCHANT, Gennevilliers
(Seine).
56, rue Beaubourg, Paris.
9, rue de la Platière, Lyon.
B.-F. DELAUNAY, Joué-les-
Tours (I.-et-L.).
Lab. DREYER-DUFER, No-
gent-sur-Marne.
85, rue des Morillons, Paris.
PIALOUX, 55, rue de Chabrol,
Paris.
41, route de Turin, Nice.
Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.
10, rue de Belfort, Rennes.
1, place L.-Herr, Paris.
55, av. des Écoles, Cachan
(Seine).
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
30, r. de Sète, Longuyon (M.-et-
M.).
DELANNOY, 20, r. Pré-Saint-
Gervais, Paris.
10, rue Crillon, Paris.
22, r. de la Sorbonne, Paris (V^e).
16, bd Pereire, Paris.
39, r. Sclessin, Liège.

3, boul. Saint-Martin, Paris.
25, rue Jasmin, Paris.
JAUME, à Tamaris (Gard).
H. SALLE, 4, rue Elzévir, Paris.
7, rue St-Isaure, Paris.
Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
Dames, Paris.
18, av. Hoche, Paris.
82, av. de Suffren, Paris.
LUMIÈRE, 45, rue Villon, Lyon.
12, rue de Nice, Paris.
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
64, rue de La Rochefoucauld,
Paris.
19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
2, rue des Lions, Paris.
14, r. Palais-Grillet, Lyon.
130, bd Haussmann, Paris.

Iodures Souffron

***Ioglott**

***Ioguine Delba**

Iolase Corbière

***Ionisalt**

Ionoides

***Ionyl**

Iophénol

Iosorbine

I. O. Z. X.

Ipéca digitale Dausse

***Irénine Gonnon**

Irol Churchill

Irovarine Tisy

Irracalcase

Irradiol

***Irrastérine Byla**

Isacène Roche

Isalaxine

Isobromyl

Isocollium

***Isogev**

Isoluol

***Isonal**

***Isorgane**

Isorhinol

***Iso-Sels**

Isotonine

***Isotonyl (Poudre de Lausanne)**

***Ispaghul**

Ivula Pearson

Ixiode A et B

***Ixium**

Ixogyne

98, rue de Sèvres, Paris.

2, rue Michelet, Alger.

DELBARY, St-Astier (Dordogne).

27, rue Desrenaudes, Paris.

199, bd Bineau, Neuilly-sur-S.

13, rue Pavée, Paris.

La Biomarine, Dieppe (Seine-Inférieure).

P. C. B., 12, r. du Téléphone Bruxelles.

16, r. Ficatier, Courbevoie.

155 bis, r. Lafayette, Paris.

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

12, rue Castiglione, Paris.

R. & A. FEIGNOUX, 95, r. de Turenne, Paris (III^e).

7, rue St-Isaure, Paris.

16, rue de Rocroy, Paris.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

10, rue Crillon, Paris.

BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).

COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

Ph. Anglaise, 62, av. des Champs-Élysées, Paris.

26, rue Chaptal, Paris (IX^e).

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

89, r. du Cherche-Midi, Paris.

LAURIAT, La Garenne-Colombes (Seine).

90, r. Saint-Martin, Étampes.

8, rue Aumont-Thiéville, Paris (XVII^e).

COSPHA, 76, rue des Jacobins, Amiens.

87, rue Lafayette, Paris.

TROUETTE-PERRET, 61, av. Philippe-Auguste, Paris (XI^e).

J. MIDY, 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).

94, rue Michelet, Alger.

98, rue de Sèvres, Paris.

52, rue de Crimée, Paris.

J

- *Jabosulfène** 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Jamax 45, r. Cambronne, Paris (XV^e).
Jap 52, rue La Bruyère, Paris.
Jarsod 50, av. de Normandie, Colombes (Seine).
- *J. B. 5 Bellas** 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse.
- *Jécobiase** D^r R. PIONNEAU, Pharm., Vayres (Gironde).
- *Jécoboldine** D^r L. COUTURE, 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
Jécofluy P. HARDY, 42, bd Saint-Marcel, Paris.
- *Jécol (cachets et gttes)** 3, rue Watteau, Courbevoie.
***Jécolaxine** D^r L. COUTURE, 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
- *Jécopeptol** 13, rue Beudant, Paris.
Jécorine OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Jécorsan Fornet** Inst. de Microbiologie, à Sarrebruck.
- *Jécosédyl** D^r L. COUTURE, 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
- Jéjunine** 42, av. de Breteuil, Paris.
- *Jemalt Wander** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- Jennol** 5, r. E.-Combes, St-Etienne (Loire).
- Jicémine** 304, r. Saint-Jacques, Paris.
- Jodal** 84, fg du Temple, Paris (II^e).
- *Josicol** 19, rue du Bac, Paris.
- Jouvaméllys** Lab. GAMBLY-VISSE, place Hôtel-de-Ville, Salon-de-Provence.
- Jovanyl** 1, place L.-Herr, Paris.
- Jouvein B** 6, rue Berbisey, Dijon.
- Jovine Brisson** 157, rue Championnet, Paris.
- Juglamarine** WARIN, 4, chaussée de la Muette, Paris.
- *Jugland Gmet** 27, faub. Montmartre, Paris.
- Juglandine Ferrouillat** 33, rue Daguerre, Paris.
- *Juglane** à Chambéry (Savoie).
- *Juglanrégine** 58-60, rue des Moulins, Valence (Drôme).
- Juniodyl** THÉVENOT, 21, rue des Roses, Dijon.
- Juniophos** Joué-les-Tours (I.-et-L.).
- Junovarine** H. DUBOIS, Tours (I.-et-L.).

Juraisin Macon***Juranol****Jus de myrtille pure****Jus de pomme « Le
Suc Normand »****Jus de raisins Chal-
land****Jus de raisins Fructu-
val*****Jus de raisins Pampryl*****Jus de raisin quoti-
dien*****Jus intégral de pommes
fraîches « Dallery »****Juvantol****Juvenex****Juvéol****Juvigor**Établ. Œnologiques de Bour-
gogne. Mâcon (S.-et-Loire).
5, bd du Montparnasse, Paris
(VI^e).H. CHARTIER, Saumur (M.-
et-L.).

id.

Nuits-St-Georges (C.-d'Or).

Lab. du COMTAT VITICOLE,
Avignon (Vaucluse).

21, rue de Mâcon, Paris.

H. CHARTIER, Saumur (M.-
et-L.).75, av. Victor-Hugo, Fresnay-
sur-Sarthe (Sarthe).

23, rue Beautreillis, Paris.

27, rue des Batignolles, Paris.

17, rue Cadet, Paris.

Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

K**Kalastyl****Kalefluid****Kaliosol*****Kalmangor****Kalimidor****Kalmine*****Kalmigraine*****Kalmobrol****Kalmogastrol****Kamara C. 47*****Kaneuron*****Kaobrol*****Kaolinase****Kaolinase Belladonée****Kaolin Crookes****Kaolin Géo****Kaolovules*****Katox*****Kaviase**

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).

21, av. de Neuilly, Nanterre.

55, av. des Écoles, Cachan
(Seine).Lab. FAURE & LAGENTE,
Montargis (Loiret).

MÉTADIER, à Tours.

MEUNIER, rue du Commerce,
Montmarault (Allier).**Voir Calmobro-Niel.**

132, av. Victor-Hugo, Paris.

72, quai Jemmapes, Paris.

LABIOLA, 52, rue de Cambrai,
Lille.

54, r. Paris, Charenton (Seine).

12, bd Saint-Martin, Paris.

id.

2, fg Saint-Denis, Paris.

20, cours Morand, Lyon.

58, rue de Maubeuge, Paris.

Voir Cobratoxine.CANAT, 22, rue Lalande, Pa-
ris (IXV^e).

- Kéfir Nutricia**
***Kéfirogène**
***Kélédol**
 Kélène
 Kénapirine Chanteaud
***Kénol**
 Képhaline Brunot
***Képhédryl**
 Kéraffine
***Keralax**
 Kéraphiline
***Kérasalicyl**
 Kératolyne
 Kératoplastol
 Kerlactine
 Kerlol Lerck
 Ketophan
***Kidoline**
***Kidophédrine**
 Kina-Coca-Kola
 Kina Elzévir
***Kinaldyne**
 Kinébyl
***Kinéchol**
***Kinectine**
 Kinégastrine
 Kinémyl Bulgare V. B.
 Kineurine Moncour
 Kinopancréatine Henry
 Kinoram
 Kioleane
 Kipsol
 Kitine
***Kluchol Remeaud**
 Koch-I-Cide
***Kodos**
 Koddyl
 Kola caféinée
 Kola-fer Trouette
- 142, r. Fransman, Bruxelles.
 CARRION-LAGNEL, 5, rue
 du Capitaine-Scott, Paris.
 D. RAQUET, 114, rue Solfé-
 rino, Lille.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 3 et 5, rue Alex.-Dumas, Saint-
 Ouen (Seine).
 MILLET & GUILLAUMIN, 4,
 r. Richer, Paris et 5, r. Am-
 broise-Thomas.
 10, pl. Thiers, Le Mans.
 1, rue Auber, Paris.
 THÉRAPLIX, 98, r. de Sèvres,
 Paris.
 1, rue Auber, Paris (IX^e).
 112, r. de Gerland, Lyon.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 HYGIO DONTIS, Croissy-sur-
 Seine (S.-et-O.).
 L. DORDIN, Harnes (P.-de-C.).
 1, rue Lassalle, Lyon.
 63, pl. St-Roch, à Saint-Étienne.
 6, r. des Cigognes, Strasbourg.
 GALLIER, 38, bd Montpar-
 nasse, Paris.
 Lab. R. GALLIER, 38, bd du
 Montparnasse, Paris (XV^e).
 GRANVAL, 12-14, rue Fery,
 Reims.
 SAILLE, 4, r. Elzévir, Paris.
 2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
 24, bd J.-Jaures, Boulogne-sur-
 Seine.
 29, r. des Marchands, Avignon.
 12, r. du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne.
 LEURQUIN, 50-52, rue Pierre-
 Legrand, Lille.
 Les Bourdons, Nevers (Nièvre).
 49, av. Victor-Hugo, Bou-
 logne-sur-Seine.
 HENRY, 39, rue de Sclessin,
 Liège (Belgique).
 H. DUBOIS, Tours (I.-et-L.).
 53, bd de Verdun, Fontenay-
 sous-Bois.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 90, rue Saint-Martin, Étampes.
 38, av. J.-B. Clément, Boulogne-
 sur-Seine.
 LEISYN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
 rte du Mouleau, Arcachon
 (Gironde).
 23, rue de Douai, Lille (Nord).
 3, pl. Jussieu, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.

- Kola Gmet**
***Kola granulé Astier**
Kola granulé Roy
Kolaine
Kola Midy
***Kola Monavon**
Kola

Kola Pausodun

Kola Pichat
Kola Rik
Kola Roy
Kolarsan
Kolarsine Pautauberge
***Kola Sthemyl**
Kolasthène Badel

***Kolatinés**

***Koumyl**
Kréazone

***Kydalose**

***Kymosine Rogier**
- 27, fg Montmartre, Paris.
 42, rue du D^r-Blanche, Paris
 81, boul. Suchet, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 14, rue Victor-Hugo Lyon.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 6 bis, rue Campagne-Première,
 Paris (XIV^e).
 5, cours Charlemagne, Lyon.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 81, bd Suchet, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 10, r. Constantinople, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 58-60, rue des Moulins, Valence
 (Drôme).
 75, rue Jacques Dulud, Neuilly-
 sur-Seine.
 50, r. Nationale, Lille.
 TROUETTE, 61, av. Philippe-
 Auguste, Paris.
 DALIN, 49, quai Saint-Vin-
 cent, Lyon.
 56, boul. Péreire, Paris.

L

- *Lab-Lacto-Ferment**
Laborol
***Laccodermes Brisson**
***Lachésine**

Lacodia
***Lacpinine**
Lacrenile Meurice
***Lac-Ser**
Lacta
***Lactagol**
Lactalvose
***Lactaris**
Lactéol Boucard
Lactéomaltol
Lactermol Vigier
Lacticholéine Tulivet
- MIALHE, 8, r. Favart, Paris
 CHAUVIN, Aubenas.
 157, r. Championnet, Paris
 RENAUD, 2, r. P.-Demours,
 Paris.
 Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).
 FISCH, Mer Rouge, Mulhouse.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 6, rue Berbisey, Dijon
 48, rue d'Alésia, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 129, r. de Turenne, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 9, rue Rodier, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.

- *Lactifère
- Lactigélose
- Lactimase
- *Lactobacilline
- Lactobactyl
- *Lactobyl
- *Lactocalcine
- *Lactochol
- Lactocoaguline Fabre
- Lacto-Diastal
- Lacto-ferment
- Lactofermentine
- Lactogélose
- *Lactolaxine Fydau
- *Lactoma
- Lacto Mannitase
- Lacto-Magnésie Vita
- Lactomorrhuel
- Lactophéine
- Lactophorine
- Lactophosphine
- *Lactoprotéide
- Lactorum
- Lactoscoparine
- Lactosine
- *Lactoseptyl Legrand
- *Lacto-Sérum Carrion
- *Lacto-Sérum Lavril
- *Lactosmose
- *Lactosodine
- Lactosone
- Lactozymase B.
- Lactyl Meurice
- Lait albumineux Mol-lard
- Lait allégé Dieticus
- *Laitancyl
- Lait Berna
- *Lait calcique Zizine
- *Lait Dardelet
- Laits de cèdre Sapolan
- *Lait de Magnésie Bey-tout
- *Lait de magnésie Phil-lips
- 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- DUCLOY, Arques (P.-de-C.).
- 18, av. Hoche, Paris.
- Rue Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
- TORAUDE, 22, r. de la Sor-bonne, Paris.
- 25, rue Jasmin, Paris.
- 7, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 25, rue Jasmin, Paris.
- 33, r. de la Haie-Cocq, Aubervil-liers.
- 45, fg Saint-Denis, Paris.
- OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- THÉVENOT, r. des Roses, Dijon.
- DUCLOY et C^{ie}, Arques (Pas-de-Calais).
- 4, r. de La Motte-Picquet, Paris.
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
- 37, r. de Tivoli, Bordeaux.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- DELPECH, 5, rue Danton, Paris.
- CACHAT, Évian - les - Bains (Haute-Savoie).
- 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
- 8, rue de la Pompe, Paris.
- CARRION, 54, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
- 50, bd des Batignolles, Paris.
- CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- 142, r. Fransman, Bruxelles.
- 11, pl. Louis XII, Blois (L.-et-C.).
- 54, Fg Saint-Honoré, Paris.
- Pacy-sur-Eure (Eure) et 26, bd. des Batignolles, Paris.
- Pacy-sur-Eure (Eure) et 26, bd des Batignolles Paris.
- 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
- 17, rue Cadet. Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 25, cours Lafayette, Lyon.
- 15, quai de Bourbon Paris.
- R. PANIER, Malo-les-Bains.
- 199 bis, rd St-Genève, Paris.
- 24, rue de Fécamp, Paris.
- Bonnard (Yonne).
- CAVAILLÈS, 29, r. de Singer, Paris.
- 12, bd St-Martin, Paris.
- O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris.

- Lait de Sapolan
 Lait de Soufre Sapolan
 *Lait Gallia Ch. Ger-
 vais
 Lait Gloria
 *Laits Guigoz : en pou-
 dre, dextrosé, malté,
 déchloruré
 Lait Lepeletier
 Lait déchloruré Mo-
 lard
 Lait Molard au Calcia
 Lait Mont-Blanc
 Lait Ofco
 *Laits Carrion
 Lait sec Lo-lo
 Lait sec Nutricia
 Lait Seklé
 Laits Nutricia
 Laminarol
 Laminiodé
 Laminolax
 Lanatine
 *Lanceryl

 *Lansoyl

 *Lantol
 *Largocol Gef
 *Laristine Roche

 Larocaïne
 *Larosan Roche
 *Laroscobine
 Laryngol Reys

 Laryngolan
 *Lasal
 *Laurénol
 Lavement mucobary-
 tiné
 Lax
 Laxafégine
 Laxaflor
 Laxagarine

 *Laxamalt

 Laxamer Lefèvre
 Laxapoudre Fleury
 Laxatif Châtel-Guyon
 Gubler
 *Laxatifs Miraton
 Laxatine Mory

 Laxatol
 Laxatone Déjardin
- 29, rue Singer, Paris.
 id.
 11, rue de Prony, Paris.
 4, r. Roussel, Paris (XVII^e).

 2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
 48, rue Ampère, Paris.

 25, cours Lafayette, Lyon (VI^e).
 id.
 Rumilly (Haute-Savoie).
 25, av. Michelet, Saint-Ouen.
 5, r. du Capitaine-Scott, Paris.
 123, rue de Paris, Saint-Denis.
 1, bd Saint-Martin, Paris.
 51, rue Rennequin, Paris.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 132, r. de Turenne, Paris.
 29, av. de Saint-Mandé, Paris.
 id.
 8, rue Favart, Paris (II^e).
 MOREAU, 13, r. des Nonnains-
 d'Hyères, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La
 Garenne (Seine).
 18, av. Hoche, Paris.
 269, rue Judaïque, Bordeaux.
 HOFFMANN LA ROCHE,
 10, rue Crillon, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 id.
 id.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (B.-Rh.).
 24, rue Jardel, Bordeaux.
 348, rue Saint-Honoré, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.

 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
 19, av. Secrétan, Paris.
 74, rue Lourmel, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières
 (Seine).
 LICARDY, 38, bd Bourdon,
 Paris-Neuilly.
 52, rue Decamps, Paris.
 BATTUT, à Vatan (Indre).

 70, rue Legendre, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois.
 Bruxelles.
 SAUBA, Montreuil.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris

- Laxaul**
Laxaval
Laxia Dannec'h
Laximauve
Laxinol-Vichy
Laxocholéine Tulivet
Laxogélose Tulivet
Laxoil
Laxoléine
Laxol Fraudin
Laxo-lin
Laxolip Henry
***Laxopeptine Girard**
Laxophényl
Laxophore Brachim
Laxo-Psyllium
Laxor
***Laxorange Connat**
LebnoI
Lécithine Adrian
Lécithine Clin
***Lécithine Colloïdale**
***Lécithine Vacheron**
Lécithine Vial
Lécithocéril
***Lénadryl**
***Lénibar**
Lenicade Brisson
Lénicure-Vichy
***Lénientol**
***Lénifédrine**
***Léniforme**
Lénigastre
Léophani
***Lenior Bonnet**
***Léotamine**
***Leptab**
Leptandrine Royer
***Leptol**
***Léthalgol**
***Leucagine**
Leucobules Gallier
Leucogénase
Leucolyse
- pl. Guillaume-le-Conquérant, à
 Falaise (Calvados).
BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
 64, rue des Tournelles, Paris.
 7, rue de la République, Puteaux
 (Seine).
PATRICE, à Vichy.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.
 id.
 74, rue Monge, Paris.
MILLET, à Rambouillet.
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 182, av. de Versailles, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège.
 48, rue d'Alésia, Paris.
THOMAS, Eurville (Hte-Marne)
 à Joinville (Haute-Marne).
LANDON Pen, av. Baraduc,
 Châtel-Guyon (P.-de-D.).
 Lab. Biologique de l'Ile-de-
 France, 19, av. d'Orléans
 Paris.
M. FOLLIET, Rumilly (Hte-Sa-
 voie).
 23, rue de Douai, Lille.
 9, rue de la Perle, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
 Paris.
 8, rue La Fayette, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 8, rue Vivienne, Paris.
 20 bis, rue Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
NOVALIS, Oullins (Rhône).
DROUET & PLET, Rueil-
 Malmaison (S.-et-O.).
 157, r. Championnet, Paris.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 27, rue Brézin, Paris (XIV^e).
 26, rue Pétreille, Paris.
 id.
PERROUD, 3, rue Sébastien-
 Gryphe, Lyon.
 11, square Marie-Louise,
 Bruxelles.
 Lab. du STÉAROL, 5, r. E.-
 Combes, St-Etienne (Loire).
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 223, rue Saint-Martin Paris.
 333, rue de Vaugirard, Paris.
 32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 32, rue de l'Ouest, Paris.

- Leucosérum**
Levaine
- *Levulinyl**
Levurase
- Levure B. 17**
Levure Boss
- Levure Coirre**
Levure de bière
Levure Déjardin
Levure fraîche Mycéta
Levure Mycéta en com-
primés
Levure Vitæ d'Irwing
Levure Zymaculine
***Levurine extractive**
Lévurine brute
Levuritin
- Lévuromaltine Dejar-**
din
Libérase
- Libérine**
Licardet Brisson
***Lichénose**
Ligatures chirurgi-
cales
Likan Asiatique
Limital
- Limmerol**
Limnéol
- *Limol Churchill**
***Limonade (Voir Citrose**
Vichy)
***Limonade Godfrin**
- Limonade hypotensive**
- Linadéline**
- Lin Tarin**
Liniderme
Liniment Bertrand
Lipasonol
***Lipaurol**
- Lipex**
- *Lipiodol Lafay**
Lipiodol « F »
Lipobil
- 50, rue Nationale, Lille.**
OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.
3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
CHARMAISON, av. de Royat,
Chamalières (P.-de-Dôme).
22, rue de la Sorbonne, Paris.
Lab. G. CÉSAR & B. BOSS,
Besançon (Doubs).
5, bd Montparnasse, Paris.
ADRIAN, 9, r. de la Perle, Paris.
10, r. Parent-de-Rozan, Paris.
34, rue Vignon, Paris (IX^e).
26, rue Vauquelin, Paris (XV^e).
PALC, Mussigny (Côte-d'Or).
26, rue Vauquelin, Paris (XV^e).
18, av. Hoche, Paris.
id.
FEIGEL, à Lutterbach (H.-
Rhin).
DEJARDIN, 10, rue Parent-de-
Rozan, Paris.
35, av. de Versailles, Paris
(XVI^e).
CAPIN, Roquefort (Landes).
157, rue Championnet, Paris.
Ducloy & C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.
5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
Lab. ROMON, 11 ter, av. de
Ségur, Paris.
12, rue de Strasbourg, Paris.
12, pl. Renoux, Clermont-Fer-
rand (P.-de-D.).
12, rue Castiglione, Paris.
7 bis, rue Galvani, Paris.
5, av. Watteau, Nogent-sur-
Marne.
PACHAUT, 130, bd Haussmann,
Paris.
Lab. VARIOT, 151 bis, Grande-
Rue, Villemomble.
6, rue Dombasle, Paris.
24, bd Sebastopol, Paris.
Nomexy (Vosges).
19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
LECOQ & FERRAND, 14, r.
A.-Briand, Levallois-Perret.
41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).
22, rue du Landy, Saint-Ouen.
id.
29, pl. Wilson, à Denain.

- Lipo-Bismuth Ercé** 37, r. de Bourgogne, Paris.
***Lipocérébrine** LEMATTE & BOINOT, 52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
Lipochol Byla 26, av. Observatoire, Paris.
***Lipocrinyl** 154, av. Malakoff, Paris.
Lipocytol Grémy 14, rue de Chichy, Paris.
Lipodeterpénol Zyma 26, rue Vauquelin, Paris.
Lipoféine 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
Lipogazes dermatologiques LECOQ & FERRAND, 14, r. A.-Briand, Levallois.
Lipogyre Ciba 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
Lipoïodine Ciba id.
Lipol 34, pl. Alex-Dumas, Lille.
Lipolysine Martinet 16, rue du Petit-Musc, Paris.
***Liposeptine** 2, pl. des Vosges, Paris.
***Liposeptol** id.
***Liposplénine du D^r Groc** 14, rue des Minimes, Paris.
Lipothine JOSSE, pl. Wilson, Denain.
Lipo-Vaccins 32, rue de Vouillé, Paris.
***Lipovita** MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
Liqueur de l'Étoile antiasthmatique MONIN, 49, rue de Maubeuge, Paris.
Liqueur d'Hermès 12, bd Saint-Martin, Paris.
Liqueur Laprade 49, rue de Maubeuge, Paris.
Liqueur Laville 20, rue Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Liqueur peptophosphorique ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Liqueur de Pittermont 2, rue de Paris, à Douai.
Liqueur Talobre Saint-Girons (Ariège).
Liqueur Thyro 3, r. de Dunkerque, Paris.
Liqueur à la Thyroïdine Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
Liqueur végétale Narud 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
Liq. organiques inject. BOUTY, 3, r. Dunkerque, Paris.
Liqueur dépurative G. LAURENS, Pharm., Aix-en-Provence.
Vérandy Ph. DELAPRÉE, Mortagne (Vendée).
***Liquidix** 19, rue Drouot, Paris.
Liseronine 7, rue L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
Listérine 17, d. Haussmann, Paris.
***Listose Vicario** CORTIAL, 7, rue de l'Armorique, Paris.
***Lita** 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Lithane 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
Litharsyne Ferré 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
Lithiné Henry 6, pl. de l'Académie, Angers.
Lithinés Magnésiés R. FOSSE, 86, rue du Pas-St-Georges, Bordeaux.
Maxim 41, bd Haussmann, Paris (IX^e).
***Livartil**
Liverphine

- *Lobéliane Laleuf
- *Lobéline
- *Lobéline Bruneau
- Lobuline
- Locrinol
- *Lofodol
- *Logaphos
- *Loraga
- Lortocarbol
- *Lotion Blanche R. P.
- *Lotion végétale Pachaut
- *Lotion Py
- Luargol
- Luatine
- Lual
- Luarsyl
- Luatol
- *Lubrokai
- Luchon
- Lucinine
- *Lucodal
- Lucosalgue
- *Ludin
- Luérol
- *Lugocalcion
- *Lumeval (Voir Dragées Lumeval)
- Luostyl
- Lusitol
- *Lusoforme
- *Luteovar
- Lux-Gaillac
- Luxiber
- Lycétol Vicario
- Lyciflore
- Lycobile
- Lycetine (Elixir)
- Lyclogen
- Lymnéogène
- Lymphactol
- *Lymphiode
- *Lynevol
- *Lynoléol
- Lysacrème L. M. L.
- Lysarthrol
- Lysaxins L. M. L.
- Lysidinal
- Lysiode
- Lyso-Choc
- Lysol
- 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
- 20, rue Vernier, Paris.
- 17, rue de Berri, Paris.
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
- GUÉRAUD, Pharm. à Chabeuil (Drôme).
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- 13, rue Pagès, Suresnes.
- 86, bd Port-Royal, Paris.
- La Roche-Posay (Vienne).
- 130, bd Haussmann, Paris.
- 58, bd Richard-Wallace, Pu-teaux (Seine).
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 2, av. Parmentier, Paris.
- BAILLY, 15, r. de Roine, Paris.
- id.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 19, rue Drouot, Paris.
- C^{ie} Fermière de Luchon (Hte-G.).
- 88, rue Duhesme, Paris.
- 2, quai Paul-Bert, Tours.
- 10-12, r. de la Fraternité, St-Mandé.
- REY, 12, r. Montmartre, Dijon.
- 37, rue Pajol, Paris.
- NOVALIS, Oullins (Rhône).
- 52, bd du Temple, Paris.
- 22, rue de Nemours, Paris.
- 7, passage Thionville, Paris.
- 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- 20, fg Poissonnière, Paris.
- av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).
- LECONTE, 12, Grande-Rue, Évreux (Eure).
- 17, bd Haussmann, Paris.
- HOURTOULLE, 11, rue des 2-Ponts, Paris (IV^e).
- 11, rue de Clichy, Paris.
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
- id.
- 26, rue Cambon, Paris.
- 4 bis, rue de Lyon, Paris.
- 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- 112, rue des Pyrénées, Paris.
- F. MONGE, Pharm., Oullins (Rhône).
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
- BEDAIL, Lavelanet, Ariège.
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- 65, r. Parmentier, Ivry (Seine)

Lysolats
Lysomol
Lysosclérol
Lysurol
***Lyxanthine Astier**

65, rue Parmentier, Ivry.
HENDRIX, à Anvers (Bel-
 gique).
 Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 112, rue de Gerland, Lyon.
 42, rue du D^r-Blanche, Paris.

M

Maganéol
***Magbi**
***Magbromyl**
***Magécarine**
***Magiodyl**
Magistère de Bismuth
Maglose
***Magnacalcine**
Magnebyl
Magnécal
Magnéclo
Magnécythine D^r Tissot
***Magnélaix**
Magnésia Régnier
Magnésie Bismurée
Magnésie Drouet
Magnésie Durel
Magnésie D^r Gustin
Magnésie hydratée
Magnésie Roger's
Magnésie Roy
Magnésie San Pelle-
grino.
***Magnésie Storck**
Magnésio - Cacodyline
Jammes.
Magnésiode
Magnésion
***Magnésium Boulard**
Magnésium chloruré

Le Blosset, Moulin-s.-Yèvre
(Cher)
 61, rue de Seine, Paris.
 10, rue J. Hachette, Ivry (Seine).
 15, r. St-Maurice, Nanterre.
 10, r. J.-Hachette, Ivry-s.-Seine.
 2, bd Pershing, Paris.
 178, rue Montmartre, Paris.
SANOVA, 103, r. Saint-Lazare,
 Paris.
 126, rue de la Pompe, Paris.
 54, rue des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
FAURE & DUSSUEL, Aix-les-
 Bains.
 75, rue Grande, Fontainebleau
 (Seine-et-Marne).
SCOTT, 348, r. St-Honoré, Paris.
 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
 7, bd Denain, Paris.
BRISSON & C^{ie}, 157, r. Cham-
 pionnet, Paris.
 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison
 (Seine-et-Oise).
 103, rue St-Lazare, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 71, av. Victor-Emmanuel-III,
 Paris.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 20, pl. de la Mairie, Parc-St-
 Maur (Seine).
 27, r. Poids-de-la-Farine, Mar-
 seille.
 82, av. de Suffren, Paris.
 107, av. de la Reine, Boulogne-
 sur-Seine.

- Magnésium chard** Grori- 12, pl. de la Révolution, Besançon.
- *Magnésium Hardy** 42, bd Saint-Marcel, Paris.
- (Sirop et Tablettes-Bouillon)** 37, rue Galilée, Paris.
- Magnésol** Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
- *Magnésotubes Robinet** 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- *Magnésosules** ROUX, 58, rue de Maubeuge, Paris.
- Magnétol** 10, rue Vignon, Paris.
- Magnétone** 17, rue du Midi, Vincennes.
- Magnidia** 13, av. de Ségur, Paris.
- Magnogène** 87, av. Borriglione, Nice.
- Magnolax** 12, rue Castiglione, Paris.
- *Magol Churchill** 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
- *Magsalyl** 102, av. Michelet, Saint-Ouen (Seine).
- *P^aaigrylline** 143, r. d'Alésia, Paris.
- *Maisleriase** id.
- Maisleriase F.** id.
- Maisleriase P. M.** id.
- Maisloriase vétérinaire** id.
- *Maïzena** 29, rue de Berri, Paris.
- Malarsan** P. AUBRY, 62, rue Erlanger, Paris.
- Maltase Fanta** Brasserie FANTA, 77, av. A.-Briand, Montrouge (Seine).
- Malt Barley** id.
- Malt des Nurses** à Bourg-la-Reine.
- *Maltea Moser** 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
- *Malt Ethel** Usines ETHEL, Schiltigheim (Bas-Rhin), 132, r. du Fg-St-Denis, Paris.
- *Malt français Déjardin** 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
- (extrait)** à Roanne (Loire).
- Maltine Gerbay** Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.).
- Malt Kneipp** MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
- Maltine-Phénix** 189, rue de Vaugirard Paris.
- Malt Moritz** Progil, 10, quai de Serin, Lyon, et Ris-Orangis (S.-et-O.).
- *Maltogil** 20, Fg Poissonniere, Paris.
- Malt-Oléol** 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
- *Maltosan** 10, rue Parent-de-Rosan, Paris (XVI^e).
- *Maltosine Déjardin** 10, rue Pajol, Paris.
- Malt Régina** 12, rue Broca, Paris.
- Malt Strauss** 151 bis, route de Joinville, à Champigny (Seine).
- *Malt Wander** 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- Malzémose** 7, rue Biscornet, Paris.
- Mamelle Endocrisines** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Fournier**
- Mameline Meurice**

- Mammairovarique**
Mercier
Mammol
- *Manacine**
***Mancobène**
***Mandelium**
Mandragol
- *Mangaïne**
***Manganésia**
- Manganifer**
- Mangano-Calcique**
Mangano-Fer Henry
Manganonuclyl
- *Mangano Phosphal Julien**
Mangaphos
Mangarsenic
Manglynol Ducatte
Mangratines
Mannitine
Marabout
Marcynase
- *Marinol**
Mariode
Marisine
- Marnal**
Marron d'Inde Dausse
Marronine
- *Marrubène**
***Marrubiase**
- *Marrucol**
Marruséra
Marsyle Clin
- *Marubor**
- Masbi**
Masglandol
- *Maté Douglas**
Matéine Dufert
Matico de Grimault
Maya Bulgare
Médicament de Saint-Boes
Medicoferments Boss
Mégathion
- 41, route de Turin, Nice.
 Lab. ISCOVESCO, 107, rue des Dames, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 32, rue de l'Ouest. Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 Produits Dannec'h, 64, rue des Tournelles, Paris.
 VIGIER, 9, rue de la Gare, Levallois (Seine).
 à Saint-Amand-Montrond (Cher).
 36, rue de Sclessin, Liège.
 B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 105, rue de Rennes, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 D^r LAVOUÉ, Rennes (I.-et-V.).
 31, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 62, r. Carnot, Vernon (Eure).
 6, rue Trencavel, Béziers.
 11, r. Antoine-Bourdelle, Paris.
 Dieppe (Seine-Inférieure).
 14, r. des Pyramides, Paris.
 15, r. de l'Hôtel-de-Ville, Brive (Corrèze).
 8, rue Ribelette, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 61 bis, rue Corot, Ville-d'Avray (Seine-et-Oise).
 2, pl. des Vosges, Paris.
 COMTE, 60-62, rue St-Guilhem, Montpellier.
 69, av. du Maine, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 VALENTIN, 1, rue d'Arras, Béthune (P.-de-C.).
 7, pass. Thionville, Paris.
 43-45, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 62, Champs-Élysées, Paris.
 163, r. de Flandre, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 322, r. Saint-Honoré, Paris.
 par Orthez (Basses-Pyrénées).
 10, r. de la Viotte, Besançon.
 OLIVIERO, Boulogne-sur-Seine

- Mélange Anesthésique**
 Adrian 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
Mélange Anasthésique
 de Schleich id.
Mélange Balsamique
 de Schleich id.
Mellolaxine 3, r. Royet, Lyon.
Ménacrine 18, r. Ferdinand-Flocon, Paris.
***Menatol** BAILLY, 15-17, rue de Rome, Paris.

Menopausine 9, pl. de la Paix, Mulhouse.
***Menosedine** Lab. Demasles, Vienne (Isère).
Ménovarine 211, r. de la Convention, Paris.
Mensalgine 3, bd Beaumarchais, Paris.
Mensorrhine EON, 3, r. des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).

***Mensuosedyl** AUGIER, 2, r. des Lombards, Paris.

***Menthe Mitcham Védé** 2 et 4, pl. Gambetta, Paris (XX^e).
Mentholina Lab. Demasles, Bois-Colombes.
Menyantal Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
Méral 61, av. Louise, Bruxelles.
Mercuriaux Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Mercurochrome 220 AMECOUSEMA, 25, r. St-Augustin, Paris (II^e).

Mériod 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
Méroléol Salle 4, rue Elzévir, Paris.
Mésiforme 17 bis, av. Parmentier, Paris.
Mésogastrine 37, av. Jules-Coutant, Ivry-sur-Seine.

***Mésothine Rhemda** 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).

Mésothorium Buisson 98, rue de Sèvres, Paris.
***Mésothorium Rhemda** 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).

***Mésothorium Théraplix** 98, rue de Sèvres, Paris.
***Métacarbine** 3, pl. Jussieu, Paris.
***Métacitrine** id.
***Métacuprol** 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e).
***Métaformine** AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
Métalase 252, fg Saint-Martin, Paris.
Métallosal 149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux.

Métarapnol 50, av. de Normandie, Colombes (Seine).

Métarsine Jasma JARMON, 4, pl. de la Gare, Tunis.

Métasept 1, r. de Besançon, Montbéliard (Doubs).

Métasérum BOUTY, 3, rue de Dunkerque, Paris.

Métasulfol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***MétaTitane** Paul MÉTADIER, à Tours.
***Métaux colloïdaux** 8, rue des Capucines, Paris.
Métaux et Métalloïdes Vivants 82, av. de Sully, Paris.

- *MétaVaccin
 Métharfer Bouty
 Métharsinate Clin
 Métharsol Bouty
 Méthinol
 Méthylarsinates Bouty
 Méthylarsinate Vicario
 Méthylarsinate Vigier
 Métophan
 Métricine
 Métricure (poudre et ovules)
 *Metritols
 Métrostyptal Grorichard
 *Mexyl
 Meyor
 *Micelliode
 Micoforme
 *Micranyl
 Microbol
 *Microderme
 Microgel
 *Microlyse
 *Microvax
 *Mictasol
 *Mictasol Bleu
 *Mictophile
 *Mictoséda
 Mictosédine
 *Mictoseptol
 *Mictualine
 Milkase
 Mimophédrine
 Minéraline du Dr Baud
 *Minéralogène
 Minérol
 Minérolaxine
 *Minervol
 Mintosal
 *Minurex
 *Miroxyl Lahaye
 Misalgol
 *Mixiod
 Moka du Travailleur
 Mokavène
 Paul MÉTADIER, à Tours.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 39, rue de la Gare, à Bondy (Seine).
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 34, bd Victor Hugo, Grasse.
 23, Gde-Rue, Asnières (Seine).
 21, rue de Lyon, Paris.
 127, bd Saint-Michel, Paris.
 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 6, rue des Dames, Paris.
 12, Grande Rue, Évreux.
 4, rue Platon, Paris (XV^e).
 SAVARY, Sallaumines (P.-de-Calais).
 GRÉMY, 14, rue Clichy, Paris.
 145, chem. de la Madrague-de-Montredon, Marseille.
 25, rue du Général-Foy, Paris. (VIII^e)
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 10, rue Strasbourg, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 BARBE, 155, bd Magenta, Paris id.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 Lab. FAURE & LAGENTE, Montarais (Loiret).
 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 CLUZEL, 60, cours É.-Zola, Lyon.
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, Salon-de-Provence.
 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
 MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
 Voir Arteriolex.
 10, rue Richelieu, Paris.
 Dr LETANNEUR, 87, av. Borriglione, Nice.
 2, rue Mélingue, Paris.
 JOUFFRAY, Bourg-en (Isère).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 36, rue de Verdi, Nice.
 16, rue de Rocroy, Paris.

- *Molagar**
Molavose
***Molène**
Mondorasme
Moranyl
***Moréthyl Dausse**
***Morisland**
Morphéroinn Leisyn
***Morrhualène Gautier**
***Morrhuéline Jungken**
***Morrhuéline Jungken**
Vitaminée
Morrhuline Puy
***Morrhuel**
***Morrhuxine**
***Moruan**
***Morubiase Crosnier**
Morubiline
***Morucalcose**
***Morufine**
Moruphyle
Moruxase concentrée
Mosti
***Mothersill's seasick**
remedy
Mouches Albespeyres
Movebil
***Mucicarbos**
Mucicardine
Mucigénol
***Mucilage Goy**
***Mucilaxine**
Mucilose
***Mucinum**
Mucobarytine
***Mucobismuthine**
Mucobyl
Mucogène Astier
Mucoléine
***Mucosodine**
***Mucyllium**
Mugrizol Dumesnil
- Lab. SUBSTANTIA, 13, r.
 Pagès, Suresnes (Seine).
 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
 14, rue A.-Briand, Levallois-
 Perret.
 95, rue de Turenne, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 CHEVILLON, 99, rue de Paris,
 Massy (S.-et-O.).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 17 bis, avenue Parmentier,
 Paris.
 105, r. de Normandie, Cour-
 bevoie (Seine).
 id.
 à Grenoble.
 8, rue Vivienne, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil.
 32, rue Joubert, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 BOST, Villefranche (Rhône).
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 21, rue Mouton-Duvernet, Paris
 (XIV^e).
 5, rue de Provence, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 5, pl. Bisson, Lorient.
 Lab. E. MILLET, à Rambouil-
 let (Seine-et-Oise).
 MOUFLET, Chennebrun (Eure).
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris (XIV^e).
 Lab. E. MILLET, à Rambouil-
 let (Seine-et-Oise).
 id.
 CHANTEREAU, 26 bis, rue
 Dombaste, Paris.
 145, r. Yves-le-Coz, Versailles.
 145, r. Yves-le-Coz, Versailles.
 4, av. Maurice-Berteaux, Poissy.
 (Seine-et-Oise).
 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
 LANDON, av. Baraduc, Châtel-
 Guyon.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 BERNARD-GARCIN, Saint-Sa-
 turnin-lès-Avignon (Vaucluse).
 10, rue du Plâtre, Paris.

*Multiplast

*Muoléol

Muqueuse Endocris-
nes Fournier

*Muronos du Dr Robert
Jacques
Musclanol
Musculargyre

*Musculogénol

Musculosine Byla

Mustérole
Mutandine

*Muthanol

*Muthiode

Muthoquinol

*Muxagol

Muxol
Muxyl

*Mycidol Badel

Mycolactine

*Mycolysine Doyen

Mydriasine

Mydriédrine

*Mygdal

*Myochrysine

*Myoden (Baume et
Elixir)

Myodone

Myodyne Mauchant

*Myoral

Myo-Sérum

Myosine (forte et faible)

*Myosthène

Myotonine

*Myothermine

*Myovarsyl

Myrcia

Myrcol

Myrone

Myrrhina

Myrtane

Myrtanol

Myrtilline

3, r. des Reculettes Paris (XIII^e).
A. BLANC, Barcelonne-du-Gers
(Gers).

7, rue Biscornet, Paris.

SILBERT RIPERT, 30, rue
Benedit, Marseille.

13, rue Saint-Agricol, Avignon.
FEIGNOUX, 95, r. de Turenne,
Paris.

117, r. Victor-Hugo, Houplines
(Nord).

26, av. de l'Observatoire, Paris.

5 bis, rue des Haudriettes, Paris.

GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.

22, rue de Turin, Paris.

Lab. LECOQ & FERRAND,
14, r. Ar-Briand, Levallois-
Perret.

102, av. Michelet, Saint-Ouen.

8, rue Dr-Jean-Sicard, Marseille.

Lab. SERVIER, à Orléans.

77, bd de Grenelle, Paris.

à Valence-sur-Rhône.

122, r. du Cherche-Midi, Paris.

5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.

Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.

194, rue de Rivoli, Paris.

295 bis, rue de la Benauge,
Bordeaux.

SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
Paris.

E. DAUPEZ, 37, rue des Lois,
Toulouse.

42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Gennevilliers (Seine).

3, rue Saint-Roch, Paris.

168, bd St-Germain, Paris.

Labor. DULCIS, pl. Clichy,
Monte-Carlo.

E. BARTIER, Armentières
(Nord).

14, av. Perrichont, Paris.

47, r. Bokanowski, Asnières.

89, rue Cherche-Midi, Paris.

38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).

72, quai Jemmapes, Paris.

42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.

38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).

42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.

19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.

Lab. DEMASLES Vienne (Isère)

N

- Nader**
Nadolor
Nadorine
***Naïodine Logeais**
Naphtocarbène
Naphtolargol
Narcotile Bengué
Narcyl
Narkène
Narsénol
Nasale Ymera
Nasargine
***Nasobore**
Nasocaine
Nasogyne
Nasolène
***Nasophédrine Béral**
Nasopon
Nasosulfolarsan
***Natibaine Nativelle**
***Natirose**
Natrochol
***Natrostyl**
Natura
***Navidrine**
Naza-Capsules
Nazilante
Naziline
Nazinette
Nazogyne
Nazophyl Darva
***Néalgyl**
Nécessaire d'Accouchement
***Néfitol**
Neigotan
Nénita
***Néocarsite**
Néo-Arsycodile
 6, rue de l'École, Versailles (Seine-et-Oise).
 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 25, rue Tocqueville, Paris.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 83, bd de la Villette, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 16, rue Ballu, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 28, rue de Seine, Paris.
MAIRE, 171, rue de Belleville, Paris.
NOVALIS, Oullins (Rhône).
Lab. ANINAT, Nîmes (Gard).
 37, rue des Lois, Toulouse.
ODILIA, 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 239, rue Paul-Bert, Lyon.
DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 27, rue de la Procession, Paris.
 id.
 19, r. du Panier, Marseille.
 127, bd Saint-Michel, Paris.
 10, rue de Strasbourg, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
BERGER, 29, fg de Bourgogne, Orléans.
ANINAT, Nîmes (Gard).
 33, Grande-Rue, Besançon.
GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
DAUPEZ, 37, rue des Lois, Toulouse.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 115 r. N.-D.-des-Champs, Paris.
LUCINIA, 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
 24, rue de Monttessuy, Paris.
 48, bd La Tour-Maubourg, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 7, rue Galvani, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.

- Néo-Asclérol** 110, av. E.-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.
- *Néo-Biol Néoby** 4, pl. du Val, à Vanves (Seine).
TROUETTE-PERRET, 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- *Néo-Calciline** 21, rue Violet, Paris.
- Néo-Carbone Magnésie** RÉGNIER, 75, rue Grande, Fontainebleau.
- *Néocardyl** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Néo-chloral Nau** 21, Gde-Rue Argenteuil (Seine-et-Oise).
- *Néo-Codion** 47, rue de Bretagne, Paris (III^e).
- *Néo-Collargol** 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- *Néo-Crinol** 117 ter, rue Ordener, Paris.
- Néodermine** 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- Néo-Dispositif Ravaut** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Néo Dmégon** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Néo-Dmetys** id.
- Néo-Emétinol** 2, rue de Rivoli, Paris.
- Néo-Ferments du Dr Wolf** 46, rue des Faures, Bordeaux.
- Néofilhos le Perdriel** 11, rue Milton, Paris.
- Néo-Galyl** MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
- *Néoglobuline** 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
- Néoiacol I. S. M.** 25, rue Dagorno, Paris.
- Néo-Iodure Ménard** 3, rue République, Lyon.
- Néo-Kola Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
- Néol** 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Néolactyl** 10, av. de Wagram, Paris.
- Néolactine** 2, r. des Fossés-St-Denis, Boulogne-sur-Seine.
- *Néo-Laxatif Chapotot** 56, bd Ornano, Paris.
- Néolides H. B.** 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- *Néolyse** 22, rue de Turin, Paris.
- Néo-Mg** 229, cours Gambetta, Lyon.
- *Néo-Neurosine** 1, quai Aulagnier, Asnières.
- *Néo-Pancarpine** 5, rue François-Ponsard, Paris.
- Néopansement du Dr Wolf** 46, rue des Faures, Bordeaux.
- *Néophage** 86, rue Michel-Ange, Paris.
- Néo-Phanol** 26, rue Sainte-Claire, Mulhouse.
- Néophos** 72, quai Jemmapes, Paris.
- *Néo-Physio** DROUET & PLÉT, Rueil-Malmaison.
- Néo-Pituitairine** OPTIMA, 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Néoplastex (Voir : Bandes Néoplastex.)** 71, fg Saint-Martin, Paris.
- *Néopulmine** 45, fg Saint-Denis, Paris.
- Néoquinine Falières** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Néoral** 295 bis, r. de la Benaugue, Bordeaux.
- Néorexine** place Pilorget Saint-Symphorien (Indre-et-Loire).

- *Néo-Rhénium du D^r**
L. Fournier
 Néo-Rhomol
 Néo-ricin
- *Néo-Riodine Astier**
 Néo-Salicylate
- *Néosaliodé**
 Néosantal
- *Néosédyl**
***Néo-Séti**
***Néosolmuth**
- Néo-Soufre Inava**
- Néospasmodyl**
- Néo-spermine**
- *Néo-Sphérulines**
 Neospiran
- *Néosplénine**
 Neostomol
- *Néosuline Fornet**
***Néothorium Millot**
 Néo-Tréparséan
- *Néo-Trépol**
***Néotrope Aguetant**
***Néotrophène**
- Néovaryl**
 Néovitalyne
 Néoxyl
- *Néphosol**
- *Néphractive**
- *Néphralbine**
- Néphrine Bouty**
Néphrine Byla
Néphrocrinol
- *Néphrylan**
***Neptal**
- *Nergine Heudebert**
 Nertose
 Nervador
- *Nervantyl Miluc**
- Nervobiolene**
***Nervocithine Tissot**
 Nervosédol
- *Nésal**
***Néseptol**
- 82-84, rue de Belleville, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 39, rue de la Gare, Bondy.
 42, r. Docteur-Blanche, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège
 55, r. des Écoles, Cachan (Seine).
 Fabris, Chambéry (Savoie).
 18, bd de Strasbourg, Albi.
 157, rue Championnet, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois
 (Seine).
 14, rue de Normandie, Asnières
 (Seine).
 41, av. Joffre, La Garenne
 (Seine).
 172, rue d'Alésia, Paris.
 (Voir : *Opothérapie Moncour.*)
 8, rue La Fayette, Paris (IX^e).
 3, pl. Jussieu, Paris.
 15, rue Cavallotti, Paris (XVIII^e).
 11, Chaussée de la Muette, Paris.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 COMAR, 20, rue des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 Lab. de Chimie appliquée, 31, r.
 Chemin-de-Fer, Nanterre (S.).
 6, av. Mirabeau, Nice.
 28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.
 27, rue G.-Tessier, Saint-Étienne
 (Loire).
 Lab. SEDROB, 35, rue Périssé,
 Toulouse.
 10, r. Pont-au-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).
 R. FAURE, 2, rue Carnot,
 Melun (S.-et-M.).
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Lab. ISCOVESCO, 107, r. des
 Dames, Paris.
 6, rue Parrot, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 4, rue Lamartine, Nanterre.
 132, r. de Turenne, Paris.
 Lab. DES VOSGES, La Broque
 (B.-Rh.).
 L. RAGOUCY, 2, rue J.-Bara,
 Paris (VI^e).
 137, Fg-St-Antoine, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 26, rue Gay-Lussac, Paris.
 16, rue Ballu, Paris (IX^e).

- *Nestogène Société NESTLÉ, 6, av. César
Caire, Paris.
- *Nestosyl 72, r. St-Dominique, Paris (VII^e).
- *Nestrovit 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
- Neubryne 78, bd Beaumarchais, Paris.
- *Neuralgic Carron LATOUR, Terrasson (Dordogne).
- Neuranol DELAUNAY, Joué-lès-Tours
(I.-et-L.).
- Neuraxial 45, fg St-Denis, Paris.
- Neuraxol DELAUNAY, Joué-lès-Tours
(I.-et-L.).
- *Neurène 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
sur-Seine.
- *Neuréol 3 et 5, r. Alex-Dumas, St-Ouen
(Seine).
- Neurhémol Vinçon Auxerre (Yonne).
- Neuricure 77, bd de Grenelle, Paris.
- Neuridor SAUBA, Montreuil (Seine).
- *Neurinase 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
- Neurit 11, rue Malher, Paris.
- Neurobore 23, rue des Moines, Paris.
- Neurobrom 6, r. du Moulin, Charleville (Ar-
denne).
- *Neurocalcium Lab. Biol. de l'Ile-de-France, 19,
av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
- Neurodonal Kœnig THOMAS, Chemillé (M.-et-L.).
- Neurodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
- *Neuroferyl 29, rue Carnot, Levallois-Perret
(Seine).
- *Neuroflorine 44, rue de Lagny, Montreuil.
- Neurogaïacol Dethan 11, rue A.-de-Neuville, Paris.
- *Neurogastrine 12, bd St-Michel, Paris (VI^e).
- Neurogénol Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
- Neuroiodure Dethan 11, r. A.-de-Neuville, Paris.
- Neurolipase 132, rue de Turenne, Paris.
- *Neuronal Brothier 20, rue H. Martin, Vanves (Seine).
- Neuro-Pax Cte de GRAUWE, 19, r. du
Bailly, Plaine-Saint-Denis.
- *Neurophoryl 187, rue de Créteil, Maisons-
Alfort (Seine).
- *Neurophos Lab. DAGONNOT, 11 bis, pl. de
l'Hôtel-de-Ville, Cannes
(A.-M.).
- *Neurophytol 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).
- Neuroplasma 16, r. Henri-Regnault, Courbe-
voie.
- Neuroplasmine id.
- *Neuropol 83, bd de la Villette, Paris et
46, fg du Temple.
- Neuroséda 149, av. des Minimes, Toulouse.
- Neurosérine JARMON, 4, pl. de la Gare,
Tunis.
- *Neurosine Prunier 1, quai Aulagnier, Asnières.
- *Neurosol Debreyne M. BAILLEUL, Mortagne (Orne).
- *Neurosolène BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.

- Neurosomnly**
***Neurcstabyl**
Neurosthéma
***Neurosthénol**
- Neurosthyll**
Neurotanic
***Neurotensyl**
Neurotonine
- Neurotrol Abadie**
Neurotrope
Neurotrophène (ampoules)
Neurotrophol Byla
***Neurovarol Douetteau**
Neurovoïne
Neuséda
***Neutracétyle**
- [Neutralcaol**
Neutralisine Bureau
[Neutralol
- Neutrobyl**
Neutrol
Neutropeptine
- *Neutrose Vichy**
- Neuvaritol**
- Névoral**
- Névral**
- Névralgésine**
Névralgine Montsarrat
***Névralgol Brossard**
Névraline Rosey
Névraltéine Rogier
Névrasite
Névraxites
Névristhone
- Névrol Fréval**
Névropathyl Leisyn
***Névrosan**
Névrosérum
***Névrosol**
Névrostérol
***Névrosthénine Freysing**
- 229, cours Gambetta, Lyon.
GUILBERT, Avion (P.-de-C.).
CELLIER, Saint-Uzé (Drôme).
Lab. M. RICHARD, Aubenas (Ardèche).
 4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
GRÉMY, 14, rue Clichy, Paris.
 72, bd Davout, Paris (XX^e).
OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
MÉROBIAN, 37, r. Pajol, Paris.
 35, rue de Boissonnade, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 20, fg Saint-Honoré, Paris.
GRÉMY, 14, rue Clichy, Paris.
 30, rue Monge, Paris.
 25, bd de La Tour-Maubourg, Paris.
BENDERITTER, Vendôme (L.-et-Ch.).
 86, bd Port-Royal, Paris.
 13-15, r. de la Sablière, Bécon-les-Bruyères.
D^r AUBERT, 3, pl. Jussieu, Paris.
AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
F. MARIOTTE, 15, rue Pasteur, Bourg (Ain).
 1 et 3, rue Lafloque, Vichy (Allier).
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
R. FEIGNOUX, Lab. **RAFEY**, 95, r. de Turenne, Paris (III^e).
Lab. VIGNAL, **DEJOUX** et **RAOUX**, Périgueux (Dordogne).
DÉBORDES, à Moulins (Allier).
 à Revel (Haute-Garonne).
 1, r. Cordonans, La Rochelle.
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 56, bd Pereire, Paris.
 11, r. Joseph-Bara, Paris.
 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
GERDA, 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
 84, r. de Rochechouart, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
P. C. B., 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
 4, fg Stanislas, Nancy.
MAHIEU, Lens (Pas-de-Calais).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 6, rue Abel, Paris.

- Newlax**
Nézol
Nickobalt
Nicopyrine
***Nigérine Vincent**
Nigroformine
Nipostra
***Nisaméline**
***Nitium Buisson**
Nitracaine
***Nitrargol**
Nitrophényl
Nitroyl Leisyn
Noal
Nobial
Noctifen Léo
Noctisédy
Noelline (Sirop-Savon)
***Nopirine Vicario**
***Normacol**
Normaflux
***Normalax**
***Normatensol**
***Normogastryl**
***Normucyl**
Nortal Clin
Nosodol
Nosol Aguetant
Notaline
***Novacétine Prunier**
Novaïodal
***Novalibut (ex-Halibut)**
Novaline de Montfleury
Novanol
***Novargyre Guillaumin**
Novarine Vicario
***Novarsénobenzol Billon**
Novarsénobenzol Corbière
Novarsénobenzol Ercé
Novarthritol
Novatropine
Novaïodal
***Novhépar**
- COULAUD, Lorris (Loiret).**
CHATELAIN, Niort (Deux-Sèvres).
 12, r. Paul-Bandry, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque (B.-Rhin).
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 51, rue de Paris, Pierrefitte.
FERREMBACH, Kaisersberg (Haut-Rhin).
TROUETTE, 61, av. Philippe-Auguste, Paris (XI^e).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-neuve-la-Garenne (Seine).
 4, r. de La Fère, St-Quentin (Aisne).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 15, rue des Champs, Asnières (Seine.)
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 2-4, r. des Lombards, Paris.
 45, place du Centre, Guingamp.
 17, bd Haussmann, Paris.
 41, rue de Rome, Paris.
 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
 17, rue Chomel, Paris.
 87, rue Lafayette, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 45, rue Cambronne, Paris (XV^e).
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 57, r. Edgar-Quinet, Nantes.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 1, q. Aulagnier, Asnières (Seine).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 348, r. St-Honoré, Paris.
 6, rue d'Alsace, Grenoble.
J. MIDY, 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
DARBANS, St-Chinian, Hérault.
 66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).

- *Novigol** 24, r. de Lesson, Rochefort-sur-Mer.
- Noviode** Lab. SALVOXYL, 237, r. Lafayette, Paris (X^e).
- *Novismuth** 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Novo-Brol** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- Novochimosine** Lab. DES VOSGES, La Broque (B.-Rhin).
- *Novocortex** 107, r. des Dames, Paris (XVII^e).
- *Novolactol** Et. DAGUIN, St-Maur (Seine).
- *Novolug** NOVALIS, Oullins (Rhône).
- Novophylline** 8, rue La Fayette, Paris (IX^e).
- Novoptine** Labor. DULCIS, pl. Clichy, Monte-Carlo.
- *Nososédine** 83, bd de la Villette, Paris.
- Novoseptine** 57 bis, av. La Motte-Picquet, Paris (XV^e).
- Novoseptol** 22, r. de l'Arsenal, Angoulême (Charente).
- *Novospasmyl** 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
- *Novurit** 25, bd de la 1^{re}-Maubourg, Paris.
- Novusang** BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
- Nox** UNIS-SPES, 14, r. Demarquay, Paris.
- *Nuciphos** 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine).
- Nuclabia** Lab. Chimie physiologique, 37, rue Tivoli, Bordeaux.
- Nuclarène Cognet** 43, rue de Saintonge, Paris.
- Nuclarrhol** Lab. J. BLANCHARD, Pont-de-Vaux (Ain).
- Nucléarrhol Gabriel** 39, rue Sclessin, Liège (Belgique).
- *Nucléarsan** 45, fg Saint-Denis, Paris.
- *Nucléarsitol Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- Nucléasine** 163, rue de Flandre, Paris.
- *Nucléatol Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- Nuclécithine** Collonges-Saint-Just-sur-Loire (Loire).
- *Nucléigène** Lab. CHEVILLON, 99, rue de Paris, Massy (Seine-et-Oise).
- Nucléigénol** 30, rue St-Jacques, Namur (Belgique).
- Nucléinovarine** Lab. DEBOUDAUD, 22, rue Turbigo, Paris.
- *Nucléocardyl** 188, cours de la Somme, Bordeaux.
- Nucléo-fenugrene** FURNON, Ste-Sigolène (Hte-Loire).
- Nucléo-fer Girard** 48, rue d'Alésia, Paris.
- Nucléol Hanbro** Lab. Central de France, 1, r. de Châteaudun, Rennes.
- *Nucléophorène** 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- Nucléotonyl** PHARMA-SPES, 15, rue Corneille, Lille.
- *Nuclergol** 37, rue Brochant, Paris.

Nuclhémose	RÉMY & LECOQ, 6, pl. Clichy, Paris.
Nuolocithol	28, av. Grammont, Tours.
*Nujol	98, rue de Sèvres, Paris.
*Nuphos	E. POINSIER, 20, rue Beaubourg, Paris (IV ^e).
Nurécase	GRANDVAL, à Reims.
Nurserine	6, c. Joseph-Thierry, Marseille.
Nutréine	25, rue Jasmin, Paris.
Nutréol	61, rue de Seine, Paris.
Nutritine Déjardin	109, bd Haussmann, Paris.
Nutrobiase	10, rue Cimarosa, Paris (XVI ^e).
*Nutromalt	151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine).
Nuxiodine	Brichard et fils, Bar-le-Duc.
Nuxyl	26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
Nyctal	DURET & RÉMY, Asnières.
Nydol	Brichard et fils, Bar-le-Duc.



*Obsor	PROBIOS, 8, rue Saint-Martin, Paris (IV ^e).
Occi-Gourme	Pl. Carnot, Romainville (Seine).
Océanine	52, rue La Bruyère, Paris.
*Ocréine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Octensanol	4, rue Platon, Paris (XV ^e).
Octo-Calcion	193, av. du Maine, Paris.
*Odarsol	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Oderma	Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
Odochloraline	6, rue Berbissey, Dijon.
Odynal Chevalier	St-Pourçain-sur-Sioule (Allier).
Enase Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Oénole Paludofuge	DAGNIAC, St-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
*Enophos	29, pl. Bossuet, Dijon.
Enoquinol	12-14, rue Fery, Reims.
Enosthène	MOUFLET, Chennebrun (Eure).
*Oéréliode	BOUVOT, Auvers-s.-Oise (S.-O.).
*Estrobröl Roche	10, rue Grillon, Paris.
*Estroglandol Roche	id.
Oio-Tnyroidine	OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
*Okamine simple	50, rue de Turenne, Paris.
*Okamine cystéinées	id.
*Okamine (Dragées)	id.
*Olbia	MOUNEYRAT, Villeneuve-la-Garenne (Seine).

- * Olcalan
- * Olcantral
- * Olegel
Oléobiline
Oléo-Calcium
- * Oléochrysine Lumière
- * Oléochrysos Lumière
- * Oléocidase
Oléodermine Vincent
Oléodine
- * Oléoformine «Corbière»
Olégarine
Oléogazeur
Oléo-Iode Dubois
Oléojasol
Oléol
Oléolaxine
- * Oléo-Mel
- * Oléophédrine Béral
Oléo-Psyllium
- Oléorhinol
Oléo-Sérums
- * Oléosodine P. Thibault
- * Oléovules
- * Oléthyle Benzyle
- * Olévone
- * Olical
Oliolase Corbière
- * Oliphédrol
Oliphédrol BB
- * Oliricyl Hardy
Olisol éphédriné
- * Olivéol Etiévant
Ombiplaste
Omonos
- * Onction Angelini
Onction Leisyn
Onctua
- Ondanol
Onguent Borgia
- * Onguent Fréval
Onguent Ilon
Onguent Ivula
- Onguent Prunot
Onguent Pyorrhépha-
gine
Onguent Salas
- * Onogo
Oophorine
- 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
- M. MARTIN, Cloyes (E.-et-L.).
- 3, rue de Vouillé, Paris.
- 2, rue Maréchal-Pétain, Nice.
- MAURES, à Port - de - Penne
(Lot-et-Garonne).
- 45, rue Villon, Lyon.
- id.
- 48, rue d'Alésia, Paris.
- 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- Pont-à-Celles (Belgique).
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 151, rue de Charenton, Paris.
- 122, fg Saint-Martin, Paris.
- 16, bd. Pereire, Paris.
- 19, rue Ferdinand-Duval, Paris.
- BRUN, Demi-Lune, Lyon (Rh.).
- 5, av. des Tilleuls, Paris.
- DELFOUR, Pouillon (Landes).
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- Lab. ADLER, 36, rue des
Francs-Bourgeois, Paris.
- 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
- Route de Cimiez, Nice.
- 48, rue d'Alésia, Paris.
- SFEAT. 15, rue Catulienne,
Saint-Denis.
- 122, fg Saint-Honoré, Paris.
- 25, r. du G^r-Foy, Paris (VIII^e).
- Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 18, rue Daval, Paris.
- id.
- 42, bd. Saint-Marcel, Paris.
- SAUBA, Montreuil (Seine).
- BRUN, Demi-Lune, Lyon.
- 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
- 33, Grande-Rue, Besançon.
- 61, rue de Seine, Paris.
- 1 bis, rue Molitor, Paris.
- 25, rue de Bordeaux, à l'Arbresle
(Rhône).
- SAUBA, Montreuil.
- 61, rue de Seine, Paris.
- 84, rue Rochechouart, Paris.
- 31, rue Illzach, Mulhouse.
- J. MIDY, 41, av. Joffre, La
Garenne (Seine).
- 61, rue de Seine, Paris.
- Croissy-sur-Seine.
- 132, rue de Turenne, Paris.
- PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
- OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
Bruxelles.

- *Ophtal 13, pl. de la Nation, Paris.
- Ophtalmine Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
- Ophtalmiso S 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Ophtalmo-vaccin Sa- 42, Grandes Arcades, Stras-
lantale bourg.
- *Opiacés liquides Chas- 33, place Meynard, Bordeaux.
sin Lab. C. Le Follet, Nozeroy
(Jura).
- *Opobrol BAILLY, 15-17, rue de Rome,
Paris.
- *Opobyl G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
96, rue Orfila, Paris.
- Opo-Calcéofibrose id.
- *Opocalcium 71, rue Ste-Anne, Paris (II^e).
- *Opocalcium Irradié 132, rue Turenne, Paris.
- *Opocérès TÉTARD, Beauvais (Oise).
- Opochlorine 83, bd de la Villette, Paris.
- *Opochol 132, rue de Turenne, Paris.
- *Opocobalt 89, rue du Cherche-Midi, Paris
(VI^e).
- Opocrinases STELVIA, 59, rue Boissière,
Paris.
- *Opodermyl 39, bd de La Tour-Maubourg,
Paris (VII^e).
- Opodisgestif 96, rue Orfila, Paris.
- *Opo-Dinitra 40, rue Bellechasse, Paris.
- *Opoferrine vitaminée M. et P. Ledent, Montreuil-sur-
Mer (P.-de-C.).
- Opogénines DURAND, Aigues-Mortes.
- *Opogermine irradiée 71, av. de Clamart, Issy-les-
Moulineaux (Seine).
- Opoglandéol Fray 163, rue de Flandre, Paris.
- *Opo-Iodamélis Logeais 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Opolases (Voir Opothé- DUVAL, Mézières (Ardennes).
- rapie E. Vergelot) 1, av. Messine, Paris.
- Opoiaxyll Cortiere 295 bis, rue de la Bénauge, Bor-
deaux.
- Opomanganol Lab. OPOS, Castelnaudary
(Aude).
- Opo-Micro, n^{os} 1, 2, 61, av. Philippe-Auguste, Paris
3, 4 (XI^e).
- *Opomygdal ISCOVESCO, 107, rue des
Dames, Paris.
- Oponergyll 19, rue de Fleurus, Paris.
- *Oponuclyl irradié Dr TESTART, Chalais (Char^{te}).
- Trouette-Perret 19, rue Drouot, Paris.
- Opopédol 25, rue Vaneau, Paris (VII^e).
- *Opophos 122, av. Champs-Élysées, Paris.
- Opophytol Dr TESTART, Chalais (Cha-
rente).
- *Opo-plasma 33, av. de Villiers, Paris.
- Oporadol
- *Oposérothérapie Val-
try
- Oposérum
- Opositoires opothéra-
piques Pellissier

- *Oposséine 60, rue Nationale, Castelnaudary (Aude).
- *Opostyl BOUÏY, 3, rue de Dunkerque, Paris.
- Oposynergines 132, rue de Turenne, Paris.
- *Opothérapie Bazin 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux.
- *Opothérapie Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
- *Opothérapie Byla 26, avenue de l'Observatoire, Paris.
- *Opothérapie Carrion 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
- Opothérapie Chaix 10, rue Al-Bertillon, Paris.
- *Opothérapie Chevreton 52, rue La Bruyère, Paris.
- *Opothérapie Choay 48, avenue Théophile-Gautier, Paris.
- *Opothérapie du D^r Fraysse 21, rue de Neuilly, Nanterre (Seine).
- Opothérapie du D^r Roussel 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- *Opothérapie E. Vergelot 163, rue de Flandre, Paris.
- Opothérapie Fortin 109, rue de Sèvres, Paris.
- *Opothérapie Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- Opothérapie Fumouze 78, fg Saint-Denis, Paris.
- *Opothérapie Iscovesco 107 rue des Dames, Paris.
- *Opothérapie Lauriat La Garenne-Colombes (Seine).
- Opothérapie «Le Pecq» 11, rue Beautreillis, Paris.
- *Opothérapie Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- Opothérapie Richard 79, av. d'Orléans, Paris.
- Opothérapie U. T. A. P. THIVISSEN, 13, rue Sainte-Véronique, Liège.
- Opothérapiques Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- *Opothérapiques Péllissier 33, av. de Villiers, Paris.
- Opotonine 20, rue des Martyrs, Paris.
- *Opo-vacuoline 39, rue de la Gare, Bondy.
- *Opozones Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- Opsine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
- Opsolysine 7 à 13, rue Saint-Maurice, Nanterre (Seine).
- Opsomyl A et B 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Optalidon 20, rue Vernier, Paris.
- *Opticura Bengué 16, rue Ballu, Paris (IX^e).
- *Optiplaste Mer Rouge, Mulhouse.
- *Opto Scott 348, rue St-Honoré, Paris (I^{er}).
- Optraex 16-22, rue des Orteaux, Paris.
- Opunsine 94, rue Michelet, Alger.
- *Orargol Amicros (Rhino-Gouttes-Collyre) 177, rue de Courcelles, Paris.
- Orarigène 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- *Or-Boulard 82, av. de Suffren, Paris.
- *Orcalcine 9, rue de la Platière, Lyon.
- Orcéol 17, rue Mont-Désert, Nancy.

Orchidine	OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Orchitine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Orchitine Meurice	61, av. Louise, Bruxelles.
*Orex	1, avenue du Dr-Lannelongue, Paris.
*Orexyl	5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
*Organésium	20, fg. Saint-Honoré, Paris.
*Organicalcion	81, rue de Lille, Roubaix.
Organocalcine	121, av. de Saint-Ouen, Paris.
Orgas	MÉDIFAR, Lomme (Nord).
Orge maltée Fanta	77, rte d'Orléans, Montrouge.
Orianol	GENTON, à Petit-Quévilly (Seine-Inférieure).
Oriphol	8, rue Richer, Paris.
Ormatol	E. ROBINEAU, 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
Orocalcyl	LE GENTIL, Pontorson (Manche).
Orpranor	LOUVEL, Elbeuf (S.-I.).
Orthobiline	37, rue Galilée, Paris.
*Orthocol	7, rue Ste-Isaure, Paris (XVII ^e).
*Orthocumène simple	117, rue de Belleville, Paris.
— laxatif	id.
*Orthocynol	8, rue Aumont-Thiéville, Paris (XVII ^e).
*Ortho-Fokène	117, rue de Belleville, Paris.
*Ortho-Gastrine	15, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Seine).
*Orthogénol	19 rue Drouot, Paris.
*Ortholaxine	8, rue Vivienne, Paris.
*Ortho Malleval	34, rue du Plat, Lyon.
*Orthophorine	15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).
*Orthosédan	7, rue Ste-Isaure, Paris (XVII ^e).
*Orthosiphon Longuet	Voir <i>Siphuryl</i> .
Ortho-Stomine	77, bd. de Grenelle, Paris.
*Orthozomine	(Voir <i>Zomine</i> .)
*Osmoléine	26, rue des Moines, Paris.
*Osmo-Peptine	103, rue St-Lazare, Paris.
Osmos	56, rue Beaubourg, Paris.
*Osmo-Vaccins Bréant	11, rue de Clichy, Paris.
Ossical	ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
Ôsteline	Lab. RISSA, 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
*Ostéogène	3, imp. Adam, Boulogne-sur-Seine.
*Ostéoglandulol	14, rue des Pyramides, Paris.
Ostéo-hépatine	62, bd. Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
*Ostéopectine	DRAPIER, Rethel (Ardennes)
Ostomalt	46, rue Claude-Lorrain, Lille.
*Ostréiode	Arcachon (Gironde).
*Ostréiode injectable	
Ostréine Buisson	98, rue de Sèvres, Paris.

- Otalgine adrénalinée** 2, pl. de l'Hôpital-Général, Montpellier (Hérault).
- *Otalgolex** 21, rue de Lyon, Paris.
- Oto-Antisclérol** 6, pl. Cambronne, Paris.
- Oto-Draineur** 5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
- Otolan** 24, rue Jardel, Bordeaux.
- Oto-yaccin Salantale** 42, Grandes-Arcades, Strasbourg.
- *Otoléine** 72, r. de Bagneux, Montrouge.
- *Ouabaine Arnaud** 27, rue de la Procession, Paris.
- *Ouabaine Mialhe** 8, rue Favart, Paris.
- *Ouataplasme Langlebert** SABATIER, 10, rue Pierre-Ducieux, Paris.
- Ouate Rhinol** DUBAT, 80, faubourg St-Denis, Paris.
- *Ova-Crine** 17, rue Chomel, Paris (VII^e).
- Ovaire Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
- *Ovaire Iscovesco** 107, rue des Dames, Paris.
- Ovairine** 62, rue Notre-Dame, Bordeaux.
- Ovaridine Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Ovarids** 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- Ovarine Dubois** 49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
- Ovarine Meurice** 61, av. Louise, Bruxelles.
- Ovarine Optima** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Ovarine Orga** Lab. ORGA, Avignon (Vaucluse).
- Ovarine Tisy** 95, rue de Turenne, Paris.
- Ovarose** 58, rue Saint-Placide, Paris.
- Ovaro-Thyroïdine** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Ovcaline** 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
- Ovex Léo** 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- Ovigénine Bouty** 3, rue de Dunkerque, Paris.
- *Ovo-biol** 62, bd. Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Ovo-Cao** 2, rue de Compiègne, Paris.
- Ovo-lécithine Billon** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Ovomaltine** Etab. Wander, Champigny (S.).
- Ovothyrol** 62, bd. Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- Ovrine** GIRARD, Douarnenez (Finistère).
- Ovules à l'Inolène** 42, rue Mont-Cenis, Paris.
- *Ovules à l'Iodéol** 37, av. de l'Opéra, Paris.
- Ovules Amicros** 177, rue de Courcelles, Paris.
- Ovules Anac** GERDA, 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
- Ovules antiseptiques** 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
- *Ovules au Nestosyl** 72, rue Saint-Dominique, Paris.
- *Ovules au Paraïode** 48, rue Paul Barruel, Paris.
- *Ovules Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.

- Ovules Derma
 Ovules Evine
 Ovules au gonagone
 Ovules Gynol
 Ovules Halogènes du
 D^r Bern
 Ovules Halleana
 *Ovules Hystan

 *Ovules Inséva

 Ovules Ivula Pearson
 Ovules Magida
 *Ovules Néothorium

 *Ovules Oape
 Ovules Patrat
 Ovules Phena

 *Ovules Rhemda

 *Ovules Roche
 *Ovules Saporèx
 *Ovules Sédo-hémosta-
 tiques Jouve
 *Ovules Stérigyne
 *Ovules au Terpoxyl
 Ovules Uxora
 Ovules-Vaccins Gol-
 denberg
 *Ovules-Vaccins Inava
 Ovules-Vaccins Salan-
 tale
 Ovules Vézès
 *Ovules au Vioforme
 Ovunéol Bottu

 Oxhydrate de Bi

 Oxitane

 Oxmol
 *Oxy-Buccol
 Oxycarbène
 Oxycyanure d'hydrar-
 gyre
 Oxy-Dents C. R. S.

 Oxyde orangé de Hg
 ophtalmoforme
 Oxydolsine
 *Oxydothyridine Paris
 *Oxydovarine Paris
- ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
 15, bd des Ratignolles, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.

 3, pl. Int. Saint-Michel, Toulouse.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 Lab. du D^r L. LAFAY, 54,
 Chaussée-d'Antin, et 69, rue
 de Provence, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.

 J. MIDY, 41, av. Joffre, La
 Garenne (Seine).
 56, rue des Dames, Paris.
 MILLOT, 177, rue de Cour-
 celles, Paris.
 PROBIOS, 8, r. St-Martin Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 Boite Postale, n° 5, Limoges
 (Hte-Vienne).
 51, rue d'Alsace, Courbevoie
 (Seine).
 10, rue Crillon, Paris.
 184, route de Genas, Lyon (III^e).

 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
 Lab. SERVIER, Orléans.
 (Voir *Terpoxyl*).
 DHAUSSY, à Mennevret (Aisne).
 IVAGO, 17, rue de Provence,
 Paris.
 14, r. de Normandie, Asnières.

 42, Grandes Arcades, Strasbourg.
 52, bd. du Temple, Paris.
 (Voir *Vioforme*).
 115, rue N.-D.-des-Champs,
 Paris.
 DESMARS, 89, av. Wagram,
 Paris.
 CASENEUVE, Saint - Cyprien
 (Dordogne).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 GUILLAUMIN, 168, bd Saint-
 Germain, Paris.
 16, rue des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 Lab. DULCIS, pl. Clichy, Monte-
 Carlo.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 4, r. de La Motte-Picquet, Paris.
 id.

- Oxydrol**
- *Oxyfuge**
- Oxygénase**
- Oxygénés du D^r Prim**
- Oxygénobore « Obs »**
- *Oxy-Injecteur du D^r Fialip**
- *Oxyléine (Adultes et Enfants)**
- Oxylisine**
- *Oxymenthol Perraudin**
- Oxymuth Saca**
- Oxynargyl**
- Oxylol Leisyn**
- *Oxyplastine**
- Oxyquinothéine**
- Oxythymol**
- Oxy-Thymoline**
- Oxytoires Sorin**
- *Oxythyol**
- Ozobiase**
- Ozobiase opothérapi-que**
- Ozodor**
- *Ozol**
- *Ozolase**
- Ozonair**
- *Ozothine**
- POINTET & GIRARD, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.**
- CASTEL, 1, pl. Bouquerie, Nîmes.**
- D^r CHAPELLE, 8, rue Vivienne, Paris.**
- 27, rue Fourcroy, Paris.**
- Neuilly-sur-Saône (Rhône).**
- 23, av. de La Motte-Picquet, Paris.**
- 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).**
- LAMBERT, 6, rue de Longchamp, Vichy.**
- 21, rue Chaptal, Paris.**
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.**
- BESNARD, 56, rue des Dames, Paris.**
- 1 bis, rue Molitor, Paris.**
- 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).**
- S. A. L. P., 91, rue Marietton, Lyon.**
- GLORY, 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.**
- GODFRIN, 13, r. Gambetta, Nancy.**
- TROMBETTA, à Blain (L.-Inf.).**
- Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).**
- 37, rue de Marly, à Rueil-Malmaison.**
- id.**
- Lab.SERVIER.Orléans (Loiret).**
- 63, av. de Wagram, Paris.**
- id.**
- 2, rue de Vienne, Paris.**
- 23, rue Sébastien-Mercier. et 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris.**

P

- Pacemol**
- Pacyl**
- *Paderyl**
- Paidol**
- BEDAIL, Lavelanet (Ariège).**
- 8, rue de Prague, Paris.**
- 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.**
- ROUSSEL, Grande-Rue, Flers (Orne).**

- Pain d'amandes** au gluten frais 37, rue du Rocher, Paris.
- Pain essentiel Heudebert** 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
- Pain massé Sana** Gaillac (Tarn).
- Pains de régime Miliat** 319, av. Berthelot, Lyon.
- Pains Nutricia** 142, rue Fransman, Bruxelles.
- *Pain Redeuil** 7, rue Couche, Paris. (XIV^e).
- Pain de santé Martin** à Montreuil-Belfroy (Maine-et-Loire).
- *Pains spéciaux Heudebert** 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
- Paloval** Pharm. de l'Etoile, Strasbourg.
- Palpitine** 72, quai Jemmapes, Paris.
- Paludase Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Paludol** PATRICE, à Vichy.
- *Pampryl** 21, rue de Mâcon, Paris (XII^e).
- Panbiase antipnymique** BAILLY, 15-17, rue de Rome, Paris.
- *Panbiline** à Annonay (Ardèche).
- *Panbiol** Lab. A. BAILLY, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e).
- Panbromine** 17, rue Cadet, Paris.
- Pancalbiose** 1, rue Chancelier, Périgueux.
- *Pancalcion** 155, bd Magenta, Paris.
- *Pancarbo** P. HARDY, 42, bd Saint-Marcel, Paris.
- Pancréadéline** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Pancréal Kirchner** 24, rue de Verdun, Strasbourg (B.-Rh.).
- Pancréanne** 10, rue Poncet, Paris (XVII^e).
- Pancréas-Endocrisines Fournier** 7, rue Biscornet, Paris.
- *Pancréastase Defresne** 19, rue Jacob, Paris.
- *Pancréatokinase** 54, fg. Saint-Honoré, Paris.
- *Pancréatose Idon** 89, rue Saint-Georges, Nancy.
- *Pancrébile** D^r AUBERT, 3, place Jussieu, Paris.
- *Pancrépar** 21, rue Chaptal, Paris.
- *Pancrépatine Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
- *Pancrinol du D^r Debat** SCHREIBER, av. du Bois, Luxembourg.
- Pandermol** 60, rue de Monceau, Paris.
- Pandigestine** 43, avenue Kléber, Paris.
- Pandigitale Houdas** 191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
- Pandigitale** 10, pass. Morel, Montrouge.
- *Pandrénaline Julien** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Panfébrine** 105, rue de Rennes, Paris (VI^e).
- Panfito** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- *Panfluine** 163, rue de Flandre, Paris.
- Panfortan** 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- *Pangaduine** 4, ch. de la Muette, Paris.
- *Pangastrol** 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- 156, av. Victor-Hugo, Paris.

- Pangermine**
***Pangestyl** Narty
***Panglandine**
Pangynol
***Panhémol**
Panhistol
Paniode
Panlabyl
Panlacto Midy
Panlax Allard

Panlaxyl
Panlithyl
***Panlutéine**
***Pan-Neurol**
Panopepton

Panophytes

***Panosan**
***Panostyl**
Panpectose
Panphylase
Pansedine
Panprocol

Pansement otalgique
Alsai
***Pansmacol**
***Pansolanée**
***Panstomase**
***Pantavoine**
Pantocamphre
Pantofort du Dr Boveil
(granules)
Panto-Kinon
Pantolaxine du Dr Boveil
(cachets)
***Pantopon Roche**
Panurol Tissot
Panvalérase
Panvalérine Delattre
Panveinine
***Panvita**

Panxylon Logeais (granulé)
***Panxylon Logeais injectable**
Panzanon
Paospholine
Papaine Henry

***Papaine Trouette-Perret**
***Papavérine Houdé**
- 10, pl. Thiers, Le Mans (Sarthe).
 134, bd Péreire, Paris.
 18, av. Hecche, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 R. BOUYSSOU, Chambois (Orne).
 4 bis, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 239, rue Paul-Bert, Lyon.
 117, rue de Belleville, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 Lab. GMET, 27, fg. Montmartre, Paris (IX^e).
 37, rue des Lois, Toulouse.
 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine).
 2, rue des 2-Ponts, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
 TROUETTE-PERRET, 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).
 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 121, rue de Gerland, Lyon.
 222, rue Duguesclin, Lyon.

 1, rue Griffon, Lyon.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 45, rue du Marché, Neuilly.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 66, rue de la Pompe, Paris.

 1, rue Lassalle, Lyon.
 94, rue Michelet, Alger.

 1, rue Lassalle, Lyon.
 10, rue Crillon, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris.
 36, av. Niel, Paris.
 10, rue du Bac, Paris.
 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
 188, cours de la Somme, Bordeaux.
 22 bis et 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 22 bis et 24, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 21, r. Mouton-Duvernét, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 9, rue Dieu, Paris (X^e).

- *Papaveryl** Lab. ORRILLARD, 245, rue de Vaugirard, Paris.
- Papier Albespeyres** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Papier du D^r Balme** 56, bd Péreire, Paris.
- Papier Barral** 78, fg St-Denis, Paris.
- Papier Fayard** 2, av. Mathurin-Moreau, Paris.
- Papier Gicquel** 64, rue des Tournelles, Paris.
- Papier iodogène Ey-** 139, c. Tolstoi, Lyon-Villeur-
monnet banne.
- *Paquets Alcal** Fleury, Arcachon (Gironde).
- Paquets P. C. L.** 163, rue de Flandre, Paris.
- Paquets Salins-du-Re-** Saint-André (B.-du-Rhône).
- vard**
- Paquets solubles ORL.** 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- *Paquets Védé** 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
- Paracarbochloryl** 76, rue Réaumur, Paris.
- *Paradox** 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
- *Paradoline** id.
- *Paraffino-Bande** 34, r. de Besançon, Pontarlier.
- Parattinol** LANDON, av. Baraduc, Châtel-
Guyon.
- Paraifinoléol Hamel** 17, rue de Berri, Paris.
- Paraformine** 172, rue d'Alésia, Paris.
- Paragangline Vassale** 25, rue Dagorno, Paris.
- Paragar** 107, av. de la Reine, Boulogne-
sur-Seine.
- Paragélase** 11, rue de Clichy, Paris.
- Paragerm** L. D. P. 151, av. de Neuilly,
Neuilly.
- Paraghurt Léo** 11, square Marie-Louise,
Bruxelles.
- *Paraiode** 48, rue Paul-Barruel, Paris.
- Paralactine Byla** 26, av. Observatoire, Paris.
- Paralaxol** TULIVET, 52, rue de Poissy, à
Saint-Germain-en-Laye.
- Paralymphine** 32, rue de Grenelle, Paris.
- Paratétanine** 17, rue Bourgelat, Lyon.
- Parathyroïde Endocri-** 7, rue Biscornet, Paris.
- sines Fournier**
- Paratone Léo** 11, square Marie-Louise,
Bruxelles.
- *Paratoxine Ducatte** 191, rue St-Honoré, Paris.
- Paratyl** CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
- *Paratyrone** BYLA, 26, av. de l'Observa-
toire, Paris.
- *Paraveinine** 45, fg-St-Denis, Paris.
- Parbelle** 14, rue Perrichont, Paris.
- Parégorique Lafran** 8, rue de Prague, Paris.
- Parémanol** BRUNEAU, 17, rue de Berri,
Paris.
- Parkibleu** 20, av. J.-Jaurès, Suresnes
(Seine).
- *Parlax** F. LATOUR, 71, rue Douy-De-
cupe, Montreuil-sous-Bois.
- *Parolagar** 348, rue Saint-Honoré, Paris.

Paroxyl**Parulcine Robin*****Parvula****Parvuline****Passacanthine*****Passicarbone*****Passiflorine****Passival****Pastapalm*****Pasticaine****Pastilles Bala****Pastilles Brachat****Pastilles Brunelet****Pastilles Contre-ut****Pastilles Debar****Pastilles Dionol****Pastilles des Eaux-
Bonnes****Pastilles Fayès****Pastilles Helgé*****Pastilles Houdé****Pastilles Irsi****Pastilles Lezin****Pastilles Libéria****Pastilles Maya*****Pastilles M. B. C.****Pastilles Méry****Pastilles Midy****Pastilles Miraton****Pastilles Nolette A.B.C.****Pastilles Norvégiennes****Pastilles Palangies****Pastilles Paterson****Pastilles de Pougues****Pastilles St-Christau****Pastilles Seclo****Pastilles Violettes A.
B. C.****Pastilles Vichy-Etat****Pastils Meran*****Pâte à l'eau Aloplas-
tine*****Pâte à l'Eau R. P.****Pâte Aseptor****Pâte Berthé****Pâte Bleue Goy*****Pâte Dentaire Bleue****Pâte dentifrice****THIRIET & C^{ie}, 26 et 28, rue
des Ponts, Nancy.****13, rue de Poissy, Paris (V°).****BRUNSCHWIK, 3 bis, rue Val-
lier, Levallois-Perret (Seine).****20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.****156, av. Victor-Hugo, Paris.****115, r. de Paris, Boulogne-s.-S.****115, r. de Paris, Boulogne-s.-S.****H. SALLE, 4, rue Elzévir, Paris.****BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.****23, rue Beautreillis, Paris.****BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).****5, av Victoria, Paris.****164, rue St-Honoré, Paris.****GIRAUD & JEANDET, 217,
rue La Fayette, Paris.****BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse)****Lab. FLEURY, Arcachon (Gi-
ronde).****RAIMOIA, 16, rue des Im-
meubles-Industriels, Paris.****199, rue Saint-Denis, Paris.****Dr LALAURIE, Cuxac-d'Aude.****9, rue Dieu, Paris.****4, ch. de la Muette, Paris.****1, rue de l'Odéon, Paris.****10, r. Cyrano-de-Beracrac, Paris.****142, rue Fransman, Bruxelles.****GOY, 23, rue Beautreillis, Paris.****19, r. du Balily, La Plaine-Saint-
Denis.****67, av. de Wagram, Paris.****48, rue d'Alésia, Paris.****24, rue Monttessuy, Paris.****36, rue de Verdi, Nice.****8, rue Vivienne, Paris.****43, rue de Saintonge, Paris.****21, rue Chaptal, Paris.****VERGELOT, 163, r. de Flandre
Paris.****6, rue Ad.-La-Lyre. Courbevoie.****24, rue de Monttessuy, Paris.****24, bd. des Capucines, Paris.****18, rue de Maubeuge, Paris.****19, av. d'Orléans, Paris (XIV°).****La Roche-Posay (Vienne).****21, rue de Lyon, Paris.****78, fg. Saint-Denis, Paris.****23, rue Beautreillis, Paris.****14, rue de Normandie, Asnières
(Seine).****OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.**

- Pâte dentifrice du D^r Léon Boyer**
Pâte dentifrice Kraus
Pâte dentifrice Philipps
Pâte Dermos Neyret
***Pâte Gingivale**
Pâte Jane
Pâte Magali
***Pâte Mireille**
Pâte Neyret
Pâtes de régime Re-deuil
***Pâte Robin**
Pâte pectorale du P^r Williams
Pâtes Sana
Pâte Silka
Pâte de Terpene Quédet
Pâte thionique Ram-baud
***Patholysine**
Pausodyne
***Pavérinol Laleuf**
***Paveron Dausse**
***Pavonol**
Paxanus
***Paxène**
Paxol.
***Paxyl**
Pebromon Henry
Pectanol
Pecthionol
***Pectine Oberlin**
Pectobiol
Pectoforme
Pectopax
***Pectoral Coulloux**
Pectoral des Dames de France
Pectoral Serla
Pectoséda
Pectosol
Pédiasma
Pediozema
- LAFFARGUE, Barsac (Gironde).**
 37, rue Godot-de-Mauroy.
 O. C. P., 108, rue de Picpus, Paris.
 35, rue de la Bourse, Lyon.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 43, av. Kléber, Paris.
 Lab. LEGENDRE & C^{ie}, section D. S., Houilles (S.-et-O.).
 35, rue de la Bourse, Lyon.
 7, rue Couche, Paris (XIV^e).
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 66, rue de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 Gaillac (Tarn).
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 GRIGNON, 2, r. Duphot, Paris.
 38, rue Gay-Lussac, Paris.
 142, rue de Picpus, Paris.
 98, rue d'Angoulême, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 CASTEL 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
 295 bis, rue de la Benaugé, Bordeaux.
 MILLET & GUILLAUMIN, 4, rue Richer, Paris.
 Lab. ORRILLARD, 245, rue de Vaugirard, Paris.
 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
 39, rue Sclessin, Liège.
 49, rue Lacépède, Paris.
 Lab. MANSEAU, Margaux (Gironde).
 17, rue Cadet, Paris.
 21, Grande-Rue, Montfermeil.
 Lab. GODART, Andenne (Belgique).
 Lab. des Vosges, La Broque (B.-Rhin).
 116, rue du Pont, Auxerre (Yonne).
 119, rue de Sèvres, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 Lab. ORGA, Avignon (Vauc.).
 122, Champs-Élysées, Paris.
 id.

- Pélargon de Nestlé.**
Pelletierine Tanret
Pellicules radifères du
D^r Vallet
Pellidol
***Pelviformine**
***Pelvinal**
Pelvi-Pyrine
Pelvisedol
***Pelvuryl**
***Penghawar des Iles**
***Penghawar Vicario**
Pennès (Produits)
Pentarsyl
***Peptidodon Henry**
***Pépione**
Pepsencia Roberts
Pepsichlorine
***Pepsinacid**
Pepsine-Ferment
***Pepsipaine**
***Pepsobyl**
Pepsodia
Pepso-Gloma
***Peptalmine**
***Peptargyl Aguetant**
Pepticol
Peptidol
Pept'iode Farma
Peptobrol Kopp
Peptocalcine
***Peptodiase**
***Pepto-fer du D^r Jaillot**
Pepto-ferrine
***Peptogil**
***Peptokola Robin**
***Pepto-Magnésie Vas-**
sal
***Peptomaltone Déjar-**
din
- 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e).
 BYLA, 26, av. de l'Observa-
 toire, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 26, rue Vauquelin, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 21, Grande-Rue, Montfermeil
 (S.-et-O.).
 id.
 15, rue des Champs, Asnières.
 38, bd de Strasbourg, Toulouse.
 RINGEADÉ, pharm., Fossebou-
 deau-Blaye (Gironde).
 17, bd. Haussmann, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 LECOQ & FERRAND, 14, rue
 A.-Briand, Levallois-Perret.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 8, rue St-Martin, Paris
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 DELAUNAY, Joué-les-Tours
 (I.-et-L.).
 ROGÉ-CAVAILLÈS, 116, bd.
 Haussmann, Paris.
 Lab. E. TABART, 168, bd.
 St-Germain, Paris (VI^e).
 B. F. DELAUNAY, Joué-lès-
 Tours (Indre-et-Loire).
 Lab. DEBOUDAUD, 22, rue
 Turbigo, Paris.
 53, rue de Crimée, Paris.
 151 bis, route de Joinville,
 Champigny (Seine).
 21, rue Chaptal, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 13, av. Maréchal-Foch, Dam-
 marie-les-Lys (S.-et-M.).
 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
 1, av. E. THOMAS, Kremlin-
 Bicêtre (Seine).
 19, rue des Foulons, Strasbourg.
 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).
 ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.
 DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
 OPTIMA, 78, Grande-Rue au
 Bois, Bruxelles.
 JACQUEMAIRE, Villefranche
 (Rhône).
 13, rue de Poissy, Paris.
 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
 10, rue Parent de Rozan, Paris.

- *Peptonal** DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).
- Peptonate Henry d Étain** 39, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
- *Peptonate de fer Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- Peptone Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Peptone Catillon** 3, bd. Saint-Martin, Paris.
- Peptone Chapoteaut** 8, rue Vivienne, Paris.
- Peptone Cornélis** OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Peptone Vassal** 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
- *Peptopancréasi** 25, rue Dagorno, Paris.
- *Peptosthénine Choay** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- Peptovalériane du Dr Gigon** 25, bd. Beaumarchais, Paris.
- Peptovitrine** Lab. DU BLOSSET, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Peptozym** R. BOUYSSOU, Chambois (Orne).
- *Perandrone** G. BAETZ, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
- Pérasurol** CIBA, 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- *Peraziodol** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Percaïne-percaïnal** CIBA, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
- *Percalcine** 84, rue Rochechouart, Paris.
- *Percalcium** 6, av. V.-Hugo, Paris.
- *Per-Extraits Carrion** 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris.
- *Perglandènes (ovarien, hépatique, orchitique).** 48, rue de la Procession, Paris.
- *Per-Hépatique Carrion** 54, fg St-Honoré, Paris.
- *Péricols Legros** 88, rue Duhesme, Paris.
- Périol Soulié** Lab. Colonial, 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.
- *Péristaltine Ciba** 103-117, bl. de la Part-Dieu, Lyon.
- Perles Jeka** 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
- Perles Nivernaises** 18-20, rue Vavin, Paris.
- Perles réductrices** PATRICE, à Vichy.
- *Perles Taphosote** 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
- *Permyase** 48, rue de la Procession, Paris.
- Pérosédol** 98, rue de Sèvres, Paris.
- *Per-Ovarien Carrion** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- Peroxydines** 135, rue de Rome, Paris.
- Perparine** 66, rue de la Pompe, Paris.
- Perquinol** 22, cité Trévis, Paris (IX^e).
- Perrhinol** Lab. Arquevaux, Etampes (S.-et-O.).
- *Persodine Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
- *Per-Surrénalien Carrion** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Per-Thymique Carrion** id.
- Pertussin Salle** 4, rue Elzévir, Paris.

- *Pérubore**
Péruglan
- Pérunhyl**
***Pérusol**
Péruvial
- *Pervosine**
- Phagocytine** Bureau
***Phagolysine**
***Phagosthyl**
- *Phagosthyl Mangané**
***Phaguryl**
- Phanodorme**
Pharmetan
***Pharyngaseptyl**
***Pharyngoléine**
***Pharynxol**
Phéchlorment
Phelaxine Moulines
***Phéna**
- Phénacodine**
- Phénalgéine**
Phénaseptyl
Phéniodine
- Phénol Bobœuf**
Phiamine Coursaget
***Philentérol**
***Philoderme** Yldra
Philodermine
- *Philogastrine**
Philogyne
- Philtroline**
- Phléboguil**
***Phlébos**
- *Phlébosine M. et F.**
***Phlébotonine**
- Phléboveinol**
Phlogogyne
Phlogovules
***Phloxiode**
Phlyctol
Phocéol
Phocitrol
1. place Victor-Hugo, Paris.
M. RICHARD, Aubenas (Ardèche).
83, bd. de la Villette, Paris.
31, rue Gambetta, La Rochelle.
REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
G. BAETZ, ^{p^{ien}}, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
86, bd Port-Royal, Paris.
14, rue Cantin, Courbevoie.
A. PARIS, 4, rue La Motte-Picquet, Paris.
id.
BAILLY, 15-17, rue de Rome, Paris.
rue Saint-Honoré, Paris.
61, av. Louise, Bruxelles.
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
72, rue de Bagneux, Montrouge.
8, rue Vivienne, Paris.
7, rue St-Isaure, Paris.
à Villeneuve-la-Guyard (Yonne).
Boîte Postale n° 5, Limoges (Hte-Vienne).
41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
29, rue de Metz, Toulouse.
4, pl. Wilson, Limoges.
57, bd A.-Briand, Champigny (Seine).
41, rue de Rome, Paris.
9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-C.).
42, r. du Dr-Blanche, Paris.
20, rue Antoinette, Paris.
13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
34, rue Saint-Lazare, Paris.
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
MARTINET, 16, rue du Petit-Musc, Paris.
H. SALLE, 4, rue Elzévir, Paris.
Lab. LAGOUTTE, 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
54, fg Saint-Honoré, Paris.
MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
109, rue de Sèvres, Paris.
58, rue de Maubeuge, Paris.
id.
94, rue Michelet, Alger.
37, rue de Bourgogne, Paris.
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
47, rue Bokanowski, Asnières, (Seine).

- *Phonodiose**
Phora
Phos
Phosarrhène
Phosbiogyl
***Phosbiose**
Phoscalgène
***Phoscamine**
Phoscol
Phosféryl Fournier
Phosiodéine
Phoshémoquinol
Phosiodine
Phoskadyl
***Phosma**
***Phosoforme**
***Phosol**
Phosorine
***Phosote Lambiotte**
***Phosovigol**
Phosphalose
***Phosphan Caducia**
Phosphantyl
***Phospharsol**
Phospharsinol
Phospharsyl colloïdal
du Dr Pinard
Phosphate Geffroy
***Phosphates Pinard**
Phosphate Vital de
Jacquemaire
Phosphatine Falières
Phosphatol Vitaminé
Irradié
***Phosphigem**
Phosphobiase
***Phosphobiol**
***Phosphobrom**
***Phosphocalcase**
Phospho-Calcine
Phospho calcine ferru-
gineuse
Phosphodéine
- 71, rue Douy-Delcupe, Mon-
treuil (Seine).
LANG, 14, r. de Marignan, Paris.
213, rue Saint-Honoré, Paris.
112, rue de Gerland, Lyon.
P. FONTANIER, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
12, rue Pavée, Paris.
LESCAROUX, à Châteauroux
(Indre).
MAUCHANT, Gennevilliers
(Seine).
LESCAROUX, à Châteauroux.
7, rue Biscornet, Paris.
41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).
21, rue des Roses, Dijon.
1, av. Eug.-Thomas, Le Krem-
lin-Bicêtre.
H. DUBOIS, Tours (I.-et-L.).
143, Cours de la Somme, Bor-
deaux.
37, r. de Marly, Rueil-Malmaison.
QUINET, 143, rue du Temple,
Paris.
VIDAL, 90, r. St-Martin Etampes.
20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.
62, rue Marengo, Saint-Étienne.
95, r. de Vaugirard, Paris.
M. RICHARD, Aubenas (Ar-
dèche).
46, rue Pierre-Charron, Paris.
MORAND, à Auray (Morbihan)
90, bd. Saint-Denis, Courbevoic.
DÉLAMARE & C^{ie}, Romilly-
sur-Andelle (Eure).
90, bd. Saint-Denis, Courbevoic.
à Villefranche (Rhône).
1, quai Aulagnier, Asnières.
15, rue Catulienne, Saint-Denis
(Seine).
38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
LANDON, p^{ien}, av. Baraduc,
Châtel-Guyon (P.-de-D.).
Ph. GUELY, 16, cours Gam-
betta, Lyon.
4, r. Lecomte-de-Nouy, Paris.
Jouffray, Bourgoin (Isère).
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.
41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).

- *Phospho-Fluor-Beynet** 165, rue Saint-Honoré, Paris.
***Phospho-Gaïacol Mary** 32, rue de l'Oucst, Paris.
Phosphogayol ROUANET, Antibes (Alp.-M.).
Phosphogénase 37, rue Tivoli, Bordeaux.
Phosphogène Favri- à Saint-Symphorien - de - Lay
chon (Loire).
Phosphoglycérate de
Chaux Chapoteaut 8, rue Vivienne, Paris.
Phospho-Iodine 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.
***Phospholéose** Lab. Demasles, Vienne (Isère).
***Phosphomagnésium** 4, r. Lecomte-de-Nouy, Paris.
***Phosphoneurol** 18, rue de Beaune, Paris.
***Phosphonine Soulié** Lab. Colonial, 21, rue Mouton-
 Duvernet, Paris.
Phosphonucléose DUPONT, Velines (Dordogne).
Phosphopinal Juin 10, impasse Milord, Paris.
Phosphorescine Leker 13, rue Marbeuf, Paris.
Phospho-Sérum 62, r. Dupont-des-Loges, Rennes.
Phosphosodine 49, rue Maleret, Bordeaux.
Phospho-Strychnal Voir *Strychnal*.
Phosphotal Clin 20, rue des Fossés-Saint-Jac-
 ques, Paris.
Phospirine 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
Phostanio M. LOISEAU, 22, fg St-Mi-
 chel, Angers.
Phostaniol Lab. COMTOS, à Feschés-le-Châ-
 tel (Doubs).
Phostone BRÉANT, 11, r. de Clichy, Paris.
***Phostyl Py** 58, bd. R.-Wallace, à Puteaux.
Phusasmine E. ROBINEAU, 80, rte des
 Petits-Ponts, Drancy (Seine).
Phydermol 70, rue Boucicaut, Fontenay-
 aux-Roses.
Phygynol 27, r. des Batignolles, Paris.
Phylactone Byla 26, av. Observatoire, Paris.
***Phylla** 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
Phyllosan 26, rue Sainte-Claire, Mulhouse.
Phymo-Stéryl Leysin 1 bis, rue Molitor, Paris.
Physéine Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
***Physioscyamine** 49, rue Maleret, Bordeaux.
***Physiosthénine** DROUET & PLET, 37, rue de
 Marly, Rueil-Malmaison.
Physocrisine 7, rue Biscornet, Paris.
Phytalgine P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
Phyteol 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Phytergol 53, rue de Crimée, Paris.
Phyteta 7, passage Thionville, Paris.
Phytinate de Quinine 103-117, boul. de la Part-Dieu,
 Ciba Lyon.
***Phytine Ciba** id.
***Phytocuprine** 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e).

- Phytogénine Byla
 *Phytogénol 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 MARIOTTE, 15, rue Pasteur,
 Bourg (Ain).
 *Phytogyl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 *Phytojava 34, rue Sedaine, Paris.
 *Phyto-Kola 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
 Phytol 3, rue Chanez, Paris (XVI^e).
 *Phytolax 50, rue Nationale, Lille.
 Phytomarine 132, rue de Turenne, Paris.
 Phytomensyl 59, rue Boissière, Paris.
 *Phytosang Sarda 119, rue de Sèze, Lyon.
 *Phytosplénol Plé 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 Phyto-Tanin D^r A. Petit, à Angoulême.
 Phytothérapie Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
 *Phytovseinol ROGÉ-CAVAILLÈS, 116, bd.
 Haussmann, Paris.
 *Phytovitamine Plé 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 *Picricol 36, quai Fulchiron, Lyon.
 Picrol 22, rue Maréchal-Foch, Mont-
 pellier.
 Picrovules 21, Grande-Rue, Montfermeil
 (S.-et-O.).
 Pilixyl BOUVELOT, 62, rue d'Antibes,
 Cannes.
 *Pilka (Gouttes) 26, rue Vauquelin, Paris.
 Pilules Anhépatiques 4, r. Colbert, Reims.
 Christiaens
 Pilules antidiabétiques 67, r. de Wagram, Paris.
 Midy MONIN, 49, rue de Maubeuge,
 Paris.
 Pilules antinévrалgi- 16, r. Ballu, Paris.
 ques du D^r Cronier 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 Pilules Bengué GIGON, 25, bd Beaumarchais,
 Paris.
 Pilules Bosredon
 Pilules bronchotoni- 28 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 ques Arco GILBERT, 6, r. du Laos, Paris.
 Pilules Clauss 10, rue Saint-Antoine, Paris.
 Pilules Clérambourg 6, rue Abel, Paris.
 Pilules de Chloramine 11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.
 *Pilules Coter 30, rue Louis-le-Grand, Paris.
 Pilules Coupier 3, av. Lowendal, Paris.
 Pilules Cuticura
 Pilules de Boldo-Biline Arques (P.-de-C.).
 Ducloy à Annonay (Ardèche).
 Pilules Doumer 196, rue de Paris, Montreuil-
 sous-Bois.
 Pilules Dray LONGUET, 34, rue Sedaine,
 Paris.
 *Pilules du D^r Debouzy Saint-Vallier (Drôme).
 *Pilules du D^r Mous- 62, rue de la Tour, Paris.
 tier 53, bd de Verdun, Fontenay-
 Pilules du D^r Séjournet énergétiques sous-Bois.
 Fradier 26, Grande-Rue - Saint-Clair,
 Pilules Eparvier Lyon.

- Pilules Galvane**
Pilules Gip
Pilules Hardy
***Pilules héléniennes**
Naud
Pilules Hémabione

Pilules d'Hermal
Pilules Laville
Pilules Lartigue
***Pilules Lemary**
Pilules lithuranées du
D^r Boveil
Pilules de Moussette
***Pilules Myosotis**
Pilules Nella
Pilules noires Leisyn
Pilules Norma
Pilules Oco
Pilules oporénales
***Pilules Philippe**
Pilules Prophylacti-
ques Christiaens
Pilules Purgatives du
D^r Dehaut
Pilules de Quassine
Frémint
Pilules Salvia
Pilules stibiées
Pilules Tix
***Pilules V.-E. Doumer**
Pinofluol
Pinolac

***Pineoleum**

***Pioréfagine**

Pipérasol Tissot
***Pipérazine Midy**
Pipérazine R.-B. La-
grave
Pipérazyl
Pipettes nasales M. S.
Piscidia Gmet
Pitol
Pituilobine Byla
Pituitairine

Pixel Kœhly
Placenta Endocrisines
Fournier
Placentodose
Plaganol

Plagéine Soulas
***Plasma de Quinton**
- Chabanais (Charente).
 7 et 7 bis, r. Galvani, Paris.
 13, rue Minimes, Le Mans.

 37, rue Pajol, Paris.
 Lab. MOURGUES, Chemin-
 Neuf, Ganges (Hérault).
 10, pass. Morel, Montrouge.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.

 1, rue Lassale, à Lyon.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 41, rue de Rome, Paris.
 4, rue Jean-Goujon, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 87, rue Lafayette, Paris.
 132, rue de Turenne, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.

 4, r. Colbert, Reims.

 147, fg Saint-Denis, Paris.

 6, rue Abel, Paris.
 139, av. Emile-Zola, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 Bomel, Annonay (Ardèche).
 3, rue de Surène, Paris.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 7, rue Lucien-Jeannin, La
 Garenne (Seine).
 Lab. HYGIO-DONTIS, Croissy-
 sur-Seine (S.-et-O.).
 34, bd de Clichy, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.

 72, quai Jemmapes, Paris.
 30, bd Raimbaldi, Nice.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 2, rue de Paris, Douai.
 26, av. Observatoire, Paris.
 OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.

 7, rue Biscornet, Paris.
 47, rue de Neuilly, Nanterre.
 13, rue des Nonnains-d'Hyères,
 Paris.
 119, rue de Sèvres, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.

- Plasmargol**
***Plasmarine**
Plas Mastyl
Plasmatol
Plasmobeef
Plasmobiol
Plasmocalcium
Plasmocéane
Plasmocol
Plasmodine Vicario
***Plasmosalin**
Plasmo Prima
Plasmostérol
***Plasmosthène**
Plasone Vours
Plasthamélyne
Plastima
Pléthorine
***Plexalgine Laleuf**
***Plexamine**
Plexorine
Plombyl
Pluorysse
***Pluribiase**
Pluriglandine M et F
Plurinatrlyl
***Plurion**
Pnéoline
Pneuma Wander
Pneumobiol
Pneumo-calcine
Pneumocratol
***Pneumogéine Renard**
Pneumogénol
***Pneumo-lipase**
Pneumonctyl
***Pneumostyl Daguin**
Pneumotanic Grémy
Podophylle Coirre
Podoxyl
***Poténane**
***Poliol Churchill**
Polvista
***Polybromure Gonnon**
***Polycalcion**
Polycalcose
Polycautére
- HION, Paimpol (C.-du-N.).**
Lab. de la BIOMARINE, Dieppe.
20 bis, rue Sergent-Godefroy,
Montreuil-sous-Bois.
ROUSSEL, Grande-Rue, Flers
(Orne).
Lab. AUBERY, Avignon (Vau-
cluse).
id.
Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
DELAUNAY, Joué-les-Tours
(I.-et-L.).
156. r. des Fauvelles, Courbevoie.
17, bd Haussmann, Paris.
35, rue Périssé, Toulouse.
3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
Lab. AUBERY, Avignon (Vau-
cluse).
14, rue des Minimes, Paris.
72, av. Kléber, Paris.
59, rue Boissière, Paris.
17, rue Vieille-du-Temple, Paris.
112, rue de Gerland, Lyon.
51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
40, rue de Bellechasse, Paris.
41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
37, rue de Marly, Rueil-Mal-
maison (S.-et-O.).
FABRIS, Chambéry (Savoie).
21, rue Violet, Paris.
OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.
151, rue de Charenton, Paris.
18, av. Hoche, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
151 bis, rue de Joinville, Cham-
pigny.
48, rue de Paris, Vichy.
25, rue Jasmin, Paris.
147, fg Saint-Denis, Paris.
35, rue de Paris, Clichy.
BURÉ, 74, fg d'Ambrail, Epinal.
YVRARD, 17, r. Soufflot, Paris.
JOUANNET, Le Perray (Seine-
et-Oise).
à Saint-Maur (Seine).
14, rue de Clichy, Paris.
5, bd Montparnasse, Paris.
PALC, Messigny (Côte-d'Or).
18, rue des Écoles, Paris (V^e).
12, rue Castiglione, Paris.
6, rue Trencavel, Béziers.
14, rue Victor-Hugo, Lyon.
21, rue Chaptal, Paris.
6, rue Berbissey, Dijon.
19, rue Drouot, Paris.

- Polychromol** Coudière 143, rue de la Guillotière, Lyon.
Polycine 113, bd Voltaire, Paris.
Polydigeral Calmel 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
***Polyferments Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris.
Polyformiate 18, avenue Hoche, Paris.
***Polyiodure Gonnon** 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Polymétal 56, rue Beaubourg, Paris.
Polyminéral Fort 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie.
***Polyna** 102, av. Michelet, Saint-Ouen (Seine).
***Polypeptine** 61, rue de Seine, Paris.
***Polypeptonal** DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
Polyphorine 6, rue Abel, Paris.
Polysel Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).
Polyseptol 74, rue Lourmel, Paris.
Polysodine 24, rue Monttessuy, Paris.
***Polytonyl** 32, rue de l'Ouest, Paris.
***Polyvaline D^r Bayle** 10, r. Alphonse-Bertillon, Paris.
Polyveinine JAUME, Tamaris (Gard).
Pommade Acar 5, r. E.-Combes, St-Étienne (Loire).
Pommade 731 1, rue Delacroix, Chartres.
Pommade adrénostyptique Midy Lab. MIDY, 67, av. Wagram, Paris.
***Pommade Aiphème** 54, r. d'Étretat, Fécamp (Seine-Inf.).
Pommade à l'Inolène ODILIA, 42, r. Mont-Cenis, Paris.
Pommade Ascigué HUYGHE (G. et J.), Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or).
***Pommade Bebia** 5, av. E.-Boissier, Nantes.
***Pommade Bernamont** 87-89, rue du Commerce, Nevers.
Pommade Bertol Vichy 34, bd Victor-Hugo, Grasse.
***Pommade-Crème Luddin** Lab. REY, 12, rue Montmartre, Dijon.
Pommade Cuticura 3, av. Lowendal, Paris.
Pommade de l'Esterel 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
Pommade de Sérus LETTRY, 69, r. de Sèvres, Paris.
Pommade du D^r Wolf 46, rue des Faures, Bordeaux.
***Pommades aseptiques** (Voir *Tubes Dulcis*).
Dulcis
Pommades Éon 13, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
Pommade épidermogène 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
Pommade Forgue 37, rue de Bourgogne, Paris.
***Pommade Fornet** à l'Insuline 14, Chaussée de La Muette, Paris.
Pommade du Foyer DOUCET, Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure).
Pommade Heliatol 4, pl. Royale, Nantes.
***Pommade Inséva** DEBAT, 60, rue de Monceau, Paris.

- *Pommade d'Insuline (Voir Poudre et Pommade d'insuline.)
 Phyloze
 *Pommades Kléos 2, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
 Pommade L. 3 8, rue Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.
 *Pommade Lenoir 142, rue de Picpus, Paris.
 *Pommade Logeais 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
 *Pommade Midy 67, av. de Wagram, Paris.
 Pommade Neothorium 177, rue de Courcelles, Paris (XVII^e).
 Millot
 *Pommade au Nestosyl 72, rue Saint-Dominique, Paris.
 *Pommade Noelline Guingamp (C.-du-N.).
 *Pommade Parvy P. BOIVERT, Montguyon (Ch.-Inférieure).
 Pommade Périol 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.
 Pommade Phlébos 229, cours Gambetta, Lyon.
 Pommade Poncet 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
 *Pommades Probios 8, rue St-Martin, Paris.
 Pommade Quartier 4, r. de Paris, Essonne (S.-et-O.).
 Pommade Radine DUCLOS, Evreux (Eure).
 Pommade Raimoa 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
 Pommade Reys 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
 Pommade Rhinol DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
 *Pommades ophtalmiques Chibret CHIBRET, 5, rue Saint-Hérem, Clermont-Ferrand.
 Pommades Rôyer 223, rue Saint-Martin, Paris.
 Pommades Stéryl 94, rue Michelet, Alger.
 Pommades Talon 153, bd Montparnasse, Paris.
 Pommade-Vaccin Santalale 42, rue des Grandes-Arcs, Strasbourg.
 Pommade Valentin 10, square de Châtillon, Paris.
 Chaillot
 Pommade V.-E. Doumer
 Pommade Vérandy BOMTEL, Annonay (Ardèche).
 G. LAURENS, Pharm., Aix-en-Provence.
 *Pommade Vitamor-rhuine
 Ponine
 *Poroderma 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
 SERRE, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
 Posoplaste A. K. 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 Postérisan 6, rue des Cigognes, Strasbourg.
 *Post-Hypophyse Choay 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 *Potion Adol GIROUD, 78, c. de la Liberté, Lyon.
 Potion Boissel 295 bis, r. de la Bénédicte, Bordeaux.
 Potion Bonnet 17, rue Cadet, Paris.
 [Potion des Cordeliers de Seez 19, av. Secrétan, Paris.
 [Potion Dioga 14, rue Demarquay, Paris.

- Potion du D^r Henry**
Potion Granval
Poudre à l'Inolène
Poudre américaine Le-roy
**Poudre antiasthma-
 tique Henry**
Poudre Airia
***Poudre Beau chloro-
 formée**
Poudre Bébia
Poudre Bellada
Poudre Blot Laxative
Poudre Cap
***Poudre Cassarini**
***Poudre Chaumel**
Poudre Cosy
Poudre Cytisi
***Poudre Danica**
Poudre Deol
Poudre Diadermine
Poudre Dumur
**Poudre dentifrice
 Charlard**
**Poudre de Lausanne
 (Voir *Isotonyl*)**
Poudre de Sapolan
Poudre de viande
Poudre du D^r Cléry
**Poudre du D^r Souli-
 goux**
Poudre épidermogène
***Poudre Escoufflaire**
Poudre Espic
Poudre Evine
Poudre Exibard
Poudre Fiore
**Poudre Ferromanga-
 nique**
Poudre Gast
Poudre Gécé
Poudre Génia
Poudre Gilbert Trillon
Poudre gynol
Poudre Gynule
Poudre Héliatol
- Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).**
 12-14, rue Fery, Reims.
ODILIA, 42, rue Mont-Cenis,
 Paris.
 12, r. de la République, Puteaux.
 39, rue Sclessin, Liège.
 49, rue Maleret, Bordeaux.
Ph. GUELY, 16, cours Gam-
 betta, Lyon.
 5, avenue Boissier, Nantes.
 4, rue Keller, Paris.
MONIN, 49, rue de Maubeuge,
 Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
COLUMEAU, 24, rue Flégier,
 Marseille.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 89, rue Saint-Georges, Nancy.
AXAREL, 15, rue Catulienne,
 Saint-Denis.
 50, rue de Turenne, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 60, r. Etienne-Dolet, Malakoff
 (Seine).
GIROUD, 78, cours de la Liber-
 té, Lyon.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 87, rue Lafayette, Paris.
CAVAILLES, 29, rue Singer,
 Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil
 (Seine).
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 53, bd de Verdun, Fontenay-
 sous-Bois.
 à Baisieux (Nord).
 20, rue Saint-Lazare, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 6, pl. Clichy, Paris.
 48, rue de Berri, Paris.
 136, rue Chemin-Vert, Paris.
 24, rue Eugène-Pelletan, Vitry-
 sur-Seine.
 316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.
CH. DEHAY, à Arras.
 4, pl. Royale, Nantes.

Poudre Hunier	REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
Poudre Jifa	44, rue Chaptal, Levallois (Seine).
Poudre Klappa	GIBAN, à Sens (Yonne)
Poudre Lartigue	78, fg Saint-Denis, Paris.
Poudre laxative André	60, rue des Moulins, Valence (Drôme).
*Poudre Mass plastique	20, rue Joubert, Paris.
*Poudre Noelline	Guingamp (C.-du-N.).
Poudre Optima	Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Poudre O. R. L.	4, rue d'Illzach, Mulhouse.
Poudre Pastorilos	10, rue du Plâtre, Paris.
*Poudre Paterson	46, rue de Saintonge, Paris.
Poudre Pelevine	15, bd des Batignolles, Paris.
*Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze	48, rue de la Procession, Paris.
Poudre purgative Künckel	3, rue Watteau, Courbevoie.
Poudre Pylor	20, Grande-Rue, Besançon.
Poudre Remoro	JEHAN & BRÉRA, Montauban (Lot-et-Garonne).
Poudre Reys	21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
Poudre Rhodys	97, bd Saint-Germain, Paris.
*Poudre Rocher laxative	19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
Poudre du roy	5, rue Diderot, Nice.
Poudre Salva	Lab. Central de France, 1, rue de Châteaudun, Rennes.
*Poudre Satine	7, rue Galvani, Paris.
Poudre de soufre Sapolan	CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
Poudre Stear	34, r. Thiers, Gray (Haute-Saône).
Poudre Stoma	HÉRIN, 98, rue Jeanne-Maillette, La Madeleine (Nord).
Poudre Zani	52, r. de Poissy, Saint-Germain-en-Laye.
Poudre Zeden	Lab. PISTRE, 27, bd Henri-IV, Paris (IV ^e).
Poudre Ziethen	85, rue des Morillons, Paris.
*Pragmoline	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Praidow	BATTUT, à Vatan (Indre).
Pré-asthme	3, pl. d'Armes, Valenciennes (Nord).
Précibiase	22, rue de la Sorbonne, Paris.
Précy	11, rue de Clichy, Paris.
*Prélagyl	32, rue de l'Ouest, Paris.
Prélase	71, rue Sainte-Anne, Paris.
*Prémaline	SPÉCIA, 21, r. J.-Goujon, Paris.
*Pressyl	Lab. LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris (IX ^e).
*Prévalidine	Mer Rouge, Mulhouse.
Prévarsyl	89, rue du Cherche-Midi, Paris.
*Préventyl	74, rue des Jacobins, Amiens.
*Prézymase	LEBOIME, 3, rue Fernand-Widal, Paris.

- Prima Furoncles**
Primafone
Primaplast
Prima-Stéril
Primatex
Primuzye
***Probios**
***Procuta Brisson**
Proderma
Produits antidiabétiques Dupont
Produits Benedictus
Produits Billault
Produits Chanteaud
Produits diététiques
Produits du Dr Serin de Gaillac
Produits Gmêt
Produits Gory
***Produits Lémery**
Produits Maias
Produits de Malt
Produits opothérapiques
Produits organiques Richard
Produits Orhino
Produits Pennès
Produits de Régime
Produits Shamb
Produits Zyma
***Prodynase**
Progadol
***Progaster**
***Progone**
Progoseptone
***Prolax**
***Prométhine**
Promulier
Propeptase
Prophylactyl
***Prophylargyl**
Prophyliax
Prophylaxis
***Propidex**
***Propidon**
***Prostal**
- 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
 24, bd Sébastopol, Paris.
 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
 id.
 id.
 23, rue Beantreillis, Paris.
 8, r. St-Martin, Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 COSSON, Romainville (Seine).
 38, rue Rochechouart, Paris.
 17, rue Duguay-Trouin, Paris.
 4, pl. de la Sorbonne, Paris.
 3 et 5, r. Alex.-Dumas, Paris.
 FAVRICHON, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
 10, allées Damour, Bordeaux.
 27, fg Montmartre, Paris.
 51, rue des Mathurins, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 BOUCHÈRE, Rive-de-Gier (Loire).
 5, rue Labroque, Strasbourg.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 79, av. d'Orléans, Paris.
 82, rue de la Croix-Verte, Albi.
 BOUTY, 3, rue de Dunkerque, Paris.
 LA NUTRICIA, 142, rue Fransman, Bruxelles.
 PALC, Messigny (Côte-d'Or).
 26, rue Vauquelin, Paris.
 12, rue Charles-V, Paris.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris (III^e).
 9, rue de la Platière, Lyon.
 15, rue Catulienne, Saint-Denis (Seine).
 id.
 4, rue d'Aumale, Paris.
 20, rue des Écoles, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 132, rue de Turenne, Paris.
 COSPHA, 76, rue des Jacobins, Amiens.
 Voir Vitargyl.
 6, rue des Feuillants, Marseille.
 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Paris.
 SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 MONAL, 13, avenue de Ségur, Paris.

- *Prostalyse
 Prostaphile Leisyn
 *Prostaditausse
 *Prostatols
 *Prosthénase Galbrun
 *Prostigmine
 Prosvelta
 Protaminol Byla
 Protargol-Boulard
 Protège-Vaccin Kraus
 *Protensène
 Protensol
 Protéobiol
 *Protéodyne
 Protéol
 *Protéo Maltase
 Prothéine
 Prothiol
 Protiode Grémy
 *Protiodyne
 Protonic
 Proto-Gambier
 Protylene Roche
 *Provac's
 *Proveinase Midy
 Provenine
 Proxytase
 *Proxytol
 *Prunagar
 Pruneline Bost
 Prunines Sentini
 *Prurilyse
 Pruritol Raimoa
 Psinase Grémy
 *Psoréal
 *Psorène
 *Psoréon
 Psorixalan
 *Psoryl
 *Psothanol
 Psychobiasés
 Psycho-Neuryl
 Psioliolaxine
 *Psyllium Langlebert
 Puberglandol
 Puerol
 Pulcéine
 Pulmicure
 21, rue de Lyon, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 BEAUXIS-LAGRAVE, 72, quai
 Jemmapes, Paris.
 10-12, rue de la Fraternité, St-
 Mandé.
 HOFFMANN LA ROCHE, 10,
 rue Crillon, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris et 8,
 r. de Hollerich, Luxembourg.
 26, av. Observatoire, Paris.
 82, av. de Suffren, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 142, rue de Picpus, Paris.
 GODART, Andenne (Belgique).
 BAILLY, 17, r. de Rome, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
 29-31, quai Henri-IV, Dieppe.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 4, rue Childebert, Lyon.
 14, rue de Clichy, Paris.
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 88, rue Duhesme, Paris.
 42, rue Émile-Deschanel, Cour-
 bevoie (Seine).
 10, rue Crillon, Paris.
 42, rue Thiers, Le Havre.
 67, av. de Wagram, Paris.
 8, rue Riblette, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 18, rue des Écoles, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 72, Grande-Rue, Flers (Orne).
 16, rue des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 Dinan (Côtes-du-Nord).
 Dinan (Côtes-du-Nord).
 Dinan (Côtes-du-Nord).
 14, rue Saint-Claude, Paris.
 2 et 4, pl. Saint-Martin,
 Vendôme (Loir-et-Cher).
 22, rue de Turin, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 4, chaussée de la Muette, Paris.
 Saint-Rémy-de-Provence (B.-du-
 Rhône).
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 150, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 LE NAOUR, Quimperlé (Fin.).
 Eon, 3, rue des Rouairies, Dinan
 (Côtes-du-Nord).

- Pulmine Byla**
Pulmobiasse
- Pulmobryne**
Pulmobules Hyva
***Pulmocardine**
- Pulmocholine**
Pulmochrysine
- *Pulmodion**
***Pulmodynol**
***Pulmofluide**
- *Pulmofluide éphédrine**
***Pulmogrog**
- Pulmogyl**
Pulmolaxol
- *Pulmonaire du**
D^r P. Bourgogne
Pulmonase
Pulmone
Pulmonine Bouty
***Pulmorectol**
***Pulmoseptine**
- Pulmoseptol**
***Pulmosérum Bailly**
Pulmosirop
- *Pulmositoires**
Pulmosodyl
- Pulmostéryl**
Pulmostyl
- *Pulmo-Thiorine**
Pulmovaccin
Pulmoverne
Pulmovitine
- *Pulsamone**
Pulsophyle
***Pulvéol**
Pulvérisateur E. C. S.
Pulvérisateur Vaast
Pulvinasol
Pulvi-Lactéol du D^r
Boucard
Pulvinha-Pathuro
Pulviséda
***Pulvita**
- Pulvo - Collargophé-**
drine
- 26, av. Observatoire, Paris.
ADLER, 36, rue des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 38, r. N.-Dame-de-Lorette, Paris.
 12, rue Grande, Evreux.
Lab. J. PERROCHON, Tours
 (I.-et-L.).
 20, rue d'Avron, Paris.
BONNAY, Nogent-sur-Marne
 (Seine).
 10, impasse Milord, Paris.
 22, rue de Nemours, Paris.
LEURQUIN, 50-52, rue Pierre-
 Legrand, Lille.
 id.
FERCOCQ, La Varenne-Saint-
 Maur (Seine).
 33, rue Lauriston, Paris.
GERDA, 163, bd Croix-Rousse
 Lyon.
- 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 14, av. Perrichont, Paris.
Lab. DARDENNES, Tours.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 23, rue des Moines, Paris.
CABASSON, 183, rue de Rome,
 Marseille.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
MEUNIER, rue du Commerce,
 Montmarault (Allier).
 7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII^e).
PHARMA-SPÈS, 15, rue Cor-
 nelle, Lille.
 à Châteauroux (Indre).
Lab. LESCAROUX, 3, rue Vic-
 tor-Hugo, Châteauroux.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 23, rue des Moines, Paris.
 13, rue D^r-Mazet, Grenoble.
P. FONTANIER, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
 59, rue Boissière, Paris (XVI^e).
 102, av. Michelet, St-Ouen.
 10, impasse Milord, Paris.
 10, rue Caumartin, Paris.
 22, rue de l'Odéon, Paris.
 26, rue des Moines, Paris.
- 30, rue Singer, Paris.
LE GALLO, à Auray (Morb.).
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
 2, rue Mélingue, Paris.

- Pulvo-Ephédrocure**
Punch Novela
Puragar
***Purargol**
Purethyl
Purgalax
***Purganol Daguin**

Purganséline
***Purgarex**

Purgatif Voux
Purgelettes Roux
Purgemint

Purgettes Lentilhac
Purgipastilles
Purgos
Purgyl Kœhly
Purolive

***Pyo-Amphogel**

***Pyocoline**

Pyodarsénol

Pyodermase

***Pyodolysine**
Pyodont « 21 »

***Pyoformine**
***Pyogénol**

Pyol Hambro

***Pyorex**
Pyoseptol

***Pyo-Vaclydun**
***Pyrallium**

Pyramidon U. R.
Pyran
Pyratone
***Pyrélaïne Collas**

***Pyréthane**
Pyrétrhine

Pyréthrosol
Pyréthroxyl
Pyridone D' Berlioz
Pyrinol Vichy
***Pyri-Pyridium**
- 2, rue Mélingue, Paris.
 Saint-Julien-en-Jarez (Loire).
 46, rue de Rome, Marseille.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 74, rue des Jacobins, Amiens.
 24, rue Monttessuy, Paris.
 7-13, rue Bobillot, Saint-Maur
 (Seine).
 Ansel, Samer (Pas-de-Calais).
 58, rue du Rempart, Valen-
 ciennes (Nord).
 31, av. Michel-Bizot, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 MOULIN, 50, rue de la Répu-
 blique, Puteaux.
 33, fg Montmartre, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 7 bis, rue Galvani, Paris.
 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 25, av. Ledru-Rollin, Le Per-
 reux (Seine).
 RONCHÈSE, 21, bd de Riquier
 Nice.
 2 et 4, pl. Saint-Martin, Vendôme
 (Loir-et-Cher).
 INAVA, 14, rue de Normandie,
 Asnières (Seine).
 pl. du Marché, La Rochelle
 (Charente-Inférieure).
 2, rue des 3 Mages, Marseille.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (S.-et-O.).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 INAVA, 14, rue de Normandie,
 Asnières.
 Lab. Central de France, 1, rue
 de Châteaudun, Rennes.
 15, rue de Rome, Paris.
 N. HORVILLEUR, 13, rue de
 Paris, Clichy (Seine).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 COUDERC, 28, rue du Four,
 Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 156, r. des Fauvelles Courbevoie.
 71, bd Saint-Michel, Paris.
 35, av. de Beauté, Le Parc-Saint-
 Maur (Seine).
 18, rue Ernest-Rousselle, Paris.
 CARTERET, 15, rue d'Argen-
 teuil, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 rue Faidherbe, Lille.
 6, rue d'Alsace, Grenoble.
 PATRICE, à Vichy.
 ESRVIER, Orléans (Loiret).

Pyrocidine**Pyroclase*****Pyrocuroil*****Pyroléol Edet****Pyrothéine*****Pyurol****OPTIMA**, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.

15, rue des Champs, Asnières.

47, rue Nollet, Paris (XVII^e).

25, bd Beaumarchais, Paris.

23, rue de Paris, Auxerre.

15, r. J. Jaurès, Puteaux (Seine)

Q***Quassia-Kina Rabot****Quassine Frémint*****Quassine Houdé*****Quassinol****Québralgine****Quiétol****Quiétudol****Quiétyl****Quina Baron*****Quina Bourcet*****Quinacrine*****Quina pepsiné Blot****Quinacinas****Quina-Fer des Vosges****Quina-Fer Mechling****Quina Laroche****Quinamagnésion*****Quinarsol antianémi-
que Grandval*****Quinarsol Fébrifuge
Grandval****Quinby****Quinéase*****Quinéine*****Quinicardine*****Quinimax****Quinimuthol Saca*****Quinine - Calcium -
Sandoz*****Quinine Pelletier*****Quininc-Phytine**

49, rue Bitché, à Courbevoie.

6, rue Abel, Paris.

9, rue Dieu, Paris.

73, bd Baille, Marseille.

12, bd Pershing, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

Bertrand, Nomexy (Vosges).

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

P. FOURNIE, 3, pl. Tobie-
Robatel, Lyon.

7, av. du Doyenné, Lyon-St-Jean.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

38, bd de Strasbourg, Toulouse.

7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
Colombes (Seine).21, rue de la Gare, La Broque
(Bas-Rhin).

à Mulhouse.

COMAR, 20, rue des Fossés-
Saint-Jacques, Paris.**SAUBA**, Montreuil (Seine).

12 et 14, rue Féry, Reims.

12 et 14, r. Féry, Reims.

P. AUBRY, 62, rue Erlanger,
Paris.37, rue de Marly, Rueil-Malmaison
(Seine-et-Oise).

21, rue Chaptal, Paris.

27, rue de la Procession, Paris.

154, av. Malakoff, Paris.

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

20, rue Vernier, Paris (XVII^e).**VIAL**, 8, rue Vivienne, Paris.103-117, boul. de la Part-Dieu,
Lyon.

- Quinio-Goyl Meurice
 Quiniopraequine 61, av. Louise, Bruxelles.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
- *Quinio-Stovarsol id.
 Quinismuth DEMARS, 89, av. Wagram,
 Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
- *Quinium Roy id.
 Quinium Roy phos-
 phaté 143, rue du Temple, Paris.
 S. I. T. S. A., 15, r. des Champs,
 Asnières.
- *Quinobore 37, rue Pajol, Paris.
 Quinobrome S. I. T. S. A., 15, r. des Champs,
 Asnières.
- *Quinoforme Lacroix 20, pl. des Vosges, Paris.
 *Quinoïdine Duriez G. HENRY, à Vernon (Eure).
 Quinol 7, rue Lucien-Jeannin, La
 Garenne (Seine).
- *Quinolax 12, rue Pavée, Paris.
 172, rue d'Alésia, Paris.
 90, av. Saint-Ouen, Paris.
- Quinophage 25-27, r. du Com^t-Rivière,
 Colombes (Seine).
 Quinopyrol 12, rue Charles-V, Paris.
 Quinorhéine Duteil 98, rue de Sèvres, Paris.
 Quinosiphon OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
- Quinotane Valguy 27, fg Montmartre, Paris.
 Quino-Thorium 42, rue du Docteur-Blanche,
 Paris.
 Quinovarine 12-14, rue Féry, Reims.
 15, av. du Parc-Montsouris,
 Paris.
- *Quinquina Gmet 34, rue Thiers, Gray (Haute-
 Saône).
 *Quinquina granulé As-
 tier rue Paul-Bert, Angers.
 Quinquina Grandval 4, rue des Martyrs, Paris.
 Quinquina Watelet TERRIAL, 22, rue de la Bien-
 faisance, Paris.
- *Quinsal 18, rue Daval, Paris.
 *Quinthéryl LONGUET, 34, rue Sedaine,
 Paris.
 *Quintolyse Feret 12, rue Castiglione, Paris.
 Quinucrea Y. CHARROL, 29, av. d'Or-
 léans, Paris.
- *Quintozone H. CHARTIER, à Saumur.
 *Quinuryl
 Quiphos Churchill
 Quotibyl
 *Le Quotidien (Raisin)

R

- Rachisténine**
Radia
Radiargyl
Radiesthésie médicale
Radioactine
Radio-Baryx
***Radiobaume Adrian**
Radiobiogyl
Radiocréméline
Radiodine
***Radiogastrol**
Radiogyl
Radiole
***Radiomagnésium**
Radio-mordant Leisyn
Radio-osséine
Radiopaque
Radiophorin
Radiopirine
Radioplasme
***Radio-Salil**
Radiosantal
Radiosérum Jaboin
***Radiotétrane**
Radio-Thalline
Radiotonine
Radiovitine
Radioviva
Radiovules
Radipirine
Radiurèse
Radiuryl
Radijunal Chevrier
Raiforyl
Rami-gouttes
***Rangol**
***Raphabil**
- 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
 14, av. Perrichont, Paris.
 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
 G. LESOURD, 88, rue Duhesme, Paris.
 24, r. de Monttessuy, Paris (VII^e).
 1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 25, rue Vaneau, Paris.
 4, rue Saint-Anastase, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 25, rue Vaneau, Paris.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 FORNIER, 264, rte d'Heyrieu, Lyon.
 HEUDEBERT, 85, rue Saint-Germain, à Nanterre.
 JOOSS, Montreuil (Seine).
 COULAUD, Lorris (Loiret).
 24, rue de Monttessuy, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 24, rue de Monttessuy, Paris.
 24, rue Monttessuy, Paris.
 40, rue Belcchasse, Paris.
 BASSOL, Ste-Alvère (Dord.)
 4, rue St-Anastase, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 25, rue Cler, Paris.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine).
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 id.
 21, fg Montmartre, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
 à Levallois-Perret, 44, r. Chaptal.
 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 20 rue Vernier, Paris.

- *Rapharène**
Rapidoats
Rapnol
- *Ravix**
- Réalgose**
Réaline
***Réalphène Buisson**
***Recal (Voir Comprisés)**
Recalcifiant Henry
***Reconstituant Mary**
***Recrésal**
***Rect'Acolitol**
- *Rectagine**
Rectaméline (Voir Pomme Logeais)
Rectanol
Rectocalm
***Rectoline**
Rectoma
- *Rectopanbiline**
- *Rectopansement-Amibiasine**
Rectoplasme
***Rectoseptol**
***Rectosol**
Rectosote
- Recto-Vaccin Salantale**
Recytile
Redermine-Bœglin
Réfistine
Régulase Efgé
Régulaxane
- Regyl**
Rein - Endocrisines Fournier
***Reinicalcine**
Remède Boss
Renaleptine
- Renalgine**
- Renetol**
***Renion Vincardi**
***Renocardine**
***Rénoline**
- JOURNET, 18-20, rue Vaviu, Paris (VI°).**
BLOCH, à Tomblaine (M.-et-M.)
 50, av. de Normandie, Colombes (Seine).
 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris (XVII°).
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
GUILLAUME, Issoudun.
 98, rue de Sèvres, Paris.
- FLEURY, Arcachon (Gironde).**
 39, rue de Sclessin, Liège.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris.
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris.
M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).
DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 Lab. du Dr Plantier, à Annanay (Ardèche).
- 69, rue de Wattignies, Paris.
MILLET, à Rambouillet.
 154, av. Malakoff, Paris.
M. SOULAS, Surgères (Ch.-I.).
 43, r. de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine).
 42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
Haguenau (Bas-Rhin).
 20, rue du Conseil, Bruxelles.
 40, av. Secrétan, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris, et 8, r. de Hollerich, Luxembourg.
 8, rue Richer, Paris.
- 7, rue Biscornet, Paris.
 191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
PRAX, à Brest (Finistère).
SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
DUVAL, à Falaise.
 14, av. Georges-Clemenceau, Nice.
 Lab. J. PERROCHON, Tours (I.-et-L.).
 7, rue des Petits-Carreux, Paris.

- Renotanic Grémy**
Renovir
Renovol
Renovules
 ***Rénoxyl**
Réparateur Thuau
 ***Résocaïne**
 ***Résyl**

 ***Réthragine**
 ***Rétropituine Carrion**
Retusol

Revitalose

 ***Révulsif Adrian**
 ***Révulsif Boudin**

 ***Révulsif Fisch anc**
Procipha)
Révulsif liquide S R
 ***Révulsif Milko**
Révulsior
 ***Rexacarbine**
 ***Rhagadine Bracque-**
mond
Rhamnausol
Rhamnine Henry
 ***Rhéantine Lumière**
 ***Rhésalgine-Vicario**
Rheumasan
 ***Rhinadorine**
Rhinadrargol
 ***Rhinadrol**

Rhinaldose
Rhinalène

Rhinalginol
 ***Rhinaquintine**
Rhinargol
Rhinaseptogène
 ***Rhinaspir**
Rhine
 ***Rhineupnyl**
Rhinil

 ***Rhino-Amphogel**

 ***Rhino-Antipiol**
 ***Rhino-Colloidol**
 ***Rhino-Borostyrol**
Rhinodol
 ***Rhinodrops**
 ***Rhinofluine**
- 14, rue de Clichy, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 22, rue de Paris, Houilles.
 id.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 103-117, boul. de la Part-Dieu,
 Lyon.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil
 (Seine-et-Oise).
 D^r FRAYSSE, 21, r. de Neuilly,
 Nanterre.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-
 le-Pont (Seine).
 Mer Rouge, Mulhouse (Haut-
 Rhin).
 4, rue Levert, Paris.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 PAULIN & BARRE, Tours.
 G. GAYRAUD, Lavit (T.-et-G.).
 71, av. de Villiers, Paris.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège.
 45, rue Villon, Lyon.
 17, bd Haussmann, Paris.
 11, rue Malher, Paris.
 33, fg Montmartre, Paris.
 56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).
 A. FALVY, 40, rue des Acacias,
 Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 M. RICHARD, Aubenas (Ar-
 dèche).
 LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
 58, rue de Vouillé, Paris.
 71, bd Saint-Michel, Paris.
 PATRICE, à Vichy.
 21, rue de Lyon, Paris.
 FLEURY, Dresles (Oise).
 94, r. de Michelet, Alger.
 Lab. ORGA, Avignon (Vau-
 cluse).
 RONCHÈSE, 21, bd de Riquier,
 Nice.
 8, av. Walkanaer, Nice.
 81-83, rue de Lille, Roubaix.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 50, r. de la République, Puteaux.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 5, r. François-Ponsard, Paris.

Rhinogeraniol	ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois.
Rhinogénol	4, villa Ornano, Paris.
*Rhino Glottyl	DENIS, 20, rue du Laos, Paris.
*Rhinol	80, fg Saint-Denis, Paris.
Rhino-Lactéol du D ^r Boucard	30, rue Singer, Paris.
Rhinolan	24, rue Jardel, Bordeaux.
Rhinolin	82, av. Malakoff, Paris.
*Rhino-Liposeptine	2, pl. des Vosges, Paris.
Rhinolive	19, rue de Pontevès, Marseille.
Rhino-Pro	8, rue Riblette, Paris.
Rhinorcine	133, rue Lecourbe, Paris (XV ^e).
Rhino-Robur	72, av. Thiers, Le Mans.
Rhino-Salas	132, rue de Turenne, Paris.
Rhino-Salva	Lab. Central de France, 10, r. de Belfort, Rennes.
Rhino-Socoll	132, rue de Turenne, Paris.
*Rhino Spécifique Favrot	6, rue Dombasle, Paris.
Rhinostagone	20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Rhinosthénol	7-13, rue Bobillot, St-Maur (Seine).
*Rhino-Sulforgan	SOUFFRICE, 16, r. de Gramont, Paris.
Rhinotherme	Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.).
Rhino-Vaccin Creuzé	74, rue de Lourmel, Paris.
*Rhino-Vaccin Inava	14, rue de Normandie, Asnières.
Rhino - Vaccin Salantale	42, r. Grandes-Arcades, Strasbourg.
*Rhino-Vaclydun	27, rue Desrenaudes, Paris.
*Rhizotanan	56, bd Ornano, Paris.
*Rhocya	39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII ^e).
*Rhodarsan	SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Rhodazil	id.
*Rhodiocarbène	id.
*Rhodoboryl	MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
Rhodocaïne	18, av. Hoche, Paris.
Rhodoquine	SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Rhoféine	id.
Rhomnol Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Rhubarbe comp. de Baudry	8, rue Vivienne, Paris.
Rhumatoidine	29, r. de la Gare, Bondy (Seine).
*Rhumofan	60, r. Nationale, Castelnau-dary.
Ricigel	7, r. L.-Jeannin, La Garenne, Colombes (Seine).
*Ricilax	60, rte de Châtillon, Malakoff (Seine).
Ricinopalmine	5, bd des Brotteaux, Lyon.

- Ricinpoudre**
Ricomalt
Rinoleina
- *Riodine Astier**
- Ripto-Choline**
- *Rob Cabanès**
Rob Dussang
Rob Gory
***Rob Oberlin**
***Robrodyne**
Roburex
***Roche-Posay**
***Rogerma**
Roléine
Romaboldo
***Romarantyl**
***Romarène**
- Romarinex**
Romarol
Romyl
***Rosalyl**
Rosanol
Rosaphédrine
***Rosaseptor**
Rossoline
- Royanol**
- Royérine Dupuy**
Rozoderme
Rubargyre
***Rubiaderm**
***Rubiazol**
***Rubyl**
- *Rutonal**
Rylal Noyon
Rythmos Leisyn
***Rythmosystol**
- Ryvema**
- 15, rue de Naples, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 Lab. SASSE, 78, bd Beaumarchais, Paris.
 42, rue du Docteur-Blanche, Paris.
 Lab. SEDROB, 35, r. Périssé, Toulouse.
 17, rue Cadet, Paris.
 LÉSCAROUX, Châteauroux.
 JOOSS, Montreuil (Seine).
 TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.
 L. ROBERT, Niort (D.-S.).
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 La Roche-Posay (Vienne).
 MAHIEU, Lens (Pas-de-Calais).
 49, r. de Bitche, Courbevoie.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 BEAUFOUR, 18, pl. Dogue
 reau, Dreux (E.-et-L.).
 PHARMA-SPÈS, Lille.
 81, av. Malakoff, Paris.
 11, r. de Rome, Issoudun.
 Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 L. HINGLAIS, à Épernay.
 FARMAN, 19, r. Auber, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.
 5, av. E.-Boissier, Nantes (L.-
 Inférieure).
 Lab. DE L'Océanie, Royan
 (Char.-Infér.).
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 11, r. des Deux-Ponts, Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 id.
 53, rue de Crimée, Paris.
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 COMTE, 60-62, rue Saint-Guil-
 hem, Montpellier.
 8, rue Riblette, Paris (XX^e).

S

- *Saburrase**
 Sacérase
 Sacnel
***Saint-Aré**
***Salantale**
 Salasenyl
 Salbiase
***Salbine du Dr Fayès**
***Salénal Ciba**

***Salène Ciba**
***Salganyl**
***Salibra**

 Salicaïne
***Salicaire Dausse**
 Salicaire Henry
***Salicairine**
 Salicéral Clin
 Salicol Dusaule
***Salicylate Ana**
 Salicylate de soude
 Clin
 Salicylate Le Perdriel
***Salicylna**

***Saliformiode**

 Saliode
 Saliphoryl

 Saliquinol
***Salitropine** Aguetant
 Salmenthyl
***Salsanos**

 Sal-Sodyl
 Salt Pepton
 Salubrine Phénix

 Salubrine Dentaire
***Salvacid**
 Salvandra
 Salvanos
- 30, r. Armand-Silvestre, Courbevoie (Seine).
 20, r. du Pré-St-Gervais, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 Sté des Eaux minérales de Decize (Nièvre).
 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
 132, r. de Turenne, Paris.
 La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).
 3, rue d'Alexandrie, Paris.
 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.
 id.
 2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
 1, rue des Jardins, Asnières (Seine).
 168, bd Saint-Germain, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 39, rue de Sclessin, Liège.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 Lab. du Dr LAVOUE, Rennes. (I.-et-V.).
 57, bd A.-Briand, Champigny (Seine).
 GABAIL, 5, r. Lefebvre, Paris.
 43, r. des Chantiers, Versailles (S.-et-O.).
 14, av. Perrichont, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 4, rue de Metz, Toulouse.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine).
 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 9, av. J.-Jaurès, Lyon.
 MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
 id.
 MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 7, rue Charlot, Paris (III^e).

- Salva-Sérum**
- *Salvatyl**
- *Salvé**
- *Salvebyl**
- *Salvenase Legoux**
- Salvoxyl**
- Salychlore**
- *Salyfrène**
- *Salyptol Narty**
- *Salsysérum**
- *Sambul**
(liquide et comp.)
- Sanatéine**
- *Sanalepsi Russi**
- Sanaigène**
- Sanalia**
- *Sanargol**
- *Sanarteryl**
- *Sanas**
- Sandar**
- *Sandoptal**
- *Sanedrine**
- Sanex Inhalant**
- Sanguifer Bouret**
- *Sanguil**
- Sanquine irradiée**
- Sanguinova**
- Sangule Dubat**
- Sanicérène**
- Sanka**
- *Sanocrysin**
- Sanocure**
- *Sanoformine**
- Sanogène**
- *Sanozyl**
- *Sanogynol**
- Sanomint**
- *Sanoquinol**
- Sanoram**
- OPTIMA, 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.**
- 42, r. Émile-Deschanel, Courbevoie.**
- 45, fg Saint-Denis, Paris.**
- 45, rue du Fg-St-Denis, Paris.**
- 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).**
- 237, rue Lafayette, Paris.**
- 46, rue de Rome, Marseille.**
- 17, av. de la Capelette, Marseille.**
- 134, bd Pereire, Paris.**
- 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison.**
- 22, r. St-Pierre, Evreux (Eure).**
- FOURNIER, 7, rue Biscornet, Paris.**
- 78, bd Beaumarchais, Paris.**
- Lab. SANAL, St-Louis (Haut-Rhin).**
- 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.**
- Lab. BARDOU, 13, quai Robert, Joigny (Yonne).**
- 124, r. St-Dominique, Paris (VII^e).**
- 72, rue du Commerce, Paris.**
- av. de Grasse, Cannes.**
- 20, rue Vernier, Paris.**
- SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.**
- BOISSY, 15, rue de Belgrand, Paris (XX^e).**
- 87, rue Lafayette, Paris.**
- 12, rue Saint-Gilles, Paris.**
- 40, rue des Abbesses, Paris.**
- 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.**
- 80, fg Saint-Denis, Paris.**
- 7, rue de Valois, Paris.**
- 54, quai de Boulogne, Boulogne-sur-Seine.**
- 39, r. Fondaudège, Bordeaux.**
- REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).**
- 41, pl. Victor-Hugo, Paris.**
- REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).**
- 5, rue Paul-Barruel, Paris.**
- 161, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux (Gironde).**
- GROS, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).**
- CIBA, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon.**
- 5, rue Paul-Barruel, Paris.**

Sanos	G. MIQUEL, 3, av. Lowendal, Paris.
Santal Bretonneau	10, pas. Morel, Montrouge.
Santal Clin	20, rue des Bossés-St-Jacques, Paris.
Santal'ex	14, rue Demarquay, Paris.
Santal Henry	36, quai Fulchiron, Lyon.
* Santal Midy	8, rue Vivienne, Paris.
* Santal Monal	13, av. de Ségur, Paris.
Santal Oberlin	17, rue Cadet, Paris.
Santal P. Petit	12, bd Saint-Martin, Paris.
Santal Salolé	37, rue Pajol, Paris.
Santal Salolé Cabanès	17, rue Cadet, Paris.
Santaline Daupez	37, rue des Lois, Toulouse.
Santalol Montagu	49, bd Port-Royal, Paris.
Santéine Montagu	id.
* Santhéose	4, rue du Roi-de-Sicile, Paris.
Santogénol Caubin	62, rue Erlanger, Paris.
Santol Dolmay	71, av. de la République, Champigny (Seine).
* Santonia	139, av. E.-Zola, Paris.
Santuroi	21, rue des Roses, Dijon.
Santyol	Cosson, Romainville (Seine).
* Sanubrol Mars	Guérande (Loire-Inférieure).
Sanuryl	44, r. M.-Sembat, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.).
Sapobarbe	CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
Sapocade	id.
Sapocrème	id.
Sapocridine	15, quai Bourbon, Paris.
Sapogynol	74, rue Blanche, Paris.
* Sapolan	CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
Sapolysine	18, rue Daguerre, Paris.
Sapopâte	CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
* Saporex	184, rte de Genas, Lyon (3 ^e).
* Saposide	CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
* Saproxyl	7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine).
Sarcoglobine	DUCLOY & C ^{ie} , Arques (P.-de-C.).
Sarcolactine	28, bd de la Cluse, Genève.
* Sarcoptol	177, rue de Courcelles, Paris.
Sargéthyle	56, av. Ed.-Vaillant, Boulogne-Billancourt.
* Saridon	HOFFMANN LA ROCHE, 10, rue Crillon, Paris.
Sarkol	à Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).
Satine	7, rue Galvani, Paris.
* Saturalgine	3, bd Beaumarchais, Paris.
Saturaline	80, r. du Fg-St-Denis, Paris.
Saturoi	Laborat. DURET & RÉMY, Asnières.

- *Saubarsinol**
***Saucholine**
 Sauge Gmet
 Savon Aiphème
 Savon Bébia
 Savon dentifrice Vigier
 Savon de Sapolan

Savon Glytra

 Savon Iodé Oberlin
 Savons Benys
 Savons Denisol Brissac
 Savons ichthyol, soufre, etc.
 Savons Mahon
***Savons Mollard**
Savon Neutrèpur

Savon Perusol
***Savons liquides Ramet**

Scatagar
Scialine

Sciaticure
***Scillarène**
Scillase
Scillitensyl

***Scillitrine**

Scléramine Dausse
Sclérobyl
***Sclérolysine**
***Sclérosérol**
***Sclérosérum**
Scléroveine Hardy
Scopolamine Houdé
Scorogènes

***Scurocaïne**

Scuroforme
Sealandair
Séborrhéine
Sécacornine Roche
Seccase
Sécurigène

***Sédacônes**
***Sédacrine**
Sédalgol
Sédangor

***Sédaortine**
- SAUBA, Montreuil (Seine).
 id.
 27, fg Montmartre, Paris.
 MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
 5, av. E.-Boissier, Nantes.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 CAVAILLES, 29, rue Singer, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris (IX^e).
 17, rue Cadet, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 157, rue Championnet, Paris.
 VIGIER, 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris (IX^e).
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 à Fontenay-Mauvoisin, par Mantes (S.-et-O.).
 46, rue de Rome, Marseille.
 P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 121, av. Saint-Ouen, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).
 B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 PERRIER, 17 bis, bd Rochechouart, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 65, av. Victor-Hugo, Paris.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 « ANGLA », Monte-Carlo.
 4, rue de Metz, Toulouse.
 10, rue Crillon, Paris.
 DUBAT, 80, fg St-Denis, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
 SOULAS, Surgères (Ch.-Inf.).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
 72, quai Jemmapes, Paris.

- Sédarsan Optima** Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
***Sédarthryl** 22, rue de Nemours, Paris.
Sédasia DOUETTEAU, 20, rue Fg-St-Honoré, Paris.
Sédasix 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
***Sédasthmine** 3, bd Beaumarchais, Paris.
Sédatif Py 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
Sédatine Christiaens 4, r. Colbert, à Reims.
Sédaton Leo 21, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
Sédatose Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
Sédatuline 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
***Sédatussine** 6, av. V.-Hugo, Paris.
Sédergine Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
***Sedhépatine** 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e).
***Sed'Hormone** 4, place des Vosges, Paris (IV^e).
***Sédibaïne** 20, av. J.-Jaurès, Suresnes (S).
***Sedlitz Ch Chanteaud** 3 et 5, r. Alex-Dumas, Saint-Ouen (Seine).
Sedobore 83, bd de la Villette, Paris.
***Sédobrol Roche** 10, rue Crillon, Paris.
Sédo-Bronchol 2, rue des 3-Mages, Marseille.
Sédocardine Lab. BARRÉ, 7, pl. Péreire, Paris.
Sédoderme FERRAND, Clichy (Seine).
Sédoflorine 24, bd Sébastopol, Paris.
***Sédofolline** 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
Sédoformine 12, rue Pavée, Paris.
***Sédogastrine** ZIZINE, 24, r. de Fécamp, Paris.
Sédogène Sallé 14, rue des Pyramides, Paris.
***Sédogastrol** 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
***Sédo-Gyncestryl** 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
***Sédo - Hypotenseur**
Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
***Sédol Buisson** 98, rue de Sèvres, Paris.
Sédomens 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
Sédomictol 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
***Sédoneurol** 50, rue Nationale, Lille.
Sédontal 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
***Sédopathyl** 62, bd St-Germain, Paris.
***Sédopavérine** 122, fg Saint-Honoré, Paris.
Sédopelvien 196, r. de Paris, Montreuil-s.-Bois.
Sédophoryl 20 bis, rue Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois.
Sédoplasme 276, rue Lecourbe, Paris.
Sédoplexine 31, bd de la Villette, Paris.
***Sédoprostyl** 8, rue Vivienne, Paris (II^e).
Sédopulmine 6, rue Robert-Estienne, Paris.
Sédorectal 31, bd de la Villette, Paris (X^e).
Sédorgine 33, Grande-Rue, Besançon.
***Sédorhinol** 276, r. Lecourbe, Paris.
***Sédormid Roche** 10, rue Crillon, Paris.
***Sédosalyl** 60, route de Châtillon, Malakoff.
***Sédosine** 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.

- *Sédosol
 Sédospasmose
 4, villa Ornano, Paris.
 Lab. DEMASLES, Vienne
 (Isère).
 *Sedotan Fonda
 *Sédotonine
 10, rue d'Amiens, Compiègne.
 13, pl. Delille, Clermont-Fer-
 rand.
 *Sédotylol
 DEBAT, 60, rue de Monceau,
 Paris.
 Sédô Viète
 Sédycal Py
 163, rue de Flandre, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux (Seine).
 *Seignet'fruits
 route du Moulleau, Arcachon
 (Gironde).
 *Seinderm Mars
 Seklé
 Guérande (Loire-Inférieure).
 51, rue Rennequin, Paris.
 Sektal Grémy
 34, rue Sedaine, Paris.
 *Selamon
 10, rue Vignon, Paris.
 Sels Clarks
 16 bis, rue Vivienne, Paris.
 Sel D.
 DUPUY, à Montluçon (Allier).
 *Sels de Bains R. P.
 La Roche-Posay (Vienne).
 *Sel de Hunt
 16, r. Boulainvilliers, Paris.
 *Sel d'Ewald
 BRACQUEMOND, 105, rue de
 Normandie, Courbevoie.
 *Sel digestif Bé Me Cé
 21, rue Violet, Paris.
 *Sélénol
 18, av. Hoche, Paris.
 Sel hépatique U. N.
 à Étampes (Seine-et-Oise).
 Arquevaux
 FAURE, 83, bd de la Villette,
 Paris.
 *Sels Intar
 11, av. de l'Opéra, Paris.
 Sels du Jura
 11, rue Milton, Paris.
 *Sels de lithine effe-
 vescents
 88, rue Duhesme, Paris.
 *Sels Mags
 14, rue Demarquay, Paris.
 Sels Marva
 25, rue Dagorno, Paris.
 Sels Montecatini
 LEURQUIN, 50-52, rue Pierre-
 Legrand, Lille.
 Sels Na 4
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 Sel de Salins-Moutiers
 3, rue de Vouillé, Paris.
 *Selor
 20, pl. de la Nation, Paris.
 Sels radioactifs Ra-
 diana
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 *Selsodion
 1, av. Lowendal, Paris.
 *Selunic
 COUTURIEUX, 18, av. Hoche,
 Paris.
 Selvan
 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
 *Sel Vial
 24, bd des Capucines, Paris.
 Sel Vichy-Etat
 85, rue Turbigo, Paris.
 *Seneçoine
 1, r. Reynouard, Paris.
 Sénophile
 17, rue de Berri, Paris.
 Séotral Leisyn
 1 bis, rue Molitor, Paris.
 Séphydine
 Chabeuil (Drôme).
 *Septazine
 SPÉCIA, 21, rue J.-Goujon,
 Paris.
 *Septicémine Cortial
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 *Septisan
 60, rue Nationale, Castelnau
 (Aude).

- Septocarbine**
Septolan
- Septometrol**
- ***Septoplrix**
Septylase
- Séquardine Bouty**
Sérelbé
- ***Sérénol**
***Séricrine Rey**
- ***Serifer Laurençon**
Seringue (spéciale pour insuline)
Séripol
Sérobél
***Sérobiol**
***Sérocalsine**
- Sérocampbre**
Sérocabone
Séro-Citral
Séro-Collosol
***Séro-Comprimés I. M.**
***Serodausse antitoxi-senyl**
Séroferrine
***Séroglobine**
- Sérogyne**
***Sérolactyl I. M.**
Séroléine
- ***Séro-liquide**
***Séroma Rey**
***Séro-Neuropsychique**
Séroquinol
- Séro-Sérum Rivier**
- Serosine Boullé**
- Sérosthényl Bouty**
***Séro-Vaccin Antipyogène**
Séroxamine
***Séroxéma**
- Serpoline**
- ***Sérum antiasthmaticque de Heckel**
Sérum antiphymique Vadam
- 4, rue Major, Pamiers.
LAFFORT, Joué - lès - Tours (Indre-et-Loire).
41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
BRISSON & C^{ie}, 157, r. Champignonnet, Paris.
3, r. de Dunkerque, Paris.
L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.
25, rue Jasmin, Paris.
12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).
Villefranche-sur-Saône (Rhône).
149, r. du Palais-Gallien, Bordeaux.
21, rue de Neuilly, Nanterre.
L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.
191, fg Saint-Antoine, Paris.
Lab. Lorrain de produits purs, Étain (Meuse).
G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
72, rue Saint-Dominique, Paris.
37, rue de Bourgogne, Paris.
116, bd Haussmann, Paris.
18, Cours Suchet, Lyon.
- 4, rue Aubriot, Paris.
52, rue La Bruyère, Paris.
Lab. **AUBERY**, Avignon (Vaucluse).
L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.
18, Cours Suchet, Lyon.
C. **BARON**, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
18, Cours Suchet, Lyon.
12, rue Montmartre, Dijon.
191, fg St-Antoine, Paris.
15, rue des Champs, Asnières (Seine).
10, Passage Morel, Montrouge (Seine).
19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
3, rue de Dunkerque, Paris.
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
62, r. Gioffrédo, Nice.
1, rue de Phalsbourg, Paris (XVII^e).
OPTIMA, 78, Gdc-Rue-au-Bois, Bruxelles.
CORBIÈRE, 27, rue Desre-naudes, Paris.
(Voir *Antiphymique*.)

- *Sérum antityphoïdique de Rodet
 Sérum Collyre
 Sérum Hépatolactique
 *Sérum de Jousset
 Sérum maternel
 Sérum Névrosthénique Fraisse
 Sérum Nevrotone
 *Sérum Oliviero
 *Sérums Clin
 *Sérums Pasteur
 Sérum polymicrobien
 *Sérum Polyvalent de Leclainche et Vallée
 Sérum sthénique
 *Sérum végétal
 *Servo-Freinyll
 *Séti
 Setirtem
 Sféol
 S. I. A. V.
 Siccogyne
 Siccol
 *Sicovaire
 Sicridine
 *Sidéranyl
 Sidérarsan
 Siforcias
 Sigbi
 Sigma-Sérum
 Sigmoidine Grémy
 Sigmotal
 Sigol
 *Silguine
 Silicate de soude
 Pellissier
 *Silicyl
- Lab. AGUETTANT, 36, q. Fulchiron, Lyon.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Lab. V. B., Les Bourdons, Nevers.
 BRUNEAU, 17, rue de Berri, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue au Bois, Bruxelles.
 8, rue Jasmin, Paris.
 P. C. B., 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
 Boulogne-sur-Seine.
 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
 Institut PASTEUR, 22, r. Dutot, Paris.
 ADLER, 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).
 OPTIMA, 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 D^r CUGUILLÈRE, 19, rue des Chalets, à Toulouse.
 52, rue de Cambrai, Lille (Nord).
 BRISSON, 157, r. Championnet, Paris.
 8, rue Passy, Paris.
 115, rue Catulienne, St-Denis (Seine).
 8, av. des Sources, Nice.
 J. MIDY, 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 5, rue Robert-Planquette, Paris.
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
 13, rue Beudant, Paris (XVII^e).
 LABIOLA, 52, rue de Cambrai, Lille.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 163, rue de Flandre, Paris.
 DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 132, rue de Turenne, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 5, rue de Stockholm, Paris.
 à Saint-Fons (Rhône).
 115, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine.
 33, av. de Villiers, Paris.
 18, rue Ernest-Rousselle, Paris.

- *Siligone** E. BACHELARD, Chalette (Loiret).
- *Siliplastine** DEBAT, 60, rue de Monceau, Paris.
- *Silisode** MICHEL, 4 bis, r. du Colonel-Moll, Paris (XVII^e).
15, rue d'Argenteuil, Paris.
- *Sinahin** 13, rue Pavée, Paris.
- *Sinapisme Rigollet** FAURE & DUSSUEL, à Aix-les-Bains.
- *Sinaplasme** Lab. DEODAX, R. Renaud, Anould (Vosges).
142, r. Fransman, Bruxelles.
- *Sinapol** 197, av. de Versailles, Paris.
44, av. Pasteur, Courbevoie (Seine).
50, rue Nationale, Lille.
- Sinaqua Nutricia** CHATEAU, 33, rue du Bois, Vincennes.
- Sinaseptic** 34, rue Sedaine, Paris.
- Sinesol** 228, rue de Paris, Montreuil-sous-Bois.
- Sinrénaline** 98, rue de Sèvres, Paris.
- *Sinusyl** 6, rue Dombasle, Paris.
- *Siphuryl** 64, rue La Rochefoucauld, Paris.
- Sirodion** COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Sirop d'Aconit Ecalte** 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- Sirop antiasthmatique Favrot** AXAREL, 15, rue Catulienne Saint-Denis.
- Sirop antiphlogistique de Briant** BRICHARD, Bar-le-Duc.
- Sirop d'Aubergier** 171, rue de Belleville, Paris.
- *Sirop au Solucamphre** THÉVENOT, rue des Roses, Dijon.
- Sirop Axaria** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Sirop Bala** 85, r. Turbigo, Paris.
- Sirop béchique Maire** 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
- Sirop Belca** 6, rue Dombasle, Paris.
- *Sirop Berthe** 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
- Sirop Blagny** 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
- Sirop de Blancard** 131, rue Vaugirard, Paris.
- Sirop Blotière** Labor. BERTHIER, Grenoble.
- Sirop Bolla** MONTAGU, 49, bd Port-Royal, Paris.
- *Sirop Brahma** 39, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
- Sirop Briant** 6, rue Berbizey, Dijon.
- Sirop Britannia** 65, cours National, Saintes.
- Sirop de Broméine** COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Sirop bromoformique Henry** 145, chem. de la Madrague-de-Montredon, Marseille.
- Sirop Bronchophilos** 87 rue Lafayette Paris.
- Sirop Brumauld**
- Sirop Buci**
- Sirop Burgical**
- Sirop carbolique du D^r Vialle**

***Sirop du Dr Canac**
Sirop Carpeau

***Sirop Cassibor**
Sirop Chauvin à
l'Adréno-Ephédrine
Sirop Chevassus
Sirop composé aux Hy-
pophosphites Fellows

***Sirop Cophed**

***Sirop de Créosote Va-**
cheron

Sirop Debar

Sirop de Dentition Al-
demi

Sirop Delabarre

Sirop de Raifort iodé
de Grimault

Sirop Derbecq

Sirop de digitale

Sirop Deroux

Sirop d'hypophosphite
de chaux de Grimault

Sirop Diver

***Sirop Dubois au Créo-**
sal

Sirop du Dr Dubreuil

Sirop Ducode

Sirop Dr Dusourd

***Sirop Efryl**

Siropeco

Sirop Escolle

***Sirop Eucalyptine**

Sirop Famel

Sirop de Fenouil

Sirop Ferret

Sirop ferrug. Laroze

Sirop Flamand

Sirop France

Sirop C. Frany

Sirop Gabi

***Sirop de Gafarsol**

Sirop Gécé

***Sirop Gelineau**

Sirop Gelvart

***Sirop Géraudel**

Sirop de Gibert

Sirop Gigon

Port-de-Bouc, près Marseille.

102, av. Camille-Pelletan, Mar-

seille.

78, fg Saint-Denis, Paris.

Aubenas (Ardèche).

6, rue Berbissey, Dijon.

7, r. L.-Jeannin, La Garenne-

Colombes (Seine).

Voir *Cophed*.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

BRICHARD, Bar-le-Duc.

15, rue Catulienne, Saint-Denis

(Seine).

78, faub. Saint-Denis, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

12, rue Cadet, Paris.

LABELONYE, 99, r. d'Aboukir,

Paris.

Vic-sur-Aisne (Oise).

8, rue Vivienne, Paris.

50, r. de la République, Puteaux.

51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

37, rue Galilée, Paris.

P. ROCHE, Aigueperse (P.

de-Dôme).

8, rue Vivienne, Paris.

98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).

Lab. DES VOSGES, La Broque

(Bas-Rhin).

pl. Forbin, Aix (B.-du-R.).

155, bd Magenta, Paris.

16 à 22, r. des Orteaux, Paris.

21, rue de la Gare, La Broque

(Bas-Rhin).

LE CHAPELAIN, Lambezellec

(Finistère).

2, rue des Lions, Paris.

6, pl. Clichy, Paris.

23, rue Beautreillis, Paris.

52, av. de la République, Paris.

AXAREL, 15, rue Catulienne,

Saint-Denis.

BOUTY, 3, rue de Dunkerque,

Paris.

132, rue de Turenne, Paris.

MOUSNIER, 28, r. Velpeau,

Antony (Seine).

24, rue Bagnolet, Paris.

3, rue Watteau, Courbevoie.

35, av. de Poissy, Maisons-Laf-

fitte (Seine-et-Oise).

25, bd Beaumarchais, Paris.

- *Sirop Girard
 *Sirop de glycérophosphates Vacheron
 *Sirop Gribell
 Sirop du D^r Hecquet
 Sirop Helgé
 Sirop d'Hémoglobine Byla
 Sirop d'Hémoglobine Grimault
 Sirop d'Hémoglobine Star
 Sirops Henry
 *Sirops Henry Mure
 *Sirop Hercell

 Sirop Hinglais
 Sirop d'Hypophosph. de chaux
 Sirop I. A. M.
 Sirop d'Iodéine
 Sirop Iodermol Vigier
 Sirop Iodocalcium

 Sirop-Iodo-noyer

 Sirop iodotannique Guillermonet
 Sirop Jackson
 Sirop Jane
 Sirop Jolivet
 Sirop Jovin
 Sirop Kérída
 Sirop de Kola Henry

 Sirop Koff
 Sirop Kopé

 Sirop de la Bonne Mère
 Sirop Lagasse
 Sirop de Lamouroux
 [Sirop Lanchat

 Sirop Larphaud

 Sirop Laurin
 Sirop Lauzi
 *Sirop laxatif Gobey
 *Sirop Lecœur
 Sirop Lex

 *Sirop de Lovel
 Sirop Magali
 Sirop du D^r Manceau
 *Sirop de la Maternité
 Sirop Mauchant
 Sirop Mignard
- 48, rue d'Alésia, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 19, rue Drouot, Paris (IX^e).
 49, bd Port-Royal, Paris.
 D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 26, av. Observatoire, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 7, r. Charlot, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
 G. MAHÉ, 85, rue de Trignac, St-Nazaire-Penhoët (L.-Inf.).
 Épernay (Marne).
 8, rue Vivienne, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 49, bd Port-Royal, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 64, rue La Rochefoucauld, Paris.
 Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 140, fg Saint-Honoré, Paris.
 172, rue d'Alésia, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 39, rue de Sclessin, Liège (Belgique).
 BÉDEIL, Lavelanet (Ariège).
 4, rue Alexandre-III, Dunkerque.
 GAVIN, Vimoutiers (Orne).
 8, rue Vivienne, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 Lab. COMTOS, à Fesch-le-Châtel (Doubs).
 12-14, rue Féry, Reims (Marne).
 86, bd Port-Royal, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 GAVIN, Vimoutiers (Orne).
 MARTINET, 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 43, av. Kléber, Paris.
 à Château-du-Loir (Sarthe).
 7, rue Galvani, Paris.
 Gennevilliers (Seine).
 29, bd Sébastopol, Paris.

- Sirop de Mimotannin**
Iodo-phosphaté
 ***Sirop minéral sulf.**
Crosnier
 ***Sirop Mireille**
 ***Sirop Morlas**
Sirop Mory
Sirop Myrianis
Sirop Négri
Sirop Névra
Sirop au Nitrite de
soude Roussel
 ***Sirop Noguès**
Sirop Nourry
 ***Sirop de Papaine**
Sirop Patrat
Sirop Pectiline
Sirop pectoral Ber-
trand
Sirop pectoral du D^r
Pyot
 ***Sirop pectoral Gobey**
Sirop pectoral Laen-
ne
Sirop phéniqué Vial
 ***Sirop Poléry**
Sirop Polybromuré
Laroze
Sirop polyiodure Gon-
non
 ***Sirop Prega**
Sirop Pulmophile
Sirop Rabuteau
Sirop Rambaud
 ***Sirop Rami**
Sirop Ramos
Sirop Rébillion
Sirop du D^r Reinwillier
Sirop Rhégia
 ***Sirop Robin**
 ***Sirop Roche au thiocol**
 ***Sirop Sédatif Neuro-**
calcium
Sirop Sédatif Gobey
Sirop Sentini
Sirop de Sirtal
Sirop de Sozopectone
éphédriné
- 3, rue Bab-Azoun, Alger.
 44, rue de Lagny, Montreuil.
 Lab. LEGENDRE & C^{ie}, Sec-
 tion DS, Houilles (S.-et-O.).
 Passage des Princes, Paris (II^e).
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 AXAREL, 15, rue Catulienne,
 Saint-Denis.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 FAURE, 83, bd de la Villette,
 Paris.
 10, rue Washington, Paris.
 7, rue Galvani, Paris.
 20, r. des Fossés-Saint-Jacques,
 Paris. (Voir *Vin Nourry*).
 (Voir *Papaine*).
 61, rue de Seine, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 Nomexy (Vosges).
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, à Salon
 de-Provence.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 8, rue Vivienne, Paris.
 J. FRÉCHIN, Lure (Haute-
 Saône).
 2, rue des Lions, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 (Voir *Capsules Préga*).
 Pl. Forbin, Aix-en-Provence.
 COMAR, 20, rue des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 E. POINSIER, 20, rue Beau-
 bourg, Paris (IV^e).
 44, r. Chaptal, Levallois-Perret.
 7, rue Capeyron, Bordeaux.
 6, rue Pas-de-la-Mule, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 145, chem. de la Madrague-de-
 Montredon, Marseille.
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 10, rue Crillon, Paris.
 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).

- Sirop de Sulfogaiacolate de Potasse du D^r Henry**
- *Sirop Teyssedre**
- Sirop Thomas**
- *Sirop Tinardon**
- *Sirop Tonique Vial**
- Sirop tribromure Gignon**
- *Sirop Vacheron au gaiacol**
- Sirop Vauthier Marcq**
- Sirop vermifuge Rémonia**
- Sirop Viano**
- Sirop Viette**
- Sirop Zemmette**
- Sirtal**
- Sistobyl**
- *Sistomensine Ciba**
- S. I. V. A.**
- *Sodamine**
- Sodamyl**
- *Sodergyl**
- *Soderséine**
- *Sodésyl**
- Sodisalyne**
- Sodocalcine**
- Sodogastrol**
- *Sodolactine**
- Sodorose**
- Sodotétrane**
- *Sodothiol**
- Softol**
- *Soja « Soyolk »**
- Solacitrine**
- Solargol**
- Sol-Bi-Fraise**
- *Solhermol « Mètère »**
- Solicide**
- Solmuth**
- Solubaine Nativelle**
- *Solubéol**
- *Solucalcine**
- M. H. PRUVOST, Houplines (Nord).**
- 74, fg d'Angoulême, Limoges.**
- 2, rue Volney, Paris.**
- 17, rue Cadet, Paris.**
- 36, place Bellecour, Lyon.**
- 25, bd Beaumarchais, Paris.**
- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.**
- 98, rue du Chemin-Vert, Paris.**
- AXAREL, 15, rue Catulienne, Saint-Denis.**
- 15, r. Catulienne, St-Denis, Seine.**
- 163, rue de Flandre, Paris.**
- 85, rue Turbigo, Paris.**
- COMAR & C^{ie}, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.**
- DELAUNAY, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).**
- 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.**
- Labor. Immunos, av. des Sources, Nice.**
- COUSSINET, 20, rue des Martyrs, Paris.**
- LEGRAS, à Avranches (Manche).**
- A. MIRONNEAU, Pharm., Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).**
- 18, rue de Beaune, Paris.**
- Vierzon (Cher).**
- PILLET, 5, av. Victoria, Paris.**
- 27, r. des Batignolles, Paris.**
- 85, cours Alb.-Thomas, Lyon.**
- Lab. GERDA, 163, bd Croix-Rousse, Lyon.**
- Labor. Hyg. Appliquée, 64, bd Voltaire, Paris.**
- 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).**
- Labor. de Médecine Expérimentale, Beauvais.**
- 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.**
- 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).**
- 49, rue Maleret, Bordeaux.**
- 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.**
- 8, rue Jasmin, Paris.**
- 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.**
- 94, rue Michelet, Alger.**
- 14, r. A.-Briand, Levallois (Seine).**
- 27, rue de la Procession, Paris.**
- L. CHAUVIN, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).**
- D^r COIRRE, 5, bd Montparnasse, Paris.**

- *Solucamphre Dela- 16, rue Henri-Regnault, Cour
 lande bevoie.
 *Solucamphre spartéi- id.
 né Delalande
 [Soludex
 *Soluprotine Roche
 Solurase
 Solurol
 *Soluseptazine
 *Solusoufre Labocip
 [Solute Gaube du Gars
 Soluthanol
 Solution de Bi-phos-
 phate de chaux
 Solutions Clin
 Solution Coirre
 Solution Cunaud
 *Solution du D^r Jacobson
 Solution Fumouze
 [Solutions Mercurielles
 du D^r Lafay
 Solution Henry Mure
 *Solution huileuse au
 Nestosyl
 Solution Laroyenne
 *Solutions Normet
 *Solution Pautauberge
 *Solution Quinquina
 Bardet
 Solution salicylate
 Henry
 Solution Schoum
 Solution Talon
 *Solution Tisch
 Solution Valens
 *Solution Watelet
 [Solutol
 *Solvant Ana
 Solvochine
 *Solvosclérose
 Solvurène
 *Solvuric
 Somalguine
 Somnalone
 *Somnicônes
 *Somnifène Roche
 Somnitis
- R. PIONNEAU, Vayres (Gi-
 ronde).
 10, rue Crillon, Paris.
 71, r. du Fort, Aubervilliers.
 COMAR, 20, rue des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 82, avenue de Suffren, Paris.
 177, r. de Courcelles, Paris
 (XV^e).
 22, rue de Turin, Paris.
 ARSAC, Montélimar (Drôme).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 pl. du Marché, La Rochelle
 (Ch.-Inf.).
 CARRION, 54, fg Saint-Honoré,
 Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 54, Chaussée-d'Antin et 69, rue
 de Provence, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 72, rue St-Dominique, Paris.
 7, bd Denain, Paris.
 10, rue Vignon, Paris.
 10, r. de Constantinople, Paris.
 76, rue de Sèvres, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 13 et 15, r. de la Sablière,
 Bécon-les-Bruyères (Seine).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 52, rue Decamps, Paris.
 BLANCHOT, 15, av. du Parc-
 Montsouris, Paris.
 M. LOISEAU, 22, fg Saint-
 Michel, Angers.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
 201, fg Saint-Denis, Paris.
 Place Forbin, Aix-en-Provence.
 MAUCHANT, Gennevilliers
 (Seine).
 24, rue de Montessuy, Paris.
 D'ÉLIOT, Dinard (I.-et-V.).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 LYONS, 30, rue Monge, Paris.

- Somnobrol**
Somnopol
***Somnothyrl**
***Sonagar**
***Sonamel**
***Sonène**
***Soneryl**

Sonomalt
***Soporalose**

***Soporigène**
Soporiné

Sorbocalcion
Sornyal
Sorol Churchill
Soufre organique injectable
Source Marie-Christine
***Sous-Nitrate de Bismuth Tulasne pur**
***Soutensa**
Sparablanc
Sparaplast Fournier
***Spartédrine**
***Spartéine Houdé**
***Sparto-Camphre**

***Spartophédrine Béral**
Spartoval

*** Spasa**

Spasalgique
***Spasédol**
***Spasmacol**

Spasma Couturieux
***Spasmalgine Roche**
***Spasmalone**
***Spasmine Jolly**
***Spasmocalcyl**
Spasmo-florine
Spasmoiyse
***Spasmonal**

***Spasmoneural**
***Spasmoryl**
***Spasmosédine**
Spasneuro
Spécific Brachat

***Spécifique Bejean**
- 50, rue de l'Université, Liège.
 80, rue du Rocher, Paris.
 CANTIN, Palaiseau (S.-et-O.).
 20, bd Heurteloup, Tours.
 id.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 SPECIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 128, rue du Mont-Cenis, Paris.
 POINTET & GIRARD, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 BADEL, 58-60, rue des Moulins, Valence.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 12, rue Castiglione, Paris.
 INAVA, 14, rue de Normandie, Asnières (Seine).

 Le Breuli-sur-Couze (P.-de-D.).

 48, bd des Batignolles, Paris.
 6 bis, rue Belloni, Paris (XV^e).
 SAUTER, à Bellegarde (Ain).
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 Lab. SAUBA, Montreuil (Seine).
 9, rue Dieu, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 PROBIOS, 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 Alexandre, 41, r. de Rome, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 d'Héliot, Dinard (I.-et-V.).
 1, rue Christine, Paris.
 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
 38, rue du Louvre, Paris.
 24, av. de Châtillon, Paris.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 239, cours de l'Yser, Bordeaux.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 15, bd Pasteur, Paris.
 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 Lab. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).
 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

- *Spécifique Lancelot** 100 *ter*, av. Saint-Mandé, Paris.
Spécifique Rousset 9, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
Spécifique Thorat Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).
***Spectrol** 9, rue Paul Baudry, Paris.
Sphérulines - Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
(Voir Opothérapie.)
Sphygmine 109, rue de Sèvres, Paris.
Spicanol 54, rue de Sablonville, Neuilly-sur-Seine.

Spirobismol 4, rue d'Ilzach, Mulhouse.
***Spirochtan** 22, rue de la Sorbonne, Paris.
***Spirogyl** 5, rue Paul-Barruel, Paris.
Splénarmone BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.

***Splénique (Extrait du D^r Bayle)** 8 et 10, rue Alphonse-Bertillon, Paris.
Splénocarbine 88, rue Duhesme, Paris.
Splénocrinol Lab. ISCOVESCO, 107, rue des Dames, Paris.

***Splénocrisines** 7, rue Biscornet, Paris.
Splénodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
***Splénogastrine** 14, rue des Minimes, Paris.
Spléno-Magnésium 83, bd de la Villette, Paris.
***Splénomanganol** 191, fg Saint-Antoine, Paris.
***Splénomédulla** Lab. CHAIX, 8 et 10, rue Alph.-Bertillon, Paris (V^e).

Splénose 163, rue de Flandre, Paris.
Splenotanic GREMY, 14, rue Clichy, Paris.

***Splenyl** BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.

***Spyrolides** 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Sripsol 5, rue Ambroise-Thomas, Paris.
Stabilisine SALESSE, Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze).

Stabylacto Chatelain place des Halles, Niort (Deux-Sèvres).

Stabyne REBOUL, 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).

***Stadrhine (ex-Stovoléine)** 26, rue des Moines, Paris.
***Stal-Kosal** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.

***Stalysine** 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
***Stanion** 18, av. Hoche, Paris.
***Stanno-Bardane Henry** 39, rue Sclessin, Liège.
Stannolip Henry id.
***Stanno-Sufrol Crosnier** 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
***Stannoxyl** 37, rue de Bourgogne, Paris.
Staphydex WARIN, 4, ch. de La Muette, Paris.

***Staphylagone** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
***Staphylase du D^r Doyen** LEBEAULT, BESSIN ET C^{ie}, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.

- Staphylocide Audras** 112, rue de Gerland, Lyon.
- ***Staphylo-coccine Fraquet** 21, rue Chaptal, Paris.
- Staphylophage** 10, rue Vignon, Paris.
- Staphylopiast** FOURNIER, Dijon.
- ***Staphylostanol** 22, rue de Turin, Paris.
- ***Staphylo-Vaclydun** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- ***Staprolysat** 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- Staréol Dupraz** 41, rue Etienne-Marcel, Paris.
- ***Stavafer** 45, fg Saint-Denis, Paris.
- ***Stéarol** M. Bonnet, Saint-Etienne.
- Stechlovules** 58, rue de Maubeuge, Paris.
- Sténergine** 4, pl. des Vosges, Paris.
- ***Sténic** A. COUSIN, Pharm., Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise).
- Sténofér Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
- Sténogénine** MOUFLET, Chennebrun (Eure):
- Sténol Chanteaud** 3 et 5, rue Alex.-Dumas, Saint-Ouen (Seine).
- Stenon du Dr Gelm** Dr LALAUERIE, Cuxac-d'Aude.
- Sténophyl Vigan** 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- Sténovarine** 132, rue de Turenne, Paris.
- Stéracholine** DELAUNAY, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
- ***Stéramine** 42, rue Thiers, Le Havre.
- ***Stérandryl** 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e).
- Stérarsinol** DELAUNAY, Joué-les-Tours (I.-et-L.).
- Stérasmine** id.
- Stérédrine** id.
- Stéridrophil Wuhrlin** à Houdouville (Eure).
- ***Stérigyne** Voir *Ovules stérigyne*.
- Stérinait** 10, rue Cardinal-Mercier, Paris.
- Stérinase Vincent** 14, av. Mac-Mahon, Paris.
- Sternol** 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise).
- Stérocaltium** 132, rue de Turenne, Paris.
- ***Stérogyl** Lab. du Dr ROUSSEL, 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- ***Sténobiose** G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- Sténophos** 74, rue Lourmel, Paris.
- Sthénoléine** 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
- ***Sthénoxal** 47, rue Bokanowski, Asnières.
- Stibial** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- ***Stillargol** 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- Stilplast** 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
- ***Stimulaxine** E. BARTIER, Armentières (Nord).
- Stimyl** FALQUE, Besançon.
- ***Stinergyx** 52, rue de Cambrai, Lille (Nord).
- Stock-Vaccin Bovy-**
- Cantonnet**
- Stomachine** 10, rue Drouot, Paris.
- OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois**
Bruxelles.

- Stomacol Boulet** 14, rue Eugène-Delacroix, Paris.
- Stomacurine** 21, rue de Neuilly, Nanterre.
- *Stomagyl** 143, c. de la Somme, Bordeaux.
- Stomal** Lab. PY, 58, bd R.-Wallace, à Puteaux (Seine).
- Stomalex** 14, rue Demarquay, Paris.
- Stomalise** BEDEIL, Lavelanet (Ariège).
- Stomalumine** 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
- *Stomarol** ROLLAND, 4, rue Platon, Paris.
- Stomasalvine** Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Stomasédine** FLAMAND, 48, r. de Flandre, Le Bourget (Seine).
- Stoméol** 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.).
- *Stomobrol** Place Carnot, Romainville.
- Stomolan** 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (Seine-et-Oise).
- Stomophile** 17 bis, av. Parmentier, Paris.
- *Stomoxygène** 2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, à Saint-Quentin.
- Stomytéol** VIGNAL, Périgueux.
- *Stopral** 47, rue Bokanowski, Asnières.
- Stosédol** 23, rue de Douai, Lille (Nord).
- Stovaine Billon** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Stovarsol** id.
- *Stovédrine** LICARDY, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine.
- *Stovoléine** Voir Stadrhine.
- Stovoquine** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Stragol Merlet** 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- *Streptoderme** 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
- Strepto-Vaclydun** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- *Strictargol** COUSSINET, 20, rue des Martyrs, Paris.
- *Strictoforme Dausse** 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- *Strongenol** 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- Stronium Paraf-Javal** 8, rue Vivienne, Paris.
- Strophantal** 62, rue Marengo, Saint-Étienne.
- *Strophantine et Strophantus Catillon** 3, bd Saint-Martin, Paris.
- *Stry-Calcium Aguet-tant** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- *Strychnal Longuet** 34, rue Sedaine, Paris.
- Strychnan** 10, r. de Strasbourg, Paris.
- *Strychnarsitol Robin** 18, rue de Poissy, Paris.
- Strychno-Cacodyl** 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
- *Strychnophyl** 74, rue Lourmel, Paris.
- *Strychnotonine** 25, bd de La Tour-Maubourg, Paris.
- *Stupho** 38, rue Mainguy, Bondy (Seine).

- Succharure Leprince** 62, rue de la Tour, Paris.
Succomusculine 8-10, r. Alp.-Bertillon, Paris.
Suc-Durham MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).
Suckine 12, av. Stéphane-Mallarmé, Paris.
***Sucre Edulcor Ferré** 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
***Sucs organiques Bazin** Voir *Opothérapie Bazin*.
***Sucre « Vita D »** 40, rue François-I^{er}, Paris (VIII).
Suc Simon Chalon-sur-Saône.
Sudyl Roberts 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
***Sufrolax** 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
***Sufrol Crosnier** id.
***Suiseryl** 97, rue de Vaugirard, Paris.
Sulcichlorine 49, rue Malerei, Bordeaux.
Sulta ampoules Sté PYRNE, Caunterets (Hautes-Pyrénées).
***Sulfan** DALAYEUN, Sannois (S.-et-O.).
Sulfarène (Lab. du), à Agen.
***Sulfarsénol** 19-21, rue Van-Loo, Paris.
Sulfarsinol Lefèvre 52, rue Decamps, Paris.
***Sulfarsiode** 11, quai St-Clair, Lyon.
Sulfate d'Atropine Clin 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
Sulfate de quinine Léo 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
***Sulfex** 13, rue du D^r-Mazet, Grenoble.
***Sulphydral Ch. Chanteaud** 3 et 5, rue Alexandre-Dumas, Saint-Ouen (Seine).
Sulfinhal 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
Sulfo-benzol 239, fg Saint-Honoré, Paris.
***Sulfobiol Aguetant** 36, quai Fulchiron, Lyon.
***Sulfo-Bore Roy** 81, bd Suchet, Paris.
***Sulfobyl** 3-5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen (Seine).
Sulfocadol 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie.
***Sulfocaïne Fayès** 3, rue d'Alexandrie, Paris.
Sulfocol M. Godart, Andenne (Belgique).
***Sulfocrème Lilless** FISCH & C^{ie}, Mer Rouge, Mulhouse.
***Sulfodermol** FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
***Sulfoïdol Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
***Sulfolax** COUSSINET, 20, rue des Martyrs, Paris.
Sulfol Charlard 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Sulfoléine Rozet à Vendôme (Loir-et-Cher).
***Sulfolive** 19, rue de Pontevès, Marseille.
Sulfo-Mésarca Roche 10, rue Crillon, Paris.
Sulfo-Perless 26, rue Friant, Paris.
Sulforéon 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
***Sulforgan** 16, rue de Gramont, Paris (II^e).

- *Sulfo-rhinol** Fayès
***Sulfosalyl**
***Sulfosine** Léo
Sulfostan
Sulfoterpine
Sulfoterpinol
***Sulfo-Thiorine**
***Sulfoxal**
***Sulfoxyl**
Sulfoxyne
***Sulfur concentré** Dax
***Sulfureux** Pouillet
***Sulfurine du Dr Lan-**
glebert
***Sulfurion**
***Sulturyl** Monal
***Sulf-Y**
Sulhyp
Sulphnaqua Pépin
Sulphénine Trouette
Sulphium
***Sulsod**
***Sunalcol**
Suniforme
***Sunoxol**
Super-digestif
Supernucléine Legrand
Superol
***Supparyres du Dr**
Faucher
Supparsol
***Suppoalgos** Lagoutte
Suppo-Anestaline
Suppo Bil Olive
***Suppocamphryl**
Suppo-Culvrai
***Suppoglandines**
***Suppo-Gynals**
Suppo-Kélédol
***Suppolive**
***Supponéryl**
***Suppopirine** Séclo
***Suppopulmos**
***Suppoquino**
***Suppo-Sédol**
***Suppositoires** Almine
Louveau
***Suppositoires** Amibia-
sine
- 3, rue d'Alexandrie, Paris.
 Lab. SAREIN, 14, av. Perri-
 chont, Paris (XVI^e).
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 CAVAILLES, 29, r. Singer, Paris.
 B.-F. DELAUNAY, Joué-lès-
 Tours (I.-et-L.).
 Lab. CHENU, Montferrand (P.-
 de-Dôme).
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 48, rue Claude-Lorrain, Lille.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 43, rue Lamitte, Paris.
 MORELLET, à Bagnoles-de-
 l'Orne.
 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris.
 SALAVERT, Sainte-Foy-la-
 Grande (Gironde).
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 116, bd Haussmann, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 BRISSON, 157, rue Champion-
 net, Paris.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 145, bd Haussmann, Paris.
 11, rue de la Station, Asnières.
 145, bd Haussmann, Paris.
 96, rue Monge, Dijon.
 id.
 5, r. Newton, Paris.
 34, bd de Clichy, Paris
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 19, rue de Pontevès, Marseille.
 85, cours Al. Thomas, Lyon.
 MATRAY, Aubières Puy-de-D.).
 84, rue Rochechouart, Paris.
 127, bd Saint-Michel, Paris.
 D. RAQUET, 114, rue Solfé-
 rino, Lille.
 19, rue de Pontevès, Marseille.
 98, rue de Sèvres, Paris
 6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie
 (Seine).
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 3, pl. Thiers, Le Raincy (S.-et-O.).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 78, bd des Batignolles, Paris.
 69, r. de Wattignies, Paris.

- Suppositoires Anucalm** 21, rue de Lyon, Paris.
Suppositoires Anugéol BOEGLIN, 26, r. Sainte-Claire. Mulhouse.
- ***Suppositoires au Nestosyl** 72, rue Saint-Dominique, Paris.
Suppositoires Bébïa 5, av. E.-Boissier, Nantes.
Suppositoires Cabanès 17, rue Cadet, Paris.
- ***Suppositoires Calmo-pelvine** 192-194, r. St-Denis, Paris (II^e)
Suppositoires Calmo-varine id.
Suppositoires Chau-mel 78, fg Saint-Denis, Paris.
Suppositoires Collu-drol ANDRÉ, rue des Étuves, Mont-pellier.
- ***Suppositoires Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris.
Suppositoires Éon 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- ***Suppositoires Eucalyp-tine** 155, bd Magenta, Paris.
Suppositoires Gonnon 14, rue Victor-Hugo. Lyon.
Suppositoires Hymel. DÜTEIL, 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
 (Voir *Pommade Inséva*.)
- ***Suppositoires Inséva** 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
Suppositoires Lagoutte
Suppositoires Lama-line AFFRE, Saint-Mandé (Seine).
Suppositoires Logeais 22 bis et 24, rue de Silly, Bou-logne-sur-Seine.
- Suppositoires Mercu-riels du D^r Lafay** 54, Chaussée-d'Antin et 69, rue de Provence, Paris.
Suppositoires Mictasol 155, bd Magenta, Paris.
Suppositoires Midy 67, av. de Wagram, Paris.
Suppositoires Pachaut 130, bd Haussmann, Paris.
- ***Suppositoires Pautau-berge (Adultes et enfants)** 10, rue de Constantinople, Paris.
Suppositoires Pepet 56, bd Pereire, Paris.
Suppositoires Pyrax Lab. Chavialle, 70, Grande-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
- Suppositoires Reys** 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
Suppositoires Rocav 116, bd Haussmann, Paris.
Suppositoires Royer 223, rue Saint-Martin, Paris.
Suppositoires Sféat 15, rue Catulienne, Saint-Denis.
***Suppothemos** 85, Cours Al.-Thomas, Lyon.
***Suppotonic** id.
- Supple-Vaccin Salan-tale** 42, rue Grandes-Arcades, Stras-bourg.
Suprarénidine OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- ***Suprasthényl** Lab. OMNITHER, 33, rue Bar-thou, Angoulême (Charente).
Supravéna à Bourg-la-Reine.
Suractivase 122, rue du Cherche-Midi, Paris.
Suralimentine Rolland 41, rue d'Amsterdam, Paris.
***Surbical** 42, rue Mont-Cenis, Paris.

Surcaïne Leisyn	1 bis, rue Molitor, Paris.
Suriodinine	5, r. Blanc-Dutrouilh, Bordeaux.
Surlax	24, bd Sébastopol, Paris.
*Suroxydal	Lab. C. LeFollet, Nozeroy (Jura).
*Surparine	MATHIVAT, 66, rue de la Pompe, Paris (XVI ^e).
*Surrasthénine	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Surrénale - Endocrines Fournier	7, rue Biscornet, Paris.
Surrénaline Bouty	3, rue de Dunkerque, Paris.
Surrénine	Lab. ORGA, Avignon (Vaucluse).
Surrénotanic Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Suryali	BLOUIN, 50, rue de Turenne, Paris.
Sylcase	7, rue Saint-André, Le Mans.
Sylvol	46, rue Pierre-Charron, Paris.
Sylvor	4, quai Pasteur, Sète.
Sympaneurol	PHARMA-SPÈS, 15, rue Corneille, Lille.
Sympasedal	130, bd. Murat, Paris (XVI ^e).
*Sympathocrine	37, rue Brochant, Paris.
Sympathol	PÉRDRIGEON, Vaires (Seine-et-Marne).
*Sympathoriane	21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.).
*Sympathyl	26 bis, rue Dombasle, Paris.
Sympatonyl	44, rue d'Inkermann, Lille (Nord).
*Sympax	191, rue du Fg-Saint-Antoine, Paris.
Synase	40, rue des Acacias, Paris.
Syncaïne Clin	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Syncrines Choay	48, av. Théophile-Gautier, Paris.
Synergyl Vadam	111 bis, rue de Turenne, Paris.
Synthaline B	Lab. CRUET, 13, rue Miollis, Paris (XV ^e).
*Synthéma	25, bd. Latour-Maubourg, Paris.
Synthol	3 à 9, rue de l'Abreuvoir, Boulogne-sur-Seine.
*Syntropan Roche	10, rue Crillon, Paris.
*Syphonéol	BAUDE, Saint-Aubert (Nord).
Syserose	18, rue des Écoles, Paris.

T

- Tabedo** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- ***Tablette Perroud** 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.
- Tablettes Boval** DEHAY, Arras (P.-de-C.).
- Tablettes Enurésan** KUNTZMANN, à Ribeaupillé (Haut-Rhin).
- Tablettes Gelok** 50-52, rue Pierre-Légrand, Lille.
- ***Tablettes Hova** 26, rue Vauquelin, Paris.
- Tablettes oxymenthol** Lab. SCIENTIA, 21, rue Perraudin Chaptal, Paris.
- Tablettes de Phospharsol** 17, rue Rochechouart, Paris.
- Tablettes Renard** GIBAN, à Sens (Yonne).
- ***Tablettes Robin** 13, rue de Poissy, Paris (Ve).
- Tablettes de thyroïde** CATILLON, 3, bd Saint-Martin, Paris.
- ***Tablettes Zeva** 60, cours Emile-Zola, Lyon.
- ***Taburol Monal** 13, av. de Ségur, Paris.
- Tacia** 15, rue du P^t-Wilson, Gentilly (Seine).
- ***Tachygastrine** DUCLOY & C^{ie}, Arques (Pas-de-Calais).
- Tachysmuth** DEMARS, 89, av. Wagram, Paris.
- ***Tænifuge Bardet** 76, rue de Sèvres, Paris.
- ***Tænifuge Castel** 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
- Tænifuge des Dames de France** 119, rue de Sèvres, Paris.
- ***Tænifuge du D^r Duhourcau** 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes (Seine).
- ***Tænifuge du D^r Jacquème** CHIARINI, Aix-en-Provence.
- Tænifuge Ercé** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- ***Tænifuge Kirn** 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
- ***Tænifuge Larix** 25, rue Thiers, Tarbes.
- Tænifuges Limousin** 10, rue du Bac, Paris.
- Talcazone** 42, rue Thiers, Le Havre.
- ***Tamar Indien Grillon** DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris.
- ***Tamarine** 4, route de Médoc, Le Bouscat (Gironde).
- ***Tampol Roche** 10, rue Crillon, Paris.
- Tampons Alsai** 1, rue Griffon, Lyon.
- Tampovules Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Tanacétyl Clin** 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- ***Taniglane** 33, rue Barthou, Angoulême (Charente).

- Tanisol**
Tannarsol
Tanno-Bismuth
***Tanno-Calchine**
***Tannurgyl**
Tanode
Tanosal
***Tapo**
Tarbisol
Tartrate Borico-potas-
sique du Dr Gigon
***Tartrate Borico-potas-**
sique Pachaut
***Tartroborol**
Taxobyl
***Taxol**
***Tébéphaguine**
***Técarine**
Tégéol
***Teinture de Cocheux**
Ténébryl
***Tensédine**
Tensiofuge
Tensiorex
***Tensol Laurençon**
***Tensoryl**
Teperos
***Terbinthiol**
Tercinol
Terco
***Tercodal**
Tercolène
Térébane
Térébhine
Térébules Gallier
***Tergyl Lamo**
***Terkal Monal**
Ternose Trouette
Térozone
Terpène iodé
Terpine Bovell
- MIGNON**, 119, rue de Noisy,
 Les Lilas.
 119, rue de Sèvres, Paris.
REBOUL, 62, r. de Paris, Ville-
 juif (Seine).
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-
 sur-Seine.
Dr LETANNEUR, 87, av.
 Borriglione, Nice.
REBOUL, 62, r. de Paris, Ville-
 juif (Seine).
FEIGEL, à Lutterbach (Haut-
 Rhin).
Lab. MADYL, 14, rue Miro-
 mesnil, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 130, bd Haussmann, Paris.
 18, rue des Ecoles, Paris.
F. MARIOTTE, 15, rue Pas-
 teur, Bourg (Ain).
 25, rue Jasmin, Paris.
 11, Chaussée de la Muette,
 Paris.
SPECIA, 21, rue Jean-Goujon,
 Paris.
 11, rue de Clichy, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 22, rue du Landy, Saint-
 Ouen.
 13, av. de Ségur, Paris.
 8, r. François-Coppée, Paris.
 84, rue de l'Aqueduc, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 52, bd du Temple, Paris.
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
 33, fg Montmartre, Paris.
 247 bis, rue des Pyrénées,
 Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 14, rue Demarquay Paris.
MAUCHANT, Gennevilliers (S.).
SAPORTA, 59, bd Lefebvre,
 Paris.
PLANCHE, 1, bd de la Made-
 leine, Marseille.
 38, bd Montparnasse, Paris.
 52, rue de Crimée, Paris.
 13, avenue de Ségur, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 62, rue d'Antibes (Cannes).
FROSSARD, 86, rue de Va-
 renne, Paris.
 9, pl. des Terreaux, Lyon.

- Terpine Cailleux**
Terpine du Mezenc
Terpine Duval
 ***Terpine Gonnon**
 ***Terpine granulée**
Baron
Terpinol Adrian
Terpoflor
 ***Terpoxyl interne et**
externe, ovules
Tersol

Teskrine
Testicule - Endocrisi-
nes Fournier
Tétralgine Routhier
Tetra magnesium

 ***Tétranitrol Roussel**
Tétrasulfol Vigier
Thalaphyl
Thalassotonine Vadam

 ***Thaolaxine**
 ***Thébaïl**
Thé d'Albret

Thé de l'Emyrne
Thé Evine
 ***Thé d'Oranger**

 ***Théinol Bailly**
 ***Théïsine Dubat**
Themsaline
Théobromine Guil-
laumin
Théobromine Houdé
 ***Théobromine Invar**
Théobromine Vicario
 ***Théobromose**
 ***Théobryl Roche**
 ***Théocalciode**
 ***Théocardine Laleuf**
Théocrinol
 ***Théophylline Bruneau**
 ***Théophylline « Carena »**

Théosalvine
 ***Théosalvose**
Théovadil

Théovérine Laleuf
 ***Théoxanthine**
 ***Thermalgol**
- Parmain (S.-et-O.).**
CELLIER, Roanne (Loire).
 62, rue Marengo, Saint-Étienne.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.

 74, rue Monge, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 26, rue Petrelle, Paris.

JOLLY, 1, rue Christine, Paris.
 32, r. Carnot, Beaune (Côte-
 d'Or).
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).

 7, rue Biscornet, Paris.
 à Vierzon.
GENÉVRIER, 45, rue du
Marché, Neuilly.
 10, rue Washington, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
BOUTTET, à Ruffec (Ch.-Inf.).
 111 bis, rue de Turenne,
 Paris.
DURET & RÉMY, à Asnières.
 7, rue Galvani, Paris.
 295 bis, r. de la Bénauge, Bor-
 deaux.
 151, rue Saint-Maur, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
J. NÈGRE, 18, rue L.-Blanc,
Cannes (Alpes-Maritimes).
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 26, rue Vauquelin, Paris.

 3, rue du Cherche-Midi, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 17 bis, bd Rochechouart, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris.
 33, av. de Villiers, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 id.
 85, r. des Morillons, Paris
 (XV^e).
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 15, bd Pasteur, Paris.
Lab. DEODAX, R. Renaud,
Anould (Vosges).

- Thermo-bloc**
Thermocédone
Thermoplaste
Thermo-Vicardine
Thé Suédois
Thiesdyne
***Thigénol Roche**
***Thi-Lip Aguetan**
***Thiobyl Bourcet**
***Thiocitran**
***Thiocol Roche**
***Thiodacaine Midy**
***Thiodérazine Midy**
 Thiokéine
***Thionafodine A et B**
***Thionaphte**
Thionhydrol Grémy
Thiopheel
***Thiopnyl**
Thiophytol
***Thiorine**
***Thiosédal**
Thiosinamine Cognet
***Thiosote-Lambiotte**
Thiosyl
Thio-terpine Dalin
***Thioxyl**
***Thorix (Thorium X**
 Rhemda)
Thoroxy
Thylargol
Thylaxines I. O. D.
***Thyméphédrine**
Thymétol
Thymobrol
Thymo-Mentol Eup-
 nique
Thymophytine
Thymoseptyl
Thymus - Endocrisi-
 nes Fournier
Thymoseptol
Thymine
Thymol doré
Thymoléine
Thymusine Byla
- GAUDICHARD, à Châtelle-**
 rault (Vienne).
 11, rue Lepic, Paris.
COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
ACHARD, 15, rue du Com-
 merce, Riom (P.-de-D.).
HERIN, 98, rue Jeanne-Mail-
 lotte, La Madeleine (Nord).
BESNARD, 56, rue des Dames,
 Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 7, av. du Doyenné Lyon.
THÉVENOT, 21, rue des Roses,
 Dijon.
 10, rue Crillon, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 id.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 71, av. de Clamart, Issy-les-
 Moulineaux (Seine).
 9, pl. Municipale, Tulle (Cor-
 rèze).
 14, rue de Clichy, Paris.
 14, r. de Normandie (Seine).
 12, bd Saint-Martin, Paris.
Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 79, rue de Paris, Saint-Denis.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
M. BERGER à Orléans.
 1 rue de la Martinière, Lyon.
Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 51, rue d'Alsace, Courbevoie (S.)
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 16, rue du Dragon, Marseille.
 7, rue de la République, Pu-
 teaux (Seine).
 77, bd de Grenelle, Paris.
Lab des Vosges, La Broque
 (Bas-Rhin).
 13, rue de Rivoli, Paris.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 2, rue des 3-Mages, Marseille.
 7, rue Biscornet, Paris.
M. H. PRUVOST, Houplines
 (Nord).
 11, ch. de la Muette, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
ABOU, 26, rue Temple, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.

- Thyratoxine** Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- ***Thyrénine** Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
- ***Thyrocréine** Grémy id.
- Thyrodose** 47, rue de Neuilly, Nanterre.
- Thyroguine** BRICHARD, Bar-le-Duc (Meuse).
- Thyroïde - Endocrisines** Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- Thyroïde** Leo 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- ***Thyroïdine** Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
- Thyroïdine** Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Thyroïdine** Couturieux 18, av. Hoche, Paris.
- Thyroïdine** Flourens 62, rue Notre-Dame, Bordeaux.
- Thyroïdine** Gory JOOSS, 7 bis, rue Général-Galliéni, Montreuil (Seine).
- Thyroïdine** Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Thyrol A.** 107, rue des Dames, Paris.
- ***Thyroxine** Roche 10, rue Crillon, Paris.
- Tiliane** LACAZE, ph^{iea}, Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
- Tilleul** Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- Tinctode** ROBERT & CARRIERE, 37, rue de Bourgogne, Paris.
- Tinga Rhino-Bismuth** 70, r. Carnot, Stains (Seine).
- ***Tiodine** Cognet 43, rue de Saintonge, Paris.
- Tisane Anticolibacillaire** Lesourd 88, rue Duhesme, Paris.
- Tisane Bala** Brichard et fils, Bar-le-Duc.
- Tisane Borkou** 69, av. du Maine, Paris (XIV^e).
- Tisane Cisbey** 12, bd Saint-Martin, Paris.
- Tisane de Maraisa** Lab. Lorrain, à Etain (Meuse).
- Tisane dépurative de Cavallès** 29, rue Singer, Paris.
- Tisane Ferlys** STELVIA, 59, rue Boissière, Paris (XVI^e).
- ***Tisane hépatique Dausse** 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- ***Tisane hépatique Lahaye** 145, rue des Bourguignons, Bois-Colombes (Seine).
- Tisanes** Lesourd n^{os} 19, 62, 55, 10, 20, 40, 3
- Tisane Sanova** 88, rue Duhesme, Paris.
- Tisane Talon** 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- ***Tisane Tanit** 153, bd Montparnasse, Paris.
- Tisane Valentin-Chail-lot** ROUANET Antibes (Alpes-Mar.).
- Tissus Le Perdriel** 10, square de Châtillon, Paris.
- Titanoderme** 11, rue Milton, Paris.
- ***Tochlorine** Lab. PALC, Messigny (C.-d'Or).
- Togal** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 13, fg Sainte-Foy, Forbach (Moselle).

- Tolu Le Bœuf**
Tonal
Tonax
Toni bronchique
Tonicalcine
***Tonicardine Gonnon**
Tonicardine
Toni-Dol
Toniflux
Toniformiase
Tonifort
Tonifosfal
Tonigène
Tonigénine
***Tonikéine Chevretin**
Tonikéol
Tonilécithine Rogier
Tonimalt
***Toni-Pectoral Adrian**
Toniphlébine Hardy
Toniphos Baron
Toniphosphine
Tonique Dulciane
***Tonique Favrot**
***Tonique Gonnon**
***Tonique Nêda**
Tonique Rik
***Tonique Roche**
Tonique Rouveray
Tonique Zéva
Toni sérum Freyssinge
***Toniveinine**
Tonixyl
Tonucyl
***Tonudol**
Tonyol « F »
***Tophol**
Topique Bertrand
Topiques Chaumel
Topique pyorrhépha-
gine
- 11, rue Milton, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 LYONS, 30, rue Monge, Paris.
 REBOUL, 62, av. de Paris,
 Villejuif (Seine).
 MARTINIE, 62, av. Philippe-
 Auguste, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 E. BASSOL, Saint-Alvère (Dor-
 dogne).
 31, bd de la Villette, Paris.
 34, rue Montgallet, Paris.
 41, r. Saint-Louis, Montauban
 (T.-et-G.).
 18-20, rue Vavin, Paris.
 LECOQ, 11, rue Eugène-Fla-
 chat, Paris.
 Lab. à Montrevel (Ain).
 52, rue Labruyère, Paris (IX^e).
 ADLER, 36, rue des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 56, bd Pereire, Paris.
 Rumilly (Haute-Savoie).
 9, rue de la Perte, Paris.
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 Les Sables-d'Olonne.
 56, rue des Dames, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 6, rue Dombasles, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 134, cours de Verdun, Bor-
 deaux.
 38, rue du Louvre, Paris
 (I^{er}).
 10, rue Crillon, Paris.
 3 bis, rue Vallier, Levallois-
 Perret.
 60, cours Emile-Zola, Lyon.
 6, rue Abel, Paris.
 BLANCHOT, 15, av. du Parc-
 Montsouris, Paris.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 MEUNIER, rue du Commerce,
 Montmarault (Allier).
 LICARDY, 38, bd Bourdon,
 Paris-Neuilly.
 VARGAS, 5, rue Chauveau-
 Lagarde, Paris.
 3, rue Condillac, Grenoble.
 à Oullins (Rhône).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Lab. Hygiodontis, Croissy-sur-
 Seine.

- Topique Robein**
Topique stomacal
 Dausse
 Torigyre Lamo
 *Toritane Lamo
 *Toritanol Lamo
 Totaliode
 *Total magnésien
 *Total-Tonic
 *Tot'Hamelis
 *Tot'Héma
 Tot'Hépatine
 *Touranol
 *Touranyl
 Toussyl Py
 Toxurol
 *Trachédrine
 Trachovaccin Salantale
 *Traitement Ambula-
 toire
 Traitement Vernet
 *Transitol
 Transpulmine
 Tranquinal
 *Traphéine
 *Trasentine
 Traumatol
 Traumatoplaste
 *Trepallix
 Tréparsénans
 Tréparsinyl
 *Tréparsol
 *Tréphonyl
 Trépocidine
 *Trépol
 Trépoquinol
 *Trépositaires
 *Triano
 Triarsonyl
 Triase
 Tribromure Gigon
 Tricadol
 *Tricalcine
 *Tricalm
 Tricarbol Begon
 21, rue de la Gare, La Broque
 (Bas-Rhin).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 53, rue de Crimée, Paris.
 id.
 id.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 29, fg Bourgogne, Orléans.
 CHANTEREAU, 26bis,
 Dombasle, Paris.
 26, bis, rue Dombasle, Paris.
 3, pl. Jussieu, Paris.
 117, rue de Belleville, Paris.
 id.
 58, boulevard Richard-Wallace
 Puteaux.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 42, Grandes-Arcades, Strasbourg.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 9, rue Laloy, Chaumont.
 13, rue Basly, Gennevilliers
 (Seine).
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
 13, av. de Ségur, Paris.
 13, rue Beudant, Paris.
 CIBA, 103-117, bd de la Part-
 Dieu, Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 id.
 66, rue de la Pompe, Paris
 (XVI^e).
 COMAR, 20, rue des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 FALQUE, Besançon.
 LECOQ & FERRAND, 14, rue
 A.-Briand, Levallois-Perret.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
 Bois, Bruxelles.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 id.
 43-45, r. des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
 PROBIOS, 8, rue Saint-Martin,
 Paris (IV^e).
 137, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 22, r. de Turin, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris.
 Lab. DU DONAGOL, Péronne
 (Somme).
 Plonsat (Puy-de-Dôme).

***Tricarbonate Lefranc**

Tricostérid

***Tridigestine Dalloz**

***Tridynol**

Triféryl

Trifloral Francois

Triganol Vigier

Trigastrine

***Triglandine Bouty**

Triglandol Bouty

Trigonellose

***Trigosthène**

Tri-Iodo-Ercé

Trijumine Pelletier

Trilactine

Trimétal

Trineuxyl

***Trinibaine Laleuf**

***Trinitral Laleuf**

***Trinitrine Gatinée Du-bois**

***Trinitrine -Papavérine Laleuf**

***Trinitrine Roussel**

***Trinitrine Simple Laleuf**

***Trinitrine Vicario**

***Trinivérine**

***Trinobenzyle**

***Triradol**

***Trisalyl**

Triseltz

***Triseptine**

Trisodyl Rozet

Tristyl Noyon

Tritonine

Triurase

Trixyl Fraudin

Tri-Zymol

***Trousses Dosurine**

Tryclène

***Trynol**

Tryparsamide

Tuberculine C. L.

Tubercuséine Leisyn

***Tubérol**

***Tubes Blache**

31, rue du Chemin-de-Fer, Nanterre.

PELVILLE, Champigny (Seine).

13, bd La Chapelle, Paris.

JOURNET, 18-20, rue Vavin, Paris (VI^e).

37, rue Galilée, Paris.

TACLET, Arras (P.-de-C.).

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

336, r. des Pyrénées, Paris.

3, rue de Dunkerque, Paris.

23, bd Hoche, St-Brieuc.

« ANGLA », Monte-Carlo.

37, rue de Bourgogne, Paris.

48, rue Jacob, Paris.

MAUCHANT, Gennevilliers (Seine).

38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).

6, rue des Dames, Paris.

51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

id.

id.

10, rue Washington, Paris.

51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

17, bd Haussmann, Paris.

13, av. de Ségur, Paris.

P. BLOUIN, 50, rue de Turenne, Paris.

22, rue de Turin, Paris.

14, rue des Minimes, Paris.

163, rue de Flandre, Paris.

LAMBERT, 6, rue de Longchamp, Vichy.

BENDERITTER, à Vendôme.

53, rue de Crimée, Paris.

64, rue des Tournelles, Paris.

46, rue de Rome, Marseille.

4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.

OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.

(Voir Dosurine.)

52, bd du Temple, Paris.

FALVY, 40, rue des Acacias, Paris.

SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

1 bis, rue Molitor, Paris.

23, rue des Moines, Paris.

CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).

- Tubes Bromure Pachaut**
***Tubes Chauvin**
***Tubes Dulcis**
***Tubes Ferlux**
***Tubes du D^r Guiraud**
Tubes Levasseur
Tubes Lux
Tubes P. O. S.
***Tubes Ratio**
Tubes Sals
***Tubes Strana**
***Tulle gras Lumière**
Tulle gras Prima
Tulle neutre AD-NO
***Tulle rose Beslier**
Tussédyl
Tuxyl
Tuya Feuillé
Tymocalcine
Tympano
***Tympanyl**
- 130, bd Haussmann, Paris.
 Aubenas (Ardèche).
 D^r FERRY, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 G. BOUSQUET, à Albi.
 10, imp. Milord, Paris.
 23, rue de la Monnaie, Paris.
 35, rue de l'Abattoir, Bruxelles.
 FERRENBACH, Kaysersberg (Haut-Rhin).
 Bousquet, Albi.
 Oullins (Rhône)
 SALANTALE, Strasbourg.
 45, rue Villon. Lyon.
 3, rue des Reculettes, Paris.
 5, rue Mézelle-Tarare (Rhône).
 COQUELU, Digoin (S.-et-L.).
 15, rue des Champs, Asnières (Seine).
 4, av. Maurice-Berteaux, Poissy (S.-et-O.).
 D^r BIDOT, 4, rue du Cirque, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 CHAUVIER, 66, rue Falguière, Paris.
 215, bd Voltaire, Paris.

U

- Ubécholone**
***Uclarsyl**
Udanka
***Ulcéobalnéine**
***Ulcéobande**
Ulcécure
***Ulcéoplaque**
***Ulcéosine**
***Ulcéosol**
***Ulcérine Berger**
***Ulcérophile Nosan**
Ulmacétyl
Ulmairé Gmet
Ulmairène Gigon
- MOUFLET, Chennebrun (Eure).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 76, rue des Rondeaux, Paris.
 id.
 82-84, rue de Belleville, Paris.
 76, rue des Rondeaux, Paris.
 id.
 id.
 P. NADAUD, 31, bd de la Villette, Paris.
 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine).
 54, r. Sablonville, Neuilly-s.-Seine.
 27, fg Montmartre, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.

- *Ultracalcium Irradié**
Ultracao Laurençon
 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e).
 11, rue François-Giraud, Villefranche-sur-Saône.
- *Ultraformine B et S**
 SAUZE, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Ultra-Levure**
Ultrapraidow
Ultrargen Leclerc
Ultrasténil
 BATTUT, à Vatan (Indre).
 10, rue Vignon, Paris.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Ultra-Violets**
 La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris.
- *Ultravitamine 4**
Ultravitine
 LAURENÇON, 11, rue François-Giraud, à Villefranche-sur-Saône.
 P. FONTANIER, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- *Umcka**
Uracétose
***Uralysol**
Uradol
Uranol
Uraséol
***Uraseptine** Rogier
***Urazine**
 34, rue St-Lazare, Paris (IX^e).
 14, rue des Minimes, Paris.
 25, rue Jasmin, Paris.
 av. de Grasse, Cannes.
 22, rue de Turin, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 56, bd Pereire, Paris.
- *Ur-Clar**
***Urémiasé**
Uribiol
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Urdol**
Urénile Meurice
***Uréol** Chanteaud
 ROUX, 58, r. de Maubeuge, Paris.
 7, rue Galvani, Paris (XVII^e).
 145, chemin de la Madrague-de-Montredon, Marseille.
- Urgoplast**
***Uriage (Ampoules)**
 OPTIMA, 78, Grande-Rue-aux-Bois, Bruxelles.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 3 et 5, rue Alexandre-Dumas, Saint-Ouen (Seine).
 FOURNIER, Dijon.
- Uribiline**
Uricase
 15, av. des Champs-Élysées, Paris.
- *Uricémine**
Uricine
***Uriclarine**
Uricure
 REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 26, rue de Gagny, Neuilly-sur-Marne.
- *Urifluine**
Uriloxal
Urilyse
Urilysonsé
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 50, rue République, Puteaux.
 157, rue Championnet, Paris.
- Uri-Magnétol**
Urisal du champs
 SECLO, 6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
 14, r. des Guillemites, Paris (IV^e).
 108, rue Maréchal-Pétain, Vichy.
 G. GAYRAUD, Lavit (T.-et-G.).
 109-113, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 ROUX, 58, rue de Maubeuge, Paris.
- 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

- *Urisanine**
 Uro-Bestol
 Urobiose
 Urobleu
***Uroboldine**
***Urobuccol Malmanche**
 Urocarbol benzo-
 naphtolé
 Urocassine
***Urocédrol**
***Urocholine**
***Uroclarol**
***Uroclase**
***Uroclase « M »**
 Uroclean
 Urococcine
***Urocylate**
***Uroflux**
***Uroformine Gobey**
 Urogem
 Urogène
 Urogénine
***Uroïodine**
 Urokaps
 Urolan
 Urol
 Urolithiase
 Urolithol
 Urolyse
***Urométine Lambiotte**
***Urométhyl**
***Uromil**
***Urophényl**
***Urophile Bailly**
***Uropiat**
 Uroquinase
***Uroquinol**
***Urosalyl**
 Urosan
***Uroscléral**
 Urose Vigan
 Urosérum
- LONGUET, 34, r. Sedaine,
 Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 id.
 6, rue Dombasle, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil
 (S.-et-O.).
 133, rue Lecourbe, Paris.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 GALLO, à Aurillac (Cantal).
 20, pl. de la Mairie, Parc-Saint-
 Maur (Seine).
 117, rue Victor-Hugo, Houplines
 (Nord).
 95, rue de Prony, Paris.
 id.
 ADLER, 36, rue des Francs-
 Bourgeois, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
 21, rue de Lyon, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris
 (I^{er}).
 D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
 55, av. des Écoles, Cachan
 (Seine).
 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
 38, bd des Brotteaux, Lyon.
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 27, rue G. Tessier, Saint-Étienne
 (Loire).
 20, rue Dumont-d'Urville, Pa-
 ris.
 NOVALIS, Oullins (Rhône).
 D^r BELIÈRES, 19, rue Drouot,
 Paris.
 CROUY, 73, r. d'Albuféra, Ver-
 non (Eure).
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 DUBOIS, 16, bd Pereire, Paris.
 DEXO, 7, rue de la République,
 Puteaux (Seine).
 GARDIOL, 6, rue Félix-Pyat,
 Marseille.
 12, rue des Saints-Pères, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 103, rue St-Lazare, Paris.
 17 pl. de Lenche, Marseille.

Urosinol Damber

- *Urosiphon**
- Urosodine Louveau**
- Uro-tisan**
- Urotropine Lafran**
- *Urovitine**
- *Uroxyl**
- *Urticide (Dragées et Liquide)**
- Utérol Leo**
- *Utéro-streptine**
- *Utersan**
- *Uvargol**
- Uvastar**
- *Uvé**
- Uvécalcion**
- *Uvéoline**
- Uvéovules**
- Uvéphorine**
- *Uvestérol**
- Uvotonyl**

71, av. de la République, Champigny (Seine).

1, rue de l'Odéon, Paris.

78, bd des Batignolles, Paris.

112, rue des Pyrénées, Paris.

8, rue de Prague, Paris.

190, bd Haussmann, Paris.

11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.

2, rue Michelet, Alger.

11, square Marie-Louise, Bruxelles.

CARRION, 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris.

20, rue des Martyrs, Paris.

MARTINIE, 62, av. Philippe-Auguste, Paris.

Route du Moulleau, Arcachon (Gironde).

1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.

11 bis, place de l'Hôtel de Ville, Cannes (A.-M.).

Ph^{ie} Ambard, Carcès (Var).

AMBARD, Carcès (Var).

37, rue Galilée, Paris.

1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.

Joué-lès-Tours (I.-et-L.).

V

Vabéol**Vacciderm**

- *Vaccin anti-asthma-tique du Pr. Minet**
- *Vaccin Anticolibacillaire M.M.**
- Vaccin antigonococcique**
- *Vaccin antigrippal du Pr. Minet**
- *Vaccin anti-pneumonique du Pr. Minet**
- Vaccin antivariolique**
- Vaccin de Weill et Dufourt**
- Vaccin M. A.**

30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.

UNIS-SPÈS, 14, rue Demarquay, Paris.

Lab. STÈNE, 14, rue des Guillemites, Paris.

43-45, rue des Fauvelles, Courbevoie (Seine).

OLIVIERO, Boulogne-sur-Seine.

14, rue des Guillemites, Paris.

id.

av. de Lodève, Montpellier (Hérault).

37, rue de Bourgogne, Paris.

CREUZÉ, 74, rue de Lourmel, Paris.

- ***Vaccinothérapie atoxique Cépède** 60, rue Mathurin-Régnier, Paris.
- ***Vaccinothérapie Pro-bios** 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
- ***Vaccinovules** 23, rue des Moines, Paris.
- Vaccins antipollin** 26, av. Observatoire, Paris.
- ***Vaccins atoxiques stabilisés** SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- ***Vaccins Bactériens I. O. D.** Lab. Biologie Médicale, 16, rue Dragon, Marseille.
- Vaccins bactériophages** 46, rue de Verneuil, Paris.
- ***Vaccins Bruschettini** 7, rue Biscornet, Paris.
- ***Vaccins Carrion** 54, rue du Fg St-Honoré, Paris.
- ***Vaccins Clin** 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- ***Vaccins Creuzé** 74, rue de Lourmel, Paris (XV^e).
- ***Vaccins Demonchy** THÉRAPLIX, 98, r. de Sèvres, Paris.
- ***Vaccins Inava** 14, rue de Normandie, Asnières (Seine).
- Vaccins Irsi** 4 ch. de la Muette, Paris.
- ***Vaccins Ivago** 17, rue de Provence, Paris.
- Vaccins microbiens curatifs** GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
- ***Vaccins Pasteur** Institut PASTEUR, 22, rue Dutot, Paris.
- Vaccins Polyvalents Renard** 37, rue de Bourgogne, Paris.
- ***Vaccin Provac's** 42, rue Thiers, Le Havre.
- ***Vaccins Ronchèse** 21, bd Riquier, Nice.
- ***Vaccins Salantale** 42, rue des Gdes-Arcades, Strasbourg.
- ***Vaccins Sténé** 14, rue des Guillemites, Paris.
- ***Vaccins Virultra** VIRULTRA, à Launay-Serquigny (Eure).
- Vacciplast** FOURNIER, Dijon.
- ***Vaclydun Vaclyderm** 27, rue Desrenaudes, Paris.
- ***Vacuoline (Voir à Opo-Vacuoline)** 39, r. de la Gare, Bondy (Seine).
- Vadérol** DURAND, à Joigny (Yonne).
- Vagisanyl Leisyn** 1 bis, rue Molitor, Paris.
- ***Vagogastryl Crozet** Saint-Venant (P.-de-C.).
- ***Vagoriane** 21, Grande-Rue, Montfermeil (Seine-et-Oise).
- ***Vagosédyl** 122, av. des Champs-Élysées, Paris.
- ***Vagostabyl** MONIN, 49, rue de Maubeuge, Paris.
- Vagotonic Fournier** Institut physiologique Vaucresson (S.-et-O.).
- Vagotonine** BYLA, 26, av. Observatoire, Paris.
- ***Valbornine Rogier** 56, bd Pereire, Paris.
- ***Valbrol** MAYOLY, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- ***Valedyl** 191, fg Saint-Antoine, Paris.
- ***Valénal Novalis** NOVALIS, Oullins (Rh.).

Valéramyl Foulon
 Valergyl Doucet
 *Valérianate Gabail
 *Valérianate Grignon
 *Valérianate Pierlot

Valériane Byla
 Valériane Dausse
 *Valériane Gmet
 *Valériane Pachaut
 Valérianose Gigon
 Valériflore
 *Valérinodor Malmanche

*Valerium Paul Thibault
 *Valérobromine Le-grand

Valéromenthol
 *Valéronal

Valérose
 Valérothéine
 Valéthryne
 Valimyl Clin
 *Vallathén

*Val'ovarine Farma

*Valovosan

Vals St-Jean

*Valthène

Valtine

Valyl Midy

*Vamétol

*Vanadarsine Guillaumin

Vanadine Chevrier

Vanadyl

Vaniol

Vanosan

Vanotonyl

*Vanoxyde

*Vansol

*Vanucléol

*Vaposulphium

Varicine

Varicolyse

*Varilaxine

Varilose

*Variphile

*Varisclérine

Variserum Lebon

*Vascosodine

Vasculine

20, r. du Fg-Poissonnière, Paris.
 rue Gambetta, Bolbec.

55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 2, rue Duphot, Paris.

10, passage Morel, Montrouge (Seine).

26, av. de l'Observatoire, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.

27, fg Montmartre, Paris.

130, bd Haussmann, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

38 bis, bd Beaumarchais, Paris.

101, av. Paul-Doumer, Rueil (Seine-et-Oise).

48, rue d'Alésia, Paris.

DARRASSE, 13, rue Pavée, Paris.

10, rue Poncelet, Paris (XVII^e).

14, rue des Pyramides, Paris.

G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).

DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).

39, rue de la Chapelle, Paris.

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.

3 pl. Intérieure-St-Michel, Toulouse.

GRAVIER, 1, av. Eug.-Thomas; Kremlin-Bicêtre (Seine).

25, bd de La Tour-Maubourg, Paris.

53, bd Haussmann, Paris.

166, r. de la Roquette, Paris (II^e).

12, rue Tour-des-Dames, Paris.

67, av. de Wagram, Paris.

14, r. de Périgneux, Angoulême.

13, rue du Cherche-Midi, Paris.

21, fg Montmartre, Paris.

8, rue Richer, Paris.

156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

58, r. Oberkampf, Paris.

11, rue de Clichy, Paris.

4, rue Richer, Paris.

18, r. Maréchal-Foch, Versailles.

37, rue Pajol, Paris.

157, rue Championnet, Paris.

12, rue Cadet, Paris.

DAGRAN, 16, rue Salaire, Tarascon (Bouches-du-Rhône).

SOULARD, Surgères (Ch.-Inf.).
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).

21, rue de Lyon, Paris.

61, rue de Seine, Paris.

à Charost (Cher).

27, rue Planchat, Paris (XX^e).

102, av. Michelet, Saint-Ouen.

- *Vascurol
 Vasocônes
 Vasoconstrictine
 Vasogènes Pearson
 Vasolaxine
 *Vaso-Neurine
 *Vasonitryl
 Vasorhinine
 *Vaso-Rhinol
 Vasothyol
 *V. A. V.
 Vavéol
 Vaxa du Dr Boucard
 *Vaxitiol Bouty
 Véba-gastrine
 *Véganine
 *Végélacl
 *Végélaç
 *Végéphos
 Végétol Fournier
 *Végumine
 *Véguva Wander
 Veinalgol
 Veinargyre
 Veinhormones Logeais
 *Veinicura
 Veinochlorine
 Veinofluine
 Veinoflux
 Veinotensyl
 *Veinogène
 Veinoglandol
 Veinophiline
 Veinophyl
 *Veinoposine
 Veinosalvine
 Veinosan
 *Veinoserum (Élixir et Gouttes)
 *Veinosine
 Veinotonyl
 *Veinotrope
 Veinovarine Mercier
- 15, rue Cavalotti, Paris (XVIII^e).
 BRUN, Demi-Lune, Lyon.
 id.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 Lab. Pathologie Gle de Paris, 5,
 rue François-Ponsard, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes et 53,
 rue du Poinçon, Bruxelles.
 22, rue Gambetta, Cherbourg.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 9, rue Laloy, Chaumont.
 51, rue du Ranelagh, Paris.
 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 92, rue du Maréchal-Pétain,
 Vichy (Allier).
 13, rue Pagès, Suresnes (Seine),
 et 53, rue du Poinçon,
 Bruxelles.
 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 8, rue des Quatre-Fils, Paris.
 151 bis, rue de Joinville, Cham-
 pigny.
 id.
 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 29, rue des Jardiniers, Mon-
 treuil (Seine).
 24, rue de Silly, Boulogne-sur-
 Seine.
 132, av. Victor-Hugo, Paris
 (XVI^e).
 44, rue de Lagny, Montreuil
 (Seine).
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 44, r. M. Sembat, Aulnay-sous-
 Bois (S.-et-O.).
 id.
 37, rue Brochant, Paris.
 156, r. des Fauvettes, Courbevoie.
 27, rue Poids-Farine, Marseille.
 MOUNIER, Eglise-neuve-d'En-
 traygues (P.-de-D.).
 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse.
 20 bis, rue du Sergent-Godefroy,
 Montreuil-sous-Bois.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
 PHARMA-SPÈS, 15, rue Cor-
 nelle, Lille.
 25, rue Jasmin, Paris.
 41, route de Turin, Paris.

- Veinyl**
Velledol Adrian
***Velpeau** (bande de crêpe)
Venapressine

Vénecine
Venissette
***Vérachol**
***Véralgine**
Veramone
Verbal

Verbenol Hanbro
***Vériane Buriat**
***Véricardine**
Vermicide Grahaut

Vermicure Pigeon
Vermifuge Castel
***Vermifuge Cornet**
Vermifuge des Moines
Vermifuge Rabi
Vermifuges Sorin
Vermifuge des Vosges

***Vermirène Audibert**
Vermi-Robur
Vermitox

Vermosol
Vermus
***Vernis à la Diachusine**
Vérocodal Boeglin
***Vérogénol**
***Véronidia Buisson**
Verrucide Robur
Verruccin Leo

Verrucure
***Verrulyse**

Verrumag
***Verticurine**
***Vertox**
***Véryl**
***Vésicatoire rose Bes-lier**
Vésicatoires d'Albes-peyres
Vexillan
***Viabyllis**
Viargol

Viburniode
Viburnum Gmet
- 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 9, rue de la Perle, Paris.

 25, bd Beaumarchais, Paris.
 7, rond-point Mirabeau, Paris (XV°).
 129, rue de Turenne, Paris.
 Vierzon (Cher).
 44, rue Chaptal, Levallois (Seine).
 38, rue du Mainguy, Bondy.
 Cruet, 13, rue Miollis, Paris.
 34, av. de la République, Montrouge (Seine).
 10, rue de Belfort, Rennes.
 25, rue Copernic, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 21, rue Sainte-Catherine, Ville-neuve-sur-Lot.
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
 7, pl. Peyberland, Bordeaux.
 7, rue Charlot, Paris (III°).
 14, rue Turgot, Limoges.
 TROMBETTA, Blain (L.-Inf.).
 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
 Cinq Cantons, Bayonne.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
 46, rue du Bac, Asnières.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 142, rue de Picpus, Paris.
 26, rue Sainte-Claire, Mulhouse.
 139, av. E.-Zola.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 6, rue d'Auteuil, Paris.
 Lab. FLUXINE, Villefranche (Rhône).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 47, rue Feray, à Corbeil (S.-et-O.).
 56, rue Beaubourg, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.

 COQUELU, Digoïn (S.-et-L.).
 FUMOUBE, 78, fg Saint-Denis, Paris.
 98, av. Wagram, Paris.
 6, rue de Dunkerque, Paris.
 44, av. Pasteur, Courbevoie (Seine).
 GIRY, 49, rue de Metz, Nancy.
 27, fg Montmartre, Paris.

- *Vicalphos (simple et irradié)
 *Viceliase
 *Vichy Amaigrissant
 Vichy Purgatif
 Vigardyne
 Vigobiase
 *Vigofruits
 Vigogastrine
 Vigoria
 Vigorine
 Vigorstyl
 Vigostérol irradié
 Vigotonique
 Vilax
 Vin à l'extrait de foie de morue
 Vin d'Anduran
 *Vin Anti-Diabétique Talon
 Vin Aroud
 Vin Boillaud
 *Vin Bravais
 *Vince
 *Vin de Baudon
 Vin de Beef Lavoisier
 Vin de Bugeaud
 *Vin de Carnéose
 Vin de Chassaing
 Vin de Coca du Pérou
 Vin Erlos
 Vin des Indes
 *Vin de Vial
 Vin Désyles
 Vin diurétique Pyrola
 Vin énergétique Fra-dier
 Vin Fédé
 Vin Gallia
 *Vin Girard
 Vin de Kola Midy
 Vin de Moride
 Vin de Séguin
 Vin Lux Gaillac moussoux
 Vin Mariani
 Vin Mory
 Vin Néo-Vital
 *Vinocrinol
- 48, rue St-Jean (Lyon).
 71, av. de la République, Champigny (Seine).
 BLANCHER, Vichy (Allier)
 7 bis, rue Galvani, Paris.
 21, r. du Chemin-de-Fer, Sceaux.
 PHARMA-SPÈS, Lille.
 Route du Moulleau, Arcachon.
 222, rue Duguesclin, Lyon.
 Lab. AUBERY, Avignon (Vau.).
 BASSOL, Sainte-Alvère (Dord.).
 25 bis, quai de la Bibliothèque, Lyon.
 BRICHARD, Bar - le - Duc.
 71, av. de la République, Champigny (Seine).
 16, bd Filles-du-Calvaire, Paris
 21, fg Montmartre, Paris.
 28, r. Velpeau, Antony (Seine).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 172, rue d'Alésia, Paris.
 56, bd Ornano, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes.
 12, rue Charles-V, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 21, fg Montmartre, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 61, rue de Seine, Paris.
 36, pl. Bellecour, Lyon.
 Levallois-Perret (Seine).
 19, rue des Chalets, Toulouse.
 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
 36, rue Eug.-Carrière, Paris.
 7, rue des Petits-Carreaux, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 LANDRIN, 12, rue de la République, Puteaux.
 165, rue Saint-Honoré, Paris.
 6, av. Foch, Gaillac (Tarn).
 41, bd Haussmann, Paris.
 OPTIMA, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 BASSOL, Sainte-Alvère (Dord.).
 30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.).

Vin Nourry	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Vinocrinol	30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.).
Vin Oophorine	Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
*Vin-Raci-Bel	Lab. Toraude, 22, rue de la Sorbonne, Paris.
Vin Raimoa Tonic	16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
Vin Rénovateur Hu-chedé	1, rue de l'Odéon, Paris.
Vin St-Raphaël	à Valence (Drôme).
Vin Surtonique Val-Notre-Dame	Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Vin Tonic Tiffeneau	24, rue de Monttessuy, Paris.
Vin Tonique des Vosges	21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
Vin Urané Pesqui	rue de Béhobie, Hendaye.
Vin Voguet	5, rue Eug.-Delacroix, Paris.
*Vioforme Ciba	103-117, boulevard de la Part-Dieu, Lyon.
Violet Bidot	4, rue du Cirque, Paris.
*Viophan	81-83, rue de Lille, Roubaix.
*Viosten	D ^r LESCÈNE, 58, r. de Vouillé, Paris, et Livarot (Calvados).
*Vioxyl Mouneyrat	Villeneuve-la-Garenne (Seine).
*Viradène	120, rue Lecourbe, Paris.
*Viredox	SANAVITA, 7, rue Fontaine-Delsaux, Lille.
Viridol	65, rue Monge, Paris.
Viriligen	DÉGÉCÉ, 7, rue Princesse, Paris.
Viristhène	COSPHA, 76, rue des Jacobins, Amiens.
Virmonal	11, quai St-Clair, Lyon.
Viroglan I. S. M.	25, rue Dagorno, Paris.
Viscine	11, rue de Fontainebleau, Kremlin-Bicêtre.
Visco-dermine	FOSSET, 21, Grande-Rue, Montfermeil (Seine-et-Oise).
*Viscoserum	22, rue de Turin, Paris.
Viscosodine	20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
*Viscoveine	21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.).
Viscum Zyma	26, rue Vauquelin, Paris.
*Vitacalcine Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Vitacarnol	Lab. AUBERY, Avignon (Vaucluse).
*Vitacholine	LABO-VITA, 190, bd Haussmann, Paris.
*Vitacrines	188, cours de la Somme, Bordeaux.
Vitacuroil	190, bd Haussmann, Paris.
Vitaderme Bergonier	122, bd Murat, Paris.
Vitadermine	Rueil (Seine-et-Oise).

*Vitadiase	145, rue Yves-le-Coz, Versailles
*Vitadone	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitaferine	Moulins-sur-Yèvre (Cher).
*Vitagar	L. BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, Paris.
Vitagéine	SÉGUIN, 7, r. Sainte-Isaure, Paris.
Vitagermine	DRYCO, 5, rue St-Roch, Paris.
Vitaglyc	48, rue de la Procession, Paris.
*Vitalactyl	SAUBA, Montreuil (Seine).
Vital Extrait	à Ste-Alvère (Dordogne).
*Vitalium	97, bd Arago, Paris (XIV ^e).
Vitalogène	REBOUL, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
Vitalyne	10, rue Bayard, Toulouse.
Vitamina	8, rue Vivienne, Paris.
Vitamine B ¹ Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine B ² Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine C. Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Vitamine D. Cortial	7, rue de l'Armorique, Paris.
Vitamine E. Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Vitamine Rogier	56, bd Pereire, Paris.
*Vitamines Seclo	6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie (Seine).
Vitaminol	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Vitamorrhaine	P. C. B., 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
*Vitamyl	4, pl. des Vosges, Paris.
*Vitaol	CHABRE Frères, Toulon.
Vitaphorine	Usines du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
Vita-Raisin Lemale	7, rue d'Argenteuil, Paris.
*Vitargyl	POINTET & GIRARD, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
*Vitarsenic	R. Paméla, 85, r. Turbigo, Paris.
*Vitascorbol	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Vitasol	49, rue d'Angoulême, Cognac (Charente).
Vitastérol	F. GUILBERT, 10, rue du Collège, Arras (P.-de-C.).
Vitazem	85, rue Turbigo, Paris.
*Vitène	12, rue Charles-V, Paris.
Vitergomine	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Vitimone	16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI ^e).
Vitocalcion	50, av. de Normandie, Colombes (Seine).
Vitozine Décornez	à Ornans (Doubs).
Vitricine Carves	à Chambéry (Haute-Savoie).
Vityl	72, quai Jemmapes, Paris.
*Vivacure	R. PIONNEAU, Vayres (Gir.).
*Vivargyre	191, fg St-Antoine, Paris (XI ^e).
Vivassol	78, fg Saint-Denis, Paris.
Viviodol	11, rue de Marseille, Paris.

Vivo-Dynergol***Vivoléol*****Vocaldop****Vogénol****Voka*****Voltargol Robin****Voxinhal*****Vulcapil Brisson*****Vulcase****Vulco (ouate)*****Vulcrinol****Vulnamine*****Vuinérine Bergen****BROTHIER**, 20, r. H.-Martin,
Vanves (Seine).

1024, rue de Fécamp, Paris.

222, fg Saint-Martin, Paris.

13, r. de la République, Yzeure-
Moulins (Allier).

11, rue Ant.-Bourdelle, Paris.

13, rue de Poissy, Paris.

163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.

157, rue Champignonnet, Paris.

id.

OPTIMA, 78, Grande-Rue-au-
Bois, Bruxelles.**CARTERET**, 15, rue d'Argen-
teuil, Paris.

19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.

DUCOQ, Langeais (L.-et-L.).**W****Wantor****Witch Hazel****Wipla****Wismuthane****BÉRAUD**, 122, r. La Fontaine,
Paris.

3, av. Lowendal, Paris.

6, rue des Dames, Paris.

41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).**X****Xantharlem*****Xanthocol****Xanthorryl****Xémaderm*****Xeroderme****Xylosulfol Vigier**76, rue de Sèvres, Paris (VII^e).

37, rue de Bourgogne, Paris.

4, rue d'Aumale, Paris.

18, r. Blanche, Paris.

MICHEL, Cirey-sur-Vezouze
(M.-et-M.).

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Y

- *Yaourtine**
***Yo-Androl**

Yocaïne
Yoghourt Karlos
Yoghourt Lactella
Yoghourt Nutricia
***Yo-Gynine**

Yohimbine Gilbert
***Yohimbine Houdé**
***Yohimbine Vicario**
***Yohourthogène Car-**
rion-Lagnel
Yohourt Douriez
Yorva

Yprine

***Yptor**
Yse
Ystaline
***Yseult**
- 18, place Laborde, Paris.
 ISCOVESCO, 107, rue des
 Dames, Paris.
 12, rue Pavée, Paris.
 à Lécuse (Nord).
 à Tourcoing.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 ISCOVESCO, 107, rue des
 Dames, Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 9, rue Dieu, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.

 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.
 37, rue Voiture, Amiens.
 BEAUCHAMP, 5, cours Saint-
 Louis, Marseille.
 4 bis, rue Hébert, Courbevoie
 (Seine).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 62, rue Louis-Blanc, Paris.
 2, pl. du Th.-Français, Paris.
 9, rue de la Platière, Lyon.

Z

- Zébo-Plastol Dumes-**
nil
Zédeno
Zidal
Zingal
Zistazine
Zogol

Zohol
***Zomine**
Zomol
Zomo-maltine
Zoocytine

***Zymatine-Lescène**

***Zymion**
***Zymogastrine Kervan**
***Zymostol**
- 10, rue du Plâtre, Paris.
 37, rue de Bourgogne, Paris.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 CASTEL, 1, place Bouquerie,
 Nîmes.
 25, r. Jasmin, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
 172, rue d'Alésia, Paris.
 DURET & RÉMY, Asnières
 (Seine).
 à Livarot (Calvados), et 58, rue
 de Vouillé, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 3/5 r. Alex-Dumas, St-Ouen (S.).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.

3^e Partie

NOMENCLATURE
DE
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
CLASSÉES
PAR LABORATOIRES

- Lab. Félix Abadie**, 25, r. Thiers, Tarbes (Htes-Pyr.). — *Tœnifuge Larix*.
- Lab. Abadie Tanzi**, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Alcoboldine*, *Asclérogénol*, *Aubémone*, *Baume de la Faculté*, *Bellinguol*, *Cachets digestifs du D^r Bern*, *Calcior*, *Dépuratif du D^r Regol*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Florénal*, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes du D^r Bern*, *Gouttes de Pectosérum, J.-B. 5. Bel-las*, *Moruxase*, *Naphtolargol*, *Neurotrol*, *Névrostérol*, *Ovules halogènes du D^r Bern*, *Urolithol*, *Vallathen*, *Veinosérum (élixir et gouttes)*.
- Lab. Abarnou**, 72, av. Thiers, Le Mans. — *Antidolor*, *Antigélures*, *Baume Robur*, *Fenurobur*, *Rhino-Robur*, *Vermi-Robur*, *Verrucide Robur*.
- Lab. des Abatilles**, r. du Moulleau, Arcachon. — *Calcivilam*, *Créofruits*, *Droséfruits*, *Kodos*, *Seignet'fruits*, *Uvastar*, *Vigofruits*.
- Lab. d'Actino-Biologie**, 11, r. François-Giraud, Villefranche-sur-Saône. — *Ultraviamine 4*, *Tensol-Laurençon*, *Serifer Laurençon*, *Algécrine*, *Ultracao Laurençon*, *Thiophytol*, *Bédénal*.
- Lab. d'Actithérapie**, 81-83, rue de Lille, Roubaix (Nord), *Hepatoxane*.
- Lab. Adam**, Granville (Manche), *Adrénocalcine*, *Chloci*.
- Lab. Adler**, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Biolax*, *Bismuth belladonné du D^r Adler*, *Collybor*, *Cratœniode*, *Formocholine*, *Gastroclean*, *Gynochlor*, *Gynomalvine*, *Hémoclean*, *Hémo-varine*, *Hépacholine*, *Inhatillol*, *Iodau*, *bépine*, *Oléopsyllium*, *Pulmobtase*, *Rhinogéraniol*, *Tonikéol*, *Uroclean*.
- Lab. Adol (L. Giroud)**, 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopiat*, *Cachets Adol*, *Cachets Louix*, *Gouttes Antispasmodiques Adol*, *Potion Adol*, *Poudre Dumur*.
- Lab. Adrian et C^{ie}**. — Voir *Société Française de Productions Pharmaceutiques*, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Lab. de l'Aéine**, 6, place Clichy, Paris (IX^e). — *Aéine*, *Cachets Antigrippe Flamand*, *Nuclhémose*, *Sirop Flamand*.
- Lab. de l'Aérocid**, 71, rue St^e-Anne, Paris. — *Aérocid*, *Opo-cérès (comprimés)*.
- Lab. de l'Æthone**, 35, r. Boissonnadé, Paris. — *Æthone-Neurotrophène*.
- Lab. de l'Agorexine**, 37, av. de la République, Paris (XI^e). — *Agorexine*.
- Lab. N. Aguettant**, 36, quai Fulchiron, Lyon. — *Adrénaline Aguettant*, *Ampoules Aguettant*, *Chrysalmiède Aguettant*, *Néotrope Aguettant*, *Nosol Aguettant*, *Peptargyl*.

Aguettant, Picrico' Aguettant, Salitropine Aguettant, Sérum antityphoïdique, Stry-Calcium Aguettant, Sulfobiol Aguettant, Teinture de Cocheux, Thi-lip Aguettant.

Lab. de l'Aigüe d'O., 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigüe d'O.*

Lab. Albu-Coli, E. Lemonnier, pharmacien, 84, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Albu-Coli.*

Lab. Pierre Alexandre, 41, r. de Rome, Paris. — *Carbomucil, Decorpa, Enzypan, Gastrosédase, Hamaméline Roya, Hépamult, Normacol, Phénol Bobeuf, Pilules Myosolis, Spasmacol.*

Lab. de l'Alexime, 8, r. Riblette, Paris (XX^e). — *Alexime, Marnal.*

Lab. Alpha, Montreux-le-Château (Haut-Rhin). — *Albu-Rénol, Anti-Diabète H, Baume oculaire Alpha, Energétyl, Goultolysine, Grains de Seltz.*

Lab. de l'Amibiasine, 69, r. de Wattignies, Paris. — *Amibiasine (Liquide, Comprimés, Suppositoires), Bioentérase, Rectopansement-Amibiasine.*

Lab. Amicros, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e). — *Amicrargol, Elain Amicros, Fer Amicros, Orargol (Rhino-Orargol, Gouttes Orargol, Collyre Orargol), Ovules Amicros, Sarcoptol.*

Lab. des Prod. Amido, 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Amidal, Backerine, Génatropine, Génésérine, Genhyosciamine, Génomorphine, Génosthéniques, Génosconolamine, Génostrychnine, Glycobyl, Sed'Hormone, Vitamyl irradié.*

Lab. de l'Amiphédrine, L. Hugon, docteur en pharmacie, 6, pl. Jean-Jaurès, Montrouge (Seine). — *Amiphédrine.*

Lab. H. Ammann, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine, Blocs Vécory, Ostéogène.*

Lab. d's Ampho-Vaccins (Ronchèse), 21, bd de Riquier, Nice, et 62, r. Charlot, Paris. — *Amphomuth, Amphoprophyl T. A. B., Ampho-pulvérisateur, Ampho-Quintivaccin, Ampho-tablettes, Ampho-vaccin anti-infectieux, Ampho-vaccin anti-staphylococcique, Ampho-vaccin intestinal, Ampho-vaccin pansement antipyrogène, Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien, Ampho-vaccin pulmonaire, Ampho-vaccin urinaire, Pyo-Amphogel, Rhino-Amphogel.*

Lab. de l'Amybdine, 44, av. Pasteur, Courbevoie. — *Amybdine.*

Lab. Ana, 18, av. Daumésnil, Paris. — *Euphoryl, Euphoryl Infantile, Hirudinase, Salicylate-suractivé Ana, Sclérosérum, Solvant Ana, Spasmoryl.*

- Lab. de l'Analpyrine**, Nomexy (Vosges). — *Analpyrine*, *Biophosyl*, *Calciocholine*, *Cuprinal*, *Gastrolex*, *Liment Bertrand*, *Quiétudol*, *Sirop pectoral Bertrand*.
- Lab. Androvar**, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort. — *Androvar*, *Androvules*, *Erythéma*.
- Lab. Angelini**, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Magbi*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Onguent Borgia*, *Onguent Prunot*, *Ovules Patrat*, *Pilules Tix*, *Polypeptine*, *Poudre Deol*, *Poudre Fiore*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Vari-sclérine*, *Vin des Indes*.
- Produits spécialisés « Angla »**, H. Adam, pharmacien, av. de la Madone, Monte-Carlo. — *Antidotase*, *Barbiflorine*, *Cardioflorine*, *Cystoflorine*, *Granusel*, *Hépaflorine*, *Sealandair*, *Trigosthène*.
- Lab. de l'Angiolymphé**, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolymphé*, *Argycuprol*, *Yprine*.
- Lab. de l'Aniodol**, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algolan*, *Aniodol*.
- Lab. des Antigénines**, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Antigénines*, *Biazan*, *Cresentyll*, *Iodosaufryl*, *Jovanyll*.
- Lab. de l'Antiphlogistine**, 11, r. du Petit-Parc, St-Maur (Seine). — *Antiphlogistine*.
- Lab. de l'Aphosal**, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal*.
- Lab. de l'Appétyl**, 37, av. de la République, Paris. — *Appétyl*.
- Sté d'Applications pharmacodynamiques**, 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e). — *Aminophylline*, *Carena*, *Carena Calcium*, *Carena Injectable*, *Carena Ouabaine*, *Chlorophylle du D^r David*, *Dinitra*, *Erythra*, *Opo-Dinitra*, *Phylla*, *Rhocya*, *Théophylline*.
- Sté Générale d'Applications Thérapeutiques**, 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — Voir "Théraplax".
- Lab. du D^r Ardely**, 20, rue Antoinette, Paris. — *Philoderme Yldra*.
- Lab. Ardissonne-Gayraud**, Allauch (B.-du-R.). — *Fluase*.
- Pharmacie Ardoin**, 33, bd Dubouchage, Nice. — *Globules Rébaud*.
- Lab. de l'Argyrophédrine**, 20, avenue J.-Jaurès, Suresnes (Seine). — *Argyrophédrine*, *Ephédramélis*, *Parkibleu*, *Sédibaïne*.
- Lab. de l'Armanite**, 1 et 3, villa Saint-Mandé, Paris. — *Armanite*.
- Lab. Armoril**, 6 bis, rue Belloni, Paris. — *Anorexyl*, *Camformine*, *Soutensa*.
- Lab. Arviset**, 239, faub. Saint-Honoré, Paris. — *Urol*.
- Lab. Aseptor**, 21, rue de Lyon, Paris (XII^e). — *Aseptorhine*, *Auriculine*, *Boréol*, *Glycalcion*, *Otalgolex*, *Rhinaspir*, *Rosaseptor*,

- Lab. P. Astier**, 42, rue du D^r-Blanche, Paris. — *Arhéol*, *Colitique*, *Condurango granulé Astier*, *Glycophosphates granulés Astier*, *Kola Astier*, *Lyxanthine Astier*, *Néo-Riodine*, *Philentérol*, *Quinquina granulé Astier*, *Riodine*, *Stalysine*.
- Lab. du D^r E. Aubert**, 3, pl. Jussieu, Paris. — *Créacalcine*, *Créatonine*, *Kola Aubert caféinée*, *Métacarbène*, *Métacitrine*, *Métaformine comprimé*, *Métaformine granulé*, *Néosalicylate*, *Néosplénine*, *Neurobyl*, *Pancrébile*, *Parabenzyl*, *Tot'Hépatine*, *Tous produits de marque Bertal*.
- Lab. Aubriot**, 56, boul. Ornano, Paris. — *Élixir Bravais*, *Granulé Bravais*, *Vin Bravais*.
- Lab. Aubery**, av. de Monclar, Avignon (Vaucluse). — *Grappuval*, *Plasmobeeff*, *Plasmobiol*, *Plasmostérol*, *Séroglobine*, *Vigoria*, *Vin Aubery*, *Vitacarnol*.
- Lab. Auclair**, 4, rue d'Aumale, Paris (IX^e). — *Bi-So-Dol*, *Cachets Pulmonix Polvi*, *Colmatol*, *Defensol B*, *Digestif Polvi*, *Endoplex Polvi*, *Gouttes M. I. A.*, *Iodocardine*, *Panveinine*, *Paxyl*, *Prolax*, *Ultracalcium irradié*, *Xanthorhyl*.
- Lab. Marcel Audibert**, Cinq-Cantons, Bayonne. — *Vermirène Audibert*.
- Lab. Augier**, 2, rue des Lombards, Paris. — *Affinex*, *Gouttes S. A. P.*, *Mensuosédyl*, *Noctisédyl*.
- Lab. du D^r H. Auriol**, 4, rue de Metz, Toulouse. — *Anti-Dermite*, *Salmenthyl*, *Seborrhéine*.
- Lab. A. V. E.**, 56, rue Beaubourg, Paris. — *Cartilos*, *Comprimés N. B. M.*, *Gelchol*, *Gluchol*, *Idonil*, *Leptab*, *Osmos*, *Sulsod*, *Vertox*.
- Lab. E. Bachelard**, Chalette (Loiret). — *Siligone*.
- Lab. Badel**, 58-60, rue des Moulins, Valence (Drôme). — *Florosine*, *Gouttes Bronchophiles André*, *Juglanrégine André*, *Kolasthène Badel*, *Mycidol Badel*, *Poudre laxative André*, *Soporine*.
- Lab. G. Baetz**, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Cinascol*, *Perasurol*, *Pervosine*.
- Lab. A. Bailly**, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e). — *Pulmo-sérum*, *Opodyl*, *Sédacônes*, *Anaxéryl*, *Derphyl*, *Ménatol*, *Pandiol*, *Oxy-Buccol*, *Pyorex*, *Theinol*, *Urophile*.
- Lab. du D^r Baissade**, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du D^r Baissade*.
- Lab. du D^r Baraige**, 24, r. Paul-Bert, Paris (XI^e). — *Glutipolysalyl*, *Glutisalyl*, *Glutisyl Injanie*.
- Lab. Barbessou**, 10, allées Damour, Bordeaux. — *Anti-douleur Barbessou*, *Baume du D^r Serin de Gaillac*, *Produits du D^r Serin de Gaillac*.

- Lab. Bardet, 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — *Cachets Kapytan, Capsules Haarlem Bardet, Sédogastrol, Solution Quinquina Bardet, Ténifuge Bardet, Xantharlem.*
- Lab. Bardou. 13, q. Ragobert, Joigny (Yonne). — *Sanargot.*
- Lab. Barthélemy, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rhône). — *Anaural, Baume St-Roch, Biliboldo, Sirop Escolle, Sirop Pulmophile, Solvurène.*
- Lab. E. Bartier, Armentières (Nord). — *Myosthène, Stimulaxine.*
- Lab. Basuyaux, 117, rue de Belleville, Paris. — *Billabstine, Fokienyl, Orthocumène, Ortho-Fokène, Touranol, Touranyl.*
- Lab. Baude, St-Aubert (Nord). — *Anthraxeptol, Emonctine, Syphonéol.*
- Lab. P. Baude, 72, r. St-Dominique, Paris. — *Nestosyl (Pommade, Solution huileuse, Suppositoires, Ovules), Sérocarbone.*
- Lab. Spécial Bazin, H. Garraud, pharmacien, 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux (Gironde). — *Opothérapie Bazin.*
- Lab. B. C. L., 29, fg de Bourgogne, Orléans. — *Alsodine, Gastrépatine, Naza capsules, Mictoseptol, Totaltonic.*
- Lab. B. E. A., 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine, Curoxyure.*
- Lab. Beaufour, 18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.). — *Romarène.*
- Lab. Beaugourdon, 43, av. Kléber, Paris. — *Crème Lygie, Fluosalyl Beaugourdon, Laxatif Fluol, Pandermol (amp. et pommade), Pâte Magali, Sirop Magali.*
- Lab. Beaulieu, 40, bd de Charonne, Paris. — *Ferandrine Vitalis, Fer-Ovarine Vitalis.*
- Lab. Beauxis-Lagrave, 72, quai Jemmapes, Paris. — *Acatar, Bensamine, Calomel R. B. Lagrave, Cérébrinol A et B, Dragées Vityl, Infusion orientale RBL, Kamara C. 47, Myrcol, Néophos, Palpitine, Pipérazine RB Lagrave, Prostatols, Rubargyre, Sédartine.*
- Lab. Bebia, 5, av. E.-Boissier, Nantes (Loire-Inf.). — *Dra-coline, Pommade et Poudre Bebia, Rossoline Lefort. Savon et Suppositoires Bébia.*
- Lab. du Spécifique Bejean, 12, rue des Hospitalières-St-Gervais, Paris (IV^e), et 30, r. des Francs-Bourgeois. — *Spécifique Bejean.*
- L. Belières, 19, rue Drouot, Paris. — *Antirrhoïde, Arachise, Biophène, Dépuratif Kromelinck, Désensibilysine. Eusomnine, Laurénol, Lubrokal, Opo-plasma, Orthogénol, Polycaulère, Radio-Salil, Recresal, Sirop Gribell, Uromil, Vaccins Ivago (procédé L. Goldenberg), Vitagar.*
- MM. Benderitter et Cie, Vendôme (L.-et-C.). — *Cynhépatil, Gastrocaol, Neutralcaol, Sulfoléine, Trisodyl Rozet.*

- Lab. du Dr Bengué et fils, 16, rue Ballu, Paris (IX^e). — *Baume Bengué, Chloréthyle Bengué, Dragées Bengué, Néseptol Bengué, Opticura Bengué.*
- Lab. H. Benoit, Poligny (Jura). — *Arshémo, Fer B.*
- Lab. Berger, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Alliocardia, Calciphose, Glutinettes d'Aspirine, Gynéose, Mariode, Ostéoglandulol, Valéronal.*
- Lab. Bergevin, Châteaudun (E.-et-L.). — *Arrhénuclène.*
- Lab. Bernamont, 87-89, rue du Commerce, Nevers (Nièvre). — *Pommade et Gouttes Bernamont.*
- Lab. Bernard Garcin, St-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse. — *Mucyllium.*
- Lab. G. Bernhard, 11, rue La Fayette, Paris. — *Ampéline Bernhard, Ampelicoûnes Bernhard, Arthropyrine Bernhard, Essence Alsacienne du Dr Frech, Gouttes Sédatives Bernhard, Granules des Vosges, Kélénol Bernhard, Kyralgine Bernhard, Poudre antigestralgique Bernhard, Sirop Sédatif Bernhard.*
- Lab. G. Berthon, Dornes (Nièvre). — *Asthmo Actine Berthon.*
- Lab. A.-G. Berton, 61-63, r. Danrémont, Paris (XVIII^e). — *Dilubyl.*
- Lab. A. Besnier, 1, rue Raynouard, Paris. — *Seneçonine.*
- Lab. R. Beurton, 2, rue Joubert, Paris. — *Poudre Mass Plastique.*
- Lab. de la Bexinine — L. Colin, 19, rue Saint-Jean, Caen (Calvados). — *Bexinine.*
- Lab. Beytout, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl, Carbonésie, Dentoma, Hista-Histamine, Hordénol, Kaolinase, Kaolinase Belladonée, Lactoma, Lait de Magnésie, Suppol, Thiophyl, Tisane Cisbey, Véryl.*
- Lab. du Bi-Ci-Pa, 62, r. du Gros-Noyer, Ermont (S.-et-O.). — *Bi-Ci-Pa.*
- La Bière des Nurses, Bourg-la-Reine (Seine). — *Bière des Nurses, Concentré des Nurses.*
- Lab. du Bilifluol, 44, rue Marcel-Sembat, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). — *Bilifluol, Hormocarnyl, Sanuryl, Veinoflux, Veinotensyl.*
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, Dr en pharmacie), 19-21, rue Van-Loo, Paris. — *Arsénos solvant, Collusulfar, Ektophanol, Sulfarsénol.*
- Lab. Biochimique de l'Est, Lure (Hte-Saône). — *Citronai, Sirop Poléry.*
- Lab. Biolabo, 9, bd Malesherbes, Paris. — *Demorphène, Euneryl.*
- Lab. d. Biologie médicale et de Dermo-thérapie, 8, avenue Walkanaer, Nice. — *Antipiol, Desartyl (ex Detensyl) Entérofagos, Rhino-Antipiol.*
- Lab. Biologique de l'Ile-de-France, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e). — *Aloplastine, Iodocalcium, Neurocalcium. Pâte à l'eau Aloplastine, Sirop Iodocalcium, Sirop Sédatif Neurocalcium.*

- Lab. La Biomarine**, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthrilose*, *Ionyl*, *Marinol*, *Plasmarine*.
- Lab. du Bionéol**, 14 r. Périgueux, Angoulême. — *Bionéol*, *Vamétol*.
- Lab. de la Biopausine**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Ergocoline*, *Leucolyse*.
- Lab. de la Biorégine**, P. Chambron, Portes (Drôme). — *Biorégine*.
- Lab. Biosedra**, 37, rue Brochant, Paris (XVII^e). — *Algonal*, *Gastéose*, *Hépanova*, *Nuclergol*, *Sympathocrine*, *Veinogène*.
- Produits de la Biothérapie**, H. Villette et Cie, pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, Paris. — *Antivirus*, *Arapal*, *Bili-vaccins*, *Cellucrine*, *Crysiodal*, *Sanogy*, *Sanoram*, *Spirogyl*, *Uroscléral*.
- Lab. du Bismucarbonate**, 7, Petite Place, Douai. — *Bismucarbonate*.
- Lab. du Bissyl**, 117 ter, r. Ordener, Paris. — *Bissyl*, *Néocrinol*.
- Lab. du Blagny**, R. Paméla, pharmacien, 85, rue Turbigo, Paris (III^e). — *Blagny* (*Dragées*, *Gouttes*, *Sirop*), *Vitarsenic*.
- Lab. Pharmaceutiques A. Blanc**, Barcelonne-du-Gers (Gers). — *Germoléol*, *Hervoglan*, *Muoleol*.
- Lab. J. Blanchard**, Pont-de-Vaux (Ain). — *Acéryl*, *Cachets du Dr March*, *Collène*, *Nuclarrhol*.
- Lab. A. et M. Blancher**, Vichy (Allier). — *Hépaline*, *Vichy Amaigrissant*.
- Lab. Blanchot**, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris. — *Toni-veinine*, *Solution Watelet*.
- Lab. Bloch**, Tomblaine près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-root*, *Blokao*, *Farines de régime*, *Farines de céréales*, *de légumes et de fruits*, *Rapidoats*, *Semoules et flocons de céréales*, *Tapiocas*.
- Usine-Labor. du Blosset**, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Beef Lavoisier*, *Carnéose du Dr Spès*, *Dépuratif Berry*, *Elixir supertonique Stella*, *Gargarinal*, *Gastrosaline*, *Iasthol*, *Manganéol*, *Neurogénol*, *Peptovitine*, *Potion du Dr Henry*, *Pulmovitine*, *Radiobiogyl*, *Vin de Carnéose*, *Vin surtonique du Val Notre-Dame*, *Vitaphorine*.
- Lab. Blouin**, 50, r. de Turenne, Paris. — *Adénoseptyl*, *Fluocholine*, *Okamine simple*, *Okamine cystéinée*, *Okamine dragées*, *Poudre Danica*, *Suryali*, *Trinobenzyle*.
- Lab. H. Boissel**, 295 bis, rue de la Benauge, Bordeaux. — *Mygdal*, *Néoral*, *Opomygdal*, *Paxanus*, *Potion Boissel*, *Thé d'Albret*.

- Lab. P. Boivert, Montguyon (Char.-Inf.). — *Hépatogénine*, *Pommade Parvy*.
- Lab. Boize et Alliot, 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. — *Alzine*, *Atomine*, *Diurobromine*, *Diurocardine*, *Diurocystine*, *Logaphos*.
- Lab. du Boldochol, 145, chem. de la Madrague de Montredon, Marseille (B.-du-R.). — *Boldochol*, *Elixir Percy*, *Heinobiose*, *Microbol*, *Sirop Burgical*, *Sirop Rhégia*, *Uribiol*.
- Lab. du Boldocyna, A. Jourdin, 6, avenue Victor-Hugo, Paris. — *Boldocyna*.
- Lab. Bomel, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer*, *Collutoire V.-E. Doumer*, *Pilules V.-E. Doumer*, *Pommade V.-E. Doumer*.
- Lab. Bonetti, 60, rue E.-Dolet, Malakoff (Seine). — *Diadermine*.
- Lab. Bordelais, 49, rue Maleret, Bordeaux. — *Cephœmetine*, *Chelicyne*, *Gelciver*, *Phosphosodine*, *Physioscyamine*, *Poudre Arria*, *Solacitrine*, *Sulcichlorine*.
- Lab. Borne, 79, r. de Paris, St-Denis. — *Diocamphine*, *Dionine*, *Thiosédal*.
- Lab. Bornet, 5, bd des Brotteaux, Lyon. — *Bismuth B3*.
- Lab. Bottu, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Codoforme Bottu*, *Gaze néolée*, *Néalgyl Bottu*, *Néol*, *Néolides*, *Ovunéol Bottu*.
- Lab. A. Bouchand, Pharmacien, Melle (Deux-Sèvres). — *Basmyl*.
- Lab. E.-Bouchara, 47, r. de Bretagne, Paris. — *Belanesie*, *Bifolarsine*, *Biphédrine Aqueuse*, *Biphédrine Hui-leuse*, *Epanal*, *Neo-Codion* (*Gouttes et Dragées*).
- Lab. P. Bouchereau, 57, bd Aristide-Brland, Champigny (Seine). — *Begessol*, *Diphasol*, *Phéniodine*, *Saliformiode*.
- Lab. Boucly, Grande-Place, Louvroll (Nord). — *Hepentéryl*.
- Lab. Boudin, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Ré-vulsif Boudin*.
- Lab. Bouillet, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne*, *Sous-Nitrate de Bismuth Tulasne pur*, *Iode Tulasne*.
- Lab. H. Bouisset, Pharmacien, 18, bd de Strasbourg, Albi (Tarn). — *Néosédyl*.
- Lab. H. Boulay, 62, r. de Montreuil, Paris. — *Calcériode Marin*.
- Lab. G. Boulet, 14, rue Eug.-Delacroix, Paris (XVI^e). — *Cratamol*, *Dragées de Prasion*, *Stomacol*.
- Lab. E. Boule, 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine). — *Cataplasme du D^r Lelièvre*, *Géranine*, *Rachisténine*, *Sérosine Boule*, *Vermitox*.

- Lab. du Dr Bourdeau**, Parthenay (Deux-Sèvres). — *Détergine*.
- Lab. Bourillot**, 6, r. Berbisey, Dijon. — *Bourdainol* (comprimés), *Bronphélia*, *Bronchialis*, *Bronchophilos*, *Bronxia*, *Choleocytol*, *Dragées* et *Elixir aux Algues-Marines*, *Hétraménol*, *Jouvén B*, *Lacta*, *Morufine*, *Odochloraline*, *Polycalcose*, *Renovir*, *Sirop Chevassus*, *Toxiuról*, *Vermus* (sirop).
- Lab. Jean Boutes**, rue Clément-Ader, Muret (Haute-Garonne). — *Drosol*.
- Lab. Bouteille**, 23, r. des Moines, Paris. — *Balseptol*, *Cantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Pulmorectol*, *Pulmovaccin*, *Tubérol*, *Vaccinovules*.
- Lab. R. Boutin**, 8, rue Aumont-Thiéville, Paris (XVII^e). — *Iso-Sels*, *Orthocynol*.
- Lab. Boutroux**, 25, rue du Général-Foy, Paris (VIII^e). — *Comprimés Chloripepsine*, *Comprimés Fluvia*, *Microderme* (crème et solution), *Soja Soyolk*, *Streptoderme Végélact*.
- Lab. Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol*, *Gastrozymase*, *Globépal*, *Liqueur Bouty*, *Liqueur Thyro*, *Liquides organiques injectables*, *Métasérum*, *Métharfer*, *Métharsol*, *Néphrine*, *Opostyl*, *Opothérapie Bouty*, *Oviginine*, *Produits Pennès*, *Sérosthényl*, *Sirop de Gaïarsol*, *Surrénaline*, *Thyroïdine*, *Triglandine*, *Triglandol*, *Vaxitiol Bouty*.
- Lab. Bouvot**, Auvers-sur-Oise (S.-et-O.). — *Bichlorone*, *Oéréliode*, *Pastilles Arvox*, *Rhinarvox*, *Sulfoxyne*, *Yro*.
- Lab. Bouyssou**, Chambois (Orne). — *Biophytol*, *Helenine de Korab*, *Panhémol*, *Peptozym*.
- Lab. Boyer**, 12, r. Pavée, Paris. — *Phosbiose*, *Radiogastrol*.
- Lab. Bracquemond et Cie**, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuéine Jungken*, *Morrhuéine Jungken Vitaminée*, *Sel d'Ewald*.
- Lab. d'Analyses Bréant**, 11, r. de Clichy, Paris. — *Cédrosan*, *Chlorure d'Ammonium Bréant*, *Daturasolène*, *Lycobile*, *Neurosolène*, *Osmo-Vaccins Bréant*, *Paragelose*, *Phostone*, *Précy*, *Tegeol*, *Vanotonyl*.
- Lab. Ch. Brésil**, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol*, *Sanguil*.
- Lab. Brichard et fils**, 23, bd Raym.-Poincaré, Bar-le-Duc. — *Baby Bala*, *Bronchorose*, *Dépursan*, *Forvital*, *Hémovéine*, *Inhalopin*, *Isalaxine*, *Nuxiodine*, *Nydol*, *Pastilles Bala*, *Pastilles Debar*, *Sirop Bala*, *Sirop Debar*, *Tisane Bala*, *Thyroguine*, *Tonixyl*, *Vigostérol irradié*.
- Lab. Brisson**, 157, rue Championnet, Paris. — *Ampoules Egralène*, *Ampoules huile soufrée*, *Ampoules Sigmuth*, *Anytal Brisson*, *Bainsulphium*, *Cathiode Brisson*, *Denisia*, *Denisoline*, *Dithioléine Brisson*, *Dolisetti*, *Entéricure Brisson*, *Jovine Brisson*, *Lacodermes Brisson*, *Lenicade Brisson*, *Licardet Brisson*.

- Néo-Séti, Procuta Brisson, Savon Denisol Brisson, Vaposulphium, Vulcase Brisson, Vulcapil Brisson, Uriclarine Brisson, Septylase Brisson, Seti.*
- Lab. du Broncho-Lactol**, 6, place de l'Académie, Angers. — *Broncho-Lactol, Lithinés Magnésis Maxim.*
- Lab. P. Brothier**, 20, rue Henri-Martin, Vanves (Seine). — *Axonal, Emencyl, Neuronal.*
- Lab. Bruneau et Cie**, 17, rue de Berri, Paris. — *Bains de bouche à la Duna-caïne, Brunyl, Cutiphile, Cutiplaste, Duna-caïne, Duna-caïmol, Lobéline, Paraffinoléol, Paremanol, Sénophile, Sérum de Jousset, Théophylline Bruneau.*
- Lab. A. Brunot**, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl, Sel de Hunt.*
- Lab. Brunschwik**, 3 bis, rue Vallier, Levallois-Perret. — *Parvula, Tonique Rouveray.*
- Lab. Buriat**, 25, rue Copernic, Paris. — *Arséniode Buriat, Vériane Buriat.*
- Étab. Byla**, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. — *Adrénaline Byla, Adrénopituine, Amino-sel, Amunine, Antélobine, Di-Iodotyrosine Byla, Di-bromotyrosine Byla, Energétènes Byla, Ergotinine Tanret, Galactogène Byla, Géo-Pansements, Géllopeptone, Hémosérol, Héparmone, Hépat-Musculosine, Hormoduodine, Hormoflavéine, Hormovarine, Insuline Byla, Irrastérine, Musculosine Byla, Neurotrophol, Paralactine, Paratyrone, Peptone Iodée Byla, Pelletière Tanret, Peptone Byla, Phylactone, Phytosphosphine, Phytogénine, Pituilobine, Soleurone, Splénamine, Splénarmone, Splényl, Surrasthénine, Thyrattoxine, Thyroxine Byla, Vagotonine, Vitadone, Vitamine B¹ Byla, Vitamine B² Byla, Vitamine C Byla, Vitamine E Byla, Vitaminol.*
- Lab. des Spécialités Cabasson**, 183, rue de Rome, Marseille. — *Cyto-Sirop, Dynosthène, Granulé Cabasson, Pulmo-septine.*
- Lab. Caducia**, 95, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). — *Clinax, Drainochol, Inacrine, Phosphan Caducia.*
- Lab. Caillaud**, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine, Choléo Combretol, Cyanhermine, Hydralin, Mucosodine.*
- Lab. H. Calas**, 162, rue de l'Hay, Gentilly (Seine). — *Intestartol.*
- Lab. du Calcio-Dynamil**, 45, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — *Calcio-Dynamil.*

- Lab. Calmel-Domergue**, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsétonyl, Arthricétol, Biiodures Domergue, Dermobel, Ephédro-Rhinol, Eucalcyl, Gonurol A et B, Guinitrol, Hexarubrine, Iodures Domergue, Pangynol, Pharyngaseptyl, Polydigéral Calmel, Promulier, Sanguinova, Vaso-rhinol simple, Vaso-rhinol mentholé, Vaso-rhinol adrénaliné, Viscosodine.*
- Lab. Calmopelvine-Calmovarine**, 192-194, r. St-Denis, Paris. — *Calmopelvine, Calmovarine, Suppositoires Calmopelvine, Suppositoires Calmovarine.*
- Lab. des Calmosuppos**, La Mothe-Ste-Héraye (Deux-Sèvres). — *Calmosuppos antithermiques, Calmosuppos sédatifs.*
- Lab. Camuset**, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal, Pyrétane, Silicyl.*
- Lab. du Canol**, Maizet (Calvados). — *Canol.*
- Lab. Cantin**, Palaiseau (S.-et-O.). — *Comprimés Nican, Gouttes Nican, Somnothyrid.*
- Lab. A. Capitrel**, 16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris. — *Aortol.*
- Lab. du Carbonal**, 14, rue Cantin, Courbevoie (Seine). — *Carbonal.*
- Lab. Carbou**, 8, rue Jean-du-Bellay, Paris. — *Cholélyse.*
- Lab. René Carlier**, 43, r. de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine). — *Colarsénol collutoire, Colarsénol pommade nasale, Infangyl Carlier, Rectosoté.*
- Lab. de la Carnine Lefrancq**, 32, av. de Metz, Romainville (Seine). — *Bovcardiac, Bovhépatie, Bovstrol, Carnine Lefrancq, Extrait de bile Lefrancq, Extrait hépatique Lefrancq, Hépatocarniné Lefrancq.*
- Prod. Biologiques Carrion**, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Adrénaline, Antasthène, Cardio-Streptine, Coliflorine, Dyspeptine Hepp, Entérococcène, Eukinase, Evatmine, Gonagone, Hématoéthéroïdine, Hépaglycérol, Hépanème, Lactifère, Lactoprotéide, Lactosérum, Opothérapie Carrion, Ovules au Gonagone, Pancréatokinase, Per-Extraits, Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Surrénalien, Per-Thymique, Phlébosine M. et F., Plasma de Quinton, Rétro-pituine, Solution du D^r Jacobson, Staphylagone, Utéro-Streptine, Vaccins Carrion.*
- Lab. Carrion-Lagnel**, 5, rue du Capitaine-Scott, Paris. — *Babeurres, Kéfirogène, Laits Carrion, Yohourthogène.*
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amipène, Fosfoxyl, Fosyls.*
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxène, Cétémol, Chrysemine Carteret, Diurène, Euronol, Fermentérol, Lusoforme, Sinahin, Vulcrinol.*
- Lab. du Castanol**, 9, pl. Municipale, Tulle. — *Castanol, Dépurgatif Sainte, Thionaphie.*

- Lab. Castel**, 1, pl. Bouquerie, Nîmes. — *Oxyfuge*, *Pavonol*, *Tœnifuge*, *Vermifuge Castel*, *Zogol*.
- Lab. Catillon**, 3, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Glycérine Catillon*, *Iodo-thyroidine Catillon*, *Peptone Catillon*, *Strophantine Catillon*, *Strophantus Catillon*.
- Lab. du Dr R. Cavaillès**, 29, r. Singer, Paris (XVI^e). — *Coloplastre*, *Crème du Dr Rap*, *Crème de Quinine-Sapolan*, *Emplâtres Rogé-Cavaillès*, *Extrait du Dr Rap*, *Gaze Anadhère*, *Lait de Cèdre Sapolan*, *Lait de Sapolan*, *Lait de Soufre Sapolan*, *Poudre de Soufre Sapolan*, *Sapobarbe*, *Sapocade*, *Sapocrème*, *Sapolan*, *Sapopâte*, *Sapoxide*, *Savon de Sapolan*, *Sulfostan*, *Tisane dépurative de Cavaillès*.
- Lab. du Cellulax, M. Pion, pharmacien**, Quai Jeanne-d'Arc, Chinon (I.-et-L.). — *Cellulax*.
- Lab. Central**, 129, rue de Turenne, Paris (III^e). — *Lactaris*.
- Lab. Central de la Bastille**, 3, bd Beaumarchais, Paris. — *Capsules Ricord*, *Cimalvol*, *Endolcalcine*, *Ferogyl*, *Inhalogène*, *Iodamol Michel*, *Iodo-Brou*, *Lactalvose*, *Mensalgine*, *Saturalgine*, *Sédasthmine*.
- Lab. Central de Paris**, 122, fg. St-Honoré, Paris. — *Oléthyle Benzyle*.
- Lab. R. Cerbelaud**, 82, av. de Suffren, Paris. — *Hydrargyre-Boulard*, *Iodure-Boulard*, *Magnésium-Boulard*, *Or-Boulard*, *Protargol-Boulard*.
- Lab. de la Cérébrine Fournier**, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris (XIV^e). — *Cérébrine Fournier*.
- Lab. Yves Chabrol**, 29, avenue d'Orléans, Paris. — *Gastrosthénol*, *Huilorhine*, *Quotibyl*.
- Lab. Pharmaceutiques Chabre Frères**, Toulon. — *A 313*, *Vitaol*.
- Lab. Chaix**, 8-10, rue Alphonse-Bertillon, Paris (XV^e). — *Colloïdogénine du Dr Bayle*, *Polyvaline du Dr Bayle*, *Splenomedulla* (opothérapie splénique et médullaire).
- Lab. Chalas**, 75, rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. — *Kolatinés*.
- Lab. Chamard et Niel**, 3, rue Royet, Lyon-Caluire. — *Bismusodine*, *Calmobro-Niel* (ex *Kalmobrol*), *Ergephos*.
- Lab. Chambon**, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciatique P. Chambon*, *Angoral*, *Algoil du Dr Guiraud*.
- Lab. Chanteaud**, 3 et 5, rue Alex.-Dumas, St-Ouen (Seine). — *Granules Chanteaud*, *Kénapirine Chanteaud*, *Sedlitz Chanteaud*, *Sténol Chanteaud*, *Sulphydral Chanteaud*, *Uréol Chanteaud*.
- Lab. Chantereau (Prod. Innothéra)**, 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot'Hamélis*, *Tot'Héma*.

- Lab. **A. Chapellier**, Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire). — *Curamida*.
- Lab. **Chapotot**, 56, bd Ornano, Paris. — *Néo-laxatif Chapotot*, *Rhizotannin Chapotot*.
- Lab. **des Charbons Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzoate de naphthol Fraudin*, *Biscols*, *Carboiodures Fraudin*, *Charbon Fraudin naphtolé*, *Charbon Fraudin simple* (granulés, comprimés, dragées), *Laxol Fraudin*.
- Lab. **Alph. Charmaison**, 26, av. de Royat, Chamalières-lès-Clermont-Ferrand (P.-de-D.). — *Dragées de Royat*, *Gobérol*, *Hépatofomine*.
- Lab. **E. Charpentier**, 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris. — *Boldolaxine*.
- Sté des Mines de Charrier**, Laprugne (Allier). — *Charrier* (*Eau Minérale Naturelle Vivante*).
- Lab. **Chartier**, Saumur (M.-et-L.). — *La Myrtille pure H. Chartier*, *Le Raisin quotidien*, *Le Suc Normand*.
- Lab. **Pierre Château**, 33, rue du Bois, Vincennes. — *Digéryl*, *Gélaux*, *Inhalyl*, *Sinuzyl*.
- Lab. **Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Yse*, *Hémagenine Giraud*.
- Lab. **Chatron**, 45, r. Cambronne, Paris (XV^e). — *Bolæomucyl*, *Dystonine*, *Jamax*, *Normucyl*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue La Fayette, Paris. — *Isotonyl* *Bouret* (poudre de Lausanne), *Normatensol*.
- Établ. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — *Acœgénol*, *Atropophédrine*, *Cachets Chauvin au Quinocitrate de Lithine composé*, *Collohirtol*, *Comprimés Chauvin à l'extrait d'Alibour*, *Dépuratif Chauvin aux hyposulfites*, *Désensibilisant Chauvin*, *Ergophédrine*, *Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure*, *Gouttes Chauvin à la Sclérocure*, *Laborol*, *Lactoscoparine*, *Paratyl*, *Phocéol*, *Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine*, *Sirop de Sozopectone*, *Ephédriné*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. **L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e). — *Asthmo-lène*, *Cachets Spévin*, *Glucamonix*, *Glucocithine*, *Gluconyl*, *Glucosium*, *Gluquinix*, *Lévulinyl*, *Olégel*, *Sélor*, *Solubéol*.
- Lab. **Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Fornosé*, *Suppositoires Pyrax* (bébés, enfants, adultes).
- Lab. **R. Chemineau**, Vouvray (I.-et-L.). — *Gargyl*.
- Lab. **Chenu**, Montferrand (Puy-de-Dôme). — *Bromocodéine* *Chenu*, *Digestal*, *Sulfoterpinol* (élixir et cachets).
- Lab. **Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Bilio-gastrine*, *Bylac*, *Morisland*, *Nucléigène*, *Paradoxex*, *Paradoline*, *Stoméol*.
- Lab. **Chevretin-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir Lab. Lematte et Boinot).

- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Elixir vermifuge Chiarini*, *Tœnifuge* du D^r Jaquème.
- Lab. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Collyres et Pommades*, *Chibret « Optima »*. *Chibromercurobrome* sous toutes ses formes, solution, ovules, ampoules lavages et ampoules injectables.
- Lab. de « Chimie appliquée de Nanterre »**, 31, r. du Chemin-de-Fer, Nanterre. — *Néotrophène*, *Tricarbone* *Le-franc*.
- Lab. de Chimio-Opothérapie**, 22, rue de Turbigo, Paris. — *Balsofumine simple et mentholée* à 1 et 4 p. 100, *Balsorhine* (Huile, Capsules, Pommade), *Nucléinovarine*, *Pepsobyl*.
- Sté Chimique de Vichy**. — P. V. Léger, Saint-Pourçain (Allier). — *Cupranine*.
- Lab. de la Chloralgine**, 3, cours Gambetta, Cavaillon. — *Chloralgine*.
- Lab. Choay**, 48, av. Théophile-Gautier, Paris (XVI^e). — *Opothérapie Choay*: *Extraits totaux*, *Extraits injectables*, *Peptosthénine*, *Post-Hypophyse*, *Synchrines* *Choay*.
Adrénaline Choay, *Gélotanin Choay*, *Insuline Choay*.
- Lab. du Chocynol**, Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or). — *Chocynol*, *Pommade Ascigué*.
- Lab. Christiaens**, D^r René Marq, S^r (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale), 4, rue Colbert, Reims. — *Antialgos Christiaens*, *Benzophosphine Christiaens*, *Capsules Goubaux*, *Pilules anhépatiques Christiaens*, *Pilules prophylactiques Christiaens*, *Sédatine Christiaens*.
- Lab. des Produits du D^r Churchill**, 12, rue de Castiglione, Paris. — *Fosfomagnyl Churchill*, *Limol Churchill*, *Magol Churchill*, *Poliol Churchill*.
- Lab. Ciba**, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomensine*, *Androstine*, *Ascéine*, *Atoquinol*, *Cibalgine*, *Coagulène et Hémocoagulène*, *Coramine*, *Dial*, *Didial*, *Digifoline*, *Elbon*, *Entéro-Vioforme*, *Ferrophytine*, *Fortossan*, *Fortossan irradié*, *Hémypnal*, *Lipoiodine*, *Perandrone*, *Percaïnal*, *Percaïne*, *Périsaltine*, *Phytine*, *Quinino-phytine*, *Résyl*, *Salène-Salénal*, *Sanoquinol*, *Sistomensine*, *Trasentine*, *Vioforme*.
- Lab. Léon Claeys**, 1, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Babeurre Nutricia*.
- Lab. Clartyl**, Bapaume, pharmacien, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. — *Histaclartyl*.
- Lab. du D^r J.-P. Clary**, Vauris, pharmacien, 72, av. Kléber, Paris (XVI^e). — *Iodo-Magnésium*.
- Lab. Claverie**, pl. Carnot, Romainville (Seine). — *Occi-Gourme*, *Stomobrol*.
- Lab. Clin**, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris (V^e). — *Adrénaline Clin*, *Arsaminol*, *Arsénobenzènes*, *Aséphéine*,

Cinnozyl, Electrargol, Electrauro, Electrocuprol, Electro Hg, Electromanganol, Electromartiol, Electropalladiol, Electro-platinol, Electro-Rhodiol, Electro-sélénium, Elixir Deret, Enesol, Génisténal, Néo-Tréparsénan, Odarsol, Padéryl, Salicylate de soude Clin, Scorogènes, Sérums Clin, Sirop Buci, Sirop d'Aubergier, Sirop Rabutteau, Sirtal, Solurol, Sparlo-Camphre, Sparoval, Vaccins Clin, Valimyl Clin, Vin Nourry.

- Lab. Cluzel**, 60, cours Émile-Zola, Lyon. — *Goultes Milko, Mictualine, Révulsif Milko, Tablettes Zéva, Tonique Zéva.*
- Lab. de la Cobratoxine** 87, rue Denfert-Rochereau, Paris. — *Cobratoxine nouvelle (Katox).*
- Lab. des Produits Cody**, Brive-la-Gaillarde (Corrèze). — *Iodo-Citrol.*
- Lab. des Prod. Cognet** (Armingeat et Cie), 43, rue de Saintonge, Paris (III^e). — *Tiodine Cognet, Thiosinamine Cognet, Agonol Cognet, Capsules Cognet, Dragées de fer Cognet, Dragées Dubourg, Hémoneurol Cognet.*
- Lab. A. Coirier**, 69, av. du Maine, Paris. — *Codérax, Marrucol, Tisane Borkou.*
- Lab. du Dr Coirre**, 5, bd Montparnasse, Paris. — *Allium Coirre, Juranol, Solucalcine.*
- Lab. Colas**, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Apaisyl, Argy, Ascle, Baldisédan, Choléolax, Filhosa, Gaïacanthine, Gynoster, Marrusera, Nitracaine, Pulmoseptol, Rhinorcine, Urocarbol benzo-naphtolé.*
- Lab. du Colizyl**, 15, r. de Chilly, Longjumeau (S.-et-O.). — *Colizyl.*
- Sté des Prod. Collas et Boudault**, 35, av. de Beauté, Le Parc-St-Maur (Seine). — *Pyrélaïne Collas.*
- Lab. de la Collocrine**, 155, bd Aristide-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.). — *Citrolactine, Collocrine, Pyodont « 21 », Sécurigène, Sédangor, Sternol, Stomolan.*
- Lab. des Collovaccins**, 74, r. Blanche, Paris (IX^e). — *Collovaccins.*
- Lab. Colonial**, 21, rue Mouton-Duvernet, Paris (XIV^e). — *Mosti, Périol Soulié, Phosphonine Soulié, Tricophan.*
- Lab. Columeau**, 24, r. Flégier, Marseille. — *Custodine, Poudre Cassarini.*
- ab. Combefreyroux**, 134, av. Parmentier, Paris (XI^e). — *Combey-Lax.*
- Lab. Comte**, 60-62, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Marrubiase, Rythmosystol.*
- Lab. Condou et Lefort**, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — (Voir *Trouette-Perret*).
- Lab. C. Cons**, rue des Écoles, Chambéry. — *Juglane.*
- Lab. du Comtat Viticole**, Avignon (Vaucluse). — *Jus de Raisin Fructural.*

- Lab. Coquelu**, Digoïn (S.-et-L.). — *Compressif Beslier*, *Coqluplaste*, *Thermoplaste*, *Tulle rose Beslier*, *Vésicatoire Rose Beslier*.
- Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose*, *Benzylcalcium*, *Broncho-Vaclydun*, *Calcium Corbière*, *Cellargos*, *Coli-Vaclydun*, *Créagénol*, *Cyto-Carbone*, *Cytocholine*, *Cytomanganol*, *Cytophédrine*, *Cyto-serum*, *Cyto-Strychnine*, *Dermaline*, *Entéro-Vaclydun*, *Fixococcine*, *Gono-Vaclydun*, *Gynéco-Vaclydun*, *Grippo-Vaclydun*, *Hémo-cytosérum*, *Iolase*, *Lacto magnésie Vita*, *Novarsénobenzol*, *Oléoformine*, *Oliolase*, *Ophtalmiso 8*, *Opolaxyl*, *Paludase*, *Pantavoïne*, *Pyo-Vaclydun*, *Rhino-Vaclydun*, *Sérum antrasthmaticque de Heckel*, *Staphylo-Vaclydun*, *Strepto-Vaclydun*, *Suppositoires à l'arséno-benzol Corbière*, *Vaclyderm*.
- Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — *Névralgol Brossard*.
- Lab. Corteel**, 74, rue de La Fère, Saint-Quentin (Aisne). — *Citra-Quint*, *Dio-Quint*.
- Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Androcalcion*, *Cortiode*, *Gynocalcion*, *Iodaseptine*, *Iodaseptine salicylée*, *Lita*, *Septicémine*, *Vitamine D Cortial*.
- Lab. Cospha**, 76, rue des Jacobins, Amiens. — *Génaldyl*, *Isotonine*, *Prophylactyl*, *Viristhène*.
- Lab. Coter, P. Mortheyrol**, pharmacien, 11, place Sainte-Eulalie, Bordeaux. — *Pilules Coter*, *Uroxyl*.
- Lab. Couderc**, 28, rue du Four, Paris. — *Pyrallium*.
- Lab. Coudert**, 13, rue Antoine-Vollon, Paris (XII^e). — *Hémostatique Coudert*.
- Lab. R. Coudert**, 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis Robinson (Seine). — *Hépartichaut*.
- Lab. Coulloux**, 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne). — *Baume Kalendol*, *Pectoral Coulloux*, *Sirop Brahma*.
- Lab. A. Cousin**, r. Albert-I^{er}, Beaumont-sur-Oise (S.-et-O.). — *Chélibile*, *Sténic*.
- Lab. G. Coussinet**, 20, rue des Martyrs, Paris. — *Bursol*, *Codocol*, *Gastro-Sédatif Alcia*, *Opotonine*, *Sodamine*, *Sulfolax*, *Utersan*, *Vagosedyl*.
- Lab. du Dr Couture**, 25^{bis}, quai de la Bibliothèque, Lyon. — *Jécoboldine*, *Jécolaxine*, *Jécosedyl*.
- Lab. Couturier**, 18, av. Hoche, Paris. — *Anti-paludique*, *Argolion*, *Aurion*, *Azufrol*, *Bismulhion*, *Bromiase*, *Collargol*, *Cuprion*, *Cytuline*, *Diurétique*, *Fébrifuge*, *Fer-ion*, *Glésol*, *Glycolactimase*, *Héracléine*, *Iodurase*, *Lactimase*, *Lantol*, *Levurine extractive*, *Levurine brute*, *Métaux colloïdaux*, *Cénase*, *Panglandine*, *Plurion*, *Polyformiate*, *Séléniol*, *Selvan*, *Spasma*, *Stanion*, *Sulfurion*, *Thyroidine*, *Zymion*.
- Lab. Couvert**, 11, rue de Mogador, Paris (IX^e). — *Bil Soda*, *Gastroniger*, *Harledine*.

- Lab. de la Créoformine, 18, r. de Jouvence, Dijon. — *Créoformine*.
- Lab. Creuzé, 74, rue de Lourmel, Paris. — *Antixénol*, *Cholégastrol*, *Crèmes-Vaccins*, *Eucratol*, *Laxafégine*, *Polyseptol*, *Rhino-sec*, *Rhino-Vaccin-Creuzé*, *Sténophos*, *Strychnophyl*, *Vaccin M. A.*
- Lab. Crinex-Uvé, 1, avenue du D^r Lannelongue, Paris. — *Crinex*, *Folliculine*, *Crinex*, *Frénovex*, *Orex*, *Uvé*, *Uvéstérol*.
- Lab. du Crinoflux, 41, rue Germain, Lyon. — *Crinoflux*.
- Lab. du Crino-Sérum, A. Mouré, pharmacien, passage des Princes, Paris (II^e). — *Crino-Sérum (Infantile et pour Adultes)*, *Elixir Morlas (pour Adultes)*, *Sirop Morlas (pour Enfants et Nourrissons)*.
- Lab. Crosnier, 44, rue de Lagny, Montreuil (Seine). — *Biosodine*, *Morubiase*, *Neuroflorine*, *Sirop Minéral sulfureux Crosnier*, *Stanno-Sufrol Crosnier*, *Sufrol Crosnier*, *Sufrolax Crosnier*.
- Lab. Crouy, Vernon (Eure). — *Urophényl*.
- Lab. de Phytothérapie du D^r Cuguillière, 19, r. des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal*, *Vin Pyrola*.
- Lab. R. Cuniasse, 63, av. de Wagram, Paris (XVII^e). — *Arg-Eph*.
- Lab. de la Curatine Brunet, 23, rue des Écouffes, Paris. — *Curatine Brunet*.
- Lab. de la Cynabiline, 38, quai des Minimes, Toulouse. — *Cynabiline*.
- Lab. Daguin, 7-13, rue Bobillot, Saint-Maur (Seine). — *Choléolactol*, *Novolactol*, *Pneumostyl*, *Purganol-Daguin*, *Rhinosthénol*.
- Lab. Dalayeun, 15, rue de Paris, Sannois (S.-et-O.). — *Sulfan*.
- Spéc. Pharm. C. Dalin, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine*, *Glycocarpine*, *Kydalose*.
- Lab. de l'Industrie de la Pomme, Dallery, 75, av. Victor-Hugo, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe). — *Jus Intégral de Pommes Fraîches « Dallery »*.
- Lab. Dalloz et Cie, 13, bd de La Chapelle, Paris. — *Antalgot*, *Glycérophosphate*, *Gosiérine*, *Hémoglobine*, *Tridigés-tine*.
- Laboratoires Daney, 134, cours de Verdun, Bordeaux. — *Cryptosote Néda*, *Tonique Néda*.
- Lab. Dagonnot, 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.). — *Artobyl*, *Charleben*, *Cinarascot*, *Colilactol*, *Neurophos*, *Uvécalcion*.

- Lab. A. Daniel Brunet**, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-Seine, — *Biocrina*, *Cholergine*, *Coréine*, *Hépatobyl*, *Neurène*, *Novo-Brol*, *Ostéo-hépatine*, *Ovobiol*, *Ovothyrol*, *Pulvita*, *Stal Kosal*, *Tænifuge Kirn*, *Tanno-Calcine*.
- Lab. Danjou**, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone*, *Pepto-Magnésie Vassal*, *Peptone Vassal*.
- Prod. Dannec'h** (MM. Brun et Martineau), 64, rue des Tournelles, Paris. — *Cachets Phébor*, *Chloridia*, *Cigares Gicquel*, *Laxia Dannec'h*, *Manganésia*, *Papier Gicquel*.
- M. J. Dardelet**, Bonnard (Yonne). — *Babeurre Dardelet*, *Laits Dardelet*.
- Établ. Darrasse**, 13, rue Pavée, Paris. — *Flétobiol*, *Pepto-fer du Dr Jaillet*, *Tamar Indien Grillon*, *Valérobromine Legrand*.
- Lab. Darrasse**, rue St-Maurice, Nanterre. — *Choléine Camus*, *Choléine lactique*, *Dragées Séranti*, *Eupnine Vernade*, *Lactobacilline*, *Magécarine*.
- Lab. Pharmaceutique Daufresne**, 42, rue Thiers, Le Havre. — *Clonazone*, *Hydroclonazone*, *Stéramine*, *Talcazone*, *Vaccin Provac's*.
- Lab. Daupez**, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.). — *Baume Fuba*, *Gouttes Dépuratives Fuba*, *Gouttes Pectiques du Dr Albert*, *Gynium*, *Myoden*, *Nasogyne*, *Panlaxyl*, *Santaline Daupez*, *Sirop Kérída*, *Sirop Pectiline*.
- Lab. Dausse**, 4, r. Aubriot, Paris. — *Ampoules Névrosthéniques*, *Bardane stabilisée*, *Belladone Dausse*, *Bromure de Codéine*, *Camphodausse*, *Carbodaussse*, *Collobiase d'Or*, *Collobiase de Sulfhydrargyre*, *Enterodausse et Enterodausse calcique*, *Fondants de soufre*, *Fondant Iodotannique*, *Gouttes Arsénosthéniques*, *Gouttes Phosphosthéniques*, *Granules Salicylle Dausse*, *Hémogénol*, *Hespéridausse*, *Hormodausse*, *Hypnodausse*, *Intrâits Dausse*, *Moréthyl*, *Paveron*, *Prostatidausse*, *Salicaire Dausse*, *Sédo-Hypotenseur Dausse*, *Sérodauasse*, *Stricteforme*, *Tisane hépatique Dausse*.
- Lab. du Dr Debat**, 60, rue de Monceau, Paris. — *Androsthénot*, *Exentérol*, *Filtrat Inosepta*, *Hépacrine*, *Hépa-peptine*, *Inogyl*, *Inolaxine*, *Inorénol*, *Inorhinyll*, *Inosepta*, *Inosepta ophtalmique*, *Inosphacérol*, *Inosplénol*, *Inotyol*, *Inoxémol*, *Inoxyl*, *Insévaccins*, *Ovules Inséva*, *Pancrinol*, *Pommade Inséva*, *Sédotyol*, *Siliplastine*.
- Lab. des Produits Debreyne**, Mortagne (Orne). — *Debreyrol*, *Neurosol*, *Tisane Debreyne*, *Traitement Anti-rhumatismal du Dr Debreyne*, *Vin Debreyne*.
- Lab. Dechâtre**, 20 bis, r. Sergent-Godefroy, Montreuil-sous-Bois. — *Boroseptine*, *Bronchoforme*, *Calco-Céril*, *Cérinil*, *Cériocalcine*, *Cériomine*, *Granulé Sabel*, *Hormotensyl*, *Inhaphone*, *Lécithocéril*, *Parvuline*, *Plasmastyl*, *Rhinostagone*, *Sédophoryl*, *Veinosalvine*.

- Lab. Déchosal**, 39, rue de la Gare, Bondy. — Aldor formogène, Méthinol, Néo-ricin, Opo-Vacuoline, Rhumatoidine, Vacuoline.
- Lab. Deffarge**, 188, cours de la Somme, Bordeaux. — Cellulax, Hémostérine irradiée, Nucléocardyl, Panvita, Vitacrine.
- Lab. Defresne**, 19, r. Jacob, Paris. — Pancréastase Defresne.
- Lab. Deglaude**, 15, bd Pasteur, Paris. — Cardibaïne, Digibaïne, Théoxanthine, Spasmosédine.
- Lab. Dehaussy**, 50, rue Nationale, Lille. — Anti-Asthmine, Biocalcium, Capsules et sirop Préga, Céréossine, Crédone, Cryphthermol, Diastogène, Entérobtyl, Ephasma, Formobenzyl, Hermarsinol, Hermomuthol, Koumyl, Leucosérum, Phytolax, Sédoneurol, Sinrénaline.
- Lab. Déjardin**, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris. — Extrait de malt français Déjardin, Malt français Déjardin, Mallosine Déjardin, Peptomaltone Déjardin.
- Lab. Delalande et Cie**, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie, — Baume Suella, Entéro-granulé, Ephédrocamphre, Esculéol, Hypiode, Neuroplasma, Neuroplasma Massif, Neuroplasmine, Polyminéral, Réxiode, Sal-Sodyl, Sirop au Solucamphre, Solucamphre, Solucamphre Associations, Solucamphre spartéine, Sulfocadol.
- Pharmacie Delaprée**, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée). — Bauminix, Liquidix.
- Lab. Delbary**, Saint-Astier (Dordogne). — Ioguine Delba.
- Lab. Delfour**, Pouillon (Landes). — Oléo-Mel laxatif.
- Lab. du Delta**, 84, rue Rochechouart, Paris. — Arcica, Calmaby, Calobil, Chloral Dalis, Névrol Fréval, Onguent Fréval, Percalcine, Suppoglandines.
- Lab. Demasles**, 5, pl. Miremont, Vienne (Isère). — Artériocrinol, Atihal, Bilicrinol, Biogénol, Crinhémol, Menosédine, Myrtilline, Phospholéose, Sédospasmosé.
- Lab. Demoulin**, 27, rue Brezin, Paris (XIV^e). — Lenientol.
- Lab. Denis**, 20, rue du Laos, Paris. — Glottyl, Rhino-Glottyl.
- Lab. Denisot**, 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e). — Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine, Opophos.
- Lab. du Dr Denismore**, 25, rue Dagorno, Paris. — Bioplastine, Endolacgénine, Endo-Ovarina, Endoxidine, Esanofèle, Foscal Sero, Hyostinal, Sels de Montecatini, Néoiacol ISM, Paragangline Vassale, Peptopancréasi Sero, Soporigène, Viroglan et toutes préparations de l'Institut Sérothérapique de Milan (Opothérapie et Vitamines Ferments, Métaux Colloïdaux, Peptocréasi, Antiluétiques).
- Lab. Deolax**, R. Renaud, Anould (Vosges). — Sinapol Thermalgol.

- Lab. **Depruneaux**, 18, rue de Beaune, Paris. — *Cypro-veinol* (Gouttes-suppositoires), *Diemenal*, *Dienol*, *Dragées Elkin*, *Gouttes Antigél*, *Granules Elkin*, *Hypophédrine*, *Phosphoneurol*, *Soderséine*.
- Lab. **de la Dermofagine** (L. sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine*, *Dyspepsia*, *Dyuril*, *Holocalcine*, *Raiforyl*.
- Lab. **Derol**, 154, av. Malakoff, Paris. — *Bolène*, *Grippalgine*, *Lipocrinyl*, *Quinimax*, *Rectoseptol*.
- Lab. **Deschiens**, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens*, *Hépathémo Deschiens*, *Holos*, *Spectrol*.
- Lab. **Descouraux et fils**, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion*, *Dragées Lumeval*, *Ovules Vézès*, *Tensoryl*, *Tryclène*.
- Lab. **Dexo**, 7, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Biovital*, *Bismokaol*, *Collunovar*, *Dexiode*, *Dexogyne*, *Dexoplasma*, *Laximanne*, *Thyméphédrine*, *Uroquinol*.
- Lab. **D. F. L.**, 94, bd Arago, Paris (XIV^e). — *Vitalium*.
- Lab. **de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastatine*.
- Lab. **A. Djian**, 137, r. de Belleville, Paris. — *Cassilax*.
- Lab. **du Dolophos**, 59-61, r. de Saint-Quentin, Caudry (Nord). — *Dolophos*.
- Lab. **du Douagol**, Péronne (Somme). — *Crayons Thomas*, *Donagol*, *Donaline*, *Dontera*, *Tricalm*.
- Lab. **Dor** (M. Dorantowicz, Pharmacien), 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Alcamfétol*, *Benzylocalcium*.
- Lab. **Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloïdine*, *Crinopancrine*, *Curiodé*, *Hormobiline*, *Hormoléol*, *Mésosome*, *Morrhualène Gauthier*, *Panfébrine*, *Stomophile*.
- Lab. **de la Dosurine**, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (Trousses).
- Lab. **Douetteau frères**, 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Astasol*, *Ficabyl*, *Neurovarol*, *Organésium*, *Sédasix*.
- Lab. **Drapier**, Rethel (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Intra-Reipar*, *Ostéopeptine*.
- Lab. **Dreyer-Dufer**, Nogent-sur-Marne. — *Anurique Duplex*, *Iodophosfer Duplex*.
- Lab. **Drouet et Plet**, 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.). — *Anexol*, *Byliérine*, *C. 40*, *Elipol*, *Lénibar*, *Magnésie hydratée*, *Néo-physio*, *Oxyléine* — *Adultes et Enfants*, *Ozobiase*, *Ozobiase opothérapique*, *Phososome*, *Phospirine*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Quinéase*, *Saly-sérum*.
- Sté Française du Lait sec Dryco**, 5, rue St-Roch, Paris. — *Dryco* (lait sec), *Vitagermine*.

- Lab. du Dr Dubat**, 80, fg St-Denis, Paris. — *Comprimés Rhinol*, *Ouate Rhinol*, *Pommeade Rhinol*, *Sangule*, *Saturaline*, *Seccase*, *Théisine*.
- Lab. Duc**, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Cèdrel Bel*, *Coquelicônes*, *Dragécalcion* (dragées), *Dragécalcion* (granule).
- Lab. Ducatte**, 31, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Entéroantigènes Danysz*.
- Lab. Ducatte**, 191, rue Saint-Honoré, Paris. — *Biosulfol*, *Cérébron*, *Cuprase*, *Cytoplasmine*, *Gaïarsénan*, *Paratoxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Pilules de Boldo-Biline* Ducloy, *Bradylgastrine*, *Lactogélose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachylgastrine*.
- Lab. Ducoq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Iodo-Hamamelis* Ducoq, *Vulnérine*.
- Lab. E. Dufour**, Amplepuis (Rhône). — *Glucôchaux*.
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol*, *Codéphryl*, *Dymoxyzyl*, *Edistol*.
- Lab. du Dr E. Duhourcau**, Legoux frères, pharmaciens, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anticatarrhales* du Dr Duhourcau, *Gastricine* du Dr E. Duhourcau, *Tœnifuge français* du Dr E. Duhourcau, *Salvenase* Legoux.
- Lab. Dulcis**, Dr Ferry, place Clichy, Monte-carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés*, *Argolène*, *Cadmiol zinc*, *Cuprinol*, *Iodo-calcique*, *Iodo-Rubidium*, *Ichtyol zinc*, *Myosine forte et faible*, *Mydriazine*, *Novoptine oxyde orangé de Hg*, *Ophthalmoforme*. *Tubes Dulcis*.
- Lab. Dumesnil**, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules Dumesnil*, *Bréthyl Dumesnil*, *Crémo-plastol Dumesnil*, *Dépuratif Dumesnil*, *Dermo-Plastol Dumesnil*, *Gélicrème Dumesnil*, *Girasiol Dumesnil*, *Huile au calomel Dumesnil*, *Mugrizol Dumesnil*, *Poudre Pastorilos*, *Sacnel*, *Solu-Plastol Dumesnil*, *Théobromose Dumesnil*, *Zébo-Plastol Dumesnil*.
- Lab. Dumesny**, 18, rue de Maubeuge, Paris. — *Cigarettes antiasthmatiques* du Dr Clery, *Poudres antiasthmatiques* du Dr Clery, *Pastils Meran*.
- Lab. R. Dunesme**, pharmacien, 4 et 6, rue Ordener, Paris (XVIII^e). — *Depressytol*, *Inhalophédrine*.
- Lab. M.-L. Durand**, 28, rue de Seine, Paris. — *Gravural*.
- Lab. Duret et Rémy**, 15, rue des Champs, Asnières. — *Bis-Ka-Ma*, *Choléokinase*, *Comprimés d'Alibour*, *Cystocone*, *Hepatosodine*, *Nobial*, *Nyctal*, *Pelvisedol*, *Peptonal*, *Polypeptonal*, *Pyroclase*, *Quinobrome*, *Saturol*, *Seroquinol*, *Thaolaxine*, *Tussédyl*, *Zoöcytine*.
- Ph^{ie} E. Duriez**, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chloral bromuré Dubois*, *Elixir Ducro*, *Quinoïdine*.

- Lab. Dursent**, 74, r. Blanche, Paris (IX^e). — *Brimox*, *Capsol*, *Egidol*, *Glaucuro*, *Sapogynol*.
- Lab. A. Duteil**, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Élixir Hymel*, *Quinorhéine Duteil*, *Spasalgique Maréchal*, *Suppositoires Hymel*.
- Lab. de la Dynamogénine**, Boîte postale 33, Aix-les-Bains (Savoie). — *Dynamogénine du D^r Chaboud*.
- Lab. des Eaux-Mères**, Salies-du-Salat (Haute-Garonne). — *Plasmosalin*.
- Sté des Eaux minérales de Decize**, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *Source Saint-Aré*.
- Étab. Echard-Gillier**, 25, rue de Bordeaux, à l'Arbresle (Rhône). — *Compresses grasses « Onctua »*, *Garnitures Obstétricales « Parturia »*.
- Lab. Echeman**, 26, rue des Moines, Paris (XVII^e). — *Camphocalyptol*, *Eupnol* (pastilles et poudre), *Eupnoléine* (ampoules et solution), *Eupnophédrol*, *Osmoléine*, *Pulvinasol*, *Stadrhine* (ex *Stovoléine*).
- Lab. Efa du D^r Lecacheux**, 16-18, rue du Château, Carentan (Manche). — *Byl Efa*, *Hépatie Efa*.
- Lab. de l'Élixir Dussaud**, rue Fondère, Marseille. — *Élixir Dussaud*.
- Lab. de l'Élocine**, 51, r. du Ranelagh, Paris. — *V. A. V.*
- Lab. de l'Embryol**, 32, rue Desrenaudes, Paris (XVII^e). — *Embryocytol*, *Embryol*.
- Lab. de l'Endopancrine**, 48, r. de la Procession, Paris (XV^e). — *Endopancrine*, *Endothymusine*, *Holosplénine*, *Holovarine*, *Insuline* (Voir *Endopancrine*), *Insuline Phyloze* (poudre et pommade), *Perglandènes* (ovarien, hépatique, orchitique), *Permyase*.
- Lab. de l'Entériode**, 39, r. de Clichy, Paris (IX^e). — *Entériode*.
- Lab. de l'Entéroseptyl**, 78, bd Beaumarchais, Paris. — *Entéroseptyl*.
- Lab. Éon**, 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — *Derméon*, *Pommade et suppos. Eon*, *Erysulfure Eon*, *Psoréal*, *Psorène*, *Psoréon*, *Pulmicure*.
- Lab. Éparvier**, 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon. — *Boldoïne*, *Cascara*, *Ferroxyline*.
- Lab. de l'Éphédrine Béral**, 194, r. de Rivoli, Paris. — *Adrénoides*, *Adréphédrine*, *Cléarol*, *Ephédermine*, *Ephédraféine*, *Ephédrampoules*, *Ephédrine*, *Ephédrisol*,

Ephédroïdes, Ephédromel, Ephéiodine, Ephétropine
Grains d'Ephédrine, Mydriédrine, Nasophédrine, Navi-
drine, Rhinodrops, Somnicones, Spartophédrine.

Lab. de l'Éranol, 45, rue de l'Échiquier, Paris. — *Éranol.*

Lab. de l'Ergépatine, Arnault, St-Just-en-Chaussée (Oise). —
Plasmocalcium.

Lab. de l'Ergocoline, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Biopausine.*

Lab. Erla (Latour, ph^{ien}), Terrasson (Dordogne). —
Bruzarine, Neuralgic Caron.

Lab. de l'Erythéma, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort
 (Seine). — *Androvar, Androvules, Erythéma.*

Lab. Escoubet, 62, bd St-Germain, Paris (V^e). — *Hépatocynol,*
Sédopathyl.

Lab. Escouflaire, Baisieux (Nord). — *Cigarettes anti-asthma-*
tiques Escouflaire n^{os} 1 et 2, Poudres anti-asthma-
tiques Escouflaire n^{os} 1 et 2.

Lab. Estève, 187, rue de la Croix-Nivert, Paris (XV^e). —
Bain de Bouche Estève, Bronchosanyl Estève.

Lab. Étienne, 19, av. Secrétan, Paris. — *Asthmédrine.*

Lab. général d'Études biologiques, 29, pl. Bossuet, Dijon
 (Côte-d'Or). — *Doloma, Œnophos, Protéodyne injec-*
table. Protéodyne dragées.

Lab. de l'Eusedyl, 32, rue des Vallées, Colombes (Seine). —
Eusedyl.

Lab. Évine, 15, bd des Batignolles, Paris (VIII^e). — *Baume*
Pélevine, Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine,
The Evine.

Lab. de l'Evolax, Guéraud, pharmacien, 27, av. Victor-Hugo,
 Valence (Drôme). — *Evolax, Gastrisodyl, Héma-Rhéo.*

Usines Ethel, Schiltigheim (Bas-Rhin). — *Malt Ethel*

Lab. Fabiou, 132, av. Victor-Hugo, Paris. — *Anapyol,*
Elixir Rodi, Veinicura.

Lab. Fabre, 33, rue de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine). —
Caséone Fabre, Ferments lactiques Fabre en cultures
pures, Lacto-Coaguline Fabre.

Lab. Fabre, 112, r. des Pyrénées, Paris. — *Fabérian (Dragées,*
Ovules, Pommades, Suppositoires), Lynévol, Uro-tisan,

Lab. Fagard, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine. —
Antiashme Bengalais, Bain Fagard (Sulfador), Cap-
sules d'Euviscol, Cigarettes Schulzé, Elatine Bouin.

- Lab. Falvy, 40, r. des Acacias, Paris. — *Adrénoléine, Anxiol, Broséyl, Chlorinol, Edricamphre, Epholéine, Fermenteryl, Gastropeptyl, Hemopectal, Holuryl, Rhinadrol, Synase, Trynol.*
- Lab. de la Fantine Adoue, 36 bis, rue Scaliger, Bordeaux. (Gironde). — *Fantine Adoue.*
- Lab. des spécialités Farma (Gravier), 11, av. Eugène-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre. — *Gynosol, Phosiodine, Val'ovarine.*
- Lab. Faure, 83, bd de la Villette, Paris. — *Citropeptol, Hexacarbène, Manacine, Neuropol, Novosédine, Sels Intar.*
- Lab. Faure et Dussuel, 15, av. de Marlioz, Aix-les-Bains. — *Elixir Bonjean, Euphorine du D^r Chaboud, Magnelax, Le Sinaplasme.*
- Lab. Faure et Lagente, à Montargis (Loiret). — *Citrocholine, Kalmidor, Mictoseda.*
- Lab. des Produits Sulfureux du D^r Fayès, 5, rue d'Alexandrie, Paris. — *Salbine du D^r Fayès, Sulfocaine Fayès, Sulfo-Rhinol du D^r Fayès.*
- Lab. Félix, 36, r. Eug.-Carrière, Paris. — *Baumes du D^r Heder, Gouttes antiasthmiques du D^r Hallay, Gouttes antirhumatismales du D^r Hallay, Vin Fédé.*
- Lab. du Féminadène, 120, r. Lecourbe, Paris (XV^e). — *Coprex, Féminadène, Viradène.*
- Lab. Fercocq, La Varenne-St-Maur (Seine). — *Antisuce, Arthrident, Hémocalcine, Pulmogrog (Enfants et Adultes).*
- Lab. G. Fermé, 22, rue de Turin, Paris. — *Muthanol, Néolyse, Psothanol, Soluthanol, Staphylothanol, Triradol, Urolan, Viscosérum.*
- Lab. des Ferments Biologiques suractivés, 29-31, qual Henri-IV, et 1, rue Ango, Dieppe. — *Protéo Maltase, Ferme de Lafaye, Marlihes (Loire).* — *Babeurre La Faye*
- Lab. du D^r Ferré, 6, rue Dombasle, Paris. — *Broncho Favrot, Cupressiode, Dismine Favrot, Immunicorps, Lin Tarin, Rhino-spécifique, Sirop Lamouroux, Tonique Favrot, Urobaldine.*
- Lab. E. Ferré, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher, Litharsyne, Pâtes et Sirop Pectoral Edulcor, Poudre Rocher laxative, Sucre Edulcor, Tablettes Vych'Edulcor.*
- Lab. du D^r Ferry, pl. Clichy, Monte-Carlo. — *Tubes Dulcis.*
- Pharmacie du D^r Fialip, 23, av. de La Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D^r Fialip.*
- Lab. Fides (M. Vouzellaud), 14, r. de la Comète, Paris. — *Balsamorhinol, Inhalantyl.*
- Lab. Fisch et Cie, Mer-Rouge, Mulhouse (Haut-Rhin). — 104, fg Poissonnière, Paris. — *Bains carbogazeux*

Wolo, Bain Chrysocadique Fisch, Baumolacpinine, Cataplasmes de Fango-Fisch, Cellona, Chlormagnésium, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Empyrol, Fango Fisch, Lacpinine, Optiplaste, Poudre ORL, Prévalidine, Recytèle, Révulsif Fisch (anc. Procipha), Sulfo-crème Liless, Thiorubrol.

Lab. Flahaut, 74, r. Monge, Paris. — *Acépine, Anadiposine Laxoil, Sulfodermol, Terpene granulée Baron.*

Lab. Fleury, Arcachon (Gironde). — *Comprimés Récal, Dionol, Eurinase, Paquets Alcais, Pastilles Dionol.*

Lab. de la Fluxine et des spécialités pharmaceutiques Jacquemaire (Bonthoux, Pharmacien), 42 bis, rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl, Fluxine, Formule Jacquemaire n° 60, Verrulyse.*

Lab. M. Folliet, Rumilly (Haute-Savoie). — *Broncho-sérum Connat, Dynamine Connat, Laxorange Connat.*

Lab. Paul Fontanier, Moulins-sur-Yèvre (Cher). — *Algbiogyl, Algilaxine, Algovitine, Carnéosine, Carnéose, Curalgine, Eliminol, Elixir Pax, Fénuéline, Fluidine, Gaduine algovitine, Gastrosalvine, Germalyne, Iasthol, Manganeol, Peptovitine, Phytenergine, Pneumosalvine, Phosbiogyl, Phytalgine, Pulmoviline, Pulmose, Radiovitine, Salvémo, Sclérovitine, Somnoline, Stomosalvine, Surrexine, Thymoborine, Ultrakinol, Ultra-sténil, Ultravitine, Vitaferine.*

Lab. des Établ. Fonda, 10, rue d'Amiens, Compiègne (Oise) — *Sedotan Fonda.*

Lab. du Dr Fonteneau (B.-F. Delaunay), Joué-lès-Tours (I.-et-L.). — *Agofluine, Arthrizol, Bio-Rob, Calménol, Camphroluble, Carbonaphtolan, Clinuryl, Combretolchol, Iodopeptyl, Manganonuclyl, Neuranol, Neuraxol, Pepsichlorine, Pepsipaine, Plasmocéane, Radiuryl, Radiurèse, Rectoma, Scillitensyl, Sigbi, Sistobyl, Stérasmine, Stéarsinol, Stérédrine, Sulfoterpine.*

Lab. du Forcival, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Forcival.*

Lab. Fortin, 109, rue de Sèvres, Paris. — *Anticalcine, Hyol, Kolaine, Nervosédol, Opothérapie, Phleboveinol, Sphygmine, Thylargol.*

Lab. Fosset, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Ago Sels, Cytopulmase, Pectobiol, Pelvinal, Pelvi-Pyrine Picrovules, Sympathoriane, Vagoriane, Viscodermine Viscoveine.*

Lab. Fouard, 61, r. Gaston-Lauriau, Montreuil (Seine). — *Les Granions.*

Lab. H. Foucher, 77, bd de Grenelle, Paris. — *Copraxe, Elixir de Larsa, Entérohépatine, Gastérinase, Muxyl, Neuricure, Ortho-Stomine, Thymetol.*

Lab. Fougerat, 44, r. Chaptal, Levallois (Seine). — *Gouttes Rami, Pâte Rami, Poudre Jifa, Sirop Rami, Vérachol.*

- Lab. Foulon et Cie, 20, fg Poissonnière, Paris. — Colhépathyl, Cuscutine, Inshépatyl, Lutéovar, Valéramyl.
- Lab. Fournier frères, 7, rue Biscornet, Paris. — Bileyl, Biolactyl, Crino-Menstryl, Crino-Sthényl, Opothérapie Fournier, Ovaire Fournier, Physocrisine, Sanaféine, Splenocrisines, Vaccins, Vasolaxine.
- Lab. Fourton, D^r en Pharmacie, 38, rue du 11-Novembre, Clermont-Ferrand. — *Dyspné-Inhal*.
- Lab. Français Gastro-Entérologie, 3, pl. Jussieu, Paris (V^e). — *Neosplénine, Tot'Hépatine*.
- Lab. du D^r Fraysse, 21, r. de Neuilly, Nanterre. — *Argostyl, Arthridol, Energinoce, Follilobine, Hépatoplasmine, Kaliosol, Opothérapie associée du D^r Fraysse (Thyrodose, Neurodose, Splenodose, Placentodose), Revitalose, Stomacurine*.
- Lab. du Frénasma, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Mimophédrine, Frénasma, Gastrhéma*.
- Lab. Freyssinge, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartois, Céthocal, Neurosthénine, Pilules de Chloramine, Polyphorine, Quassine Frémint, Salicol Dusaule*.
- Lab. Frigyl, F. Montanton, Pharmacien, Buzançais (Indre). — *Frigyl*.
- Lab. H. Frilley, 94, bd. Lefebvre, Paris (XV^e). — *Iodiformine, Novospasmyl*.
- Lab. du Fumar, M. Grellier, Pharmacien, Saint-Sever (Landes). — *Chlorasepthymol, Curospasm, Fumar du D^r Fournier*.
- Établissements Fumouze, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Baume Lartigol, Bougies uréthrales Chaumel, Capsules Raquin, Cigarettes Barral, Crayons utérins Chaumel, Globules Fumouze, Granstimul, Introl, Ovules Chaumel, Papier Barral, Poudre, Chaumel, Sirop Berthe, Sirop Cassibor, Suppositoires Chaumel*.
- Lab. S. Gabail, 55, av. des Ecoles, Cachan (Seine). — *Anti-Kokyline, Baume Diulac, Biscamph, Elixir valero-bromuré, Gluphosol, Iodoscilline, Kalmanzor, Néosaliodé, Valérianate Gabail désodorisé, Urogénine*.
- Lab. Gaillard (L. E. V. A.), 26, r. Pétreille, Paris (IX^e). — *Lénifédrine, Léniforme*.
- Lab. Gaizard, 94, rue Michelet, Alger. — *Asthma, Carboseptyl, Ixiole A et B, Opunsine, Panto-Kinon, Phloxiode, Rhineupnyl, Solicide*.
- Lab. du Galaphos, 92, av. Camille-Pelletan, et 2, rue d'Amiens Marseille. — *Galaphos*.

- Lab. Galbrun, 10 et 12, rue de la Fraternité, Saint-Mandé (Seine). — *Aristargol*, *Citronema*, *Iodalose Galbrun*, *Lucosalgue*, *Prosthénase Galbrun*.
- Lab. du D^r Galimard, 145, rue Yves-Le-Coz, Versailles. — *Curogène*, *Mucobarytine*, *Mucobismuthine*, *Vitadiase*.
- Lab. R. Gallier, 38, bd Montparnasse, Paris. — *Arhémapectine Gallier*, *Arkhébios*, *Basedowine*, *Daboïne*, *Kidoline Kidophédrine*.
- Établ. Gallina, 4, rue Candolle, Paris. — *Huile Gallina*, *Iodentérol*, *Iodhéma*.
- Lab. Gallo, 19, rue Victor-Hugo, Aurillac. — *Urocédrol*.
- Lab. du Gambéol (J. Gautier), 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie (Seine). — *Actiphos*, *Balsaformine*, *Comprimés de Proto-Gambier*, *Gambéol*, *Ganderma*, *Hémopylore*, *Salvatyl*.
- Lab. Gamel, 2, pl. de la Salamandre, Nîmes. — *Kinaldyne*, *Salganyl*.
- Lab. du D^r Gayraud, Lavit (T.-et-G.). — *Bleumyl*, *Citrhémol*, *Cléinol*, *Eupeptyl*, *Fénugrec Ravin*, *Opo-Calcéofibrose*, *Rexacarbène*, *Sérocamphe*, *Sirop Lauzi*, *Sténobiose*, *Urilyse*, *Valérose*, *Varilose*, *Vin Erlos*.
- Lab. Clément Gardiol, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Urosalyl*.
- Lab. du Gastrhema, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Frénasma*, *Gastrhema*, *Mimophédrine*.
- Lab. du Gastrocarbone, Saint-Louis (B.-du-R.). — *Bisalicyle*, *Gastrocarbone*.
- Lab. de la Gastrocitrine, Luc-sur-Orbieu (Aude). — *Gastrocitrine*.
- Lab. Gatel-Léger, 35-37, r. Joinville, Laval (Mayenne). — *Alcalisalyl*.
- Lab. Gauchon 201, rue du Fg-Saint-Denis, Paris. — *Solvo-sclérose*.
- Lab. Gaulier, 38, r. St-Ferdinand, Paris (XVII^e). — *Cachets B. Q. S. C.*, *Cachets S. F. T.*, *Hygienyl du D^r Gaulier*.
- Lab. Gavin, Vimoutiers. — *Sirop Lecœur*.
- Lab. Gef, 269, rue Judaïque, Bordeaux. — *Curoveinyl Gef*, *Largocol Gef*.
- Lab. Géha, Port-de-Bouc, près Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume de l'Echalp Albert*, *Cachets Némé*, *Globular*, *Gouttes Géha*, *Sirop du D^r Canac*.
- Lab. Gelia, Champdeniers (Deux-Sèvres). — *Geliderm*.
- Lab. du Genalyptol, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII^e). — *Genalyptol*.
- Lab. Geneve., 29, rue des Marchands, Avignon. — *Kinechol*

- Lab. Génévrier**, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — Adolan, Alepsal, Bis-Hyd, Boues radioactives de Pistyan-les-Bains (Tchécoslovaquie), Figadol (Vin et Capsules du Dr Vivien), Neurinase, Panstomase, Tétramagnésium.
- Lab. Géraudel**, 3, r. Watteau, Courbevoie. — Sirop Géraudel.
- Lab. Gerda**, 163, bd Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — Ovules Anac, Arvensyl, Calsédine, Gerdabyl, Névrithone Daclin, Noal, Pulmolaxol, Sodolactine.
- Sté Ch. Gervais**, 11, r. de Prony (XVII^e). — Carnet de Santé Gallia, Galliasac, Lait Gallia.
- Lab. Gev**, 26, rue Chaptal, Paris (IX^e). — Argyrine, Isogev.
- Lab. Gewa**, 32, rue Assalit, Nice (A.-M.). — Eductyl, Léthalgol.
- Lab. A. Girard**, 48, rue d'Alésia, Paris. — Caséoline, Glycérophosphate de Chaux granulé Girard, Nucléofer Girard.
- Lab. Girel**, 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris (IX^e). — Hémédonine, Vulnamine.
- Lab. Givaudan**, 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon. — Glyphospher, Hipposarcine Roy, Huile de ricin Crolas.
- Lab. du Glefina**, 348, rue Saint-Honoré, Paris. — Gléfina, Lasal, Novalibut (Gouttes et Pilules) (ex Halibut).
- Lab. E. et G. Glomaud**, 12, bd Saint-Michel, Paris (VI^e). — Neurogastrine.
- Lab. des Gloxines**, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris. — Gloxines, Gloxines Polyvalentes.
- Lab. des Gluconates**, 7, rue de la Montagne-Sainte-Genève, Paris. — Calcium Français.
- Lab. Glyco M**, 1, avenue Lowendal, Paris (VII^e). — Glyco M, Sélunic.
- Lab. Gmet**, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. — Boldo Gmet, Composé Gmet, Condurango Gmet, Crataegus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrait Hamyd, Frène Gmet, Fucus Gmet, Gui Gmet, Hamamélis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Piscidia Gmet, Quinquina Gmet, Sauge Gmet, Tilleul Gmet, Ulmaire Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet.
- Lab. P. Godfrin**, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — Limonade Godfrin.
- Lab. Jammes de Golbery**, 19, rue Brunel, Paris (XVII^e). — Gossypiol Maurin, Hormocrinol F et M.
- Lab. du Gomenol**, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — Gomenol, Gomenolé et tous produits au Gomenol.
- Prod. Gonnon**, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — Antidiabétique Monaxon, Cacodyle Gonnon, Créosote soluble Vacheron, Eupeptique Monaxon, Irénine Gonnon, Kola Monaxon, Lecithine Vacheron, Polybromure Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vache-

ron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gâiacol, Suppositoires Gonnon, Terpene Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon.

Lab. Gouin, 20, r. des Ecoles, Paris. — Avantol, Cuprémone F, Cuprémone simple, Prométhine, Gouttes P. A. S.

Lab. Gouzène, 139, rue de Paris, Pantin (Seine). — Aloysine.

Établ. Goy, 23, rue Beautreillis, Paris. — Calcisan Cachets, Gouttes Magalo, Comprimés et Gouttes Notal, Digestif Goy, Elixir Goy, Fer Larcade, Globules et Granulé Chomet, Gouttes Vocis, Hémostatique Goy, Impaludol, Inhalation Goy, Inhalations Vocis, Juvantol, Misalgol, Mucilage Goy, Narizol, Notaline, Oxycarbine, Panol, Pasticaïne, Pastilles M. B. G., Pâte Bleue Goy, Pâte Goyer, Pectoral Serla, Pimpinol, Primulyse, Reclusol, Saturateur Chomet, Sédalgot, Sirop Chalin, Sirop France, Thiocosyl, Urosidal, Verrumag, Vin William.

Lab. Grandval, Quirin succ., 12-14, r. Féry, Reims (Marne). — Eugynol Grandval, Hamamelis Grandval, Cœnoquinol Grandval, Potion Grandval, Quinquina Grandval, Kina coca kola Grandval, Quinarsol antianémique Grandval, Quinarsol fébrifuge Grandval, Sirop Larphaud.

Lab. Granger, 13, rue Basly, Gennevilliers (Seine). — Transitol.

Lab. C^{te} R. de Grauwe, 19, r. du Bailli, La Plaine-St-Denis. — Elixir Duchamp, Fer Bravais.

Lab. R. Gray, Pharmacien, Montmirail (Marne). — Gouttes Trina.

Lab. Grémy, 14, rue de Clichy, Paris. — Antéparsine Grémy, Diasténine, Epidosine Grémy, Eutensyl Grémy, Folles-trine Grémy, Hépatocalcion Grémy, Immuniderm Grémy, Immuniperos Grémy, Immuniphages Grémy, Immunizols Grémy, Micranyl Grémy, Ocréine Grémy, Thyrénine Grémy, Thyrocréine Grémy.

Lab. Grias, 47, rue Féray, Corbeil (S.-et-O.). — Verticurine.

Lab. Grignon, 2, rue Duphot, Paris. — Eniode Lefebvre, Valérianate Grignon, Pâte de Terpene Guédet.

Lab. Grorichard, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — Comitiol, Magnésium Grorichard, Métrostyptal Grorichard.

Lab. Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — Capsellase. Diurocalcine Gros, Diurocalcine iodurée, Hépafluol, Hergénol, Puerol, Sanomint, Sédotonine. Spasmonal.

Lab. Grysa, 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe). — Cinéyl, Cuprobalt, Sycase.

Lab. André Guerbet et Cie, 22, rue du Landy, St-Ouen (Seine). — Lipiodol Lafay, Lipiodol « F » (fluide), Ténébryl Guerbet.

- Lab. Guéret**, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret). — *Anoxyne, Comprimés Kléos, Pommade Kléos.*
- Lab. P. Guérin**, 15, rue Cavalotti, Paris (XVIII^e). — *Algo-curine, Ferrocalcine, Néostomol, Vascuro.*
- Lab. R. et M. Guignard**, 38, rue du Louvre, Paris. — *Arhino-line, Aseptocarbine, Asthmatyl, Casbyl, Coqueluchyl, Fucogem, Gemaline, Gemiodol, Gemmenagol, Gemo-carpine, Hormo-Gynol, Kola « Rik », Kola Sthemyl, Myrcia, Phosphigem, Phyto Kola, Spasmo-florine, Tri-metal, Urogem.*
- Lab. E. Guilbert**, 124, bd Demailly, Avion (P.-de-C.). — *Neurostabil*
- Lab. F. Guilbert**, place d'Armes, Hesdin (P.-de-C.). — *Hypo-tenseur Vale.*
- Lab. André Guillaumin**, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Acésine, Comprimés Guillaumin, Cyanargyre, Novar-gyre, Théosalvose, Vanadarsine.*
- Lab. Guillaumin et Gérard**, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy, Prodynase, Quinolane Valguy, Vin de Baudon antiminio-phosphaté, Vitène.*
- Lab. de la Guimelinde**, Ancenis (L.-Inf.). — *Guimelinde.*
- Lab. P. Guin**, Contres (L.-et-C.). — *Cachets Lekma.*
-
- Lab. Halleana, G. Vienne**, Pharmacien, 102, avenue Michelet, Saint-Ouen (Seine). — *Maigrylline, Polyna.*
- Lab. Paul Hardy**, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Bil-flux, Cèdre bleu, Dipentyl, Florisédy (et Polypnal), Cachets Gastruth, Jecofluy, Magnésium Hardy, Neutracide, Oliricyl Hardy, Pancarbo, Pulmonaire du D^r Paul Bourgogne (et Borsalyl), Solution Tisch.*
- Lab. D'Héliot**, Dinard (I.-et-V.). — *Alliosote.*
- Lab. de l'Hémoluol**, 11, r. Mogador, Paris (IX^e). — *Hémo-luol.*
- Lab. Henry**, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique). — *Arsénc-Fer Henry, Bromidine Henry, Bromovaleron Henry, Bronchitol Henry, Cascara Henry, Chloro-magnésium Henry, Digestif Henry, Disménine Henry, Elixir hépa-tique Henry, Fer Henry, Kino pancréatine Henry, Laxolin Henry, Lithine Henry, Iodothéine Henry, Man-gano-Fer Henry, Néo-Salicylate Henry, Nucléarrhol Gabriel, Papaine Henry, Pebromon Henry, Peptonate d'étain Henry, Pepiodon Henry, Recalcifiant Henry, Salicaire Henry, Sirop bromoformique Henry, Sirop d'hémoglobine, Sirop de kola composé Henry, Solution salicylate Henry, Stanno-bardane Henry, Stannolip Henry.*

Lab. de l'Hépatomagnésion, 57, rue Pierre-Corneille, Lyon. — *Carborexyl, Hépatomagnésion, Urocylate.*

Lab. J. Hernandez, 40, r. François-I^{er}, Paris. — *Sucre « Vita D ».*

Lab. Heudebert, Ch. Heudebert fils, pharmacien. 4, rue Lamartine, Nanterre (Seine). — *Féculyse Heudebert, Nergine Heudebert.*

Prod. de Régime Heudebert, 85, rue St-Germain, Nanterre (Seine), 2 et 4, chemin Feuillat, Lyon. — *Pain essentiel, Pains spéciaux, Radiopaque.*

Lab. Louis Hinglais, Epernay (Marne). — *Capsules Kuchner, Chenanthol.*

Prod. Hinglais, 30, rue Mirosmesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais.*

Lab. Hocquette, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella, Cassilax, Chélibile, Crésolargol, Embryhormone, Fenulcalcium, Pandigestine, Rangol, Seroliol, Séro-neuropsychique, Splénomanganol, Stenic, Sympax, Trinobenzyle, Valédyl, Vivargyre.*

Lab. F Hoffmann-La Roche et Cie, 10, rue Crillon, Paris (IV^e). — *Adoverne, Allonal, Ampoules de Pantopon, Ampoules de Digalène, Ampoules de Spasmalgine, Arsylène, Biolipase, Cachets Roche de Thiocol, Choline, Comprimés Roche de Thiocol, Dibromotyrosine, Digalène, Diiodotyrosine Roche, Globinofer, Hémostra, Illoglandol, Iodostarène, Imido, Isacène, Laristine, Larocaïne, Larosan, Laroscorbine, Nestrovit, Œstrobrol, Œstroglandol, Ovules Roche, Pantopon, Prostigmine, Saridon, Séacornine, Sédobrol, Sédormid, Sirop Roche, Soluproline, Somnifène, Spasmalgine, Syntropan, Tampol, Théobryl, Thigénol Roche, Thiocol Roche, Thyroxine Roche, Tonique Roche, etc.*

Lab. de l'Hopogamyl, 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais (Oise). — *Hopogamyl.*

Lab. de l'Hormoléol, 17 bis, av. Parmentier, Paris (XI^e). — *Hormoléol.*

Lab. Houdé, 9, r. Dieu, Paris. — *Aconitine Houdé, Aloïne Houdé, Apioline Houdé, Boldine Houdé, Caféine Houdé granulée, Colchicine Houdé, Ephédrine Houdé, Formosaline Houdé, Granules Houdé (tous alcaloïdes et glucosides), Gymimbine Houdé (voir Yohimbine), Hamaméline Houdé, Hélénine Houdé, Hydrastine Houdé, Hyoscine Houdé, Hyoscyamin Houdé, Papavérine Houdé, Pastilles Houdé à la cocaïne, Quassine Houdé, Scopolamine Houdé, Spartéine Houdé, Strophanthine Houdé, Strychnine Houdé, Théobromine Houdé, Yohimbine Houdé.*

Cie de l'Hydroxydasé, 10, rue Blanche, Paris. — *Hydroxydasé.*

Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie, Cophed (Sirop), Dysthène, Félosine, Gynésodine, Héxafel, Myothermine, Nuciphos, Panlithyl, Phocitrol, Sthénoxal, Stopral.*

- Lab. Hygio-Dontis**, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.). — *Pioréagine*.
- Lab. Immunos**, 8, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Digicardine quininée*. Ferments immuno-lactiques, Immuno-vaccin antirhumatismal, Immuno-vaccin bronchopulmonaire, S. I. V. A., Immuni-vaccin antiporrhéique.
- Lab. Inava**, 14, rue de Normandie, Asnières (Seine). — *Antityphique* « TP », *Bouillon Antidysentérique* « Db », *Dientyl Anticolibacillaire*, *Insensine*, *Néo-Soufre*, *Ovules-Vaccins*, *Pâte Dentaire Bleue*, *Pyodarsénol Injectable et Gelée*, *Pyogénol Gelée*, *Rhino-Vaccin Gelée*, *Thiophéol (Injectable)*, *Vaccins Injectables* « A » *Antibronchitique*, « G » *Antigonococcique*, « P », *Antipyogène*, « D » *Antistaphylococcique*, « M » *Gynécologique*.
- Lab. de l'Inhalyptol**, G. Dubœuf, 4, rue Raymond-Poincaré, Nancy (M.-et-M.). — *Inhalyptol*.
- Lab. Innerva**, 52, rue de Cambrai, Lille (Nord). — *Servo-Freinyl*.
- Lab. des Inocrinines**, 4, rte du Médoc, Bordeaux-Bouscat (Gironde). — *Inocrinines*.
- Institut de Biologie appliquée (C. Cépède)**, 57-59-60, rue Mathurin-Régnier, Paris (15^e). — *Panostyl*, *Vaccinothérapie atoxique Cépède*, tous examens de laboratoire.
- Institut Pasteur**, 22, rue Dutot, Paris. — *Sérums*, *Vaccins*.
- Lab. de l'Inhalo-Bol**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Inhalo-Bol*, *Inhalo-Sel*.
- Lab. de l'Iodarsenic Guiraud**, 10, imp. Milord, Paris. — *Citralin*, *Iodarsenic* ou *Gouttes Païdophiles* du D^r Guiraud, *Véricardine*.
- Lab. Iscovesco**, 107, rue des Dames, Paris. — *Adrénol total*, *Adrénol Cortex*, *Afatyl*, *Androcrinol*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gyno-Gouttes*, *Gynohypophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Novocortex*, *Opopédol*, *Opothérapie Iscovesco*, *Ovaire Iscovesco*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.
- Lab. Ivago**, 17, r. de Provence, Paris. — *Vaccins intradermiques*, *Vaccins Ivago*, *Gelées-vaccins Ivago*.

- Établ. Jacquemaire, Villefranche (Rhône). — *Blécao, Blédine, Galactogil, Peptogil.*
- Lab. Jammes, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Boldocrino', Cacodyline Jammes, Iodinjectol Jammes, Magnésio-Cacodyline, Néophage.*
- Lab. Jauffret, 4, pl. du Val, Vanves. — *Impetigol, Néobiol.*
- Lab. de la Jéobiase, Vayres (Gironde). — *Jéobiase, Soludex, Vivacure.*
- Lab. du Jécol, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allopha-Quina, Jécol (Cachets et Gouttes).*
- Lab. Jicem, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaïne, Iodarsine, Jicémine.*
- Lab. Jolly, 1, rue Christine, Paris. — *Spasmine Jolly (Elixir et Comprimés). Terpoxyl (Externe, Interne, Ovules).*
- Lab. Journet, 18-20, r. Vavin, Paris (VI^e). — *Bladérol du Dr Jenrout, Iodofosfal, Perles Nivernaises, Rhapharène Tonifosfal, Tridynol.*
- Lab. du Dr Jouve, 16 bis, rue Dufrénoy, Paris (XVI^e). — *Bolsurol, Cystorénol, Epipaline, Ovules Sédo-Hémostatiques du Dr Jouve, Vitimone.*
- Lab. Juin 10, Impasse Milord, Paris (XVIII^e). — *Phosphopinal Juin, Pulmodion, Pulvéol.*
- Lab. Julien, 105, rue de Rennes, Paris (VI^e). — *Benzoflorine, Corylase, Elgine Julien, Manganophosphal Julien, Pandrénaline Julien.*
- Jus de Raisin Pampryl, 21, r. de Mâcon, Paris (XII^e). — *Jus de Raisin naturel, Pampryl.*
- Lab. du Kaléfluid, 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e). — *Bigonor, Bronchofluid, Gastrofluid, Kalefluid, Mériod, Ovcaline.*
- Lab. du Kaobrol, 54, r. de Paris, Charenton. — *Bigyn', Colisel, Cytopan, Dosotol, Kaobrol.*
- Lab. de la Kaviase, 22, rue Lalande, Paris (XIV^e). — *Kaviase.*
- Lab. du Kéralax, 1, r. Auber, Paris. — *Kéralax.*
- Lab. L. Kerfysen, 25, rue de Calais, Dunkerque (Nord). — *Benzoquinol, Dermaline Demeulenaere, Globabyl, Hémorroïdine (Pommade, Gouttes, Suppositoires), Sirop Kopé.*

- Lab. du Képhédryl**, 1, rue Auber, Paris. — *Képhédryl*.
- Lab. du Dr Kirchner**, 24, r. de Verdun, Strasbourg (B.-Rh.). — *Pancreal Kirchner*.
- Lab. Koehly**, 18, r. de Ménilmontant, Paris. — *Carboxine*, *Eubine*, *Malzemose*.
- Lab. Kraus**, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Anti-convulsif Kraus*, *Citrol*, *Coroplasme*, *Francoplaste*, *Furoncide*, *Ombiplaste*, *Poroplaste*, *Protège-vaccin Kraus*, *Savon Glytra*, *Savon Neutrèpur*, *Solargol*, *Traumatol*, *Traumatoplaste*.
- Lab. Krieger**, 121, av. de St-Ouen, Paris (XVII^e). — *Antipur*, *Artérioveinine*, *Butyral*, *Eczémacure*, *Gélocalcine*, *Géraldine*, *Organocalcine*, *Sciaticure*.
- Lab. René Krotoff**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII^e). — *Dolpuc*.
- Établ. Kuhlmann**, 145, bd Haussmann, Paris. — *Binidia*, *Binoxol*, *Chloralosane*, *Dithioral*, *Sunalcol*, *Sunoxol*.
- Lab. d'Applications Biologiques (Labiola)**, 52, r. de Cambral, Lille (Nord). — *Doganol*, *Encytral*, *Cordonner*, *Gynoids*, *Gynodine*, *Icorase*, *Kaneuron*, *Koddyl*, *Sidéranyl*, *Spasmocalcyl*, *Stinergix*, *Stosédol*, *Viabylis*.
- Lab. Labocip**, René Cerbelaud, docteur en pharmacie, 82, av. de Suffren, Paris (XV^e). — *Efflozone Labocip*, *Solusoufre Labocip*.
- Lab. Lacombe**, 4 ter, r. Barbès, Courbevoie (Seine). — *Bemax*, *Eno's Fruit Salt*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène*, *Do-sa-no-sal*, *Fanerval*, *Surbical*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Arsi-Quinoforme*, *Camphostyl simple*, *spartéiné et strychniné*, *Luerol*, *Neurotrope*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme*, *Santal saloté*, *Vanucléol*.
- Lab. du Dr Lafay, Lecoq et Ferrand**, pharmaciens, 54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence, Paris (IX^e). — *Cura-luès*, *Drainobyl*, *Flor-Peyotl*, *Ovules Hystan*, *Solutions mercurielles injectables du Dr Lafay*, *Suppositoires mercuriels du Dr Lafay*.
- Lab. Laffort**, Joué-lès-Tours (I.-et-L.). — *Evobiline*, *Fluokol*, *Lysosclérol*, *Septolan*, *Uvotanyl*.
- Lab. Lafran**, 8, rue de Prague, Paris. — *Aspirine Lafran*, *Charbenzo Lafran*, *Dicodéine Lafran*, *Glandimbine Lafran*, *Parégorique Lafran*, *Urotropine Lafran*.

- Lab. F. Lagarce (D^r en Ph^{ie}), 13, Place de la Nation Paris. — *Cholofluol, Ophthal.*
- Lab. du Laitancyl (M. Panier), 69, r. Faidherbe, Malo-les-Bains. — *Laitancyl.*
- Lait Guigoz. 2 et 4, rue Catulle-Mendès Paris (XVII^e). — *Babeurre Guigoz, Lait en poudre Guigoz, Lait dextrosé-malté Guigoz, Lait déchloruré Guigoz, Ravix (lait Guigoz irradié).*
- Lab. Lagoutte. 85. cours Albert-Thomas, Lyon. — *Boldolactic, Calmocardine, Dermodulcis, Phlébos, Suppoalgos, Suppocamphryl, Suppopulmos, Suppothemos, Suppotionic.*
- Lab. du D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude. — *Adolol, Analgol, Catemenyl, Cemag, Crémasepta, Pastilles Helge, Sirop Helge, Stenon du D^r Gelm, Udanka, Urigène.*
- Lab. Laleuf, 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e). — *Adrépatine, Colloïdine, Créosal, Crinocardine, Folliovarine, Iodatoxine, Lobéliane, Pancrépatine, Pavérinol, Plexalguine Laleuf, Polyferments, Sirop Dubois au créosal, Théocardine Laleuf, Théovérine Laleuf, Trinibaine Laleuf, Trinitral Laleuf, Trinitrine caféinu Dubois, Trinitrine-Papavérine Laleuf, Trinitrine simple Laleuf, Urisal du D^r Deschamp, Urococcine.*
- Lab. Lambert, 6, rue de Longchamp, Vichy. — *Épicral, Oxylysine, Triseptine.*
- Lab. Lambert, pl. du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac, Fenucine.*
- Lab. Lambiotte frères, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine, Créosoforme, Galform, Perles Taphosote, Phosote, Thiosole, Urométine.*
- Lab. Lamo, R. Rousseau, docteur en pharmacie, 49, rue du Château-d'Eau. Dépôt général : 52, rue de Crimée, Paris (XIX^e). — *Acaïol, Ixogyne, Pepsodia, Phyltergol, Rylal Noyon, Tergyl, Torigyre (Sirop et Dragées), Toritane, Toritanol, Tristyl Noyon.*
- Lab. Lancelot, 100 ter, av. de Saint-Mandé, Paris (XII^e). — *Appareil et Spécifique Lancelot.*
- Lab. des Procédés André Lancien, G. Weber, pharmacien, 8, rue des Capucines, Paris. — *Métaux colloïdaux et Dérivés Cinnamiques.*
- Lab. Lancosme, 19, rue Alain-Chartier, et 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris. — *Acolitol, Algocratine, Anhé-mor, Argybil, Bain Carré, Bismhydral, Bismuth Des-leaux, Bistomax, Carbonate de chaux Lancosme, Gargarisme Lancosme, Globules Laincar, Hémodrome, Inhalation Lancosme, Magnésie Storke, Rect' Acolitol.*
- Lab. Landrin et Cie, 12, rue de la République, Puteaux. — *Cipromarol, Elixir de Virginie Nyrdahl.*

- Lab. **Lang et Cie**, 7, rue Charlot, Paris (III^e). — *Cachets Glycofuges*, *Capsules Dieu*, *Digestif Capmartin*, *Ficatine*, *Hémoglobine Star*, *Oxydolysine*, *Poudre Cap*, *Savons Mollard*, *Salvanos*, *Sel Zem*, *Sirop Jane et pâte Jane*, *Sirop Zemetle*, *Vermifuge des Moines*, *Yohimbine Gilbert*.
- Lab. **J. Laroze**, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bigynol*, *Colisel*, *Cytopan*, *Dosotol*, *Granuchol*, *Kaobrol*.
- Lab. **Laryngologique**, **H. Cordier**, 222, fg St-Martin, Paris. — *Hydrorrhéol*, *Inhalation gargarisme VocaIdop*, *VocaIdop*.
- Lab. **F. Latour**, 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil (Seine). — *Parlax*, *Phonodiose*.
- Lab. **du Dr Laurent-Gérard**, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Acétamone*, *Evolaxine*, *Plexamine*, *Radiotétrane*.
- Lab. **Lauriat**, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Anti-Asthénie Lauriat* (*Ex-Lauriatol*), *Bronchoseptol*, *Isorgane*.
- M. J. Laurin**, pharmacien, 3 et 5, rue Alexandre-Dumas, Saint-Ouen (Seine). — *Neuréol*, *Sulfobyl*, *Zymogastrine Kervan*.
- Lab. **du Dr Lavoué**, Rennes (I.-et-V.). — *Ephydion*, *Felisedine*, *Gouttes Elixir et Sirop I. A. M.*, *Mangarsenic*, *Salicylina*, *Uro-Bestol*.
- Lab. **Lavril**, Pacy-sur-Eure. — *Gyno-Lactosmose*, *Lactosérum Lavril*, *Lactosmose*, *Ovules au Lactosmose*.
- Lab. **Lebeault, Besins et Cie**, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citrolargol*, *Germose*, *Mycolysine*, *Staphylase du Dr Doyen*, *Veinosine*, *Vin de Bugeaud*.
- Lab. **Le Blond**, 15, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Seine). — *Ortho-Gastrine*, *Orthophorine*, *Pyurol*.
- Lab. **Leboime**, 1, 3 et 5, r. Fernand-Widal, Paris. — *Calcozymase*, *Prezymase*.
- Lab. **Lebrun**, 155, bd Magenta, Paris. — *Dragées toni-cardiaques*, *Eucalyptine*, *Pancalcion*, *Sirop d'Eucalyptine*, *Suppositoires Eucalyptine*.
- Lab. **Leclerc**, 10, rue Vignon, Paris. — *Cador*, *Entérochir*, *Entérophage*, *Entéroxin*, *Félicol*, *Magnétone*, *Sélamon*, *Solution Normet: chirurgicale, médicale, sclérolitique*, *Staphylophage*.
- Lab. **Leconte**, 7, r. des Petits-Carreux, Paris. — *Ambocurine*, *Bilaxyl*, *Choléfluine*, *Euglyma*, *Gouttes Leconte*, *Lactocalcine*, *Rénoline*.
- Lab. **Lecoq et Ferrand**, 14, rue A.-Briand, Levallois-Perret. — *Antipsorine*, *Curalues du Dr Lafay*, *Erythrolues du Dr Lafay*, *Gatran*, *Helminthyl*, *Lipaurool*, *Molène*, *Muthiode*, *Néosolmuth*, *Pentarsyl*, *Tréparsol*.

Établ. Pharmaceutiques M. et P. Ledent, Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — *Décholestrol*, *Opogermine irradiée*.

Lab. Lees, 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Métritols*, *Suppogynals*.

Lab. C. Le Follet, Nozeroy (Jura). — *Opobrol*, *Suroxydal*.

Lab. Legendre et Cie, Houilles (S.-et-O.). — *Gasmar Legendre*, *Pâte Mireille*, *Sirop Mireille*.

Lab. Legoux frères, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. (Voir Lab. du D^r E. Duhourcau.)

Lab. Legrand, 11, pl. Louis-XII, Blois (L.-et-Ch.). — *Hépatomanganol*, *Lactoseptyl*.

Lab. Lejeune, 142, rue de Picpus, Paris. — *Diachusine*, *Indhaméline simple*, *Indhaméline plurigl.*, *Patholysine*, *Pommade Lenoir*, *Protensène*, *Vernis à la Diachusine*.

Lab. Lematte et Boinot, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acécolex*, *Acécoline*, *Acécoline-spartéine*, *Acécoline-camphre*, *Acécoline-yohimbine*, *Arsoplasmine*, *Biocalcose Chevretin*, *Calcional*, *Cholestériodine*, *Hémotonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Hypotan Injectable*, *Jap*, *Lactozymase B*, *Lipocérébrine*, *Océanine*, *Pressyl*, *Séroferrine*, *Tonikéine*.

Lab. Léonardon, 1, r. Paul-Bert, Angers (M.-et-L.). — *Cacheis Asminol*, *Hemofluidol*, *Quinthéryl*, *Splenora*.

Lab. Le Perdriel, 11, rue Milton, Paris. — *Antipyrine effervescente Le Perdriel*, *Benzoate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Biosine Le Perdriel*, *Bromhydrate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Carbonate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Citrate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Coaltar Saponiné Le Beuf*, *Fucoglycine du D^r Gressy* (sirop bromo-iodo-phosphoré végétal), *Glycérophosphate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Goudron Le Beuf* (émulsion de goudron végétal), *Salicylate de lithine effervescent Le Perdriel*, *Tolu le Beuf*.

Lab. du Leptol, 333, rue de Vaugirard, Paris (XV^e). — *Leptol*.

Lab. Lersam, André Ingé, Ph^{en}, 92, bd Murat, Paris (XVI^e). — *Amphotonyl*, *Arsécrinol Lersam*, *Ethyl-Pneumine*.

Lab. Lescène, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquintine Lescène*, *Balsamol*, *Choléo-Zymatine*, *Rhinaquintine*, *Viosten*, *Zymatine*.

Lab. G. Lesourd, 88, r. Duhesme, Paris (XVIII^e). — *Anthylline*, *Bolcitol*, *Foenugol*, *Gouttes C. Z. A.*, *Gouttes C. C. U.*, *Lucinine Borelle*, *Péricols du D^r Legros*, *Radiesthésie Médicale*, *Sels-Mags*, *Splénocarbène*, *Tisane Anticolibacillaire*, *Tisanes Lesourd n^{os} 19, 62, 55, 10, 20, 40, 3.*

Lab. Lesure, 70, rue du Bac, Paris (VII^e). — *Arquéritol Lesure*.

- Lab. du D^r Le Tanneur**, 87, av. Borriglione, Nice. — *Tannur-gyl*, *Minérolaxine*.
- Lab. Lettry**, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl*, *Gouttes de Sérû*, *Hederyl*, *Pommade de Sérû*.
- Lab. Leurquin**, 50-52, rue Pierre-Legrand, Lille. — *Bromo-carbone*, *Kinégastrine*, *Pulmofluide*, *Pulmofuide éphé-driné*, *Sels Na 4*, *Tablettes Gélok*.
- L. E. V. A.**, 26, rue Pétreille, Paris. — *Lénifédrine*, *Léniforme*.
- Lab. de la Levure Mycéta**, 34, rue Vignon, Paris. — *Levure Fraîche Mycéta*.
- Lab. Licardy**, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl*, *Gélogastrine*, *Hémoductyl*, *Laxamalt*, *Sédosine*, *Storé-drine*, *Tonudol*.
- Lab. des Lices**, 38, rue des Lices, Angers. — *Anturic Labesse*, *Gadiodine*, *Gouttes de Quarantaine*, *Hypotensol*.
- Lab. des Lipides**, 14, r. des Minimes, Paris. — *Dermosplénine*, *Liposplénine du D^r Groc*, *Splénogastrine*.
- Lab. de la Liposeptine**, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Dépurogène*, *Fenugrène*, *Fucusol*, *Gastrobiase*, *Liposeptine*, *Liposeptol*, *Marrubène*, *Pansolanée*, *Rhino-Liposeptine*, *Sonène*.
- Lab. du Livartil**, 86, r. du Pas-St-Georges, Bordeaux. — *Livartil*.
- Lab. Lobica**, 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e). — *Azotyl*, *Béatol*, *Carditone*, *Chlorobyl*, *Iodo-trypsine*, *Lactobyl*, *Lactochol*, *Nutréine*, *Pneumo-calcine*, *Sérénol*, *Taxol*, *Uralysol*, *Veinotrope*.
- Lab. Lobru**, Louis Brun, pharmacien, 26, rue Vauquelin, Paris. — *Guaraphos*, *Produits Zyma*.
- Lab. Lobry**, 6, r. Parrot, Paris. — *Néphrylan*.
- Lab. des Spécialités Scientifiques Logeais**, 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Panxylon* (*Ampoules et Granulés*), *Pommade Logeais* (*Rectaméline*), *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.
- Lab. Jacques Logeais**, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux. — *Boricine Meissonnier*, *Fluidostérol*, *Globules Secre-tan*, *Iodamélis*, *Naiodine A et B*, *Opo-Iodamélis*, *Thio-naïodine A et B*, *Comprimés dragéifiés de Thionaiodine*.
- Lab. Marcel Logeais**, 24, rue des Plantes et 1, r. Bénard, Paris. — *Analgésol*, *Choléopeptine*, *Sanicérène*.
- Lab. Loiseau**, 61, bd Malesherbes, Paris. — *Gubline*.
- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Carbofixine*, *Cholépan*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Hama-citro*, *Narcyl*, *Orlho-Zomine*, *Phospho-Strychnal*, *Phyto-java*, *Pilules du D^r Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalguine*, *Rhi-nalginol*, *Siphuryl* (*Orthosiphon Longuet*), *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.

Lab. Lormeau, 27, r. Planchat, Paris. — *Cépaïne*, *Curalisine*, *Glycarsol*, *Hépasel*, *Vascosodine*.

Lab. Lorrain de Produits purs, Etain (Meuse). — *Caparlem*, *Collosoufre*, *Cryosan*, *Sérocalsine*.

Lab. J. Lorthioir, 22, rue Perceval, Paris. — *Biotrignon*, *Carbotrignon* (synonyme *Biotrignon hépatique*), *Diurophyte*.

Lab. A. Louveau, 78, bd des Batignolles, Paris. — *Arthri-Biose Louveau*, *Iodehaméline Louveau*, *Sulfoline*, *Suppositoires Almine Louveau*, *Urosodine Louveau*.

Lab. André Lucien, 19, rue du Bac, Paris (VII^e). — *Atospi-pirine*, *Josicol*.

Lab. Lumière (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, rue Villon, Lyon. — *Allocaïne Lumière*, *Allochry-sine Lumière*, *Antipaludique*, *Borosodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Emgé Lu-mière*, *Entalva Lumière*, *Enierovaccin Lumière*, *Gelée Lumière*, *Granulochrysine Lumière*, *Hémoplasie Lu-mière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lu-mière*, *Néokola Lumière*, *Oléochrysine*, *Oléochrysol*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.

Lab. Lutsia, 4, villa Ornano, Paris. — *Gélo-Baby*, *Lenidol*, *Rhinogénol*, *Sédosol*.

Lab. Henri Luzuy, 29, r. Carnot, Levallois-Perret (Seine). — *Neuroferyl*.

Lab. des produits au Lynoléol, Oullins (Rhône). — *Lynoléol*.

Lab. Madyl, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Tapo*.

Lab. du Magbi, 61, r. de Seine, Paris. — *Magbi*.

Lab. du Magsalyl, 10, rue J.-Hachette, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl*, *Magbromyl*, *Magiodyl*, *Magsalyl*.

Lab. Mahé, pharmacien, 85, rue de Trignac, Saint-Nazaire-Penhoët (L.-Inf.). — *Sirop Hercell*.

Lab. du Mainguy, M. Bassin, Bondy (Seine). — *Stupho*, *Véral-gine*.

Lab. de la Maisleriasse, 143, rue d'Alésia, Paris (XIV^e). — *Maisleriasse*.

Lab. Malmanche, 101, av. Paul-Doumer, Rueil-Malmaison. — *Digestif Harvey*, *Rosalyl*, *Urobuccol*, *Valérinodor*.

Lab. du Malone, d'Héliot, Dinard (Il.-et-V.). — *Gouttes Malone*, *Somnalone*, *Spasmolone*.

- Lab. de la Manacine**, 83, bd de la Villette, Paris. — *Manacine*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées Mannet ferro-ergotées*, *Elixir Mannet ferro-ergoté*, *Elixir tribromuré Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au Salol*.
- Lab. Marceau** (D^{rs} A. Grigaut et A. Boutroux, pharmaciens, chefs de Lab. à la Faculté de Médecine), 25, rue du Général-Foy, Paris. — *Carb*, *Carbagyre*, *Cholérène*, *Olévone*.
- Lab. Marchand et Leroy** E. Marr^{rs}, Succ^{rs}, 74, rue des Jacobins, Amiens. — *Isotonine*, *Nogaldyl*, *Préventyl*, *Puréthyl*, *Viristhène*.
- Lab. Margex**, 13, r. Mélingue, Paris. — *Gréositoires*, *Gencigel*.
- Lab. Marinier**, 23, rue Ballu, Paris. — *Bi-Citrol*, *Carbagol*.
- Lab. Mariotte**, 15, rue Pasteur, Bourg (Ain). — *Neutropeptine*, *Pectosédyl*, *Phytogénol*, *Taxobyl*.
- Lab. Mars**, Guérande (L.-Inf.). — *Argyrescine Mars*, *BB Derm Mars*, *Sanubrol Mars*, *Seinderm Mars*.
- Lab. Martin**, 25-27, r. du Commandant Rivière, Colombes (Seine). — *Cytobiase*, *Quinosiphon*.
- Lab. Martin**, 4, rue Nationale, Cloyes (E.-et-L.). — *Embriocation Siamoise*, *Olcantrol*.
- Lab. du D^r Martinet**, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Granoxyl*, *Gynarsol*, *Hémanausine*, *Hépadrainase*, *Hormovitrol*, *Hygioline*, *Insuline Novo*, *Lipolysine*, *Lymphiode*, *Magnésosvules*, *Néocollargol*, *Pangaduine*.
- Lab. Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Benzosulfène*, *Phlebotonine*, *Tonicalcine*, *Uvargol*.
- Lab. Maronneau-Morel**, 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie (Seine). — *Curiosan*, *Gamostyl*, *Trépositaires*, *Vaccin anticolibacillaire polyvalent M.-M.*
- Lab. du Marubor**, 1, rue d'Arras, Béthune. — *Carbolaxine*, *Marubor*.
- Lab. Masson**, 2, place de la Porte-des-Ternes, Paris (XVII^e). — *Continol*.
- Lab. R.-L. Mathivat** (Synthesis), 66, rue de la Pompe, Paris (XVI^e). — *Novatropine*, *Pantocamphre*, *Perparine*, *Surparine*, *Trepallix*.
- Lab. Mauchant**, 22, bd Camelinat, Gennevilliers (Seine). — *Asthmapepton*, *Cassitol*, *Fluveinose Mauchant*, *Héparmine Mauchant* (Ampoules buvables et sirop), *Iododanueléol*, *Lipovita*, *Maltine Phenix*, *Minéraline du D^r C. Baud*, *Myodyne Mauchant*, *Narkène*, *Phoscamine*, *Rhodoboryl*, *Salubrine* (Liquide et Comprimés), *Sirop Mauchant*, *Solvuric*, *Suc Durham*, *Tercolène*, *Trilactine*.

- Lab. P. May, 215, bd Voltaire, Paris (XI^e). — *Tympanyl May*.
- Lab. Mayaud, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ulcérophile Nosan*.
- Lab. Mayoly Spindler, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma, Borostyrol, Dicaliode, Euphon, Fluenzyl, Isoluol, Kalastyl, Pérubore, Pipettes nasales M. S., Rhino-Borostyrol, Sanoformine, Stillargol, Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. — *Fludiose, Formocarbène, Opochol, Sodothioli*.
- Lab. Médico-Pharmacologique de Vichy, 1 et 3, r. Lafloque, Vichy. — *Frugéolines-Vichy, Neutroses-Vichy*.
- Lab. du Mensuosédyl, P. Augier, Pharmacien, 2, r. des Lombards, Paris (IV^e). — *Affinex*.
- Lab. Mercier, Fécamp (S.-I.). — *Baume Iki, Pommade Aiphème, Savon Aiphème*.
- Lab. Mercier, 41, route de Turin, Nice. — *Iodorganine Mercier, Comprimés Mercier à l'Iodorganine, Dépuratives Mercier, Gastrine Mercier, Mammairo varique Mercier, Veinovarine Mercier*.
- Lab. Merlet, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine. — *Ephédrolénol, Ephédrolyptol, Stragol*.
- Lab. J. Messis, 71, av. de la République, Champigny (Seine). — *Agozymase, Guérysipèle, Hémostrope (Gouttes), Santal Dolmay, Urosinol Damber, Vicéliase, Vigotonique*.
- Lab. du Métacuprol, 5, rue Pajou, Paris (XVI^e). — *Métacuprol, Phytocurine*.
- Lab. Paul Métadier, Tours. — *Méta-Titane, Méta-Vaccin*.
- Lab. Mètère, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne (Seine). — *Bécalciol « Mètère », Cuprosténol « Mètère », Diathès « Mètère », Huile camphrée Manganésinée « Mètère », Solthermol « Mètère »*.
- Lab. Meunier, r. du Commerce, Montmarault (Allier). — *Calmant Meunier, Kalmigraine, Tonucyl*.
- Lab. Mexyl, 6, rue des Dames. — *Collutoire Mexyl, Filtraxyl, Mexyl, Trineuxyl, Wipla*.
- Lab. du D^r Mialhe, 8, rue Favart, Paris. — *Adrénine, Aquintol-Mialhe, Digi-Lanatine, Digi-Mial-Baine, Digitaline-Mialhe, Elixir du D^r Mialhe, Lab-lacto-ferment, Ouabaine-Mialhe, Salvacid*.
- Lab. Michel, Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.). — *Chasvers Michel, Fluidobile, Xeroderme*.
- Lab. Michelon, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Æsculase, Sonagar, Sonamel*.
- Lab. Michels, 4 bis, rue du Colonel-Moll, Paris (XVII^e). — *Chloro-calcion, Siliscde*.

- Lab. de Microbiologie**, 11, Chaussée de la Muette, Paris (XVI^e). — *Anthraxone Fornet, Blennosine Fornet, Grippol Fornet, Héparcyl, Insuline Fornet, Néosuline, Pommade Fornet, Tébéphaguine Fornet.*
- Lab. du Mictasol**, 155, bd Magenta, Paris. — *Mictasol, Mictasol Bleu, Mictasovules. Suppositoires Mictasol.*
- Lab. Midy**, 67, av. de Wagram, Paris. — *Algipan Midy, Antidiabétique Midy, Antigastralgique, Antigrippine Midy, Bétul-ol Midy, Bi-iodure de mercure indolore Midy, Carbolin Midy, simple et composé, Cascara Midy, Cocaïne Midy, Colchi-Sal Midy, Panlacto Midy, Pipérazine Midy, Pommade Midy, Proveinase Midy, Suppositoires Midy, Thiodacaine Midy, Thiodérazine Midy.*
- Lab. L. Mignard**, 24, bd de Sébastopol, Paris. — *Entelactol, Total Magnésien.*
- Lab. E. Millet**, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos, Comprimés et Suppositoires de Calomel, Comprimés de Carbonate de chaux, Formocarbos, Laxoléine, Mucicarbos, Mucilaxine, Mucilose, Rectoplasme.*
- Lab. Millet et Guillaumin**, 5, r. Ambroise-Thomas, Paris. — *Hormuclases du D^r Roussel, Kénol, Myovarsyl, Paxène, Sripsol, Uclarsyl, Vanadyl, Vanoxyle.*
- Lab. Millot**, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Ampoules Dubé, Benzo-bismuth Millot, Comprimés néothorium Millot, Crayons néothorium Millot, Inophylène (Comprimés, Suppositoires, Ampoules), Orargol (Rhino, Gouttes, Collyre, Ampoules), Ovules néothorium Millot, Pommade néothorium Millot, Sarcoptol, Soluté Gaube du Gers.*
- Lab. Miluc (M. Ragoucy)**, 2, r. Joseph-Bara, Paris (VI^e). — *Allergantyl Miluc, Nervantyl Miluc.*
- Lab. Géo Miquel**, 1, av. Lowendal, Paris. — *Glyco-M, Sanos, Selunin, Witch Hazel.*
- Lab. A. Mironneau**, Pharmacien à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Drinal, Hormiadyne, Sodergyl.*
- Lab. Moislère**, 62, r. du Gros-Noyer, Ermont (S.-et-O.). — *Sirop Eupéptique Bi-Ci-Pa.*
- Lab. J. Moity**, 199, bd Bineau, Neuilly-sur-Seine. — *Aérococyl, Amphostabyl, Antalgy, Cynefluine, Ionisalt, Panfluine, Pansmacol, Strongenol.*
- Lab. Monal**, 13, avenue de Ségur, Paris. — *Boléase, Forcival, Globules Romon, Iodolipine, Magnogène, Prostal, Santal Monal au Bleu de méthylène, Sulfuryl Monal, Taburol Monal, Tensédine, Terkal Monal, Trinivérine.*
- Lab. Moncour**, 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour (sphérulines et néo-sphérulines), Vitacalcine Moncour.*
- Lab. Monin**, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Cruxol, Dépuratif Rob. Lechaux, Elixir Grez, Liqueur de l'Etoile anti-asthmatique, Pilules anti-névralgiques du D^r Cronier, Poudre Bloi laxative, Vagostabyl.*

- Lab. Montagu**, 49, bd de Port-Royal, Paris. — *Broméine Montagu, Carbalcaloïdes, Carbatropine, Carbosanis Dragées Hecquet, Génacide, Iodéine Montagu, Lac-Ser, Papier réactif du Génacide, Savons Michon.*
- Lab. Moreau**, 13, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Lanceryl, Plaganol.*
- Lab. Morellet**, Bagnoles-de-l'Orne (Orne). — *Bagnolax, Euchol, Sulfur concentré Dax.*
- Lab. Moser et Cie**, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée.*
- Lab. Mothersill Remedy Company**, 5, rue de Provence, Paris. — *Mothersill's Seasick Remedy.*
- Lab. Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseptone, Bacilactine, Baume Dolora, Benzothymol, Poudre Helvétia, Purgemini granulé, Rhinodol, Sirop Diver au Gaïacol ou au Bromoforme, Uricine (cachets, solution).*
- Lab. Mouneyrat, Dr Mouneyrat, Prof. Agrégé Faculté de Médecine**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Histogénol, Vioxyl, Hectine, Heclargyre, Kinectine, Arsénomyl, Olbia, Exobol, Nitrargol.*
- Lab. Mouré**, 5 bis, bd des Italiens, Paris. — *Artério-Phan, Crino-serum, Sirop Mortas.*
- Lab. Mousnier-Delorme**, 28, rue Velpeau-Antony (Seine). — *Dragées du Dr Gélinau, Sirop du Dr Gélinau.*
- Lab. du Dr Moustier**, Saint-Vallier (Drôme). — *Pilules du Dr Moustier*
- Lab. du Musculogenol**, 117, rue Victor-Hugo, Houplines (Nord). — *Musculogenol.*
- Lab. du Muxagol**, 8, r. Dr Jean-Sicard, Marseille. — *Muxagol.*
- Lab. du Myoral**, 3, r. Saint-Roch, Paris. — *Calcium-Francalcium, Francalcium, Franlaxol, Myoral.*
- Lab. Nacher**, Pharmacien licencié ès sciences, 71, bd Carnot, Toulouse. — *Glucoxyl Nacher.*
- Lab. P. Nadaud**, 11, bd de la Villette, Paris (X^e). — *Sédoplexine, Sédorectal, Toniflux, Ulcérine Berger.*
- Lab. Nador**, 25, r. de Tocqueville, Paris (XVII^e). — *Aseborhal-Nador.*
- Lab. du Dr Narodetzki**, 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris. — *Elixir Spark, Griponal, Halifletol, Nazophyl Darva, Spyrolides.*
- Lab. Nativelle**, 27, rue de la Procession, Paris (XV^e). — *Actibaïne, Digitaline Nativelle, Natibaïne Nativelle, Natirose, Ouabaïne Arnaud, Quinicardine.*

- Lab. du Néocrinol**, 117 ter, rue Ordener, Paris. — *Bissyl, Néocrinol.*
- Néoplastex (Thuasne et Cie)**, 71, Fg St-Martin, Paris (X^e). — *Attaches Néoplastex, Bande Néoplastex.*
- Lab. du Néo-Rhénium**, 82-84, rue de Belleville (XX^e). — *Néo-Rhénium.*
- Lab. de la Néphralbine**, R. Faure, D^r en Pharmacie, 2, r. Carnot, Melun (S.-et-M.). — *Néphralbine.*
- Société Nestlé**, 6, av. César-Caire, Paris. — *Babeurre en poudre (Elédon), Lait en poudre demi-gras, Nestogène, Pélargon.*
- Lab. du Neurophoryl**, 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine). — *Bromephra, Cascalobyl, Dolental, Euges-tol, Neurophoryl.*
- Lab. du Neurophytol**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII^e). — *Neurophytol.*
- Lab. H. Noé**, 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux (Nord). — *Carbophos, Citrofos, Chloropeptase.*
- Lab. Noelline**, Guigamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline, Poudre Noelline, Noelline (Sirop laxatif), Noelline (Savon).*
- Lab. H. Nogues**, 7, r. Galvani, Paris. — *Grains de Vals, Baume maternité, Capsules Noguès, Comprimés Purgos, Néoarsite, Pilules Gip, Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Noguès, Thébail, Urémiase.*
- Lab. Nollet**, 47, rue Nollet, Paris (XVII^e). — *Boroformyl, Borosol, Héduisol, Pyrocurool, Végéla.*
- Lab. du Normogastryl**, 14, rue des Minimes, Paris. — *Pelvi-formine, Plasmosthène.*
- Lab. Novalis**, Oullins (Rhône). — *Adrénargol, Gouttes Eryl, Lénadryl, Lugocalcion, Nasobore, Novolug, Purargol, Résocaïne, Sulfoxyl, Urométhyl, Valénal.*
- Lab. du Novigol**, 24, rue de Lesson, Rochefort-sur-Mer (Ch.-Inf.). — *Novigol.*
- Lab. Oberlin**, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon, Analgénine, Biodynamine, Capsules grises Cabanès, Ferropéptone Oberlin, Gastrocalcine, Gouttes Linober, Granulé Tinardon, Gynaicéol, Hamaméliode, Iode Oberlin, Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin, Potion Bonnet, Rob Cabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Salolé Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sirop Tinardon, Suppositoires Cabanès, Uraséol.*

- O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris. — *Lait de magnésie Phillips*, *Pâte dentifrice Phillips*.
- Lab. Odilia, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — *Gynopausine*, *Inolène* (simple, thymolé), *ovules à l'Inolène*, *pommade à l'Inolène*, *poudre à l'Inolène*, *Nasolène*, *Sedofolline*.
- Lab. Odinot, 21, r. Violet, Paris. — *Calciline*, *Gastro-Sodine*, *Néo-calciline*, *Pluribiase*, *Sel digestif Bé Mé Cé*.
- Lab. de l'Oliphédrol, 18, rue Daval, Paris (II^e). — *Oliphédrol*, *Oliphédrol BB*, *Quintozone*.
- Lab. J. Olive, 14, rue des Minimes, Paris. — *Trisalyl*.
- Lab. Olivéol-Hépaticol-Etiévant, (Ed. Brun), La Demi-Lune (Rhône). — *Hépaticol*, *Oléol*, *Olivéol*, *Vasocônes*, *Vasoconstrictine*.
- Lab. des Prod. Ollivier, de Rochefort-sur-Mer, préparés par les Lab. Hardy, 42, bd St-Marcel, Paris (V^e). — *Cachets Céli*, *Cachets Syncal*, *Dragées Céli*, *Poudre Syncal*, *Spécifique Saint-Jean*.
- Lab. Oliviéro, Boulogne-sur-Seine. — *Algostérine*, *Biocéane*, *Cytomagnésium*, *Hépatine Gad*, *Hétérolysine*, *Mégathion*, *Sérum de cheval Oliviéro*.
- Lab. Omnither, 33, rue Barthou, Angoulême (Charente). — *Suprasthényl*, *Taniglane*.
- Lab. Ophidios, 84, rue du Bac, et 67, rue de Grenelle, Paris (VII^e). — *Ampoules antalgiques Ophidios*.
- Lab. de l'Opocalcium (A. Ranson), 96, r. Orfila, Paris. — *Anaclasine*, *Anaclasine Infantile*, *Opocalcium*, *Opoferrine vitaminée*.
- Lab. Opos, 60, r. Nationale, Castelnaudary (Aude). — *Aubeliode*, *Oponergyl*, *Oposséine*, *Rhumofan*, *Septisan*.
- Lab. Moderne d'Opothérapie et Biologie médicale, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — *Glandocalcyl*, *Hépatozyl Caldo*, *Nucléophorène*, *Sclérosérol*, *Veinoposine*.
- Lab. de l'Orcalcine, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Orcalcine*.
- Lab. Orrillard, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Biarsol*, *Papaveryl*, *Paxol*.
- Lab. de l'Ostréiode, av. Nelly-Deganne, Arcachon (Gironde). — *Ostréiode*, *Ostréiode injectable*.
- Lab. de l'Oxyplastine, 78, av. de Saint-Ouen, Paris. — *Oxyplastine*.
- Lab. de l'Ozol, 63, av. de Wagram, Paris. — *Ozol*, *Ozolase*.
- Lab. Ozothine, 23, r. Sébastien-Mercier, Paris (XV^e). — *Ozothine*.
- Lab. Pachaut, 130, bd Haussmann, Paris. — *Bromures Pachaut*, *Cachets Pachaut Alpha et Gamma*, *Eupaveryl Pachaut*, *Iodures Pachaut*, *Limonade hypotensivé Pa-*

chaut, Lotion végétale Pachaut, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-polassique Pachaut, Tubes de Bromure Pachaut, Valériane liquide Pachaut.

Lab. de la Pancréatose Idon, Jean Brevière, successeur, D^r en Pharmacie, 89, r. St-Georges, Nancy. — *Pancréatose Idon (poudre, cachets, granulé), Poudre Cosy.*

Pansements Prima, 3, rue des Reculettes, Paris (XIII^e). — *Bande Mérinos-Bébé, Bio-Titane-Prima, Crêpe Eglanos, Multiplast, Plasmo-Prima, Prima-Furoncles, Primaplast, Prima-Steril, Primatex, Stilplast.*

Lab. du Paraïode, 48, rue Paul-Barruel, Paris (XV^e). — *Paraïode, Ovules au Paraïode.*

Lab. Paret (28 ex-22), r. Guibal, Marseille. — *Azym, Cellules Paret, Fixase et Fixase irradiée.*

Lab. A. Paris, 4, rue de La Motte-Picquet, Paris. — *Hémophagosthyl, Lactolaxine, Oxydothyryne, Oxydovarine, Phagosthyl, Phagosthyl Mangané.*

Lab. du Parolagar, 348, r. St-Honoré, Paris. — *Parolagar.*

Lab. des Prod. Paterson (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris. — *Poudre Paterson, Pastilles Paterson.*

Lab. de Pathologie générale, 5, r. François-Ponsard, Paris. — *Néopancarpine, Rhinofluine, Vaso-neurine.*

Lab. Pautauberge, 10, rue de Constantinople, Paris. — *Broncurool, Dragées Pautauberge, Gaïacol Pautauberge, Kolarsine Pautauberge, Solution Pautauberge, Suppositoires Pautauberge (Adultes et Enfants).*

Lab. Pellissier, 33, av. de Villiers, Paris. — *Hépagastrrol, Héparfer, Opothérapies Pellissier, Opositoires opothérapiques Pellissier, Silicate de soude Pellissier.*

Lab. de la Pelviformine, 14, rue des Minimes, Paris. — *Nor-mogastryl.*

Lab. Pépin et Leboucq, 30, rue Armand-Silvestre, Courbevoie. — *Bromogénol, Gaurool, Guethural, Iodogénol, Sabur-rase.*

Lab. du Percalcium, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Percalcium.*

Lab. H. Perignon, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont. — *Elixir Godfrin.*

Lab. des Peroxydes médicaux, 12-18, r. Lamartine, Paris. — *Ektogan Bocquillon (Poudre, Pommade, Pâte, Méchettes, Gazes, Ovules, Ekto-Plaste), Hopogan Bocquillon (Cachets, Pilules glutinisées, Prise-Bébé), Hopo-ganase.*

Lab. Perrier, 17 bis, bd Rochechouart, Paris. — *Conval-baine, Scillitrine, Théocalciode.*

Lab. Perrin, 11, quai Saint-Clair, Lyon. — *Asclérosol, Eudynol, Guitose, Hém-antitoxine Sofos, Sulfarsiode, Virmonal.*

- Lab. Perrochon, Tours (I.-et-L.).** — *Eurectol, Grains d'Évian, Pulmocardine (simple et éphédrinée), Rénocardine.*
- Lab. Perroud, 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.** — *Carbonate de bismuth, Lénigastre, Tablettes Perroud.*
- Lab. du Pérusol, 31, rue Gambetta, La Rochelle.** — *Pérusol, Savons Benys.*
- Lab. J.-P. Petit, 72, bd Davout, Paris (XX°).** — *Neurotensyl.*
- Lab. de la Phagolysine, 14, rue Cantin, Courbevoie (Seine).** — *Phagolysine.*
- Lab. Pharmaceutiques du Rhône (P. Guély, D^r en Pharmacie).** — 16, cours Gambetta, Lyon. — *Bronchosédol, Glutines Chabre (KI ou NaI), Phosphobiol, Poudre Beau chloroformée ou Ether.*
- Pharmacie anglaise des Champs-Élysées, 62, av. des Champs-Élysées, Paris.** — *Emerson's Bromo Seltzer, Hazellium, Isocolium, Maté Douglas.*
- Pharmacie Biologique, G. Gombastel, F. Rischshoffer, S^r, 57, r. Mathurin-Régnier, Paris.** — *Panostyl, Vaccinothérapie Atoxique.*
- Pharmacie Centrale de Belgique, 12, rue du Téléphone, Bruxelles.** — *Carbobel, Digistabiline (Gouttes et Pilules), Hypersan, Iophénal, Névosan, Vitamorrhaine (granulés, perles et pommade).*
- Pharmacie Centrale de France, 25, bd Beaumarchais, Paris.** — *Adrénaline Invar, Caféine Invar, Crêpe Velpeau, Digitaline Invar, Pyroléol Edet, Théobromine Invar, Végéphos.*
- Lab. de Pharmacodynamie E. Poincier, 20, rue Beaubourg, Paris (IV°).** — *Nu-Phos, Sirop Rambaud.*
- Lab. de Pharmacologie générale (Vial et Cie), 8, rue Vivienne, Paris.** — *Boldorhéine, Capsules d'apioline Chapoteaut, Capsules à l'éther valérianique de Vial, Capsules à l'huile de génévrier de Vial, Capsules et injection au Matico de Grimault, Capsules de Morrhual Chapoteaut, Capsules de Morrhual créosoté Chapoteaut, Capsules de Cardiosthénine, Cigarettes indiennes de Grimault, Crystol, Cytobaume, Delbiase, Delbosel, Elixir polybromuré de Baudry, Elixir digestif de pepsine de Grimault, Farine maltée Vial, Fer Girard, Fer Leras, Gélodelbiase, Guarana purifié de Grimault, Ortholaxine, Oxygénase, Pastilles Palangié, Pharynxol, Phosphoglycérate de chaux Chapoteaut, Pnéoline, Poudre ferro-manganique de Burin du Buisson, Quinine Pelletier, Rhubarbe comprimée de Baudry, Santal Midy, Sédoprostyl, Sirop d'hémoglobine de Grimault, Sirop d'hypophosphite de chaux de Grimault, Sirop Lagasse, Sirop phénique Vial, Sirop de Raifort iodé de Grimault, Strontium Paraf-Javal, Vin et poudre de Peptone de Chapoteaut, Vin et sirop de Dusart au lactophosphate de chaux, Vitamina.*
- Produits Pharma-Scientia, 26, rue Gay-Lussac, Paris, (V°).** Concessionnaire : *L. Brun, pharmacien, 26, rue Vauquelin (V°). Artrocolchine «C», Atens, Cuproxil, Nesal.*

- Lab. Phéna, Boîte postale n° 5, Limoges (Haute-Vienne). — *Ovules Phéna, Phéna.*
- Lab. Philbert, 6, av. Mirabeau, Nice. — *Blüyl, Néovaryl.*
- Lab. Philippe, 122, Fg St-Honoré, Paris. — *Sédopavérine.*
- Lab. Philippe, 5, rue Mazard, Lyon. — *Fluidbos Moyet, Gouttes Phosbel, Likan asiatique, Orexyl.*
- Produits du D^r Philippe, 36, quai Fulchiron, Lyon. — *Anti-dote-Malaria, Capsules Henry, Gouttes Scandinaves, Kérasalicyl, Pilules Philippe, Produits Lemary, Santal Henry.*
- Lab. Phosma, M. Frémont, 143, Cours de la Somme, Bordeaux. — *Entérargol, Phosma.*
- Lab. du Phosol, 143, r. du Temple, Paris. — *Phosol, Quinobore.*
- Lab. de la Phosphocalcase, Bourgoin (Isère). — *Phosphocalcase du D^r Ferrier.*
- Lab. Phygène, 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine). — *Coluval, Hormantoxone, Lansoyl (liquide et gelée), Pineoleum, Quinolax, Salsanos, Saproxyl.*
- Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle, Le Chesnay (S.-et-O.). — *Dyspeptine Hepp.*
- Lab. de Physiologie et de Thérapeutique, 10, rue de Strasbourg, Paris (X^e). — *Atural, Microlyse, Natura.*
- Lab. de Phytothérapie de Paris, 113, bd Voltaire, Paris. — *Amipyrine, Ballotyl, Mandragol, Polycine.*
- Lab. Pialoux, 55, r. de Chabrol, Paris. — *Airoglyce, Bengouté, Cédro-Méthyle, Chlorurol, Dynamoférol, Hépatuyl, Iodoplume, Maniodhamamélis, Rectocalm.*
- Lab. du D^r Pinard, 90, bd St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du D^r Pinard, Calcigénol, Halocalcion.*
- Lab. Plagnol, 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles. — *Boldine Plagnol, Gaïacamphre, Nasylum Blondin, Van Sol (cachets).*
- Lab. Planche, 2, r. Volney, Paris (II^e). — *Amidon Planche, Eau Sova, Hémophiline Planche, Pilules Stibiées, Sirop Thomas.*
- Lab. du D^r Plantier, Annonay (Ardèche). — *Hémopanbiline, Panbiline, Rectopanbiline.*
- Lab. du Plasmocalcium, St-Just-en-Chaussée (Oise). — *Ergépatine, Sédergine.*
- Lab. J. Plé, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — *Antiphymique Vadam, Calcium-Plé, Diurétax, Histamyl, Phytosplénol Plé, Phyto-Vitamines Plé, Synergyl Vadam, Thalassotonine Vadam, Thalassotonine infantile.*
- Lab. Pointet et Girard, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline, Hépatodiagnose, Novismuth, Oxydrol, Prophylargyl, Soporalose, Vitargyl.*
- Lab. de la Polypeptine, 61, r. de Seine, Paris. — *Polypeptine.*

- Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Sulfureux Pouillet*.
- Fabrique Pontissus**, 34, rue de Besançon, Pontarlier (Doubs). — *Paraffino-Bande*.
- Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — *Derma-cide Porcher, Eczéda, Eczosec*.
- Lab. Porsin**, 39, rue Claude-Bernard, Paris. — *Apivène*.
- Lab. du Praticien**, Hussigny (M.-et-M.). — *Angihormol, Axyol, Bioxyol, Diatol, Exugyl, Minurex, Oxythyol, Thioxyol, Traitement Ambulatoire*.
- Lab. Probios**, 8, r. St-Martin, Paris (IV^e). — *Amiflorine, Azama, Comprimés Probios antipyogènes, Dentifrice Probios, Diorine, Embryochoc, Embryotonyl, Granules de Bourget, Hepationa, Intesto, Obsor, Onogo, Ovules Oape, Pépione, Probios Cream, Spasa, Triano*.
- Lab. des Produits Biologiques I. M. (S. Savigneux, pharmaci- en)**, 18, Cours Suchet. Lyon. — *Séro-Comprimés, Sérolactyl, Séro-liquide*.
- Lab. des Produits Dermiques R. P.**, La Roche-Posay (Vienne). — *Lotion Blanche R. P., Pâte à l'Eau R. P., Roche-Posay (produits), Sels de Bains R. P.*
- Soc. des Produits du Maïs**, 29, rue de Berri, Paris. — *Dextrosol, Maïzena*.
- Lab. des Produits Ortho-Malleval**, 34, r. du Plat, 9, r. Sala, Lyon (Rhône). — *Comprimés Ortho-Malleval*.
- Lab. Progil**, 10, quai de Serin, Lyon, et 6, rue du Pont, Ris-Orangis (S.-et-O.). — *Diasés, Mallogil*.
- Le Progrès Scientifique**, 25, bd Latour-Maubourg, Paris (VII^e). — *Demalgon, Neutracétyl, Novurit, Strychnotonine, Synthéma, Valovosan*.
- Lab. L. Prothière**, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine*.
- Lab. Prunier** 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat, Neurosine Prunier*.
- Lab. du Pulmodynol**, 22, rue de Nemours, Paris. — *Sédar-ithryl*.
- Lab. du Purgarex**, 58, r. du Rempart, Valenciennes (Nord). — *Purgarex*.
- Lab. du Pugetol**, 19, rue de Pontevès, Marseille. — *Boldo-live, Dermalive, Rhinolive, Sulfolive, Suppo Bil Olive, Suppolive*.
- Sté Purgos**, 7-7 bis, r. Galvani, Paris. — *Limonade Citrose-Vichy, Vichy purgatif, Purgos*.
- Lab. Py.** 58, bd Richard-Wallace, Puteaux. — *Lotion Py, Phostyl Py, Sédycal Py, Toussyl Py*.
- Lab. de la Pyodolysine (F. Martin, pharmacien)**, 2, rue des Trois-Mages, Marseille (B.-du-R.). — *Pyodolysine, Sédo-Bronchol, Thymoseptyl*.

- Lab. du Quassinol, J. Olive, pharmacien, 73, bd Baille et 109, rue de Lodi, Marseille. — *Gouttes Quassinol*.
- Lab. Quesneville, L. Colleson, 5, r. d'Angoulême, Paris. — *Crème de Bismuth, Crème de Bismuth Chl. magnésienne, Cupro-Salyl du Dr Quesneville*.
- Lab. Quies, 8, rue Auguste-Chabrières, Paris (XV^e). — *Boules Quies*.
- Lab. du Quina Blot, 38, bd de Strasbourg, Toulouse. — *Pelvuryl, Quina pepsiné Blot*.
- Lab. du Quina Bourcet, 7, avenue du Doyenné, Lyon. — *Bain de Bouche du Dr A. Boll, Quina Bourcet, Thiobyl Bourcet*.
- Lab. Quinet, 143, r. du Temple, Paris. — *Phosol, Quinobore*.
- Lab. du Quinsal (F. Bolla), 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône). — *Crème Stéar, Poudre Stéar, Quinsal, Sirop Bolla*.
- Lab. de la Quintolyse (M. Féret), 4, rue des Martyrs, Paris (IX^e). — *Quintolyse Féret*.
- Lab. Raby, pl. de la Comète, Asnières. — *Bilias Raby, Neuristol, Uricural*.
- Lab. du Radio-Baryx, 1, rue de Paris, Limours (S.-et-O.) — *Baryx-Colloidal, Baryxine, Radio-Baryx*.
- Agence Générale des Produits Rafax, 4, rue Boulard, Paris (XIV^e). — *Baume Rafax*.
- Lab. des Savons Ramet, Fontenay-Mauvoisin par Mantes-Gassicourt (S.-et-O.). — *Savons liquides Ramet*.
- Lab. Ranque et Senez, 16, rue du Dragon, Marseille. — *Vaccins bactériens I. O. D., Thylaxines I. O. D.*
- Lab. D. Raquet, 114, rue Solférino, Lille. — *Cavéform, Kélédol et Suppo-Kélédol*.
- Lab. Y. Ravalec, Pharmacien, 13, Grande-Rue, Herblay (S.-et-O.). — *Bellasodine, Carboquinol*.
- Lab. R. B. D., 37, rue du Vieil-Abreuvoir, Roubaix (Nord), Dr J. Willot, pharmacien. — *Babysanine, Cutisanine*.
- Lab. Reaunbourg, 115, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. — *Agarase, Passicarbonate, Passiflorine, Silguine*.

- Lab. Reboul, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine). — *Anuidol*, *Bituyol*, *Cardiobromine*, *Cholagol*, *Créo-suppo-camphre*, *Ergostol Violet*, *Péruviol*, *Sanocure*, *Tanode*, *Toni-bronchique*, *Uribiline*.
- Lab. de Recherches et Réalisations Scientifiques, 140, rue Lamarck, Paris (XVIII^e). — *Argolacta*.
- Lab. du Reconstituant Mary, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Phosphogaiacol Mary*, *Reconstituant Mary*.
- Produits de Régime Redeuil, 7, r. Couche, Paris (XIV^e). — *Pain Redeuil (frais et conserve)*, *Biscottes Redeuil*, *Chocolat Redeuil*, *Farine Redeuil*, *Pâtes Redeuil*,
- Lab. Regagnon et Cie, 276, rue Lecourbe, Paris (XV^e). — *Amborhinol*, *Bicolyre*, *Bronchosédyl*, *Energésine*, *Sédo plasme*, *Sedorhinol*.
- Lab. M. Reinhold, 20, rue de Rivoli, Paris (IV^e). — *Hébéol*.
- Lab. Reivilo, 191, fg Saint-Antoine, Paris (XI^e). — *Digex*.
- Lab. Remeaud, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine. — *Kluchol Remeaud*.
- Lab. Renard, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Algane*, *Crypthiol*, *Pneumogéine*.
- Lab. Renard et Cie, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Gaduamine*.
- Lab. du Dr Renaud, 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes. — *Cupro-Glycol*, *Ampoules Cardio-camphre simple et sparteiné*, *Elixir Phospho-Mel*, *Hyper-Sérum Nac*.
- M. Renaud, 2, rue Pierre-Demours, Paris. — *Lachesine*.
- Lab. Renault, 24, pl. des Vosges, Paris. — *Corizol*.
- Dépôt général Rendell, 61, rue Damrémont, Paris (XVIII^e). — *Cônes solubles antiseptiques Rendell*.
- Lab. Ch. Requis, 163, bd Croix-Rousse, Lyon. — *Antidiabétique Requis*, *Asuorol*.
- Lab. Revel, 34, rue St-Lazare, Paris. — *Iodonesyl*, *Philo-gastrine*, *Umcka*.
- Lab. Rey, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Casol F. Rey*, *Ludin*, *Pommade Crème Ludin*, *Sericrine Rey*, *Seroma Rey*.
- Lab. Reygagne, 160, avenue d'Italie, Paris (XIII^e). — *Ampoules Anti-H*, *Bioélixir*, *Bio-organic*.
- Lab. Rhemda, 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine). — *Boues radioactives Rhemda*, *Bougies radioactives Rhemda*, *Dermathorium*, *Mésothine*, *Mésothorium Rhemda*, *Ovules Rhemda (Radiovules)*, *Radiargyl*, *Radiomagnésium*, *Thorix (Thorium X Rhemda)*.
- Lab. du Rhinophta, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — *Produits Orhino*, *Tubes Ferlux*.
- Lab. Ricardou et Cie, 46, r. Pierre-Charron, Paris (VIII^e). — *Antibilieux Fuzor*, *Dentoline*, *Innerclean*, *Phospharsol*, *Sylvol*.

- Lab. M. Richard**, Aubenas (Ardèche). — *Gastrilène*, *Gripposédine*, *Neurosthénol*, *Péruglan*, *Phosphantyl*, *Rhinalène*.
- Lab. Richer**, 45, fg St-Denis, Paris. — *Adrogestill*, *Carbogénase*, *Colpophile*, *Comprimés Salvé*, *Embrocation Richer*, *Euskine*, *Florhépatine*, *Gynométine*, *Kolarsan*, *Lactodiastal*, *Mictophile*, *Morucalcose*, *Néopulmine*, *Neuraxial*, *Novaiodal*, *Nucléarsan*, *Oxmol*, *Paraveinine*, *Salvébyl*, *Stavafer*.
- Lab. Richomme**, 19, rue Pache, Paris. — *Cachets du Dr Richomme*.
- Lab. Richou**, 39, r. Taitbout, Paris. — *Gotira*.
- Lab. Ringeade**, Pharmacien, Fosseboudeau-Blaye (Gironde). — *Penghawar des Iles*.
- Lab. Rissa**, 46, rue Claude-Lorrain, Lille. — *Calci-Osteline*, *Glaxo*, *Iodex*, *Osteline*, *Ostomall*.
- Lab. M. de Rive**, 2, rue Mélingue, Paris. — *Aurixéma*, *Biodarcine*, *Collargophédrine*, *Ephédrivaine*, *Ephédrocure*, *Héparita*, *Minervol*, *Pulvo-Collargophédrine*, *Pulvo-Ephédrocure*.
- Lab. H. Rivier**, 10, passage Morel, Montrouge (Seine). — *Anégrine*, *Ascoléine Rivier*, *Benzo-Iodhydrine*, *Capsules Bruel*, *Séro-sérum Rivier*, *Valérianate Pierlot*.
- Phar. J. Robert (J. Boudier, succ.)**, 37, rue de Bourgogne, Paris. — *Bylyxyl*, *Hémocalciopectine*, *Gouttes Him*, *Veinosan*.
- Lab. Robert**, Place des Halles, Niort. — *Antiseptoma*, *Cardirène*, *Robrodyne*.
- Lab. Robin**, 13, rue de Poissy, Paris (V°). — *Bismuthoidol Robin*, *Bromone Robin*, *Camphydryl Robin*, *Camphydryl spartéiné*, *Camphydryl strychno-spartéiné*, *Glycérophosphate Robin*, *Iodone Robin*, *Nucléarsitol*, *Nucléatol*, *Parulcine*, *Pâte Robin*, *Peptonate de fer Robin*, *Peptokola Robin*, *Sirop Robin*, *Strychnarsitol Robin*, *Sulfoïdol Robin*, *Tablettes Robin*, *Voltargol*.
- Lab. Robinet**, Moret-sur-Loing (S.-et-M.). — *Magnésc-tubes Robinet*.
- Lab. Roche**, Pharmacien, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Iodopan*, *Orcalcine*, *Progaster*, *Yseull*.
- Lab. Rochereau**, Salbris (L.-et-C.). — *Dolysine*.
- Pharmacie Rogé Cavailès**, 116, bd Haussmann, Paris. — *Anoïde*, *Elixir iodépuratif Pépin*, *Pepsinacid*, *Phytoveinol*, *Suppositoires Rocav*.
- Lab. Rogerma**, rue des Jardins, Lens (Pas-de-Calais). — *Histogerma*, *Nevrosol*, *Rogerma*.
- Lab. Henry Rogier**, 56, bd Pereire, Paris. — *Baume Delacour*, *Insuline*, *Kymosine Rogier*, *Suppositoires Pepel*, *Uraseptine*, *Valbornine Rogier*, *Vitamine Rogier*.

- Lab. Albert Rolland, 4, rue Platon, Paris (XV^e). — *Hépa-phos*, *Hépatrol*, *Hepbi*, *Micelliode*, *Oclensanol*, *Stomarol*.
- Lab. Pierre Rolland, 127, bd St-Michel, Paris. — *Balmiga*, *Hypalène*, *Natrosyl*.
- Lab. du D^r P. Rolland et Duret et Rémy réunis, Asnières (Seine). — *Bis-Ka-Ma*, *Choléokinase*, *Comprimés d'Alibour*, *Cystosone*, *Hépatosodine*, *Nobial*, *Nyctal*, *Pelvisedol*, *Peptonal*, *Polypeptonal*, *Pyroclase*, *Quinobrome*, *Saturol*, *Seroquinol*, *Thaolaxine*, *Tussédyl*, *Zoocytine*.
- Lab. Romon, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Ampoules Romon*, *Forvical*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Étab. Roques, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaine Roques*.
- Lab. Rosa, 11, r. Roger-Bacon, Paris XVII^e. — *Chophytol Rosa cristallisé injectable* (ampoules), *Chophytol Rosa* (dragées et gouttes), *Cynurol Rosa* (dragées).
- Lab. L. Rouanet, 48, rue de la République, Antibes (A.-M.). — *Apiol Tanit*, *Phosphogayol*, *Tisane Tanit*.
- Lab. Rousseau, 71, av. de Villiers, Paris (XVII^e). — *Rhagadine Bracquemond*.
- Lab. Rousseau, 49, rue du Château-d'Eau, Paris (X^e). — *Bi-Activol*, *Gastrobellone*.
- Pharmacie Roussel, 10, rue Washington, Paris. — *Élixir Tonicardiaque Roussel*, *Sirop et Gouttes au Nitrite d'Soude Roussel*, *Tétranitrol Roussel*, *Trinitrine Roussel*.
- Lab. du D^r Roussel, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). — *Angioxyl*, *Disonyl*, *Gravidostyl*, *Hémostyl*, *Hépagyl*, *Hormone Gonadotrope*, *Insulanol*, *Insulyl*, *Microgel Microvax*, *Proxylol*, *Sérum Polyvalent de Leclainch et Vallée*, *Suiseryl*, *Trephonyl*.
- Lab. du D^r Roussel, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e). — *Benzo-Gynœstryl*, *Benzo-Gynoestril 5*, *Bivatol*, *Casaldyl*, *Collubiazol*, *Ectiazol*, *Folliculine*, *Gynœstryl*, *Hormoclases*, *Isonal*, *Lysarthrol*, *Myovarsyl*, *Opodermyl*, *Opothérapie du D^r Roussel*, *Phytogyl*, *Pyoformine*, *Renoxyl*, *Rubiaderm*, *Rubiazol*, *Sedo-Gynœstryl*, *Sirop laxatif Gobey*, *Sirop pectoral Gobey*, *Sirop sédatif Gobey*, *Stérandryl*, *Sterogyl*, *Uclarsyl*, *Uroformine Gobey*.
- Lab. R. Roussel, 72, Grande-Rue, Flers (Orne). — *Bromophène*, *Hémorroïdyl*, *Paidol*, *Plasmatol*, *Prurilyse*.
- Lab. G. Roussy, 164, r. St-Honoré, Paris (I^{er}). — *Anictérol*.
- Lab. Routier, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Duret*.
- Lab. M.-A. Roux (M. A. R.), 58, rue de Maubeuge, Paris. — *Antiseptique Nénita*, *Armosine*, *Bili-Magnétol*, *Entéroglandex*, *Gastronaldine*, *Glandex*, *Gutturyl*, *Kaolovules*, *Phlogogyne*, *Phlogovules*, *Purgelettes Roux*, *Stechovules*, *Sulhyp*, *Totaliode*, *Ur-Clar Blanc Bleu*, *Urimagnétol*.

- Lab. Roux, 60, route de Châtillon, Malakoff. — *Ricilax*.
- Lab. A. Roy, 81, bd Suchet, Paris. — *Comprimés Roy, Kola Roy, Magnésie Roy, Quinium Roy, Sulfo-Bore*.
- Lab. Roy, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand. — *Ferydal, Spécifique Mignard*.
- Lab. de Biol. Appl. G. Roze, 2, allées de Chelles, Le Raincy (S.-et-O.). — *Iode colloïdal Roze, Bismogyre, Marra-mélis, Philhepar, Rhinarsenol, Sirop Seillon*.
- Lab. Dr Ruin, 10, rue du Bloc, Amiens (Somme). — *Energines de Berck*.
- Lab. Sabatier, 10, rue Pierre-Ducieux, Paris. — *Fluodyle, Ouataplasmé Dr Langlebert*.
- Lab. Salantale, 42, rue Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Vaccins Salantale : Auriculo, Cysto, Gingivo, Ophtalmo, Oto, Ovules, Pommade, Recto, Rhino, Suppo, Tracho Salantale. Tubes Strana : Pommades ophtalmiques*.
- Lab. Salavert, Ste-Foy-la-Grande (Gironde). — *Antinéase, Sulf-Y*.
- Lab. du Salibra, 1, rue des Jardins, Asnières (Seine). — *Salibra*.
- Établ. Thermal de Salies-du-Salat (Haute-Garonne). — *Eaux-Mères*.
- Lab. A. Salles, 11, bd de Strasbourg, Paris. — *Boldolactol, Elixir Zidal, Zidal*.
- Lab. Salmon, 151, rue de Charenton, Paris (XII^e). — *Carbin-tol, Fixophos, Gargarisme Salmon, Gynosanine, Hédéranol, Inovap, Olégarine, Plurinatryl*.
- Lab. du Salyfrêne, 17, avenue de la Capelette, Marseille. — *Salyfrêne*.
- Lab. du Sambul, 22, rue St-Pierre, Evreux (Eure). — *Bougie coricide, Dermopode, Sambul (Liquide et Comprimés)*.
- Lab. Sanarteryl, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl, Sedhepatine*.
- Lab. Sanavita, 7, r. Fontaine-Delsaux, Lille. — *Bevita, Viredox*.
- Prod. Sandoz, 20, r. Vernier, Paris (XVII^e). — *Allisatine Baume-Panthésine, Belladénal, Bellafoline, Bellergal, Calcibronat, « Calcium-Sandoz », Digilanide, Féla-mine, Gynergène, Lobéline, Optalidon, « Quinine-Cal-cium-Sandoz » Raphabil, Sandoptal, Scillarène*.

- Lab. du Sanogynol, 161, r. Croix-de-Seguey, Bordeaux (Gironde). — *Sanogynol*.
- Produits Sanova, 103, rue St-Lazare, Paris. — *Enteraspirine*, *Hépatismine*, *Iodasclérine*, *Magnacalcine*, *Magnésie Roger's*, *Osmo-Peptide*, *Talyc*, *Tisane Sanova*, *Uricémine*, *Urose Vigan*.
- Lab. de la Santhéose, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose*.
- Lab. Saporex, 184, route de Genas, Lyon. — *Barytol*, *Ovules Saporex*, *Saporex*.
- Lab. Saporta, 5, bd Lefebvre, Paris (XV^e). — *Embrocan*, *Térébane*.
- Lab. du Sarcotol, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Sarcotol*.
- Lab. Sarda, 119, rue de Sèze, Lyon. — *Romaboldo*, *Phytosang Sarda*, *Uropiat*.
- Lab. Sarein, 14, avenue Perrichont, Paris. — Voir Lab. de *Thérapeutique Antirhumatismale*.
- Lab. Sassé, 78, bd Beaumarchais, Paris. — *Cacospermine*, *Dercusan*, *Dermose anti-impétigineuse*, *Rinoleina*, *Sanalepsi Russi*.
- Lab. Sauba, Montreuil, Paris. — *Adrénaline (Tablettes)*, *Adrénolire*, *Anthracalcine*, *Boldobyl*, *Cachets Dolozyms*, *Cafédrine*, *Chlorical*, *Citrina*, *Codobromyl*, *Curasmes*, *Dragées Gargarisme de Luchon*, *Dragélines*, *Gouttes Molinal*, *Gouttes Narkay*, *Menyantol*, *Neuridor*, *Olical*, *Olisol éphédriné*, *Phosovigol*, *Saubarsinol*, *Saucholine*, *Spartédrine*.
- Lab. Saunier, 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Baume Gélutrol*, *Cachets Saunier*, *Hédopeptol*, *Libérase*.
- Lab. Sauze, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy (Loire). — *Euquingargol*, *Ultraformine B et S*.
- Lab. Roger Savoie, 2 et 4, place St-Martin, Vendôme (L.-et-Ch.). — *Psoryl*, *Pyocoline*.
- Lab. Henri Schéhadé, 17, rue Chomel, Paris (VII^e). — *Arthrilysé*, *Asthmasédine*, *Capsorhinol*, *Euvagol*, *Normalax (pur et au Cascara)*, *Oléorhinol*, *Ova-Crine*.
- Lab. Schmit, 71, rue Ste-Anne, Paris. — *Aerocia*, *Aseptobiline*, *Cachets Tacet*, *Capsules Petithuguenin*, *Formicalcine*, *Galliodine*, *Mangaine*, *Mucigénol*, *Myonutrose*, *Opo-cères*, *Prélase*, *Réginase*.
- Lab. des Prod. Scientia (D^r E. Perraudin, pharmacien de 1^{re} classe), 21, r. Chaptal, Paris. — *Bain Bagnor*, *Calcoléol*, *Diabétifuge*, *Digestonic*, *Ergotine Bonjean*, *Globexine*, *Huile iodée et Calcium Finikoff*, *Iodocitrane*, *Oxymenthol*, *Pancrépar*, *Pepialmine*, *Pepitalmine magnésiée*, *Polycalcion*, *Quineine*, *Staphylococcine Fraquel*, *Tricalcine*.
- Lab. Scott et fils, 348, rue St-Honoré, Paris (I^{er}). — *Opto Scott*.

- Lab. Seclo**, 6, r. Adolphe-La-Lyre, Courbevoie. — *Baume Kamol, Chocolax, Emulsion Scott, Huile de foie de Morue Seclo, Pastilles Seclo, Suppopirine Seclo, Uri-cure, Vitamines Seclo.*
- Lab. Seda**, 149, av. des Minimes, Toulouse. — *Acticarbine, Actiformine, Cachets Seda, Colluseda, Elixir Seda, Neuroseda, Pectoseda, Pulviseda.*
- Lab. du Sédarthryl**, 22, rue de Nemours, Paris. — *Luostyl, Pulmodynol.*
- Lab. de la Sédatussine**, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Sédatussine.*
- Lab. de la Sedhepatine**, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl, Sedhepatine.*
- Lab. de Thérapeutique générale Sedrob**, 35, rue Périissé, Toulouse (Haute-Garonne). — *Cachets Sedrob, Carbo-septine, Hamhydril, Néphosol, Plasmosalin, Riptocholine.*
- Lab. Seguin**, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle, Phosphofluor Beynet.*
- Lab. Ch. Seguin**, 7, r. Sainte-Isaure, Paris (XVIII^e). — *Articholine, Artrex-Croz, Calcium Vehem, Ektal, Génysil, Iodoxinol, Irracalcase, Moruan, Orthochol, Orthosedan, Phéchlorment, Pulmositoires.*
- Lab. Serindat**, 4, rue Lecomte-de-Nouy, Paris (XVI^e). — *Phosphobrom, Phosphomagnésium.*
- Lab. du Séroxéma**, 1, rue de Phalsbourg, Paris (XVII^e). — *Séroxéma.*
- Lab. J.-M. Serre**, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Olcalan, Porodermal, Vermifuge Cornet.*
- Lab. Servier**, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase, Iminasthme, Muxol, Ozodor, Pyri-pyridium, Stérigyne.*
- Lab. Sevenet**, 10, rue Le Chapelais, Paris. — *Hémagène Tailleur.*
- Lab. Sévigné**, 76, rue des Rondeaux, Paris (XX^e). — *Ulcéoplaque, Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol, Ulcéobalnéine.*
- Lab. Siéat**, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *Acripyroril, Bucco-Progone, C. B. K., Oléovules, Progone, Progoseptone, Sféal, Sirop Viano, Suppositoires SFEAT.*
- Lab. SICA**, 13, r. Beudant, Paris (XVII^e). — *Euplastyl, Extraits opothérapiques S. I. C. A., Jecopeptol, Novhépar, Sédontal, Sicovaire, Sicridine, Traphéine.*
- Lab. du Siècle**, 13, rue Boinod, Paris. — *Bromo-Garnal, Draguirol.*
- Étab. Silbert et Ripert**, 30, rue Bénédict, Marseille. — *Muronas du Dr Robert Jacques.*

Société Française de Produits Pharmaceutiques (Anc. Adrian et Cie), 9 et 11, rue de la Perle, Paris. — Arrhénal Adrian, Bismuth Adrian, Carbo-Bismuth Adrian, Carbonate de chaux Adrian, Chloroforme Adrian, Chlorure de Magnésium Adrian, Chlorure d'Ethyle Adrian, Endocaïne, Ether anesthésique Adrian, Hupnosol Adrian, Hydrate de Magnésie Adrian, Mélange Anesthésique A. C. E., Mélange de Schleich, Progadol, Radio-baume Adrian, Révulsif Adrian, Sul'urine du D^r Langlebert, Toni-Pectoral Adrian, Velledol Adrian.

Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher). — Comprimés Luc, Edal-gine, Electralgine, Iodo-Dépuratif Jacquet, Sodésyl, Venisette.

Étab. Soudan, 48, rue d'Alésia, Paris. — Ampoules Boissy (Iodure d'Ethyle), Ampoules Boissy (Nitrite d'Amyle), Biophorine Girard, Bromomaisine, Caséoline Girard, Diabétosan, Euonymine Thibault, Glycérophosphate de chaux, Granulé Girard, Iode organique Boissy, Iodomaisine, Lactagol, Laxatifs Miralon, Laxopeptine Girard, Nucléo-Fer Girard, Oléocidase Thibault, Oléosodine P. Thibault, Sirop Girard, Valérium Thibault, Vasogènes Pearson, Vin Girard.

Lab. Souffrice, 16, rue de Gramont, Paris (II^e). — Rhino-Sulforgan.

Lab. du Soufre Organique, 16, rue de Gramont, Paris (XX^e). — Sulforgan.

Lab. du Spasmonéural, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — Spasmonéural.

« **Specia** » (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. — Acétylarsan, Alunozal, Alvo-ricine, Anthéma, Anthiomaline, Asciatine, Balsoforme, Baume Rhodia, Bévitine, Coryphédrine, Crisalbine, Diagnothorine, Dmelcos, Ergorone, Flétase, Foriod, Gardenal, Gélobarine, Gonacrine, Hexorcène, Huile de foie de morue médicinale suractivée Rhône-Poulenc, Hyrganol, Moranyl, Myochrysine, Néocardyl, Néo-Dmégon, Néo-Dmètys, Neptal, Novarsénobenzol Billon, Ovo-Lécithine, Pâte Gingivale, Pâte spéciale antidysentérique, Pragmoline, Prémaline, Propidex, Propidon, Quinacrine, Quinio-Praequine, Quinio-Stovarsol, Rénaleptine, Rhodarsan, Rhodazil, Rhodiacarbène, Rhodoquine, Rhoféine, Rubyl, Ruional, Sanédrine, Scurocaïne, Scuro-forme, Septazine, Soluseptazine, Soneryl, Stovaïne, Stovarsol, Tabédo, Técarine, Tochlorine, Tryparsamide, Urazine, Vaccins atoxiques stabilisés, Vitascorbol.

Lab. Spès-Guiraud, 10, impasse Milord, Paris (XVIII^e). — Elixir Spès du D^r Guiraud, Tubes du D^r Guiraud.

Lab. du Stearol, 5, r. E.-Combes, St-Etienne (Loire). — Jennol, Lenior Bonnet, Pommade Acar, Stearol.

Lab. Stelvia, 59, r. Boissière, Paris (XVI^e). — Carbo-Combrosmol, Combrosmol, Equisétol, Foliavène, Granulé Edgès, Opodigestifs, Phytomensyl, Plasthamélyne, Pulsamone, Tisane Ferlys.

- Lab. Sténé, 14, rue des Guillemites, Paris (IV^e).** — *Atocrazine, Baume Créza, Bilifluine, Bouillon vaccin opératoire Sténé, Crésopirine, Crésotanol, Cryptotoxyl, Flavuro, Fluxidia, Hémato-iodine, Hypocholate, Urifluine, Vaccin antipyogène Sténé, Vaccin antistaphylococcique Sténé, Vaccins Sténé, Vaccins (anti-asthmatique, anti-pneumonique, anti-grippal).*
- Lab. du Stomagyl, 143, cours de la Somme, Bordeaux.** — *Stomagyl.*
- Lab. du Stomoxygène, 2 bis, rue du Chevalier-de-la Barre, Saint-Quentin (Aisne).** — *Boromyl, Gabiol, Halocure, Stomoxygène.*
- Lab. H. Stouls, 156, av. Victor-Hugo, Paris.** — *Balsaine, Borinhalant, Columiel, Comp. Aseptuter, Cyalène, Ephodol, Galégactol, Gardorinol, Hemostase, Iodogargyval, Laxaflor, Pangastrol, Pan-Neurol, Paquets Solubles O. R. L., Passacanthine, Roburex, Suppo-Anestaline, Tonique Dulciane.*
- Lab. du Strictargol, 20, r. des Martyrs, Paris.** — *Strictargol.*
- Lab. G.-R. Strohl, 2, r. Sédillot. Strasbourg (Bas-Rhin).** — *Cutobronchyl, Cutopralgine.*
- Lab. Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes.** — *Anusol, Calmag-Na, Loraga, Molagar, Panosan, Vasonitryl, Véganine, Vince.*
- Lab. Substantia, 53, r. du Poinçon, Bruxelles.** — *Agarcl, Anusol, Calmag-Na, Vasonitryl, Véganine.*
- Lab. de la Sulfoléine Rozet, Vendôme (L.-et-Cher).** — *Gastrocaol.*
- Lab. Sulfo-Thiorine, 39, r. Fondaudège, Bordeaux.** — *Bacturyl, Balsosantol, Hypo-Thiorine, Inhalo-Thiorine, Pulmo-Thiorine, Sulfo-Thiorine, Thiorine.*
- Lab. du Sulfoxal, 48, rue Claude-Lorrain, Lille.** — *Sulfoxal.*
- Produits Synerga, G. Chauzeix, pharmacien, 8, rue Lafayette, Paris (IX^e).** — *Bismogénol, Desitin, Desitinol, Léicitine colloïdale, Néospiran, Novophylline.*
- Lab. Synops, 84, rue du Faubourg-du-Temple, Paris (XI^e).** — *Agonoccine, Aseptoline Freysse, Dynamose, Jodal, Néoglobuline, Panpectose.*
- Lab. Tachot, 103, r. St-Lazare, Paris (IX^e).** — *Psyllium Langlebert.*

- Lab. du D^r Talon**, 153, bd Montparnasse, Paris. — *Histonyl*, *Pommade Talon*, *Tisane Talon*, *Solution Talon*, *Vin Anti-Diabétique Talon*.
- Lab. de la Tamarine**, 4, route du Médoc, Le Bouscat (Gironde). — *Tamarine*.
- Lab. L. Tattevin, D^r en Pharmacie**, 3, r. E.-Burgault, Vannes — *Asthmosine*.
- Lab. P. Tavernier**, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Biopausine*, *Ergocoline*, *Hépax*, *Indoberberine*, *Inhalo-boll*, *Inhalo-sel*, *Leucolyse*, *Mancobène*, *Miroxyl Lahaye*, *Phospho-Gaiacol Mary*, *Polytonyl*, *Prefagyl*, *Reconstituant Mary*, *Tachédrine*, *Tisane Hépatique Lahaye*.
- Lab. Teyssèdre**, 74, fg d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssèdre*.
- Lab. Thaïdelmo**, 11, Chaussée de la Muette, Paris (XVI^e). (Voir *Laboratoire de Microbiologie*.)
- Le Thé d'oranger (J^e Nègre)**, 18, r. Louis-Blanc, Cannes. — *Le Thé d'oranger*.
- Lab. A. Thepenier**, 10, rue Clapeyron, Paris. — *Amylodiastase*, *Bulgarine Thépenier*.
- Lab. Thérabiol**, 21, Grande-Rue, Argenteuil (S.-et-O.). — *Néochloral Nau*.
- Lab. de Thérapeutique Antirhumatismale**, Sarein, 14, av. Perrichont, Paris. — *Alcalax*, *Asfarol*, *Autocator*, *Babydermine*, *Belladoforme*, *Bichlorhydrol*, *Bromo*, *quietol*, *Bronchonal*, *Entérorubiase*, *Entérosalicyl*, *Escaïne*, *Gastrocolase*, *Glucosalyl*, *Histalgine*, *Myotonine*, *Parbelle*, *Pulmonase*, *Radia*, *Saliquinol*, *Sulfosalyl*.
- Lab. de Thérapeutique expérimentale médico-pharmaceutique**, 188, cours de la Somme, Bordeaux. — *Hémotérine irradiée*.
- Lab. de Thérapeutique O. R. L.**, 72, rue de Bagneux, Montrouge. — *Aminoléine*, *Otoléine*, *Pharyngoléine*.
- « **Théraplax** », Sté générale d'Application thérapeutique, 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — *Biiodure et Bromure Souffron*, *Catalgine*, *Carbone Théraplax*, *Crème de Nujol*, *Crescol*, *Freinix*, *Féroxal*, *Grassyl*, *Gynoplax*, *Hémotonine*, *Ifranor*, *Iodure Souffron*, *Ixium*, *Kéraffine*, *Mandelium*, *Mésothorium*, *Nitium*, *Nujol*, *Ostréine*, *Perofreinix*, *Perosédol*, *Quinothorium*, *Réalphène*, *Sédol*, *Septoplax*, *Sirop Efryl*, *Spasedol*, *Supponeryl*, *Supposédol*, *Vaccins Demonchy*, *Véronidia*.
- Lab. Thérinex, R. Condé, Pharmacien**, 6, r. de Dunkerque, Paris. — *Icorase*, *Stinergyl*, *Viabylis*.
- Lab. Thévenot**, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigol*, *Borocalcyl*, *Choléoboldine*, *Eupnéol*, *Juniodyl*, *Lacto-fermentine*, *Phoshémoquinol*, *Santuro*, *Thiocitran*, *Triseptol*.
- Lab. Thiers**, 3, place Thiers, Le Raincy (S.-et-O.). — *Erythrasedol*, *Suppoquinol*.
- Lab. Thiriet et Cie**, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl*.

- Lab. Thirode**, 33, Gde-Rue, Besançon. — *Belcarmine*, *Eczémine*, *Génécarmine*, *Gorgex*, *Hydramélis*, *Naziline*, *Omonos*, *Pilules Norma*, *Sédorgine*.
- Lab. L. Thomas**, 33, fg. Montmartre, Paris. — *Asthmenthol*, *Baume Thomas*, *Héganol*, *Huile de Haarlem*, *Purgettes Lentilhac*, *Rhinadorine*, *Terbinthiol*.
- Lab. Thoral**, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme). — *Asm*, *Bronchasmine*, *Catarasmine*, *Diuréphédrine*, *Ephédrasmine*, *Garéphédrine*, *Spécifique Thoral*.
- Lab. Tiffeneau**, 24, rue de Monttessuy, Paris. — *Genoderme*, *Nefitol*, *Pastilles Nolettes A. B. C.*, *Polysodine*, *Purgalax*, *Somnalgine*, *Vin Tonic Tiffeneau*.
- Lab. G. Tinard**, 134, bd Pereire, Paris. — *Dulcilax*, *Pangestyl*, *Salyptol*.
- Lab. du Dr G. Tissot**, 34, bd de Clichy, Paris. — *Bronchodermine*, *Charbon Tissot*, *Diasto-pepsine*, *Gérasol Cimon*, *Magnecythine*, *Nervocithine (Hépalocithine)*, *Panurol*, *Supparygres*.
- Lab. du Tophol**, 3, rue Condillac, Grenoble. — *Tophol*.
- Lab. Toraude**, 22, rue de la Sorbonne, Paris. — *Antimycose*, *Bain Flévar*, *Bronchotonine*, *Diumnal*, *Flébosanine*, *Gluti-Santal*, *Hypostrontium*, *Hyposulfène*, *Iodassium*, *Iodosulfène*, *Jabosulfène*, *Leucagine*, *Levure B. 17*, *Néo-trépol*, *Précibiase*, *Psychobiases*, *Rectagine*, *Réthragine*, *Sorbocalcion*, *Sornyal*, *Spirochlan*, *Staprolysat*, *Trépol*, *Trépoquinol*, *Ultra-Levure*, *Vin Raci-Bel*, *Yptor*, *Zymostol*.
- Lab. du Total Magnésien**, 24, bd Sébastopol, Paris. — *Total Magnésien*.
- Lab. Trouette-Perret**, 61, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Aphloïne*, *Isphaghul*, *Lofodol*, *Nisaméline*, *Oponuclyl*, *Papaïne*, *Romarantyl*.
- Lab. Unis-Spès**, 14, rue Demarquay, Paris (X^e). — *Algophagine*, *Artil*, *Carboléine*, *Dépuratif Nox*, *Epocl*, *Exonagar*, *Fluxivenol*, *Gastiasse*, *Hémotal*, *Hépatodiase*, *Nox*, *Potion Dioga*, *Santalex*, *Sels Marva*, *Stomalex*, *Terco-dal*, *Vacciderm*.
- Lab. de l'Urocholine**, 20, place de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine). — *Urocholine*.
- Lab. de l'Uroclarol**, 117, rue Victor-Hugo, Houplies (Nord). — *Buchobléu*, *Sirop de Sulfogaiacolate de Potasse du Dr Henry*, *Thymoseptol*, *Uroclarol*.
- Lab. de l'Uroclase**, 95, rue de Prony, Paris. — *Cathacide*, *Cholal*, *Uroclase*.

- Lab. de l'Uroflux, 21, rue de Lyon, Paris (12°). — *Anucalm* (suppositoires), *Métricure* (poudre et ovules), *Miclosédine* (cachets), *Prostalyse*, *Sédomicol* (capsules), *Uroflux*, *Variphile*.
- Lab. de l'Uroïodine, 17 bis, rue Juge, Paris (XV°). — *Lactosodine*, *Nécraxites*, *Uroïodine*.
- Lab. *Uromil* (L. Belières, Dr en Pharmacie), 19, r. Drouot, Paris. — *Uromil*, *Radio Salil*, *Vitagar*.
- Lab. de l'Urosiphon, 1, r. de l'Odéon, Paris. — *Cachets de Sidérol PEM*, *Névratine Rosey*, *Pastilles Lezin*, *Urosiphon*, *Vin Rénovateur Huchédé*.
- Lab. de l'Urticide, 2, rue Michelet, Alger. — *Ioglott*, *Urticide*.
- Usines Chimiques des Laboratoires Français, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Calciodyl*, *Myovarsyl*, *Prévarsyl*, *Uclarsyl*.
- Lab. de l'Uvéoline (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline*, *Uvéovules*.
- Lab. de Vagothérapie, M. Crozet, docteur en pharmacie, Saint-Venant (P.-de-C.). — *Vagogastryl*.
- Lab. Vaillant, 19, r. Jacob, Paris. — *Audigénine*, *Pancréastase Defresne*.
- Valentin Aage Moller, 149, r. du Palais-Gallien et 39, rue Fondaudège, Bordeaux. — *Exhepa*, *Insuline Léo*, *Léolamine*, *Métallosal*, *Sanocrysine* et *Oléo-Sanocrysine* de Mollgaard, *Seringues*, *Sulfosine Léo*.
- Lab. de la Valthène (A. Valat), 166, rue de la Roquette, Paris (XI°). — *Valthène*.
- Lab. de la Val'Ovarine, 1, av. Eug.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine). — *Hémovaryl Farma*, *Pept'iode Farma*, *Val'Ovarine*.
- Lab. Valtry, 122, Champs-Élysées, Paris. — *Curozema*, *Oposérothérapie Valtry*, *Vagosédyl*.
- Lab. Vamétol, 14, rue de Périgueux, Angoulême. — *Bionéol*, *Vamétol*.
- Lab. de la Varilaxine, Surgères (Ch.-Inf.). — *Gargarisme du Mont-Dore*, *Rectoline*, *Rectosol*, *Sédacrine*, *Varilaxine*.
- Lab. Védé, 2, pl. Gambetta, Paris. — *Hépalomel*, *Paquets Védé*, *Menthe Védé*.
- Lab. F. Vellay, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Eupnogénol*.
- Fabrique Vendéenne de produits pharmaceutiques, 10, rue Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée). — *Angéiol*, *Néphractive*.

Lab. Venot, 139, av. Émile-Zola, Paris (XV^e). — *Bain Salvia, Pilules Salvia, Santonia, Vérogénol.*

Lab. E. Verdon, Pharmacien, Celles-sur-Belle (D.-S.). — *Choleo-Fluase, Colave, Gasmanyl.*

Lab. Ch. Vergelot, 6, rue de Navarin, Paris. — *Hépatoglobine.*

Lab. opothérapique E. Vergelot, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases, Amyliodine, Anti-Anémique F. F., Déméteros, Henrick's bill, Opolases, Mangratines, Matéine Dufert, Morrhuxine, Paquets P. G. L., Nucléasine, Panfito, Pastilles Saint-Christau, Sédo Viète, Siforcia, Sirop Viète, Splénose, Transfusine, Triseltz, Zistasine.*

Lab. du D^r Vermersch, 18, rue des Écoles, Paris (V^e). — *Bromure de Calcium, Chlomag, Pofénane, Prunagar, Sirops Henry Mure, Syseros, Tartroborol.*

Lab. Verne, 13, rue D^r Mazet, Grenoble (Isère). — *Boldine Verne, Boldo Verne, Pulmoverne, Sulfex.*

La Verrerie Scientifique, 12, av. du Maine, Paris (XV^e). — *Diathermie, Infra-Rouges, Ultra-Violets. — Appareils galvaniques, faradiques, galvano-faradiques, de haute fréquence. — Electrodes de haute fréquence. — Accessoires d'électricité médicale. — Cautère-Lumière.*

Lab. Vial, 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon. — *Artériolex (ex Minéralogène), Sel Vial.*

H. Vial, Pharmacien, 36, pl. Bellecour, Lyon. — *Vin de Vial et Sirop Tonique Vial.*

Lab. E. Viel, 37, av. de l'Opéra, Paris. Usine à Rennes, 11 et 12, bd de Chézy. — *Iodargol, Iodeol, Iodéopirine, Ovules à l'Iodéol, Salicairine.*

Lab. du Vicalphos, 48, . St-Jean, Lyon. — *Vicalphos irradié, Vicalphos simple.*

Lab. Vicario, 17, bd Haussmann, Paris. — *Adonal Vicariol, Andryl Vicario, Bromadyl Vicario, Calomel Vicario, Collyre des Alpes Vicario, Dimétol Vicario, Héroïne Vicario, Listose Vicario, Nopirine Vicario, Penghawar Vicario, Plasmodine Vicario, Rhésalgine Vicario, Trinitrine Vicario, Yohimbine Vicario.*

Lab. Vigier (J. Huerre et Cie), 9, r. de la Gare, Levallois. — *Albuplast, Aristoplast, Aristoplastic, Crème Mégève, Crème de Lainine, Extensoplast, Furoplast, Hermoplast, Kiroplast, Lactophorine, Manganifer.*

Lab. Vincent, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Angitan, Cholécystine, Iodocaïne, Nigérine.*

Lab. du Vinocrinol, 30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.). — *Iodosclérol, Vinocrinol.*

Labo-Vita, 190, bd Haussmann, Paris. — *Urovitine*, *Vitacholine*, *Vitacurool*.

Lab. du Viophan, 81-83, rue de Lille, Roubaix. — *Viophan Organi-calcion simple*, *Organi-calcion endocrinien polyvitaminé*, *Rhino-colloïdol*.

Lab. Virultra, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables*, *Vaccins-pansements* et *Vaccins buvables Virultra*.

Lab. Vogein, 2, 4 et 6, rue des Deux-Ponts, Paris (IV^e). — *Freinolutéine*, *Panlutéine*, *Stormolutéine*.

Produits Wander, P. Bastien, Pharm., 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). — *Alcacyl*, *Alucol*, *Cris-tolax*, *Formitrol*, *Héparégu-line*, *Jémalt*, *Pepso-Gloma*, *Pneuma* et tous les extraits de *Malt médicamenteux* (*Glomas*).

Sté anonyme des Étab. Wander, 151 bis, route de Joinville, Champigny (Seine). — *Carottase*, *Gloma pur*, *Maltosan*, *Nutromalt*, *Ovomaltine*, *Végumine*, *Veguva* (Voir **Produits Wander**).

Lab. Warin, 4, chaussée de la Muette, Paris. — *Bucmine*, *Buc-Vac*, *Cachets Rava*, *Citrocarbène*, *Citrofluyl*, *Fidulax*, *Hépatogastrine*, *Hermostyrum*, *Hydrogemmine*, *Lagasse*, *Inhaloxyl*, *Juglamarine*, *Panfortan*, *Pastilles Irsi*, *Psycho-Neuryl*, *Staphydex*, *Vaccin-Irsi*.

Lab. Weber, 5 bis, rue des Haudriettes, Paris. — *Glyco-Thymoline*.

Lab. A. Welcker et Cie, 72, rue du Commerce, Paris. — *Bacté-Ricyl*, *Sanas*.

Lab. des Produits Xanthoreryl, 4, r. d'Aumale, Paris. — *Xanthoreryl*.

Lab. de la Yaourtine (L.-J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris. — *Yaourtine*.

Lab. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris. — *Cérébro-lipase*, *Cupro-formine*, *Helguerol*, *Pneumolipase*.

Lab. du Dr Zizine, 24, rue de Fecamp, Paris. — *Agocholine, Entéropanement, Gastropanement, Lait Calciqne Zizine, Peptodiase, Sédogastrine, Vivoléol.*

Prod. Zyma. — Dépôt général, Lab. Lobru, 26, rue Vauquelin, Paris (V^e). — *Hémosamine, Tablettes Hova, Levure Mycéla en comprimés, Lipodéterpénol, Gouttes Pilha, Themsaline, Viscum Zyma.*



255-9-37. — IMP. CRÉTÉ. — CORBEIL.

